

خاندانی علاج

KHANDANI ILAJ

M. Bhattacharyya & Co. (Private) Ltd.

ہومیو پیتھک
خاندانی علاج

KHANDANI ILAJ

جسکو
جناب ہمیش چندر بھٹاچاریہ

نے
تالیف کر کے شائع کیا

ایم۔ بھٹاچاریہ اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ

نمبر ۳۷ نیتاجی سبھاش روڈ کلکتہ ۱

نے چھپوایا

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نیو کوشل آرٹ پریس نمبر ۵ پرنسپ اسٹریٹ کلکتہ ۱۳۔ بی۔ جی

Rs.

185/-

۱۹۴۳ء اگست

بار پنجم

6th Edition

V-X-85

دیباچہ

ہے امر الکل مسلمہ ہے کہ علاج ہو میو پیتی اپنے ڈھنگ کا نرالا علاج ہے ان ادویات میں اس قدر جادو کا اثر ہے کہ ایک قطرہ دوا جان کنی کے وقت آب حیات کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنایا ہے کہ ہندوستان کے ہر خاندان میں اس پر اثر علاج کا رواج ہو اور معمولی امراض میں لوگ خود ہی علاج کر لیا کریں۔ اور کسی سخت مرض میں یا حادثات میں ڈاکٹر کے آنے تک دوا دی جاسکے۔ اس خیال کو مدنظر رکھ ہم نے ایک کتاب موسومہ برادرک جھکٹسا، ہندی زبان میں شائع کی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ چھوڑے کئی بار طبع کرانا پڑا۔ اردو داں صاحبان کا اصرار بہت ہوا کہ یہ کتاب زبان اردو میں بھی شائع کی جائے اور ہم کو بھی معلوم ہوا کہ اگر یہ کتاب زبان اردو میں بھی شائع کی جائے تو اس ضرورت رفع ہوگی۔

لہذا یہ اردو ایڈیشن بارنچیم موسومہ خاندانی علاج پیبلک کے سامنے پیش ہے۔ خاندانی علاج۔ اردو داں طبقہ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ مجھ کو پیبلک کے بعد اصرار پر پانچویں دفعہ چھپوانا پڑا۔ باوجود اسکے کاغذ کی گرائی اور کمیابی اور طرح طرح کی دشواریوں کے چھپائی لکھائی اور کاغذ نہایت عمدہ، اور بیکہ جاذب نظر ہے۔ یہ کتاب نہایت جامع ہے اور اسکو کامیاب بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھایا نہیں رکھا گیا ہے۔ ایسی جامع اور مکمل کتاب زبان اردو میں آج تک شائع نہیں ہوئی اور قیمت صرف پندرہ روپیہ۔

قیمت میں معمولی سا اضافہ ہوا۔ یعنی فی جلد تین روپیہ کا۔

اس کتاب میں انسانی جسم کی ساخت و مصلحت ویرا و در انسانی جسم کے اعضاء کے افعال نہایت متشرح طریقہ پر بیان کئے گئے ہیں۔ سائنس دان جناب ڈاکٹر ہنی مین صاحب موجد ہو میو پیتی کی مختصر سوانح عمری اصول ہو میو پیتی، علم جراثیم

امراض، فاذہر، تریاق، ازہر، صحت قائم رکھنے کے لئے اصول غذا کا بیان، حادثات (مثلاً چوٹ لگنا، موج آنا، پانی میں ڈبونا وغیرہ) ادویات کے رشتہ وغیرہ۔ مفید اور ضروری مضامین علاوہ متشروح بیان امراض کے نہایت تشریح سے درج کئے گئے ہیں جو دلچسپ اور مفید ہیں۔
اب ہم اپنے ناظرین سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ علاج شروع کرنے سے پہلے مضامین کو بخوبی سمجھ لیں اور اس پر عبور حاصل کریں اُس کے بعد دوا دینا شروع کر دیں۔

(۱) ایک قطرہ دوا سے کیوں فائدہ ہوتا ہے ص ۱۱۲ ص ۱۱۵ اور کتاب کے آخر میں مقصد (الف) ملاحظہ ہو۔

(۲) امراض ماد اور مزمن۔ اور کتاب کے آخر میں مقصد (ب)

(۳) جراثیم۔ اور کتاب کے آخر میں مقصد (ج)

(۴) رشتہ ادویات

کتاب مجلد ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے اور کافد کی بے انتہا گرائی اور کسی حد تک نایابی کے قیمت صرف پندرہ روپیہ، محض رفاہ عام کے خیال سے رکھی گئی ہے تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔
ہم کو اُمید قوی ہے کہ یہ کتاب ملک میں مقبول عام ہو چکی ہے۔ اس کا ہر گھر میں ہونا بحد ضروری ہے۔

مہیش چندر بھٹا چاریہ اینڈ کو پرائیویٹ لمیٹڈ

اکانک فارمیسی

نمبر ۱۰۰ نیٹاجی بھاش روڈ۔ کلکتہ ۱

فہرست تصاویر

صفحہ	تصویر	صفحہ	تصویر
۴۲	۲۳۔ حجاب حاجز	۴	۱۔ ڈھانچہ
۴۳	۲۴۔ مشانہ کا کاٹنا حصہ	۷	۲۔ سر کی پٹیاں
۴۵	۲۵۔ مشانہ حالب	۱۰	۳۔ جوف پیڑ کی پٹیاں
۴۶	۲۶۔ مرد کے آکر تناسل کا سیدھا کاٹ	۱۱	۴۔ اطراف علیا کی پٹیاں
۴۸	۲۷۔ رجم اور یوقان	۱۶	۵۔ عروق شعریہ
۴۹	۲۸۔ فسیح	۱۶	۶۔ عروق جاذبہ اور عدد
۵۰	۲۹۔ فرج کا آدھا کاٹ	۱۷	۷۔ چلہ
۵۲	۳۰۔ آنکھ	۱۹	۸۔ دماغ
۵۵	۳۱۔ طبقہ غیبہ (امعاء بینائی)	۲۲	۹۔ دل کی باہری لکیریں
۵۷	۳۲۔ کان کا اندرونی حصہ	۲۵	۱۰۔ بطون
۷۲	۳۳۔ حمل کا نصف دائرہ	۲۷	۱۱۔ خاص شرایین اور وریدیں
۷۴	۳۴۔ چھ ہفتہ کا حمل	۲۷	۱۲۔ منہ کا اندرونی حصہ
۷۵	۳۵۔ مشیمہ	۲۸	۱۳۔ دانت
۷۶	۳۶۔ حاملہ کا رجم	۲۸	۱۴۔ دانت کا اندرونی حصہ
۷۸	۳۷۔ پورے دنوں کے جنین کی حالت	۳۹	۱۵۔ غذا کے کل راستے
۷۹	۳۸۔ جنین کی مختلف صورتیں	۳۰	۱۶۔ جوف باریطون
۸۲	۳۹۔ جنین میں ندران خون	۳۷	۱۷۔ آنت
۴۹۳	۴۰۔ آگ میں جلنا	۳۷	۱۸۔ منہ اور جوف بینی
	۴۱۔ پانی میں ڈوبنے یا مرنے کا	۳۸	۱۹۔ ناک کا سوراخ اور تالو
۸۹۴	۴۲۔ پچھانسی لگانے سے	۳۹	۲۰۔ مصلحہ اور آواز کا آلہ بینی نرغہ
	سانس بند	۴۰	۲۱۔ ہوا کی نالی
		۴۱	۲۲۔ خوشہ جوف پھیپھڑا

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰	پیل دماغ یا اوسط دماغ	۱	اعضاء انسانی (تشریح)
۲۰	حرام مغز	۲	انسانی جسم کی ساخت
۲۱	ریڑھ کا ستون اور اس کا گودہ	۳	ڈھانچہ کی ہڈیاں
۲۱	اعصاب الدماغ	۵	مہروں کا ستون
۲۲	اعصاب نخاع یا حرام مغز	۱۱	اطراف علیا
	کے اعصاب	۱۱	اطراف سفلی
۲۳	نظام دوران الدم	۱۳	عضلات
۲۳	دل	۱۴	عروق دمویہ
۲۴	اجوف فوقانی	۱۵	عروق شریہ
۲۴	اجوف تحتانی	۱۵	عروق رطوبتی
۲۵	غلاف القلب	۱۶	عروق جاذبہ
۲۵	غشاء بطن	۱۶	جلد
۲۶	کوارٹر	۱۷	مسام جلد
۲۶	نظام ہضمی	۱۷	خند و دریا گلیاں
۲۷	مغصہ	۱۸	چربی
۲۷	تربان	۱۸	تشخی
۲۷	لوزتان	۱۸	بال
۲۷	تالو	۱۸	ناخن
۲۷	دانت	۱۸	نظام عصبی یا اعضاء نفسانیہ
۲۹	غذا کی نالی یا مری	۱۹	نظام شریکی
۳۱	معدہ	۱۹	نظام دماغی یا حرام مغز
۳۳	آنت	۱۹	مقدم دماغ یا برا دماغ
۳۵	جگر	۲۰	مؤخر دماغ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷	فوطہ	۳۵	ورید البساب
۴۷	خصیہ	۳۶	صفرا کی تھیلی یا پتہ
۴۷	غده ندی	۳۶	صفرا کی نالی
۴۷	خصیہ قوتانی	۳۶	بیلہ
۴۷	دعا رناقل	۳۶	نظام تنفسی
۴۸	کیستہ المنی	۳۶	ناک
۴۸	اناث	۳۷	حشوت
۴۹	رکب	۳۸	زرخرہ - حنجرہ
۴۹	شفراں کبیر	۳۹	قبضہ الریا - هوا کی نالی
۴۹	مقدم بطن	۴۰	شبتین
۵۰	مؤخر بطن	۴۱	پھیپھڑا
۵۰	قید فرجی	۴۲	جوف سینہ
۵۱	شفراں صغیران	۴۲	حجاب حاجز
۵۱	بطارہ	۴۳	نظام بول
۵۱	مجری بول اناث	۴۳	گردہ
۵۱	دیانہ فرج	۴۴	حالب
۵۲	رحم	۴۵	مشانہ
۵۲	یوستان	۴۵	نظام آلات تناسل
۵۳	پستان	۴۵	ذکورہ
۵۴	آنکھ	۴۵	قضب یا بخ قضب
۵۶	کان	۴۵	حشفہ
۵۷	انسانی جسم کے اعضاء کے افعال	۴۵	گردن قضب
۵۸	کیسیا سیلون	۴۶	دھڑ قضب
۵۹	نظام عصبی کے افعال		کلفہ (گھونٹ)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۴	نال کا ٹٹنا	۶۰	جگر کا فعل
۷۵	مشیمہ	۶۱	صفر کی تقییلی کا فعل
۸۱	جین میں دوران خون	۶۱	مجرى لبالبہ کا فعل
۸۴	موت	۶۱	طحال کا فعل
۸۵	علاج بالمشل	۶۱	چھوٹی آنت کا فعل
۸۶	ہنی میں کون تھے؟	۶۲	بڑی آنت کا فعل
۹۵	دوا سازی	۶۲	ہاضمہ کا فعل
۹۵	دوا کا استعمال	۶۴	نظام تنفسی کے افعال
۱۰۰	مددگار علاج	۶۵	پھیپھڑے میں خون کی صفائی
۱۰۲	علامات امراض	۶۵	نظام دوران الدم کا فعل
۱۰۴	علامات معلوم کرنا	۶۶	دانہ ہائے خون
۱۱۰	صحت قائم کرنے کا اصول	۶۶	دانہ ہائے خون سفید
۱۱۳	چلنے کے نقصان	۶۶	سوزش
۱۱۴	گافی کے نقصان	۶۷	نظام مجری بول
۱۱۵	لباس	۶۸	جلد
۱۱۵	ہوا	۶۸	نظام اعصاب
۱۱۵	سورج کی روشنی	۷۰	ریڑھ کا ستون
۱۱۵	وزرش	۷۰	اعضاء الحسن
۱۱۵	غسل	۷۱	اعضاء تناسل
۱۱۶	ہنی میں کے بتائے ہوئے زہر	۷۱	حمل کا بیان
۱۱۷	مرض	۷۳	حمل کے اعضاء کی ساخت
۱۱۸	امراض حاد	۷۶	رحم میں جین کی پردہ کشی
۱۱۹	ادویات پیدا شدہ امراض	۷۶	حمل کا بڑھنا
۱۲۰	امراض مزمن کا علاج	۷۴	ولادت کا فعل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۱	ہیضہ کے ۵ درجے	۱۲۰	علامات تکھے کا طریقہ
۱۲۲	ہیضہ کا معمولی علاج	۱۲۲	درد
۱۲۳	بچوں کا ہیضہ	۱۲۴	اخراج
۱۲۴	ہیضہ کے نیک و بد علامات	۱۲۴	اسباب مرض
۱۲۵	غذا اور پرہیز	۱۲۴	مرض میں کمی و زیادتی
۱۲۶	ہیضہ میں تیمارداری	۱۲۴	مرض کی خاص علامات
۱۲۷	ہیضہ کی دوا	۱۲۵	ذاتی استعداد
۱۲۸	تھ	۱۲۵	امراض مرض کی خرابی
۱۲۸	معدی ہیضہ	۱۲۵	دماغی اور جسمانی علامات
۱۲۸	تھ و دست کے ساتھ خون	۱۲۵	مختلف اعضاء کی حالت
۱۲۸	ہیضہ میں بخار	۱۲۷	علم الجراثیم
۱۲۸	تشنجی ہیضہ	۱۲۸	حفظ مآل قدم
۱۲۸	گم ہیضہ	۱۲۹	جراثیم امراض
۱۲۹	ہیضہ کی علامات و علاج	۱۳۲	علاج آب خون
۱۵۳	ابتدائی ہیضہ کا علاج	۱۳۳	جراثیم جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں
۱۵۷	درجہ استعداد		
۱۶۲	درجہ انتہائی مرض کا علاج	۱۳۵	آئی ٹاکسن سیرم
۱۶۶	درجہ انحطاط کا علاج	۱۳۵	الیو پیتھی
۱۶۷	ہیضہ کے عوارض	۱۳۷	امراض عام
۱۶۳	امراض خون	۱۳۷	امراض خون
۱۶۶	اقسام پلگ	۱۳۸	ہیضہ
۱۷۷	پلگ کا علاج	۱۳۹	معمولی اور مہلک ہیضہ کا فرق
۱۸۰	سیادہ بخار - -	۱۴۰	ہیضہ کا سبب
۱۸۰	زکامی بخار	۱۴۰	حفظ مآل قدم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۷	سرخ بخار	۱۸۲	دائمی بخار
۲۴۹	سرخسارہ	۱۸۴	مالٹا بخار
۲۵۲	دقتتھیر یا	۱۸۵	ملیر بخار
۲۵۷	انفندہ تھیرا	۲۰۳	نوبتی بخار
۲۶۳	سکرم	۲۰۴	ملیر کے بعد کی تکالیف
۲۶۴	خون زہر یا بخار	۲۰۷	لازمی بخار
۲۶۷	امراض سور الزاجی	۲۰۸	پوشیدہ بخار
۲۶۷	وجع مفاصل	۲۰۸	طیر یا کی سور الزاجی
۲۶۸	حاد	۲۰۹	مہلک ملیر یا
۲۷۶	عضلاتی وجع مفاصل	۲۰۹	سکامی بخار
۲۷۸	درد عضلاتی گردن	۲۰۹	اسہالی بخار
۲۷۸	درد عضلاتی کندھا	۲۱۰	نجیست بخار
۲۷۹	کاذب ذات الجنب	۲۱۰	پسینہ کا بخار
۲۷۹	عضلاتی کمر درد	۲۱۰	قلبت خونی بخار
۲۸۱	لنگری کا درد	۲۱۰	خونی بخار
۲۸۲	مرض وجع مفاصل	۲۱۱	کالا زار
۲۸۴	گٹھیا	۲۱۲	ٹائیفائیڈ
۲۸۶	جڑوں کا پتھہر انا	۲۱۹	ٹائیفیس
۲۸۷	گٹھیا کی مختلف علامتیں	۲۳۰	تھط کا بخار
	اور علاج	۲۳۰	طبری طور بخار
۲۹۱	کنٹھ مالا	۲۳۳	زرد بخار
۲۹۳	تپ رق	۲۳۷	گٹھیاں کا بخار
۳۰۱	آنتوں کی سل	۲۳۷	حصہ
۳۰۳	ذیابیطس	۲۴۱	سقیلا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۲	دماغ میں خون کی زیادتی	۳۰۷	ورم گردہ
۳۴۲	علاج اجتماع الدم	۳۰۹	ورم گردہ مزمن
۳۴۴	اجتماع الدم دریدی {	۳۱۰	مزمن ورم گردہ کی لاغری
۳۴۴	صافیت	۳۱۲	جلت دھر
۳۴۵	دماغی تشکاوٹ	۳۱۶	استسقاء
۳۴۵	درد دھر	۳۱۶	بند
۳۴۶	خاص علامات	۳۱۶	دماغ
۳۵۰	آدھے سر کا درد	۳۱۶	استسقاء الصدر
۳۵۲	سر چکرانا	۳۱۶	حجاب قلب
۳۵۲	تشیخ - حلقوم	۳۱۶	زقی
۳۵۵	پے خوابی -	۳۱۶	خصیہ
۳۵۶	نیت کی بیماری	۳۱۶	انستری کی سوجن
۳۵۸	خواب میں ڈرنا	۳۱۶	آب خون نکلتا
۳۵۸	ہسٹیریا	۳۲۰	بیری بیری
۳۶۰	سکتہ	۳۲۱	پیرا پلے کچک - بیری بیری
۳۶۳	مرگی - صرع	۳۲۲	کارڈی - بیری بیری
۳۶۷	کمزاز	۳۲۲	کمی خون
۳۶۹	کتے کا پاگل پن	۳۲۵	استدالی کمی خون
۳۷۱	لقوہ - فالج اذہنگ	۳۲۷	ثانوی کمی خون
۳۷۲	بر لگت	۳۳۴	امراض نظام اعصابی
۳۷۶	تشیخ - انیمیشن	۳۳۴	دماغ اور حرام مغز کی سوزش
۳۷۷	مطلق - تشیخ	۳۳۶	ورم غشاء دماغ - دماغی آ
۳۷۸	سوزش عصب	۳۳۶	پر دوں کا ورم
۳۷۹	عصبی کمزوری	۳۴۱	دماغ میں یانی جمع ہونا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۹	خیالات چشم	۳۸۱	عصبی درد
۳۹۹	دور کی چیزیں دکھائی نہ دینا	۳۸۲	مالینولیا
۴۰۰	آنکھ کے انگوڑی پردے کا آنا	۳۸۲	رعشہ
۴۰۱	انجن باری	۳۸۵	ارتعاش
۴۰۲	آنکھ کی پلک پھڑکنے	۳۸۶	جمود
۴۰۲	پلک لٹکنا	۳۸۶	عضلہ کا ڈبلا پن
۴۰۲	پلکوں کا سکڑنا	۳۸۷	امراض ریڑھ
۴۰۲	موتیا بند	۳۸۷	درم حرام مغز
۴۰۳	آنکھ میں پٹا پڑنا	۳۸۸	درم مغز میں خون کا کمی
۴۰۳	امراض چشم کی علامت	۳۸۸	حرام مغز میں خون کا زیادتی
۴۰۴	امراض گوش	۳۸۸	"جریان خون"
۴۰۷	کان کا درم	۳۸۸	آبہ
۴۰۸	کان کا درد	۳۸۹	حرام پردہ ہائے نساء
۴۰۹	کان میں پھوٹا	۳۸۹	درم حرام مغز
۴۱۰	کان کی بوا سیر	۳۹۱	حرام مغز کا زوال
۴۱۰	کان بجینا	۳۹۱	امراض چشم
۴۱۱	کرن مول	۳۹۲	آنکھ آنا
۴۱۳	کان بہنا	۳۹۶	آنکھ میں کالا داغ
۴۱۵	کان کے سوراخ میں پھوٹا	۳۹۷	کم دکھائی دینا
۴۱۵	بہہ سہا پن	۳۹۷	رتو ندھی
۴۱۸	اوجھا ستائی دینا	۳۹۸	دنو ندھی
۴۱۸	کان میں میل	۳۹۸	جزوی اندھا پن
۴۱۹	کان کی چھاجن	۳۹۸	آدھی نظر
۴۲۱	امراض ناک	۳۹۹	بھینکنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳۸	نبض صلب	۴۲۱	زکام
۴۳۸	” ضعیف سریع	۴۲۱	ناک کی سوچن
۴۳۸	نبض ہتھوڑی سریع	۴۲۲	لال ناک
۴۳۸	” لرزتی	۴۲۲	ناک پھنسیاں
۴۳۹	تغیر الوزن	۴۲۲	ناک کی جڑ کی بیماریاں
۴۴۰	ورم غلات دل	۴۲۳	ناک کا زخم
۴۴۱	دل میں خون کی کمی	۴۲۳	ناک میں کیسٹرا
۴۴۲	مزمن ورم غلاف دل	۴۲۳	” ” پیپا
۴۴۳	غلات دل میں	۴۲۴	نکسیر
۴۴۳	اجتماع خون	۴۲۶	تپ سوزش بینی
۴۴۴	انیڈروکارڈائیٹس حاد	۴۲۷	قوت شامہ کا زوال
۴۴۶	” ” ” مزمن	۴۲۷	ناک کی بواسیر
۴۴۷	دندانہ کوآرڈ سے	۴۲۸	ناک کے نیچ کا بڑھنا
۴۴۷	خون واپس ہونا	۴۳۱	احراض نظام دوران الدم
۴۴۸	دو دندانہ کوآرڈ کی تنگی	۴۳۱	نبض
۴۴۹	شہہ رگ کے کوآرڈ کی تنگی	۴۳۵	نبض کے علامات
۴۵۰	شہہ دندانہ کوآرڈ سے	۴۳۶	نبض کی حالت سے معلوم
۴۵۰	خون کی واپسی	۴۳۶	ہو نیوالے امراض
۴۵۱	سہ دندانہ کوآرڈ کی تنگی	۴۳۷	بیمار نبض
۴۵۱	شریان الریہ سے خون کا دباؤ	۴۳۷	خراب نبض
۴۵۲	تنگی پھیپھا	۴۳۷	غیر شعوری نبض
۴۵۳	ورم عضلہ قلب	۴۳۸	نبض سریع
۴۵۴	دل کا پھیل جانا	۴۳۸	نبض بطی
۴۵۵	ہول دل	۴۳۸	نبض لین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸۱	نرخرے کا علاج	۴۵۷	عصبی ہول دل
۴۸۱	برانکائی ٹس	۴۵۸	آہستہ تپاک قلب
۴۸۲	” ” کی علامت	۴۵۹	وجع مفاصل قلب
۴۸۵	پلیوریسی	۴۵۹	سٹر وکر آرمسٹریسٹر
۴۸۶	دمہ	۴۶۰	بارٹ بلاک
۴۸۷	دمہ کا علاج	۴۶۱	دل کے چند دیگر علامات
۴۹۰	نمونیا	۴۶۲	غشی
۴۹۱	” ابتدائی مرحلہ	۴۶۲	خون کا دباؤ بڑھنا
۴۹۱	” اسباب	۴۶۷	درد دل
۴۹۲	” علاج	۴۶۸	امراض شریان
۴۹۲	درم بھٹڑے میں {	۴۶۹	” علاج
۴۹۲	سرسامی حالت }	۴۶۹	شریان کا ابھار
۴۹۵	کھانسی	۴۷۰	شریان کی سختی
۴۹۵	” کا علاج	۴۷۱	” ” ” کا علاج
۵۰۰	آواز بیٹھ جانا	۴۷۱	امراض آوردہ
۵۰۲	زوال قوت گویائی	۴۷۱	سوزشیں درید
۵۰۲	امراض آلات ہضم	۴۷۲	پنڈلیوں کی رگوں کا پھولنا
۵۰۲	سانس کی بدبو	۴۷۳	خون کا حقو کہ
۵۰۲	منہ کا زخم	۴۷۴	امراض نظام تنفسی
۵۰۵	پیرائے دست	۴۷۴	حساد نزلہ
۵۰۵	” ” ” کا علاج	۴۷۵	” ” کا علاج
۵۰۶	گوشت خورہ	۴۷۷	مزمن نزلہ
۵۰۶	دانت کا درد	۴۷۹	نرخرے کی شدید سوزن
۵۰۹	امراض زبان	۴۷۹	” ” ” پیرائی سوزن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۳	مزمن تیزابیت	۵۱۰	سوزش زبان
۵۲۲	بھپکی	۵۱۰	سوزش زبان کا علاج
۵۲۲	سینہ دباے جانے کا خواب	۵۱۰	زخم زبان
۵۲۲	کھانے پینے کی خرابی سے بد ہضمی	۵۱۰	" " کا علاج
۵۲۶	ضعف معدہ سے سرچکراتا	۵۱۰	زبان کی اور بیماریاں
۵۲۶	مٹھ میں پانی بھر آنا	۵۱۱	ورم حلق
۵۲۶	بھوک نہ لگنا	۵۱۱	" " کا علاج
۵۲۷	معدہ کا پھیلنا	۵۱۳	ورم لوزتین
۵۲۷	" " " کا علاج	۵۱۳	" " " کا علاج
۵۲۸	معدے کا ڈبلاؤ	۵۱۴	ورم معدہ
۵۲۹	زخم معدہ	۵۱۴	ورم معدہ مزمن
۵۲۹	معدہ کا سرطان	۵۱۵	" " " " کا علاج
۵۲۹	تیزابیت	۵۱۶	معدہ کا مزمن زخم
۵۳۰	" " " کا علاج	۵۱۶	" " " " کا علاج
۵۳۳	سمندری بیماری	۵۱۶	خون کٹے
۵۳۴	درد معدہ	۵۱۸	بد ہضمی
۵۳۴	" " " " کا علاج	۵۱۹	شکریہ ضعف معدہ
۵۳۵	صفراوی سردرد	۵۱۹	مزمن ضعف معدہ
۵۳۵	غذا کا زہر	۵۱۹	سرفہارے باعث بد ہضمی
۵۳۷	ورم آنت	۵۲۰	بد ہضمی کا علاج
۵۳۷	چھوٹی آنت کا ورم	۵۲۳	مٹھ سے پانی نکلتا
۵۳۸	" " " " کا علاج	۵۲۳	نفخ شکم
۵۳۹	بڑی آنت کا ورم	۵۲۳	بھوک زائل ہونے پر
۵۳۹	" " " " کا علاج	۵۲۳	سینہ میں جلن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶۰	جل کے دوران اسپہاں	۵۳۹	ورم بارطون
۵۶۱	ترش چیزیا کھانے سے	۵۴۰	درد قوئخ
۵۶۱	ہوا بدلنے سے اسپہاں	۵۴۱	” ” ” ” کا علاج
۵۶۱	موسم گرما کا اسپہاں میں	۵۴۲	قوئخ سیسہ
۵۶۱	بورھوں کا اسپہاں	۵۴۳	یت پتھری
۵۶۱	مزمن اسپہاں	۵۴۵	” ” ” ” کا علاج
۵۶۲	پیش	۵۴۶	” ” ” ” کا معاون علاج
۵۶۳	جراثیم سے پیدا ہوئی پیش	۵۴۷	قبض
۵۶۳	” ” ” ” کا علاج	۵۴۸	” ” ” ” کا علاج
۵۶۳	بے میس پیش	۵۵۰	انڈے سائیٹس
۵۶۴	” ” ” ” کا علاج	۵۵۳	پیٹھ پھوٹنا
۵۶۵	طیریا کے ساتھ پیش	۵۵۳	” ” ” ” کا علاج
۵۶۵	مزمن پیش	۵۵۳	بار شکم
۵۶۵	” ” ” ” کا علاج	۵۵۴	اسپہاں
۵۷۰	زخم معده	۵۵۴	موسم گرما کا اسپہاں
۵۷۱	بھپکی	۵۵۵	” ” ” ” کا علاج
۵۷۱	” ” ” ” کا علاج	۵۵۵	خون کی دست
۵۷۳	بواسیر	۵۶۰	دیرمضم چیزوں سے آیا اسپہاں
۵۷۳	” ” ” ” کا علاج	۵۶۰	خراب پانی سے آیا اسپہاں
۵۷۵	بواسیر کا درد	۵۶۰	سردی کا اسپہاں
۵۷۵	بادی بواسیر	۵۶۰	دودھ سے آیا اسپہاں
۵۷۵	بواسیر میں آنوں	۵۶۰	مزمن چیزوں سے اسپہاں
۵۷۶	بواسیر میں غذا	۵۶۰	خوت یا خوشی سے اسپہاں
۵۷۷	کلخ نکلتا	۵۶۰	رنج ” ” ” ” ” ”

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۸۹	چٹے کرم کا علاج	۵۷۷	کایخ کا علاج
۵۸۹	مکھی کاٹنے کا مرض	۵۷۸	ہواسیر کا معاون علاج
۵۹۰	" " " علاج	۵۷۸	ہرنیا
۵۹۰	ہوائی کرم	۵۷۸	" " " کا علاج
۵۹۰	" " " کا علاج	۵۷۹	نواسیر
۵۹۰	ورم جگر	۵۷۹	" " " کا علاج
۵۹۱	جگر کا بڑھنا	۵۸۰	بھگندہ
۵۹۱	درد جگر	۵۸۰	" " " کا علاج
۵۹۱	صفرا کی زیادتی	۵۸۱	خارش متعد
۵۹۲	" " " کا علاج	۵۸۱	" " " کا علاج
۵۹۵	یرقان	۵۸۱	پیٹ کے کپڑے
۵۹۵	حاد یرقان	۵۸۲	جنون
۵۹۶	" " " کا علاج	۵۸۲	کدو دانے
۵۹۷	تلی کا بڑھنا	۵۸۳	" " " کا علاج
۵۹۷	" " " کا علاج	۵۸۳	کچھوے
۵۹۸	تلی اور جگر کا بڑھنا	۵۸۴	" " " کا علاج
۵۹۹	امراض گرمہ	۵۸۵	دیگر امراض کرم
۵۹۹	بول زلالی	۵۸۵	" " " کا علاج
۵۹۹	" " " کا علاج	۵۸۶	فیل پا
۶۰۰	ورم نائیزہ	۵۸۶	نیج کا غارت کن کرم کا مرض
۶۰۰	" " " کا علاج	۵۸۷	" " " " " کا علاج
۶۰۰	درد گرمہ	۵۸۷	طیرے کرم کا مرض
۶۰۱	پیشاب کی نالی کا مسکڑنا	۵۸۸	" " " کا علاج
۶۰۱	" " " کا علاج	۵۸۹	چٹے کرم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۱۴	احتلام	۶۰۱	عضوی سکڑن
۶۱۴	جریان منی	۶۰۲	خونی پیشاب
۶۱۵	" " " کا علاج	۶۰۲	" " " کا علاج
۶۱۶	استسقاء فوطہ استسقاء فوطہ کا علاج	۶۰۳	پیشاب کا رگ جانا
۶۱۶	پروسیٹ کا بڑھنا	۶۰۳	" " " کا علاج
۶۱۷	" " " کی سوزش	۶۰۳	زہر پیشاب چرھنا
۶۱۷	" " " کا علاج	۶۰۴	" " " کا علاج
۶۱۷	ورم فوطہ	۶۰۵	ورم مشانہ
۶۱۸	" " " کا علاج	۶۰۵	" " " کا علاج
۶۱۸	ورم انٹین حادہ	۶۰۶	کثرت بول
۶۱۸	" " " مزمن	۶۰۶	" " " کا علاج
۶۱۸	" " " کا علاج	۶۰۷	پیشاب کے اختیاری نکل جانا
۶۱۹	نامری	۶۰۷	" " " کا علاج
۶۱۹	" " " کا علاج	۶۰۸	پیشاب کا قطرہ قطرہ ۲۵ نا
۶۲۰	آلات تناسل کے دوسرے مرض	۶۰۸	" " " کا علاج
۶۲۰	ورم جشفہ	۶۰۹	پتھری
۶۲۰	جلق	۶۰۹	سنگ ریزہ پیشاب
۶۲۰	جلق جماع	۶۱۰	سنگ مشانہ
۶۲۱	زیادہ خواہش جماع	۶۱۱	" " " کا علاج
۶۲۱	امراض خبیثہ	۶۱۲	سنگ گردہ
۶۲۲	آتشک	۶۱۳	" " " کا علاج
۶۲۲	" " " حقیقی	۶۱۳	ریگ پیشاب
۶۲۳	آتشک کا ابتدائی درجہ	۶۱۳	" " " کا علاج
۶۲۳	" " " دوسرا درجہ	۶۱۴	امراض آلات تناسل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۵	گھینگا	۶۲۴	آتشک کا تیسرا درجہ
۶۲۶	" " کا علاج	۶۲۵	آتشک کا علاج
۶۲۶	گھینگے کے ساتھ آنکھ کے {	۶۲۶	آتشک سوروشی
۶۲۶	ٹھیلے کا باہر نکل آنا {	۶۲۷	" مجبازی
۶۲۷	" " " کا علاج	۶۲۷	" کا علاج
۶۲۷	جنون	۶۲۷	سوزاک
۶۲۷	غده ترسیہ	۶۲۸	سوزاک عام
۶۲۷	" " " کے ساتھ دیوانگی	۶۲۸	" " " کا علاج
۶۲۸	بلغمی استسقاء	۶۲۹	عورتوں کا سوزاک
۶۲۸	" " " کا علاج	۶۳۰	ورم حشفہ
۶۲۹	پہرہ، ماتھ، پیروں کے {	۶۳۰	فیضی الغلفہ
۶۲۹	نسیج کا غیر طبعی طریقہ {	۶۳۱	اختناق الغلفہ
۶۲۹	سے بڑھنا	۶۳۱	ورم قوطہ کا علاج
۶۳۹	" " " کا علاج	۶۳۱	وجع المقاصل
۶۳۹	ابتدائی تلی کا بڑھنا	۶۳۱	مہجری البول کے سکڑنے میں
۶۴۰	" " " کا علاج	۶۳۱	" " " " کا علاج
۶۴۰	مرض ایڈیشن	۶۳۱	سوزاک عام کا زہر
۶۴۰	امراض غده یتوسہ	۶۳۲	مقاصی سوزاک کا زہر
۶۴۱	" علاج	۶۳۲	" " " " کا علاج
۶۴۱	دوتوں شاخوں کا تشیع	۶۳۳	بدماہی
۶۴۲	" " " " کا علاج	۶۴۲	غده ندی کا بڑھنا
۶۴۲	امراض جلدیہ	۶۴۲	سوزاک کما عت وجع نفاک
۶۴۳	" " " کا	۶۴۳	نیتدہ آنا
۶۴۳	مخصوص علاج	۶۴۵	تغیر نالی کے گلی کے امراض

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵۲	کھال اُدھر جانے کا علاج	۶۴۴	بھوڑا
۶۵۴	پتی	۶۴۴	کا علاج
۶۵۴	پتی کا علاج	۶۴۴	چند ادویات کے مخصوص علامات
۶۵۵	خارش	۶۴۵	ڈنیل
۶۵۶	سفید دانہ	۶۴۵	کا علاج
۶۵۶	کھجلی	۶۴۶	زخم
۶۵۶	کا علاج	۶۴۶	کا علاج
۶۵۶	چمڑا	۶۴۷	ناسور
۶۵۸	اگزیریا	۶۴۸	کا علاج
۶۵۸	کا علاج	۶۴۸	پھتیاں
۶۵۹	کینسر	۶۴۹	کا علاج
۶۶۱	کا علاج	۶۴۹	د پھتیاں
۶۶۲	تالو کا کینسر	۶۴۹	کا علاج
۶۶۲	رجم کی گردن کا کینسر	۶۴۹	سکھرش
۶۶۲	کون " " "	۶۵۰	پٹھے کی گٹھی
۶۶۲	پستان کا کینسر	۶۵۰	زہر ملا زخم
۶۶۲	ناک کا کینسر	۶۵۰	کا علاج
۶۶۲	سینہ " "	۶۵۱	مہاسہ
۶۶۲	سر کی بھوسی	۶۵۱	کا علاج
۶۶۲	کا علاج	۶۵۱	کارنیکل
۶۶۲	ناخن کی جڑ کی سوزش	۶۵۲	کا علاج
۶۶۲	کا علاج	۶۵۲	جلد کی سُرخی
۶۶۲	کورٹھ	۶۵۳	جلد کی سُرخی کا علاج
۶۶۲	کورٹھ کا علاج	۶۵۳	کھال اُدھر جانا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۸۳	حساد جنون سرسامی	۶۶۶	چمبل
۶۸۳	مزمن " "	۶۶۶	نیل پا
۶۸۵	مذہبی " "	۶۶۶	رُوسی
۶۸۶	مالخولیا	۶۶۶	اٹن
۶۸۶	حاد مالخولیا	۶۶۶	سوزش رحم
۶۸۶	مزمن	۶۶۹	جسم کا پھٹنا
۶۸۶	بدحواسی	۶۶۹	موخچھوں کی داد
۶۸۷	مالخولیا کے فتور	۶۶۹	مستہ
۶۸۹	توہمات باطلہ	۶۶۹	چھلکا اُترنا
۶۹۰	مشت زنی سے	۶۶۹	بدگوشت
۶۹۰	پیدا شدہ احمق بن	۶۶۹	مسالہ
۶۹۰	بڑھاپے کا مالخولیا	۶۶۹	پیر کی انگلی میں گھسٹ
۶۹۰	عقونجی	۶۷۰	عضو جلد یہ کے علامت
۶۹۰	شالوی	۶۷۲	امراض ناخونی
۶۹۰	" " کا علاج	۶۷۲	ورم کیسہ ناخن
۶۹۱	مجنونوں کا فالج	۶۷۲	ناخن کا گوشت میں گرنا
۶۹۲	" " " " کا علاج	۶۷۲	زیادہ موٹاپا
۶۹۳	وہم مراقی	۶۷۲	" " " " کا علاج
۶۹۴	" " " " کا علاج	۶۷۲	بڑھاپا
۶۹۶	نشرہ کا جنون	۶۷۷	بڑھاپے کا معاون علاج
۶۹۷	" " " " کا علاج	۶۷۸	آخری رقت
۶۹۸	چند دماغی علامات	۶۷۹	امراض دماغی
۷۰۲	امراض ادویات	۶۸۰	جنون
۷۰۲	یارسہ	۶۸۲	دھشت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۲۵	حیض کے علامات	۷۰۴	کونین
۷۳۰	سفید پانی آنا	۷۰۵	سنگھیا
۷۳۵	حیض کی موقوفی	۷۰۶	اقیمون
۷۳۸	رحم کی بیماریاں	۷۰۶	کوکین
۷۳۸	درد رحم	۷۰۷	شراب
۷۳۹	باؤ گولہ	۷۰۷	شہد
۷۳۹	درد رحم	۷۰۷	تمباکو
۷۳۹	حاد و مزمن درد رحم	۷۰۷	کافی
۷۴۰	رحم کا اخراج خون	۷۰۷	چائے
۷۴۱	اجتماع خون	۷۰۸	برف
۷۴۲	رحم کی رسولی	۷۰۸	دیگر ادویات
۷۴۲	سرطان رحم	۷۱۰	امراض زناد
۷۴۲	سیلان رحم	۷۱۱	حیض
۷۴۳	رحم کے دوسرے علامات	۷۱۱	استقرار حمل
۷۴۴	امراض خصیتہ الزم	۷۱۳	حیض کی بہت اعلیٰ
۷۴۴	سوزش	۷۱۳	شروع حیض میں دیری
۷۴۴	" " " " مزمن	۷۱۴	" " " " علاج
۷۴۵	سوزش حاد	۷۱۵	بندش حیض
۷۴۵	" " " " مزمن	۷۱۵	" " " " کا علاج
۷۴۵	استسقا خصیتہ الرحم	۷۱۶	بے ترتیب حیض
۷۴۶	درد عصبی خصیتہ الرحم	۷۱۷	عوض حیض
۷۴۷	خصیتہ الرحم کی رسولی	۷۱۷	قلیت حیض
۷۴۸	دوسرے علامات	۷۲۱	دشواری حیض
۷۴۸	فرج کی بیماریاں	۷۲۲	مختلف علامات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۹۱	پیٹ بڑا ہونا	۷۸۷	مرگی
۷۹۱	بچے کی حرکت	۷۸۷	سکتہ
۷۹۲	سیلان الرحم	۷۸۷	دماغی حالت کی خرابی
۷۹۲	درد پستان	۷۸۷	قے و متلی
۷۹۲	پستان کی گھنٹی	۷۸۸	منہ سے پانی گرنا
۷۹۲	سورس	۷۸۸	وریدوں کا پھولنا
۷۹۲	حالت حمل میں اخراج خون	۷۸۹	انٹھن
۷۹۳	کمی خون	۷۸۹	مرفان کا نور
۷۹۳	استقاط حمل	۷۸۹	خود بخود پیشاب کا نکل جانا
۷۹۴	کا علاج	۷۸۹	پیشاب گرک جانا
۷۹۵	ولادت کے وقت کی علامات	۷۸۹	قبض
۷۹۶	زچہ خانہ	۷۸۹	اسہال
۷۹۷	درد زہ	۷۹۰	کلیجے میں جلن
۷۹۷	ولادت کے بعد درجے	۷۹۰	بے خوابی
۷۹۸	طبعی ولادت کے لئے ہدایات	۷۹۰	برسی اشبار کی رغبت
۸۰۲	زچہ کی خدمت	۷۹۰	سانس کی تکلیف
۸۰۵	پھول نہ گرنا	۷۹۰	دل دھڑکتا
۸۰۵	رہانہ فرج کا پھٹ جانا	۷۹۰	بوا سیر
۸۰۶	ولادت کے بعد درد	۷۹۰	کھانسی
۸۰۶	نفاس	۷۹۰	پیشاب
۸۰۶	اخراج خون	۷۹۱	مجرى بول کا تشنج
۸۰۷	ولادت کے پہلے یا بعد ہی	۷۹۱	پیٹ میں انٹھن
۸۰۷	انٹھن	۷۹۱	فرج کے باہر کھجلی
۸۰۷	پسینہ بند	۷۹۱	پیٹ لٹک جانا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲۶	کان پکنا	۸۲۵	سوزاک یا آژنڈا کے دانت
۸۳۶	تشخ	۸۲۵	" " " " " "
۸۳۷	بچے کی سردی و گرمی	۸۲۶	" " " " " "
۸۳۷	دماغی جھٹکی کا ورم	۸۳۶	زخم
۸۳۷	دماغ میں اجتماع آب	۸۲۶	سٹراؤ
۸۳۸	" " " خون	۸۲۷	اندھوری
۸۳۹	بچے کے دماغ میں خون کی کمی	۸۲۷	کھجلی
۸۴۰	فالج	۸۲۷	آبلہ
۸۴۰	ریشہ کا فالج	۸۲۷	سرخبادہ
۸۴۱	مرگی	۸۲۷	خسرہ
۸۴۱	حمی لازمی	۸۲۸	جلد کا سرگٹ لگنا
۸۴۱	تلی	۸۲۸	بچے کے سٹھ کے زخم
۸۴۲	بچے کی بے خوابی	۸۲۹	بھوڑا
۸۴۲	سرگرم	۸۳۰	سرطان
۸۴۲	دودھ کی قے	۸۳۰	جسم کھٹنا
۸۴۳	قے یا متلی	۸۳۱	سر میں روسی
۸۴۳	خون کی قے	۸۳۲	بال گرنا
۸۴۳	سواری میں کھوٹنے سے قے	۸۳۲	سر میں جوئیں
۸۴۳	بھپکی -	۸۳۳	بھوت لگنا
۸۴۳	دانت نکلتا -	۸۳۳	آنکھ
۸۴۴	کرم دندان	۸۳۴	بشی
۸۴۴	دانت بیٹھنا	۸۳۵	ورم کرنول
۸۴۵	نالہ سرخ	۸۳۵	بہرہ پن
۸۴۵	کان کا زخم	۸۳۵	درد کان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۵۵	ورم الاموار	۸۴۵	ناک میں پھنسی
۸۵۶	بچے کا ہیضہ	۸۴۵	ناک کی سوچیں
۸۵۶	کرم کی خرابی	۸۴۶	ناک سے خون گرنا
۸۵۷	پیشاب کی بیماری	۸۴۶	ناک بند ہونا
۸۵۷	نیند میں پیشاب	۸۴۷	سردی - کھانسی
۸۵۷	پیشاب بند	۸۴۷	بچے کا دمہ
۸۵۷	خون کا پیشاب	۸۴۷	سانس میں تکلیف
۸۵۸	خراب پیشاب	۸۴۸	کالی کھانسی
۸۵۸	پیشاب میں بدبو	۸۴۸	بچے کا برا نکالیٹس
۸۵۸	سرخ گاد	۸۴۸	کروپ
۸۵۹	سفید گاد	۸۴۸	پلیوریسی
۸۶۰	بچے کا رونا	۸۴۹	نفلی کروپ
۸۶۰	بچے کا سیلان الرحم	۸۵۰	بچے کا سہل
۸۶۱	بے فتعدہ نشوونما	۸۵۰	بچے کی کالی کھانسی -
۸۶۱	دبلا پن	۸۵۱	ڈنٹھیریا -
۸۶۱	سوکھا	۸۵۱	بھوک نہ لگنا
۸۶۱	برص	۸۵۱	بھوک کا ہو کا
۸۶۳	لکنت	۸۵۱	قبض
۸۶۳	لنگ کرنا	۸۵۲	ہیٹ درد
۸۶۳	ٹہری کا طیرھا ہونا	۸۵۳	قوتیج
۸۶۳	حساندانی خرابی	۸۵۳	اسہال
۸۶۶	بچے کا آتشک	۸۵۴	گرمی کا اسہال
۸۶۶	بچے کا مزاج	۸۵۵	سورمضی
۸۸۱	حادثات	۸۵۵	منہ میں پانی بھر آنا -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۹۸	مچھلی کا کانٹا اٹکنا	۸۸۲	ورید یا شریانیں سے
۸۹۹	مچھلی کا زہر		اخراج خون
۸۹۹	مچھڑ یا مکھی	۸۸۵	ناک سے خون گرنا
۸۹۹	سانپ کا ٹٹنا	۸۸۵	دانت سے خون گرنا
۹۰۱	بڑی اکھڑنا	۸۸۵	چوٹ
۹۰۶	جوڑا اکھڑنا	۸۸۷	سر کی چوٹ
۹۰۶	جڑا اکھٹنا	۸۸۸	دماغ ہل جانا
۹۰۶	گلے کی بڑی	۸۸۸	سیاہ داغ
۹۰۶	بازو کی بڑی	۸۸۹	موج
۹۰۷	ننگی کی بڑی	۸۸۹	کچھل جانا
۹۰۷	ران کی بڑی	۸۸۹	صدمہ
۹۰۷	گھٹنا گھٹنا	۸۹۰	سانپ کا ٹٹنا
۹۰۷	علم ادویات	۸۹۰	یا گل کتھا کا کاٹنا
۹۰۸	میٹر یا میسٹریکا	۸۹۱	کیڑا کاٹنا
۹۰۸	آرٹھک	۸۹۲	بچھو
۹۰۹	آرٹھک	۸۹۲	ناک کان میں کیڑا
۹۰۹	ایکونائٹ	۸۹۳	سانس بند
۹۱۰	انیم طار	۸۹۵	بجلی گرنا
۹۱۰	ایسڈنا ٹیک	۸۹۵	زہر پلے ہوا
۹۱۰	ایسڈنا س	۸۹۵	سردی گرمی
۹۱۱	ایپیکاک	۸۹۵	بے ہوش ہونا
۹۱۱	اوپی ایم	۸۹۵	شراب سے بے ہوشی
۹۱۲	بیسلا ڈونا	۸۹۷	زہر کھانا
۹۱۲	برائی ادویا	۸۹۸	دواؤں کا زہر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲۲	ادویات بابو کیک	۹۱۳	پلس
۹۲۵	لے تھیلین	۹۱۳	تھو جا
۹۲۵	سلکا	۹۱۴	چا سنا
۹۲۶	فرم فاسفوریم	۹۱۴	رٹا کن
۹۲۷	کلکیر یا سلف	۹۱۵	سالی کاشیا
۹۲۷	کلکیر یا فاس	۹۱۵	سنا
۹۲۸	کلکیر یا فلوریکا	۹۱۵	سیکیل کار
۹۲۹	کیلی فاس	۹۱۶	سلف
۹۲۹	کیلی میور	۹۱۶	فاسفورس
۹۳۰	میگنیتا فاس	۹۱۷	فرم میٹ
۹۳۱	نیٹرم سلف	۹۱۷	کار بووج
۹۳۲	نیٹرم فاس	۹۱۸	کیموٹا
۹۳۲	مخصوص اعضا ر	۹۱۸	کلکیر یا کارب
۹۳۲	کی ادویات	۹۱۹	لائیکو پوڈیم
۹۳۲	درا کی طاقت	۹۲۰	مرک
۹۵۱	رشتہ ادویات	۹۲۰	لیکس
۹۸۲	ایک قطرہ دوا سے کیوں	۹۲۱	نکس و امیکا
	فائدہ ہوتا ہے	۹۲۲	نیٹرم میور
	سور المزاجی	۹۲۲	ہیر سلف
۹۹۷	کا دقعیہ	۹۲۳	ہیامیلین

خاندانی علاج

باب اول

تشریح اعضاء انسانی

کسی کام کا فائدہ اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ اُس کام کا کرنے والا اُس کا سبب اور مقصد اچھی طرح نہ جانتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک گھڑی ہی کو لیجئے۔ اس پر اچھی طرح غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اس کے کل پرزے اور پیسے اپنے اپنے کام کو سرانجام دینے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ اگر ایک جگہ کے دندانے ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کے پیسے دھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ پیسے جس دھری پر گھومتے ہیں وہی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کل پرزوں کے کام میں فرق پڑ جاتا ہے اور آخر میں گھڑی بند ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی بنائی ہوئی مشینری کی یہ حالت ہے تو قادر مطلق کی بنائی ہوئی مشینری میں جو انسان کی شکل میں ہے اور کاریگری میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات کیوں نہیں موزوں ہو سکتی؟ ہو مویو پیچیک طریقہ علاج، نہ صرف اُن تکالیف کی ترقی کو دور کرتا ہے۔ جو قدرتی طور پر اس دنیا میں امراض کا شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ بلکہ اُن تکالیف کو دوبارہ ہونے سے روکتا ہے۔

اب ذرا غور کیجئے کہ یہ ہے کیا؟ یہ بھی غور فرمائیے کہ قدرت کے بنائے ہوئے اس جسم میں پیدا شدہ نقائص کو دور کرنا کتنا مشکل کام ہے اسلئے جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت اس انسانی جسم کے امراض کا علاج کرنا چاہتا ہو یا یوں سمجھئے کہ اس جسم کی کھوئی ہوئی صحت کو از سر نو بحال کرنا چاہتا ہو تو اس کو قدرت کا طے کے سامنے صدق دل سے ایسی قابلیت حاصل کرنے کے لئے دُعا کرنی چاہیے تاکہ اس افضل ترین مشینری کی صحت دوبارہ درست کر سکے۔ صرف وہی ایسی طاقت کاش سکتا ہے جس سے یہ کام پورا ہو سکے، اس لئے ہم سب کو اُس کا افضل و کرم حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے سر بسجود ہو کر

دعا کرنا چاہئے۔

ہاں! ہم نے اس جسم انسانی کی تشبیہ ایک مشینری سے دی ہے بلا شک یہ ایک مشینری ہے۔ اور اس وقت تک یہ ضروری مشینری ہے۔ جیتک اس کے روزمرہ کا کام جاری ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تاکہ یہ صرف مشینری ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ متحرک شے ایک زندہ طاقت، ایک کام کرنے والی ذی عقل لوح ہے۔ اب آگے میں یہ بتانے کی حقیر کوشش کروں گا کہ مشینری ہے کیا۔ کیسے بنی ہے اور اس میں کن کن مخصوص پڑیوں کی کون کون جگہیں ہیں؟ اس کتاب کے شروع نصف حصہ میں جسم انسانی کا بیان ہے اور نصف دوسرے یعنی آخری حصہ میں اس مشینری کے کام اور انسان کی صحت پر اس کے اثر کا بیان ناظرین کتاب ہذا ملاحظہ کریں گے۔


جسم انسانی کی ساخت

معمولی طور سے یہ انسانی جسم اول ہڈیوں کا ڈھانچہ (SKELETON) ہے۔ دوسرے رباطات یا بندھن (APPENDAGES) اور تیسرے مختلف اندرونی عضو (VISCERA) ان ہی تین مخصوص چیزوں سے بنا ہے اور اس ڈھانچہ کے اندر خود جدا دند عالم کا افضل جلوہ یا روح موجود ہے۔ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے یہ عضلات (گوشت) کھال شریانیں۔ ورید۔ عصب وغیرہ نازک جھے اور ہر اندرونی اعضاء کو جو غول میں رہتے ہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہڈیوں میں عضلات وتر (نس)، رباطات (بندھن) نسج (رگ) وغیرہ چسپاں ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہوں پر محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہڈیاں نہ ہوتیں تو یہ کس کے سہارے رہتے۔ ہڈیاں آپس میں ملکر مفصل (جوڑ) بناتی ہیں اور جوڑ حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہڈیوں کا جوڑ بنانے والا پردہ یعنی وہ جگہ آپس میں ملتی ہیں۔ نرم ہڈی کی طرح کی چیز کے ایک غلاف میں ملفوف رہتا ہے۔ جسکو جوڑ کی کڑی (ARTICULAR CARTILAGE) کہتے ہیں۔ سب ہڈیاں ان جھیلوں میں ملفوف ہیں جن میں نسج اور ورید شامل ہوئی ہیں ایسی جھیلوں کو پیریاٹم (PERIOSITEUM) کہتے ہیں۔ ان ہی جگہوں سے عروق دمویہ (جسم کی پرورش کرنے والی شریانیں ہڈیوں میں ان چھوٹے چھوٹے ہڈی کے

سوراخوں (FORAMINA) سے داخل ہوتی ہیں جو ان کے پردہ پر پائے جاتے ہیں۔ جب تک یہ چھٹی ٹھیک اور کام کرنے کی طاقت رکھتی ہے تب تک ہڈیوں کی تمام خرابیاں ٹوٹنا۔ کھسکنا وغیرہ سدا ہارے جاسکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اگر ایک ہڈی کا ٹکڑا اکاٹا جائے تو اس کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اس کی سطح سخت اور کھوس ہے۔ یعنی یہ سخت نساج سے بنی ہے اور اندرونی حصے میں اینسج کی طرح ہست سوراخ ہیں۔ اسلئے ان کو جالدار یا سوراخ دار اینسج کہتے ہیں۔ اس جالدار اینسج میں سرخ گوشت (RED MARROW) بھرا رہتا ہے جس کو ہڈیوں کا گودا کہتے ہیں چھوٹی اور لمبی ہڈیوں کے جالدار حصہ کی خالی جگہ میں گودا بھرا رہتا ہے لیکن لمبی ہڈی کے مرکزی حصہ میں گودا ایک دم بھرا نہیں رہتا۔ یہ کھوکھلی جگہ ہڈیوں کے جالدار حصہ کی خالی نیچ کے گودے کی تلی کہلاتی ہے (جوف) (MEDULLARY CAVITY) گودے دو طرح کے ہوتے ہیں سرخ اور زرد۔ سرخ گودا ہڈی کے جالدار حصوں میں اور زرد گودا بڑی ہڈیوں کے سروں میں ہوتا ہے۔ قد اور لمبائی کے لحاظ سے ہڈیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ان میں چند چھٹی۔ چھوٹی۔ ناہموار لمبی ہوتی ہیں۔ ہاتھ پر وغیرہ جن عضو کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ہڈیاں لمبی (LONG) پہونچے اور کلائی وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی (SHORT) کچھ چھٹی یا ناہموار (IRREGULAR) ہوتی ہیں۔ لمبی ہڈیوں

میں دوسرے اور ایک مرکزی حصہ (CENTRAL SHAFT) ہوتا ہے۔
 ڈھانچہ کی ہڈیاں ایک دوسرے سے تین ذرائع سے جڑی ہیں (۱) سلائی دار جوڑ، یا زرد والا (SUTURES) یعنی دوسری ہڈیوں کے نوکدار کناروں سے ملتی ہیں جیسے چند یا کی ہڈیاں (PARIETAL BONES) میں ہوتا ہے جس سے کھوپڑی بنتی ہے (۲) جوڑ کی کڑی (ARTICULAR CARTILAGE) جس کے ذریعہ سے ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ یہ جوڑ کی جگہ پر ہوتی ہے (۳) رباطات یا بندھن (LIGAMENT) کے ذریعہ سے جوڑ ایک نہایت سخت چمکیلی چیز سے گھرے رہتے ہیں۔ انہیں جوف جوڑ (ARTICULAR CAPSULA) کہتے ہیں۔ اسکے ذریعہ سے ہڈیاں اپنی ٹھیک ٹھیک جگہ پر رہتی ہیں اور ہٹ نہیں جاتیں۔

۴
دھانچہ
اس میں خاص خاص ہڈیاں دکھائی گئی ہیں



تصویر نمبر ۱

- (۱) کیوٹر کاسہ (SKULL) (۲) سینہ کی ہڈی (STERNUM) (۳) ہنسی کی ہڈی
(CLAVICLE) (۴) بازو کی ہڈی (HUMERUS) (۵) کلائی کی بالائی اور زیرین ہڈی
(RADIUS ULNA) (۶) ہمرے کا ستون رتھ (VERTEBRAL COLUMN)
(۷) کوٹھے کی ہڈی (HIP BONES) (۸) ران کی ہڈی (FEMUR)
(۹) پٹلی کی ہڈی (TIBIA) (۱۰) پٹلی کی چھوٹی ہڈی (FIBULA)

پورے ڈھانچے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

اس پر سر قائم رہتا ہے (SKULL)
اس سے دو جوف بنتے ہیں۔

جوف سینہ (THORAX)

جوف شکم (ABDOMEN) اسی پر جوف پیڑ کا دار و مدار ہے۔

بالائی شاخیں یعنی دونوں ہاتھ (UPPER EXTREMITIES)

زیرین شاخیں یعنی دونوں پیر (LOWER EXTREMITIES)

ان دونوں ہی کا اس سے تعلق ہے۔

مہروں کا ستون

یا

ریڑھ کا ستون

مہروں کا ستون :- (SPINAL OR VERTEBRAL COLUMN) اس طرح بنا ہے

اس میں جو ہڈیوں کی لڑی جڑی ہے اسے جہرہ (VERTEBRA) کہتے ہیں۔ گردن، پیٹھ اور
کمر سے نیچے تک ایک ڈنڈا ایسا جو کھڑی پیر سے ہاتھ کو مہرے کا ستون یا ریڑھ کا ستون کہتے ہیں
مقعد کے بالائی حصہ سے لیکر گردن تک ایک ستون کی طرح بن گیا ہے انھیں کو مہرے

کہتے ہیں کل مہرے کے ستون میں ۲۶ ہڈیاں ہیں، گردن (CERVICAL OR NECK BONES)

۱۲۔ پشت کے مہرے (DORSAL VERTEBRA)

۵۔ کمر کے مہرے (LUMBER VERTEBRA)

۵۔ پشت کا گاہ کے مہرے (SACRUM BONES)

۳۔ دمچی کی ہڈی (TAIL BONES)

مہرے کی ہڈیاں نامہوار ہونے پر بھی ٹھیک طریقہ سے ایک پر ایک رکھی ہیں۔ اور
انگوٹھی کی طرح ہوتی ہیں۔ پنج میں سوراخ ہوتا ہے (VERTEBRAL FOREMEN) اس کے

علاوہ ان میں ایک مٹی کی نگاری رہتی ہے۔ اس دو موٹے اور پتلے حصے ہیں۔ موٹا حصہ گولی ہوتا

ہے۔ اور اسی جگہ ایک گھیرا ہے جس کا پچھلا نوکدار ہوتا ہے۔ اور جو حصار نما اُبھرا

(SPINOUS PROCESS) کہتا تھا اور گھیرا اور کولاکٹنے کی جگہ (PEDICLE)

کہلاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہروں کے ستونوں کا سہارا ایک ہڈی ہے

جس پر قائم رہتا ہے۔ اندرونی حصے میں گودا بھی ہے۔ سامنے اور دونوں طرف یہ ستون

ٹھک جاتی سکتا ہے۔ لیکن پیچھے کی طرف بالکل ہی حرکت نہیں ہے۔ بکھڑے ہونے اور پیچھے

(VERTEBRAL BODY) کی حالت پر خیال نہ رکھئے اور ٹیڑھے بیٹھے اور کھڑے ہونے کی وجہ سے ہڈی بے ترتیب ہو جاتے ہیں اور سطح ہڈیاں مڑا دیتے ہیں (CARIES) (OR RECROCIS) ستون کے ٹھنڈوں میں دونوں طرف سے بارہ بارہ پسلیاں آکر جوڑ گئی ہیں ان کو ضلع (COSTAE) کہتے ہیں ۱۲ پسلیوں میں اول سات ساتوں کی طرف وسطی دھڑ میں سینہ کی ہڈی سے جوڑی ہوئی ہیں۔ سینہ کی ہڈی تین حصوں میں بٹی ہے۔ اوپر کے دونوں حصے ہڈی والے ہیں اور نیچے والا حصہ دھڑ کے نرم اور لچکدار ہوتا ہے۔ ۳۰ سال کی عمر کے بعد یہ ہڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ جسمانی ساخت کی ناقصیت کی وجہ سے ۲۰ برس کی عمر کے بعد یہ حصہ سخت ہو جاتا ہے۔ لوگ اسکو جگر کی بیماری سمجھنے لگتے ہیں ہم پھر پسلی کا بیان کرتے ہیں۔ اوپر کہا گیا ہے کہ سینہ کی ہڈی تین حصوں سے بنتی ہے۔ سینہ کی ہڈی (STERNUM) کچھ چوڑی اور چھٹی ہے۔ اوپر گردن سے شروع ہو کر پیٹ کی کوری (ECHIGASTRIUM) تک چلی گئی ہے۔ اوپر کا کچھ چوڑا ہے۔ اسی جگہ (FACET) ہیں یعنی دونوں طرف کی ہڈیوں کے لئے گرٹھے ہیں۔ یہ گرٹھے سات سات ہیں۔ جن پر پسلیوں کی نوک رہتی ہے بالائی چوڑا حصہ (MANUBRIUM) درمیانی لیما حصہ (MASATERNUM) سب سے زبردست نرم حصہ (CARTILAGE) حصہ (KIPHAID) (PROCESS) اول سات پسلیاں اضلاع صاف دیکھی جاسکتی ہیں (TRVERIBS) کہلاتی ہیں۔ کیونکہ یہ سینہ کی ہڈی سے جوڑی ہیں۔ پانچ میں اوپر والی کی تین کڑی ساتویں پہلی کی کڑی سے جوڑی ہیں۔ آخر کی دو پسلیاں آزاد یا ترقی پسلیاں کہلاتی ہیں کہ انکا ایک سر کسی میں جڑا نہیں رہتا۔ جہاں یہ بھی سمجھا دینا چاہیے کہ پسلیاں سینہ کی ہڈی سے ایک نرم جوڑی نہیں ہیں۔ ان کے بیچ میں ایک اور کڑی سی رہتی ہے جو کڑی حقیقی (COSTAL CARTILAGE) کہتے ہیں۔ نپت کا پہلا ٹھنڈہ اور دونوں طرف کی پہلی پسلیاں اور سینہ کی ہڈی کے بالائی کنارہ پر ایک سوراخ ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے عروق دمویہ گردن سے سینہ میں آتے ہیں۔ اور بہت سے دوسرے عروق اوپر کو جاتے ہیں۔ اب ہم کھوپڑی یا سر کی ہڈیوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ کھوپڑی (۱) پیشانی کی ہڈی سامنے کی طرف ہے۔ (FRONTAL BONE) (۲) (۷) چند یا کی ہڈیاں (PARICTAL BONES) دونوں طرف رہتی ہیں۔

یہی مل کر سر کی چند یا یا پیشانی کا بالائی حصہ بناتی ہیں۔

۴۔ گدی کی ہڈی (OCEIPITAL BONE) اس سے پیشانی کے پیچھے کا حصہ بنتا ہے۔



۵۔ ۶ دونوں کپٹی کی ہڈیاں

(TEMPORAL BONES) دونوں ہی دونوں

طرف ہیں۔ انہیں میں کان کے باہر والے سوراخ

(OUTER EAR) ہیں۔

اس کے اندر چھوٹی ہڈیاں (OSSICLES) اور کان کا

درمیانی حصہ بھی ہے (MIDDLE EAR)

(۷) کھوپڑی کے نیچے یا صحن میں (SPHENOID BONE) یہ دونوں کپٹی

کی ہڈیوں کے اندر ہیں۔ اس سے پیشانی کے نیچے کا حصہ بنتا ہے۔

۸۔ جالیدار ہڈی (ETHMOID BONE) یہ ناک کے اوپر اور آنکھ

کے پیچھے کی طرف ہے۔ اس کے اندر سے سب رگیں گئی ہیں۔ لڑکپن میں یہ ملی

نہیں رہتی ہیں۔ جس کو چند یا کہتے ہیں (OPEN FONTANELLE) سات یا آٹھ سال

کی عمر میں یہ ہڈیاں مل کر سخت ہو جاتی ہیں۔

اس طرح آٹھ ہڈیوں سے مل کر کھوپڑی بنتی ہے۔

اب چہرے کی طرف خیال رجوع کیجئے۔ یہ حسب ذیل ہڈیوں سے بنا

ہے۔ جوف منہ میں سب ہڈیاں ہیں۔

(۱۲) اوپر کا جٹرا (SUPERIOR MAXILLARY BONE)

جس سے زخاروں کے پنیر میں مدد ملتی ہے۔

۱۔ نیچے کا جٹرا (INFERIOR MAXILLARY BONE) اس جٹرے میں

ملاوت رہتے ہیں۔ ان کے ملنے سے اوپر کے جٹرے کی ہڈی کی مدد سے سخت تالوا اور ناک کی

چھت بنتی ہے۔ درحقیقت ناک کا ہر ایک پھپھلا ایسے مقام سے ظاہر ہوتا ہے جس کو جیب

فکی (ANTRUM OF HIGH-MORE) کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی کو زکام ہو جاتا

ہے۔ تو یہ مرض اندر اندر پھیلتا ہوا جیب فکی (ANTRUM OF HIGH-MORE) میں

جا پہنچتا ہے اور رخساروں کے ابھارتک درد پہنچتا ہے۔ اوپر کے جڑے میں دو ہموار ہڈیاں دائیں اور بائیں طرف رہتی ہیں۔ ان میں ۱۲ دانتوں کی جگہیں بنی ہیں۔ یعنی دونوں حصوں میں آٹھ آٹھ ہیں۔ یہ دونوں جگہیں جس جگہ ملتی ہیں وہیں سامنے کا حصہ اور ناک کے نیچے کی سطح بنتی ہے۔

نچلا چڑا جوتے کے فعل کے مانند ہے۔ اس کے محراب سے ٹھڈی بنتی ہے اس میں ایک امبھار رہتا ہے جو زرخدان کا ابھار (RAMUS OF MANDIBLE) کہتے ہیں۔ اس کے دو پشت ہوتے ہیں۔ باہری عضلہ ہونٹ کو حرکت کونے میں مدد دیتا ہے۔ اور اندرونی عضلہ زبان کو حرکت دیتا ہے۔

۲۔ کوہ کی ہڈیاں (LACHRYMAL BONES) یہ جوف آنکھ کے سامنے والے حصے میں ہیں۔ ان کے راستہ سے آنسو نکلتے ہیں اور ناک میں بہتے ہیں۔ ۲۔ رخساروں کی ہڈیاں۔ یہ چہرہ کے بیرونی اور اوپر کے حصے میں ہیں۔ انھیں سے رخساروں کا بالائی حصہ بنتا ہے

۲۔ تالو کی ہڈیاں (PALATE BONES) یہ ایک ایک دو توں طرف ناک کے پیچھے رہتی ہیں۔ ان سے تالو بنتا ہے تالو کے حصے ہیں ایک سخت اور دوسرا نرم۔ سخت حصہ دانت کا پچھلا حصہ ہے اور اس کے پچھلے کنارے تالو سے ملا ہے۔

۲۔ نیلی کی ہڈیاں (INFERIOR TURBINATE BONES) یہ دونوں ناک کے سوراخوں میں ایک ایک دونوں طرف ہیں۔

۲۔ بانسہ کی ہڈی (VOMERS) یہ ہڈی ناک کی بیچ کی دیوار کا پچھلا حصہ بناتی ہیں۔

آنسو کے جوف کے بارہ میں علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سر کے دونوں طرف ایک ایک گول گول حصہ ہے جس سے آنسو نکلے گا۔ یہ سات ہڈیوں سے بننا ہے۔

۱۔ پپائی کی ہڈی (MALAR BONES) ۲۔ جال دار ہڈی (ETHMOID)

۳۔ کھوٹری کے تے کی ہڈی (ETHMOID BONE) ۴۔ کوہ کی ہڈی

(SUPERIOR MAXILLARY) (۵) اوپر کا چڑا (LACHRYMAL BONE)

(۶) تالو کی ہڈی (PALATE BONES) (۷) رخسار کی ہڈی (MOLAR BONES)

قبل اس کے کہ چہرہ اور پیشانی کا بیان ختم کیا جائے۔ ضروری ہے کہ علم علاج اور علم جراحی (SURGICAL) کے متعلق کچھ اور بھی بیان کر دیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ جس جگہ دونوں چند یا کی ہڈیاں، پیشانی کی ہڈی اور سر کی پچھلی ہڈی سے ملتی ہے۔ وہ بچوں کا تالو یا نرمہ سر (FONTANELLES) ہے یہ تھوڑے یعنی مثلث نما گڑھا ہے (ANTERIOR FONTANELLES) جو ایک سال سے کم عمر کے بچوں میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی جگہ سامنے والی چند یا کی ہڈی دونوں کنارے والی چند یا کی ہڈیوں سے ملتی ہے۔

پہلا جوت یا گڑھا (POSTERIOR FONTANELLES) مربع ہے۔ یہی سر کی پچھلی ہڈی اور کنارے والی چند یا کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ پر چھ ماہ کے چھوٹے بچوں میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ گڑھے جیوں جیوں بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں بھرتے جاتے ہیں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ نیچے کی ٹھڈی میں کس طرح کی چوٹ یا جھٹکا لگنے پر وہ دماغ میں پھونچتا ہے۔ اگر بیکانیک بہت زور کی چوٹ ہو تو اس سے کھوپڑی کی نلی پھٹ سکتی ہے۔ کھوپڑی کے اندر ہی بھیجا یا مغز (BRAIN) محفوظ ہے دماغ کے بارے میں بعد کو بیان کیا جائے گا۔

اب جوف عازیا یا پیٹرو (PELVIS) کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس میں آلتہ تناسل اور مجری بول وغیرہ شامل ہے اور اس سے ٹہرے کے ستونوں کو سہارا ملتا ہے۔ اس میں حسب ذیل اعضاء ہیں۔

۲۔ عظم بلانام یا استخوان بلانام (OS INNOMINATA) ایک ایک دونوں طرف دائیں اور بائیں ہے


۱۔ قب یعنی سرین یا نشست گاہ کی ہڈی (SACRUM) پانچ مثلث ٹہروں سے بنتی ہے۔

۱۔ نشست گاہ کی ہڈی یہ تین ٹہروں سے بنتی ہے۔

جوف عانہ یا خول پیٹرو میں اوپر اند نیچے کی طرف ایک ایک سوراخ ہے اور نیچے کی طرف بھی ایک سوراخ ہے جسکو مخرج بول کہتے ہیں۔ جوف پیٹرو کا اگلا حصہ یعنی مقام پیٹرو کی دونوں ہڈیوں کا اتصالی خط جو (SYMPHYSIS PUBIS) اتفاق العانی

کہلاتا ہے۔ یہی آلات تناسل کا مقام ہے۔ مردوں کے آلات تناسل کو آلات تناسل
مردانہ اور عورتوں کے آلات تناسل کو آلات تناسل زنانہ کہتے ہیں۔

تصویر نمبر ۳
جوف پیرو کی ہڈیاں



(VERTEBRAL COLUMN)

(HIP BONE)

(SACRUM)

(COCCYX)

(ACETABULUM)

جہرے کا ستون

کوٹھے کی ہڈی

نشست گاہ کی ہڈی

دھجی کی ہڈی

بالائی جوف

جوف پیرو کا وہ حصہ جس کے سہارے ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ نشست گاہ کی ہڈی (SCHIUM) کہلاتا ہے۔ جوف
پیرو مردانہ اور زنانہ میں حسب ذیل فرق ہے۔

جوف پیرو زنانہ

جوف پیرو مردانہ

ہڈیاں ہلکی ہوتی ہیں وہ اوپر کم ہوتی
ہیں۔ جوف میں چوڑی جگہ ہوتی ہے
بالائی حصہ کا سوراخ چوڑا ہوتا ہے
مثلث نما ہڈی کم ٹیڑھی رہتی ہے
مخرب زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔

ہڈیاں سخت ہوتی ہیں۔ عضلات
کی وجہ سے جو جوف بنتا ہے وہ گہرا اور
تنگ رہتا ہے جوف پیرو کے بالائی حصہ
کا سوراخ چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے
مثلث نما ہڈی بہت ٹیڑھی رہتی ہے
جوف پیرو کا مخرب بھی بہت تنگ ہوتا ہے

اب ہم انسان کے جسم کی شاخوں کا بیان کریں گے

حقیقت میں جسم انسانی کے تین حصے ہیں۔ سب بالائی حصہ سر (HEAD)
درمیانی حصہ جتنے یا تن یا دھڑ (BODY) بخلا حصہ اطراف سفلی۔ یہ اطراف سفلی شکم
سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کو سفلی شاخیں بھی کہتے ہیں۔ شاخیں دو ہیں اطراف علیا۔
یعنی دونوں ہاتھ اور اطراف سفلی یعنی دونوں پیر (UPPER AND LOWER)
اطراف علیا میں کندھے کے بغل سے دونوں طرف کے دونوں (EXTREMITIES)

ہاتھ۔ اور ہاتھ و اطراف سفلی میں کو لہے سے لیکر دونوں پر اور ان کے جھٹے شامل ہیں۔ اطراف علیا میں دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہر ایک ہاتھ تین حصوں میں منقسم ہے۔ (۱) بازو (ARM) (۲) پہونچہ کلائی (FORE ARM) اور (۳) ہاتھ (HAND) کندھے (SHOULDERS) کے ساتھ دونوں بازو ملے رہتے ہیں۔ کندھے (SHOULDERS) دو شانوں کی ہڈیوں سے (SCAPULA) اور ہنسی کی ہڈیوں (CLAVICLES) (COLLOR BONES) بنتے ہیں۔ اس لئے ہنسی کی ہڈی کا شمار بھی بازو کی ہڈیوں میں ہے۔



اطراف علیا کی ہڈیاں

- (۱) ہنسی کی ہڈی (CLAVICLES) - سامنے
- (۲) شانے کی ہڈی (SCAPULA) پیچھے
- (۳) بازو کی ہڈی (HUMERUS) بازو میں
- (۴) کلائی کی بالائی ہڈی (RADIUS) لگے بازو میں
- (۵) کلائی کی زیرین ہڈی (ULNA) لگے بازو میں
- (۶) پہونچے کی ہڈی (CARPAL BONE)
- (۷) ہتھیلی کی ہڈی (METACARPAL)
- (۸) پوریں (PHALANGES)

اطراف سفلی کی ہڈیاں

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (PELVIC GIRDLE) | خوف پیرو کا کر بند |
| (OSSINOMINATUM) | بے نام کی ہڈی |
| (SACRUM) | نشست گاہ کی ہڈی |
| (FEMUR) | ران کی ہڈی |

تصویر نمبر ۵

پیر

(FIBULA)

پنڈلی کی چھوٹی ہڈی

(TILIA)

پنڈلی کی چھوٹی ہڈی

(PATELLA)

کاسرہ زانو یا چینی کی ہڈی

(TORSAL BONE)

پیر کے ٹخنہ کی ہڈی

(METATARSAL BONE)

تلوے کی ہڈی

(PHALANGES)

پلورس

ہاتھ کی ہڈیاں

(CARPAL BONE)

ہونچے کی ہڈیاں

(SCAPHOID)

گشتی نما ہڈیاں

(CANEIFORM)

خروطی ہڈیاں

(SEMI-LUNAR)

ہلالی ہڈی

(PISSIFORM)

مسٹر جیسی ہڈی

(TISIIFORM)

مشانہ تکیونی ہڈی

کی دوسری لائن کی بیرونی ہڈی ہے۔

(ORMAGNUM)

بڑی ہڈی

یشت دست کی ہڈیاں کل پانچ ہیں۔ ہر ایک

(PHALANGES)

انگی میں تین تین پلورس ہوتی ہیں

پیر کی ہڈیاں

(TARSAL BONES OR ANKLE BONES)

پیر کے ٹخنہ کی ہڈیاں

(SCAPHOID)

گشتی نما ہڈی

(ASTRAGALUS)

ٹخنہ کی ہڈی

(CUNEIFORM)

گتے کی ہڈی

(ORCALCIS)

اٹری کی ہڈی

(META TORSAL BONE)

تلوے کی ہڈی

(CABOID BONE)

پانسنہ نما ہڈی

ہر ایک انگلی میں تین تین اور

(PHALANGES)

پیر کے انگلیوں کی ہڈی

انگوٹھے میں دو، پلوریں ہوتی ہیں
پورے ڈھانچے میں متذکرہ بالا ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہڈیاں جس مقام پر ملتی ہیں
اس کو جوڑ (JOINT) کہتے ہیں

جوڑ دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) متحرک (MOVABLE) (۲) غیر متحرک (IMMOVABLE)
متحرک جوڑوں سے ہر قسم کی حرکت ہوتی ہے یعنی وہ گدھے
پیر اور ٹر سکتے ہیں۔ غیر متحرک جوڑیوں کے توں رہتے ہیں۔ اپنی جگہ پر ہڈیاں باہم
خوب پیوست رہتی ہیں۔ متحرک ہڈیوں کے کنارے جی ریشوں سے بندے
ہیں۔ ان کو بندھن یا ربات (LIGAMENTS) کہتے ہیں۔
اب آگے ہم ہڈیوں کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کا بیان کریں گے۔

عضلات یا مچھلیاں

عضلات یا مچھلیاں (MUSCLES) ایک ایسا رشتہ کا مجموعہ ہے اور
اس میں سکڑنے کی طاقت ہے۔ عضلات یا گوشت کا خوشہ ہے یا ایک ایک گوشت
کا ریشہ ہے۔ ہر ایک ریشہ میں بہت سے خطنے ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہڈی کے
مقام سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری ہڈی میں چپاں ہو جاتے ہیں۔ عضلہ کا
درمیانی گھنا حصہ عضلہ کا شکم کہلاتا ہے۔ اس کے پسیدار ہونے اور ملنے کا مقام
وتر (TENDONS) کہلاتا ہے۔ یہ بہت مضبوط اور چمکدار ریشے ہوتے ہیں۔
جو چمکدار نہیں ہوتے۔ عضلات میں رگ کے سرے داخل ہوتے ہیں۔ ان میں بہت
عروقی دمو یہ ہوتے ہیں۔ ہر عضلات میں کھینچاؤ کا مادہ بتا رہا ہے۔ یہ کئے تناؤ سے
ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہر ایک عضلا میں لچیلیاں سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے
اعصاب (NERVE) بجلی کے تار کی طرح زندگی سے پروئے ہیں۔ وہ
چمکے سخت اور ڈوری کی طرح ہیں۔ وہ یا تو دماغ سے یا حوام مغز سے یا ہڈی
کے گود سے پیدا ہوتے ہیں اور جلد عضلات اور جسم کے حصے میں مل کر اپنا کام
کرتے ہیں۔ یہ حسب ذیل تین کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔
(۱) اعصاب حرکت (MOTOR NERVES) اعصاب حرکت کا تعلق

عضلات کی حرکت سے ہے۔ اس کی وجہ سے کل عضلات ٹکڑے ٹکڑے یا اکٹھا ہوتے ہیں اور انہیں عضلات میں وہ ختم ہوتے ہیں

(ب) اعصاب الحس (SENSORY NERVES) ان کا تعلق نفسِ باغ و فہم سے رہتا ہے۔ جیسے ہاتھ جلا اور دماغ نے محسوس کیا یہ کام اعصاب الحس کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی اندرونی و بیرونی چکر جس جگہ رہتے ہیں وہاں سے تکلیف و آرام و بخ و خوشی سردی و گرمی لاسہ ذائقہ وغیرہ کی خبر دماغ کو پہنچا دیتے ہیں۔

(ج) ان کے علاوہ اعصاب ہیں جو پرورش کرنے والے اعصاب کہلاتے ہیں۔ وہ جن جگہوں پر ہیں وہاں پرورش کا کام کرتے ہیں مثلاً اگر کوئی عصب کٹ جائے تو جسم کے جن حصوں کی یہ پرورش کرتا تھا وہ اس کی غیر موجودگی سے پرورش سے محروم ہو جائیں گے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کالعدم ہو جائیں گے جسم کے خاص خاص اعصاب مندرجہ ذیل ہیں۔

اعصابِ عجزیہ :- یہ ان کے پیچھے سے ادر جاتا ہے۔ دوسرے اعصاب بازو (BRACHIL) جو بغل کے گڈھے سے نکلتا ہے۔ باقی اعصاب بہت چھوٹے چھوٹے یا نہایت باریک ہیں۔ وہ گوشت کے طبقہ سے چھٹے ہیں۔ اس جگہ کے عروقِ دموہ کے ساتھ ہی وہ پردے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان کی حفاظت کا انتظام ہڈیوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔

عروقِ دموہ :- دل کے مقام سے بہت شریانیں اور وریدیں نکلتی ہیں انہیں کے ذریعہ سے تمام جسم میں خون کا دوران ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو عروقِ دموہ (BLOOD VESSELS) کہتے ہیں۔ ان کے تین حصے ہیں۔

(۱) (ARTERY) شریان یا وہ نالیاں جن میں سُرخ و صاف خون رواں ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ دل سے نکل کر صاف خون جسم کے دُور دُور حصوں میں پہنچتا ہے اس کے اوپر گوشت کی تہہ ہوتی ہے۔ یہ کٹ یا ٹوٹ جانے پر سُکھتی ہیں۔ ان میں ٹرین ہوتی ہے۔ دل سے خون زور کے ساتھ نکلتا ہے اور وہ زوری کے ساتھ شریانیں میں جاتا ہے۔ اسے ایک طرح کی ٹرین ہوتی ہے، یہ ٹرین بھی شریان کے ذریعہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہوتی ہے۔ جب کوئی شریان کٹ جاتی ہے تو اس سے زور

کے ساتھ دھار میں خون نکلتا ہے۔ اور یہ خون جگہ ار اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔

(۲) اور وہ (VEINS) (۱) کے ذریعہ جسم کے تمام حصوں سے کشیف اور کالا خون دل کے دائیں حصہ میں پہنچتا ہے۔ ان پر کوہست کا غلاف نہیں رہتا ہے جب یہ کٹ جاتی ہیں تو ان سے زردی دھار میں کالا خون نکلتا ہے۔ شرائین میں جب چھوٹی ہو جاتی ہیں تو چھوٹی شرائین (ARTEIOLES) کہلاتی ہیں اور جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو چھوٹی ورید (VENUES) کہلاتی ہیں (۲) عروق شعریہ یعنی بال سے باریک رگیں (CAPILLARIES) جب جسم کے کسی حصہ میں یہ رگیں داخل ہوتی ہیں تو چھوٹی شرائین چھوٹی ہوتے ہوتے بال سے باریک ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک سیل والی دیوار میں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ اس حالت میں ان کو عروق شعریہ کہتے ہیں اس طرح عروق شعریہ ایک طرف تو شرائین کی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ ایک شریان سے دوسری طرف ملتی ہیں۔ دوسری طرف ایسی ہی ابتدائی شاخیں ہیں جو چھوٹی اور وہ میں ہی داخل ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ عروق شعریہ شرائین کے آخر کا اور چھوٹی وریدوں کے شروع کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس میں شرائین کی رڑیں نہیں ہوتی۔ لیکن اسکے توسط سے خون ٹیڑھی دھار سے گرتا ہے۔ یہ دریا کی طرح ہے جسم کے ہر اک سیل میں صاف خون پہنچا جاتی ہے اور وہاں سے کشیف خون اکٹھا کر کے دل کے دائیں حصہ میں پہنچا دیتی ہیں۔

دریا کی دھار کی طرح عروق شعریہ کا محیط کبھی کبھی عروق دمویہ (شریان یا ورید) سے بھی بڑا ہوتا ہے جو عروق شعریہ کے اندر سے گزرتی ہیں۔ شرائین سے خون تیزی اور جھٹکے کے ساتھ چھوٹی شرائین سے تیزی سے مگر شریان کی بہ نسبت کم جھٹکے سے آہستہ آہستہ بغیر کسی جھٹکے کے، عروق شعریہ سے چھوٹی ورید سے دل میں داخل ہوتا ہے۔

عروق شعریہ جو عروق دمویہ سے ملتی ہیں عروق رطوبتی (LYMPHATICS) جسم کے ہر حصہ میں جب خون عروق شعریہ میں دورہ کرتا ہے تو ان کی پتلی پتلی دیواروں سے اس کا کچھ رقیق حصہ ٹپکتا ہے۔ اس ٹپکی ہوئی چیز کا نام رطوبت ہے۔

اس رطوبت میں شکر، پروٹین، چربی اور نمک وغیرہ چیزیں رہتی ہیں جسم کی سیلیں رطوبت میں تر رہتی ہیں۔ اس رطوبت کے توسط سے سیلوں کی پروڈرژ ہوتی ہے۔ رطوبت، خاص کر نہایت باریک عروق شعریہ کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کو عروق

مادہ (LYMPHATIC DVCTS) کہتے ہیں۔ یہ رطوبت جس جگہ ٹپکتی ہے اس کو

تصویر نمبر ۵



عروق کیلوسیہ یا عروق بنیہ (RECEACULAMGHYLI) کہتے ہیں۔ عروق کیلوسیہ جو پیرو میں ہے اور وہاں سے دل میں بحری الصدر یعنی سینہ کی نالی (THORACIC DVCTS) کے ذریعہ رطوبت پہنچا دی جاتی ہے رگوں سے عروق کیلوسیہ میں لے جانے کے راستہ میں بحری الصدر ان غدود جاذبہ

(LYPHATIC GLANDS)

کے اندر سے جاتی ہیں جو جسم میں عموماً سب جگہ اور خصوصاً جوڑوں کے نزدیک اور جوف پیرو میں ہیں۔ یہ عروق جاذبہ ایک قسم کی بڑی نلی یا تام جسم کی پرورش کرنے والی چیز کے برابر ہیں اور غدود جاذبہ وہ مقام ہے۔ جہاں اگر کوئی باہری یا کوئی زہریلی چیز رطوبت میں مل جاتی ہیں۔ ان کو گھیر کر ہلا کر دیتے ہیں۔

تصویر نمبر ۶



عروق جذبہ اور غدود

جلد: جسم کا باہری غلاف (EXTERNAL COVERING) ہے جس سے اندرونی رگیں وغیرہ محفوظ رہتی ہیں۔ اور حرارت غریزی یعنی حرارت بدنی قائم رہتی ہے۔ یہ قوت لاسرہ کا خاص ذریعہ ہے۔ انسانی کے بال ناخن اور جانوروں کے سینگ جلد ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جلد میں تین حصے ہیں۔ باہری سے اندر کی طرف اس طرح ہیں۔


(EPIDERMIS)

(۱) بشیرہ یا بالائی طبقة

اس میں رگیں اور عروق دمویہ نہیں ہوتیں (۲) درمیانی

طبقہ جس سے جلد میں رنگت آتی ہو (۳) اومو یعنی زیرین طبقہ (DERMIS OR TRUE SKIN) بالائی طبقہ سانپ کی کچل کی طرح باریک ہوتا ہے۔ اس کو جلد غیر حقیقی کہتے ہیں اس میں رگیں عروق دمویہ چربی (FAT) اور غدود عرقیہ (SWEET GLANDS) رہتے ہیں۔ حقیقی جلد میں ٹھیک اور پروا اور غیر حقیقی جلد میں ٹھیک نیچے ایک جالدار ریل رہتا ہے اس کا نام بنیادی عشاء جھلی (BASE MENT) (MEMBRANCS) ان سیلوں میں ایسے اسباب موجود ہیں جن سے رنگ اور شباهت میں تبدیلی ہوتی ہے اسلئے اس کا نام رنگ کی سیلیں (COLOUR CELLS) ہے۔

تصویر نمبر ۷



(۱) اومو یا حقیقی جلد

(DERMIS OR TRUE SKIN)

جلد (۲) رنگ کی سیلیں (COLOUR)

(CELLS) غدود عرقیہ (SWEET GLANDS)

چربی (FAT)

سام جلد (PORES OF THE SKIN)

جلد ایک غلاف ہی نہیں۔ بلکہ خون سے کثیف چیزوں کو باہر نکال دینے والا ایک آلہ بھی ہے۔ جلد میں بیشمار چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں کو سام جلد (PORES OF THE SKIN)

کہتے ہیں۔ پسینہ کی صورت میں کثیف چیزیں

اس کے ذریعہ سے باہر نکل جاتی ہیں۔

(GLAND)

غدد و یا گلیاں

جو تمام جسم کے عضو و خون وغیرہ سے کوئی چیز

باہر نکال سکتے ہر یا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ان کو غدد و یا گلیاں (GLANDS) کہتے ہیں۔

جسم کے کل جگہوں میں غدد و ہیں جیسے غدد عرقیہ (SWEET GLAND) رینالیوں

کا حلقہ ہے۔ اور ان میں ایک نئی ہوتی ہے۔ جس کا منہ جلد پر کھلا رہتا ہے۔ یہی وہ سوراخ ہیں جن کو مسام کہتے ہیں۔ چربی کی گلیٹیاں جلد کے اندرونی طبقہ میں ہوتی ہیں اور ان میں بھی تلی رہتی ہے اور ان کی تلیاں بالوں کے خانہ میں کھلتی ہیں۔ ان میں سے ایک روغنی شے نکلتی ہے جس سے ہماری جلد چمکی رہتی ہے۔

چربی (FAT) یہ ایک طرح کی مادی اور روغنی چیز ہے۔ یہ عضلات پر جلد کے اوپر اور نیچے رہتی ہے۔ اس کا کام جلد کو گرم رکھنا ہے۔

نسج (TISSUE) یہ مسل ڈور کے ایک بندھن ہے۔ جسکے ذریعہ جسم کی مشینری اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جب یہ دونوں بڈیوں کا اتصال کرتے ہیں تو بندھن یا رابطات (LIGAMENTS) کہلاتے ہیں۔ اور جب عضلہ کا اتصال ٹھی سے کرتے ہیں تو ان کو نشیں یا پوتار (TENDONS) کہتے ہیں۔

بال (HAIR) ہار ایک سوت کی طرح جو چیزیں بیرونی جلد پر معلوم ہوتی ہیں۔ انھیں رویاں کہتے ہیں۔ داڑھی۔ مونچھ اور سر کے رویں کو بال (HAIR) کہتے ہیں۔ ان میں نہایت ہار ایک قلے ہوتے ہیں۔ ان کی جڑیں جلد حقیقی میں ہوتی ہیں ان کو شعیرہ جراب یعنی بال کے کیسہ دار غدود کہتے ہیں۔

ناخن :- اس سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے اور قوت لامہ میں مدد ملتی ہے ناخن ہی رویں کی طرح بیرونی جلد کی دوسری شکل ہے۔ ناخن کے تین حصے ہیں۔ جڑ۔ جسم۔ کنارہ (FREE EDGE) عضلہ کے اوپر کا حصہ جسم اور جلد کے نیچے والے حصہ کو اُس کی (ROOT) کہتے ہیں۔

نظام عصبی یا اعضار نفسانیہ

(NERVOUS SYSTEM)

اعضار نفسانیہ :- انسان کے جسم میں آلات یا رگوں کا مجموعہ ہے جو معمولی طور سے کام کیا کرتا ہے۔ ان کو نظام (SYSTEM) کہتے ہیں جو آلات باضمہ کا کام کرتے ہیں۔ ان کو نظام ہضمی (DIGESTIVE SYSTEM) کہتے ہیں۔ انھیں کے اندر جوت شکم، غدود چکر، دیرہ ہیں۔ یہ آلات یا نظام جس سے ادراک، تحریک

جوش وغیرہ معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں نظام عصبی کہتے ہیں۔ نظام عصبی کے دو حصے ہیں

(۱) نظام دماغی یا حرام مغز

(SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM)

(۲) نظام شرکی

نظام شرکی سے پرورش کے آلات، جسم، خدود، اور عروق دمو یہ کو رگیں

ملتی ہیں۔ یہ سب نظام دماغی سے ملی۔ ان کے دو حصہ ہوتے ہیں۔ جو
مہروں کے دونوں طرف لگے رہتے ہیں۔

(۱) ہر ایک حصہ یعنی دھڑ میں لمبی لمبی رگوں کی گرہیں ہیں۔ ان کو عجرت یا پٹھے

کی گرہ (GANGLIA) کہتے ہیں (ب) یا رگوں کے سرے جو عجرت سے

مل گئے ہیں اور (ج) پیچ در پیچ رگیں یا رگوں کا جال (PLEXUSES)
ہے۔ نظام دماغی کے حصے حسب ذیل ہیں۔

(CEREBRUM)

[مقدم دماغ

(CEREBELLUM)

(۱) آخر دماغ

(۲) پل دماغ یا اوسط دماغ (POVS VEROLII) (۳) حرام مغز

(۴) رگ کا مقدم، دمیانی، مؤخر حصہ

مقدم دماغ یا پل دماغ :- اس کے دو حصے ہیں ان دونوں حصوں

کے پیچ میں ایک درز (SAGITAL FISSURES) ہے۔ اسکی وجہ سے دماغ

دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

ان دونوں حصوں کو دماغ کا نصف کرہ

(CEREBRAL HEMISPHERES)

کہتے ہیں۔ یہ دائیں اور بائیں


طرف رہتے ہیں۔

اوپر سے نیچے کی طرف مقدم

دماغ، چھوٹا دماغ، پل دماغ

اور حرام مغز کا نصف حصہ

دکھائی دیتا ہے۔



ماپنے کو دایاں نصف کرہ (RIGHT HEMISPHERE) اور بائیں کو
 بایاں نصف کرہ (LEFT HEMISPHERE) کہتے ہیں یہ دونوں حصے بھی نیچے
 جڑے ہیں جس چیز سے یہ جڑے ہیں اس کو جسم مُلک (CORPUS CALLOSUM)
 کہتے ہیں۔ تصویر نمبر ۸ بغور دیکھئے۔

مقدم دماغ کا اندرونی پردہ ٹیلہ رنگ کی چیز یا سیلوں سے بنا ہے۔ اس
 میں کہیں اُبھار اور کہیں گہرائی رہتی ہے۔ اُبھری ہوئی جگہ کو دماغ کا اُبھار
 (CORVOBUTTON) اور گہری جگہ کو (SULCI OR SULENS) کہتے ہیں۔
 اس کا اندرونی حصہ سفید چیز (WHITE MATTER) یعنی رگوں کے جال سے بنا
 ہے۔ دوسرے حصہ کھالی مادہ (CORTEX OR GRAY MATTER) کہتے ہیں دماغ کا باہری حصہ سیلوں
 سے اور اندرونی عصبی یافتہ (NERVOUS TISSUES) سے بنا ہے۔ ہر ایک
 نصف کرہ دماغ کے نیچے خالی رہتا ہے۔ اور دونوں نصف کرہ دماغ کے درمیان
 ایک پتلی چیز رہتی ہے۔ اس میں کچھ سیال شے ہے۔

مؤخر دماغ (CEREBELLUM) اس میں بھی دو نصف کرے ہوتے
 ہیں۔ اور یہ مقدم دماغ سے رہتا ہے۔ اس میں بہت فرمات (سلی یا سونی نس) ہوتی ہیں۔
 غرض زیادہ گہری رہتی ہیں اس کے تین حصے ہیں۔

نصف کرے (HEMISPHERE) اور درمیانی حصہ (VERNIS)
 ان دونوں کے درمیان ایک ڈنٹھل کی طرح رہتا ہے جو (CORPUS DONTATUNE)
 کہتے ہیں۔ ان میں تین ستون (PEDUNCLES) ہوتے ہیں۔

پیل دماغ یا اوسط دماغ (PONS VEROLEE) یہ مؤخر دماغ کے سامنے کا
 ایک گول پیدار حصہ ہے۔ یہ سفید ہوتا ہے۔ اس جگہ سے حرام مغز، مقدم دماغ
 اور مؤخر دماغ تک جانے والے اعصاب نکلے ہیں۔ ان کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے گول
 دانے ہوتے ہیں۔ یہ (CORPUS MAMILLAR) کہلاتے ہیں۔ اُسکے

سامنے ایک بڑا گولا (HISPHEIDIS) پھر مجمع النور (OPTIC CHIASM)
 پھر سونگھنے کا راستہ ہے

حرام مغز:- یہ سونی کی شکل کا عصب ہے اس کا سر تقریباً ایک انچ۔ طول اور

کی طرف ہے۔ اس کی موٹائی سب جگہ یکساں نہیں ہے۔ بیرونی حصہ اور اندرونی حصہ میٹلے رنگ کا ہے۔ اُس کے وسط میں ایک سوراخ ہے اُس میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جو دماغ کے چوتھے خانہ میں جا ملی ہے اور اُس کا دوسرا ریڑھ کے ستون کے درمیانی نالی سے ملا ہے۔

ریڑھ کا ستون اور اُس کا گودہ :- یہ ڈیڑھ فیٹ لمبی ڈیڑی ہے اور اس سے کل ریڑھ کے ستون کا بھرا ہوا ہے۔ اس سے اعصاب کے اکتیس جوڑے نکلتے ہیں۔ ایک بیرونی حصہ مٹی کے رنگ کی چیز ہے اور اندرونی حصہ سفید رنگ کی چیز (WHITE MATTER) سے بھرا رہتا ہے اور بیچ میں قناعت مرکز یہ یا حرام مغز کی نالی ہے۔

مقدم دماغ، پُل دماغ، حرام مغز اور ریڑھ کا ستون ان سب پر جھیلیوں کے ۳۔ غلاف چڑھتے ہیں؛ باہری غلاف کو اُم جانیہ (DURA MATTER) کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ڈیڑی والے حصے کے غلاف سے ہے۔ یہ بہت ہی نازک عصبی ریشے کے بندھن کی طرح ہے۔ درمیانی غلاف یا دماغ کی جھلی اُم دماغ (MENINGES) کو اُم رقیق (ARCH HOID) کہتے ہیں۔ اور دماغ کے سب سے اندرونی غلاف کو فشارین (PIA MATTER) کہتے ہیں۔ یہ عروق دمویر کا جال ہے

اعصاب :- دماغ سے جسم کے مختلف حصوں میں خبر لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ اعصاب حسب ذیل حصوں میں منقسم ہیں۔

(۱) اعصاب الدماغ (CRANIAL NERVOUS) وہ ہیں جو چھوٹے دماغ کے اندرونی پردہ سے نکلتے ہیں۔ ان کے بارہ جوڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دونوں پہلو میں رہتے ہیں۔

(۲) اعصاب النخاع یا حرام مغز کے اعصاب (SPINAL NERVOUS) حرام کے ستون کے دونوں پہلو سے اعصاب کے ۳۱ جوڑے نکلتے ہیں۔ اعصاب دماغ سب ذیل ہیں

(۷) عصب شمی (OLFACTORY NERVOUS) اس سے سونگھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ (ب) عصب البصری (OPTIC NERVOUS) یہ آنکھ کے ڈھیلے کے پیچھے سے داخل ہوتے ہیں اور نوداتی پردہ (RETINA) کے

اندرونی طبقہ میں پھیل جاتے ہیں۔ ان سے دیکھنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے
 (ج) عصب محرک متقلبی (OCULO MOTOR) اس سے آنکھ کے کویر میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔
 (د) عصب محرک منظر (TRACHEAR) اس سے آنکھ کی پلکیں اوپر اٹھتی ہیں
 (س) عصب ثلاثی وجمی (TRIGEMINAL NERVOUS) اس سے چہرہ پھیلا جڑا،
 ناک، منہ، زبان کا درد تہائی حصہ، اور دانت میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ان سے چبانے
 اور کچلنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ (ص) عصب استیاتی یا عصب الشفاتی
 (ABDUCENS) ان سے اوپر کی جانب اٹھتی ہے (ط) عصب الوجہ (FACIAL)
 (NERVOUS) اس سے کھوپڑی اور چہرے کے عضلات میں قوت حرکت پیدا ہوتی ہے
 اور زبان کے ذائقہ پیدا کرتی ہے۔ (ع) عصب سمعی (AUDITORY)
 (OR ACOUSTIC NERVOUS) ان سے سنتے میں مدد ملتی ہے (ف) عصب
 ذوقی (GLOSSO PHARY NGEOL) ان سے حلق کے عضلات اور زبان میں ذائقہ
 کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ (ز) عصب لاج (VAGUS OR PNEUMOGASTRIC NERVE)
 یہ دونوں بڑے اعصاب ہیں۔ ان سے نرخرہ اور ہوا کی نالی پھیپھڑے، مدہ، بارہ انگشتی
 آنت اور جگر وغیرہ میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ (ل) عصب انسانی (SPINAL)
 (ACCESSORY) پشت اور گردن کے عضلات میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ اور
 بہت سے عضلات میں حرکت کی طاقت کا باعث ہے (م) عصب سانی (HYPG)
 (LOSSAL) اس سے زبان کے عضلات میں حرکت ہوتی ہے

اعصاب حرام مغزی۔ یہ اعصاب ۱۲ ہیں۔ اور حرام مغزی سے شروع ہوتے
 ہیں۔ یہ حرام مغزیں دو طرف سے جڑے ہیں اور دونوں طرف کے سوراخوں سے نکل کر
 کل جسم میں پھیل گئے ہیں۔ جن دو حصوں میں جڑے رہتے ہیں۔ انھیں مقدم
 (ANTERIOR OR MOTOR) اور پچھلے یا دوسرے کو مؤخر (POSTERIOR)
 کہتے ہیں۔ اور بہت جگہوں میں ان کا خوشہ بن گیا ہے۔ یہ مقدم عصب اور مؤخر
 عصب فوراً ہی عصبی گروہ میں بدل جاتے ہیں۔ اعصاب حرام مغزی مندرجہ ذیل ہیں۔
 (۸) جوڑ گردن میں۔ ۵ جوڑ نشست گاہ میں۔ ۱۲ جوڑ سینہ میں
 ایک جوڑ دچی کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ ۵ کمر میں

ہر ایک عصب حرام مغز سے نکلتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے مل کر جال (PLEXUS) بناتا ہے۔ یہ اعصاب عضلات کے سیلوں، گریہوں، جلد۔ رخو، یا زبان میں ختم ہو جاتے ہیں۔

نظام دوران الدم

(CIRCULATORY SYSTEM)

اس میں حسب ذیل اعضاء ہیں۔

(۱) دل

(ب) باہر نکلنے والی عروق دمویہ میں شراہیں (ARTERIES)

(ج) اندر آنے والی عروق دمویہ (VEINS)

(د) چھوٹی چھوٹی متفرق عروق دمویہ (CAPILLARIES) عروق

شعریہ، عروق جاذبہ (LYMPHATICS)


آخر کے تینوں کے بارے میں پہلے ہی بیان ہو چکا ہے اب ہم (BLOOD) خون اور دل (HEART) کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔

دل (HEART) دل نہایت پانی کی شکل کا چوت دار عضلاتی عضو ہے اس کا قد ایک بندھی ٹھکی کے برابر ہے۔ سینہ سے کچھ پیچھے کی طرف اور کچھ بائیں طرف ہلکا ہلکا دونوں پیچھڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ بالائی چھتہ بالائیت زیریں حصہ کے کچھ زیادہ چوڑا ہے۔ اس کے اوپر جھلی کا ایک غلاف چڑھا رہا ہے۔ جسکو غلاف القلب (PERICORDIUM) کہتے ہیں۔ اس سے سیال خنہ نکلتی ہے۔ جس سے دل کا بالائی حصہ تر رہتا ہے۔

دل کا اندرونی حصہ خول ہوتا ہے۔ جس طرح اوپر بیان ہوا ہے۔ یہ باریک عضلات کی جھلی اسکو چار چار حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ترتیب دار اوپر نیچے، دائیں اور بائیں چار خلتے (AVRICLES) ہیں۔

اوپر کے دونوں دائیں اور بائیں اذن القلب، یا کان کی سیپی (AURICLE) اور نیچے والے دائیں بطن یا کم کہلاتا ہے۔

تصویر نمبر ۹



دل کی باہری لکیریں

(۱) دل کا دایاں کان (RIGHT AURICLE)

(۲) دایاں بطن (RIGHT VENTRICLE)

(۳) دل کا بایاں کان (LEFT AURICLE)

(۴) بایاں بطن (LEFT VENTRICLE)

پس دل دائیں اور بائیں اس طرح ہے۔

ایک دل کا کان (AURICLES)

ایک بطن (VENTRICLES)

ایک عضلہ جو دل کے کان اور بطن کو جدا کرتا ہے۔

ایک دل کا کان

ایک دل کا بطن

ایک عضلہ جو دل کے کان اور بطن کو جدا کرتا ہے۔

دل سے دونوں قسم کے صاف اور کثیف خون آتے جاتے ہیں۔

صاف خون چار پھیپھڑوں کے وریدوں (PULMONARY VEINS) کے ذریعے

آتا ہے۔ کثیف خون اجوف قوتانی (SUPERIOR VENACAVE) اور اجوف

تحتانی (INFERIOR VENACAVA) کے ذریعے آتا ہے۔

غذا کا حصہ اور سب جھٹوں سے طبع یا رطوبت بے نام والی شریان کے

ذریعہ سینہ کی نالی میں گرتے ہیں۔

دل سے کثیف خون نکل کر شریان الریہ (PULMONARY ARTERY) کے ذریعہ

پھیپھڑے میں جاتا ہے اور طنی یا شہر رگ (AORTA) کے ذریعہ صاف


خون کل جسم میں پھیل جاتا ہے۔

اب دل کے فعل پر غور کیجئے۔

اجوف تحتانی (INFERIOR VENACAVE) جو بزرگ کے اندر سے جا کر

دل کے دائیں کان (RIGHT AURICLE OR ATRIUM) میں کھل جاتی ہے۔ اس

میں کل نچلے عضو کا خون اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے تمام حصوں سے کثیف خون۔ اجوف فوقانی (SUPERIOR VENA) میں آتا ہے۔ جو دل کے دائیں کان میں اسکو پہنچا دیتا ہے۔ جیوں ہی دایاں کان خون سے بھر جاتا ہے۔ یہ سکرٹنے لگتا ہے۔ اور زور سے خون کو (RIGHT VENTRICLE) دائیں بطن میں دھکیل دیتا ہے۔ دایاں سر دنداں دندانہ کوٹر (TRICUSPID VALVE) اس کے بعد ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور خون کو واپس نہیں جانے دیتا۔ یعنی پھر دائیں بطن سے دایاں کان میں نہیں جانے پاتا۔



اس میں بالائی دایاں اور بائیں دونوں بطن دکھائے گئے ہیں۔

اس کے بعد جیوں ہی دایاں بطن بھرتا ہے۔ ویسے ہی یہ بڑا شریان اگر یہ کے ذریعہ صاف ہونے کے لئے پھیپھڑے میں پہنچا دیتا ہے۔ پھیپھڑے میں خون صاف ہو کر دایاں اور بائیں پھیپھڑے سے شریان اگر یہ


کے ذریعہ بائیں بطن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کان سے یہ خون بائیں بطن میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہاں دو دندانہ کوٹر (BICUSPID VALVE) یہ اس کا واپس ہونا روک دیتا ہے۔ اس کے بعد جب دایاں بطن بھر کر سکرٹنے لگتا ہے تو خون اور طنی یعنی شریان لگ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔

یہ اوپر بٹھا چکے ہیں کہ دل ناشپاتی کی شکل کی چیز ہے۔ یہ پانچویں۔ چھٹے سالوں۔ آٹھویں پشت کے مہرہ کے نیچے رہتا ہے۔ اس کا بالائی حصہ بائیں سے بنتا ہے اور جسم کے درمیانی حصہ سے ۳ انچ اوپر ہے۔ یہ ایک مضبوط عضلہ کا جوف ہے۔ جسکو غلاف القلب (PERICARDIUM) کہتے ہیں۔ اس کا اندرونی حصہ ایک نرم جھلی سے ڈھکا ہے جسکو عشاء البطن (ENDO-CARDIUM) کہتے ہیں۔

اب ذرا ان کو اڑوں کے بارے میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔

کان سے بغن میں خون آنے کے لئے ایک سو راج ہر ایک طرف رہتا ہے۔
 سو راجوں میں ایک کو اڑ (VALVE) رہتا ہے۔ یہ ایک ہی طرف کھلتا ہے
 یعنی کان میں نہیں جاسکتا کیونکہ اس وقت یہ کو اڑ آپے آپ بند ہو جاتا ہے۔ دائیں
 طرف تین کو اڑ ہیں۔ اس لئے اس کا نام (TRI-CUSPID VALVE) سہ دندانہ کو اڑ ہے۔
 اور بائیں طرف دو کو اڑ ہیں۔ اس لئے اس کو دو دندانہ کو اڑ (BI-CUSPID VALVE)
 کہتے ہیں۔ دل سکر کر شراہیں میں زور سے خون ڈھکیں دیتا ہے۔ اسی وجہ سے دل کے
 سکرٹے اور پھیلنے سے ایک آواز "لیپ وپ" کی سنائی پڑتی ہے۔ اس آواز کو دل
 کی آواز (SYSTOLE) کہتے ہیں۔

تصویر نمبر ۱۱



اور طنی یا شہرگ (AORTA)

شریان الریہ (PULMONARY ARTERY)

وریدیہ (PULMONARY VEINS)

بایاں کان (LEFT AURICLE)

بایاں بطن (LEFT VENTRICLE)

نظام ہضمی

(DIGESTIVE SYSTEM)

اس میں مشہد خلق

جس کے بارے میں نظام تنفسی میں

بیان کیا جائے گا۔ معدہ چھوٹی

اندر بڑی آنت

(SIGMOID)

سنی

(SMALL AND LARGE INTESTINE)

(BLADDER)

جگر (Liver) مثانہ

(RECTUM)

(PANCREAS) وغیرہ ہیں۔

منہ (MOUTH) اس کا اندرونی حصہ لعابدار جھلتی سے بنا ہے۔ یہ لعابدار جھلتی (MUCUS MEMBRANE) بھی چلد کے مانند ہوتی ہے اس کا رنگ سُرخ مائل ہے اس میں غدود منفردہ (SECRETING GLANDS) ہیں اور اس میں نزدیک آنیوالی چیز کو جذب کرنے کی طاقت ہے۔ غدود کی بابت آئندہ بیان کیا جائے گا۔
 زبان۔ یہ عضلات کا بنا ہوا آلہ ہے۔ ذائقہ کا ذریعہ ہے۔ چلنے میں بھی یہ مدد کرتی ہے۔

لوزتان (TONSILS) ایک قسم کی گتیاں ہیں۔
 تالو (PALATE) یہ ہڈی اور لعاب دار جھلتی سے بنا ہے۔ اس سے ہضم ہونے کا فعل ہوتا ہے (اس کے پارے میں آئندہ بیان کیا جائے گا) زبان میں چند رگیں کانٹے دار (PAPILLAE) ہیں جن سے ذائقہ ملتا ہے۔
 دانت (TEETH) کی قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ دانت کی دو قطاریں ہوتی ہیں۔ بالائی اور زبریں۔

(INCISOR TEETH)

چار آگے کے دانت جن کو اسنان

(CANINE TEETH)

دو کچلیاں یا کیلے

(BICUSPID

TEETH)


چار دائرہ والی

(MOLAR TEETH)

چھ کچلی دار ہیں

تصویر نمبر ۱۲

تصویر نمبر ۱۲



منہ کا اندرونی حصہ، دانت، زبان

تالو اور حلق دکھایا گیا ہے

دانت کی دو قطاریں علیحدہ علیحدہ

جڑے کی ہڈی میں ہیں۔ جن پر یہ دانت


رہتے ہیں اس کو مسوڑھا کہتے ہیں۔ اس

میں بہت سے عروق و دمویہ آؤرا عصاب

رہتے ہیں۔ جو ان کے جڑ کے سوراخوں میں

رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دانت کا جو حصہ

تصویر نمبر ۱۳



دکھائی دیتا ہے۔ وہ سفید کڑا انامل
چڑھا رہتا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے
تو دوبارہ نہیں نکلتا۔ دانت کا وہ حصہ
جو مسوڑھوں میں رہتا ہے۔

دانت کی جڑ (FANG)

کہلاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو
دانت نہیں ہوتے۔ چھٹے ماہ سے دڑھ
بریں لگنا دودھ کے دانت نکل آتے ہیں
(اوپر سے نیچے) پہلے تین جوڑے
جو پچھلی دائرہ ہیں۔ بعد میں دوڑے
پچھلیاں اور آخر کے دوڑے (انسان۔
چھل بریں کی عمر ہوتے ہوئے یہ گر جاتے

ہیں۔ بعد کونے اور مستقل دانت (PERMANENT TEETH)
نکلتے ہیں۔ گنتی میں بیس ہوتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں گرتے ہیں۔
اور اگر دانتوں کی حفاظت کی جائے تو ضائع نہیں ہوتے۔

تصویر نمبر ۱۵



سر دندان (CROWN)

انامل یا جلد دندان (ENAMEL)

گہنی جو گودہ (PULP CAVITY)

گردن دندان (NECK OF THE TEETH)

رُہ دندان (TAG OR ROOT)

پردہ دندان (DENTINE)

سینٹ کا طریقہ (COATING OF CEMENT)

غذا کی نالی امری (ALSO PHAGUS OR GULLET)

یہ وہ نالی ہے جسکے ذریعے سے مہلک میں جاتی ہے۔ حسب قاعدہ یہ نالی معدہ کی طرف

ہمیشہ سکرٹا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے سر جھیکا کر کھانے سے بھی غذا آسانی سے معادہ میں پہنچ سکتی ہے۔ معدہ اور غذا کی نالی کے اتصال کو "قلم معدہ" یا کوڑی کا مقام (CARDIAL ORIFICE) کہتے ہیں۔ اصل میں غذا کی نالی جوف سینہ میں جا کر حجاب حاضرہ (DIAPHRAGM) کو چیرتی ہوئی معدہ میں پہنچتی ہے۔

معدہ (STOMACH OR VENTRICULUS) یہ ناشپاتی کی شکل کی کھوکھلی تھیلی کی طرح ہے۔ یہ بائیں جانب جوف شکم کے بالائی حصہ میں اور حجاب عاجز کے ٹھیک نیچے واقع ہے۔ اسی پر دل رہتا ہے

یہ منہ سے مری (غذا کی نالی) کے ذریعہ ملتی ہے۔ غذا کی نالی آنتوں تک نیچے چلی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں کونجیاں مری یا غذا کی نالی کے ساتھ قائم داخلہ (CARDIAC) کہتے ہیں۔ معدہ اور آنتوں کے اتصال کو بیرونی دروازہ کہتے ہیں

معدہ باہر کی طرف جس پتھر اور چھتی سے ڈھکا ہوا ہے اس کو باریطون

(PERITONEAL SEROUS COAT)

کہتے ہیں۔ درحقیقت یہ معدہ کا ایک ڈھکن ہے

درحقیقت یہ باریطون ایک چھتی ہے جس سے

طوبت تراوش پاتی ہے۔ جو شکم کی دیوار

(ABDOMINAL WALL) کے اندر رہتی ہے۔

باریطون سے اور بھی کئی طبقے ہیں جن کے

علیحدہ علیحدہ نام ہے۔

غذا کے کل راستے


(۱) اوپر کا جبر

(۲) نیچے کا جبر


(۳) زبان کی جڑ

(۵) غذا کی نالی

(۲۵) معدہ



- (۹) اس کا اندرونی حصہ
 (۲۱) صفرا کی تھیلی
 (۱۰) جگر کا دایاں و بائیں حصہ
 (۱۱) (۱۲) (۱۳) بارہ انگلی آنت
 (۱۴) قولون نازل
 (۱۵) چھوٹی آنتوں کا بیج
 (۱۶) اُغور
 (۱۷) قولون صاعد
 (۱۸) قولون معترض
 (۲۰) موٹی آنتوں کا طیرھا حصہ
 ان کے بیج میں جوت باریکوں پر ٹیوں کی طرح ہے۔
 تصویر نمبر ۱۶



(GALL BLADDER)

(BIB DUCT)

(PANCREATIC DUCT)

صفرا کی تھیلی

صفرا کی نالی

پنکریا کی نالی

(STOMACH) معدہ (INTESTINE) آنت

(GASTRIC GLANDS) غدد ہضمی یا غدد معدی

(GASTRIC CELLS) ذرات ہضمی

(CARDIAC AND OF THE STOMACH) شکم کی باڈی کھڑکی

(POLYPUS) قلم اسفل یا مسہ

(AESOPHAGUS) غذا کی نالی یا قری

(TUBULAR GLANDS OF THE LARGE INTESTINES, بڑی آنتوں کی چھوٹی گٹیاں

معدہ کی بازو انگشتی آنت اور صفرو کی قطعی کھلی ہے۔ اس میں جو دانہ دار جھد دکھائی دیتا ہے وہ غدد ہضمی ہیں۔ کھڑے کی شکل کا جو جھد ہے وہ رقیق سیال کو تراوش دینے والی گٹیاں ہیں۔

معدے کے تین خاص طبقے

(۱) بیرونی یا سب سے بالائی طبقہ (PERILOVEUM) جس کے ذریعہ شکم کی دیوار سے ملا رہتا ہے اور ملف کا دوران ٹھیک رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
(ب) درمیانی طبقہ (MIDDLE OR MUSCULAR COOT)

یہ عضلات سے بنا ہے۔ معدہ میں غذا جلتے ہی یہ سب عضلات یکے بعد دیگرے سکڑ کر لہروں کے اٹھنے کے باعث ہوتے ہیں۔ یعنی معدہ کو ایک طرف سے دوسری طرف برابر چلاتے اور ہلاتے ہیں۔ اس لئے غذا فوراً پاش پاش ہو جاتی ہے اور لٹی یا چٹنی کی شکل کی ہو جاتی ہے۔

(ج) اندرونی بلغمی طبقہ (MUCOUS COAT) یہ شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح ہے اس سے رطوبت نکلتی ہے۔ زیادہ رطوبت نکلنے کے لئے اس میں بلغمی جھلی کے بہت سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ یہ بلغمی جھلی خاص طرح کے ذرات یا سیلوں کے ایک ہی طبقہ سے بنی ہے۔ اس کے سیلوں میں کوئی عروق دمویہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی جڑ تک بہت سے عروق دمویہ جاتے ہیں۔ بلغمی جھلی کا

فعل رطوبت نکالنا ہے۔ وہ سیلیں جو اس طرح کی بنی ہیں کہ انی میں جب جو شش ہوتا ہے تو رطوبت تراوش پاتی ہے۔ ان کو غدود کہتے ہیں۔ غذا کے سلسلے میں اوپر بتایا جا چکا ہے کہ باہر کی چیزیں یا زہر وغیرہ جو جسم میں آجاتا ہے اسکو گھیر لیتی ہیں آگے نہیں بڑھنے نہیں دیتیں۔ یہ غدود دانہ دار ہوتے ہیں اور انکو غدود المفادہ کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ غدود ویسے نہیں ہیں۔ جیسا خیال کئے جاتے ہیں۔ بلکہ ان سے سیال چیزیں تراوش پاتی ہیں۔ اس لئے جو عضلات خاص قسم کی سیلیوں یعنی خدات سے بنتے ہیں اور جن میں سیال شے کے رواں کرنے کی طاقت ہے اس کو غدود کہتے ہیں۔ آنسو کے غدود سے آنسو بہتے ہیں۔ پسینہ کے غدود سے پسینہ نکلتا ہے۔ بقیہ المنی سے منی تراوش پاتی ہے اور اسی طرح دوسرے غدود بھی اپنا فعل کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ رطوبت لیجانو والی گلیاں خاکہ لعاب دار چھلی میں رہتی ہیں۔ اس لئے یہ سمجھ لینا بھی بالکل غلط نہ ہو گا کہ لعاب دار چھلی کا پورا حصہ رطوبت لے جانے والی گلیوں سے ہی پُر ہے حقیقت میں غدود سب جگہ پھیلے ہیں۔ لعاب دار اور دوسرے خاص خاص طبقے پر ادھر ادھر غدود ہیں۔ اور یہ ایک قسم کی خاص سیلوں سے بنی رہتی ہیں اور اپنی اصلی شکل میں غرق رہتی ہیں۔ غدود میں بہت عروق دمویہ، رگیں اور لطف ہوتے ہیں۔ رقیق سیال رواں کرنے والے ہر ایک غدود دھندلے سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور ان کے دھڑکنا۔ ٹالی، اور ٹھنڈ ہوتا ہے۔ لعاب دار چھلی یا طبقہ ایک ایسی لہر دار چیز ہے جس میں ایسے غدود رہتے ہیں جن سے شور چکنی اور لعاب دار رقیق سیال تراوش پاتی رہتی ہے۔

اب ہم پھر معدہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا اندرونی حصہ لعاب دار چھلی سے بھرا رہتا ہے۔ جب پیٹ خالی رہتا ہے تو اسکی رطوبت چھلی کی تہہ بندھ جاتی ہے۔

جب رطوبتی چھلی کا زیادہ حصہ معدہ کے اندرونی حصہ کو تر رکھنے کے لئے رطوبت کی روانی کرتا ہے۔ تو اس کے بہت حصوں میں رقیق سیال رواں کرنے والے غدود بھر جاتے ہیں۔ جن سے ہضم میں (پیٹ میں) اور بائیڈرو کلورک اسید کی روانی ہوتی ہے۔ ایسے غدود کو غدود ہضمی (پیلک گلینڈز) کہتے ہیں۔

اب خور کیجئے کہ ہاضمہ کا فعل کیسے ہوتا ہے۔ غذا فم معدہ (Cardiac ORIFICE) سے ہو کر معدہ میں جاتی ہے عضلات کے سکڑنے سے متھ جاتا ہے۔ (Muscular) اور ساتھ ہی ساتھ رطوبتی غدود (Orifices of Glands) کے منہ سے رطوبت معدی (Gastric Juice) نکل کر اس کو تر کرتی ہے۔ اس لئے غذا جو کھائی جاتی ہے آہستہ آہستہ دباؤ کی وجہ سے پس جاتی ہے اور پانی کے مانند پتلی ہو جاتی ہے۔ اور باقی حصہ مٹریا کالی کی طرح ہو جاتا ہے اس پتلی شے کو معدہ کے دوسرے طبقہ کی باریک باریک عروق دمو یہ کو جذب کر کے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ باقی حصہ کالی کی طرح جس کو کیموس (chyme) کہتے ہیں وہ جاتا ہے اُس کو اور بھی رقیق بنانے کے لئے تاکڑوں میں مل جانے کے قابل ہو جائے۔ معدہ کے فم اسفل کے راستے آنتوں میں پہنچاتی ہیں۔ اس معدہ کے قسم اسفل پر ایک سخت عضلہ کا کوڑا رہتا ہے جس کو عضلہ عامصر (Sphincter) کہتے ہیں۔

آنت (Intestines) آنت یا رودہ (Intestines) کے زیرین حصہ میں رہتی ہے۔ یہ پیچ در پیچ لی ہیں۔ ان نلوں نے پیچیدار ہونے کی وجہ سے جوف شکم کا بہت سا حصہ گھیر رکھا ہے۔ جو ان آدمیوں کی آنت تقریباً ۱۱ ہاتھ لمبی ہوتی ہے۔ آنت کے دو حصے ہیں۔

(۱) بڑی آنت (Large Intestine) (۲) چھوٹی آنت (Small Intestine) یہ لمبائی میں تقریباً ۱۱ ہاتھ یا ۲۰ فٹ ہوتی ہے۔


۱۔ بڑی آنت (Large Intestine) بڑی آنت شکم کے دائیں زیرین حصہ سے شروع ہوتی ہے۔ جس کو حقہ کوٹھے کی ہڈی (Iliac

region) کہتے ہیں اور اسی سے اُغور کالی آنت (Intestinal caecum) لی ہے۔ رودہ رقیق (پیچیدار آنت) کا منہ اخور (Ileum) میں کھلتا ہے اور اس جگہ پر ایک کوڑا رہتا ہے جسکو (Colon Valve) کہتے ہیں۔

بڑی آنت تین حصوں میں منقسم ہے تو ہون صاعد (Ascending Colon) - اُتر کے اندر سے گزر کر اوپر جاتی ہے۔ دایاں سے ہو کر گھومتی ہے۔ اس کو

قولون متعرج (TRANSVERSE) کہتے ہیں۔ اس طرح یہ بالائی شکم کے زیریں حصہ سے گزرتی ہوئی خطہ طحال میں پہنچتی ہے۔ یہاں سے یہ نیچے جھکتی ہے۔ اور وہاں سے قولون نازل (DESCENDING COLON) کہلاتی ہے۔ اس کا سب سے زریں حصہ ترتیب وار قولون حرقی (PELVIC COLON) اور قولون عالی (ILIAC COLON) کہلاتا ہے۔ جس جگہ بڑی آنت جھکتی ہے اس کو تعارج کہتے ہیں۔ اس کا کٹرے کٹرے کی شکل کا کرم نما زائیدہ یا متعلقہ دودھ (VERMIFORM APPENDIX) تقریباً ۱۳ اینچ لمبا اور آعور یا کائی آنت (Cecum) میں کھلتا ہے۔ یہ یزدنی ہے جس کا فعل اب تک معلوم نہیں ہوا۔

چھوٹی آنتوں سے بڑی آنتوں کا فرق مندرجہ ذیل باتوں سے معلوم ہوتا ہے
 ۱۔ اس میں بڑی آنتوں کے بیرونی طبقہ پر فیصلی کی طرح چربی کا حصہ بالائی طبقہ سے پیدا ہوتا ہے۔ (ب) اس کے بیرونی طبقہ پر درمیان میں نیتے کی طرح ایک بندھن ہوتا ہے (ج) اس میں فیصلی کی طرح طبقہ ہوتے ہیں (د) اس میں دلی اور غشاء صحافات جو چھوٹی آنت میں ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتیں۔ اس کے ساخت کے بارے میں اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ بیرونی بالائی طبقہ درمیانی عضلہ کا طبقہ اور درطوبتی غدود اندرونی طبقہ، بلغمی اس میں رہتے ہیں۔



آغور یا کافی آنت کیڑے کی شکل کا کرم نمازائدہ اور فولون صاعدہ کا آغاز
 قولون صاعد (Ascending colon) عور (Cecum)
 رودہ رفیق (Ileum)

چھوٹی آنت (Small Intestines) چھوٹی آنت کی لمبائی ۲۰ فٹ
 ہے۔ غذا جو معدہ میں ماتی ہے۔ اس کا غیر منہضم حصہ اس چھوٹی آنت میں داخل
 ہوتا ہے۔ اس کے بھی چار طبقے ہیں ہضم ہونے کے وقت اس آنت میں صفرا کی
 تھیلی سے بذریعہ ایک نل کے صفرا (Bile) اور بلبلہ (Pancreas)

یا نالی سے بذریعہ ایک نل کے رطوبت بلبلہ (Pancreatic Juice)
 اگر نل جاتے ہیں اس آنت سے بھی ایک قسم کی رطوبت نکلتی ہے اس کو افراز یا فتنی
 (Intestinal Juice or Internal secretion)

کہتے ہیں معدہ سے غیر منہضم آنتوں میں آنے کے بعد ان تینوں رطوبتوں میں پساکرنا ہے۔
 اس طرح غذا کا جو ہر ہضم ہو کر خون جاتا ہے اور فضلہ پیچ در پیچ آنت میں
 گھومنا ہوا براز (Stool) کی شکل میں نیچے آجاتا ہے۔

جگر (Liver) انسان کے جسم میں جگر سب سے بڑا غدہ ہے۔ اس کی
 وزن تقریباً پچاس آونس ہے۔ یہ جوت کے دائیں طرف یا الائی حصہ میں ٹھیک
 حجاب حاجز (Diaphragm) کے نیچے ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ دایاں
 حصہ دایاں فص یا دایاں توٹھڑا (Right Lobe) اور بایاں حصہ، بایاں
 فص یا بایاں توٹھڑا (Left Lobe) جس میں دایاں حصہ خاص طور سے بڑا
 ہے۔ شریان الکبد (Hepatic Artery) اور ورید البساب (Portal Vein)
 جگر میں خون پہونچاتے ہیں۔

ورید الکبد اس کو وہاں سے نکالتی ہے۔ (Hepatic Veins)

جگر کے متعلق دو چیزیں غور کرنے کی ہیں (Gall Bladder)

صفرا کی تھیلی (۲) ورید البساب :- پہلے ورید البساب کے بارہ میں بیان
 کیا جائے گا۔ بلبلہ کی نالی طحال معدہ اور چھوٹی آنت کی وریدوں سے ورید البساب
 بنتا ہے۔ یہ دو شاخوں میں جگر میں داخل ہوتا ہے ہر ایک شاخ جگر کے ایک ایک

حقہ میں جاتی ہے۔ جگر کے اندر جاکر یہ عروق شریہ اور جگر کے شریان میں ختم ہو جاتی ہے
جگر کی ورید انھیں عروق شریہ سے شروع ہوتی ہے اور اوج نازل
(Inferior vena cava) میں خون لے جاتی ہے۔

صفرا کی تھیلی یا پتہ :- پتہ ناشپاتی کے شکل کی ایک گھوکھلی تھیلی ہے یہ جگر کے
سطح پر رہتی ہے۔ جس کے اندر اس کا ٹرا آخری سر اچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے اس کے
بالائی یا حصے یا گلے سے یا بحری المرارہ (cystic duct) بنتی ہے جو درمیانی
حصہ اور پیچھے کی طرف سے ہو کر جگر کی نالی میں مل جاتی ہے اور اس طرح صفرا
کی نالی (Bile duct or ductus choleduchus) بنتی ہے۔
لبلیہ :- (Pancreas) یہ بھی ایک بڑا غددہ ہے۔ لیکن جگر سے
چھوٹا ہے۔ بیلحال کے پائیں رہتا ہے۔ اس کے سر، گردن، دھڑ اور دم رہتی
ہے۔ اس میں رطوبت لیا (Pancreatic juice) رہتی ہے جو لبلیہ (Pancreas)
سے نکل کر آنت میں جاتی ہے۔

نظام تنفسی

(RESPIRATORY SYSTEM)


اس میں ناک (NOSE) ملق (Pharynx) قصبہ الرئیہ یا ہوا کی
نالی (Wind Pipe) پیپٹرا (Lungs) حجاب حاجز
(Diaphragm) ہیں۔
ناک (Nose) یہ ایک جوف ہے جس کے اندر اور باہر دو دروازے
ہیں۔ اس میں دو جوف ہوتے ہیں۔ اور دو سوراخ سامنے کی طرف۔ ایک دائیں اور
ایک بائیں طرف ہے۔ ان کو ناک کا سوراخ کہتے ہیں۔ اور ان دونوں جوف کے درمیان
ایک دیوار ہوتی ہے اس کو حاجز اور دیوار فاصل (Septum)
کہتے ہیں یہ ناک کی درمیانی دیوار فاصل کچھ ہڈی اور کچھ کڑی سے بنی ہوئی اس
پر دے کے دونوں جانب ناک کے جوف ہیں۔ اور اس کے درمیانی حقہ میں پسینا
پیچیدار ہڈیاں (Anterior turbinated Bones) ہیں

ناک کے جوف پر عابدہ چھٹی چڑھی ہے، اور ہر ایک جوف کی بیرونی دیوار کے اوپر کے جڑے (superior maxillary) کے سوراخ سے ملتی ہے۔ اسی کو اوپر کے جڑے کی ہڈی کہتے ہیں۔ بالائی حصہ میں جہاں ناک کے دونوں پچھلے سوراخ کھلے ہیں۔ وہ منہ کا پچھلا حصہ ملتی ہے۔ پچھلے سوراخ کو سوراخ بینی (Posterior nares) کہتے ہیں۔

حلق :- (Pharynx) یہ وہ جوف ہے جو جوف دہن اور ناک کا آخری حصہ بناتا ہے۔ اور ان سے بالکل ملا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسب ذیل ضروری ساخت ملتی ہے۔

سامنے کی طرف اور بالائی حصہ کے دونوں جوف ناک پیچھے کی طرف۔ دونوں قنات اور ستاکیوس۔ درمیان آگے۔ منہ۔

نیچے کی طرف :- قصبۃ الثریہ یا ہوا کی نالی سامنے اور مری پیچھے کی طرف ہے۔
تصویر نمبر ۸



اس میں منہ اور جوف

بینی نصف کرہ کی شکل میں دکھائے گئے ہیں۔

(۱) کھوپڑی کے تکیے کی ہڈی

(Sphenoid bone)

(۲) قنات اور ستاکیوس

(Eustachian tube)

(۳) نرم نالو Soft palate

(۴) کوا Uvula

(۵) حلق Pharynx

(۶) ناک کا راستہ

(Nasal Passage)

(TONGUE)	(۱) زبان	(UPPER GAW)	(۲) اوپر کا جڑا
(EPIGLOTTIS)	(۱۱) خنجرہ کی پان نما کری	(LOWER GAW)	(۳) نیچے کا جڑا
(LARYNX)	خرخرہ یا خنجرہ	(HARD PALATE)	(۹) سخت تالو
	الائی حصہ حلقوم بینی۔ درمیانی حصہ حلقوم	(PHARYNX)	حلق
	اور نیچے کا حصہ خرخرہ یہ متعلق حلق میں۔	(ORAL PHARYNX)	دہن
	تصویر نمبر ۱۹		


ناک کا سوراخ دکھائی دیتا ہے۔

۱۸۔ بالائی نرم تالو۔ ۱۹۔ ہڈی کا بنا ہوا تالو
کا محراب۔ ۱۔ ۹۔ ۴۔ پیچیدار ہڈیاں
۱۲۔ بالائی جڑہ کی ہڈی۔ دیکھو
جوف بینی کس طرح اوپر کے جڑہ کی ہڈی
سے مل گیا ہے۔



خرخرہ (LARYNX) یہ آواز نکالنے کا آلہ ہے۔ یہ اُسی
جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں حلق کا خاتمہ ہے۔ یعنی زبان کے پچھلے حصہ سے۔ اس میں
بہت سی گریاں ہیں (۱) زرخندان کی بالائی گری۔ یہ ایک مربع شکل کی گری ہے۔ ایک
ایک دونوں طرف اور ناک کے سامنے والے حصہ میں ہے۔ وہاں یہ سب وقتی
(PGNUM ADAMI) بناتی ہے۔ اس کے اندر وتران الصوتیان
(۲) خضروف خاتمہ (CRICOID)
(۳) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۴) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۵) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۶) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۷) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۸) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۹) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۰) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۱) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۲) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۳) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۴) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۵) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۶) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۷) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۸) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)
(۱۹) خضروف خاتمہ کے بالائی کنارہ پر طر جہانی (CRICOID CARTILAGE)

تصویر نمبر ۲۰




اس میں آواز کا آلہ یعنی نرخرہ، پھیپھڑے، دل، معدہ، شکم میں دائیں طرف جگر، بائیں طرف طحال، گردہ، آنتیں، مثانہ و غیرہ دکھایا گیا ہے۔
کل نرخرہ پر ایک لمبا بدار جھلی پڑھی ہوئی ہے۔ اُس سے اوپر کی طرف ملقوم اور نیچے کی طرف ہوا کی نالی ملتی ہے۔

قصبۃ الریہ ہوا کی نالی (Trachea) اور شجقین (Branchi)
اس کا وجود غشوف خاتمہ کے کنارے کے حصے سے ہوتا ہے۔ گلے کے نیچے ہوا کی

کی نالی (WIND PIPE) میں جو سینہ آکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔
 انھیں کو شعبتیں یا ہوا کی نالی کہتے ہیں۔ یہ شعبتیں (دونوں ہوا کی نالیاں) لطیف
 سے لطیف شکل میں بیشمار شاخوں میں تقسیم ہو کر پھیپھڑے میں پھیل گئے ہیں۔
 ان چھوٹی شاخوں کو عروق خشک (BRONCHIAL TUBE) کہتے ہیں۔ ہر ایک
 عروق خشک کے کنارے انگوڑے کے خوشہ کی طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں
 انھیں جو ف پھیپھڑا (LUNG SACS یا AIR SACS) کہتے ہیں اور ان میں
 ہمیشہ ہوا بھری رہتی ہے۔

تصویر نمبر ۲۱



ہوا کی نالی (WIND PIPE) شعبتیں (BRONCHI) عروق

خشک (BRONCHIAL TUBES) جو سینہ (THORAX) ہے
 سینہ کے اندر کا جو ف ہے۔ یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ اس میں دل اور پھیپھڑے
 ہیں۔ ہر ایک پھیپھڑے پر ایک بہت نرم طبقہ ہوتا ہے۔ جس کو غشاء الصدر
 سینہ کی پھلی (PLEURA) کہتے ہیں۔

پھیپھڑا (LUNGS) اس میں بہت نرم سوراخ ہوتے ہیں۔
 اور سکڑنا اور پھیلنا ہے۔ اس کی شکل مندر کے گند کی طرح ہے جس کا نوک اندر

گردن کی طرف ہوتا ہے اور ان کا زیرین کھوکھلا حصہ جوف سینہ میں ہوتا ہے پھیپڑے
دو ہوتے ہیں۔ یہ جوف سینہ دل کے دونوں طرف رہتے ہیں اور دل کے دائیں طرف
کا دایاں پھیپڑا (RIGHT LUNG) اور بائیں طرف کا بایاں

پھیپڑا (LEFT LUNG) کہلاتا ہے۔ ان کا رنگ کچھ ٹیلا ہوتا ہے یہ اسخ
کی طرح سکڑے ہوتے ہیں۔ یہ نرم اور ہلکے ہوتے ہیں۔ دائیں پھیپڑے میں تین اور
بائیں پھیپڑے میں دو ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو فصوں (LOBES)

کہتے ہیں۔ ہر ایک فص اور بھی بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہے۔ یہ
دونوں ٹکڑے جھلی سے علیحدہ رہتے ہیں۔ دونوں پھیپڑے بکر سینہ کا گہرے
زیادہ ہی حصہ پھیر لیتے ہیں۔ دونوں پھیپڑوں میں بے شمار ہوا کے خانے

(AIR CELLS) عروق خشک (BRONCHIAL TUBES) وریڈیں شریانی


اور عروق شریانی بھرے رہتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے لطیف آلات سے بنے ہیں۔ ہوا
کے خانوں کی وجہ سے ہی یہ انگور کے خوشہ کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اور انھیں

خانوں میں ہوا بھرتی رہتی ہے۔ دل سے شریان الریه (PULMONARY)

(ARTERY) اس جگہ آتی ہے۔ بے شمار عروق شریانی یہ ہوا کے خانوں کے

گرد لگے رہتے ہیں۔ اس کے دوسرے کنارے وریڈالت کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔

تصویر نمبر ۲۲



خوشہ جوف پھیپڑا (LUNG SACS)

حجاب عاجز

(DIAPHRAGM)

عقلہ ہے۔ یہ جوف سینہ اور شکم کو جدا کرتا ہے۔ اسلئے اس کا نام حجاب عاجز ہے۔ سامنے کے حصے میں یہ زائد ہنجرے (XIPHOID APPENDIX) کے کچھلے حصے سے اور اندرونی طبقے پر نیچے کی چوٹی نرم کر یوں سے ملا ہے۔ اسی کے سہارے یہ پھیپڑا اور دل قائم ہے اور پیٹ میں اس عضلہ کے نیچے ہے۔ بائیں طرف طحال اور معدہ اور دائیں طرف جگر ہے، اس کے دو ستون سے مثانہ کو سہارا ملتا ہے۔ اسی کے اندر سے ہو کر جوف سینہ سے ترخہ اور شہرہ رگ داخل ہوتے ہیں۔ شکم سے جوف سینہ میں اجوف نازل اور سینہ کی مالی اور مختلف رگیں اور عروق دموئے سب داخل ہوئی ہیں۔

تصویر نمبر ۳۳




جوف شکم، اور جوف سینہ کو جدا کرتا ہوا حجاب عاجز دکھلائی دیتا ہے۔ اور درمیان میں دل اور پھیپڑا ہر ایک طرف ہے۔ نیچے بائیں طرف شکم، اور دائیں طرف جگر ہے۔ طحال معدہ میں چھپی ہے۔

(URINARY ORGANS)

نظام بول

بول یا پیشاب ایک قسم کی رقیق سیال ہے جس میں خون سے علیحدہ کیا
 ہوا کثیف مادہ رہتا ہے۔ یہ دو غدد کا فعل جن کو گُرْدہ
 کہتے ہیں۔

تصویر نمبر ۲۴



مثانہ کا ٹکا حصہ کپڑے کی شکل کا پیشاب پیدا کرنے والا اور نکالنے والا حصہ
 ہے۔ یہ اُسی طرح دکھایا گیا ہے۔ میا قدرتی حالت میں ہوتا ہے۔ بائیں مثانہ کا ایک
 خوشہ عروق دموئیہ (GLOMERULES) بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے۔
 جس مقام پر پسلیاں ہوتی ہیں اُسی جگہ کے خط میں دونوں طرف گُرْدے

رہتے ہیں۔ گردہ کی شکل گھٹلی کے مانند ہے۔ اور وہ ایک غلاف میں مدفون رہتا ہے۔ اس سے دونوں طرف سے ایک ایک تلی نکلتی ہے۔ جس کو طالب پیشاب کی نالی (URETER) کہتے ہیں۔ یہ پیشاب کے تیار ہوتے ہی اُسے مثانہ (URI NARY BLADDER) میں بہو بچا دیتا ہے۔ اگر مثانہ یا گردہ کا ٹڈالا جائے تو اس کا بیرونی حصہ دانہ دار دکھائی دیتا ہے اور اس کے اندرونی حصہ میں چھوٹی چھوٹی نالیوں کے نشانات ہیں۔ اور نوک دار ستون کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ جسکو مینارہ گردہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک قسم کا مادہ رہتا ہے جو لوں کو خون سے علیحدہ کرتا ہے۔ گردہ میں بہت سے قسم کی عروق دمویہ رہتی ہیں۔ مگر خون کا خاص حصہ پیشاب نکالنے کے لئے اندر جاسکے۔

حالب :- (گردہ اور مثانہ کے درمیان کی نالی (ureter) یہ ایک چھوٹی تلی ہے۔ جس کی حالت کڑے کی طرح ہے۔ یہ مثانہ سے برف مثانہ تک ہوتی ہے۔ مثانہ :- مثانہ کیسے نہ عضلی طبقات سے بنا ہے۔ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ یہ پیرو کے دونوں بڑیوں کے اتھالی خطہ کی طرف رہتا ہے۔ جب پیشاب سے بھرا رہتا ہے تو اس میں ابھار ہوتا ہے۔ مردوں میں یہ سیدھی آنت کے سامنے۔ مگر عورتوں میں رحم اور اندام نہانی کے سامنے والے حصہ میں رہتا ہے۔ اس راستہ کو جس سے پیشاب باہر نکلتا ہے۔ مجری البول (پیشاب کی نالی) (URETHRA) کہتے ہیں۔ عورتوں میں پیشاب کا راستہ صرف اپنا اپنا لبا اور سیدھا رہتا ہے۔ اور صرف پیشاب نکالنے کے کام آتا ہے۔

مردوں میں یہ راستہ ۹ انچ لمبا ہوتا ہے۔ اور اس میں دو جھکاؤ یا گھماؤ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس سے پیشاب اور مباشرت کے دفعت منی نکلنے کے دونوں کام ہوتے ہیں۔

پیشاب ہمیشہ گردہ سے نکل کر مثانہ میں جمع ہوتا ہے۔

گردہ (K. KIDNEY)

حالب :- (پیشاب اور گردہ کے درمیان کی نالی -)

(UR-ETER)

مشانہ (Bl. Bladoie)

۲۔ دہانہ (Opening of urethra)

۱۔ غالب کا مثانہ میں کھلنا (Opening of ureter in bladder)

جو بیس گھٹنوں میں تندست جسم سے
کم از کم اسیر پیشاب نکلا کرتا ہے۔ قدرتی
پیشاب کا رنگ پانی کی طرح کبھی کبھی پیلا
ہی لے ہوتا ہے۔

تصویر نمبر ۲۵



نظام آلات تناسل

ذکورہ:- مردوں میں آکر تناسل کے ذریعہ سے ہی اولاد پیدا کرنے کا کام
ہوا کرتا ہے۔ اس کے لئے ذکر یا قصب (PENIS) ہے، قصب کو چار
جھٹوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔


(۱) بیخ ذکر یا قصب (ROOT) (۲) دھڑ ذکر (BODY) (۳) گردن
قصب (NECK CERVIX) (۴) حشفہ سپاری (GLANS PENIS)
تین بے نلوں سے قصب بنا ہے۔ اس دونوں بے نلوں طرف ہیں۔ ان دونوں کو
جسم اجوف (پولا اجوف) (CORPORA COVERNOSA) کہتے ہیں۔

تیسرا نل متذکرہ بالا دونوں نلوں کے درمیان ادھینچے کی طرح ہے۔ اس نل کا نام
درمیانی جسم اجوف (CORPUS SPONGIOSITM) ہے پیشاب کی نلی کا
زیادہ حصہ اسی میں چھپا ہے۔ یہ تینوں ہی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک
ٹھیکیلے جالدار غلاف میں ملفوف ہیں۔ اور پور قصب عجان (سیون) کا مقام
سے کرباط کے ذریعہ جڑا ہوا ہے۔ قصب کا نوکدار اگلا حصہ حشفہ سپاری (GLANS)
(PENS) کہلاتا ہے۔ اس کا دھڑ (CORPUS) اور درمیان کا
اجوف کی طرح اس کو گردن قصب (NECK OR CERVIX)

کہتے ہیں۔ نیچے سے لیسکرتینوں تلوں کے لئے ملنے کے مقام تک کو دھڑ قفسیب (BODY) کہتے ہیں۔ اور مشانہ میں جالدار رباط کے ذریعہ پیڑو کی ہڈی (SYMPH) اور ارتفاق العانی (ISCHIO PUBIC RAMI) میں ملا ہوا حصہ بیخ قفسیب (ROOT) کہلاتا ہے

قفسیب کی جلد ڈھیلی رہتی ہے۔ اس پر بال نہیں ہوتے اور جو کھال خشقہ تک جاتی ہے اس کو کلفہ یا گھونٹ (PREPUCE) کہتے ہیں۔

تنبہ ۳۶



۱۔ مرد کے آئہ تناسل کا سیدھا کاٹ۔

۲۔ عجز چوڑ کی ہڈی۔

۳۔ مشانہ۔

درمیانی جسم اجوف اور دونوں کنارے کے جسم اجوف برابر پھیپے کی طرف
عجان (PERINEUM) یا اس مثلث نما مقام تک چلے گئے ہیں جو مسانے
کی طرف فوطہ اور پھیپے مقعد کے درمیانی حصہ میں ہے۔ درمیانی جسم اجوف
کے ذریعہ مقعد کے پاس ایک طویل سرا بنتا ہے۔ اور یہاں سے یہ غدہ ندی
کے ذریعہ مشانہ میں چلا جاتا ہے

مردوں کے آئہ تناسل کا ایک اور بیرونی حصہ جوف فوطہ

کہلاتا ہے۔ یہ کیسہ نما ہے۔ جس میں دائیں اور بائیں خصیہ ہیں جو جبل منوی یعنی منی
دوری کے سہارے جوف فوطہ میں رہتے ہیں۔
آئہ تناسل کے متعلق اندرونی عضو مندرجہ ذیل ہیں۔

غدی ندی (PROSTATE GLAND) خیسے (Testicles)
منی کی نالی (SPERMATIC CORD) خصیہ فوقانی (EPIDIDYMIS)
(BALAN) اور قنات منوی (منی کی نلی) (SEMINAL TUBES) ان سب کے
بارے میں مختصراً آگے ذکر ہوگا۔


قصبہ میں ۳ غدود ہیں۔ ایک سے قصبہ مثانہ کی گردن گھری ہوئی ہے
یہ بادام نما ہے۔ اس کا غدہ ندی (PROSTATE GLAND)

ہے۔ اس کے تین حصہ ہیں۔ اور اس کا سرا ٹھیک سامنے ہے۔ دونوں حصے ایک
گرہ کی طرح آکر ہیں۔ یہ جبل منوی کے سہارے جوف فوطہ میں قائم ہیں۔ یہ جیل
منوی ان کے پچھلے کنارہ سے لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک خصیہ کا (۱) دھڑ ہوتا ہے جو اگلا حصہ
ہے اور (۲) خصیہ فوقانی (بالائی) جو پیچھے کی طرف ہے۔ کاٹنے پر ہر ایک خصیہ دو طیسقوں
میں دکھائی پڑتا ہے۔ اس میں بہت سی منی کی خفیلیاں اور نالیاں ہیں۔

خصیہ فوقانی :- یعنی بالائی خصیہ ایک لمبی تیلی چیز ہے جس میں راس البرنج
(خصیہ فوقانی کا پچھلا سرا) (GLOBUS MAJOR) ذب البرنج (خصیہ فوقانی کا
پچھلا سرا) (GLOBUS MINOR) اور بدن ہے۔

بالائی حصہ کے درمیان رحم (U) کھلا ہوا ہے۔ رحم کے دو بالائی کونوں سے
دونوں بوتان (رحم کے دونوں طرف دو جھال دار غشائی نالی ہیں جو خصیۃ الدم سے
اتصال رکھتی ہیں) نکلتے ہیں اور (O) غدود رحم کے نیچے سے ہوتے ہیں۔ رحم کے نیچے
لیکن اُس سے ملا ہوا دھانہ فرج ہے (V) جو کھلا ہوا ہے۔ فوطہ سے اس میں
ایک جیل منوی (منی کی نالی) داخل ہوگئی ہے۔

دُعا ر نافل (خصیہ کی نالی جس کے ذریعہ کیستہ المنی (VASCAL FERNS)
میں جاتی ہے۔ یہ ایک نلی ہے۔ جو خصیہ فوقانی کے نیچے جلتے حصہ سے ہے اور
جیل منوی کے ساتھ ہی ساتھ مثانہ کے نیچے کے حصہ تک جاتی ہے۔



یہاں اس میں گڑھے سے بنے ہیں اور آگے بڑھ کر کیستہ المنی (VESICULE -

SEMINALES) سے مل کر منی نکالنے والی دونوں نالیوں

(COMMON EJACULATORY DUCT) بنادیتی ہیں۔ جل منوی میں دعار

ناقلی شریان اور دعار ناقل، اور جمل منوی کی رگیں رہتی ہیں۔

کیستہ المنی (VESICULUR SEMINALES) دو سکڑے ہوئے

گڑھے ہیں۔ جو شانہ کی تلی میں رہتے ہیں۔ دو غدہ ندی میں داخل ہوتے

ہیں۔ جو کہ درمیانی حصہ میں واقع ہیں۔

آلہ تناسل اناث:- عورتوں کے آلہ تناسل کے تین حصے ہیں۔

۱۰

جیسے بیرونی حصہ فرج - اندرونی حصہ فرج اور پستان۔

(۱) بیرونی فرج میں مسئلہ رجبہ ذیل آلات ہیں۔


(۲) رکب (MONS VERNIS) جو بیوں کے سامنے ایک قسم کا

بالوں سے بھرا مقام ہے۔

(ب) شفران کبیر (فرج کے دونوں بیرونی لب یا کنارے (LABIA - MAJORA) یا ہونٹ کی طرح کا آلہ ہے نرم ابھرے ہوئے مثلث نما دو کھال رکب کے دونوں طرف سے مقعد کے سامنے کے حصہ (PERENIEUM) تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو شفران کبیر کہتے ہیں۔

(ج) ان دونوں لبوں کا رکب سے اتصالی مقام یعنی جس جگہ دونوں مل گئے ہیں۔ مقدم بطن (ANTERIOR COMMISSURE) کہلاتا ہے۔ اور مقعد


تصویر نمبر ۲۸



سے ایک اینچ اوپر ہٹ کر جس جگہ یہ ملے ہیں اس کو مؤخر بطن۔ (POSTERIOR-COMMISSURE) کہتے ہیں۔ مقدم بطن میں ایک اُٹھی سی پھوٹی جگہ ہے۔ جس کو قید فرجی، فرج کے اندر ایک ہلالی چھٹ جو پہلی ولادت میں پھٹ جاتی ہے۔ (FOURchette) کہتے ہیں۔

(۲) رکب (MONS VERNIS) (۳) غلات بطارہ (فرج کا مدد مہانی گوشت جو بعض ممالک میں خستہ کے وقت کاٹا جاتا ہے۔ (COVERING OF CLITORIS) - (۴) بطارہ (CLITORIS) (اشفران صغیران) (فرج کے اندر فنی دونوں چھوٹے لب یا کنارے (LABIA MINORA) (۲) اشفران کبیران فرج کے دونوں بڑے لب یا بیرونی کنارے۔ (LABIA MAJORA) (۵) پردہ بکارت (HYMEN) (۱۰) قید فرجی (FOUR CHETTE) (۱۶) دہانہ مجری (OPENING OF URETHA) (۶) سوراخ فرج

تصویر نمبر ۲۹



(ORIFICE VAGINA) مقعد (ANNS) (۳) مقعد کا بالائی
 حصہ (RECTUM) (۸) شفران صغیران (LABIA MAJORA)
 (۹) شفران کبیر (LABIA MINORA) (۲) رحم (UTERUS) (۱۴) کمر
 کے ہبرے (LUMBER VERTEBRA) دھجی (COCCYX)
 (۶) ہبرے ہائے عجز (VERTEBRA OF SACRUM) مقعد اور رحم کی
 درمیانی نالی (RETRO UTERINE EXCAVATION)
 (۱) (C) رحم (VAGINA) گردن رحم (CERVIX OF THE
 (UTERUS - قعر رحم کی گہرائی) (FUNDUS OF THE UTERUS)
 (۱۸) مجری الرحم مشانہ (UTERINE VEBICAL EXCAVATION)
 (۱۳) شفران صغیران (LIBIA MINORA) دونوں شفران کبیران
 کے اندر دو لعاب دار جھلیوں سے لپٹی ہوئی کھالیں ہیں۔ انہیں کانام شفران
 صغیران (LABIA MINORA OF NYMPH) ہے پیچھے کی طرف یہ
 دونوں شفران کبیران سے مل گئے ہیں۔

(۳) بظارہ (CLITORIS) یہ سوجھ انتصابی (تن جلنے کے لائق
 ساخت (ERECTILE TISSENES) سے بنا ہے۔ اور الاپچی نما ایک آلہ ہے
 یہ دونوں شفران کبیران کے بالائی بطن کے زیرین مقام میں ہے۔
 (۴) مجری بول اناث (URETHRA) یہ قریب ۱۱ اینچ لمبی
 نلی ہے۔ عورتوں کے مجری بول کا دھانہ۔ دونوں شفران کے درمیان اور بظارہ
 کے ایک اینچ نیچے رہتا ہے۔

(ط) دھانہ فرج (ORIFICE OF VAGINA) مجری بول کے نیچے
 کے حصہ میں دھانہ فرج شروع ہوتا ہے۔ یہ ۵-۶ اینچ لمبا ہوتا ہے
 اور نیچے کا حصہ لعاب دار جھلی سے ڈھکا رہتا ہے۔ اسی کا نام پردہ
 بکارت۔ یا کنوار پن کا پردہ (HYMEN) ہے۔

(۲) اندرونی فرج۔ اس میں (۱) فرج (VAGINA) (ب) رحم
 (UTERUS) (ج) خیمۃ الرحم (ORCARIES) کہتے ہیں۔

(۱) فرج: یہ ایک نلی ہے۔ رحم سے نکل کر جوفِ مشانہ کے اندر ہوتی ہوئی دونوں شفرانِ کبیر میں کھل گئی ہے۔ اس کے سامنے کے حصہ میں مشانہ، اور پچھلے حصہ میں مقعد ہے۔ اس کی لمبائی عموماً ۵-۶-۷ اینچ ہوتی ہے۔ اندرونی حصہ لعاب دار چھلتی سے ڈھکا رہتا ہے۔

رحم (UTERUS) اس کی شکل ناشپاتی یا امرود کی طرح ہے جس کا منہ بچے کی طرف ہے۔ یہ ایک پھیلی ہے۔ جس کا اندرونی حصہ کھوکھلا رہتا ہے لمبائی ۳-۴ اینچ چوڑائی ۲ اینچ اور موٹائی ایک اینچ ہوتی ہے۔ جوفِ مشانہ میں فرج سے لگی ہوئی ہے۔ رحم کا اندرونی حصہ مثلث نما ہوتا ہے اسے رحم یا تجیہ دانی کہتے ہیں۔ اس میں پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے اور جنین کے بڑے ہونے کے ساتھ ہی ساتھ پھیلا جاتا ہے۔ یہ عضلات سے بنا ہے۔ اس میں تین طبقے ہوتے ہیں اور چھلتی جس سے رطوبت تر اوش پاتی ہے۔ دوسرا عضلہ ہے (۳) لعاب دار چھلتی سے اس کے بالائی حصہ کو قعر رحم (FUNDUS) درمیانی حصہ کو اُس کا دھڑ اور جہاں گول شکل میں ختم ہوتا ہے اس کو گردن (NECK OR CERVIX) کہتے ہیں۔

گردن کے سامنے غصہ کو جس میں سوراخ بھی شامل ہے۔ دبانہ رحم خارجی (AS-UTER EXTERNUM) کہتے ہیں۔ رحم ایک پردہ کی شکل کی بندھنی سے بندھلے۔ اس کو رباط عرضی (BROAD LIGAMENT) کہتے ہیں۔

اس کے علاوہ گول بندھن (ROUND LIGAMENT) جو دو ڈوریوں کی طرح جوڑی بندھنوں کے بیچ میں ہے اور سیدھا (اکٹی ٹی کیل) تک جاکر شفرانِ کبیر ان میں مل جاتا ہے۔

یوتقان: یہ بھی دو ہیں۔ رحم کے دونوں طرف دو جھال دار غشائی نالیاں جو کہ خفیہ الرحم سے تعلق رکھتی ہیں (FALLOPIAN TUBES) دونوں

رحم کے بالائی حصہ میں دونوں طرف کے خفیہ الرحم تک پھیلے ہوئے ہیں۔

اُن کی لمبائی عموماً ۴ اینچ رہتی ہے ان کا ایک سر رحم میں اور دوسرا خفیہ الرحم کے پاس جوفِ مشانہ میں چلا گیا ہے۔ ان تلوں کے آخر حصہ میں جھال دار پھول کے مانند ہوتا ہے۔ اس سے رحم میں بیغۃ السنی میں جاتی ہے۔

پستان (MAMMA OR BREAST) یہ ایک پھل پھلی لٹکتی ہوئی شکل کا ایک عضو ہے۔ اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور غدہ نسج (GLAND TISSUE) بڑے ہوتے ہیں۔ پستان دو ہیں۔ ہر ایک پستان کے آخر حصہ میں ایک اُبھرا ہوا گول عضلہ جو مریض (بھٹنی) (NIPPLE) کہتے ہیں۔ اس کے نیچے ایک دائرہ ہوتا ہے۔ گول چمڑے سے گھرا رہتا ہے اس کا نام بالہ (بھٹنی کے گردہ کا علقہ) (AREOLA) ہے۔

باصرہ۔ چشم (EYES)

آنکھیں دو ہیں ہر ایک دائیں اور بائیں رہتی ہیں آنکھ میں (ا) جو ف چشم (ب) متعلقات چشم۔ یہ دو سامان ہیں۔ اس کی باہری شکل بادام نما ہوتی ہے لیکن پچھلا حصہ گول رہتا ہے۔ اس کے پچھلے حصہ میں داغ رہتا ہے متعلقات چشم۔ مندرجہ ذیل عضو ہیں۔ ابرو ہر ایک جو ف چشم کے اوپر ایک طیر صی بالدار لکیر ہوتی ہے اس کو ابرو یا بھوؤں (EYE-BROWES) کہتے ہیں


پپوٹے (پلکیں) (EYE-LIDS) بالائی اور زیریں۔ ان سے آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ایک کھلنے اور بند ہونے والی چیز ہے۔ اس کا وہ حصہ بالائی اور زیریں پلک سے ملا ہے۔ آخرۃ العین آنکھ کا کوہ (CONTHUS) کہلاتا ہے۔ آنکھ کے ایک عضلہ کے سہارے پلکوں کا ڈھکن اٹھتا ہے۔ اندرونی کوہ میں طبقہ ملتحمہ کا ایک پرت (CONJUNCTIVA) ہے۔ جسے بالائی جنو ہلائیہ (PLICA-BEMILUNARIES) کہتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں ہر ایک پلک کے سامنے آنسو جاری کرنے والے دانے (LACHRYMAL PAPILLA) اور یہ نقطہ دمیہ (آنسو بہانے والی نالی) سے دبے رہتے ہیں (PUNCTUM LACHRYMALE)

جوف چشم کے بالائی گوشہ میں غدود دمیہ (LACHRYMAL - GLAND) - آنسو کی گلیاں ہیں۔ بڑیوں کے بیان میں جوف چشم کا بیاض کرچکے ہیں۔ پلکوں کے بالائی حصہ میں ایک درجن نالیاں ہیں نقطہ دمیہ غدود دمیہ سے

شروع ہوتی ہے اور اندر ہی اندر گیس دمقی (آنسو کی تھیلی) (LACHRYMAL - SAC) تک جاتی ہے۔


تصویر نمبر ۱۰



فرد دمقی (LACHRYMAL GLAND) پلک کا اندرونی حصہ جھٹھ جھنی ریپٹے کی گڑی (TARSAL CARTILAGE) اس میں آنکھوں کا سوراخ ہے۔ مجری لول دمقی (آنسو کی نالی) (LACHRYMAL DUCT) فرد کے منہ اور پلک کے مجری الف (ناک کی نالی) (NASAL DUCT) فرد رہتے ہیں۔ جوف چشم میں آنکھ کا ڈھیلا (EYE-BALL) رہتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل جھتے ہیں۔

آنکھ کا ڈھیلا تین طبقات سے گھرا ہے۔ بیرونی طبقہ قرینہ (آنکھ کا شفاف پردہ) (CORNEA) ہے۔ اوپر کا یہ جڑ اسب جگہ سے سخت ہے۔ گھڑی کے ڈائلی کی طرح اسی چمڑے سے آنکھ کا ڈھیلا ڈھکا رہتا ہے۔ آنکھ کی پتلی کا بالائی حصہ چوڑا رہتا ہے سب حصوں کا طبقہ سفید ہے۔ آنکھ کے ڈھیلے کا بالائی طبقہ کے بیچ کا حصہ بہت چمکیلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے طبقہ کو صلیبہ (آنکھ کا سخت پردہ) (SCLEROTIC) کہتے ہیں۔ یہ سفید طبقہ ہے۔ اس دوسرے طبقہ کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ ہے۔ اسی کو مردمک (پتلی) (PUPIL) کہتے ہیں۔ اسی سوراخ سے ہو کر عصب بصری (OPTIC NERVE) اندر آتی ہے۔ آنکھ کے ڈھیلے کے بالائی حصہ میں اور ناک کے پیچھے کی طرف ایک گوشہ میں

متذکرہ بالا فرد دمی (LACHRYMAL) ہیں۔ اس کے بعد کا تیسرا یعنی
 ٹھیک آنکھ کے ڈھیلے کے اوپر کا پردہ عروقی پردہ (CHOROID) ہے۔
 اس میں بہت سی رگیں اور عروق دموئیہ ہیں۔ یہ دیکھنے میں ایک باریک جال کی طرح ہے۔
 اس کا دوسرا نام طبقہ شبکیہ (RETINA) ہے۔ آنکھ کی درمیانہ پھلی اور
 جال دار پردہ کے بیچ میں محدب بلوری (CONVEX LENS) ہے۔ آنکھ کی پتلی
 کے اندر سے جو کرن آنکھ کے ڈھیلے میں جاتی ہے۔ اسی کی مدد سے ہم لوگوں میں بصلت
 آتی ہے۔ اس وقت اس چیز کی تصویر مندرجہ بالا کرن کے ذریعہ آنکھوں کے پچھلے حصہ میں
 یعنی رطوبت زجاجیہ اور آب (AGNOUS AND VITREON HUMOUR) کی
 طرح دو چمکیلی چیزوں کے درمیان میں طبقہ شبکیہ (RETINA) پر گرتی ہے۔ تصویر
 فوراً ہی دماغ میں پہنچتی ہے۔ اور اس وقت دل کو جس ہوتا ہے۔ چھ جھوٹے
 عضلات کے ذریعہ آنکھ کا ڈھیلا جو ف چشم میں بندھا رہتا ہے۔ انہیں عضلات کے
 سہارے حسب خواہش آنکھ گھمائی جاسکتی ہے۔
 آنکھ کے ڈھیلے کے پچھلے حصہ میں دماغ ہے۔ رگ دماغ سے نکل کر پیچھے کی
 طرف سے جو ف شکم میں داخل ہوتی ہے۔ اور طبقہ شبکیہ میں گھلتی ہے۔
 طبقہ عنبیہ (آنکھ کا انگوری پردہ) (IRIS) ایک رنگین حصہ ہے
 جو شبکیہ کے سامنے کی طرف اس رطوبتی چیز میں ہے
 تصویر نمبر ۳۴



نیچے کی طرف۔ عصب بصری۔ (OPTIC NERVE)
 اوپر کی طرف۔ قرینہ۔ (CORNEA)
 آنکھ کے سامنے کا خانہ۔ حجرہ مقدمہ (FRONT CHAMBER)
 طبقہ عنبیہ۔ (IRIS)
 بطورت آرجاجیہ (VERTRCOUS HUMOUR)
 عروق پرده (CHOROID)
 بلور (LENS)
 شبکیہ (RETINA)
 صلبیہ۔ آنکھ کا سخت پردہ (SCLEROTIC)

گوش (EAR)


آنکھوں کی طرح کان بھی دو ہوتے ہیں۔ یکھوڑے کی جڑ میں دائیں اور بائیں ہیں۔

کان تین حصوں میں منقسم ہیں۔ (1) بیرونی کان (EXTERNAL EAR)
 درمیانی کان (MIDDLE EAR) اندرونی کان۔ (INTERNAL EAR OR LABRYNTH)
 کان کے دو حصے ہیں (1) کان کی سپی (ب) قیف نامانی۔
 کان کی سپی (PINNA) ایک ہڈی ہے جو آواز کو جمع کرتی ہے (ب) قیف
 نامانی (EXTERNAL AUDITORY MEA) اور وہ آواز قیف نامانی
 میں جاتی ہے۔ چند لوگ قیف نامانی کو سننے کی نالی بھی کہتے ہیں۔ یہ قیف نامانی اندر
 کی طرف آہستہ آہستہ پتلی اور تنگ ہو کر ٹیڑھی ہوتی ہوئی ایک جھلی سے مل گئی ہے۔ اس
 جھلی کو کان کا پردہ (TYMPANIC MEMBRANE) کہتے ہیں۔

کان کی نالی میں کان کا میل نکالنے والے کئی غدود ہیں انہیں عمومی رطوبت
 کی گلیاں (WAX GLANDS) کہتے ہیں۔ ان میں سے میل
 نکل کر کان کی نالی کو تر رکھتا ہے۔

ان کے علاوہ ایک، قنات اور ستاکیوس (کان اور حلق کے درمیانی نالی
 EUSTACHION TUBE) ہے جس کے ذریعہ جوف گوش، یا بیرونی کان

تخیرونی اور اندرونی جھکے دباؤ کا تناسب برابر رہتا ہے۔
تصویر نمبر ۳۵



(۱) بیرونی کان (۲) بیرونی کان کی تلی (۳) کان کا پردہ (۴) مطرقہ (کان کی آستوری ناٹھی) (۵) غطرہ سندان (کان کے اندر کی نہائی غامدھی) (۶) عظم رکابی (۷) نصف کرۂ نائیاں (۸) عروق اذن (سُفنے کی تالی) (۹-۱) بیرونی کان (۲-۶) درمیانی کان (۷-۸) اندرونی کان
درمیانی کان (MIDDLE EAR) اس کا سورج ہوا سے بھر رہا ہے

اس میں تین چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ جو شکم کی طرح آپس میں جلی گئی ہیں۔ ایک دیکھنے میں تھوڑی۔ دوسری نہانی اور تیسری رکاب کی طرف ہوتی ہے۔ یہ آواز کو لے جاتی ہے۔
(۳) اندرونی کان (INTERNAL EAR OR LABRYNTH) اس میں تین حصے ہیں۔ اس کی ساخت نہایت تعجب خیز ہے۔ یہ پانی کی طرح کی ایک چیز سے بھرا رہتا ہے۔ دماغ سے نکل کر عصب سماعت (AUDITORY NERVES) اس میں داخل ہونے کے بعد ہزاروں جھٹے میں تقسیم ہو گیا ہے اندرونی کان کا پہلا سرا بہت کچھ انگوٹھی سے مشابہت رکھتا ہے۔ درمیان حصہ بیضہ نما ہے اور آخر حصہ گھونگھانا ہے۔

بیرونی کان صرف خبریں جمع کرتا ہے اور اس کو کان کے پردے تک پہنچا دیتا ہے۔ پردہ اپنی حرکت سے اس کی تیری کو زیادہ کر دیتا ہے کان میں پھیلانے والے اور اٹھانے والے دو عضلات ہیں۔ یہ آواز کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھتے ہیں۔ کان کی ہڈیاں ہوا کی لہروں کو ٹھیک جگہ پر پہنچاتی ہیں اور قات اور سا کیوں سے آواز کا دباؤ اور تناسب ٹھیک رہتا ہے۔

انسانی جسم کے اعضاء کے افعال

انسان کے جسم کی ساخت کے بارے میں مختصراً بتایا جا چکا ہے۔ اب انسانی جسم کے افعال کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی صحت پر کس عضو کا کیا اثر ہوتا ہے اور کون سا عضو کیا کام کرتے ہیں۔

انسانی جسم کی ساخت کیسے یا سیلون (CELL) (ذرات یا کیمہ) سے ہی پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ کیسے ایسی چیز ہے جو صرف آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی سیلوں میں ایک دیوار (WALL) مادہ حیات (PRATOP LASM) رہتا ہے جس کے بیچ میں لواہ (مغز گھٹلی) (NUCLEUS) رہتا ہے جو سیلوں کے افعال پر حکومت کرتا ہے۔ سیل اُس وقت زندہ رہتے ہیں جب تک انھیں غذا کی شکل میں تری (پانی) گرمی اور آکسیجن (OXYGEN) ملتے رہتے ہیں گرمی سوکھنا غذا اور آکسیجن کا نہ ملنا ہی سیلوں کی موت کا باعث ہوتا ہے سردی سے وہ مرتے نہیں ہیں۔

لیکن ان کے کام کرنے کی قوت ترک جاتی ہے۔

انسانی جسم کے سیل جہاں پیدا ہوتے ہیں۔ خاص کر وہ ہیں رہتے ہیں۔ وقت گزرنے پر یہ پُرانے ہو جاتے ہیں اور نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ یا ان سے نئے سیل بن جاتے ہیں۔ سیلوں کی تبدیلی یا دوبارہ بننا تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ پُرانے سیل میں ایک کلی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے۔ اور بڑھتے بڑھتے پُرانے سیل سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح دو سیلیں بنتے ہیں۔ لیکن ایک پہلے ہی کا اور دوسرا خود اُس سے بن گیا۔ ان کی افزائش کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے دو دو سے چار اسی طرح بڑھتی جاتی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نواۃ یا ذرہ کی حالت ہی میں تقسیم ہو کر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور نئی نئی ساخت بھی پیدا ہو جاتی ہیں جب نواۃ دو ہو جاتے ہیں تو ان کے دونوں حصے غلاف کیسہ کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ اور وہاں سیلوں کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ خون کے دورانے ساتھ ہی اس کو غذا اور آکسیجن ملتا ہے۔ جسم کے موجودہ خون سے ہی سیلیں غذا اور آکسیجن پاتے ہیں اور وہ جسم کا (CO) کا اور اپنے جسم کے اُس حصے کو جو ضائع ہو جاتا ہے جس کو ترہ مغزیہ (METABOLIC-PRODUCT) کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔

جسم کے جس عضو میں جو کیے ہوتے ہیں۔ وہ وہیں رہتے ہیں۔ لیکن اُس عضو کی ضرورت کے موافق سیلوں یا کیسوں میں تبدیلی یا اصلاح ہو کر رہتی ہے ان کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا پہچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ناخن میں وہ سیلنگ کی طرح ابھار بناتے ہیں۔ قبضہ اثر یہ۔ میں بال مارا ابھار بناتے ہیں عضلات کے لئے کیے ٹڑھے اور بلے ہوتے ہیں۔ جوت خضہ میں جو سیلیں ہوتی ہیں۔ اُن کی دم ہوتی ہیں شکم میں وہ گلاس یا پائپ کی شکل کے ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ان سیلوں کی ساخت مختلف قسم کی مختلف مقامات اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ جسم میں سیلیں جمع ہو کر جال بناتی ہیں۔ جن سے ایک خاص قسم کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح شیعہ بخوان، شیعہ اعصاب، شیعہ عضلہ وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔ یہی شیعہ کام کرنے والے اجزاء کے حصے کے سبب ہوتے ہیں۔ نظام ہضمی کے افعال یہ۔ ہاضمہ کا مطلب یہ ہے کہ غذا کو اس طرح بنا دیا جائے جو جذب ہو سکے۔ اور ہضم ہو کر سیال جزو خون ہو جائے۔ اس طرح ہضم ہونے میں

تین فعل ہوتے ہیں۔ غذا کا رقیق تیار بننا، اس کا جذب ہونا اور پکنا، یا دوسری چیزوں سے ہل جانا۔ غذا کو جذب ہونے کے قابل بنانے کے لئے اس کو چٹنی کی طرح بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں کچھ ایسی کیمیاوی خفے کے ملنے کی ضرورت رہتی ہے۔ جس سے اس کی شکل میں ایسی تبدیلی ہو جائے وہ آسانی سے آخری نرم لعاب دار مچلی سے جذب کئے جاسکیں۔

ہم لوگ جو غذا کھاتے ہیں وہ عموماً صاحب ذیل کئی حقوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔

- ۱۔ پروٹینڈ یا مواد غاریرہ :- ان میں گوشت، دودھ، انڈے، مچھلی، دال، مٹر، دہی، میدہ، آٹا وغیرہ ہیں۔ ان سے جسم میں گوشت تیار ہوتا ہے۔
- ۲۔ کاربوہائیڈریٹس :- یعنی مواد شکر یہ اور نشاستہ، ان میں چاول، گہوں، کئی، آٹا، ترکاریاں، پھل، آلو، قند، ساگو، بارلی، اراروٹ۔ چینی، شکر، اچار وغیرہ بہت سی سیڑیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

۳۔ فائیٹریٹس یعنی مواد تھمیر و دہنیہ یعنی چربی سے اور روغنی مواد۔ اس میں کھن، گھی اور تیل وغیرہ ہیں۔ ان سے جسم میں گرمی اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔

۴۔ نمک :- ان میں خاص طور سے قابل ذکر ہے معیولی نمک (SODIUM-CHLORIDE)۔ کالشیئم نمک، فاسفیٹس وغیرہ۔

(۵) پانی :- یہ غذا اور زندگی قائم رکھنے کے لئے ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے۔ جسے (۶) وٹامن (VITAMINS) کہتے ہیں۔ اس کی موجودگی غذا میں صحت بخش ہے۔ غذا میں ان کی غیر موجودگی یا موت کا باعث ہے۔ آپ خواہ کتنے ہی کھاتے جائیں۔ اگر یہ نہ ہوگا تو آپ کا جسم مضبوط نہ ہوگا۔ (VITAMINS) تانے پھلون اور رسوں میں پایا جاتا ہے۔

ایسے پینڈو جو حصہ ہضم میں جذب نہیں ہو سکتے۔ انھیں گلنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہ عمل دوج ذیل ہے۔

(۱) منحنی میں وائٹ :- کاٹا، پھاڑتا۔ کچلتا اور بہت ہی سخت چیزوں کو چٹنی کی طرح بنا دیتا ہے۔ اور کھائی ہوئی چیز کو ہضم کے قابل بنا دیتا ہے۔

زبان :- سب سے پہلی اور ضروری بات پر غور نہیں کیا جاتا۔ منہ میں چیز جاتے ہی

ایک قسم کا عابہ تیار ہونے لگتا ہے۔ اس عابہ صرف غذائی نہیں۔ بلکہ اس سے مواد شکر و نشاہ (کاربوہائیڈریٹ) وغیرہ تبدیل ہو کر چینی کی شکل میں جاتے ہیں۔ زبان غذا کو منہ میں لے جانے میں ادھر سے ادھر لٹائے، عابہ میں ملانے اور پھر غذا کی نالی میں پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ اسی سے ذائقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ مجری غذا:۔ اس سے بغیر روک ٹوک کے غذا معدہ میں پہنچتی رہتی ہے۔
۳۔ جوت شکم کے اندر۔

(۱) جگر کا فعل:۔ جگر کے بارے میں اوپر بتایا جا چکا ہے۔ اس کا اصل دیکھنے۔ جگر میں صفرا بنتا ہے۔ یہ حیوانی نشاستہ کا زیادہ حصہ خون میں نہیں جانے دیتا۔ پشایاب میں جو یومات بنتے ہیں وہ بھی جگر میں تیار ہوتے ہیں۔ غلہ کے ساتھ کیسی چیز پہنچ جانے پر ایسی چیز بناتا ہے جس سے اُس زہر کی خرابی جسم میں نہ اثر کر سکے (ب) صفرا کی تحصیل کا فعل:۔ صفرا کی تحصیل ناشپاتی سے ہے۔ اس میں باضمہ رہتی ہے جبکہ صفرا بکھتے ہیں۔ یہ زردی مائل ہے۔ اور اس کے چار خواص ہیں۔ معدہ میں غذا اپنے پر یہ رطوبت اُس میں مل کر باضمہ میں مدد دیتی ہے۔ (ج) مجری بلبلہ کا فعل:۔ یہ شکم کے پھلی دیوار میں ہے۔ اُس میں جو باضمہ رطوبت رہتی ہے اس کو رطوبت بلبلہ کہتے ہیں۔ یہ ایک کھارے پتلی سیال ہوتی ہے۔ اس میں تین قسم کی باضمہ اشیاء ہیں۔
۱۔ پروٹین یا مواد غذائی کا تجزیہ:۔ اس سے پروٹین کے سب اجزاء جدا جدا ہو جاتے ہیں (۲) اسٹارچ کا تجزیہ۔ اس کی مدد سے شکر بن جاتی ہے (۳) مواد شمعیہ اور ذہنیہ (چربی کا تجزیہ)۔ اس کی مدد سے چربی سے گلیسرین اور ترشی بنتی ہے۔

(د) صفرا سے مل کر اس (پتکے یا ز) کا فعل بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اجزاء شمعیہ، ذہنیہ کے ہضم کرنے کے لئے اس کی بہت ضرورت ہے۔ آنزوں میں صفرا کے رہنے سے (غذا) متعین اور فاسد کم ہوتی ہے اور صفرا کی غیر موجودگی سے تعفن کا فعل زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سے براز میں تیر بدبو ہوتی ہے۔

(د) طحال یا جگر کا فعل:۔ اب تک اچھی طرح معلوم نہیں ہوا۔

(س) چھوٹی آنت کا فعل:۔ چھوٹی آنت میں جو حرکت یا ہر ہوتی ہے۔ اس سے

پسائی تو ہوتی ہی ہے ساتھ ہی اس میں سے ایک طرح کی رطوبت نکلتی ہے۔ اس کو رطوبت ہضمی کہتے ہیں۔

اس سے مندرجہ ذیل کام ہوتے ہیں (۱) رطوبت انقرا اس میں قوت ابھارنے والی چیز پیدا ہوتی ہے جس سے غدود انقرا اس بہت جلد رطوبت بنانے لگتے ہیں۔ (۲) ایسی چیز بنتی ہے جس سے غدود انقرا اس کی طاقت پروٹین بنانے کی بڑھتی ہے۔ (۳) تجزیہ پرزین رہتا ہے جو پروٹین کی اجزا کو ٹھکانا کر دیتا ہے۔ (۴) مغیرہ شکر یہ۔ اس کے فعل سے مختلف اقسام کی شکر بنتی ہے۔ درقین غذا کو اور بھی متھ کر اور جذب کر کے بڑی آنتوں میں بھیج دیتا ہے

(۵) بڑی آنت کے فعل انفعال :- چھوٹی آنت میں ہضم ہو کر مٹی چیزیں خون اور رطوبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں ان کو چھوڑ کر باقی حصہ بڑی آنت میں جاتا ہے۔ اس میں بھی عضلہ کے سکڑنے اور پھیلنے کی حرکت سے جو رطوبت بنتی ہے۔ وہ پہلے اوپر پھر جگر میں پھر طحال میں بعدہ زیرین جوف عانہ میں آتی ہے۔ بڑی آنت کے لعابہ اور جھلی سے پانی خون اور لعاب میں جاتا ہے اور وہ گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور یہ گاڑھی چیز کو لون عانہ میں جاتی ہے۔ اور وہاں سے متعدد کے راستے سے باہر نکلتی ہے۔ یہی براز یا پاخانہ ہے۔

آلات ہضم کا فعل

ہاضمہ کا فعل ایک طرح سے منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رطوبت سے ملی غذا معدہ کے بائیں طرف کے چڑے حصہ میں جمع ہوتی ہے۔ اسی وقت رطوبت معدی بنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ ترش رطوبت غذا میں نہیں مل جاتی اس وقت تک رطوبت کا نشاستہ کو تبدیل کر دینے والی چیز غذا پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس کے بعد ترش رطوبت بنتے لگتی ہے۔ اب یہاں معدہ کی دیواروں میں حرکت ہونے لگتی ہے کبھی عضلہ سکڑتا ہے۔ اور کبھی پھیلتا ہے۔ اس سے غذا پرو دیاؤ پڑتا ہے اس طرح معدہ میں پہونچی ہوئی غذا اچھی طرح متھ جاتی ہے اور رطوبت معدی سے جگہ وہ پستلی بھی ہو جاتی ہے اس طرح ۶۴ گھنٹہ تک خوب پسائی ہوتے ہوئے آنتوں میں پہونچ کر یہ پستلی غذا کھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن دودھ کا فعل کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ دودھ جب

معدہ میں پہنچتا ہے تو وہاں ترشی ملنے کی وجہ سے جم یا پھٹ جاتا ہے وہ چیز جس کی وجہ سے دودھ جم جاتا ہے۔ ”رشیز“ کہلاتا ہے۔ اس رشیز کے خاصہ سے وہ وہی بنتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہضم ہو جاتا ہے۔

معدہ سے متقی ہوئی غذا آنت میں جاتی ہے۔ لیکن یہ پہلے چھوٹی آنت میں جاتی ہے۔ وہاں اس میں چھوٹی آنت کی رطوبت مل جاتی ہے یہاں بھی آنتوں میں کچھ بے کی طرح حرکت ہونے لگتی ہے۔ اس سے رطوبت ہضمی غذا میں اچھی طرح مل جاتی ہے صرف اسی قدر نہیں۔ معدہ میں صفرا و رطوبت انقراش وغیرہ مل کر اس کے گلنے میں پوری مدد کرتے ہیں۔

سب سے پہلے غذا منہ میں جاتی ہے۔ یہاں چلنے اور رطوبت ملنے کا کام ہوتا ہے۔ اس سے وہ گیلی ہوتی ہے۔ رطوبت کے نشاستہ کو تبدیل کرنے والے فعل کے مطابق نشاستہ سے شکر بننے لگتی ہے۔ رطوبت ملنے کے بعد غذا، غذا کے راستہ سے معدہ میں آتی ہے۔ معدہ میں آکر رطوبت معدی بننے کے بعد پیرڈیمینوں کے ساتھ جدا جدا ہوتے ہیں۔ چربی پگھل جاتی ہے اور دودھ جم جاتا ہے معدہ میں غذا خوب متقی جاتی ہے۔ اور ترشش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چھوٹی آنت میں جاتی ہے۔ یہاں صفرا و چھوٹی آنت سے نکلی ہوئی رطوبت انقراش اس اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ اس سے اس کا کھٹاپن یا ترشی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ کھاری ہو جاتی ہے۔ اب سب چیزیں ہضم ہونے اور ٹھیک راستے پر آنے کے قابل ہو جاتی ہے یہ قسم کا فعل ہے۔

یہ ہضم کا فعل ختم ہونے کے بعد غذا کی رطوبت سے ضروری چیزیں لے کر باقی بچھی سے ہو کر خون اور لطف میں جاتی ہیں۔ اور جزو بدن ہو جاتی ہیں۔ یہی فعل جذب کرنے کا فعل ہے۔ چربی کا جذب ہونا۔ چھوٹی آنت کے بال سے باریک اُبھارے والے عروق شعریہ سے ہوتا ہے۔ باقی چیزیں خون میں مل جاتی ہیں۔ پانی اور نمک لطف اور خون دونوں طرح کے عروق شعریہ میں جاتے ہیں۔ پروٹین، شکر اور چربی کا جذب ہونا چھوٹی آنت میں ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت سے بھی ہوئی رطوبت بڑی آنتوں میں جاتے جاتے گاڑھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں پانی کا حصہ جذب

کر لیا جاتا ہے۔ جو غذا جذب نہیں ہوتی۔ اس سے براز بن جاتا ہے اور وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔

براز یا پاخانہ۔ غذا میں کل اجزاء ہضم ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ کچھ نہ کچھ غیر ہضم بھی رہ جلتے ہیں۔ وہ براز کے ساتھ نکلے ہیں۔ براز میں (۱) پانی (۲) غیر ہضم غذا کا حصہ (۳) ہضم نہ ہونے کے قابل چیزیں (۴) انڈول یا اسکٹول نامی شے جو آنتوں کے شرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے (۵) غذا کی نالی کی عبادر جھلی کی سیلیں (۶) رطوبت ہضمی کا کچھ حصہ رہتا ہے۔

براز کا رنگ غذا پر منحصر ہے۔ نباتاتی غذا کھانے والوں کا برا زردی مائل، گوشت خوردوں کا بھورا۔ بیماروں کا سیاہ۔ بنفید بنزد غیرہ رنگ کا ہوتا ہے۔ نظام تنفسی کے افعال۔ سانس لینے اور نکلنے کا فعل پھیپھڑے کے ذریعہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑے کی ساخت کے بارے میں ادب پر بیان ہو چکا ہے۔ ہوا کا پھیپھڑے کے اندر جانا اور باہر آنا یہی سانس کے فعل کے اندر آنے اور باہر جانے کا فعل ہے۔ جب ہم سانس کھینچتے ہیں تو ہوا اندر جاتی ہے۔ یہ ہوا ناک سے ہو کر اندر مانی ہو اسی وجہ سے سینہ پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے پھر جب ہوا ناک سے باہر آتی ہے تو سینہ پہلی حالت میں ہو جاتا ہے سانس لینے پر پھیپھڑے پھیلتے ہیں۔ اور باہر نکلنے سے سکڑتے یا چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی کو زفير اور شہيق کہتے ہیں۔ سانس لینے کے وقت سینہ کا پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ حجاب عاجز سکڑتا ہے اور شکم کی طرف دب جاتا ہے۔ پسلیاں اور کئی دوسرے عضلات ادب کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس سے سینہ کا حصہ بڑھتا ہے۔ جیوں جیوں سینہ کا پھیلاؤ بڑھتا ہے ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا کے خاتمے پہلے سے بڑے ہو جاتے ہیں۔

سانس لینے اور باہر نکلنے سے دو فعل ہوتے ہیں۔ (۱) خون میں آکسیجن (نیم) کا ملنا (ب) خون سے کاربوولک ایسڈ گیس کو نکالنا۔ اس طرح ہر مرتبہ سانس اندر لینے اور باہر نکلنے میں خون سے کاربوولک ایسڈ باہر آ جاتا ہے اور آکسیجن بھر جاتا ہے۔ یہ آکسیجن زندگی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ اسکے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ کاربوولک ایسڈ گیس زہر کا کام کرتا ہے۔

تندرست انسان ایک منٹ میں تقریباً ۸۰ مرتبہ سانس لیتا اور نکالتا ہے۔
نہسے بچوں میں یہ تعداد ۲۴ تا ۳۰ بار کی عمر میں ۲۵ یا ۲۶ رہتی ہے سانس لینے میں جو فائبرین
پیلیوں سے ملے ہوئے عضلات، پسلی، پھیپھڑاں سب ہی آلات سے مدد ملتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی اعصاب سے بھی کم مدد نہیں ملتی ہے۔ کاربوئک ایسڈ گیس کے جمع
ہوتے ہی اعصاب کو نکالنے میں زور لگاتے ہیں۔ جوں ہی اس گیس کی زیادہ مقدار
خون میں جمع ہو جاتی ہے فوراً ہی اعصاب سے ایسا جھٹکا آتا ہے کہ سانس کے مددگار آلات
تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں اور سانس کے اندر آنے اور باہر جانے کا فعل زور سے
ہونے لگتا ہے مگر اس فعل کی باقاعدگی پر ہی ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔

جو ہوا اندر جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے۔ اس کے متعلق بھی علم ہونا ضروری ہے
جو ہوا اندر جاتی ہے اور نکلتی ہے اُسے (TIDAL AIR) کہتے ہیں۔ اس
مقدار ہو کہ جو پھیپھڑے میں گہری سانس لینے کے ذریعہ کھینچی جاسکتی ہے۔
(COMP LEMENTAL AIR) کہتے ہیں۔ زور سے سانس نکالتے پر جتنی ہوا نکل جاتی
ہے۔ اسکو (SUPPLE MENTAL AIR) کہتے ہیں۔ دم
گھٹنا (ASPHYXIA) ایک ایسی حالت ہے جس میں سانس کے اندر جانے
اور باہر آنے کا فعل رُک جاتا ہے۔ سانس لینے میں جو تکلیف ہوتی ہے اُسکو سود
تنفس (DYSPNOEA) کہتے ہیں۔ بیٹھنے سے جو سانس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے
اس حالت کو تنفس (ONTHOPNOEA)

پھیپھڑے میں خون کی صفائی :- ہمارے جسم میں سیلوں کے ٹوٹے اور
بہت سی کیمیائی فعلوں کی وجہ سے کاربوئک ایسڈ گیس بنا کرتی ہے۔ اس سے
خون سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سیاہی مائل خون جسم کے سب حصوں میں جمع ہو کر دل کے
دائیں اذن القلب (دل کا کان) میں دو بڑی وریدوں کے ذریعہ پہنچتا ہے
اسکے بعد دل سے شریان الٹریہ کے ذریعہ یہ خون دونوں پھیپھڑوں میں جاتا ہے
یہاں ہر سانس نکالنے سے کاربوئک ایسڈ گیس نکل کر اس میں (OXYGEN)
ہے۔ اور یہ خون صاف ہوتا ہے۔

نظام دواہن الدم کا فعل :- خون کا کچھ حصہ رقیق اور کچھ منجمد ہوتا ہے

اس میں سُرخ و سفید ذرات رہتے ہیں: یہ رقیق یعنی رطوبت محصورہ (PLASMA) کل حصّہ جسم کے سیلوں میں جاتا ہے۔ اور اُس سے اُن سیلوں کو آکسیجن، نیک اور کھانے کے قابل چیزیں ملتی ہیں۔ اُن سیلوں سے ان کا ضائع ہوا حصّہ لے لینا ہے جب خون جم جاتا ہے تو اُس کا گھاس کارنگ کارقیق حصّہ رہ جاتا ہے۔ وہ مالدہ یا آب خون (SCRUM) کہلاتا ہے۔ یہ رقیق سیال متواتر عروق دینہ سے تراوش پایا کرتا ہے اور یہ تراوش پایا ہوا حصّہ (LYMPH) ہے۔ خون کارقیق حصّہ رطوبت محصورہ (PLASMA) ہے۔ اور جو چیز خون کے جمنے کے بعد رہ جاتی ہے ماء الدم یا آب خون (سیرم) نیک آب خون میں یہ نسبت رطوبت محصورہ کے زیادہ ہوتا ہے۔ آکسیجن سے صاف کیا ہوا خون شرائین اور طے کے ذریعہ جسم کے کل حصّوں میں پٹ سے جاتا ہے۔ یہ شرائین چھوٹی ہوتے ہوتے اڑیوں بناتی ہیں اور پھر اور بھی چھوٹے اور باریک عروق شعریہ کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور ایک دیوار تک کی لطیف سیلوں میں یہ مصفا خون غذا کی صورت میں پہونچا دیتی ہیں۔ سیلیں ہی ضائع ہوئی چیزیں خون میں پہونچا دیتی ہیں۔ اس طرح خون میں عوض معاوضہ سے انسانی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔

خون میں دو سخت چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں ذرات لطیف ہیں۔ کربات دمویہ یا دانہ ہائے خون اور دانہ ہائے سفید ہیں۔ خون کے ہزار حصّہ میٹر میں دانہ ہائے خون تقریباً ۵۰۰۰۰ ہوں گے، اور دانہ ہائے سفید ۶۰۰۰۰ ہیں۔

دانہ ہائے خون :- ان سے خون کارنگ سُرخ بنتا ہے۔ اس میں ہیموگلوبین (HEMOGLOBIN) ایک شے رہتی ہے، جو آکسیجن سے فوراً مل جاتی ہے یہ دانہ ہائے خون ہمیشہ تلف ہوتے رہتے ہیں۔ اور انھیں سے صفراء، براز، بول وغیرہ میں رنگ آتا ہے۔

دانہ ہائے سفید :- شکل میں ڈیسرے میٹر سے ہوتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور نیکے ذرات کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ بیرونی اجرام کو رد کر کھا جلتے ہیں۔

سورس کے متعلق کچھ بتا دینا ضروری ہے، سُرخ، اگر می، اماس، درد۔ ان چاروں کے مجموعہ کا نام سورس ہے۔ سورس کہنے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ

اُس مقام پر سُرخ ہے، اس سے گرمی ہے، اور درہٹے۔ سوزش کیوں ہوتی ہے۔
اگر کوئی بیرونی چیز جسم میں سرایت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے جوں ہی جسم کے کسی
حصہ میں بیرونی چیز داخل ہوتی ہے اُسی وقت وہاں کے عروق دموی پھیل جاتی ہیں
اس سے وہاں خون جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی قتنا خون وہاں ہونا چاہیے اس سے زیادہ
وہاں آجاتا ہے اور وہاں ایک قسم کے جراثیم جن کو (مقارنہ معسلہ) کہتے ہیں
کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اب اس مقام کو رکھنے کے لئے عروق شریہ کی دیواروں
سے بہت زیادہ لف تراوش پاتا ہے۔ اور فوراً ہی ایک دوسرے قسم کے اجزاء
کو نڈا کر دینے والے (مقارنہ معسلہ) انھیں کھا جانے کے لئے دوڑ پڑتے ہیں۔ اگر
وہ بیرونی چیز فوراً ہٹا دی جاسکے تو دوران خون آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔
اگر دونوں میں جنگ دیر تک رہے تو اتنے (مقارنہ معسلہ) وہاں آجاتے
ہیں کہ وہ مقام سفید دکھائی دیتا ہے۔ اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پیپ پردہ
لکوسائٹ ہیں جو لف میں تیرتے اور جمع رہتے ہیں، اب شاید یہ سمجھنے میں وقت نہ
ہوگی کہ وہ مقام کیوں سُرخ دکھائی دیتا ہے (کیونکہ وہاں بہت خون بھر جاتا ہے۔)
کیوں اس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے (کیونکہ مدد کرتے ہیں) کیونکہ عصاب پر خون کا زیادہ دباؤ پڑتا ہے
خون کے دوران کے فعل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
(۱) دل ایک بڑا پیپ ہے۔ جس میں جسم کے سب ہی حصوں سے خون یا سیال
آتا ہے اور یہیں سے جسم کے سب حصوں میں سیال جاتا ہے۔
(ب) شرائین کے ذریعہ مصفا خون دل سے جسم کے حصوں میں جاتا ہے۔ شرائین
چھوٹی ہے اور کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں۔
(ج) عروق شریہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جن سے لف نکل کر جسم کے سب یلوں کو تر
کرتی ہے۔ غذا دینے اور کام کرنے کے قابل بناتی ہیں۔
(د) وریدیں۔ ان سے کل تلف ہوئی چیزیں خون میں مل کر دل کے دائیں حصہ میں
آتی ہیں۔ اور پھر پمپوں میں جا کر اکسیجن کے ذریعہ خون صاف ہو جاتا ہے۔
نظام فحری بول:۔ غذا میں جو حصہ جذب ہو کر آنت سے ورید الباب
(Mesenteric Veins) میں چلا جاتا ہے۔ اس میں پروٹین کا ربو بائیڈ ریٹ بہت

رہ جاتا ہے۔ اور باضمہ کے ذریعہ دُٹیاں تبدیل ہو کر ترش ہو جاتا ہے لیکن ایبوسین اور گلوبول کی شکل میں آنتوں کے رطوبات سے جذب کیا جاتا ہے ایبوسین اور گلوبول خون میں اور پھر جگر میں جاتا ہے۔ جگر میں جا کر یہ ایبوسین اور یابین جاتا ہے۔ پھر خون میں چلا جاتا ہے۔ اسکے علاوہ دیگر عضلات اور قوتِ حیات (PROTOPLASM)

ایبوسین کو علیحدہ کر دیتے ہیں جو جگر میں یورک ایسڈ میں ملتا ہے۔ یہ یوریا ہے۔ جو خون سے نکل کر یورک ایسڈ بنتا ہے۔ لیکن بول بالکل یوریا ہی نہیں ہے۔ بول میں بہت غلاظت یورک ایسڈ، سودا، کلورائیڈ وغیرہ کئی چیزیں رہتی ہیں۔

مثانہ سے پیشاب کے استخراج کا کام نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف جسم کے مُضر اشیا کو خون سے علیحدہ کر دیتا ہے، اسکے مثانہ میں بہت سی عروقِ دمویہ اور نالیاں رہتی ہیں۔ مثانہ کے فعل پر غور کرنے سے انسان تعجب میں آ جاتا ہے۔


مختلف حالتوں کے لحاظ سے پیشاب کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی جنسِ مذکورہ، جنسِ اُنات، درجہ حرارت، آب و ہوا یا موسم، غذا، مشروبات، لباس، ورزش وغیرہ اور جسم سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اندازاً ۵۔۱۰ اولنس پیشاب روزانہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی جانچ کرنے سے ہم لوگوں کی غذا بود و باش وغیرہ بہت سی باتوں کا پتہ لگتا ہے۔

جلد:- چمڑے میں دو قسم کی گرہیں ہوتی ہیں اُن میں ایک میں ایک میں پسینہ ہوتا ہے اور دوسری سے چربی نکلتی ہے۔ جو ہمارے جسم کو نرم اور چمکی رکھتی ہے۔ ہمارے جسم میں جو مسامات ہیں وہ پسینہ کی نالیوں کے مُنفذ ہیں۔ پسینہ ایک سیال کھار اور رزق چیز ہے۔ وہ مقامات جہاں بہت دباؤ پڑتا ہے یا رگڑ لگتی ہے سخت ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے مقامات جن میں قوتِ محرکہ کم ہوتی ہے۔ ان میں خاص قسم کے اعصاب رہتے ہیں جیسے ہتھیلی اور انگلیوں میں وہاں پسینہ کم ہوتا ہے۔

نظامِ اعصاب

نظامِ اعصاب کا مکمل حال بغیر عملِ جراثیمی کے پورا معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو بھی یہاں مختصر بتایا جاتا ہے۔

دماغ یا مقدم دماغ سے تین خاص فعل ہوتے ہیں۔



مطلب یہ کہ ہم لوگوں میں اُسی وقت تک قوت جس ہے۔ جب تک دماغ زندہ ہے اور اس ہوش و حواس کا قائم رہنا دماغ میں خون کی موجودگی پر منحصر ہے۔ حافظہ کے کل افعال (ادراک، فہم، خیال، وغیرہ) دماغ کے فعل ہی کے نتیجہ ہیں۔ قوت متخیلہ صرف حاصل کی ہوئی چیز ہے یہ اعصاب الحس کا فعل ہی مثلاً اگر ہم چوڑکھا جائیں تو درد ہوتا ہے اور دماغ میں بھی بے چینی ہوتی ہے۔ کل عضلات کے حرکات پر دماغ کی ہی حکومت رہتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھ کو پلٹنے یا رُک جانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ یعنی اُس کی حرکت کو قاعدہ میں رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ غدد کا فعل ہے اسی طرح دماغ کا بھی فعل ہے۔ یہاں تک کہ عمدہ غذا دیکھنے سے ہمارے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ یعنی منہ میں تھوک کے غدد درال بہانے لگے ہیں۔ اسی قسم کی حرکت کو منعکس فعل (Reflex action) کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی خیال کا طبقہ ہے۔ جو دماغ سے علیحدہ ہے۔ اور اس میں جب تحریک ہوتی ہے تو وہ خبر دماغ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور دماغ پر عضلات اور غدد کو جیسا حکم دیتا ہے ویسا ہی فعل کرتے ہیں۔ اس کی وہی حالت ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے لڑکے کی تکلیفوں کا تار یا کر باپ روپیہ بھیج دیتا ہے منعکس فعل عضلات اور غدد کا وہ فعل ہے جو کسی معاون طبقہ کی تحریک کی وجہ سے دماغ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔

مؤخر دماغ یا چھوٹے دماغ۔ یہ خون میں عضلات کی حرکت کا معاونت کر کے ————— تناسب اور توازن کی حفاظت کرتا ہے۔

حرام مغز کے افعال مذکورہ ذیل ہیں۔

- (۱) دل کی دھڑکن (ب) عروق دمویہ میں کھینچاؤ قائم رکھنا ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ عروق دمویہ اور عضلات پر حکومت کرتا ہے۔
 (ج) زیر اور شہیق کا فل (د) ٹھکنا، بونا۔ رال بہنا، خیالات کی پیدائش۔
 ریڑھ کا ستون :- اس کے دو افعال ہیں (۱) کچھ کاموں کے ثانوی فعل کا یہ مرکز ہے (ب) دماغ میں خیال پہنچاتا ہے اور لے آتا ہے۔

ریڑھ کے ستون کے مرکز سے جسم کی حکومت کے متعلق مندرجہ ذیل افعال ہوتے ہیں۔
 (۱) عضلات میں طاقت دینے کا مرکز (ب) مقصد کے عضلات کا فعل ٹھیک رکھنے کا مرکز۔ ساتھ ہی مشانہ کی گردن اور مقصد کی گردن کے فعل کی حفاظت۔
 (ج) رحم میں مکران پر ناکرہنے کا مرکز (د) قیض میں تحریک پیدا کرنے کا مرکز۔
 ریڑھ کے ستون کے دوسرے فعلوں میں سے ایک فعل یہ بھی ہے کہ جسم کے کسی مقام یا آلہ سے جو خیال یا حالت معلوم ہو دماغ کو اس کی خبر دینا۔ یہ خبر حرام مغز اور اوریل دماغ اور مؤخر دماغ کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عضلات اور غدود فعل کے دماغ کا گڑھا۔ مؤخر دماغ، پل دماغ، حرام مغز، ریڑھ کا ستون، اعصاب، حرام مغز وغیرہ مرکز ہیں جن سے غدود اور عضلات کا تعلق ہے۔

اعصاب شریکیہ کے خاص چار افعال ہیں

- (۱) دل کی حرکت کو تیز کرنا (ب) عروق دمویہ کے اندر کا قطرہ ٹھیک کرنا۔
 (ج) پیٹ کے پمپوں کی رطوبت گرنے والے فعل کا تناسب اور توازن قائم رکھنا۔
 (د) بارہ آشتی آنت معدہ رحم وغیرہ کے لہری طرح کے فعل کو ٹھیک کرنا۔
 اس طرح اگرچہ دیکھتے ہیں یہ آتا ہے کہ نظام اعصاب کے حصے جدا جدا ہیں لیکن حقیقت میں کام کی صورت میں ایک دوسرے سے خود بخود رہنے پر بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

اعضاء الخمس :- ہم لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں حقیقت میں وہ دماغ سے دیکھتے ہیں یہ کیسے تو صرف دیکھی ہوئی چیز کی شکل لیتا ہے۔ بیرونی حرکت منشا رطوبی کو حرکت

دیتی ہے جو آخر میں عصب سامع میں جنبش پیدا کر کے دماغ کو خبر بھیجتا ہے اسی طرح بوئے عصب شمی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بو کیسی ہے۔ دماغ فیصلہ کرتا ہے۔ اسلئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے من سے دیکھتے ہیں نہ کہ آنکھ سے۔ کان سے نہیں سنتے بلکہ دماغ کے اندر کے آلہ سے۔ اس طرح کل افعال ہوتے ہیں۔

اعضا و تناسل :- مردوں میں فوطہ سے ایک قسم کی گاڑھی رقیق چیز نکلتی ہے۔ یہ مجبوری منی کے ذریعہ آتی ہے۔ اس میں بہت کپڑے رہتے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ منی ہمیشہ تیار نہیں رہتی۔ یہ جماع کے فعل کے نتیجہ کے طور پر بن جاتی ہے۔ اور عضلات مجبوری بول جماع کے فعل کے وقت اس تیزی سے اسے پھینکتے ہیں۔ کہ اس کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔


عورتوں میں بیضہ کے متعلق اوپر بتایا جا چکا ہے۔ حیوان منویہ اور بیضہ بشر کے ملنے سے ہی عمل رہتا ہے۔

حمل کا بیان

حیوان منویہ (مردوں کے منی کے کپڑے) اور بیضہ المنی (Ovum)
(عورتوں کے منی کے آٹھے) کے ملنے سے قرار حمل عموماً مجبوری بیضہ المنی (Falloption tubes) میں پایا کرتا ہے۔ رحم میں بھی قرار پاتا ہے۔ حیوان منویہ کا سر اور بیضہ المنی کا قواۃ آپس میں مل جاتے ہیں اور حیوان منویہ کے سر کو چھوڑ کر باقی حصہ رحم کے جسم میں چسپاں ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں کے ملنے پر ایک سیل تیار ہوتی ہے۔ یہی حمل کا (Zygote) ہے اور حمل کے سیل میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اُن کو فعل کون و فساد (segmentation) کہتے ہیں۔
یہ سیل حمل میں بہت تیزی سے مجبوری بیضہ المنی کے راستہ سے رحم میں جا کر وہاں کی ایک لعا بدار غشاء سے چسپاں ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کا دوسرا فعل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پھٹ کر پھر دسے چار چار سے آٹھ اس طرح لگانا پھٹتا ہے۔ اور پھٹتے پھٹتے سیلوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے اس کو غشاء حمل (embryo) کہتے ہیں غشاء حمل کے اندر کی سیلیں

کچھ کچھ چھوٹی ہوتی ہیں۔ باہر کی بڑی۔ باہر کی سیلیں اندر کی سیلوں کو گھیر کر ایک حلقہ بناتی ہیں۔ اس فشار حمل میں ایک کھوکھلی جگہ بن جاتی ہے جس میں ایک قسم کی رقیق چیز جمع ہونے لگتی ہے۔ اس کے دباؤ سے باہر کی سیلیں اندر کی سیلوں سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ حمل کی یہ حالت بلیبلہ حمل (BLAETOCYST) کہلاتی ہے۔ اسی بلیبلہ کے اندر جو سیلوں کا مجموعہ رہتا ہے اس سے حمل کا سر اور حمل کے ڈھکنے والی جھلی کا کچھ کام بنتا ہے۔

تصویر نمبر ۳




قرار حمل کیسے عمل میں آتا ہے۔ اس تصویر میں عورت کی منی کے اندر سے اور مرد کے منی کے کیڑے آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔

ولادت کے پہلے ایک حاملہ کے حمل کا نصف دائرہ

اور دائرہ میں طرف آئیں اور رحم اس لئے دکھایا گیا ہے کہ حمل میں جنین کس طرح رہتا ہے۔ رحم میں اس وقت کچھ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ حمل قرار پانے کے بعد رحم کی لعابدار جھیلی موٹی ہونے لگتی ہے اور وہ غدد جوئل کی شکل کے ہوتے ہیں۔ زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ لعابدار غشاء جنین کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یعنی جنین کے چاروں طرف لعابدار غشاء کا ایک طبقہ بن جاتا ہے۔ اس حالت میں غشاء رلی (DECIDUA) کہلاتی ہے۔ جنین آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ اس حالت میں اُس پر سیلوں اور لعابدار لیج کے دو غلاف چڑھ جاتے ہیں وہ پردہ جو باہر رہا ہے وہ غشاء رلی سے ملتا رہتا ہے۔ یہ جنین کا بیرونی پردہ (CHORION) کہلاتا ہے۔ دوسرا پردہ اندر رہتا ہے۔ یہ جنین کا اندرونی پردہ (MESOBLAST) کہلاتا ہے۔ بیرونی پردہ آہستہ آہستہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس وقت بیرونی پردہ آہستہ آہستہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اُس وقت بیرونی پردہ کے پشت پر بہت سے چھوٹے چھوٹے بالوں کی طرح کٹے نکلتے ہیں۔ ان سے جنین کی پرورش ہوتی ہے اس حالت میں جنین رحم کی دیوار پر چسپاں رہتا ہے۔ حمل کے ارد گرد بیرونی پردے کے ریشے کچھ گھنے رہتے ہیں۔ باقی جگہوں کے چھوٹے اور مقدار میں بھی کم ہوتے ہیں۔ دو ماہ بعد نئے ریشے تو بنتے نہیں۔ جو بن گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پھر چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں۔ یہ گڑھے خون سے بھرے رہتے ہیں۔ اور انہیں گرمیوں میں اس بیرونی پردے کے ریشے ڈوبے رہتے ہیں۔

چھ ہفتہ کا حمل نمبر (۱) حمل کا بیرونی پردہ (CHORION) نمبر (۲) ریشہ (FIBRE) نمبر (۳) جنین کا اندرونی پردہ (MESOBLAST) نمبر (۴) نال (PLACENTA) نمبر (۵) تھیلی جس میں پرورش کر نیوالی چیزیں رہتی ہیں نمبر (۶) اتصال نال۔ نمبر (۷) مشیمہ کے بننے کا مقام۔ جب جنین چار پانچ ہفتہ کا ہوتا ہے تو جنین اور اُس کے اندرونی غلاف

کے درمیان میں ایک طرح کی رقیق چیز بن جمع ہونے لگتی ہیں اسکو
(LIQUOR AMNI) تصویر نمبر ۳



کہتے ہیں۔ اس سیال امیونی آبی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیرونی اندرونی پردے
ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ سیال امیونی آبی اچھ سات ماہ تک برابر بڑھتا رہتا ہے اور فوٹا
مہینہ شروع ہوتے ہی سیال امیونی آبی تقریباً سو اسی گز جمع ہو جاتا ہے۔ یہ سیال
امیونی آبی حمل کی حفاظت کا ایک خاص ذریعہ ہے۔


اس وقت غشاء زردی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ دو قسم کی ہو جاتی ہے۔ پہلے اس
بالائی حصہ زردی میں جھٹکے سے علیحدہ رہتا ہے۔ اس کے رحم میں حمل اور اس دیواروں
میں فرق رہتا ہے۔ لیکن جب جنین بڑا ہو جاتا ہے تو بالائی غشاء زردی باقی غشاء زردی
کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور جب جنین تین ماہ کا ہو جاتا ہے تو دونوں ہی آپس میں مل جاتی
ہیں۔ سیال امیونی آبی کے دباؤ سے غشاء زردی پستلی پڑ جاتی ہے۔ رحم کا مٹھو رطوبت
سے بند ہو جاتا ہے۔ اور بھی کوئی چیز اس میں نہیں جا سکتی۔

نالہ۔ وہ چیز ہے جس کے سہارے جنین رحم کی دیوار سے لٹکا رہتا ہے۔ اس کو

جبلُ السَّہَرِہ (UMBILICAL CORD) کہتے ہیں۔ نال ایک طرف جنین کی ناف سے اور دوسری طرف مشیمہ سے لگا رہتا ہے۔ حقیقت میں نال کئی ایلوں کے قریب پہنچے بن جاتا ہے۔ ان میں خاص چیزیں دو ہوتی ہیں دو شریانیں اور ایک ویدہ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی لیمبار چیز سے آپس میں ملا رہتی ہیں اور ان پر ایک اندرونی خلافت چڑھا رہتا ہے۔ اسکی لمبائی جنین کی لمبائی کی طرح ہوتی ہے عروق دموشیمیہ میں جاکر کئی شاخوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔

مشیمہ :- (PLACENTA) جس جگہ نال کے سہارے جنین رحم سے لٹکا رہتا ہے وہ مشیمہ کہلاتا ہے۔ یہ مشیمہ عشا اور زر ملی سے چسپاں رہتا ہے۔ مشیمہ میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو خون سے بھری ہوتی ہیں۔ ان میں بیرونی پردے کے ریشے درجہ بہ درجہ دھتے ہیں، ان ریشوں میں چھوٹے چھوٹے عروق دموشیمیہ ہوتے ہیں۔ جسم میں یہ مشیمہ اوپر کی طرف یا اس کے سامنے یا پیچھے کی دیوار سے جتا ہے۔ مشیمہ ہی وہ چیز ہے جسکے ذریعہ جنین ماں کے جسم سے ملتا رہتا ہے۔ اسی کے ذریعہ جن میں سانس آتی جاتی ہے۔ یعنی مشیمہ جنین کے سانس کے اندر جانے اور نکلنے کا آلہ ہے اور جنین کے خون کو صفات کر کے کام بھی کرتا ہے۔ کیونکہ جنین اسی کے ذریعہ اپنے جسم کی کثافت کو دور کرتا ہے۔

تصویر نمبر ۳۱



نوٹ :-

مشیمہ یعنی نال

حمل کی پرورش

اسی نال کے ذریعہ

ہوا کرتا ہے۔

سانس بھی اسی

نال کے ذریعہ آتا ہے۔

(۲) جنین کا اندرونی علاقہ

(۱) پشت مشیمہ (BACK OF PLACENTA)

(۳) عروق دمویہ (BLOOD VESSELS)


(MESOBLAST)

مال (UMBILICAL CORD)

رحم میں جنین کی پرورش :- چار ہفتہ کا جنین ہونے تک اس کے بیرونی پردہ میں عروق دمویہ نہیں ہوتے۔ اس وقت تک جنین رحم کی لعابدار جھلی اور لطف سے ہی ضروری چیزوں کو جذب کر کے اپنی پرورش کرتا ہے چوتھے ہفتہ بعد غشاء زرہی میں کئی گڑھے خون سے بھرے بنتے ہیں اور ساتھ ہی بیرونی پردے میں بہت سے عروق دمویہ بھی بننے لگتے ہیں۔ مشیمہ تیسرے ماہ میں اچھی طرح بن جاتا ہے اور مال کی عروق دمویہ مشیمہ کی جگہ سے ہی طاقت کی چیزیں حاصل کرتی ہیں۔ ماں کے خون سے بھرے گڑھے اور کلوں کی عروق دمویہ کے بیچ بیرونی عروق دمویہ کی دیوار اور بیرونی خلافت رہتا ہے۔ یہ اتنی پتلی رہتی ہے کہ جذب کرنے کا کام بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ رحم میں جب تک بچہ رہتا ہے اس وقت تک وجود ہی سانس نہیں لیتا۔ ماں کے ہی دل سے اسے یہ کام ہو جاتا ہے۔

حاصل کیا بڑھنا

جن بہت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ چار ماہ میں ایک انچ دوسرے ماہ میں



۱۲ اپریل تیسرے ماہ میں ۲ اپریل، اسی طرح بڑھتا بڑھتا دسویں ماہ تک تقریباً ۱۰ اپریل لبا اور دان میں بھی اندازاً نصف سیر ہو جاتا ہے۔

حاملہ کے لبا کے رخ کا کٹا مل۔ اس میں رحم اور جنین کا قیام اور دوسرے جسمانی آلات سے اُس کا تعلق بتایا گیا ہے۔

حمل کے اعضاء کی ساخت۔۔ ایک مادہ کا حمل مثل جیوٹی کے رہتا ہو ایک سراموٹا۔ دوسرا تپلا۔ منہ کی جگہ پک شکاف، اور ہوٹ کی جگہ تل کے مانند داغ ہوتا ہے۔ دوسرے ماہ میں ناک ہوٹ اور بھوس دکھائی دیتی ہیں۔ آلہ تناسل اور مقعد کی شکل بھی بنتی ہے۔ پھیپھڑے، طحال اور چھوٹا شہانہ آنتوں کے نال کا اندرونی حصہ۔ نال میں اشیمن وغیرہ رہتی ہے۔ تیسرے ماہ میں آنتیاں علیحدہ دکھائی دیتی ہیں۔ تپک اور ہوٹ جڑے رہتے ہیں۔ قلب کا بھی کچھ حصہ بن جاتا ہے۔ اس طرح برہمنے بڑھتے ساتویں ماہ میں حمل کا زیادہ حصہ بن جاتا ہے۔ جلد کے نیچے چربی آ جاتی ہے۔ خیمے نیچے اتر آتے ہیں۔ دسویں ماہ میں جسم پورا بن جاتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن انگلی کے آگے نکلتے رہتے ہیں۔ بال بھی قریب قریب ایک اپریل سے ہوتے ہیں۔

جنین کے بڑھنے کے ساتھ ہی رحم بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ دسویں ماہ میں اسکی لمبائی ۱۰ اپریل ہو جاتی ہے۔ لیکن جنین کی ۲ اپریل رہتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جنین رحم میں بہت سکڑا رہتا ہے۔ اس کے ہاتھ دیر بھی پھیلے نہیں رہتے سر اور پشت سینہ پر جھکے رہتے ہیں۔ کشت کی ریڑھ بنو آگے کی طرف جھسکی رہتی ہے۔ دونوں رانیں پرٹ پر اور ٹانگیں رانوں پر مڑ کر رہتی ہیں۔ مٹھیاں بند رہتی ہیں۔ اسی لئے وہ انڈے کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔

پورے دنوں کے جنین کی حالت


حمل قرار پانے کے پہلے کئی مہینوں میں جب جنین چھوٹا رہتا ہے اُس وقت اسکا سر اوپر کی طرف اور دھڑ نیچے کی طرف رہتا ہے۔ لیکن کچھ مہینوں میں سر نیچے ہو جاتا ہے۔ اور کونٹا اوپر کی طرف رہتا ہے۔

۷۸
تصویر نمبر ۳۳
پورے دنوں کا حمل



زیادہ جنین اسی حالت میں رہتا ہے۔ ولادت کے وقت فرج سے پہلے سر بعد کو دھڑ نکلتا ہے۔ لیکن جب جنین اُٹا رہتا ہے۔ تو پہلے دھڑ بعد کو سر نکلتا ہے۔ کبھی کبھی کندھے کے ساتھ بھی سیدھا جوتا ہے۔

ولادت :- ماں کے جسم سے جنین کا باہر نکلنا ولادت کہلاتا ہے۔ اس وقت حاملہ کو تھوڑی بہت تکلیف سہا رہتی ہے۔ لیکن جو عورتیں اپنے دن کا بھی میں ہی ہیں اور محنت نہیں کرتیں۔ جو بہت کم سہا رہتی ہیں یا جن کے پیڑ کے خوف بڑیاں کسی مرض کی وجہ سے مڑی رہتی ہیں؛ انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو درازانہ جسمانی محنت کرتی ہیں جن کا مزاج پُر امن ہے انہیں کم تکلیف ہوتی ہے۔



ولادت کا فعل :- رحم کا عضلہ سُکڑنے کی وجہ سے ولادت کے وقت درد ہوتا ہے۔ لیکن رحم کا عضلہ اُس وقت بالکل ہی نہیں سُکڑتا۔ اس میں رُک رُک کر لہر سی اُٹھتی ہے۔ یہ درد سُکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے سُکڑنے کی وجہ سے رحم کا اندرونی مقام گھٹنے لگتا ہے۔ اس لئے اس کے اندر کی چیز کے باہر نکلنے کا یہ فعل ہوتا ہے۔ رحم کی دیوار پر اس طرح دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ اندرونی چیز باہر کی طرف نکالتی ہے؛ رحم کے اندر بچہ کا جسم اور سیال امینو آئی رہتا ہے۔ اس لئے عضلہ کے سُکڑنے کی وجہ سے جب رحم کی کشادگی ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر کی چیزیں باہر نکلنے لگتی ہیں۔ اس وقت امینو آئی سے بھری ہوئی ایک جھلی کی تھیلی رحم کے منہ پر اڑ جاتی ہے۔ دباؤ کی وجہ سے رحم کے منہ کے پاس کا چمڑا پھیل جاتا ہے۔ اور منہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ بچہ تاسر باہر نکل آدے اسی طرح پورا جسم باہر نکلتا ہے۔ ولادت کے وقت سیال امینو آئی کی تھیلی پھٹ جاتی ہے۔ تھیلی پھٹ جانے کی وجہ سے سیال امینو آئی بہہ کر فرج سے باہر نکلتا ہے۔ اس سے فرج کے راستے میں چکنا چٹ پیدا ہو جاتی ہے اور بچہ آسانی سے نکل آتا ہے۔

اس وقت نال بچہ کے نال سے لگا رہتا ہے۔ اس نال کے ذریعہ ہی وہ رحم میں جڑا رہتا ہے۔ نال اندازاً ۱۰-۱۲ سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس میں شریان کے ضربات معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ضرب ولادت ہونے کے غموضی دیر بعد بند ہو جاتی ہے۔ اور بچہ فرج سے نکلنے ہی زور سے رونے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ سانس لیتا ہے اور ہوا پہلے پہل اس کے پیچھے میں جاتی ہے۔ اگر بچہ نہ روئے تو اسکی موت کا خوف رہتا ہے۔ نال کا ٹٹنا :- نال کی ضرب یا ٹپکن بند ہونے پر اُسکو کاٹنا چاہیے۔ یعنی اس میں دو گز میں اس طرح لگانی چاہیے کہ ایک گانٹھ بچہ کی ناک سے دوا بچ کی درمی پڑے اور دوسری ماں کی فرج کے سوراخ کے پاس رہے۔ گرہ لگانے کے بعد پہلے ردوں گر ہوں گے۔ بچ میں لیکن پہلی گرہ کے پاس کاٹ دینا چاہیے۔ تاکہ اور چھری کو پہلے کچھ دیر گرم پانی میں ابال لینا چاہیے۔

مشیمہ :- گو کہ اُس وقت بچہ ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مشیمہ اور جنین کی جھلی ماں کے جسم میں رہتی ہے۔ قریب قریب نصف گھنٹہ میں مشیمہ

روح سے ملحدہ ہو جاتا ہے اور جنین کی مچھلی کے ساتھ خون، غشاء زیر پل مشیمہ وغیرہ نکلتے ہیں۔ اس وقت خون کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ اگر اس وقت یہ چیزیں نہ نکلیں تو نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔

جنین میں دوران خون


انسانی جسم اور جنین کے دوران خون میں فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ جنین پھیپھڑوں کے ذریعہ سانس نہیں لیتا ہے اور نہ نکال سکتا ہے۔

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ناک ایک طرف جنین کے ناف سے ملتا رہتا ہے اور دوسری طرف مشیمہ سے نال میں تین عروق دوسرے ہوتی ہیں۔ ان میں دو شریانی اور ایک وید رہتی ہیں۔ ان شریانی سے جنین کا کثیف خون مشیمہ میں پہنچتا ہے اور وید ٹھنکے تک لوٹ کر جنین کے جسم میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جنین کی اور پل بھی اپنے آخری حصہ میں کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کی دو بڑی شاخیں بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا فعل پیڑ کے جوف کے اندرونی حصوں کی پرورش کرتا ہے۔ اور دوسری کنج ران کے مقام۔ گھومتی ہوئی شکم میں جاتی ہے۔ اس کے بعد پیڑ کے جوف کی شریانی سے دو شاخیں نکلتی ہیں۔ ان میں شریانی ناف کہتے ہیں۔

تمہید تصویر نمبر ۳۵

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ۱۔ دائیں شریان تحت الرقہ | (Right sub-clavin artery) |
| ۲۔ دائیں شریان شریانی | (Right common carotid artery) |
| ۳۔ بائیں شریان شریانی | (Left common carotid) |
| ۴۔ بائیں شریان تحت الرقہ | (Left sub-clavin artery) |
| ۵۔ اور پل شریان اعظم | (Aorta) |
| ۶۔ مجری شریان | (Ductus arterialis) |
| ۷۔ بائیں اذن القاب | (Left atrium) |
| ۸۔ بائیں پھیپھاڑ | (Left lung) |

تصویر نمبر ۳۵



جین میں دورانی خون

(Left Ventricle)	۱۰۔ بائیں قلب
Right Ventricle)	۱۱۔ دائیں قلب
(Right Atrium)	۱۲۔ دائیں اذن القلب
(Right lung)	۱۳۔ دایاں پھیپھا
(Left lobe of the liver)	۱۴۔ بائیں حصہ جگر
(Liver)	۱۵۔ جگر
(Right lobe)	۱۶۔ جگر کا دایاں حصہ
(Portal Vains)	۱۷۔ درید الباب
(Inferior Venacava)	۱۸۔ جوف نازل
(Aorta)	۱۹۔ اوپرلی خیریاں اعظم
(Common Illiac)	۲۰۔ عضلہ وقفہ مشترکہ
(Common Illiac)	۲۱۔ عضلہ وقفہ مشترکہ
(Hypogastric Arteries)	۲۲۔ ناف اور پیٹھ کے درمیان کی دریدیں
(Bladder)	مثانہ
(Placenta)	۲۳۔ مشیمہ
(Umbilicus)	۲۴۔ ناف کی غلطت
(Ectus Vensus)	۲۵۔ نخری درید۔

طیڈ ناف مشیمہ سے خرد ہوتی ہیں۔ اور ناف کے اندر ہوتی ہوئی جوف شکم میں جا کر پہنچتی ہیں۔ اور وہاں سے جگر کے نچلے حصہ میں پہنچ کر کئی جھٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک درید الباب میں مل جاتی ہیں اور دوسری اجوف نازل میں۔ دوسری شاخیں بھی جگر میں جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاص حصہ جگر میں ہے۔ اور تھوڑا حصہ اجوف نازل میں جا پہنچتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجوف نازل میں صاف اور کشیف دونوں طرح کا خون بہتا ہے۔ صاف خون در باب ناف کے ذریعہ آتا ہے اور کشیف جگر، شکم اور ٹانگوں سے ہو کر جا پہنچتا ہے یہ کل خون اجوف نازل کے ذریعہ اذن القلب میں

جاتا ہے جنین کے دونوں اذن القلب کو ملائے والا ایک انڈا نما سوراخ ہوتا ہے خون
اجوف نازل سے اجوف صاعد میں بغیر ملے ہی اس سوراخ کے اندر سے نکل کر بائیں اذن
القلب میں جاتا ہے۔ وہاں سے دشاخ راستہ سے بائیں بطن میں جاتا ہے اور اجوف صاعد
کا خون دائیں بطن میں جاتا ہے۔ جب بطن سکڑنے لگتا ہے تو بائیں بطن کا خون اور نئی میں
جاتا ہے۔ اس وقت ایک چھوٹی شریان کے ذریعہ شریان الریہ اور طی کے محراب کی بنی جاتی ہیں
یہ ایک ایسی جگہ پر ملتی ہے۔ جہاں اور طی سے تین شاخیں نکلی ہوتی ہیں۔ اسی جگہ محراب
بنتا ہے اب بائیں بطن سے خون اور طی کے محراب میں جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے اور
تین بڑی شریانیں کے ذریعہ ورید میں اور دونوں ہاتھوں میں جا کر ان حصوں کی پرورش کرتا ہوا
اجوف نازل میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ خون جو ہاتھوں کی پرورش کرتا ہوا اجوف صاعد یا
اجوف فوقانی کے راستہ سے دائیں بطن میں جا کر ان حصوں کی پرورش کرتا ہوا نیچے
جانیاں اور طی میں مل جاتی ہے۔ اس کا فعل اس طرح ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی پرورش کرتا ہوا جو
خون لوٹتا ہے وہ دائیں بطن میں آتا ہے۔ پھر اجوف صاعد کا خون تین کو اڑولے دے دے
میں جا کر بائیں بطن میں جاتا ہے۔ اس کے بعد دائیں بطن کا خون شریان الریہ میں جا کر
اور طی میں داخل ہو کر اس نے خون سے مل جاتا ہے۔ پھر پٹے کام نہیں کرتے اسلئے شریانیں
کے مقامات سے خون بیدری شریانیں میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سب خون شکم کی اور
طی میں جاتا ہے۔ کچھ نیچے اتر کر پیٹ اور طی سے اور بھی دو ٹی ہوئی شریانیں نکلی ہیں۔ ان کی
دو دشاخیں ہیں۔ ایک ناف کی شریان۔ دوسری بیرونی کچھ ران کی شریان دونوں طی
ہوئی شاخوں میں جاتی ہیں۔ اس کے بعد خون ناف تک تار یک عروق شریہ کی باریک
عروق رمویہ میں جاتا ہے اور اس طرح مصفی خون مذکورہ بالا دستوں سے جنین
کے دل میں پہنچتا ہے۔ جنین میں خون کا ایک اور اسی طرح ہوتا ہے۔

موت

ولادت کے بعد طاقت حیات کی ترقی ہوتی ہے۔ جب ایک معین حد تک پہنچ
ہے۔ تب ترقی رک جاتی ہے اور زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایسی
حالت آجاتی ہے کہ بھر طاقت نہیں رہتی۔ کل آلات اپنا اپنا فعل بند کر دیتے ہیں۔
اور روح اس کہنہ مشیری کو ترک کر دیتی ہے اور یہی موت ہے۔

باب دوسرا

ہومیو پیتھی . علاج بالمثل

علاج کا بیان شروع کرنے سے پہلے ہومیو پیتھی کے متعلق کم از کم موٹی موٹی باتوں کا بیان کر دینا بہت ضروری ہے۔ اس لئے کہ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے میری درخواست ہے کہ اس تمہید کو بغور پڑھیں۔

دوا کیسا ہے؟ جو چیز تندرست جسم کو خراب کر سکتی ہے اور خراب جسم کو تندرست کر سکتی ہے۔ اس کو دوا کہتے ہیں۔ مثلاً سنگھیا، کوفین، ایفون وغیرہ (باب دوا سازی ملاحظہ ہو۔)

ہومیو پیتھی کیا ہے؟ تندرستی کی حالت میں کسی دوا کے کھانے سے جو علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہی علامات اگر بیماری کی حالت میں نمودار ہوں تو اُسی دوا کو نہایت قلیل مقدار میں استعمال کرنے سے اُس بیماری کے دُب جلنے یا دفع ہو جانے کا نام ہومیو پیتھی یا علاج بالمثل ہے۔ مثلاً تندرست آدمی کو تھوڑی سنگھیا کھلا دینے سے مثل ہضم کے دست ماتے اور پیاس وغیرہ علامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ہضم کے مریض کو (جس کو دست و قے آتے ہیں۔) اور پیاس معلوم ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی سنگھیا کھلا دی جائے تو وہ علامات دور ہو جاتے ہیں اور ہضم دفع ہو جاتا ہے۔ تندرست آدمی اگر تھوڑی کوفین کھائے تو اس کے جسم میں لیریا یا جاڑا بخار کے علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کوفین کی بہت قلیل مقدار جاڑا بخار کو دور کر سکتی ہے جسم تندرست رہنے پر ایفون زیادہ کھالینے سے قبض، بے خوابی، یہاں تک کہ بیہوشی بھی ہو جاتی ہے اس لئے ایفون بہت تھوڑی مقدار میں، قبض، بے خوابی، بے ہوشی وغیرہ مریض میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسلئے سیٹھاسمیل بس کیوزسٹر۔ علاج بالمثل ہومیو پیتھی کیا ہے۔

لے بتدیوں کو اموزل پر خوب دھیان دینا چاہیے (۱) بالمثل سے کیا مراد ہے؟ مثل سے

ہو میو پیتی کتنے عرصے سے؟ کم از کم دو ہزار سال پیشتر۔ ممالک ہندوستان اور قدیم یونان میں سیملیا اسمیلس بالمثل کے مذہب کا جادو چل گیا تھا اس کے بعد قریباً کئی برس ہوئے کہ ہینی مین نامی زبردست قوت روحانی رکھنے والے نے دل و جان سے کوشش کر کے اسکو باقاعدہ استعمال میں لاکے اچھی طرح اسکی اشاعت کی جس سے طبی دنیا میں ایک زبردست بل چل چکی اور اسٹ پلٹ ہو گیا اور انکا نام بھی دائمی ہو گیا۔

ہینی مین کون تھے؟ نیا دور لانے والے دھرم پر چلنے والے جناب کرشٹمان فریڈرک سیموال ہینی مین صاحب۔ ۱۸ اپریل ۱۷۷۷ء میں سکس عملداری کے مائی سین شہر جرمنی میں مٹی کے برتنوں کے ایک غریب رنگ ساز کے یہاں پیدا ہوئے۔ بڑی دقت سے انھوں نے کھنا پڑنا کیا۔ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے مٹی کا چراغ بنا کر اس کی روشنی میں رات کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ یونانی، ہبرو، عربی، لاطن، اطالوی، اسپینش، سیرین، فرانسیسی، جرمنی اور انگریزی وغیرہ زبانوں اور علوم طب و کیمیا کے ماہر تھے۔ بات یہ کہ ان میں دو بڑی صفیں موجود تھیں ایک تو مختلف علوم پر عبور دوسرے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر نیکی صلاحیت، یہی وجہ تھی کہ مشہور ڈکٹر ریکٹر صاحب ان کو دو سر کا عجیب آدمی کہا کرتے تھے، ۲۳ برس کی عمر میں ہی انھوں نے ایم۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

۱۸۲۶ء میں اس ہنری ٹیٹا کو لکڑی نامی ایک حسین اور بہتر مندرجہ من دو شیزہ سے شادی کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک وہ ڈرہٹن اسپتال میں بول سر جین کے عہدہ پر

مرا دیا جاتا ہے۔ (Simulus) ذکر "دی" (The same) مثلاً زہر کی مقدار میں اگر سنگھا کھایا جائے اور سینفس کے علامات ظاہر ہوں تو مرنس کو آر سینک یا سنگھا دینا چاہیے۔ روزمرہ کے ایفون کھانے والے کو قیض میں ایفون نہ کھانا چاہیے۔

(۲) دو اسفرد ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر سنگھا دینا بہتر صحت سنگھا بغیر کوئی اور دوا ملائے ہوئے دینا چاہیے۔ اور یکے بعد دیگرے بھی نہ دینا چاہیے۔

(۳) دوا طیل مقدار میں ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر سنگھا دینا ہے تو محل کر کے نہایت قلیل مقدار میں دینا چاہیے۔

۵۷ بقول ڈاکٹر بریڈ فورڈ ۱۸ اپریل کو پیدا ہوئے۔

کام کرتے رہے پھر انھوں نے یہ عہدہ ترک کر کے لپ زنگ شہر کے پاس ایک چھوٹے گاؤں میں رہ کر علاج کرنا شروع کیا۔ اس طرح دس سال باعزت ڈاکٹری کرنے کے بعد رائج الوقت طریقہ علاج کو بے فائدہ تصور کر کے اور سمجھ کر کے اس سے نقصان ہوتا ہے اس مرد مفلنے وہ کام ترک کر دیا۔ اور تنہائی میں بیٹھ کر علم کیمیا کی تحقیقات اور بہت سی سائنس کی کتابوں کا ترجمہ کر کے نہایت مشکل سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے لگے۔ اسی زمانے میں بہت سی مشرقی اور مغربی طب کی کتب مبنی کر کے پچائی کر کے باوقار بیاری میں صاحب نے ناامید ہو کر کہا کہ تمام طریقہ ہائے طب ایک فرسبی شے ہیں مرض کے دور کرنے کی ٹھیک دوا یا تو ہے ہی نہیں، یا ہونا ناممکن ہے۔ لیکن جس شخص کی قسمت میں طبی دنیا میں ایک نیا دوا لانا لکھا تھا۔ اس کے دل میں یہ مشتبہ بات کب تک جگہ پاسکتی تھی بھوڑے ہی دنوں بعد ان کے گھر کو مرض نے اگر گھیرا۔ ان کا جان سے مزہ چھو بیٹھا۔ ایک تو بچہ کی کرب و بھیم اور موجودہ علاج پر بے اعتقاد می مزنا داری و تنگ دستی کی خبر سے یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ جو سنی میں صاحب کو باہوس کئے تھیں لیکن اولاد کے دلدادہ اور مستقل مزاج میں صاحب صرف خداوند کریم پر بھروسہ کر کے مرض کی چار پائی کے قریب بیٹھے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب سماں تھا اسی نیک سائنس میں یہ الہام اور آواز عیمہ ان کے دل میں آئی کہ حکیم مطلق اپنے جسم سے پیاری مخلوق کے مرض دور کرنے کا کوئی درست طریقہ ضرور ہی ٹھیک کر رکھا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی انھوں نے طریقہ علاج کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھایا۔

سلسلہ عین جب وہ کالین صاحب کی خواص الادویہ (میرامیڈیا) کا ترجمہ انگریزی زبان سے جرمن زبان میں کر رہے تھے تو ایک دوا سکونائے بیان سے جس کی تعریف بخار دفع کرنے کی لکھی تھی۔ اطمینان نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس دوا کے مختلف اوصاف پر غور و خوض کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ تندرست آدمی کو سکونا کھلانے سے جاڑا بخار کی طرح کامرٹن پیدا ہو جاتا ہے اس لئے شاید سکونا جائزہ بخار میں فائدہ کرنا ہے انھوں نے خود ہی سکونا کھا کر امتحان کر لیا کہ حقیقت اس کے کھانے

سے کونین سکونائے نکالا ہوا کھار ہے۔ جرمن زبان میں سکونا کو پیاتے ہیں۔

سے مثل جاڑے بخار کے مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اب انھوں نے یہ سوچا کہ سکنونا کی طرح
بیماریاں پیدا کرنے والی اور بیماریاں دفع کرنے والی طاقت دوسری دواؤں میں بھی
ہو سکتی ہے۔ ان کے ان دلی جذبات نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ سیمیلیا بس کیورنٹر
کے راستہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔

اس کے بعد لگاتار ۶ برس کی تحقیقات، ہر قسم کی جانچ، نیز سمت سائنس کا مطالعہ
اور خود متعدی زہریلی ادویات کھانے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہومیو پتھی اصل
پہلے ہی چوٹی پر نہایت مضبوطی سے رونق پذیر ہے اور اسکی بنیاد فرضی نہیں ہے پہلے جو
جو شاخ سے گرتا ہے نیچے زمین پر کیوں آتا ہے اور کیوں نہیں جاتا، اسکے جواب کی تحقیقات
کرتے کرتے جس طرح عاقل نیوٹن نے قوت کشش کا پتہ لگا کر مادہ کے سائنس کی بنیاد تیار کر لی تھی۔
اسی طرح سکنونا طیر یا کو کیوں ڈنڈا کرتا ہے؟ اس سوال کو حل کرتے کرتے قابل معی میں صاحب
علاج بالمثل کا طریقہ تلاش کر کے علم طب کو سائنس کے زمرہ میں لے آئے۔

۶ برس کے تلاش و تجربہ کے بعد ۱۸۱۷ء میں ہونے لیدیس جرنل میں جو اس زمانے کی
طبی دنیا میں بہترین رسالہ سمجھا جاتا تھا ان کا ایک مضمون شائع ہوا۔ ان کے اس بالکل نئے
خیال کی اشاعت ہوتے ہی چاروں طرف ایک ہل چل پیدا ہو گئی۔ سچائی کے دلدادہ بہت سے
قابل ڈاکٹر ان کے شاگرد ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے خود غرض اور کچھ فہم ڈاکٹر
ان کے مخالف بھی ہو گئے۔ مگر جس مستقل مزاج شخص نے سچائی کے راستہ پر قدم رکھا وہ کیا ان
موافق اور مخالف ہواؤں سے اپنے راستے سے ہٹ سکتا تھا۔ ۱۸۵۰ء میں انہوں نے ایک
کتاب موسوم بہ فریگنڈا ڈی وری بس (*Fragmenta de Viribus*)
لاٹینی زبان میں طبع کرائی۔ ان میں ان ہی امور کا بیان کیا ہے کہ تندرست آدمی میں ۲۷
ادویات کے استعمال کرنے سے کون کون سے علامات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی سب سے پہلی
ہومیو پتھک ٹریٹیا میڈیکا خواص الادویہ ہے ۱۸۵۰ء میں ایک بڑی کتاب موسوم بہ
آرگننڈا شائع ہوئی۔ اس قیمتی کتاب میں جس طرح علاج بالمثل کا بیان لا جواب اور
تعجب خیز طریقہ سے کیا گیا ہے۔ اس طرح اس رائج الوقت طریقہ سے علاج مثلاً قصد و
بولاب وغیرہ وحیانا طریقہ کی مذمت سخت الفاظ میں کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان
کے مخالفین جامہ سے باہر ہو گئے اس کے بعد ۱۸۵۲ء میں جب وہ اپنی قابلیت کی

جلد دفع کر دیتی ہے (اگر گین پیرا ۲۶۹۔ اور اس کتاب میں دوا سازی کا بیان ملاحظہ ہو) ۱۳۱۶ء میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ۸۰ برس کی عمر میں انھوں نے دوسری شادی کر کے زندگی کے باقی ۸ برس فرانس کے دار السلطنت پیرس میں گزارنے۔ اس نئی بیوی کا نام میلانی تھا۔ اس حسین دانا اور اعلیٰ خاندان کی امیر فرانسسی عورت نے جب ہنری مین کی تعریف سنی وہ شعلہ بدل کر شہر فرسین گئی اور اس پس رسیدہ ڈاکٹر کی فراست اور صلاح میں کمال دیکھ کر

۱۳۱۶ء ان کی اس آسان اور مدلل ترکیب (دوا کو لطیف حالت میں اگر منتشر کرنا اور اس کے اثر کو ابھارنا) ڈاکٹر مائزیشن کو مادہ پرستوں نے محض کپ کہہ کر ٹال دیا۔ تاہم ایکن اس میں شک نہیں کہ اس توہرے کے عرصہ میں بھی دلیلوں سے انکو غلط ثابت ذکر کے خوش قسمتی سے انیسویں اور بیسویں صدی میں قوت روحانی کی طرف لوگوں کا خیال رجوع ہوا۔ (مقصد الف ملاحظہ ہو) انیسویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر گیگ نے یہ دیکھ کر کہ ہنری مین کا بیان کیا ہوا ڈاکٹر مائزیشن کی دوا کی ترکیب سے دوا کو تقبیل کرنا اور اس کے اثر کو ابھارنا، کے پڑھنے والوں کے سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔

پیرس کا گٹر لیس میں جو کچھ تقریر کی تھی اسکو مختصر آذیل میں درج کیا جاتا ہے (ڈیکلایر ایریل ۱۹۱۶ء ملاحظہ ہو) ہر مرکب شے کے ذرات (جیسے ملک کوہر ایڈ آف سوڈیم) اپنے سے ہزار گنا انکوائ کے ساتھ گلے پر اس کے ہر ذرہ میں برقی قوت آجاتی ہو اس تبدیلی کا نام ذروں کا علیحدہ اور منتشر ہونا ہے (dissociation of molecules) ہونا ہے۔ یہ ذرے

غیر متحرک (PASSIVE) رہتے ہیں۔ لیکن کیمیائی ترکیب سے ان میں وہ برقی قوت ابھر آتی ہے جو پہلے غفی تھی۔ وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ گویا جیتی جاگتی قوت بن جاتی ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ بدوہ بالاسیاں (سولیوشن) یا مرکب شے میں گویا ایک نئی طاقت بھونک دی گئی ہو۔ ۱۳۱۶ء اس شہر کے مذاق قیام میں یہاں کے اکاڈمی آف سائنس کے معززا صحابہ علمہ تعلیم کے منسٹر اور پالیٹیشن جناب گرو صاحب نے ہنری مین صاحب کے اصول کی اشاعت روکنے کے لئے درخواست کی۔ اس وقت اس مشہور عالم نے جواب دیا کہ ہنری مین ایک غیر معمولی شہرت والے ہیں۔ سائنس کا پیشہ عام سمجھے جارہا ہے۔ اگر ہونیو تھیک میں اصلیت نہیں ہے تو وہ خود بخود معدوم ہونے لگی اگر اس کی بنا سائنس ہے تو اس کی اشاعت عمر زری ہوگی۔ اور اشاعت میں مدد دینا ہمارے اکاڈمی میں شہر کی عادت ہے۔ اس کے بعد ہنری مین کو بھونکے ہم ہیں آئیں کہتے ہیں۔

انہی پر فریقہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے شادی کر لی۔ اس نئی بیوی کے مشورہ سے منصف مزاج بنی میں نے اپنی لہجہ کے لئے ایک معمولی رقم تین ہزار روپیہ کی رکھ کر باقی سب جائداد لاکھوں روپیہ اور دو آدھ ستمہ مکانات، متوفی سے پیدا شدہ لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کی زندگی نصیحتوں سے پُر ہے۔ ان کی زندگی کا ہر دور یعنی لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، کسی دیکھی نصیحت سے پُر ہے۔ ان کی محنت، محنت، علم کا شوق، عوام کے فائدے کے لئے، مائیں کی دلچسپی، استقلال، سچائی کی محبت، شرافت اور انکساری وغیرہ اچھے اوصاف ہم لوگوں کے لئے قابل تقلید ہیں۔ وہ وحدانیت کے قائل تھے۔ اور خدا کی رحمت پر ان کو پورا بھروسہ تھا۔ یہ بات ان کی زندگی کے وقت تک قائم رہی۔ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ان کی دلی جو شس ان کو نا اُمیدی کے تاریک کوئیں سے علاج بالمثل کے روشن میدان میں لے آیا۔ انھوں نے اپنے عقیدہ کی نظر سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس صدائے حق سے دنیا کے لوگ بیدار ہو جائیں گے۔ ۲ جولائی ۱۸۹۷ء میں یہ بانی علاج بالمثل اپنے مقصد زندگی کو پورا کر کے اس دار فانی سے عالم جاوداتی کو سدھارا۔ انتقال ہونے کے وقت انھوں نے قریب دو لاکھ پونڈ یا تیس لاکھ روپیہ کی جائداد چھوڑی (کلکتہ انگلش می مورنر ۳۰ ستمبر ۱۹۲۲ء ملاحظہ ہو۔)

آپ کی لاش (MONTMARTRE) مونٹ مارٹری قبرستان میں دفن کی گئی۔ اس کے بعد ۱۸۹۹ء میں وہاں سے نکال کر نہایت عزت کے ساتھ پیری لائٹر قبرستان میں دفن

۱۷ آخر وقت جب وہ عرصہ سے دردِ سینہ اور سانس کی تکلیف سے بہت پریشان تھے۔ ایک ان کی بیوی نے کہا کہ جب آپ دوسروں کی تکلیف دہ کرنے کیلئے اتنے دنوں سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو خدا آپ کو اس خوفناک تکلیف سے نجات دینے کے لئے ضرور ہی رحم کرے گا۔ اس بات کے سکتے ہی اس قریب الحسب ضعیف کے زندگی کا ٹھکانا ہوا چراغ ذرا دیر کے لئے روشن ہو گیا۔ جوانی کا جو ش نوٹ آپ انھوں نے سنجیدگی اور سکون قلب کے ساتھ اور پر جوش ہمہ میں جواب دیا۔ اے قانون میں اس طرح کی تکلیف سے نجات پانے کی کیسے امید کروں۔ خدا نے تمام انسان کو اپنا کام سرانجام دینے کی طاقت بخشی ہے۔ ہمارے کام کو دیکھ کر دنیا جیسا خیال کرتی ہے۔ لیکن خدا کا خیال کچھ اور ہی ہے۔ خدا کسی کام میں ہمارا مشکور نہیں ہے۔ بلکہ ہم ہی تمام کاموں میں خدا کا مشکور ہیں۔

کی گئی۔ اس آخر مکہ میں اُن کی قبر کا تعمیر اور امریکہ کا شہر واشنگٹن میں ان کی یادگار کی عمارت ان کے شاگردوں اور دوستوں کی گہری محبت اور عقیدت کا ثبوت ہے۔ ۱۸۵۱ء میں اُس شخصیت اعظم کے ہم وطنوں نے اُن کے اداسی عمر کی مرز میں شہر رپ رنگ میں اُن کی برنجی شبیہ نصب کر کے اپنے گناہوں کا کافارہ ادا کیا ہے (ہنی میں یس مصنفہ البرٹ براؤن فور وٹلاف آف ہنی میں میکس ہٹری آف ہو میو میٹھی مترجمہ ڈاکٹر اے۔ ای۔ ڈایڈیل رٹس ای میڈی کس، ڈچین کا لکچرر آف ہو میو میٹھیک مجبر کا ان سائیکلو پیڈیا (آرٹیکل) ہنی میں اور ہو میو میٹھی، کلاک کارپولیشن ان میڈلین، دی ہوم ورلڈ، جنوری ۱۹۵۱ء، ڈاکٹر سرکار کا پریسیڈنٹیل ایڈریس ۱۸۸۷ء اور ہو جیز کا ہنی میں، ایس۔ آ۔ میڈیکل فلاسفر ملاحظہ ہو۔)

علاج بالمثل اپنے اشاعت کرنے والے کے ساتھ ہی مستحکم ہو گیا۔ اور اس کی پیشانی میں غیروانی حروف میں لکھ گیا کہ حق کی فتح! مرحبا کم یوگی ہی میں۔ آپنے ناقابل برداشت ریاضت کے ذریعہ سے مرض دفع کرنے کا راستہ تلاش کر کے کل بنی نوع انسان کو جو غیر معمولی فائدہ پہونچایا ہے۔ اُسے یاد کر کے کون شخص ایسا ہے جس کے دل میں آپ کی عظمت کا سکہ نہ بیٹھ جاتا ہو۔ بنی نوع انسان کی بھلائی کی خاطر آپنے اپنی مرضی سے بغیر کسی پس و پیش کے زہر قاتل کھالیا۔ زہر کھانے سے موت ہوتی ہے۔ لیکن خدا کے عجیب کرشمہ سے آپ کا بال بیکابھی نہ ہوا۔ سخت زہر کھا کر تریاق کا پتہ لگایا۔ جب تک چاند اور سورج قائم ہیں آپ زندہ جاوید رہیں گے۔ اے حکیم مطلق آپ ہی کی رحمت سے زہر قاتل تریاق میں تبدیل ہو گیا۔ آج جرمنی، فرانس، اسٹریا۔ اٹلی، انگلینڈ، امریکہ اور اسٹریلیا۔

۱۵۔ حال ہی میں رسالہ لیبیٹ میں جو انگلستان میں ایلوپتھیک کا بہترین رسالہ ہے۔ ان مضمون کی اشاعت کی ہے کہ ہو میو میٹھی طریقہ سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ روی ہوم ورلڈ جنوری ۱۹۲۳ء صفحہ ۵۶۵ اور رسالہ لیبیٹ ملاحظہ ہو (بقیہ صفحہ ۹۲ پر)

وغیرہ تمام ہند ملک آپ کے ایجاد کے ہوئے طریقہ علاج کے سامنے سر تسلیم خم کر کے
 اکتوبر ۱۹۲۲ء میں ۲۲ ہومیو پیتھک طبی کالج اور ۱۰۳ اسپتال ہیں۔
 جس سے تقریباً چھ ہزار مریض مستفید ہوتے ہیں۔ جو آپ کے لئے تحسین کے نعرے بلند کر رہے
 ہیں۔ ناجد رلال دت، سکریٹری آف اسٹیٹ کی کونسل کے سابق برید من بلگر ائی ائی ائی
 کے ڈاکٹر بریج، بنگال کے عدلیہ بہا ہند رلال سرکار غریبوں کے خادم اور سابق تعلیم
 فائز میڈ (عیسائی) وغیرہ زیر دست ہستیوں نے نہایت سعی و کوشش سے بنگال کے ہر
 شہر و دیہات میں اودھندوستان کے اکثر مقامات میں آپ کے فتح کے جھنڈے کو لہرا رہا ہے۔

(Proving the pudding by the eating, it
 would be difficult to say in the present state
 of Allopathic pharmacology that this (i.e.
 the Method Similia Similibus Curentur) is
 essentially wrong. With a few exceptions
 the more Orthodox therapy has foundations
 which seem scarcely firmer, and in any case
 the motto in certis unitas, indubus libertas
 in omnibus charitas is a good rule of life
 (The Hom. World for January 1923 Lancet)

لے یہاں یہ کہہ دینا بہت ضروری ہو کر ۱۸۲۵ء میں پشور پنجاب ہمارا جو رنجیت سنگھ کے شاہی طبیب
 (جو من ڈاکٹر) ہنگ چارج نے سب سے پہلے ہندوستان میں اور ۱۸۵۸ء میں گلگتہ کے سابق ہتھہ ایفیر
 (فریج ڈاکٹر) ٹرنر صاحب نے سب سے پہلے بنگال میں ہومیو پیتھک کی اشاعت کی کوشش کی لیکن برصغیر
 سے ان میں سے کسی کی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ اسکے بعد شہرہ نڈت محکم رقم الشوری خیر رو دیا
 سنگھ کے فرشتہ خصلت بھائی دین بندھو نیلے رتن (اور ان کے شاگرد نو دودھ بھاری بندو پادھیائے
 نو گوپال گھوش، ششی بھوشن، سو اس، واسٹر پیارے، چون مرکار، کانی کرشن مترسان، پدمہ ساٹا، کٹر
 ہندی لال بھادری، قابل یادگار بھو دیو، کھوپا دھیما وغیرہ عالموں نے بنگال میں اودھندو
 مزاج کو کتنا متاثر کیا۔ ہمارے میں ہومیو پیتھک پھیلانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ عظیم الشان
 ہستیوں کے لئے چل سکیں۔ لیکن اگر عالم جاوداۃ اور عالم فانی میں کچھ فرق ہے تو ہمیں
 قائم کیا ہوا ہومیو پیتھک کا پودا بنگال کی مزمین میں جو بیماری کا گھر ہے ایسا سرسبز اور بارشدار

جب قدرت کی جانب سے آپ کی پیشانی میں نچ لکھ دی گئی تو سانس کے ناپائیدار
 بٹمانہ طریقہ علاج کے مغرور علموں کی کیا مجال ہے کہ کسی دنیاوی طاقت کے ذریعہ سے
 اس شہرے مرد کو مٹا سکیں اور قدرت کے ارادوں میں دخل دے سکیں۔ اس چشمہ
 حق کے بہاد کو روکنے کے متعدد شاہوں کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ ہر ایک ملک
 کی ہومیو پتھک تاریخ زبان حال سے اسکی تصدیق کر رہی ہو (ٹرن زکشن انٹرنیشنل ہومیو پتھک
 کانگریس ۱۹۷۷ء سے ہر پانچویں سال منعقد ہوا کرتی ہے۔ ملاحظہ ہو)۔

اے نیک نیت آپ نے بڑی دریافت اور غور و خوض سے اس طریقہ علاج کو کتاب
 کی صورت میں پیش کیا۔ گویا دیدیا کو کوڑہ میں بند کیا ہے یا شاید کسی زبردست دیتا نے
 آپ کو غیبی مدد دی تھی۔ اے بہادر ہنر مند کیا آپ نے کبھی یہ خیال بھی کیا تھا کہ اتنی قلیل مدت
 میں سچائی کا تخت بلا ایک قطرہ خون پہلے بلند ہو کر حد کمال کو پہنچ جائے گا جو ایک
 ناممکن سی بات معلوم ہوتی تھی۔ لیکن دیکھئے وہی ناممکن بات ممکن ہو گئی صرف ایک حد
 میں قصداً، جراحی وغیرہ وحشی طریقہ ایک دم سے دور ہو جانا اور شوہر صاحب کی بابو کیک
 پوسٹے اور صاحب کا انٹی ناکسٹ رائٹ صاحب کا ایسوخن اور کوئٹن صاحب کا آئی سو
 ٹانکس پلازما، وغیرہ نئے طریقہ ہائے علاج کی اشاعت اور عام فہم اصولوں نے انہ
 عجیب و غریب کرشمے دکھا کر آپ کی شہرت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اے دُنیا کو
 تریا فی فیض پہنچانے والے آپ نے سری مہادیو جی کی طرح دہر قائل کھا کر علاج تلاش

ہوا ہے۔ اور اس قدر آب حیات کے پھل لگ رہے ہیں کہ بہت میں ان کی رو میں بھی اس کو
 دیکھ کر خوش ہوتی ہوں گی۔ دکن میں ایکسٹنشن کے قائم کئے ہوئے ہومیو پتھک ہسپتال۔
 گوڑھیوں کا ہسپتال، بلیک کا ہسپتال۔ ہزاروں عربوں کو موت کے منہ سے بچا رہے ہیں۔
 اس سے خوش ہو کر سرکار ہند نے اسکے قائم کرنے والے کو ۱۹۷۷ء میں قیمر ہند کا تمغہ عطا کیا۔
 اور جرمن سرکار نے بھی اسی طرح عزت افزائی کر کے ہومیو پتھک کی شہرت میں اضافہ کیا (کیمیکل ٹیکس
 ۱۹۷۸ء گسٹ ۱۹۷۸ء ملاحظہ ہو)۔ اسی ہر دلعزیز ہستی نے سب سے پہلے کم قیمت میں ہومیو پتھک
 دوا کے فروخت کی مثال قائم کی تھی ۱۹۷۶ء میں انتقال کر گئے اس وقت بھی رضا کار مہنجران
 کے کام میں گئے ہیں (اسٹیس میں سورند۔ مارنومبر ۱۹۷۷ء ملاحظہ ہو)

کر لیا اور ناہ عام کے لئے جو سیدھا اور آسان راستہ آپ نے دکھا دیا ہے۔ اس کے لئے موجودہ اور آنے والی نسل ہمیشہ آپ کی مشکور رہے گی۔

مقصد دوا سازی

دوا اور بدرقہ۔ لوہ (فریم) مشک (ماسکس) بھنگاگ زہر (اکونائٹ) وغیرہ بہت سی چیزوں میں مرض کو پیدا کرنے اور دفع کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ انکو دوا کہتے ہیں۔ صاف کیا ہوا مقطر پانی (ڈسٹیلڈ واٹر) الکول۔ دودھ کی شکر چھوٹی اور بڑی گولیوں وغیرہ میں مرض پیدا کرنے اور دفع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی مدد سے دوا تیار کی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے اس لئے اسکو بدرقہ کہتے ہیں۔

دوا دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ دوا کا جوہر (یعنی مرض کو دفع کرنے والی طاقت) دو طرح سے محفوظ رہتی ہے۔ سفوف اور سیال کی صورت میں۔

۱۔ سفوف :- لوہ وغیرہ سخت چیزیں جو آسانی سے گلتی نہیں ہیں۔ انھیں دودھ کی شکر کے ساتھ خوب کھل کر کے سفوف کر دیا جاتا ہے۔ ایسے سفوف کو بڑی چوراشی کہتے ہیں۔ لیکن سفوف کرنے سے پہلے اس کو بے وغیرہ کا نام خادم دوا ہے۔

۲۔ سیال :- بڑی بوتلیوں کے دس پچوڑ کے الکول میں ملا دیتے ہیں۔ اس مرکب کو سیال یا ٹنچر کہتے ہیں۔ اس پچوڑ سے ہوئے عرق میں اصلی چیز کے سب اثرات موجود رہتے ہیں (الکول کے ساتھ ملنے سے یہ بہت عرصہ تک خراب نہیں ہوتی۔ اس لئے اس سیال کو مد رٹنچر کہتے ہیں۔ جس کا نشان یہ ہے۔

تقلیل :- اصلی دوا یا مد رٹنچر کو دودھ کی شکر یا الکول میں رکھنے یا حل کرنے سے قلیل سے قلیل مقدار میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس ترکیب کو تقلیل (ذرات توڑنا) کہتے ہیں۔ مثلاً خام دوا (سونابا پارہ۔ کوئلہ) کا ایک حصہ جو حصہ دودھ کی شکر کے ساتھ ملا کر رکھنے سے مد رٹنچر یا بڑی چوراشی تیار ہوا (جس کا نشان x_1 یا x_2 ہے۔ خادم دوا کا ایک حصہ دودھ شکر کا ۹۹ حصہ کے ساتھ حل کرنے سے پہلے سوالی تقلیل ٹیوٹیشن تیار ہوتا ہے۔ اس طرح پہلے کی تقلیل سفوف یا سیال ہوتا ہے۔

حصہ اور دودھ کی شکر یا الکول ۹ حصہ یا ۹۹ حصہ کے ساتھ ملائے یہ سنی اور ترکیب

دسویں یا سوویں تقلیل تیار ہوتے ہیں۔ خاص خاص جگہوں پر دسویں یا سوویں تقلیل تیار کرنے میں اس اصول سے کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ اگر دسویں تقلیل بنانا ہے تو دوا کے نام کے بعد "x" لکھنا چاہیے۔

جیسے چائنا "x۳" = چائنا "۱۰ دسویں تقلیل" اور سوویں "۱۰ تقلیل" بنانا ہو تو دوا کے نام کے بعد صرف ہندسہ ہی لکھ دینا کافی ہے۔ جیسے چائنا "۳" = چائنا ۳ سوویں تقلیل تقلیل دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول سیال، جس کو ڈائلیوشن کہتے ہیں؛ دوسرے سفوف، جس کو ٹری جوالیشن کہتے ہیں۔ (دوا سازی کے بارے میں اگر خاص باتیں معلوم کرنا ہو تو ہماری کتاب "ہشج" دھان گرنتھ " خوب جی لگا کر پڑھنا چاہیے۔

ادنیٰ، اوسط، اعلیٰ تقلیل x۱، x۲، x۳، x۴، x۵ - یہ ادنیٰ تقلیل ہے۔

۱۲، ۱۸، ۲۰، - یہ اوسط درجہ کی تقلیل ہے۔

تسو، دوتسو، یہ اعلیٰ درجہ کی تقلیل ہیں۔ اور پانچسو (ڈی D) ایک ہزار ۱۰۰۰ (IM) ۱۰۰۰ (IDM) ۵۰۰۰۰ (DM) ۱۰۰۰۰ (MM) وغیرہ نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی تقلیل ہیں۔ امریکہ کے ہومیوپیٹھک فارماکوپیا کے مطابق x۱ - ۳۰ تک یہ ادنیٰ درجہ کی ہیں۔ اور ۳۰ کی طاقت سے اوپر اعلیٰ درجہ کے ہیں۔

ایک قطرہ دوا سے کیوں فائدہ ہوتا ہے کم سے کم اس لطیف قسم میں تقلیل کی ہوئی دوا کے اندر دلی قوت زیادہ ہوجاتی ہے (تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو دوا سب سے زیادہ قلیل مقدار میں تقلیل کی جائے گی۔ اس کی قوت دافع مرض بڑھ جائے گی) ویدیک میں سونا دافع مرض کی زبردست دوا ہے۔ کیونکہ وہ نہایت قلیل مقدار میں تقسیم کیا جاتا ہے

۱۰ "ہر دوا میں ایک قطرہ ڈالا اور گنگا ساگر میں پیا۔" یہ ہے علاج پاشل جو ہومیوپیٹھی کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے اصحاب کو عقیدہ (۱) تقلیل کا بیان ملاحظہ کرنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیٹھک دوا غرض اس پر عقیدہ رکھنے سے فائدہ کرتی ہے کیا میں ان سے بادیہ یہ پیچھ سکتا ہوں کہ شیر خوار بچے اور بے زبان والے جانور غرض فلاح عقیدہ رکھنے سے ہومیوپیٹھک کے علاج سے اچھے ہوجاتے ہیں۔

”اودھتی“ کے طریقے سے تیار کی ہوئی دوا بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، نمک، چونا، سونا، گندھک، مشک، دھتورا وغیرہ مادی اشیاء اور نیا آتی دنیا کی بہت سی چیزیں ہومیو پیتھک طریقہ سے تقطیل کی ہوئی جب ان کے ذرات تقسیم کر دیئے جاتے ہیں۔ تب ان کی دفعیہ مرض کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ متعجب ہو جاتے ہیں۔ یہی طاقت مریض کے جسم میں جاتے ہی بجلی کے مانند کام کرتی ہے۔

(آرگینن پیرا ۱۲۸، ۲۶۹- ملاحظہ ہو) اس لئے ایک قطرہ ہومیو پیتھک دوا مثل آپ حیات کے مرتے ہوئے جسم میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہے اسی لئے ان سوسالوں کے اندر علاج بالمثل کی اتنی عزت تمام دنیا میں ہوئی ہے۔

تقطیل یا دوا کو حل کر کے طاقت بڑھانا: طریقہ تقطیل کے مطابق تیار کی ہوئی ہومیو پیتھک دوا کی طاقت دافع مرض بڑھ جاتی ہے۔ اس تقطیل کی جگہ طاقت استعمال ہوتا ہے (ڈرگ انرجی) یا ڈرگ پوٹنسی، جیسے چائنا جھیٹ طاقت کا کہنے سے مراد ہے۔ چائنا تقطیل کیا ہوا، عالم و فاضل مشہور ڈاکٹر اٹلین وغیرہ نے لفظ (ڈائیزیشن) تقطیل کے بجائے (پوٹنسی) ”طاقت“ استعمال کرنے کی صلاح دی ہے۔ (دی نارتھ ویسٹرن جرنل آف ہومیو پیتھی جولائی صفحہ ۵۰۰ ملاحظہ ہو)۔ یہ بیجا نہ ہو گا۔ کہ مرض عضوی آرگے نمک اور مرض فعل نمک مثل جو اعضا وغیرہ کی خرابی سے ہوتی ہیں کافرین بنا کر مہنی میں صاف نے علم علاج کو ٹھیک ڈالنا کس یعنی دوا کی طاقت کو ابھارنے کے طریقہ میں بدل دیا ہے (دہلی میں صاحب کا آرگینن پیرا ۱۹۳ اور ایکڑ دار مارچ ۱۹۲۷ء صفحات ۱۲۵-۱۲۷ ملاحظہ ہو) ایک بات اور بھی ہے اس ہومیو پیتھی کی بیرونی کر کے آج کل ”علاج آب خون“

لہ سائنس میں زور (FORCE) اور قوت (ENERGY) ایک چیز نہیں ہے۔ مصنفہ جیسا سوای زبانی صفحات ۱۳- اور ۱۵ اور اسی کتاب کے آخر میں مصیمہ تعریف ۱۰۲ و ۱۰۸ میں الفاظ زور اور قوت ملاحظہ ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سے انگریزی اور ہنگری زبان کے سائنس کتابوں میں یہ دونوں الفاظ ایک معنی میں استعمال ہونے کی وجہ ناظرین کو پریشان اٹھانی پڑتی ہے دوسری کتابوں سے اس کتاب میں جو حقے لئے گئے ہیں ان میں بھی کہیں کہیں یہ نقص دکھائی دیکھا۔ لیکن ہم مجبور ہیں۔ دوسروں کی زبان بدل دینا ہماری طاقت سے یا ہر ہے۔

(Vaccines) جو (Anti Toxin Treatment) یا (Sera) (Serum Therapy) کے مجموعہ فعل ہوتا ہے وہ بھی ادویات (Dyna-mical) - ٹائنا میکل، یعنی قوت ابھارنے والے طریقہ سے بنائے گئے ہیں۔

دوا کے استعمال کا بیان

اُن ہومیو پیتھک دواؤں کے نام جو روزمرہ استعمال میں آتی ہیں۔ جن ہومیو پیتھک دواؤں کا استعمال ہم لوگ عموماً کرتے ہیں اُن کے نام اور طریقہ استعمال کے لئے کتاب ہذا کے چوتھے مقصد کا دوسرا باب فہرست ادویات ملاحظہ ہو۔ جو ادویات مندرجہ فہرست کھلانے کی ہیں۔ ان میں آرنیکا۔ کیسلنڈولا۔ ہیپامیلس وغیرہ کھلانے اور لگانے یعنی داخلی اور خارجی دونوں کام میں آتی ہیں۔ ۲۲ ہومیو پیتھک مخصوص ادویات کی میٹر یا میڈیکا۔ چوتھے مقصد کے باب اول میں درج ہے۔

استعمال خارجی ادویات۔ ہومیو پیتھک اصلی دوا (مدیکم) ایک حصہ پانی، تیل، صابن، چربی یا موم وغیرہ ۸ حصے ملا کر عرق (نوشن) مالش یا طلاء (یعنی منط) خارجی استعمال کی ہومیو پیتھک ادویات تیار کی جاتی ہیں۔

ادویات کس طرح رکھنا چاہئے۔۔۔ دوائیں معتبر دکان سے خریدنی چاہئیں۔ کیونکہ سمجھنا ناممکن ہے کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی۔ جس کمرے میں دوا کا کبس رکھا جائے وہ سوکھا صاف سمجھنا ہونا چاہئے۔ دھوپ گر کے ذرات تیز ہو اور دھواں کبس کے اندر نہ جانے پائے عرق کا نور، ایلو پیتھک دوائیں تیز ہو دار چینی یا خوشبودار اشیاء کبس کے پاس نہ رکھنا چاہئے۔ ایک شیشی کی دوا یا کارک دوسری شیشی میں رکھنا یا لگانا منع ہے۔ اگر مکان دھوپ والا ہو تو دوا کا کبس دوسرے کمرے میں رکھنا چاہئے۔

ادویات کا استعمال کیسے کیا جائے۔۔۔ سفوف منہ میں ڈال لینا چاہئے۔ عرق بقیہ کے ساتھ دینا چاہئے۔ اگر مقطر پانی (ڈسٹلڈ واٹر) نہ ہو تو صاف پانی کے ساتھ عرق دینا چاہئے۔ اگر صاف پانی بھی نہ ہو تو چھوٹی یا بڑی گولیوں یا دودھ کی شکر کے ساتھ عرق استعمال کرنا چاہئے۔ دوا کھانے کے پہلے منہ اچھی طرح صاف کر لینا چاہئے۔ کانگ کے بیچ میں شیشی کا منہ لگا کر دوا ٹپکانی جاتی ہے۔ ورنہ قطرہ ٹپکانے والے آلہ سے دوا

دانا چاہئے لیکن ہر مرتبہ قطرہ پیکانے سے پہلے اُس آلہ کو گرم پانی یا اسپرٹ سے صاف کر لینا چاہئے۔ عرق کو دوا پتھر، چینی، مٹی یا شیشہ کے برتن میں پینا چاہئے، پیرانے انیل۔ البوی نم، بالوہے وغیرہ کے برتن میں بھول کر بھی دوا کھائی جائے۔

دوا کی مقدار خوراک:- مریض کی عمر اور اُس کی حالت کے موافق دوا کی مقدار قائم کرنا چاہئے۔ معمولی طور سے پوری عمر والے آدمیوں کے لئے ایک قطرہ عرق ایک تولہ پانی کے ساتھ دینا چاہئے۔ گویاں دو۔ چھوٹی گویاں چار۔ سفوف ایک گرین لٹروں کے لئے، ایک قطرہ عرق، ایک تولہ پانی کے ساتھ دو مرتبہ دینا چاہئے۔ گولی ایک۔ چھوٹی گولی دو۔ سفوف نصف گرین، چھوٹے بچے کے لئے۔ ایک قطرہ عرق دو تولہ پانی کے ساتھ چار مرتبہ دینا چاہئے۔ گولی نصف۔ چھوٹی گولی ایک۔ سفوف چوتھائی گرین۔

کتنا وقفہ دے کر دوا دینا چاہئے:- شدید مرض میں ایک۔ دو تین، یا چار گھنٹے کا وقفہ دے کر دوا کھلائی جائے۔ مہلک امراض میں دس۔ پندرہ، بیس یا تیس منٹ کا وقفہ دیکر دوا کھلائی جائے۔ امراض مزمن میں روزانہ یا ہفتہ میں ایک مرتبہ۔ یا دو مرتبہ دوا دینی چاہئے۔ امراض حاد میں منتخب دوا تین مرتبہ دینے سے اگر فائدہ نہ کرے تو اسی کو دوسری طاقت میں دینا چاہئے۔

دوا دینے کے متعلق کچھ ضروری باتیں:- دوا یا زیادہ ہو موی تھیک ادویات ایک شیشی میں ملا کر نہیں دی جاتیں۔ ایک ہی دوا ایک مرتبہ دی جاتی ہے۔ اگر ایک بارگی ایسے علامات ہوں کہ دو دواؤں کا دینا ضروری معلوم ہو تو یکے یا دیگرے دینا چاہئے۔ (پرنسپل انیڈ پر کلیٹ صفحہ ۱۰۸۔ ۱۱۴)۔ مصنف ہوز صاحب ملاحظہ ہو لیکن ڈنہم صاحب اور دوسرے سرکردہ ماہرین یکے بعد دیگرے دوا دینے کی اصولی صورت پر شدید مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کی ہے۔

صبح نہار منہ دوا کھانے کا وقت نہایت اچھا ہے۔ اگر کئی مرتبہ کھانا ہو تو غذا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ بعد دوا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ بعد پانی، تباکو، یا انیون کھانے میں کچھ نقص نہیں ہے۔ بخار میں جب جسم کی گرمی کم ہونے لگے تو دوا دینی چاہئے۔ مہیتر یا تشنجی وغیرہ امراض میں نوبت کے وقت ہی دوا دینی چاہئے۔ اگر کسی دوا سے فائدہ معلوم ہو تو جب تک فائدہ ہوتا ہے۔ دوا دینی چاہئے۔

ایلو مچھک۔ آہور ویدک، یونانی یا کسی اور طرح کے علاج کے بعد اور ہومیو پتھک علاج شروع کرنے کے قبل یا بعد ہومیو پتھک دوا دیئے جانے کے بعد درمیان خیراک کی کمی فرمایا مکس و امیکا ۳۰۔ دینا چاہئے۔ اس کے بعد ضروری منتخب دوا دینی چاہئے۔

مددگار علاج :- دوا دینے کے ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی ادرو کو شش کرنے سے علاج میں بہت مدد ملی جاسکتی ہے۔ جیسے پھوڑا ہونے پر اسی راکھ یا نیم کی پولش یا ندھ کر چکانا اور پھر چاک کرنا مناسب ہے۔ دوا کھلانے سے اگر دست نہ ہوں تو نیم گرم پانی میں صابن گھول کر پچکاری دینی چاہئے۔ اگر کسی مرض کی وجہ سے پیشانی گرم ہوگئی ہو۔ یا شدت کا دوسرا

سہ آج کل ہم لوگ تخم بالنگا۔ اسی کی پولش بالکل نہیں استعمال کرتے، بڑی کوشش سے ہلوگوں کو معلوم ہوا کہ ہر قسم کی پولش کے عوض خوب گرم کلینڈیو لائوشن کا فارمی استعمال یا سینک (فونین میں) بہت پر اثر ہے۔ کلینڈیو لائوسف ڈرام (یا تیس قطرے) آدھ آونس خوب گرم پانی میں ملا کر کلینڈیو لائوشن تیار ہوتا ہے۔ چھوڑا صاف کپڑا لیکر تہہ بہ تہہ کر کے گرم کلینڈیو لائوشن میں بھگو کر پھوڑے یا اماں پر رکھنا چاہئے۔ اوپے کیلے کا پتہ رکھنا چاہئے۔ اس پر بورک کاٹن (اگر نلے تو ردی) اس پر پھیلا کر کپڑے کی پٹی سے اس طرح کس کر باندھ دینا چاہئے کہ اس میں ٹھنڈی ہوا نہ لگنے پائے۔ ضرورت پولش کا سینک، اس سات آٹھ مرتبہ کرنا چاہئے۔ اس طرح گرم سینک کرنے سے اماں یا پھوڑا (خواہ کتنا ہی خراب) بغیر کسی وقت کے میٹھ جائے گا۔ یا پھٹ جائے گا۔ اس سے مرض کو فائدہ ہی ہوگا۔ کوئی نقصان نہ ہوگا۔

اس بارہ میں ایک بات بغیر کہہ نہیں رہا جاتا۔ کلکتہ نمبر ۱۔ وارڈ کے سابق ڈسٹرکٹ انجینئر مریٹ کارنک چندر سوس کے جب پھوڑا نکلا تو بڑے بڑے ایلو مچھک کٹروں نے کہا کہ چاک کئے بغیر پھوڑا اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہماری تشخیص مطابق ہی گرم کوشن استعمال کر کے دہی ہفتہ میں ایک م اچھے ہو گئے۔ (پھوڑا پھوٹ گیا۔ اور اس میں سات۔ آٹھ سوراخ ہو گئے۔ اس وجہ سے گرم کوشن کے ساتھ ہی ساتھ سلیکا ۳۰ کھانے کو دیا گیا۔ تب سے وہ لاکھوں بار اس کی تعریف کر چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس انمول دوا کے ہم شکر رہیں گے۔ اور سب کے سامنے اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہومیو پتھک پر نہ میرا اعتقاد تھا اور نہ ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ہومیو پتھک کا یہ گرم کوشن زندگی اور جان بچنے والا ہے۔ اب اگر کسی کو پھوڑا ہو رہا ہے تو اس گرم کوشن کے استعمال کی درخواست

ہو یا ناک یا منہ سے خون گرتا ہو تو برف یا ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا چاہئے۔ کبھی کبھی گرم پانی کی سینک یا فلائین سے سینک کر نا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مریض کے کھانے پینے پر بھی معالج کو خاص اور اچھی طرح نگاہ رکھنی چاہئے۔

دوران استعمال دو اہم غذاؤں پر ہینر:- ساودانہ، بامبی، اراروٹ، مصری دودھ، دھان کے کھیل کا جوشاندہ، مونگ یا مسور کے جوشاندہ کا پانی، کیسرو، شگھارہ۔ بہدانہ، انار، وغیرہ مرض کے موافق اچھی غذا ہیں۔ ادراک، مولیٰ، کافور، ہنگ، مرج، کالی مرج، پیاز، لہسن، پوستہ کا دانہ، چھوٹی الائچی، دارچینی، لونگ، جاد تری وغیرہ گرم مصالحے، لیمو کا پھلکا یا چھال، لیونڈ، یا پینے کی چیزیں، تیزاب (ایسڈ) کے ذریعے تیار ہوتی ہیں۔ چار کافی، ڈبل روٹی، جو فوراً تیار کی گئی ہے۔ موری پانی (دو اڑس) گرم تیزاب (جیسے برائڈی) وغیرہ دوا کھانے کے وقت شروع ہیں۔ خارجی استعمال کی دوا دیرین میں تیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہومیو پتھک دوا استعمال کرنے کا وقت کوئی کوئی لیمو چونا وغیرہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب (خام) غذا کے فعل ہیں۔ اور ہومیو پتھک (لطیف دواؤں کا فعل ایک ہی جگہ (سیم پلیس Same Place) پر نہیں ہوتا۔ غذا کی چیزوں کا فعل مادی جسم (میٹریل) یا فزیکل باڈی (Material or Physical body) پر ہوتا ہے اور ہومیو پتھک دوا کا اثر قوت، قوت روحانی (دائس انرژی) (Vital energy) پر ہوتا ہے۔ (ہیمن صاحب کا آرگن ص ۱۳۱ ملاحظہ ہو) تمباکو۔ گاجسہ۔ ایفون۔ وغیرہ۔ کھانے والوں کو دوا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور ایک گھنٹہ بعد کل نشہ بند کر دینا چاہئے۔

کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی کا پیوڑا پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایلیپتھک ڈاکٹر بھی پہلے اسی گرم دوشن کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لہٰذا لیکن جہاں پیٹ میں بد ہضمی وغیرہ امراض میں ڈاکٹر چوڑے کا پانی تجویز کرتے ہیں۔ وہ نا سبھی سے مریض کے جسم میں چوڑے کے زہریلے، مسموم، پروڈکٹ پیدا کر دیتے ہیں وہاں جو نا کھانا بیان کیا کہ پانی کے ساتھ چونا کھانا بھی منع ہے۔

علامات امراض اور انتخاب ادویات

مرض کسے کہتے ہیں؟ اندرونی اور بیرونی علامات کے ذریعہ جسم کے کسی حصے عضو میں تبدیلی معلوم ہو اس کو مرض عضوی (اکریٹیزم) کہتے ہیں۔

علامات مرض سے کیا مراد ہے؟ صحت خراب ہونے سے جسم اور جان میں جو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تبدیلی کا نام علامات مرض (سپیشلس) ہے مثلاً جسم کی گرمی کا زیادہ ہونا۔ نبض کی تیز رفتار، سانس زور زور سے لینا۔ کمر میں درد۔ بھوک کا بند ہونا وغیرہ بھی رکے علامات ہیں۔ اول اول تین علامات ظاہری (Objective symptoms) کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ باہر یعنی مرض کے جسم میں بیرونی طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ باقی آخر کے علامات، علامات باطنی (سبجیکٹو سپیشلس) - (subjective symptoms) کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کو مریض اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اگر مریض نہ بتائے تو معلوم نہیں ہو سکتے۔

علامات دوا سے کیا مراد ہے؟ صحت کی حالت میں جس دوا کے کھانے سے جسم اور جان میں جو جو علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان علامات کو اس دوا کی "علامات" کہتے ہیں۔ مثلاً صحت کی حالت میں ایکوٹائٹ اصلی عرق زیادہ مقدار میں کھانے سے نبض کی ضرب تیز، جسم خشک، چہرہ سرخ، پیشاب کا رنگ سرخ زور زور سے سانس لینا وغیرہ علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ان کی علامات کو ایکوٹائٹ کی علامات کہتے ہیں۔ ادویات کی علامات ہمارے بھیجے لکسن سنگرہ نامی کتاب میں تشریح کے لکھے ہیں۔

انتخاب دوا:- (سکشن آف میڈیسن) کسی مرض کے علامات دوا کے کل (یا زیادہ) علامات نے ملنے پر اس دوا کے اس مرض کی سچی ہو سوسپٹیک دوا سمجھنی چاہیے۔ جیسے تیریاکس نبض کی تیز رفتار، خشک، جلد وغیرہ تیز بخار کے علامات مندرجہ بالا ایکوٹائٹ کے علامات سے ملتے ہیں۔ اس لئے ایکوٹائٹ ایسے تیز بخار میں دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے باب علاج الاراض میں ہر مرض کی جو دوائیں لکھی ہیں وہ سب اسی طرح منتخب کی گئی ہیں اس لئے فوراً ہی فائدہ کرتی ہے (بزرگ صاحب کی انجیل آف ہومیو پتھیک ملاحظہ ہو)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہومیو پتھیک کی کل دواؤں کی آزمائش پہلے تمہارا دست

آدی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آزمائش شدہ علامات اور مریضوں کے مرض کی علامات ملا کر دوا کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی سچی دوا ملی۔ لیکن کبھی کبھی اس طرح ٹھیک ٹھیک علامات مرض اور علامات دوا کا ملنا جلد باز معالج کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جس دوا کے مخصوص علامات کی مطابقت ہو، وہی دوا دینے سے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہمیشہ ناک کھلاتا اور تھیکہ پر ناک رگڑتا ہے، اور ہمیشہ اپنی ماں کے کندھے پر ناک رگڑا کرتا ہے۔

(کرم تھے یا نہیں معلوم نہیں ہوا)۔ یہ علامات دیکھتے ہی سائننا (CINA) کھلانے سے ہی بچہ اچھا ہو گیا۔ اگر ایک ڈاکٹر بہت دوائیں دیکر بھی دشواری حیف (در د حیف) کے ساتھ کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے تب انھوں نے مستورات کے امراض کے ماہر ڈاکٹر گریسی کو مشورہ کرنے کے لئے بلایا۔ گریسی نے اس مریضہ کی حیادت کی رغبت اور متواتر بکنا جھکنا دیکھ کر اسٹرا مونیم کھلایا اور مرض بہت جلد رفع ہو گیا۔ (دی ہی مین غصلی جلد سے ملاحظہ ہو) اسلئے یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ کبھی کبھی دوا ایک مخصوص علامات پر تو جبر دیکر دوا دینے سے امید زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسکو مکمل ہومیوپیتھی نہیں کہہ سکتے۔ علامات کو ملا کر ٹھیک ٹھیک دوا انتخاب کرنا ہی ہی من صاحب کی بتائی ہوئی سچی ہومیوپیتھی ہے

لہ آزمائش شدہ دوا۔ کسی دوا کے جو علامات بار بار معلوم ہوں۔ اگر وہ دوا استعمال کرنے سے کسی مرض کی وہی علامات بار بار آرام ہوتے ہوں تو ان سب علامتوں کو اس دوا کی خصوصیات کہتے ہیں (پیکولیئر یا کیریکٹر اسٹک) جیسے ناک کھلانا یا کھنسا سنانا کی ایک مخصوص علامت ہے۔ اس کتاب کے آخر میں دوا کی علامات کے بیان میں نکس و امسکا۔

”پیٹ پھولنا“ اور ”مات کا جاگنا“ ان دونوں مخصوص علامات کی نکتہ چینی کر کے ایک گریجویٹ نے ”میری“ نامی کتاب باتھویر ناول میں خوب مذاق اڑایا ہے۔ (۱۳۲۲)۔ ننگہ سال کے چھٹھ ماہ کا بھارت ورش دیکھئے۔

۱۹۳۳ء میں برٹش ہومیوپیتھک کانگریس کی جلسہ ہوا تھا۔ اس میں ہومیوپیتھک کے صدر عالم ڈاکٹر پی سدرلینڈ صاحب نے یہ کہا تھا۔ (خداوند کریم کا ٹھیک بتایا ہوا ہومیوپیتھی

علامات مرض کیسے معلوم کرنا چاہئے

(۱) مریض کے پاس بیٹھ کر پہلے اس کے اندرونی علامات (جیسے ہاڑا لگنا، چکر آنا، پیرا نیٹھنا، کر ڈوا ذائقہ، کلیجہ میں جلن، ڈروغیرہ، (۲) مرض کی اصلی سبب (جیسے سردی لگنا، پانی میں بھینکنا، ثقیل غذا کا کھانا۔ بھاری چیز اٹھانا وغیرہ۔ (۳) کس وقت یا کس طریقہ میں مرض کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے (جیسے سبب مرض کی زیادتی، رات میں اٹنے لگھنا، جسم دبانے سے آرام معلوم ہونا۔ حرکت سے تکلیف کا بڑھنا، بائیں کروٹ سونے سے آرام وغیرہ باتیں آہستہ آہستہ معلوم کر لینا چاہئے۔ ان کے بعد (۴) کس بیرونی علامات (جسم کی گرمی، نفی، زبان، جلد، سینہ یا ناز، پیشاب وغیرہ ماپنے کے ذریعہ) معالج کو معلوم کر لینا چاہئے اور (۵) آخر میں مریض کی موجودہ اور مرض کی گذشتہ حالت کی کل مخصوص علامات (جیسے بخار میں بدن بہت زیادہ گرم رہنے سے بھی پیاس نہ معلوم ہوا یا کسی مرض میں چھوٹے بچے کا ہمیشہ ناف کھلانا دیرہ علامات) سمجھ اور جانچ کر دوا منتخب کرنا چاہئے۔ (نیش ہاؤ ٹو ٹیک کیس)

(NASHES HOW TO TAKE CASE)

کا کام آج بھی ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں۔ زیادہ موجودہ کے علاج کے طریقہ میں ہمیشہ سے غلط نام دوا میں (Palliative) زہر کی غذا کی دیکھائی جاتی ہیں ان کی صرف مخالفت کرنا ہی ہر میو پیٹ کا فرض نہیں ہے۔

طریقہ علاج بالکل سبب طریقہ تحقیقی علاج یعنی تسکین دینے والا طریقہ نہیں ہے بلکہ صاف صاف مرض کے بعد کرنا والی دواؤں کے استعمال کا طریقہ ہے۔ مرض کے کسی خاص علامت کا علاج کرنا ہی نہیں، بلکہ مریض کی مجموعی (یعنی جسمانی، دماغی، تناسلی وغیرہ سبھی علامات) علامات پر رکھ کر دوا یا سبب علامات کا علاج کرنا ہی ہو میو پیٹ کا بھی سبق ہے کہ سبب دواؤں میں جس طرح مرض کے دفعہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح ان میں مرض پیدا کرنے کی طاقت بھی موبہ دہ اس لئے ہے مگر اور خود دواؤں کے بعد دوا دینا چاہئے۔

دیکھئے the Chemist and a suggestion for September 18, 1920

ڈاکٹر انگلر کا میٹنس ٹوڈی مینٹ (Distinguishing Suggests
(as To the Patient.) اور اسی کتاب کا علامات مرض لکھنے کا
باب ملاحظہ ہو۔

اس کتاب میں علاج مرض میں جو دوائیں لکھی گئی ہیں۔ مبتدی طلباء کی آسانی کے لئے
ان کی مخصوص علامات بھی دیدی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر اور بھی تیارہ علامات معلوم کرنا
چاہیں تو کوئی اچھی خواص الادویہ یا میٹر یا میڈیکا سے مدد لینا چاہیے کسی کسی مرض کی کسی خاص
خاص دواؤں کے علامات بتانے کے بعد دواؤں کے صرف نام لکھے گئے ہیں ان کی علامات
نہیں لکھی گئی ہیں۔ یہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ یہ ادویات معروف معالج کی آسانی کے لئے
ہیں۔ ان کی علامات معلوم کرنے کے لئے بھی کسی اچھے خواص الادویہ میں دیکھنا چاہیے۔

جسم کا گرمی وغیرہ کی جانچ کیسے کرنا چاہئے۔ یہ معمولی طرح سے مندرجہ ذیل ہے۔
(۱) جسم کی گرمی کلینکل تھرمامیٹر (مقیاس الحرارة) کے ذریعہ جانچ لینا چاہئے۔

حرارت پارہ بھرا شیشہ کا ایک ایسا نل بوتل ہے جس میں بیج بیج میں لکیریں بڑی ہوتی ہیں۔
سبکے نیچے پادہ کا تھکا رہتا ہے اس کے اوپر کچھ چھوٹی بڑی لکیریں اور گنتہ کا نشان رہتا ہے۔
پہلے بڑی لکیر ۹ یا ۹۵ ڈگری اس کے بعد ہم چھوٹی لکیریں رہتی ہیں ہر ایک ڈگری کا پانچواں
حصہ بناتی ہیں۔ ہر ایک بڑی لکیر ایک ایک ڈگری ہے۔ ۹۸ ڈگری کے اوپر دوسری
چھوٹی لکیر کے اوپر ایک تیر کے مانند نشان رہتا ہے۔ یہ آدمی کی خلقی گرمی کو بتاتا ہے۔
اس مقیاس الحرارة کا پارہ والا حصہ مریض کی بغل، زبان کے نیچے، یا مقعد میں لگا کر
گرمی کی جانچ کی جاتی ہے، اس وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں باہر کی ہوا نہ لگے پائے۔
۱-۲-۳ یا ۵ منٹ تک خاموشی سے بغل میں رکھ کر باہر نکال کر اسے دیکھنا چاہئے۔
پارے کے ٹھکے سے سوئی کی طرح ایک تیلی لکیر اوپر اٹھ کر جس خانہ میں جس عدد کے پاس
جا کر رک جائے جسم کی حرارت کا درجہ (ڈگری) سمجھنا چاہئے۔

تندرست جسم کی حرارت ۹۸° ڈگری سنڈ میں لگنے پر ۹۹° ڈگری تک بڑھ
جاتی ہے۔ یہاں یہ خیال رکھنا چاہئے کہ یہ درجہ سرد ملکوں کا ہے۔ ہندوستان کے
زیادہ تر آدمیوں کی معمولی حرارت ۹۷° و ۹۸° رہتی ہے۔ بہت طاقتور آدمیوں کی
۹۸° رہتی ہے۔ لڑکوں کے جسم کی حرارت بہ نسبت جوانوں کے کچھ زیادہ ہوتی

ہے اور ۴۰ برس کی عمر کے بعد کی حرارت جوانوں سے کم ہو جاتی ہے۔ سوتے ادا آرام کرتے وقت جسم کی حرارت درجہ ڈگری کم ہو جاتی ہے۔ جسم کی حرارت ڈھائی ڈگری بڑھ جانے کی برنسبت ایک ڈگری کم ہو جانا اندیشہ کی بات ہے۔ طیر یا بخار میں درم پر دہائے نچاغ ذات الریا بہر یا بخار، حمی دموئی چھپک میں درجہ حرارت ۱۰.۶ یا ۱۰.۷ تک ہو جاتی ہے۔ دوسرے بخاروں میں ۱۰.۲، ۱۰.۴، ۱۰.۵ یا ۱۰.۶ درجہ کے نیچے حرارت رہ کر رہتی ہے۔ اگر جسم کی حرارت ۹.۸ ڈگری سے اوپر ہو جائے یا ۹ کے نیچے اتر جائے تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی مرض ہوا ہے۔ ۹.۹ سے ۱۰.۱ ڈگری تک بخار معمولی ۱۰.۵ درجہ تک ہو جائے تو زور کا بخار ۱۰.۷ ہو جائے تو مہلک بخار اور ۱۰.۸ یا ۱۱.۰ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ موت جلد ہوگی۔ ٹائیفائیڈ یا تپ محرقہ اسہالی میں دوسرے ہفتہ میں شام کے وقت جسم کی حرارت ۱۰.۲ یا ۱۰.۳ ہو جائے تو معمولی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ۱۰.۵ ہو جائے تو خوفناک خیال کرنا چاہئے۔ شدید طیر یا بخار میں ۱۰.۶ ڈگری بھی زیادہ خوف کی بات نہیں ہے۔ لیکن شدید وجع مفاصل میں ۱۰.۴ ڈگری یا اس سے بھی زیادہ بڑھنا بہت فکر اور خوف کی بات ہے۔ پرسوت کے بخار میں اکثر جسم کی حرارت ۱۰.۵ ڈگری تک بڑھ جاتی ہے۔ ۹.۷ سے ۹.۹ ڈگری تک گری ہوئی حالت بتاتی ہے۔ ہیفیہ کے علاوہ اور کسی بھی بیماری میں جسم کی گری ۹.۳ ڈگری تک اترنا بہت خراب علامت ہے۔ ہیفیہ کی بیماری میں جسم برف کی طرح سرد ہو کر کبھی کبھی ۸۰ درجہ تک اتر جاتی ہے۔ قوی بخار اندر من مہلک امراض میں اگر جسم کی حرارت یکا یک بہت کم ہو جائے تو خوف کی بات ہے۔

(۲) نبض کی ضرب :- جنین کے نبض کی ضرب فی منٹ تقریباً ۱۰۵ مرتبہ۔ پیدائش سے ایک سال کی عمر تک حالت تندرستی میں ۱۲۰-۱۴۰ مرتبہ ۲ سے ۵ سال تک ۹۰-۱۱۵ ۶-۱۵ برس تک ۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰ سال تک ۷۰-۹۰ مرتبہ اور بوڑھے میں ۴۵ سے ۵۰ مرتبہ مردوں کی نبض سے عورتوں کی نبض ۱-۱.۵ ضرب زیادہ ہو اگر قوی ہے۔ غذا وغیرہ یا کثرت کے بعد نبض کی ضرب معمولی ضرب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور سونے میں یا آدھی رات میں کم ہو جایا کرتی ہے۔ اگر مقررہ وقت سے نبض کی ضرب ۲۰ ضرب کم ہو تو جانتا چاہئے کہ وقت زیست کم ہو رہی ہے نبض کی رفتار ٹھیک ہو لیکن یکا یک رگ جاتی ہو تو یہ علامت بد ہے نبض کا بہت کم زور ہو کر طاقتور

ہونا بہت خراب علامت ہے (دوران خون کے درد والے باب میں نبض ملاحظہ ہو)۔

(۳) سانس :- حالت تندرستی میں سانس لینا اور نکالنا آہستہ آہستہ اور آسانی سے بغیر کسی تکلیف اور آواز کے ہوا کرتا ہے۔ ایک سال کی عمر میں فی منٹ ۲۵ مرتبہ سانس کی رفتار ہے۔ ۲ سال کی عمر سے ۲۵ مرتبہ اور ۱۵ سے پوری عمر تک کے آدمیوں میں ۲۰ سے ۱۸ مرتبہ سانس کی رفتار کا آہستہ ہونا نیک علامت ہے اور سرد اور جلد جلد موتا کی نشانی ہے۔ سینہ اور پیچھے کی بیماری میں سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ کمزوری گھٹ جاتی ہے۔

(۴) نبض، سانس اور جسم کی گرمی کا ایک دوسرے سے تعلق

جسم کی گرمی ایک درجہ بڑھنے سے نبض کی رفتار دس مرتبہ اور سانس کی دو مرتبہ بڑھ جاتی ہے۔ قدرتی درجہ حرارت جسم ۹۸.۶ نبض کی رفتار ۷۵ اور سانس کی دس مرتبہ ہوتی ہے۔ جسم کی حرارت اگر ۱۰۰ ہوگی تو نبض کی رفتار ۱۱۸ مرتبہ اور سانس کی ۲۳ مرتبہ معمولاً سانس ۲ مرتبہ لینے سے نبض ۷۵ مرتبہ چلتی ہے۔

(۵) زبان کا امتحان :- تشخیص مرض میں زبان بڑی مددگار ہے۔ اس کا بدلہ ہوا جلد از رنگ دیکھ کر آسانی سے مرض تشخیص کیا جاسکتا ہے۔ تندرستی کی حالت میں زبان ہمیشہ تر اور صاف رہتی ہے۔ تیز سرسامی حالت میں اور نئے بخار میں اعصابی کمزوری کی وجہ سے زبان خشک ہو جاتی ہے۔ سرخ زبان اس بخار کا جو پھوڑے کی وجہ سے یا مرض متعلق ہاضمہ کا پتہ دیتی ہے اگر زبان پر سفید میل کی تہ ہو اور اس پر سرخ دانے ہوں تو سرخ بخار سمجھنا چاہیئے۔ زبان کی جڑ یا آگے کا حصہ خشک ہو تو پٹ محرقہ سمجھنا چاہیئے۔ سفید زبان، خون کی کمی یا کمزوری کی نشانی ہے۔ اگر خشک زبان تر ہو جائے اور جڑ کی طرف سے صاف ہو جائے تو سمجھنا چاہیئے کہ مرض گھٹ رہا ہے۔ اگر زبان پر سفید میل ہو تو قبض یا ہاضمہ کی خرابی ہوگی۔ اگر زبان پھلی ہو تو سمجھنا چاہیئے کہ صفرا نکلنے کے آگے میں یا جگر کے آگے میں کچھ خرابی ہے یا ہوگی۔ نیلگوں رنگ کی زبان دوران خون کی خرابی کا پتہ دیتی ہے۔ سیاہ زبان اکثر بد علامت خیال کی جاتی ہے۔ معدہ کے مرض میں اگر زبان پر سیاہ رنگ کا دانغ دکھائی دے تو ناتوانی یا قوت حیات کا خاتمہ فوراً ہی موت آنے کا خیال ہوتا ہے۔ برصان کے مرض میں اگر زبان پر سیاہ تہ چڑھی معلوم ہو تو

سمجھنا چاہیے کہ جگر کی سخت خرابی ہے۔ چھپکپ میں سیاہ زبان نہایت بد علامت ہے اگر زبان بالکل ہل نہ سکے یا زبان باہر نکل کر ایک طرف پڑی رہے تو خیالی کرنا چاہیے کہ دماغ بے بس ہو گیا ہے۔ زبان پر زخم یا چھالے ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ اچھی طرح غذا ہضم نہیں ہوتی۔ سیاہ یا بیگنی رنگ کی زبان بتاتی ہے کہ شریان میں خون رکنا شروع ہو گیا ہے۔

(۶) **چہرہ**:- جسم کے آئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے چہرہ دیکھ کر بھی بیماری کی بابت بہت کچھ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ خوش چہرہ تندرستی کی علامت ہے۔ لیکن کلچے کے مرض کی تکلیف کے بعد مریض کا بشاش چہرہ اچھی علامت نہیں ہے۔ پھیپھڑے کی سوزش میں چہرہ متفکر اور سکڑا ہوا۔ اور سانس میں تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ شرمیلا چہرہ، باہ کی کمزوری کی علامت ہے، بخار کے ساتھ اگر قبض ہو تو چہرہ غمگین ہوگا۔ یا مرض سرخ، بادامی، سیاہ ہونٹ وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

(۷) **جلد**:- ردھمی، خشک، گرم جلد ہو تو بخار جانا چاہیے جسم کی حرارت کم کرنے کے ساتھ ہی اگر دوسرے علامات بھی کم ہوں اور پسینہ ہو تو نیک علامت ہے اگر تمام جسم میں پسینہ نہ ہو بلکہ کسی خاص جگہ ہو تو اعصابی کمزوری اور اس مقام کے نیچے سوزش کی علامت ہے۔ حادثہ میں اگر پسینہ ہو تو مرض دفع ہونا سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر مزمن تپ میں رات کو پسینہ زیادہ نکلے تو سمجھنا چاہیے کہ تپ دق وغیرہ زائل کرنے والا مرض شروع ہو گیا ہے۔ نوعی بخار دیراج، سوزشی بخار میں پسینہ نکلنے سے ہی اگر دوسرے علامات کم نہ ہوں تو علامات بد سمجھنا چاہیے۔ نوعی بخار تپ، طیرا۔ رسوت کا بخار، اور دوسرے تیز بخاروں میں سردی اور لرزہ ہوتا ہے۔ یکایک زیادہ پسینہ نکلنا نیک علامت نہیں ہے۔

(۸) **قے اور ہچکی**:- امراض متعلقہ معدہ، متعلق دماغ، سینہ، پھیپھڑا اور رحم وغیرہ میں قے ہوتی ہے۔ کڑھ، معدہ یا جگر کی سوزش کی وجہ سے بھی ہچکی آتی ہے۔

(۹) **درد**:- اگر کسی خاص مقام میں لگاتار درد ہو، اور وہ مقام گرم ہو اور دہانے سے درد ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ درد سوزش کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ حرکت کرنے سے بڑھتا ہو، عضلہ یا گھٹنے میں درد ہو، یا ان کے عقب کی گلی

کی سوزش سمجھنا چاہیے۔ جگر کی سوزش میں دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے اور قلب کی بیمار میں بائیں بازو میں درد ہوتا ہے۔ مرض پتھری میں آرتھرائٹ کے اگلے حصہ میں درد ہوتا ہے۔

(۱۰) سینہ: سینہ کی جانچ خاص کر تین طرح سے ہوتی ہے۔

(۱) دیکھ کر (ب) چھو کر اور (ج) سُن کر۔

(۲) دیکھ کر۔ مریض کو سیدھا بلا حرکت کے بٹانا چاہیے اور استقلال سے

دیکھنا چاہیے۔ کہ سینہ اچھی طرح پھیلتا اور سکڑتا ہے یا نہیں۔ سانس ہر مرتبہ لینے اور

نکلنے میں ٹھیک اونچا ہوتا ہے۔ یا نہیں، جھکتا ہے یا نہیں یا کسی مقام میں اماں

تو نہیں ہے۔ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ (ب) چھو کر یا ضرب لگا کر۔ بائیں

ہاتھ کے پنجہ کو پتھری کی طرف مریض کے سینہ پر رکھ کر دائیں ہاتھ کی انگلی سے اگر اس پر

ضرب لگانے سے آواز ٹھن ٹھن ہو۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ فطری حالت ہے۔ اگر ٹپ ٹپ

کی آواز ہو تو پھیپھڑے کی سوزش، سینہ میں اماں وغیرہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرے

عارضہ میں ہو یا زیادہ مقدار میں سینہ میں جاتی ہے۔ اس لئے آواز ٹپ ٹپ ہوتی ہے۔

(۳) سُن کر یہ کام ایک آلہ کے ذریعہ سے جس کو اسٹھتیا سکوپ کہتے ہیں۔ ہوتا ہے۔

اسٹھتیا سکوپ کی قسم کا ہوتا ہے جیسے کڑی کا سیننگ کا، جرمین سلور کا، اور برکانل

نگا ہوا مریض کو چپٹا کر یا سیدھا خاموش کھرا کر کے سینہ میں (دل) اور اس کے

بغل کی جگہ اسٹھتیا سکوپ کا چھوٹا مُنہ لگا کر دوسرا چوڑا مُنہ کان میں لگا کر جانچ

کرنی پڑتی ہے، ربر کے اسٹھتیا سکوپ کا جو مُنہ چوڑا ہوتا ہے۔ وہ مریض کے سینہ

پر اور چھوٹے دونوں مُنہ کان کے سوراخوں میں رکھ کر جانچ کرنی پڑتی ہے۔ فطری

حالت میں آواز سوں سوں سُنائی دیتی ہے۔ سانس کی تلی کی سوزش دماغ کھانسی

دق کی کھانسی وغیرہ امراض میں مختلف، باجوں کی آواز سُن پڑتی ہے اگر بلغم کی زیادتی

ہوتی ہے تو گھم گھم کی آواز سُنائی دیتی ہے۔ نوٹیا میں بال رگڑنے کی سی آواز

اور پھیپھڑے کی دھکنے والی جھلکی میں اگر سوزش ہوتی ہو تو کھس کھس کی آواز ہوتی ہے۔

(۱۱) ہوا ز۔ فطری براز کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ مثیال۔ بھورا۔ یا کچھ کی طرح ہوتا

صفر کا حصہ کم (جگر کی خرابی) خیال کرنا چاہیے۔ اگر براز کا رنگ سیاہ یا بہت

زرد ہو تو صفر کا حصہ زیادہ ہوگا۔ سبز رنگ کا بازو خاص کر بچوں کو معدہ کی ترشی
براز کے ساتھ خون ملی ہوئی آٹوں ہو تو آنتوں کی سوزش، اگر بازو سخت ہو تو سمجھنا
چاہیے کہ آنتوں کے فعل میں کچھ خرابی ہے۔ معدہ، جگر، تلی وغیرہ کی بیماریوں میں آپ
ہی آپ یا بغیر معلوم ہوئے (مریض کو معلوم ہی نہ ہو) پاخانہ ہو جائے تو بہت بُری
علامت ہے۔ اکثر یہ موت کی خبر دیتا ہے۔

(۱۲) پیشاب :- فطرتی حالت میں جو آٹوں کو ڈیڑھ سیر پیشاب ہوتا ہے جگر کی
بیماری میں گہرے زرد رنگ کا پیشاب ہوتا ہے۔ پیشاب میں کچھ جم جاتا ہے۔ بخار میں
نبض میں تیزی ہونے سے پیشاب کم اور سُرخ ہوتا ہے۔ اگر پیشاب وزن میں زیادہ
اور صاف ہو تو اعصابی تکلیف سمجھنا چاہئے۔ پیشاب کرنے کے بعد ہی اگر پیشاب دودھ
کی طرح ہو یا چونے کے پانی کی طرح سفید ہو تو کرم کا فساد ہوتا ہے۔ پیشاب میں اگر مٹی
یا شکر ہو تو ذیابیطس سمجھنا چاہئے۔ پیشاب میلا ہو تو اُس میں جوں موجود ہے۔
اگر پیشاب گہرے سُرخ رنگ کا ہو تو اُس میں ترشی ہوتی ہے۔ اگر پیشاب
گہرے رنگ کا یا سیاہ رنگ کا ہو تو سمجھنا چاہئے کہ مرض بہت زیادتی پر ہے۔

صحت قائم رکھنے کے متعلق چند ضروری باتیں

صحت قائم رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے۔ مثلاً
غذا کھانے اشیاء، پانی، روشنی، ہوا، لباس، اور غسل وغیرہ،
غذا :- یہ بات غلط ہے کہ طاقتور یا طاقت دینے والی اشیاء کھانے سے ہی
جسم تندرست اور اچھا طاقتور رہتا ہے۔ کھانے سے پہلے دیکھنا چاہئے کہ جو چیز کھا لی
جائے اُس کے ہضم کرنے کی طاقت بھی ہے یا نہیں۔ غذا کا ہضم ہونا بہت کچھ محنت پر منحصر
ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے پر اُسی قسم کی طاقتور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن
زیادہ کھانا مناسب نہیں ہے۔ عمر کے لحاظ سے غذا کی چیزیں اور ان کا وزن ٹھیک کرنا
چاہئے۔ تھوڑا کھانے والے کے لئے طاقتور چیزوں کے کھانے کی ضرورت ہے۔

موسم سرما میں چربییلی غذا مفید ہے۔ اور ان دونوں میں بہ نسبت گرم موسم
کے کچھ زیادہ کھانا بھی نقصان دہ نہیں ہے۔

زیادہ لال مرچ، کالی مرچ اور گرم مصالحہ دار چیزیں کھانا نقصان دہ ہے۔ اچھی طرح پکا ہوا پکا بھجوں آہستہ آہستہ چیا کر کھانا چاہیے۔ ترکاری درمیان میں بند نہ رہنا چاہیے۔ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہ پینا ہی اچھا ہے۔ کیونکہ ٹھنڈا پانی معدہ میں جا کر وہاں کی گرمی کو کم کر دیتا ہے۔ اس لئے باضمہ میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ جسکو باضمہ کی شکایت رہتی ہو، اس کو کھانے کے بعد تھوڑا نیم گرم پانی پی لینا چاہیے۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا مناسب ہے۔

معدہ بہت دیر تک خالی رہنے سے بھی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ دن کی غذا کی نسبت رات کی غذا سادی اور ہلکی ہونا ضروری ہے۔ سونے کے وقت معدہ خالی نہ رہنا چاہیے۔ اور نہ خوب بھرا ہونا چاہیے۔ سونے سے کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے کھانا چاہیے۔ جو بہت رات تک لکھنے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں انہیں سونے کے قبل بہت تھوڑی غذا کھانی چاہیے۔ بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے پالے میں زیادہ کھانے سے عرصہ تک زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ ضعیفی کے وقت خوراک کی مقدار آہستہ آہستہ کم کر دینی چاہیے۔

معمولی غذا کی چار قسم ہوتی ہے (۱) چھاناکا قسم یا گوشت کے متعلق غذا جیسے چھانا، بھجلی گوشت، انڈے کی سفیدی، دال وغیرہ (۲) روغن یا شیا یا مکھن کی قسم کی غذا۔ (جیسے گھی، مکھن، روغن، چربی وغیرہ) ان کے ذریعہ سے صحت قائم رکھنے کے لئے ضروری گرمی بڑھتی ہے۔ اور محنت کرنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ ہی جسم کچھ قریب بھی ہوتا ہے (۳) شکر کی قسم کی چیزیں (جیسے چینی، مصری، گڑ، کھجور، کارس، چاول، چھوہارا، لائی، دھان کا میٹھا لادوا، چنا، ساگو دانہ، یارلی، ارادوٹ، ساٹھی، میدہ، آلو وغیرہ) ان کے ذریعہ سے ہمارے جسم کی گرمی اور کام کرنے کی طاقت اور قریب بھی بہت کچھ پیدا ہوتی ہے۔ (۴) نمک کی قسم کی شیا (جیسے کھانے کا نمک، دال وغیرہ) ان کے ذریعہ سے ہمارا خون صاف ہوتا ہے۔ اور جسم کے آلات، اور ہڈیاں درست ہوتی ہیں۔ حقیقت میں اگر نمک نہ کھایا جائے تو ہماری زندگی ناممکن ہو جائے گی۔

چساول، دال، روٹی، ترکاری، گھی، تیل، گڑ، بیون، بھیل، مولی، آلو۔

مچھلی، مانس، دودھ پالی وغیرہ کھلے پینے کی چیزوں سے ہم لوگ جسم کی حفاظت کے لئے مفید غذا حسب ضرورت چھانا، مکھن، چینی، اور نمک جمع کر کے جسم کی پرورش کرتے اور زندہ رہتے ہیں، صرف دودھ، اور انڈے میں مذکورہ بالا چاروں قسم کی چیزیں موجود رہنے کا وجہ سے ہم لوگ صرف دودھ (انڈا) کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں۔

ہماری غذا کی چیزوں میں کیا کیا ملائی جاسکتی ہیں۔ ان کا تفصیل حسب ذیل ہیں۔

(۱) اداوٹ یا امس، کھٹے آم کارس اقدیشہ، اٹلی، گڑ، میدہ۔
(۲) آٹے میں رام کھلی، چنا۔ چینی مٹی۔ بھوسی، چاول، کا آٹا، بجھے کا ستوا اور کھربائی۔
(۳) اداوٹ، چاول کا آٹا۔ بجھے کا آٹا۔ آلو کا میدہ۔

(۴) گئی میں ناریل کا تیل، پوتے کا تیل، برین کا تیل، کسم کے بیج کا تیل، مہوے کا تیل، رینڈی کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، ویسلین، چربی، چاول کے آٹے کے ساتھ لیا ہوا۔ کیلا۔ اروٹی یا شکر قند، باجرا۔ حوار کا آٹا۔ خوب خراب یا سٹری کے ساتھ تھوڑا تازہ دودھ، یاد ہی اور کچھ اچھا گھی ڈال کر اوٹلنے سے اچھے گھی کی بہت خوشبو آتی ہے۔

(۵) چاول میں ٹوٹے کپڑے لگے دالے، زنگونی چاول، حوٹے کا سفوف۔

(۶) دودھ میں۔ پھونکا دے کر بیمار گائے کے دودھ سے مکھن نکلا۔ بتاشہ، پرائے تالاب کا سٹرا پانی۔ بمبیں کا دودھ اور سنگھارے کا سفوف ملا رہتا ہے۔

(۷) بارلی میں۔ ساٹھی کا سفوف، چنے کا ستوا، آلو کا میدہ، کیسو کا میدہ۔ گیہوں کا میدہ۔

(۸) شہد میں چینی اور جلیٹین نام کی شے متعلق گوشت۔

(۹) مکھن میں۔ سور گنجا تیل، تل کا تیل، ویسلین، موم، چربی۔ نار کا تیل۔

کیسلا ملا ہوا۔

(۱۰) گوشت میں بکرے کا گوشت میں بکری کا گوشت، بدھیا بکرے کا گوشت

(۱۱) سرسوں کے تیل میں، سور کا تیل، بنولا تیل، دانہ خشک، بونگ پھلی۔

بوم ایس آئل، نامی کراسن تیل، اور سرخ مرچ کا سفوف

دودھ۔ پیلے ہی اوپر بتایا جا چکا ہے کہ دودھ میں چاروں قسم کے کھانے کی

چیزیں اچھی طرح موجود ہیں۔ اس لئے اس کو کھانے کی پوری غذا کہی جاسکتی ہے۔

یعنی صرف دودھ ہی پی کر ہم لوگ زندہ رہ سکتے ہیں بچپن میں ماں کا دودھ ہی ہماری غذا ہے۔ گدھی کا دودھ، بکری کا دودھ، بھڑی کا دودھ، یا برداشت ہو تو بھینس کا دودھ بھی کام میں لایا جاسکتا ہے بغیر ابلے کیا دودھ فائدہ مند ضرور ہے کیونکہ ابلنے سے دودھ کا دھما (اس کا خاص فائدہ بہت کچھ کم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں گائے وغیرہ جانور بہت گندی جگہ میں رکھے جاتے ہیں۔ اور اسی حالت میں دوسے جلتے ہیں۔ اس لئے انکا کچا دودھ پینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ صرف دودھ نہ پی کر اس کے ساتھ چینی، مسر، چاول، بادلی وغیرہ ملا کر کام میں لادیں تو جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔

دودھ: ہتھالی ڈاکر متھنے سے جو چیز اوپر تیرنے لگتی ہے اُسے مکھن کہتے ہیں۔ کچھ گرم دودھں تھوڑی کا فامن یا نسلے تو کوئی دوسری ترش چیز ڈالنے سے وہ دودھ جم جاتا ہے۔ یہی کہلاتا ہے۔ تازے دہی کو اس طرح متھنے پر جو چیز اوپر تیرنے لگتی ہے۔ اُسے مکھن کہتے ہیں اور نیچے جو مائی کی طرح رہ جاتا ہے۔ اُس کو مٹھا کہتے ہیں۔ کسی بھی مٹھن کے لئے یہ مٹھا بہت فائدہ مند ہے۔ جو گرم دودھ میں چنے کا پانی یا ٹھیکری یا لیوکارس یا کوئی دوسری ترش چیز ڈالنے سے دودھ پھٹ جاتا ہے اور چھانا تیار ہو جاتا ہے اس چھانے کے نیچے جو پانی رہتا ہے وہی پھلنے کا پانی کہلاتا ہے۔

چائے پینا: عمدی طرح سے تندرستی کے لئے چائے پینا فائدہ مند ہے۔ جو لوگ بہت گرمی یا سخت کرتے ہیں ان کے لئے یا بلغمی مراح داراں کے لئے چائے پینا آنتا خراب ہیں ہے اس کے استعمال سے تھکاوٹ بہت کچھ دزر ہو جاتی ہے۔ چائے کے ساتھ پھل (یا جن میں باضمہ کی ثوب طاقت ہو) تھوڑی مچھلی۔ گوشت۔ انڈا۔ یا پھانا کی کوئی چیز کھانے میں کچھ مہرج نہیں ہے۔ مگر مقدار تھوڑی ہونا لازمی ہے۔

چائے پینے سے نقصان: بہت چائے پینے سے یعنی دن میں ایک مرتبہ سے زیادہ چائے پینے سے بد ہضمی، بھوک نہ لگنا، کلیجہ دھڑکنا۔ دماغی پریشانی، نیند نہ آنا۔ وغیرہ علامات دکھائی دیتے ہیں۔ اسی حالت میں چائے بند کر دینا چاہیے۔ مچھلی، گوشت کے ساتھ چائے نہ پی کر گوشت مچھلی کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اگر چائے پی جائے تو اچھا ہے۔ سوئے کے ٹیمپل پہلے چائے پینا منع ہے، جن کے جسم میں چربی زیادہ ہو ان کو چینی کے بدلے لیوکارس ڈال کر چائے پینی چاہیے۔ اس سے چربی کم ہونے میں مدد ملے گی۔

کافی۔ چلے کی طرح کافی پینے سے نشہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے چُپتی آتی ہے۔ کافی پینے سے محنت کرنے کی تھکاوٹ، سُستی وغیرہ دُور ہو جاتی ہے۔

کافی پینے سے نقصان۔ چلے کی طرح زیادہ کافی پینے سے دردِ سر، نیند نہ آنا، خواب دیکھنا، دماغی پریشانی، سینہ کی دھڑکن، اور بد ہضمی وغیرہ علامات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کافی پینے سے کسی کسی کو پائیکٹوز و صاف ہوتا ہے کسی کسی کا معدہ اور کبھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور قبض ہو جاتا ہے۔ چلے کی نسبت اس میں قوتِ محرکہ زیادہ ہونے سے بھی یہ ہائیم کو نقصان کرتی ہے۔ بالآخر پیٹ بھی لاتی ہے۔

پانی۔۔ پینے کی سب سے زیادہ اچھی چیز صاف پانی ہے۔ صاف پانی گوشت کو مضبوط اور جسم کے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسلئے یہ تندرستی اور زندگی کو قائم رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے۔ پانی کے بغیر غذا ہضم نہیں ہوتی۔ اس لئے صاف اور خالص پانی بہت ہی فائدہ مند ہے۔

صاف پانی کیسے ملتا ہے۔ دریا، سمندر، جھرناء، وغیرہ کا پانی کتنی ہی دھات اور زہریلی چیزوں کے ملے رہنے کے سبب سے کسی کام میں لانے کے لائق نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ اس سے کھانا بنا اور غسل کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ لیکن صاف اور پاک پانی گہرے کنوئیں یا بارش سے مل سکتا ہے۔ تالاب۔ بادل۔ کنواں۔ وغیرہ کو کبھی کبھی خاص کر جھاڑا آنے کے پہلے، یا گرمی کے پہلے پانی کم ہو جانے پر کم سے کم ایک مرتبہ صاف کر دینا چاہئے۔ ایسے مقامات کو کبھی کبھی صاف نہ کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ گو کہ یہ نقصان دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ہوتا ضرور ہے۔ لہذا احتیاط لازمی ہے۔

نظر کو کام میں لانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہے زیادہ فلٹروں سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔

کنوئیں کے پانی کے اوپر کا حصہ صاف ستھرا دکھائی دینے سے بھی کاربونک ایسڈ گیس اُس میں ملی رہنے کی وجہ سے اُس کو بھی کام میں لانا خوت سے خالی نہیں ہے۔ اُس کی نسبت کنوئیں کے نیچے کا پانی پاک

ہوتا ہے۔ اس لئے اُسے بغیر خوف کے استعمال میں لایا جاسکتا ہے

لباس :- غذا کے ساتھ ہی لباس کے متعلق بھی اُنہوں قائم رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جسم کو گرم رکھنے کی طاقت لباس میں نہیں ہوتی جسم کی گرمی کو قائم رکھنے کے لئے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تھلہ کے اذیر فلنیل (فلنلین) رہنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بیکار زیادہ پیسے پہن کر جسم کو سردی و گرمی نہ برداشت کرنے کے قابل بنانا بھی اچھا نہیں ہے۔ اس لئے بچپن ہی سے جسم کو تکلیف برداشت کرنے کا عادی بنانا چاہئے۔ پسینہ کے ساتھ ہی بہت سی کثافت ہم لوگوں کے جسم سے برا بھلا نکال دیتی ہے۔ اُس کا داغ کپڑے پر موجود رہتا ہے۔ یہ کہنا فضول ہے کہ جسم کے لئے وہ چونا چھو ہوتا ہے اسلئے پوشاک کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہئے۔ یہاں تک کہ روز دھو دھو کر دھوپ میں خشک کر لینا فائدہ مند ہے۔ رات میں تنگ کپڑا پہن کر نقصان کرتا ہے۔ جوتے کا فیتہ بھی کسکر باندھنا مناسب نہیں ہے۔

بیماری :- زندگی قائم رکھنے کے لئے ہوا بہت ضروری چیز ہے۔ اسلئے قدیم زمانہ لوگوں نے اُس کو "جان جہاں" کہا ہے کثیف ہوا سے اگرچہ انسان فوراً ہی نہیں مر جاتا لیکن جسم جان اور صحت بالکل برباد ہو جایا کرتی ہے۔ مریض اور ڈیلے اُرمیوں کے لئے تو یہ بہت نقصان دہ ہے۔ بیماری میں ہمیشہ کاربوئک ایسڈ گیس نکلا کرتی ہے۔ یہ زندگی کو برباد کر نیوالی ہے جس کمرے میں بہت آدمی رہتے ہیں اُس میں باہر کی صاف ہوا آنے جانے کی وجہ سے اُس کمرے میں کاربوئک ایسڈ گیس میں رہنے سے موت کا بڑا خوف رہتا ہے۔ اسلئے سونے کی کوکھڑی یا کمرے میں ہوا کی آہور و رفت کا کافی انتظام ہونا چاہئے اور باہر سے دوسری صاف ہوا آنے کے لئے بڑی بڑی کھڑکیاں اور دروازے کا ہونا ضروری ہے۔ بہت اسکولوں، کالجوں، ہوسٹلوں، گریہت کے مکانوں میں ابھی ہوا کا کافی انتظام نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ برا ہوتا ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی :- جسم کی خوبصورتی کو زیادہ کرنے اور زندگی قائم رکھنے کے لئے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے۔ تندرست اور مرض سے پہلے کے کے چھوٹے بچے اور بڑوں کو دسب گون کو کچھ دیر تک کھلی جگہ میں جہاں روشنی کا ذرا

ہو گھومنا چاہیے۔ جن جگہوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی وہ سب بیماری کے گھر ہیں۔ جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے اسی جگہوں میں ہیفہ، چپک وغیرہ مہلک امراض کے جراثیم آسانی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہنے کا مکان وغیرہ ایسا بنانا چاہیے جس میں سورج کی روشنی کافی پہنچ سکے۔

ورزش یا کسرت: کسرت یا ورزش سب کے لئے مفید نہیں ہے۔ مریض اور کمزور آدمیوں کو ورزش سے نقصان ہوتا ہے۔ ٹنڈ لگانا۔ ٹکدر کی جوڑی ملانا۔ تیرنا۔ تیز چلنا۔ یہ سب ہی بہت اچھی اور جسم میں پھرتی پیدا کرنے والی کسرتیں ہیں۔ ہمیشہ مقررہ وقت پر کھلی ہوا میں صبح یا سہ پہر کو کچھ دیر تک کسرت کرنے سے جسم اچھا رہتا ہے۔

غسل: تندرست آدمی کے لئے پانی میں اتر کر غسل کرنا فائدہ مند ہے۔

غسل سے پہلے تمام جسم میں پیل کی مالش مفید ہے۔ اور غسل کے وقت جسم کو ضرور رگڑنا چاہیے۔ پہلے سر پر پتھر یا پانی ڈالنے کے بعد دوسرے عضو پر پانی ڈالنا چاہیے۔ جو لوگ صبح چار پائی سے اتر کر کسرت کرتے ہیں انھیں کچھ دیر رک کر غسل کرنا چاہیے۔ سمندر کے پانی میں کچھ نمک ملا رہتا ہے۔ اسلئے اس پانی میں نہانا صحت بخش ہے۔ اگر سمندر کا پانی نہ ملے تو غسل کے پانی میں تھوڑا نمک ملا کر غسل کرنا اچھا ہے۔ طاقتور آدمیوں کو صبح اور کمزوروں کو ۹-۱۰ بجے غسل کرنا اچھا ہے۔ بہت گرم پانی کی حرارت ۸۸-۱۱۲- ڈگری قدرے گرم پانی کی حرارت ۹۲-۹۷- ڈگری اور نیم گرم پانی کی حرارت ۸۵-۹۲- ڈگری۔ ٹھنڈے پانی کی حرارت ۴-۷- اور بہت ٹھنڈے پانی کی حرارت ۲-۶- ڈگری ہوتی ہے۔

بخی میں کے بتائے ہوئے حادثہ مزمن امراض کے علامات۔ صحت کے اصولوں کی پابندی نہ کر کے کی وجہ سے یا جسم میں کسی زہر کے داخل ہو جانے کی وجہ سے جسم کی حالت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام بیماری ہے۔

بیماری:- کھلتے پھینکے کی بدعنوانی، لاپرواہی، زیادہ سردی یا گرمی کے اثر کی وجہ سے موسم کے یکایک بدلنے کے وقت ہوشیار نہ رہنے سے

ریخ، غصہ وغیرہ، دماغی انتشار کی وجہ سے بہت محنت سے مرطوب مقام میں
 رہنے سے صحت کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے سے جسم کی حالت میں جو تبدیلیاں
 ہو جاتی ہیں اُس کو بیماری (یا مرض) کہتے ہیں۔ کھانے پینے کی بے اعتدالی یا فاقہ،
 موسم، سردی یا دوسرے موسموں کے موافق غذا لباس، وغیرہ کا
 انتظام ہوا دار اور صاف مکان میں رہنا وغیرہ صحت کے اصولوں کی پابندی
 کرنا۔ جو اس بیماری کے خاص سبب کو دور کر سکتا ہے۔ وہ خود ہی (یعنی بغیر
 دوا کے استعمال) تندرست ہو سکتا ہے۔

مرض (DISEASE) خون میں کسی ذہر کے پھیلنے (یا داخل ہوجانے)
 کی وجہ سے جسم کی حالت میں جو تبدیلی ہوتی ہے اُس کا نام مرض (یا درد
 یا تکلیف) ہے۔ مرض پیدا کرنے والے ذہر کو (وائر) (VIRUS)
 جراثیم مرض کو (DISEASE GERMS) دوزیر جرّمس
 یا میازم (MIASMS) کہتے ہیں۔

کینٹ کا بیان ہے کہ میازم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نیا اور پرانا۔ جیسے
 خسرہ کا ذہر، چچک کا ذہر، پلگ کا ذہر وغیرہ نئے میازم ہیں اور سوزاک کا
 ذہر، آشک کا ذہر وغیرہ، پرانے میازم میں ہیں۔ دونوں قسم کے میازم کی ترقی
 لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ اور اُس وقت کل نظام قصبی خراب ہو جاتا ہے اس ترقی کے
 بعد اُس میں کچھ پھوٹنے لگتے ہیں اور وہ بڑھنے لگتے ہیں (ACUT MIASMS)

(حاد میازم) جیسے خسرہ کا ذہر) پھیلنے پر مرض کے جسم میں اُس کا آغاز
 (پروڈروم) (PRODROME) برضا یا ترقی پروگرس (PROGRESS) اور گھٹنا

۱۔ بیماری کسی قسم کی مادی طاقت سے پیدا نہیں ہوتی ہے یہ طاقت اندر
 پوشیدہ ہے۔ یعنی یہ ہم لوگوں کی زندگی کے فعلوں کی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر بریڈ میڈ نے یہ کہا
 ہے کہ اس قوت حیات کا بے قاعدہ ہو جانا ہی مرض ہے (براڈ صاحب کی تقریر موسمہ آٹ
 ڈیزیز این میڈیسن) مطبوعہ ہوم ورلڈ ماہ نومبر ۱۹۶۲ء صفحات ۲۸۲-۲۸۳ اور
 ڈاکٹر ہوز کی تصنیف پریل انڈیا پرائیکٹس صفحات ۳۱-۲۲۔ ملاحظہ ہو۔

(DECLINE) (ظلمات) یہ تین حالتیں یکے بعد دیگرے آجاتی ہیں۔ اور گھٹنے کی حالت اکثر تندرستی کی حالت میں بدل جاتی ہے۔ (یعنی زہر جسم سے یکدم نکل جاتا ہے۔ لیکن پُرانا یعنی کرائنک میازم (CHRONIC MIASM) جیسے آتشک کا زہر پھیل جانے پر مریض کے جسم میں اس کا آغاز، یا بڑھنا۔ یہ دونوں حالتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور گھٹنے کی حالت نہیں رہتی (یعنی آدم مرگ مریض کے جسم میں یہ موجود رہتا ہے۔ اور سچی ہو میوٹیک دوا سے استعمال کے بغیر وہ زہر کسی طرح نہیں نکل سکتا۔ گرائنک میازم کا دوسرا نام سود المزاج ڈن کریشیا (DYSCRASIA) ہے۔

جسم میں متذکرہ بالانے اور پُرانے زہر کے پھیلنے کی وجہ سے مرض بھی دو طرح کا ہوا کرتا ہے۔ جیسے "حاد" اکیوٹ (ACUTE) اور مزمن مرض کرائنک (CHRONIC)

امراض حاد (نیا) اور مزمن پُرانا (جسم میں کوئی نیا زہر یا جراثیم داخل ہونے سے جو مرض پیدا ہوتا ہے اُس کو مرض حاد یا نیا (اکیوٹ) (ACUTE) کہتے ہیں، مرض مزمن (پُرانا مرض) کے متعلق ہنری مین نے کتاب موسومہ کرائنک ڈیزیز میں لکھا ہے کہ کسی پُرانے زہر کے (جیسے زہر سورا۔ زہر آتشک، یا زہر سوزاک) جسم میں سرایت کرنے سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اُس کو مرض مزمن یا پُرانا سوزاک (کرائنک) کہتے ہیں۔ نئے زہر (جیسے زہر خسرہ) کا جسم میں سرایت کرنے کا نتیجہ نیا حاد مرض (جیسے خسرہ یا چھوٹی مانتا) ہے۔ اور کسی پُرانے زہر (جیسے زہر آتشک) کا جسم (زہر آتشک) کا جسم میں سرایت کرنے کا نتیجہ مرض مزمن (جیسے آتشک) ہے۔ مرض حاد میں تین حالتیں آغاز (PRODROME) ترقی (PROGRESS) انحطاط (DECLINE)

یکے بعد دیگرے ہوا کرتی ہیں اور اکثر یہ مرض مزمن (یا کبھی موت) میں بدلا کرتی ہیں۔ لیکن امراض مزمن میں دو ہی حالتیں آغاز اور ترقی ہوا کرتی ہیں اور زمانہ انحطاط نہیں ہوا ہے۔ دیکھئے جب تک جسم قائم رہتا ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرض حاد کی رجعت زمانہ انحطاط کی جانب ہوتی ہے۔

اور مزمن مرض کی نسبت کبھی زمانہ انحطاط کی طرف نہیں مڑتا ہے بلکہ ہمیشہ ترقی کی جانب ہے (مزمن مزمن) 'کے' کے اشخاص پر حملہ کرتا ہے۔ یا پھر کبھی کبھی دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مرض مزمن نسلاً بعد نسلًا چلا سکتا کرتا ہے اور اس سے پیدا شدہ امراض جلدیہ وغیرہ جسم کے بیرونی حصہ سے جسم کے اندرونی حصہ میں داخل ہوتے ہیں (یعنی بہت ایلو پیٹیک دوائیں کھانے کی وجہ سے مرض جلدیہ دب کر جسم کے اندرونی آلات پر حملہ کرتا ہے اور بہت سے خوفناک علامات پیدا کرتا ہے۔ نئی بیماری بغیر دوا کے ہی دور ہو سکتی ہے لیکن سوز المزاجی کو دور کرنے والی دوائیں استعمال کے بغیر پُرانا مرض کبھی دور نہیں ہوتا سہ

ادویات سے پیدا ہونے والے امراض:- متذکرہ بالا حاد اور مزمن امراض کے علاوہ بنی میں صاحب نے ایک قسم کا مرض اور بتایا ہے۔ کوئین، افیون، پارہ، سکھیا، یا بہت قسم کی پیٹنٹ ادویات نے عرصہ تک زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے مرض مزمن کے ایسے علامات مریض کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کو وہ ادویاتی فتور کہتے ہیں۔ مریض کے جسم کل یا کسی حصہ کا بُر ہٹنا یا ڈھیللا ہو جانا، قوت ادراک اور قوت خیال کا زیادہ ہونا۔ یا کم

سہ ایک یا دو سال کے بچہ کو ڈبلا پن اور سوکھا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ بچہ نے اپنے ماں۔ باپ سے کوئی مرض مزمن پایا جاتا ہے۔

سہ ناظرین کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرض حاد میں (نئی بیماری) ان دونوں الفاظ کے جو معنی ایلو پیٹیک ہیں ہوتے ہیں ہو میو پیٹیک میں ان دونوں الفاظ کے وہ معنی نہیں ہیں جن امراض کا زمانہ دو ماہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ایلو پیٹیک کے مطابق امراض حاد (کیوٹ) دو ماہ بعد سے دس یا بارہ ماہ تک وہ مرض بہت حاد نہیں جب اکیوٹ مرض کہلاتا ہے۔ اُس سے بھی زیادہ دیر مرض کے قیام رہنے پر اس مرض کا نام مزمن یا پُرانا ذکر انک مرض ہوتا ہے۔ ہو میو پیٹیک میں مرض حاد اور مرض مزمن کے معنی ہیں۔ اسکی تشریح اوپر کی گئی ہے۔

سہ باب ج:- سوز المزاج اور اس کے دفعہ کا بیان ملاحظہ ہو۔

ہو۔۔۔ جگر وغیرہ آلات کا ملائم، سخت یا زخمی ہونا "امراض آلات" کے خاص علامات ہیں (امراض علامات کا باب ملاحظہ ہو) امراض ادویات کے ساتھ سو مزاج کے ملنے سے وہ اکثر بہت خراب ہو جاتا ہے۔

امراض مزمن کے علاج کا بربیان۔۔۔ مزمن امراض کا علاج نہایت ہی مشکل ہے۔ مرض مزمن کی خاصیت کا فیصلہ کر کے دوا کا انتخاب کرنا اور اس کو آرام کرنا ہو میو پیٹھیک معالج کا بہت بڑا امتحان اور اس کے معلومات کا ثبوت ہے۔ ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مرض مزمن کا ذہن جسم کے بیرونی حصہ سے اندر داخل ہوا کرتا ہے اسلئے مہنی میں "کی رلے" جن ہو میو پیٹھیک دواؤں کا فعل جسم کے اندر سے جسم کے باہر کی طرف ہوتا ہے وہی دواؤں کو خاص کر امراض مزمن میں استعمال کرنا پڑے گا۔ دوا کے کھانے سے اگر دیا ہوا سو مزاج جسم کے باہر مرض جلدیہ وغیرہ کی شکل میں نمودار ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ مرض شفا کی طرف آ رہا ہے۔ اور اسے کچھ عرصہ تک رد کرنا ہو گا۔ مرض مزمن کے علاج کے لئے وقت درکار ہو گا (کم سے کم دو سال تک اچھی طرح علاج ہو تو یہ آرام ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے)۔ کل علامات کو ملا کر ایسی دوا منتخب کرنی پڑتی ہے۔ اور منتخب شدہ دوا کی ادوی طاقت (ہائی اوپوٹنسی) ہفتہ میں دو مرتبہ، دو ہفتہ میں، یا ایک ماہ میں ایک خوراک دینی ہوتی ہے۔ مشروح حال معلوم کرنے کے لئے مقصد "ب" میں سو مزاج اور اسکو دفع کرنا مہنی میں کا آرگینین (پیرا ۴۲-۸۲ ص ۲۶ تا ۲۶ ملاحظہ ہو)۔

پروفیسر سیمول لیلینٹھل کے مضامین جو کیلوفورنیا ہو میو پیٹھیک میں شائع ہوئے ہیں اور جو آرگینین اور کرائنک ڈیزر کا خلاصہ ہے۔ بورک کمپنڈ صفحات ۴۲-۸۹، کلرک کا پرلین کرائر صفحات ۳۲-۱۰۳-۱۰۴۔ ہو میو پیٹھیک فلاسفھی پریکٹس کے گلیجر صفحات ۱۰۵، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵

اختیار کے ساتھ علاج ذیل ہیں۔

(۱) سیاہی سے صاف حروف میں اپنا نام، پتہ، پیشہ، عمر، وغیرہ لکھنے کے بعد مرض کے علامات وغیرہ بیان کرنا چاہئے۔

(۲) جسم خراب (یا زوال صحت) ہونے پر جسمانی دعا کی جو تبدیلی ہوتی ہے۔ اُن میں ہر ایک کو مرض کی علامت یا (سٹیمٹ) کہتے ہیں۔ ہر ایک علامت مفید یا مریض کے لئے خواہ وہ کتنی ہی معمولی اور حقیر۔ اس کو اچھی طرح سہل زبان میں لکھنے سے کچھ پس و پیش اور شرم نہ کرنا چاہیے۔

(ا) مرض کتنے دنوں کا ہے۔ وہ کیسے شروع ہوا۔ وہ کیا ہے۔ یا کمی یا زیادتی ہو رہی ہے (ب) اس مرض کو آرام کرنے کے لئے کوئی ایلوپیتھک ہو میوٹھک یا بوکیک، ویدک۔ یا یونانی علاج ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا ہو تو اس کا نسخہ یا اس کی نقل ہو تو معالج کو دکھانا ضروری ہے (ج) موجودہ مرض شروع ہونے کے کچھ ہی پہلے چیچک کا ٹیکہ لگایا گیا تھا یا نہیں۔ یا کوئی دوا مرض (جیسے طیر یا بخار، خسرہ، چیچک، یا کسی طرح کی جلد کی بیماری، کھجلی، اگزیمہ، زخم وغیرہ) ہوا تھا یا نہیں۔ اور اسکو اچھا کرنے کے لئے داخلی یا بیرونی دوائیں (جیسے زنگ یا گندھک کا مرہم) کام میں لایا گیا تھا یا نہیں (د) ماں باپ کے خاندان میں دق ہوا تھا، آتشک، سوزاک، وغیرہ کوئی مرض تھا۔ یا ہے کہ نہیں۔ مریض کے پہلے کی تاریخ۔

(۳) یاد رکھنا چاہیے۔

(۴) مرض مزمن میں ہو میوٹھک دوا استعمال کرنے کے بعد پسندیدہ دواؤں کے اندر اگر کبھی مرض بڑھ جائے یا سوزاک وغیرہ مرض کا بہاؤ یا مرض جلدیہ کی شروع کی حالت (جو ایلوپیتھک یا کوئی دوسری تیز دوا کھانے کی وجہ سے دب گیا ہو۔ لیکن حقیقت میں آرام نہ ہوا ہو) پھر نو دوا ہو تو مریض کو دُنایانا اُمید نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایسا ہونے سے سمجھنا چاہیے کہ ہو میوٹھک دوا کا انتخاب ٹھیک ہوا ہے۔ ایسی حالت میں مرض کی ترقی روکنے کے لئے دوا بدلنے سے بہت کچھ نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ (مرض مزمن کے علاج کا بیان ملاحظہ ہو۔)

(ب) جس کا علاج ہو رہا ہو اُس کے حکم کے بغیر مریض کوئی دوا نہ کھائے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معالج سے پوچھے بغیر قبض دُور کرنے کے لئے مریض کوئی نقصان کر نیوالا جلاب، درد دُور کرنے کے لئے افیون سے بنی ہوئی دوا یا کوئی دوسری علامت کو دبانے کے لئے کوئی سپٹیت الیو پتھک، یا ہومیو پتھک کھا کر بیماری اور بھی بُرا پڑا ہے۔ (ج) قدرت کا اُصول ہے کہ بھوک لگنے پر کھائے، بھوک اچھی طرح نہ لگی ہو تو تھوڑی سی ہلکی غذا کھانا یا بالکل ہی نہ کھانا ہی بہتر ہے۔ کسی خاص حالت میں فاقہ کرنا فائدہ مند ہے۔ یہ تو کہنا ہی بیکار ہے کہ بھوک، پیاس کو دُور کرنے کے لئے ہلکی غذا یا طاقتور غذا کھانا اور پاک دھات پانی پینا۔ یا خالص دودھ پینا منع نہیں چلے کافی بھی تھوڑا مقدار میں پینا ممنوع نہیں ہے۔ لیکن دیر ہضم غذا کھانا تیز آچار، اود دوسری غذا کے سامان اور مشروبات جو ہضم کے لئے نقصان دہ ہیں۔ اُن کو زہر کی طرح ترک کر دینا چاہیے۔

(۴) موجودہ علاج کے وقت دوا کھانے کے بعد سے مرض ترقی کرتا ہے۔ گھٹتا ہے۔ جوں کا توں ہے۔ یہ لکھ کر اُس معالج کے پاس بھیج دینا چاہیے۔

دوا کے استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی نئی علامت یا نئے نئے علامات معلوم ہوں تو معالج کے جاننے کے لئے اُس مرض کی علامت یا جو جو علامات ہوں تو وہ سب لکھ کر اُن کے نیچے ایک لکیر کھینچ دینا چاہیے۔ ان میں جن علامات کیوجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اُن کے نیچے دو لکیر کھینچ دینا چاہیے۔ اگر دو کھانے کے بعد کوئی پُرانا دیا ہوا مرض پھر نمودار ہو تو معالج کے جاننے کے لئے اوپر لکھے ہوئے مرض کے علامات لکھ کر اُس کے نیچے تین تین لکیریں کھینچ دینا چاہیے۔ باقی علامات مرض کے نیچے لکیر کھینچ کر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(۵) معالج کو یہ بھی لکھ کر بتا دینا ہو گا کہ اُس کی دوا سے مرض ترقی کر رہا ہے، کمی ہے، یا اُسی حالت میں ہے یا علاج کی ذمہ داری دوسرے معالج کے سپرد کی گئی ہے۔ کیونکہ ہومیو پتھک علاج کے آئندہ ترقی کے لئے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔

(۶) چنتا خاص طریقے

مرض کی اس میں بلکہ مریض کا علاج کرنا ہی اسی ہومیو پتھک ہے۔ یعنی صرف

مرض کے نام کے مطابق یادوچار علامات پر نظر رکھ کر علاج کرنا ہی ہو میو سٹیک طریقے کے موافق علاج کرنا نہیں کہلاتا۔ بلکہ مرض کے چھوٹے سے چھوٹے اور لطیف سے لطیف علامات کو معلوم کر کے دوا دینا ہی ہو میو سٹیکی علاج کا خاص کام ہے۔ جیسے یہ معلوم ہونے سے کہ بحیثیت ہوئی ہے۔ مرکبوریس دیدینا ہو میو سٹیک معالج کا کام نہیں ہے۔ بلکہ مریض کے جملہ علامات کو معلوم کر کے مفید دوا کا انتخاب کرنا اور دینا (جیسے مرکبوریس، آسکون مایلو، نکس واپو، پودو، آپس۔ یا کوئی دوسری دوا انتخاب کرنا ہی اصلی ہو میو سٹیکی ہے۔ اس لئے

(۱) اور (ب) قوتِ جس (ج) کل اعضا کی حالت (د) بہادری (جیسے سردی، رال، حیف (و) مرض ہونے کے اسباب (س) علامات مرض کی زیادتی و کمی (ص) مریض کے خاص علامات (ط) ذاتی استعداد (ع) سور مزاج) حتی الامکان بیان کرنے کے بعد (۲) (الف) مریض کے دماغی خیالات (ب) سر کے بالوں سے لیکر پیر تک کل اعضا کے علامات پورا پورا اور تشریح سے لکھنا ہو گا۔

(۱) درد وغیرہ کے علامات

(۱) دردِ جسم کے کسی جگہ (جیسے گھٹنے، کمر، پستان، ناف وغیرہ سے) درد معلوم ہوتا ہو۔ اور اس کی حفاظت۔ (جیسے جلن ہو، تیزی سے بدلتا ہو۔ ادھر ادھر گھومتا ہو، کن کن، جھن جھن، تپک ہو، کترنے کی طرح، چبانے کی طرح، نوچ ڈالنے کی طرح، سوئی پھینے کی طرح، کس کر پکڑنے کی طرح یکایک شروع ہو کر یکایک رک جائے۔ یا درد آہستہ آہستہ شروع ہو کر یکایک رک جائے وغیرہ علامات) اچھی طرح سمجھا کر پورا لکھنا چاہیے۔

(ب) احساس۔۔۔ گلے میں گویا کسی نے پوٹلی باندھ رکھی ہے۔ پیٹ میں گویا انڈا اُبل رہا ہے۔ کلیجہ گویا بیٹھ رہا ہے۔ بازو پر گویا چوٹی رنگ رہی ہے۔ مریض کو ایسا خوف ہوتا ہے کہ آنکھ بند کرتے ہی گر پڑے گا۔ مریض کو ایسا معلوم ہو کہ پیروں میں برف سے تر ٹھنڈا موزہ پہنے ہے۔ وغیرہ احساسات اچھی طرح ذرہ ذرہ بتانا چاہیے۔

(ج) عام حالت :- (جنرل کنڈیشن) (GENERAL CONDITIONS)

جیسے وہ اس قسم کی تیزی۔ جسم کا دبلا ہونا۔ ناخوشی، رغبت، نفرت، سوتے وقت کس طرح سوتا ہے (چیت، کروٹ یا اوندھا) رات کے آخری حصہ میں خواب دیکھنا۔ دائیں یا بائیں حصہ جسم یا ایک کے بعد دوسرے حصہ پر حملہ ہونا۔ سر سے پیر تک گویا بجلی کی لہر دوڑتی ہے۔ کان میں گویا ٹھنڈی ہوا گونج رہی ہے۔ اس طرح کے کبھی علامات سوچ کر لکھ دینا چاہیے۔

(د) اخراج :- جیسے زخم یا ٹھنڈ، ناک، آنکھ، کان، پھیپھڑا۔ آلات ناسل۔

یا کسی دوسرے عضو کے کسی قسم کا اخراج ہوتا ہو تو وہ لکھنا ہو گا۔

اخراج کی مقدار، رنگ، کپڑے میں داغ لگتا ہے یا نہیں، بو، خاصیت۔ (جیسے سوزش پیدا کرنے والا۔ چلد میں خارش پیدا کرنے والا۔ کس وقت

اور کس حالت میں اخراج کم یا زیادہ ہوتا ہے) ان سب باتوں کو لکھنا ہو گا۔

(س) اسباب مرض :- جیسے جارے کی خشک ہوا لگنا۔ برسات میں تر ہوا

لگنا۔ ٹھنڈے پانی میں نہانا۔ یا دوڑ جانا۔ دب جانا (جیسے خسرہ، چھپک کھجلی کے دلنے وغیرہ دب جانا۔ کھانے پینے کی بے قاعدگی۔ گر بڑنا۔ یا برف کھانا۔ تیز دواؤں سے سوزاک کا اخراج روکنا۔ طیر یا بخار کو روکنا۔ کوئین۔ پشردل، آرسنک، لوہا وغیرہ ادویات کے استعمال سے اگر مرض پیدا ہوا ہے تو لکھنا ضروری ہے

(س) علامات مرض کی کمی و زیادتی (AGGRAVATIONS AND

دن میں یا رات یا ادھی رات (AMELIORATIONS OF SYMPTOMS) کے بعد

یارات کے آخری حصہ میں گرمی، یا برسات کے موسم میں کھانے کے وقت کھانے کے پہلے یا پچھے، سونے کے وقت، سونے کے پہلے یا بعد سونے یا گھومنے بدن دبانے یا کسی دوسری حالت میں مرض ترقی کرتا ہو، یا کم ہوتا ہو۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ مرض کی زیادتی و کمی کو اچھی طرح معلوم کر کے ہی ہو مو سٹیک کا سچا معالج دوا کا انتخاب کر سکے گا۔ اس بات کو مریض کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ (BOENNING HAUSEN) جو ہو مو سٹیک کے

ابتدائی زمانہ میں ہومیو پتھی کے ماہر تھے، خاصکر مرض کی زیادتی و کمی کے لحاظ سے دوا کا انتخاب کرتے تھے۔ اور اکثر بھی جگہ کامیاب ہوتے تھے۔

(ص) مریض کی خاص علامات :- جو علامت مریض کا خاتمہ ہو گیا ہو (یعنی خیر ہو گیا ہو) اُن کا نام ہی خاص علامت ہے جیسے ناک میں ہمیشہ پیڑی بھری رہنا۔ سرخ رنگ کا ہونا۔ اوپر (نگلا) یا نیچے کا حصہ (مقعد) سے ہوا نکلتے رہنا۔ جسم بہت گرم ہونے پر بھی پیاس کا نہ ہونا، صبح بستر چھوڑتے ہی پاخانہ جانے کی حاجت، بایں کروٹ سونے ہی سے کلیجہ دھڑکتا ہے۔ براز تھوڑا نکلنے کے بعد ہی اُس کا پھر اندر واپس جانا۔ جسم کا بے حس ہو جانا۔ دبانے سے ہی آرام معلوم ہونا۔ وغیرہ امراض کے خاص علامات بھی لکھنا چاہیے۔

ذاتی استعداد (IDIOSYCRASY) (کسی کسی اذمان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برداشت نہیں ہوتی۔ کمر، میں مٹی کے تیل کی روشنی، یا چمپا کے پھول رکھنے پر کسی کسی کو نیند نہیں آتی۔ یہ سب ذاتی خصوصیات بھی بتا دینا چاہتے ہیں۔

(ع) امراض مزمن کی خرابی رہنا جیسے سوزاک کا زہر (SYCOsis) زہر جلد یہ (PSORA) یا زہر آتشک (SYPHILLIS) مریض کے جسم میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ بھی بتا دینا چاہئے۔

دماغی اور جسمانی علامات

(۱) دماغی حالت مزاج وغیرہ جیسے خوشی رنج و غم، خوں، غصہ، نفرت، خودکشی کی زبردست خواہش، غمگین چہرہ، چڑچڑامزاج لڑنا جھگڑنا، لاپرواہی، ناامیدی، مریض کا منصوبہ - غلط عقیدہ رونا۔ مغرور، بدلہ لینے کی خواہش، تیزی، یادداشت کا کم ہونا۔ وغیرہ دماغی علامات ہیں۔

(ب) کل عضو کی حالت

(۱) بیرونی حصہ۔ جیسے سر بھاری۔ سر میں جڈ، سر کھجوانا۔ تاویں ملن

کپٹی میں چمکن، سر کے اندر بوجھ معلوم ہونا (۲) آنکھ اور قوت بینائی کے علامات۔ جیسے آنکھ میں آنکھوں کی پلکیں۔ بیرونی بتلی کو یہ وغیرہ کی حالت اور قوت بینائی کی کمی، بینائی میں جھک نصف نظری، بینائی کی تھکاوٹ وغیرہ علامات۔ (۳) کان اور قوت سامعہ کی علامت :- جیسے کان کا بیرونی حصہ، درمیانی حصہ، یا اندرونی حصہ کی جلن، درد وغیرہ، بہرہ، صاف نہ سننا یا سننے کی طاقت کی کمی یا زیادتی وغیرہ۔ آلات سامعہ کی خرابی وغیرہ (۴) ناک اور قوت شامہ کے علامات :- جیسے ناک سے خون گرنا۔ ناک میں پھڑکی جھنا۔ قوت شامہ کی کمی (۵) چہرہ، ہونٹ، داڑھی، وغیرہ کے علامات جیسے رنگ کا سفید ہونا۔ خشکی، پھنسی یا پھوڑا ہونا وغیرہ (۶) منہ، زبان، دانت، مسوڑھا۔ کٹا۔ وغیرہ کی حالت :- منہ میں بدبو، زبان سرخ، خشک یا زخم ہونا۔ مسوڑھوں میں درد اور زخم۔ کٹا میں سرسراہٹ (۷) گلا جیسے تالو کی جڑ میں جلن، اور گلے کی نالی کے چھلکی کی سوزش، گلے میں جلن ہونا وغیرہ (۸) شکم، معدہ، تلی، جگر وغیرہ کے علامات :- جیسے درد معدہ، صفراوی قویج، جگر میں اماس، اور درد۔ دست، پانی پینے کی خواہش۔ لیکن پانی پیتے ہی تھو جانا۔ کسی غذا یا مشروبات کی خواہش یا نفرت، کس وقت بھوک معلوم ہوتی ہے وغیرہ علامات (۹) ہمارے جیسے ہمارے وزن میں تھوڑا، گہرا، پیلا، بدبو دار اس میں کپڑے ہیں، یا نہیں (۱۰) بول یا الکات :- رات کو سونے میں بے خبری سے پیشاب ہو جانا۔ پیشاب روکنے سے ناقابل پیشاب، گارحساب، پیلا زنگ پیشاب کے وقت پیشاب کی نالی میں جلن (۱۱) آلات تناسل مردانہ، جریان و سوزاک اور اُس کی دہر سے آلات کے بالائی پٹے اور سیاری میں کھجلی ہونا۔ آلات تناسل کی سوزش اور درد، آماس، پیلا دست، ہوتے وقت مجبوری البول غدہ ندی سے خون کا اخراج وغیرہ، کل علامات اور نسل بعد نسل کا ہے یا نہیں (۱۲) آلات تناسل زنانہ :- سوزاک وغیرہ کی دہر سے رحم میں سوزش ہونا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جلتی ہوئی چیز کے قندے چاروں طرف پھیلتے ہیں، حیض دیر سے ہونا۔ خون کا رکتا۔ تھوڑا، خون، حیض، حیض کا ٹھیک وقت پر ہونا۔ حیض کے وقت -

پیٹ میں درد سوزش وغیرہ علامات (۱۳) آلہ تنفس :- دسم کی طرح
 سانس لینا۔ ہوا کی نالی کی سوزش، خشک کھانسی، غلاف سینہ کی جلن وغیرہ۔
 (۱۴) قلب :- کچھ کا دھڑکنا۔ قلب کے اوپر یا نیچے درد وغیرہ (۱۵) پھیپھڑا
 دائیں یا بائیں پھیپھڑے میں درد، بوجھ معلوم ہونا۔ کھانسی آنے سے سینہ
 پھٹنے کی ایسی تکلیف۔ سوئی چھبنے کا ایسا درد۔ (۱۶) گردن کے ہرے
 یا کمر۔ دونوں کندھوں کے درمیان سوئی چھبنے کی طرح درد۔ پشت کے
 دونوں شانے کے درمیان جلن معلوم ہونا۔ کمر میں سوئی چھبنے کی طرح درد۔ کمر
 کس کر دہلنے سے درد کی کمی (۱۷) ہاتھ :- جیسے بازو، کہنی، کلائی، ہاتھ، انگلی،
 ناخن، بازو کے عضلہ میں وجع مفاصل کی طرح کا درد، جوڑ اور ہڈیوں میں درد۔
 ہتھیلی میں پسینہ نکلنا۔ تھوڑی محنت کرنے کے بعد انگلیوں کا کانپنا۔ ناخن
 نکل جانا وغیرہ (۱۸) پیٹ و ران :- پیر، گھٹنا، ایڑی، تلو، پیر کی
 انگلیاں، ران کے بالائی حصہ میں کسی خوفناک آلہ کے چوٹ اور سوزش کی
 طرح درد، تھوڑے ہی چلنے پر گھٹنے میں اینٹھن، پیر کے جوڑ اکثر اینٹھ جلتے ہیں۔
 ایڑی میں چوٹ لگنے کی طرح کا درد، تلو۔ انگلیوں کی جلد نکلنا (۱۹) نیند
 اور خواب۔ نیند میں گہری یا رات کے پہلے یا آخر حصہ میں بالکل نیند نہ آنا۔
 خواب میں ڈکیتی دیکھنا۔ یا غیر مالک میں گیا ہوا شخص گھر واپس آ گیا۔
 (۲۰) جلد :- کھجلی یا کو تہ وغیرہ کا ہمیشہ رہنا، جسم سے بدودار پسینہ۔
 نکلنا۔ جسم ہمیشہ گرم رہنا (بخار ۱۰۱) یا ہمیشہ جاڑا لگنا۔ جسم میں جلن۔
 تلوے میں ہمیشہ پسینہ نکلنا۔ کل جسم میں گویا سوئی چھبی جا رہی ہے۔ ہاتھ
 پیروں میں ہمیشہ جلن (ہاتھ کی تصویر نوٹ) قابل یاد رکھنے کی بات۔ اس
 مقصد کے ساتھ سورہ الزحاجی اور اس کے دفعیہ کا باب مقصد۔
 (ب) طلباء کو ضرور پڑھنا چاہیے۔

(BACTERIOLOGY)

علم الجراثیم

(۱) امراض متعدی اور تداویر، حفظ ماتقدم۔

کان کی جڑ کا پھولنا، ہسپ کھانسی، وغیرہ امراض اگر کسی چھوٹے بچے کو ہو تو مکان یا محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے، ایک ساتھ سونے وغیرہ کی وجہوں سے یہ بیماری انہیں بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی چھو جانے سے ہی مرض کا جرم مریض کے جسم سے تندرست جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے مرض کو مرض متعدی یعنی چھوت سے پھیلنے والا مرض کہتے ہیں۔

چچک، باری کا بخار، وغیرہ، اگر کسی کو ہو تو اسکو چھو جانے کے علاوہ مریض کے استغالی چیزوں کے کپڑے لے وغیرہ کے ذریعہ سے یہ جراثیم بہت دور کے رہنے والے تندرست آدمیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ ہوا، پانی، دودھ، گرد و غبار کے ذریعہ، جھینگر، جو ہے بکھی، روپے، پیسے، خط، استرا وغیرہ چیزوں کے ذریعہ مرض کے جراثیم ایک مقام کے مریض سے دوسری جگہ تندرست آدمیوں کے پاس پہنچتا ہے ایسے امراض کو امراض مُسری کہتے ہیں۔

کوڑھ، مرضِ دق، بخار، چچک، سُرخ بخار، نونی، ہیضہ، پچیش، انفلوینزا وغیرہ امراض میں متعدی اور مُسری دونوں طرح کے علامات دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت میں آلاتِ سانس کی مدد سے جتنے ہی مرض کی تحقیقات بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی متعدی اور مُسری کا فرق ہو رہا ہے۔ امراض کے جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتے ہیں۔ پہلے لوگوں کا خیال اس طرف زیادہ نہیں تھا۔ نیز خوردبین وغیرہ کی مدد سے اب بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ ہوا، پانی، ریل گاڑی، جہاز، وغیرہ کے ذریعہ سے ایک ملک کا مرض دوسرے ملک میں آسانی سے جاسکتا ہے (یعنی جن امراض کو ہم لوگ مرض متعدی کہتے ہیں) وہ درحقیقت مُسری مرض کے تحت میں ہیں۔

حفظِ ماتقدم کے تدابیر: جب ذیل آسان تدابیر اختیار کرنے سے خیر، چچک، سُرخ بخار، دق، وغیرہ چھوت دار بیماریوں کی ترقی روکی جاسکتی ہے۔ (۱) صحت کے معمولی اصولوں کی یا بستری۔ مثلاً خشک صاف ہوا دار

لے بعد کا بیان، جراثیم مرض، ملاحظہ ہو۔

مکان میں جہاں روشنی کافی پہنچتی ہو رہتا اور سونا۔ (سورج کی کرنیں۔
مرض کے جراثیم کو ہلاک کرتی ہیں۔) جس جگہ دھوپ نہ جاتی ہو اندھیرا رہتا ہو۔
ہوا کی آمد و رفت نہ ہو وہ امراض کے جراثیم کی پیدائش اور رتی کی جگہ ہے۔
(ب) روئی یا گر دوغبار کے ذریعہ سالن میں نہ پہنچیں۔ اس بات کا ہمیشہ
خیال رکھنا چاہیے۔

(ج) ایسے مریض کو جس کو متعدی مرض ہو گیا ہو، علیحدہ رکھنا چاہئے
حتیٰ الامکان گھر والوں کا اُس کے چھوت سے علیحدہ رہنا چاہیے۔
(د) ہیفیضہ کے مریض کی تہ و دست اور دق کے مریض کی بلغم و قہقہہ وغیرہ
اگر کسی طرح تیار دار کے جسم میں لگ جائے تو اُس کو فوراً دھو ڈالنا چاہیے۔
(س) مریض کے کمرے میں اس کا یا کسی دوسرے شخص کے کھانے پینے کا سامان
اور دوا وغیرہ رکھنا نہ چاہیے۔

(سب) مریض کے کمرے میں دھوپ، دھوئی، گندھک کا فور جلا
یا فنانیل جھڑکنا چاہیے۔

(ص) اگر حوائی یا بنے کو مرض متعدی ہو تو اُس کی دکان سے کھانے
پینے کی چیزیں مٹھائی وغیرہ خریدنا نہ چاہیے۔

(ط) مرض متعدی جہاں خوب پھیلا ہو، وہاں سے کوئی چیز (جیسے چادر،
ٹرکاری، کپڑے، روپیے، خط وغیرہ) آوے اُس کو خوب گرم پانی سے دھو لینا چاہیے
یا کسی دوسرے طریقے سے انہیں پاک و صاف کر لینا چاہیے امراض ”دق“، ”ہیفیضہ“
انفلوینزا وغیرہ میں معادن اور علاج حفظ التقدیم (روکنے والا) ملاحظہ ہو۔

(DISEASE GERMS)

(۲) جراثیم امراض

بہت جستجو کرنے کے بعد عالم معالج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جسمائیم ہی مرض
متعدی کے خاص سبب ہیں، درختہ بیل وغیرہ سے گھرے ہوئے اندھیرے
چھوٹے نالوں کے اور پر اکثر کائی کی طرح ایک ہکا پرست دکھائی دیتا ہے۔
خوردین کی نند۔ اس کی جانچ کرنے پر اُس میں بہت سے

چھوٹے چھوٹے کپڑے دکھائی دیتے ہیں۔ جراثیم (کپڑے) شکل میں کچھ گول کچھ
 ٹیڑھے، اور کچھ سینگ کی طرح سیدھے ہوتے ہیں، بہت قلیل وقت میں ایک
 ایک جرم ہزار ہو جاسکتے ہیں۔ یہ جراثیم زمین کی خشکی، تری اور کڑواہوا میں
 دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن خاص کر بیمار جسم، بدبو دار اور بند جگہوں میں لاش میں
 درخت اور سیلوں سے ڈھکے ہوئے تالابوں میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ یہ
 جراثیم تین طرح سے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں: جیسے کھانے پینے
 کے ساتھ معدہ میں سانس کے ساتھ پھیپھڑے میں یا جراحی کی پچکاری کی دوا
 کے ساتھ (انجکشن) (INJECTION) خون میں داخل ہو جاتے ہیں۔
 سائنس دان جراثیم کو انسان کے جسم کا نہ دکھائی دینے والا دشمن کہا کرتے
 ہیں۔ لیکن ان امراض کے پیدا کرنے والے جراثیم کے علاوہ انسان کے جسم میں
 ہر جگہ فائدہ مند جراثیم بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
 حقیقت میں یہ جراثیم انسان کے نہ دکھائی دینے والے دوست ہیں۔

کھانے کی چیزوں یا سانس کی آمد و رفت کے ساتھ یہ فائدہ مند جراثیم
 انسانی جسم میں داخل ہو کر آلات ہاضمہ کو مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہ جراثیم
 نباتاتی ہیں یا حیوانی، اس بارہ میں سائنس دانوں میں آج بھی اختلاف ہے

لے جن مکالوں میں بہت لوگ رہتے ہیں جہاں پتھر کاٹے جاتے ہیں اور پاشی کی جاتی
 ہو، پھلے، غلے، دفتری کی دوکان، چڑے کی دوکان، بازار کا دھانے گوشت کی
 دوکان، قصائی، بالے وغیرہ گندے مقامات بھی جراثیم امراض سے پُر ہوتے ہیں۔
 لے بنگلہ میں پروارک چکت کے گیارہویں بار طبع ہونے کے بعد ظلم الجراثیم کے عاملوں
 کی تحقیقات کا نتیجہ (اگست ۱۹۲۴ء) مندرجہ ذیل ہے۔

انسان کے جسم کو نقصان پہونچانے والے اور فائدہ پہونچانے والے جراثیم کی شکل
 میں اتنا کم فرق ہے کہ ان کا پہچانا مشکل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا پانی کی طرح جراثیم بھی
 انسانی جسم کے لئے بہت ضروری ہیں۔ قدرت ان جراثیم کے ذریعہ سے نباتات اور
 انسانی جسم کی بہت سی خرابیاں دور کر دیتی ہیں (بقیہ مآشیہ ص ۱۳۱ پر)

امراض پیدا کر نیوالے جراثیم بہت عرصہ تک مُردہ کی طرح پڑے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اُس کی بیماری پیدا کرنے والی طاقت زائل نہیں ہوتی۔ کھانے پینے کے ذریعہ سے یا سانس لینے کے ساتھ ہی انسان کے جسم میں داخل ہو کر جسم کے اندر مناسب غذا، ہوا اور تری پا کر طاقتور ہوتے۔ اور بڑھتے ہیں اور کھوڑے ہی وقت

اور ہمارے جسم میں جھاگ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ یا کیمیائی تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، دودھ۔ دودھ سے بنا کر مکھن اور بہت ہی قیمتی شراب اُن کی وجہ سے خوشبودار لذیذ ہو جاتی ہیں۔

۱۔ ایم۔ ڈی کی ڈگری حاصل کر لینے ہی سے مرض میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایسا جن کا خیال ہے کہ اُس کے واقفیت کے لئے پورٹس ماؤتھ کا حال ہی میں ایک جلسہ ہوا تھا۔ اُس میں ڈاکٹر کیشلینی (CASTELLANI) نے علم الامراض (PATHOLOGY) اور علم الجراثیم (BACTERIOLOGY) کے بارے میں جو تقریر کی تھی اُس کا اختصار ذیل میں درج ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہا کہ گرم ملک کے رہنے والے جن امراض کے شکار ہوتے ہیں اُن میں ایک جو تھائی جھٹہ کی خاص وجہ نباتاتی (FUNGOID) جھلتے کے جسم کی) سے پیدا ہے۔ (عیسوس ستر حصوں صدی میں اسکا بیان ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس جھلتے والے نباتاتی علم کی بے عزتی ہوتی تھی جراثیم اور چھاتے والے نباتاتی جرم، دونوں نباتاتی جراثیم کی دوسری شکل ہیں اور دونوں زہر (TOXIN) اُگلا کرتے ہیں۔ اس جھلتے والے جراثیم یا زہر (ٹاکسن) سے بہت مہلک مرض پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے یوروپین ڈاکٹر اُن کی پیدائش کا سبب بالکل نہیں جانتے۔ اس لئے دوسری ہڈی بڑا بیجا کام کر رہے ہیں۔ جیسے موسم سرما کے پھوڑے دار۔ گرم ملکوں کا ایک قسم کے آلات تنفس کا مرض بہت قسم کی جلد کی بیماری وغیرہ امراض کا خاص سبب سمجھ سکنے کی وجہ سے اور کچھ مہلک جراثیم سے پیدا ہوئے مرض کے ساتھ جراثیم سے پیدا ہوئے مرض کا جیسے ذہنی یا، ٹوبرکل (TUBERCLE) سفلس (SYPHILIS) وغیرہ کی مشابہت دیکھ کر ہی غلط فہمی کے سبب آخری امراض کی دوائیں کھلا کر فریب مریضوں کو جان والے۔ دونوں سے تباہ کر رہے ہیں (بقیہ حاشیہ ص ۱۳۲ پر دیکھئے)

میں لاکھوں جراثیم پیدا کر سکتے ہیں۔ اُن کی تیزی سے پیدائش اور ہلاکت کے سبب جسم میں ایک قسم کا کیمیاوی فعل ہو کر آتا ہے اور اسی کیمیاوی فعل کی وجہ سے کیمیاوی مرکبات (CHEMICAL COMPOUNDS) پیدا ہوتے ہیں۔ اسی ذہر کی تیزی سے جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام مرض متعدی ہے۔ یہ نہایت فضول ہے کہ خسرہ، دق وغیرہ مختلف قسم کے متعدی امراض کی پیدائش کا سبب مختلف قسم کے جراثیم یا جراثیم مرضیہ میں زیادہ حل معلوم کرنے کے لئے اگلے باب میں علاج مصلیٰ اور مقصد (ج) علم جراثیم ملاحظہ ہو۔

(بقیہ ماثیہ ص ۱۳۱ کا) میں نے (DR. CASTELLANI) ایسے جگہوں پر پوسٹیم آؤٹاڈرکائی آؤٹاڈرک استعمال کر کے بہت کچھ کامیابی حاصل کی ہے (شرح حال معلوم کرنے کے لئے دی مورنگ پوسٹ، مورخہ ۲۸ جولائی ۱۹۲۳ء ملاحظہ ہو)۔
 کہ انسان جیسی نند اکھاتا ہے۔ کل جراثیم بھی ویسا ہی نباتات یا گوشت کھا کر مضبوط ہوتے ہیں۔ اسکے بوجہ ترش میال سے یہ بے کار ہو جاتے ہیں، یا مر جاتے ہیں۔ انسان کے جسم سے یہ براز یا دہ کثیف شے نکلتی ہے۔ یہ نکلی ہوئی کثیف شے یازہر (TOXIN) زیادہ مقدار میں جمع ہونے پر وہ نہ مضبوط ہو سکتے ہیں، نہ اپنی نسل کی افزائش کر سکتے ہیں۔ آخر میں معدنل کے ذائل ہو جاتے ہیں۔

علاج آب خون

SERUM THERAPY)

(TREATMENT BY NOSODES) فاؤزہر کا بیان

(ISOPATHY) تریاق ذہر جراثیم کا بیان

بہ نسبت پہلے کے آجکل جراثیم پر بہت غور و خوض ہو کر آتا ہے۔ جراثیم ہر جگہ موجود ہیں۔ ایسی جگہوں میں خاص کر درخت، پتے وغیرہ دھکے رکھنے سے اندھیرا ہوتا ہے۔ اور ہوا وغیرہ نہیں جاتی۔ اور چھوٹے مایوں میں جراثیم

غور کرنے سے پانی کی سطح پر ایک پرت کالی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ پرت جراثیم سے بھری رہتی ہے۔ کل جراثیم آدمیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے پہلے مقصد میں بتایا گیا ہے کہ ان میں بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں ان کو جراثیم رقیق کہا جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو سانس، غذا، پانی، دوا یا کسی دوسرے ہی طریقہ سے خون میں پیوست ہو کر انسان کی زندگی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔

ان جراثیم کی پرورش یا زندگی کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے جیسے (۱) غذا (۲) ہوا (۳) تری معمولی (بہت زیادہ نہیں) (۴) ہلکی گرمی ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی جراثیم ہیں۔ (کراڑ پیدا کرنے والے جراثیم) جو صرف ہوا میں (یعنی ترش چیزوں سے علیحدہ جگہوں میں ہیں) زندہ رہتے ہیں۔ کوئی جرم مذکورہ بالا تین حالتوں میں یعنی غذا، تری، اور ہلکی گرمی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خشک جگہ یا خشک حالت میں جراثیم کثرت سے مریجاتے ہیں۔ اسلئے سونے کا کمرہ، بادورچی خانہ، گہوٹا، اسطبل وغیرہ خوب صاف اور خشک ہوں، روشنی اور ہوا کافی جاتی ہو، اس کا انتظام رکھنا بہت ضروری ہے۔

جراثیم کل جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں

کل جراثیم ان تین طریقوں سے جسم میں داخل ہوتے ہیں جیسے (۱) سانس لینے کے ساتھ (۲) کھانے پینے کے ساتھ اور جسم کی جلد چھل یا کٹ جانے پر خون کے ساتھ ملے

کیوں یا کس طرح جراثیم زندہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں؟

کل جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہی اپنی نسل بڑھانا شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی جسم کا براز، بول وغیرہ یا اپنی حفاظت کے لئے اپنے جسم سے نکلا ہوا کوئی

ملہ جب تک ہم لوگوں کے جسم کی جلد چھل نہیں جاتی یا زخم نہیں ہوتا تب تک اس میں جراثیم داخل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے نشتر لگاتے یا انجکشن کرتے وقت ڈاکٹر آجکل اتنی ہوشیاری کرتے ہیں (یعنی آلات کو اسپرٹ سے دھوتے ہیں، کاربوئک ایسڈ وغیرہ سے پاک کر لیتے ہیں اور نشتر لگاتے ملے ہاتھ کو اچھی طرح دھو کر جراثیم کو ہاک کرنے والا دستاں پہن لیتے ہیں جسم میں جس جگہ نشتر لگانا ہوتا ہے اسکو بھی اچھی طرح پاک و صاف کر لیتے ہیں۔ وغیرہ)

زہر بلا مادہ (ٹاکسن) چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بول دہرا یا اپنی حفاظت کے لئے
 تھوڑا ہوا مادہ زہر ہے یعنی انسان کے جسم میں یہ مادہ مثل زہر کے کام کرتا ہے اسلئے اس کو
 "ٹاکسن" کہتے ہیں۔ "ٹاکسن" ایسی چیز ہے جس میں خون برباد کرنے کی بہت بڑی
 طاقت ہے۔ اور یہی انسان کے جسم کے کل اسباب زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔

عوض یا بدلہ :- ہم لوگ جس کو خون کہتے ہیں، وہ کوئی اصل شے نہیں ہے۔
 یعنی خون کا ایک حصہ پانی کی طرح رقیق چیز ہے۔ اس کا نام پلازما (PLASMA)

ہے۔ اس پلازما کے اندر بے شمار سفید اور سرخ ذرات پتہ رہتے ہیں۔ یہ سفید
 ذرات انسان جسم کے بادشاہت کے جھاڑ و بردار اور سپاہی کی طرح ہیں۔ ان
 کا کام یہ ہے کہ جسم میں کسی حرم کے داخل ہوتے ہی وہاں تھوڑا زیادہ خون بڑی تیزی سے
 آکر جمع ہو جاتا ہے۔ اس خون کے ساتھ کچھ زیادہ سفید ذرات بھی اس جگہ آ پہنچتے ہیں
 خون کے یہ سفید ذرات اس جگہ جہاں جراثیم ہیں، آکر قاعدے سے جراثیم
 کی افزائش میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اور صحیح الامکان جراثیم کو نگلنے یا مار ڈالنے
 کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جان زندگی کی بازی لگا کر جو جنگ ہوتی ہے، اس میں
 اگر سفید ذرات کی فتح ہوتی ہے تو یہ اماس کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف اگر جراثیم
 تعداد میں بہت زیادہ ہوئے یا ان کا چھوڑا ہوا ٹاکسن بہت تیز ہو تو ان جراثیم سے لڑائی
 میں بہت زیادہ سفید ذرات برباد ہو جاتے ہیں، ان مژدہ سفید ذرات کا دھیر ہی
 پیپ ہے اور اس ذرات کو سکست دینے کے پہلے جسم میں سرایت کئے ہوئے جراثیم
 (یعنی جس مرض کے جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں) اسی قسم کے جراثیم سے پیدا ہوا
 ویکن، جسم کے سفید ذرات کو تیز اور زبردست بناتا ہے۔ وہاں کے تیز ٹاکسن
 کے اثر سے کل سفید ذرات بے جان ہو جاتے ہیں، ٹیکالکلیت سے وہ ان کے ذرات زندہ ہو جاتے ہیں۔
 خون میں ایک قسم کی طاقت ہے کہ اگر روز تھوڑا کوئی زہر جسم میں سرایت
 کرتا جائے تو وہ خون اس زہر کا دافع زہر (نقصان رساں شے) تیار
 کر دیتا ہے۔ بہت خون کٹنے کی وجہ سے وہ جگہ سرخ دکھائی دیتا ہے۔ اور گرم ہو جاتی ہے۔
 تھوڑی جگہ خون جمع ہونے کی وجہ سے اس جگہ اماس ہو جاتا۔ اور وہاں درد کم ہوتا ہے
 جسم کے کسی حصہ پر بھی یہ علامات دکھائی دینے پر ہم اس سے سوزش کہتے ہیں۔

کر سکتا ہے۔ کل جراثیم انسان کے جسم میں سرایت کرنے کے بعد اپنے جسم سے جو میل یا زہر (ٹاکسن) چھوڑتے ہیں وہی ٹاکسن یا زہر ہلاک کرنے والا دافع زہریا نقصان دہ شے ہے۔ یا ایک نقصان رسا مادہ ساتھ ساتھ خون کے بہاؤ میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ ٹاکسن زہر کے فعل میں خلل پڑتا ہے۔ جب کبھی جراثیم ہمارے جسم میں ٹاکسن پیدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ (جسم تندرست اور طاقتور رہنے پر) اسی وقت خون سے پیدا شدہ زہر کو ہلاک کر نوالی چیز کا تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دافع زہر کا یہ فعل ہے کہ جس خاص جنس کے ٹاکسن یا زہر کو تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جسم کا ٹاکسن ہلاک کرنے والے کی طاقت اس دافع زہر میں موجود رہتی ہے۔ ہر طاقت قدرت کی دی ہوئی ہے۔ خون کی دافع زہر پیدا کرنے کی طاقت کم ہو جانے پر اس طاقت کو بڑھانے کے لئے آج کل علاج کی دُنیا میں انٹی ٹاکسن انجکشن یا (طریقہ علاج آب خون) جاری ہے۔

انٹی ٹاکسن سیرم دوسرے جاندار کے جسم سے بُرے آلہ سے نکالا ہوا صرف دافع زہر مادہ ہے۔ یہ خاص جسم کے جراثیم سے پیدا ہوئے زہرور دکنے والا ہے۔ اس لئے اس کا انجکشن (یعنی پیکاری کے ذریعہ سے جسم میں دوا پہنچانا) کرنے پر ان جراثیم سے پیدا ہوا خاص جنس کا ٹاکسن یا زہر کا کام روکنے کے لئے اسی وقت کا تیار کیا ہوا دافع زہر مادہ حسب ضرورت خون کے ساتھ پھیلا دیتا ہے۔ یہ طریقہ علاج آب خون ہمارے علاج بالمثل (ہو میو پتی) میں بہت دنوں سے (ISOPATH) ایسوپیتی کے نام سے

سہ کسی خاص جراثیم کی بیماری میں دیکھیں یا انٹی ٹاکسن سیرم سے فائدہ پہنچانے کے لئے اسی جسم کے جراثیم سے اُس کا تیار کرنا ضروری ہے یعنی جس مرض کے جراثیم کا ٹاکسن کے خلاف "دیکھیں" یا "انٹی ٹاکسن سیرم" استعمال کیا جائے گا۔ اُسے اُسی مرض کے جراثیم سے تیار ہونا چاہیے۔
 تھ دق! ڈفستیریا۔ کزاز وغیرہ امراض کاسیال (بقیہ ص ۱۳۶) پر ملاحظہ کیجئے۔

چل رہا ہے۔ مسیح سے قریب چار سو برس پہلے جنور ٹیس کے ذریعہ اس اطلاع کا طریقہ شاید جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد ۱۸۲۳ء میں ڈاکٹر سکس نے پہلے پہل اسے ہومیوپیتھی میں جاری کیا۔ کچھ عرصہ بعد ۱۸۲۳ء میں علاج بالشل کے دانا ڈاکٹر ہنی تین کے راست بازو ڈاکٹر ہیزنگ نے ۱۸۲۳ء میں ہومیوپیتھی کے ایک ایک پڑانے سرغنہ ڈاکٹر (STAYH) نے اس طریقہ کو بڑی عزت سے ہومیوپیتھی شامل کر لیا۔ سب کے آخر میں ہومیوڈاکٹر ہارنٹ، کیمیا کے قابل فرانسیسی ڈاکٹر (PASTEUR) اور جریشیم کے علم کے ماہر مشہور عالم جرمنی کے دو ڈاکٹروں نے (Koch) اور (BEHRING) موجودہ علاج دنیا میں اس طریقہ علاج کو بڑے زوروں سے جاری کر دیا ہے۔

دقیقہ حاشیہ نمبر ۱۳۵ کا) پیپ وغیرہ مرض کا ذریعہ ہے (VIRUS) یا بیج (GERMS) جسم میں داخل کر کے ان امراض کو روکنا (PREVENTION) یا آرام کرنا (CURE) طریقہ کا نام (ISOPATHY) ہے ان امراض سے تیار کی ہوئی دواؤں کو نو سوڈ (NOSOD) کہتے ہیں۔ تندرست جسم میں متواتر آزمائش کی ہوئی (PROVED) علامت پر نظر رکھ کر دوائیں انتخاب کرنے کے بعد یہ دوائیں ہومیوپیتھی میں شامل کی گئی ہیں اس لئے تندرست جسم میں زہر کی جانچ اور بیمار جسم میں تندرست جسم سے آزمائش شدہ خاص مرض کے پیدا کرنے والے زہر سے تیار کی ہوئی ادویات (NOSODES) کو تجویز کرنا۔ علاج بالشل کے تحت ہے اور مرض سے تیار کی ہوئی دواؤں میں طاقت (POTENCIES) ہماری ہومیوپیتھک فارمکو پیا کے مطابق ہی تیار ہوئی ہے

Dr Stayh dispassionately says:-

I do not doubt that the discovery of the curative action of morbid matters in diseases that produced them to be one of the most important discoveries that has been made since the beginning of our school.

(بقیہ حاشیہ نمبر ۱۳۵ پر ملاحظہ ہو)

(GENERAL DISEASES)

(۲) امراض عام

جن امراض سے جسم کا کل خون یا تمام جسم کے آلات پر مرض کا حملہ ہوتا ہے۔ ان کا نام امراض عام ہے۔ امراض عام کی دو قسمیں ہیں۔
 (۱) امراض خون (بیم امراض سور المرچ (مزاج کی خرابی)
 امراض عام (۲) سور المرچ یا سور مزاج۔
 ————— یا —————

(BLOOD DISEASES)

امراض خون

قابل یادگار۔ اکثر معالج اس کتاب کی جو ہندی میں "پرورک چکتا"۔

(بقیہ طائیفہ ص ۱۳۶ کا) زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لئے ڈوکیں ویدیکم ایڈیشن ۱۹۲۳ء
 در بیان وکیں اینڈ میرا صفحات ۷۵-۷۰ اور سیواستھ سماچار پر بندہ میں جراثیم
 کا بیان ٹولفہ سرکامیش چند رائے ۱۳۲۹ء بنگلہ صفحات ۲۹۸-۳۱۰-۳۱۲۔
 ۳۲۰-۳۲۹ بنگلہ صفحات ۷۴، ۷۵ اور ڈوکیں کپنڈ صفحات ۱۲-۱۳۔ دیکھئے۔
 ڈاکٹر الینس نو سوڈر۔ صفحات ۵-۶۔ ڈاکٹر میوزر پرنس اینڈ برکیٹس آف ہومیو پتی
 صفحات ۲۹-۲۱۔ اور صفحات ۵۷-۷۲۔ دی لائٹ ٹومبر ۱۸۹۵ء کل تک
 جولائی ۱۸۹۴ء اور دسمبر ۱۸۹۵ء اور اس کتاب کا مقصد (ج) ملاحظہ ہو۔

Ruddock's yade Mecum edition 1923 chapter
 "vaccine and sere" P.P. 751-760 Bcericks Com-
 pend P.P. 12-13, Dr. Allen's Nosode P.P.V. VI,
 Dr. Hugh e's principles and practice of Hom-
 eo pathy P.P. 209-211 and P.P. 570-72 The
 Lancet of November 16, 1895. Clinique July
 1894 and December 1895.

کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لئے فخر کی بات ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب خاص کر ان اصحاب کے لئے شائع کرائی گئی ہے جن کو علاج کرنے کا علم نہیں ہے۔ اس لئے اس کتاب کے اگلے باب میں مرض کے نام کے مطابق (جیسے اسہال، خسرہ بخار) ادویات کی مخصوص علامات بذکرہ لکھی گئی ہیں۔ اس سے ہمارے ناظرین کو انتخاب دوا میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ لیکن حقیقت میں اعلیٰ درجہ کے فن طبابت کے ماہر (ہومیو پیتھک ڈاکٹر) جانتے ہیں کہ ایسا سہل علاج اور بہت جگہ مفید ہونے پر بھی ٹھیک ہومیو پیتھی نہیں ہے۔ علامات پر پوری نظر رکھ کر دوا کا انتخاب کرنا ہی سچی ہومیو پیتھی ہے۔ یہ بات ہمارے ناظرین کو بھی نہ بھولیں۔ ایک بات اور بھی تپ محرقہ TYPHUS FEVER لوٹ آنیوالا بخار (RELAPSING FEVER) نام آج کل کے ایلو پیتھک علاج کی کتابوں (PRACTIC OF MEDICINES) سے علیحدہ ہو جانے پر بھی ہم نے اُن امراض کو بھی اس کتاب سے نہیں نکالا ہے۔ کیونکہ ان کے علامات (SYMPTOMS) اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں۔ دوسرے امراض کے علامات کی طرح دوا کے انتخاب میں ناظرین کو بہت مدد ملے گی۔

ہیضہ، طیر یا بخار، چیچک وغیرہ امراض میں جسم کا تمام خون خراب ہو جاتا ہے اس لئے ان کا معمولی نام امراض خون ہے۔ آگے ترتیب دار ان کا بیان کیا جاتا ہے۔
(CHOLERA) ہیضہ (کالرا)

ہیضہ سے مراد "دست و قے" ہے۔

سڑے پانی کی طرح یا چاول کے بیج یا باسی چاول کے مادہ کی طرح کے جھاگ دار دست اور پانی کی طرح بلا بدبو کی قے، مرض ہیضہ کی یہی پہلی علامت ہے۔ آہستہ آہستہ سستی آنکھ اور چہرہ کا بیٹھ جانا۔ پیاس، پیشاب بند ہونا، تشنگی، آواز ٹیٹھ جانا، نبض سا قہ ہونا۔ جسم سرد ہو جانا، سر دھپینے، آنکھوں کا دھنس جانا، جسم نیلا (خاص کر ہاتھ و پیر) سامنے لینے میں تکلیف وغیرہ علامات نمودار ہو کر مریض کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔

ہیضہ کے مریض کے دست اور قے میں ایک قسم کے جراثیم زہریلے تھے ہیں (جراثیم علم اصول کے ماہرین کی رائے سے)۔ یہی اس مرض کے پیدا کرنے والے ٹھیک سبب ہیں۔ تندرست آدمی پانی یا دودھ یا دوسری غذا کے ساتھ کو کھا جاتا ہے۔ اُسی

وقت ہیضہ ہو جاتا ہے۔ اس کا پانی پینے کی وجہ سے گاؤں یا محلہ کے بہت آدمیوں کو یہ بیماری
 ہوتی دیکھی گئی ہے میکٹاناراز ٹریٹمنٹ ان ایشیاٹک کارا
 (MACNAMARA) (TREATISE ON ASIATIC CHOLERA) ملاحظہ ہو۔

۱۸۱۷ء میں ہندوستان، فارس، روس وغیرہ ملکوں میں پہلے پہل مرض ہیضہ
 نمودار ہوا؟ اسکے بعد سولہویں صدی میں شاید یہ مرض عالمگیر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنگال
 میں پہلے پہل ۱۸۱۷ء میں یہ خوفناک مرض نمودار ہوا۔ اسی سہ ماہ میں لیتھوہر ضلع
 کے نل ڈانگا گاؤں میں ایک میلہ کی وجہ سے بہت سے آدمی آئے تھے۔ یکایک یہ مرض
 وہاں نمودار ہو۔ پھر کلکتہ، ڈھاکہ، ممبئی، سنگھ، چانگام وغیرہ شہروں میں اور ان کے ارد گرد
 کے ضلعوں میں یہ پھیل گیا۔ آسٹریلیا، جزیرہ انڈیاں وغیرہ کئی جگہوں کے علاوہ
 اس مرض نے اب تمام عالم میں اپنی حکومت کا سکہ بٹھا دیا ہے۔

ہیضہ خاص کر دو قسم کا ہوتا ہے؟ معمولی اور مہلک۔ معمولی ہیضہ کو صفراوی یا
 کالرین یعنی تیز بہہ ہیضہ بھی کہتے ہیں۔ اور مہلک کو کالرایا ایشیاٹک ہیضہ کہتے ہیں۔
 کبھی کبھی معمولی ہیضہ مہلک ہیضہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
 علاج کی آسانی کے لئے یہ دونوں قسم کے ہیضہ کا فرق مندرجہ ذیل ہے۔

معمولی اور مہلک ہیضہ کا فرق

ایشیاٹک ہیضہ یا کالرایا	معمولی ہیضہ یا کالرین
۱۔ اس میں شروع ہی سے چادر کی بیچ کی طرح کے دست غیر صفر کے ہوتے ہیں۔	۱۔ اس میں پہلے صفراوی دست (سبز رنگ کے) ہوتے ہیں۔ پھر صفر انہیں رہتا
۲۔ اس میں پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ (شاید کبھی رانوں میں ہو۔)	۲۔ پیٹ میں، خاص کر نائے کے گرد کھینچنے کی طرح کا درد ہوتا ہے
۳۔ اس میں پہلے ہاتھ پیر کی انگلیاں نیٹھنے لگتی ہیں۔ بعد ہاتھ پیر نیٹھتے ہیں۔	۳۔ اس میں پہلے پیٹ میں ضرور ہوتی ہے لیکن اوپر کے عضو میں نہیں ہوتی۔
۴۔ جسم کی حرارت یکساں کم ہو جاتی ہے مریض جلد جلد ٹھہلا ہو جاتا ہے۔	۴۔ جسم کی حرارت آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اور مریض ایک دم ٹھہلا نہیں ہوتا

معمولی ہیضہ یا کالرین

۵۔ اس میں اکثر پیشاب نہیں بند ہوتا ہے

۶۔ یہ اکثر غذا ہی کی خرابی سے ہوتا ہے۔

۷۔ اس میں مرضی کا رنگ تھوڑا

بدلتا ہے۔

ایشیا کا ہیضہ یا کالرا

۵۔ اس میں شروع ہی میں پیشاب رگ جاتا ہے۔

۶۔ اس کا خاص سبب ایک قسم کے جرم کا جسم

میں داخل ہونا ہے لیکن غذا کی خرابی ہی

اس کا سبب سابقہ ہو سکتا ہے۔

۷۔ اس میں پہلے ناخن کی جڑ بعد کو کل جسم

نیلا ہو جاتا ہے۔

اسباب مؤیدہ :- گد رچل، موتی ترش یا سٹری چیزیں (خاص کر مچھلیاں)

گوشت (کھانا، کیکڑا، چنگڑی مچھلی، جوڑا، ستو۔ مرضی غذا، چاول، چنایا پاڑ، نئے

چاول، کچوڑی، کھوڑی، بگنی، یا بگن کی کچوڑی، وغیرہ۔ خراب غذا کھانا، زیادہ

کھانا، فاقہ کرنا، کثیف ہوا میں رہنا۔ شب بیداری کرنا، خراب پانی پینا۔ یا بہت نشہ

کا استعمال کرنا، زیادہ محنت کرنا۔ زیادہ گرمی، سردی، جلاب، ہیضہ پھیلنے کے وقت بہت

ڈنڈا کمزوری، محنت کے معمولی اگھو لوں کے خلاف کرنا۔ تبدیلی موسم۔ وغیرہ مرض میں ہیضہ کے

اسباب مؤیدہ ہیں۔ اس ملک میں اکثر غریب یہی کو یہ بیماری ہوتی ہے۔

اصلی سبب :- مذکورہ بالا جراثیم یہ کپڑے (BACILLI) خاص کر ہیضہ

کے دست و پے میں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر کوک کی رائے کے موافق ان کپڑوں کی شکل نشان

کوما (COMMA) ان کی لمبائی ۱/۲۵ انچ چوڑائی ۱/۱۵۰ انچ

ہوتی ہے (ج) حصہ (۲) ملاحظہ ہو۔

حفظ ملاحظہ :- ایام ہیضہ میں ناپاک بدبو دار جگہ میں رہنا۔ زیادہ

کھانا۔ فاقہ کرنا۔ کثیف پانی پینا۔ بہت محنت کرنا۔ یا سٹری مچھلی، گوشت کھانا، بالکل منع ہے۔

اس مرض کے وقت ایسی ترکیب کرنا چاہیے جس میں دل میں ٹھنہ پیدا ہو، بہت شب بیداری

کرنا، سرد اندر بدبو دار ہوا میں نہ رہنا چاہیے۔ ہر کوٹھری میں روزانہ کافور جلانا چاہیے۔

مکان میں جو جگہ نیم یا بدبو دار ہو، وہاں کاربولک ایسڈ، فائل، چونہ پھڑک دینا چاہیے

یا آگ لگا دینا چاہیے۔ ہیضہ کے وقت کپڑے ۳۔ ۴۔ سفیر کا استعمال بہتر ہے۔

مریض کے دست و پے کے لگاؤ سے کوئی چیز پیٹ میں نہ جانی چاہیے مریض کے دست

وقت، اکثر ایچونڈال کر زمین میں گاڑ دینے سے در بہت کم ہو جاتا ہے اگر ماں کو ہیضہ ہو جائے تو بچہ کو اس کا دودھ نہ پینے دینا چاہیے۔ خالی پیٹ کسی شخص کو تیمارداری نہ کرنا چاہیے۔ مریض ابول و برازیلینہ یا رال اگر کسی دوسرے شخص کے جسم میں لگ جائے تو اس کو فوراً بخوبی دھو ڈالنا چاہیے۔ جس کمرے یا کوٹھری میں مریض ہو وہاں دوا یا کھانے کی کوئی چیز نہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کھانے یا پینے کی چیز ہے تو کسی دوسرے کو اسے نہ استعمال کرنا چاہیے۔

پینے کے پانی، دودھ، کھسی وغیرہ کے ذریعہ ہیضہ کا ہر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا ہے۔ اس لئے جہاں ہیضہ نمودار ہو، وہاں کا پانی، دودھ، وغیرہ خوب جوش دے کر استعمال کرنا چاہیے۔ تازہ چونے یا پھٹکری کا سفوف کنواں، تالاب، چشمہ وغیرہ میں ڈال کر بانس سے خوب ہلا دینے سے پانی صاف ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہاکین، اور کیننگ گہم کنویں کا پانی پر گنٹ آف پوٹاسس سے مداف کرینکا مشورہ دیتے ہیں۔ جہاں ہیضہ پھیلتا ہو وہاں کی کوئی چیز (جیسے تراری، چاول، پکڑے، مٹی کے برتن، روپیہ، پیسہ وغیرہ) آگ پر خوب گرم پانی میں دھونے کے بعد اسے کام میں لانا مناسب ہے اسی طرح ہیضہ کا ہر جس چیز میں لگا ہو پاک کر لیا جاتا ہے۔ مرض ہیضہ کے پانچ درجے

(۱) درجہ ابتدائے مرض۔ اس درجہ میں مریض سست ہو جاتا ہے اور اہمال

بغیر درجہ کے ہوتا ہے۔ اس کا زمانہ قیام اسے ۶ گھنٹہ تک ہے۔

(۲) درجہ اشتداد مرض:- چاٹ کی بیج کی مانند دست وقتے ہو جانا۔ اور

تشخ اس درجہ کی خاص علامت ہے۔ اس کا زمانہ قیام ۳ سے ۲۴ گھنٹہ تک ہے۔

(۳) درجہ انتہائے مرض۔ اس درجہ میں کل جسم مثل برف کے سرد ہو جاتا ہے۔

نبض قارب ہو جاتی ہے۔ اس کا زمانہ قیام ۱۲ سے ۲۶ گھنٹہ ہے۔

(۴) درجہ انحطاط مرض۔ اس درجہ میں جسم پھر گرم ہو جاتا ہے اور

نبض معلوم ہونے لگتی ہے۔

(۵) عوارض و نتائج مرض:- اس درجہ میں پھر دست وقتے

بخار، یا ہچکی وغیرہ ہو جاتی ہے۔

ہیفہ کا معمولی علاج

ہیفہ کے تذکرہ بالا درجے کا علاج مشترک آگے بیان ہوا ہے۔ لیکن مبتدیوں کے لئے کل بیان پڑھ کر علامات کے مطابق مناسب دوا کا انتخاب کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ اگر اُس وقت انتخاب نہ کیا جائے تو علاج کا وقت نہیں ملتا اس کے علاوہ خاص خاص موقع پر جیسے مکان میں کوئی مرد موجود نہ ہو یا علاج کرنے والا قابل ڈاکٹر نہ ملنے کی وجہ سے عورتوں کو مجبور ہو کر یہ بار اپنے سر لینا پڑتا ہے ان کی آسانی کے لئے کچھ خاص خاص دواؤں کی مدد سے اس مہلک مرض کا علاج یہاں لکھا جاتا ہے۔

اگر زیادہ مقدار میں بار بار پانی کی طرح یا ٹکے نیلے رنگ کے دست اور ساقوں میں سبز رنگ کا صفر آگرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پیٹ میں درد ہو، یا دست کے بعد مقعد میں جلن ہوتی ہو تو آئرس ۳x - دینا چاہئے، اگر پاؤں کی بیج یا دائر کی طرح کے بار بار بغیر درد کے دست دتے ہوتے ہوں، لیکن درد نہ ہو۔ یہ علامت آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہو اور دست پر اگر چھوٹی چھوٹی کوئی منجمد تیرتی دکھائی دے، اور ساتھ ہی اینٹھن ہو، اور سستی طاری ہو۔ لیکن پیٹ میں درد نہ ہو تو روسی لنس ۳ - دینا چاہئے۔

کچھ سبز رنگ کے پانی کی طرح کا دست (اور اس میں ٹہرے کدو کی طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹہرے، نیچے پیٹھ جاتے ہوں) متلی یا تھے ہو، درد شکم، پیشانی میں سرد پسینہ، اور زیادہ ٹھنڈے پانی کی تیز پیاس ہو، جسم نیلا اور سرد ہو۔ انگلیوں میں اینٹھن، کمزوری، وغیرہ علامات اگر آہستہ آہستہ نہ ہوں، یکایک تیزی سے جو جائیں تو درازے البم ۶ - دینا چاہئے۔

ہیفہ میں اینٹھنے کی اور تشنگی علامات زیادہ ظاہر ہوں (خاص کر ہاتھ و پیر کی انگلیاں آگے کی طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہوں) تو گرم ایٹ ۳x کا سفوف یا گرم میٹا لنک ۶ - دینا چاہئے۔ لیکن اینٹھن نہ ہو، آگے کی طرف ٹیڑھی نہ ہوں (بیج میں علیحدہ نہ ہوں، چمچے کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہوں تو گرم گرم کے عوض سیکیل ۳ - ۶ - دینا چاہئے۔ دست دتے کے ساتھ تیز پیاس، جسم میں جلن ہو۔

پر بھی جسم کو کپڑے سے ڈھکا رکھنا چاہتا ہو۔ جسم میں برف کے سرد ہو سکتی ہے جیسی، کمزوری ہو تو آرسنک ۳-۶۔ اگر اس کے ساتھ ہی تشنجی علامات بھی موجود ہوں تو آرسنک کے عوض کپرم آرسنیکم x۲ کا سفوف دینا چاہیئے۔ دست و قے کے ساتھ پیٹ میں جلن یا تیز درد، پیاس، اور موت کا خوف اور مریض تریبا ہو تو ایکونائٹ ریڈیکس (مدر تپھر) کے استعمال سے تعجب خیز نتیجہ دکھائی دیتا ہے۔ لگاتار متلی وقتے ہونے کے بعد متلی بند ہو جائے تو آٹم ٹارٹ ۶ دیں مریض کا جسم سرد ہو لیکن اندر جلن معلوم ہوتی ہو سو وقت بچکے کی خواہش ہو جسم کا کپڑا اتار دالیا ہو دست بے اختیار سے آتے ہوں تو سیکل ۳ مفید ہے اگر پانچا زویشیاب بند ہو کر پیٹ پھول گیا ہو، سانس میں تکلیف وغیرہ آخر وقت کے علامات ہوں تو اپنی ایم، سبب اچھی دوا ہے۔

ایک طرح کا ہیضہ اور بھی ہے جس میں مریض کو دست دتے یا پسینہ نہیں ہوتا۔ لیکن مرض شروع ہوتے ہی تکلیف دہ شخ ہو۔ جسم برف کی طرح سرد ہو نہایت سستی وغیرہ ہو، خوفناک علامات شروع ہی میں نمودار ہوں ایسے موقعہ پر مریض کو اسپرٹ کیمفر کھلانے اور جسم پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر کیمفر سے فائدہ نہ ہو تو ہائی ڈروسیانک ایسڈ ۳۰ دینا چاہیئے۔ اگر ہیضہ میں سرد جسم ہونے کی حالت ہو جاتی ہو اور جسم میں گرمی آنے لگے لیکن پیشاب نہ ہو تو کینتھر ۳-۶ دینے سے پیشاب ہو جاتا ہے۔ چہرہ پر مڑوئی اور بدن رنگ ہو، جسم برف کی مانند سرد ہو۔ نبض غائب ہو، سانس پور میں نہ سمائی ہو، وغیرہ علامات ظاہر ہوں تو کبرا یا ناجا ۳۰ کا سفوف کھلانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔

بچوں کا ہیضہ:- گرم دست، گرم قے، تیز پیاس، یا پیاس لگتی نہیں۔ ریا دانت نکلنے کے وقت ہیضہ یا پیٹ کی بیماری ہو تو پودو فاکلم سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر خوب تھلا دست آتا ہو ڈکار آتی ہو یا کھٹے دہی کی طرح پھٹی قے آتی ہو، یا قے ہونے کے بعد ہی کچھ سست ہو جاتا ہو نہ نال ہو جاتا ہو، سو جاتا ہو اور جاگتے ہی جھوک لگتی ہو تو ایتھوزا x۶ دینا چاہیئے بچہ کی نہایت درجہ کی سستی جسم سرد اور نیلا

اور نبض ساقط ہو جانا، انیٹھن یا تشنج وغیرہ تیز علامات میں کیلی بروم x کا سفوف استعمال کرنا چاہیے اور صفائی کی طرف زیادہ خیال کرنا چاہئے۔ مریض کا لباس اور بستری سونے کا کمرہ، رہنے کا کمرہ، رہنے کا مکان، صاف و ستھم رکھنا بہت ضروری ہے مریض کا دست، قے، یا کپڑا جس میں دست دتے لگی ہو، قیام کی جگہ سے دودھ گاڑ دینا یا جلادینا چاہئے۔ قریب کے تالاب وغیرہ میں یہ کپڑے نہ چھوڑے جائیں، اور دست یا قے پاخانہ میں یا کسی جگہ نہ پھینکنا چاہیے۔ ان اصولوں کی پابندی نہ کرنے سے محلہ یا گاؤں میں یہ مرض پھیل سکتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ درجہ ابتدائے مرض سے لیکر درجہ انحطاط مرض تک پیشاب ہو جانے کے تین یا چار گھنٹہ بعد مریض کو ضرورت کے موافق پانی پیے کو اور برف کا ٹکڑا اچھونے کو دینا چاہئے۔ اس کے خلاف کرنے سے (یعنی پیشاب ہونے کے پہلے دوسری غذا دینے سے) مریض کو موت تک آ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔

درجہ انحطاط مرض ختم ہونے کے بعد کم سے کم چار گھنٹہ بعد مناسب غذا دینا چاہئے۔ پیشاب ہو جانے کے بعد (یا جب صاف معلوم ہو کہ پیشاب مثلاً نہ میں جمع ہے لیکن ہوتا نہیں، اُس وقت پانی سے بنا سا گودانہ، تھوڑی شکر یا نمک ملا کر کھلانے کو دیا جاسکتا ہے۔ اگر براز میں صفرا کا حصہ دکھائی دے تو بارلی، گند بھا، دولیا کا شوربہ یا پانی ملا کر بہت تھوڑا سا دودھ دینا چاہئے۔ کسی بھی وجہ سے ہوا سہال دتے، شروع ہونے پر مریض کو غسل نہ کرنا چاہیے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ”گرمی“ سے دست دتے ہوتے ہیں، غسل کرنے یا ٹھنڈک پہنچانے سے مرض دیکھا جائیگا۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ غسل کرنے یا کھلانے سے بہت لوگوں کی جان جاتی ہے۔

نیک و بد علامات

دست دتے، زیادہ نہ ہونا۔ (خاص کر چہرہ کی چمک دمک) کا زیادہ بزرگ نہ ہونا، جسم کی حرارت زیادہ کم نہ ہونا۔ مریض کو بے چینی و سانس کی تکلیف نہ ہونا، نیند آنا۔ انیٹھن کم ہونا۔ پیاس نہ ہونا۔ سر و جسم ہونیکے وقت نبض کا ساقط نہ ہونا۔ روزمرہ کی ضروریات کا عادت کے موافق جلد جلد

شرع ہونا (جیسے جسم کی حرارت کا اصلی حالت پر آنا) پیشاب ہونا۔ دست کا رنگ زرد یا مٹھلا ہونا، وغیرہ اچھے علامات ہیں۔

رات کے آخر وقت میں یکایک ہضم ہونا۔ جلد از جلد کمزور ہونا۔ بے اختیار سے بار بار پانچا نہ ہونا یا تھو ہونا۔ غفلت، نیند نہ آنا۔ تیزی سے جسم سرد ہو جانا۔ بے چینی، سانس میں تکلیف، نبض ساقط، جسم کی حرارت کا بہت دیر تک کم ہونا۔ یا بہت بڑھ جانا، تیز درد شکم، دست و قدم میں خون، بہت دیر تک صفرا نہ خارج ہونا۔ یا پیشاب نہ ہونا، یا تشج بند نہ ہونا۔ کینا جھکنا۔ ننگ نہ سکنا۔ غشی کی حالت میں ایک پیر موڑ کر اوپچا کر کھنا، اور اسکے گھٹنے پر دوسرا پیر رکھ کر حیت سونا، سر سامی حالت یہ سب علامات بد ہیں؛ حاملہ نشہ میں چور، افیونی، بہت چھوٹا بچہ یا بہت کمسن، ڈبلا یا مریض، یا ریا کو ہضم ہونا بہت خوفناک ہے اگر حاملہ عورت کو ہضم ہو جائے تو حمل ساقط ہو جاتا ہے

غذا اور دوا پر ہینہ :- ہضم کے درجہ ابتدائی ”درجہ اشتداد“ اور درجہ انتہائی مرض میں (خاص کر درجہ انتہائی مرض میں) کسی طرح کی کوئی غذا نہ دینا چاہیے۔ پیراں روکنے کے لئے خوب گرم پانی پینے کو یا برف چوسنے کو دیا جاسکتا ہے لیکن برف چبا کر کھانا یا نگل جانا منع ہے۔ پیشاب ہونے کے کم سے کم چار گھنٹہ بعد ارادہ رکھنے کا پانی (تھوڑا نمک اور کافور کا قند یا لیمو کا عرق ملا کر) دیا جاسکتا ہے اگر دست میں صفرا دکھائی دے (یعنی براز پیلا یا بھورا ہو) تو پانی میں تیراہ کی ہوئی بارہ کی ساگو کا پانی، دودھ، ساگو، گندہ بہا دویا کا شوربہ دیا جاسکتا ہے۔ یہ غذا جب ہضم ہو جائے تو چا دل کا مارڈ اور آخر میں خوب پرائے چادل کو بھی طرح پکا کر دیئے جاسکتے ہیں۔ نہایت غور و خوض کے بعد غذا دی ہی چاہیے۔

اگر مریض کی طبیعت صحت کی خرابی کی طرف جارہی ہو تو ایسی حالت میں پانی کی بارہ لی بھی اکثر مرغن کو ٹوٹا دیتی ہے۔ اور مریض کی حالت خراب ہو جاتی ہے مرض سے آرام ہونے کے بعد کچھ دنوں تک مریض کو تیل یا گھی میں پکی چیزیں یا کوئی دوسری دیر ہضم چیز کھانے کے لئے نہ دینا چاہیے۔

دودھ پلانے والی ماں کو اگر ہضم نہ ہو تو بچہ کو اس کا دودھ نہ گر دیا جائے۔

شیر خوادچہ کو اگر ہضم ہو جائے تو اسکی غذا فوراً بند کر دینا مناسب نہیں ہے آدھ گھنٹہ تک باری کو جوش دیکر کھنڈا کر کے چھان کر دینا چاہیے۔ دودھ اور پانی برابر حصہ ملا کر جوش دیں جب پانی جل جائے تو کھنڈا کر کے دیا جاسکتا ہے اگر فکے کی وجہ سے بچہ کے پیٹ میں دودھ نہ رکتا ہو تو دودھ دینے کے پہلے برف کا ٹکڑا چوسا کر دودھ دینے سے دودھ ہضم ہو جائے گا۔ جسم بالکل سرد ہو جانے کی آخری حالت میں جب مریض شفا کی طرف راغب ہو تو اراروٹ، یا گندہ بہا دو یا کچے پینے کے علاوہ کوئی دوسری غذا نہ دینی چاہیے۔ اور دودھ پلانے والی بھی کوئی تعقیل غذا نہ کھائے۔ غذا کی بے اعتدالی سے مرض کا پھر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور موت ہو سکتی ہے۔

تیسار داری :- مرض ہوتے ہی مریض کو ایسے کمرے میں مٹلانا چاہیے جہاں صاف ہوا آتی جاتی ہو، مریض کے کمرے میں بھیڑ یا رونٹا وغیرہ نہ ہو، اور اس کمرے میں کوئی چیز، جہاں تک کہ دوا بھی نہ رکھی جائے، اگر مریض کے کمرے میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو اسکو فوراً دور پھینک دینا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اُسے کوئی کام میں نہ لائے۔ بیج بیج میں اُس کمرے میں صوب دینا چاہیے مریض کی چار پانی اور کپڑے ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مریض کے دل میں درد۔ یا ناامیدی نہ پیدا ہو جائے، اگر مریض بہت کمزور ہو جائے تو اُسے اٹھا کر پانچانہ میں نہ بٹھایا جائے۔ کئی باندی میں چونہ ڈالکر اسی میں مریض سے پانچانہ اودھتے کرایا جائے اور اُسے مکان سے دُور مٹی کے تلے دبا دینا چاہیے۔ ہضم کے مریض کو آسانی سے نیند نہیں آتی۔ اگر وہ سو جائے تو اسکو کبھی کبھی (دوا دینے کے لئے) نہ جگایا جائے، زیادہ پسینہ ہو تو اُس کو صاف ستھرے سوکھے کپڑے سے پونچھ دینا چاہیے۔ جہاں پانی نہ ملتا ہو وہاں خوب گرم کر کے پلایا جائے۔

۱۔ جب ہضم بہت پھیل جائے تو لوگوں کے دل میں اکثر درد پیدا ہو جاتا ہے اس خوف کو دور کرنے کے لئے اس جگہ کے لوگوں کے عقیدے کے موافق ہری کرتن، دیوتاؤں کی پوجا، نماز، ایشور کی اداسنا وغیرہ کی کوشش کرنا اچھا ہے۔ ان کوششوں سے اکثر خوف جاتا رہتا ہے اور دل ہراساں میں اُمید بھڑک اٹھتی ہے۔

جارے میں ہیفیضہ ہونے پر مریض کا کمرہ کچھ گرم رکھنا چاہیے۔ جسم میں کسی جگہ انیمٹن ہونا شروع ہوتا تو اس جگہ کو ہاتھ سے دبتے سے یا رگڑنے یا الکول اس جگہ ملنے یا بوتل میں گرم پانی سے سینکے سے انیمٹن کم ہو جاتی ہے، ہاتھ، پیر، ٹھنڈے ہونے لگیں تو غلائین گرم کر کے سینکے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بد مرضی یا دست آتے ہوں تو ایسے ہیفیضہ کے مریض کی تیمارداری نہ کرنا چاہیے مریض کے کمرے میں خانی پیٹ یا نا اچھا نہیں۔ مریض کا برازیلاتے یا لاکسی طرح اگر جسم میں لگ جائے تو اس جگہ کو فوراً دھسو ڈالنا چاہیے۔ کیونکہ وہ کسی طرح اگر پیٹ میں پیوپنخ جسائے گا۔ اس کو بھی ہیفیضہ ہو سکتا ہے۔

استعمال دوا :- ہمیشہ دو تین خوراک دوا کھلانے سے فائدہ کی امید ہوتی ہے لیکن اگر فائدہ نہ ہو تو دوسری دوا تجویز کرنا چاہیے۔ مرض جتنا ہی مشکل صورت اختیار کرے، دوا اتنی ہی جلدی جلدی دینا چاہیے۔ دوا پندرہ منٹ کے فرق سے اور مرض کی تیزی جیسے جیسے کم ہوتی جائے دوا بھی اتنی ہی دیر میں دینا چاہیے۔ اگر مریض میں ٹنگنے کی طاقت نہ ہو تو ایسے مریض کو منتخب دوا سونگھا دینا چاہیے۔ سونگھانے سے بھی دوا کا اثر ہو جاتا ہے۔

مرض ہیفیضہ میں معمولی طور سے کم طاقت والی (۳-۶) دوا میں دی جاتی ہیں۔ ادنیٰ طاقت کی دوا کھلانے سے نقصان ہونے کا خوف رہتا ہے۔ ایلوپتھیک، آیلوروبیک، یا یونانی علاج کے بعد اگر ہو میو پیٹھیک علاج کرنا ہے تو مریض کو پہلے دو ایک خوراک کیمفر کھلانا چاہیے۔

ہیفیضہ کے قسمیں اور ان کی خاص ادویات

یہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ ہیفیضہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ معمولی ہیفیضہ اور مہلک ہیفیضہ۔

- ۱۔ معمولی ہیفیضہ یا صفر ادوی ہیفیضہ :- اس کی خاص دوا ہے۔ آئرس ۱۸۳۔ کروٹن ۶۔ اپیکاک ۶؛ لائیم ۳۔ چائنا ۶۔ دینا چاہیے۔
- ۲۔ مہلک یا ایشیاک ہیفیضہ یا کالرا۔ خاص خاص علامات کی خصوصیت کے مطابق مہلک ہیفیضہ مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا ہے۔ جیسے۔
- (۱) دست خاص کر انٹرلوں کا ہیفیضہ :- بار بار بہت دست آنا اسکی

- خاص علامت ہو۔ رسی نس ۳۔ ورٹیرم ۶، اس کی بہت اچھی دوا ہے۔
- (ب) تھے خاص کر شکمی یا معدی :- اس کی خاص علامت :- بار بار تکلیف دینے والی تھ یا متلی ہے۔ آر شک البم، اس کی خاص دوا ہے۔
- (ج) دست وقفے، خاص انٹریٹیوں اور معدی ہیضہ :- بار بار ایک ہی طرح کی تکلیف کے ساتھ دست وقفے ہوتا۔ اس کی خاص علامت ہے۔ آر شک ۶۔ رسی نس ۳۔ ورٹیرم البم ۶، اس کی خاص دوا میں ہیں۔
- (د) دست وقفے میں خون بلا ہیضہ :- خاص علامت خون کا، دست آنا یا خون کی تھ ہوتا ہے۔ ایلون XI۔ آر سس ۳۳۔ کاربووج ۶۔ مرک کار ۶۔ کینتھرس ۳۔ قاسفورس ۳۔ اس کی عمدہ دوا میں ہیں۔
- (س) ہیضہ میں بختار :- جسم کی حرارت تیز ہونے کے ساتھ ہی ساتھ مریض کو دست وقفے ہوتا۔ اس کی خاص علامت ہے۔ ایکونائٹ XI۔ بیلاڈونا ۶۔ برائی آونیا ۳۔ بیٹشیا IX ۶۔ رٹاکر ۶، رسی نس ۳۳۔ اس کی خاص دوا میں ہیں۔
- (س) تشنجی ہیضہ :- مریض کے جسم میں نہایت انٹین یا تشنج ہوتا۔ اس کی خاص علامت ہے۔ گبرم ۶۔ کیمفر کرم آر س ۳۳۔ اس کی خاص دوا میں ہیں۔
- (ص) بند یا گم ہیضہ :- اس میں دست ہونے سے پہلے ہی مریض کا جسم سرد ہو جاتا ہے اور مریض کی زندگی تشکش میں پڑ جاتی ہے کیمفر آر شک ۳۳۔ ایڈ بائی ڈر ۶۔ کاربووج ۳۰۔ ٹے بیکم ۶۔ اس کی خاص دوا میں ہیں۔

۱۔ اس قسم کے ہیضہ میں مریض کے جسم سے رطوبت یا پانی کا حصہ نہیں نکلتا ہے۔ اس لئے اس کا نام ”گم ہیضہ“ ہے۔ یہ بیکام مریض پر حملہ کرتا ہے۔ اس وقت سستی، پیاس، پیٹاب کی تکلیف جسم میں ملن وغیرہ علامات پیدا ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کل جسم نیلا سفید نہادہ۔ آواز کا بیٹھ جانا، یا کمزور ہو جانا۔ اور پیشاب بند ہونا وغیرہ ہلکے علامات نمودار ہوتے ہیں۔ اسپرٹ کیمفر یا عرق کافور اس بند ہیضہ کی ایک ہی دوا ہے۔ کوئی دوسری دوا دینے سے پہلے اس دوا کو ضرور دینا چاہیے۔ ۵، قطرے کیمفر ۳، ۳۔ منٹ کے وقفے پر استعمال کرنا چاہیے۔ (بقیہ صفحہ ۱۴۹ پر دیکھئے)

(ط) مہلک ہیفیضہ :- مرض کا حملہ ہوتے ہی تمام جسم کا نیلا ہو جانا۔ قلب کا سکھن ہو جانا۔ سینہ میں بوجھ معلوم ہونا۔ سانس میں تکلیف، نبض کمزور۔ اور مریض کا بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہنا۔ اس کے خاص علامات ہیں۔
 ورٹیرم البیم ۶ - یا ورٹیرنیم ۳ - سفوف، آرٹک البیم ۶ - ٹکوشین ۳ -
 اس کی خاص اور محرب دوائیں ہیں۔

مندرجہ بالا ادویات اور دوسری ادویات کے علامات کے لئے مندرجہ ذیل ہیفیضہ کی پانچ علامتوں کے علامات اور علاج کا بیان ملاحظہ ہو۔

ہیفیضہ کے پانچ درجوں کے علامات اور علاج

(۱) درجہ ابتدائی یا حملہ ہیفیضہ کا زہر یا جراثیم جسم میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر جھاگدار دست ہونے تک درجہ ابتدائی کہلاتا ہے۔ یہ حالت ایک دو گھنٹہ سے چار روز تک موجود رہ سکتی ہے۔ اس حالت میں جسم کی حرارت آہستہ آہستہ کم ہو کر کمزوری، تیزی کی کمی، دوران سر، سینہ نہ آنا۔ منہ میں ذائقہ نہ ہونا، متلی، ذائقہ خراب رہنا۔ پیٹ میں درد یا گرمی محسوس ہونا۔ کبھی جگر اکبھی گرمی محسوس ہونا۔ کان میں سننا ہٹ یا دم دم کی آواز محسوس ہونا۔ نیلے دست وغیرہ علامات پہلے نمودار ہوتے ہیں۔ بعد کو جھاگدار یا مارڑی طرح کے دست آنے لگتے ہیں۔

استعداد مرض :- جب چاول کی بیج کی طرح جھاگدار دست و قے ہوتے رہیں تو سمجھنا چاہیے کہ دوسری حالت شروع ہو گئی ہے۔ اس حالت

دبقیہ حاشیہ ص ۱۴۸ اور درمیان میں مریض کے جسم میں کافور رگڑنا فردری ہی تھیک مریض سنبھل نہ جائے اس وقت تک کافور دینا مناسب ہے اگر کیف کے استعمال سے مریض کو فائدہ نہ ہوتا ہو اور اس کی حالت بدتر ہوتی جاتی ہو تو ایسڈ ہارڈر دینا تک ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ کاربووج ۳۔ ۷۔ یلے سکیم ۶۔ علامات کی مطابقت دینا چاہیے۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ فوراً علاج کا بندوبست نہ کرنے سے یہ بند کم ہیفیضہ اکثر مہلک ہو جاتا ہے۔

میں چاول کے ماڑ کی طرح کے دست دتے، نیز مٹی، پیاس، چہرہ بالوس، آنکھوں کا بیٹھ جانا، جسم کا رنگ بدل جانا۔ کل جسم میں سرد پسینہ نکلنا (خاص کر پیشانی میں) آہستہ آہستہ پیشاب بند ہو کر نبض کمزور ہونا۔ نیلے رنگ کی ایک کثیر آنکھوں کے چاروں طرف دیکھائی دینا اور بیٹھ جانا۔ درد شکم، معدہ میں جلن، پیٹ گڑ گڑاتے رہنا، جسم میں جگہ جگہ (خاص کر ہاتھ پیر میں) انگلیوں میں تشنج جسم میں سستی، بے چینی، مٹھ اور ہونٹ کا خشک ہونا وغیرہ علامات دکھائی دیتے ہیں۔ خاص خاص وقت پر کسی علامت کی کمی یا زیادتی معلوم ہوتی ہے جیسے کسی کسی مریض کو بہت دست آنے لگتے ہیں۔ لیکن قے، کم ہوتی ہے۔

کسی کسی کو دست کم قے زیادہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حالت ۳-۴ گھنٹہ تک رہ سکتی ہے۔ اس ظاہری حالت کے علامات اگر ۸-۱۲ گھنٹہ تک موجود رہیں۔ اور دست کے ساتھ صفراوی (یا پیلا یا ہرے رنگ کا) دست ہو تو مریض آہستہ آہستہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو اور کل جسم ٹھنڈا، چہرہ پر شکن، نبض غائب وغیرہ علامات دکھائی دیں تو سمجھنا چاہیے کہ مرض انتہائی ترقی کی حالت میں آگیا ہے۔ اس حالت میں اکثر مریض مر جاتے ہیں۔

اگر ۱۲ گھنٹہ تک مریض زندہ رہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بچ جائے گا۔

جسم کا مثل یرون کے سرد ہونا یا انتہائے مرض :- یہی حالت اصلی مہیشہ ہے۔ یہ انتہائے مرض کی حالت بہت خوفناک ہوتی ہے اسی وقت میں مریض اکثر مر جاتا ہے۔ دوسرے درجہ میں دست و قے بیکام ہو جاتے ہیں، مریض پیاس سے بے چین ہو جاتا ہے لیکن پیاس کے ساتھ ہی قے ہو کر وہ پانی نکل جاتا ہے۔ بار بار قے ہونیکے بعد مریض کی رونق فوراً جاتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ نبض نہیں ملتی۔ (یہاں تک کہ بازو کے بالائی حصہ تک میں بھی نبض کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد طاقت حیات گھٹ گھٹ جاتی ہے جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہونٹھ نیلے، تمام جسم بے رونق، یا زرد آنکھوں کا بیٹھ جانا۔ رونق کا کم ہو جانا۔ سرخ رہنا۔ آنکھ کی پتلی ہوئی۔ سانس۔

میں تکلیف، آواز کا بیٹھ جانا۔ یا ایک بارگی بند ہو جانا (یہاں تک کہ بات تک
سننے میں نہیں آتی۔ آواز بند، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا اگلا حصہ سکڑا ہوا دھیسے
دیر تک پانی میں بھیکنے پر ہوتا ہے) ہونا وغیرہ علامات نظر آنے لگتے ہیں۔
جسم میں تیز جلن رہنے کی وجہ سے مریض چار پائی پر پڑا چھٹ پٹاتا ہے۔
اور جسم کا کپڑا (یہاں تک کہ جو کپڑا پہنے ہے) اتار کر پھینک دیتا ہے۔ تھوڑی
تھوڑی دیر بعد چہرے پر پسینہ کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، اس حالت میں بے
اختیاری سے پسینہ ہو جایا کرتا ہے۔ (پانچواں بند ہو کر سپٹ پھول جاتا ہے تیسری
حالت کے آخر میں مریض اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس میں کروٹ بدلنے کی بھی طاقت
نہیں رہتی۔ لیکن ہیضہ کے مریض کے جو اس موت کے آخر تک قائم رہتے ہیں۔
اس حالت میں دست وقفہ بند ہونے کے بعد موت آ جاتی ہے یا ۲ - ۳
گھنٹہ چپ ٹپ رہنے کے بعد موت آ جاتی ہے، اگر دست وقفہ بند ہونے کے
بعد ۴ - ۵ گھنٹہ تک مریض نہ مر جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ (۴) درجہ
انحطاط مرض یا رد الفعل شروع ہو گیا۔

(۴) درجہ انحطاط مرض یا رد الفعل

تیسرے درجہ کے آخر میں دست وقفہ بند اور نفض غائب ہونے کے بعد اگر
موت کہیں ہوئی تو پھر نفض معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا درجہ
یعنی درجہ اشتداد مرض کے علامات پھر نمودار ہوتے ہیں حالت رد الفعل
طبعی یا غیر طبعی، اگر طبعی رد الفعل شروع ہو تو، جسم آہستہ آہستہ گرم ہونے
لگتا ہے اور صفرا بلا دست وقفہ شروع ہو کر قوت حیات بڑھنے لگتی ہے۔ پھر
پیشاب ہوتا ہے۔ یا مثانہ میں پیشاب جمع ہونے لگتا ہے۔ جسم کا رنگ اور
آنکھوں کی رونق بھی قدرتی ہو جاتے ہیں، اسکے علاوہ کبھی کبھی غیر طبعی رد الفعل
شروع ہو جاتا ہے اور مرض نتیجہ کی حالت میں پہنچ جاتا ہے

(۵) نتیجہ مرض :- ہیضہ کی اس حالت میں (یعنی غیر طبعی رد الفعل
شروع ہو جاتا ہے) جسم کے اکثر عضویں خون کا درجہ ہوتا ہے اور نفض
کا عضو جو سب سے زیادہ کمزور رہتا ہے۔ اسی پر زیادہ تر مرض کا حملہ ہوتا ہے۔

مندرجہ ذیل علامات ہمیشہ پائے جاتے ہیں؛ مرض کا دوبارہ حملہ - بخار -
پیشاب نہ ہونا - سستی، ہچکچی، قے، یا متلی، پتے دست، نفخ، شکم، پھوڑا -
کان میں جلن، پھیپھڑے میں جلن وغیرہ وغیرہ -

کیمفر :- مذکورہ بالا پانچوں درجے کے علاج بیان کرنے سے پہلے اس مرض
میں کیمفر کے استعمال کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ ملک اٹلی کے ڈاکٹر
روہنی نے عرق کا فور (اسپرٹ کیمفر) تیار کیا۔ انھوں نے اس دوا سے
سیکڑوں ہیفیہ کے مرض اچھے کئے تھے۔ خاص خاص حالتوں میں اکثر کیمفر ہی کے
استعمال سے مرض اچھا ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں جلن یا درد اور دست، اور
ساتھ ہی سردی معلوم ہونا اور تشنج ہونا - کیمفر کے خاص علامات ہیں۔

(۲) ہنی مین بڑے عاقل و دانا فرماتے ہیں کہ ہیفیہ کی شروع حالت میں دینے
جب تک دست کے ساتھ غلاظت آئے، مریض یکایک کمزور ہو جائے۔ چہرہ
بدل جائے، آواز بیٹھ جائے، آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں، جسم ٹھنڈا ہو جائے
عدہ میں جلن معلوم ہو وغیرہ علامات میں کیمفر دینا چاہیے۔

(ب) ڈاکٹر فرنگٹن کہتے ہیں، کہ دست کم ہوں، قے زیادہ، کل جسم سرد اور
آواز بدی ہو، وغیرہ علامات میں کیمفر دینا چاہیے۔

(ج) برف کھانے یا سردی لگنے سے بد ہضمی ہو، یا دست آتے ہوں اور یہ
بہضمی اور دست ہیفیہ میں تبدیل ہو جائے تو کیمفر سے فائدہ ہوتا ہے۔

(د) اسی مرض کے حملہ کی حالت میں جب تھوڑا تھوڑا حار معلوم ہوتا ہو،
کمزوری معلوم ہو، دم لینے اور نکلنے میں تکلیف ہوتی ہو، پیٹ میں جلن، سر میں
چکر وغیرہ علامات دکھائی دیں تو کیمفر دیا جاسکتا ہے۔

(ه) قے و دست نہ ہوتے ہوں تو کیمفر ہی خاص دوا ہے۔

(س) اعصابی کمزوری، کل جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو جائے (پسینہ نہ ہو) -
یا ٹھنڈی لمی کی طرح پسینہ، ہاتھ پیر قابو میں نہ ہوں - سانس لینے میں تکلیف بتلیا
ایک جگہ قائم رہیں، نفی کمزور، کل جسم تپا ہو وغیرہ علامات میں کیمفر ہی فائدہ کرتا ہے۔
(ص) جسم ٹھنڈے ہونے کی علامت میں جب دست و قے بند ہونے پر بھی

رد الفعل (کسی مریض و مادی عضو کا اپنے طبعی فعل کی طرف لوٹنا) (RECTION) نہ ہو تو کیمفر کی دو ایک خوراک دی جاسکتی ہے۔ اس حالت میں بڑی آنت، دل اور عضلات کے مفلوج ہونے پر اور کاربو و ج، فاسفورس، وغیرہ دواؤں سے کوئی فائدہ نہ ہونے پر کیمفر دینا چاہیے۔ مہلک ہیفیہ میں رفتی جس ہیفیہ میں مرض کا حملہ ہوتے ہی کل جسم نیلا ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی سانس میں تکلیف اور دل بیکار ہو۔ وغیرہ علامات ہو تو کیمفر مخصوص دوا ہے۔

ہیفیہ جس میں مفلوجی کیفیت نہ ہو، یا مفلوجی ہیفیہ کی شدید حالت میں کیمفر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہو، زیادہ مقدار میں بار بار کیمفر دینے پر اگر پیٹ یا معدہ میں جلن، قلب میں بے چینی وغیرہ تکلیف دینے والے علامات محسوس ہوں تو فاسفورس ۶۔ دو ایک خوراک دینے سے یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔

آپور ویدک یا ایلیو پیٹھک علاج کے بعد اگر ہو میو پیٹھک دوا شروع کرنا ہو تو پہلے ایک دو خوراک عرق کا فور دیں۔

عرق کا فور دینے کی ترکیب:۔ رزینی کا کیمفر تھوڑی شکر یا تماشہ میں پانچ، دس، یا پندرہ منٹ کے وقفے سے دینا چاہیے۔ چھوٹے بچے کے لئے ایک دو بوند، اور جوان و بوڑھے کے لئے (مرض کی تیزی کے موافق) ۵ سے ۱۵۔ بوند تک دینا چاہیے۔ اگر دو گھنٹہ میں دس بار مرتبہ کیمفر دینے سے بھی کچھ فائدہ نہ ہو تو دوسری دوا کا بندوبست کرنا چاہیے۔

۱۔ درجہ ابستدالی کا علاج:۔ کیمفر جس ہیفیہ کے شروع میں یکایک جھاگدار دست وقتے آتے ہوں، جاڑا لگتا ہو، کمزوری ہوتی ہو یا جس ہیفیہ میں پہلے سے سب جسم نیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہو اس ہیفیہ میں کیمفر فائدہ کرتا ہے۔ سردی لگنے سے اگر ہیفیہ ہو تو بھی کیمفر دینا چاہیے۔ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ہیفیہ جس میں مفلوجی کیفیت ہوگی۔ دستہ ۲ نہ ہو نیولہ ہیفیہ کی اور مہلک ہیفیہ کی کیمفر ایک اچھی دوا ہے (پہلے مقصد کا "کیمفر" کا بیان دیکھئے) لیکن دست کی نسبت قے زیادہ ہونے پر، یا قے کی وجہ سے جسم تیزی سے سرد ہو جانے سے کیمفر روک دینا چاہیے۔ علامات کے موافق اگر سنگ دوا میں وغیرہ منتخب کرنا چاہیے۔

آرسنک الیم ۶۔ بہت کچے اور پکے پھل، یا برف کھانے پینے کی وجہ سے ہیضہ ہونے پر، پانی کی طرح دست، وزن زیادہ، بدبودار، بدبودار بلادر کے پیٹ میں (خاص کر نیچے حصہ میں) تکلیف اور خرابی ہونے پر موت کا خوف، پیٹ میں جلن، تیز پیاس، لیکن تھوڑے ہی پانی سے تسکین، دست وقفے، یا قے، نہایت بے چینی، بہت زیادہ کمزوری، رات، دوپہر، بعد یا ٹھنڈی چیز کھانے پینے کے بعد مرض کا بڑھنا (درجہ اشتداد، مرض کے بیان میں "آرسنک" ملاحظہ ہو۔)

چائنا ۳-۶۔ پھل یا مولی کھانے کی وجہ سے دست، بدبودار، پانی کی طرح زیادہ دست، بلادر کے، آدھی رات کے بعد مرض کا بڑھنا۔ پانی کی طرح زیر دست اور پانچاند میں غیر مہضم غذا کا گرنا۔ پیٹ میں گرد گردا ہٹ، نفخ، شکم کان میں بھن بھناہٹ، زیادہ خون نکلے، یا مٹی کے زائل ہونے کی وجہ سے مرض آرسنک کی طرح یہ بھی مرض ہیضہ کی ایک عمدہ اور کامیاب دوا ہے۔

ایکونائٹ نیپ XI۔ گلے ہوئے تر بوز کے پانی کی طرح دست سخت درد شکم بے چینی، پیاس، سردی معلوم ہونا۔ موت کا خوف، بخار کے ساتھ دست وقفے، خون کا دست، گرمی و سردی لگنے سے ہیضہ خون ملا دست، وقفے، یا بخار و ہیضہ ساتھ ساتھ ہو، ان علامتوں کی عمدہ دوا ہے۔

ایسٹ فاس ۳۔ بلادر کے دست، میٹلے دست، اگر اسہال مزمن مرض ہیضہ میں تبدیل ہو جائے یا بہت زیادہ جماع کی وجہ سے ہیضہ ہونے پر کھانا کھانے کے بعد دائیں کروٹ سونے سے مرض کی ترقی ہو۔

آئرس ۳۔ بہت زیادہ وقفے و دست، پانی کی طرح زرد دست، یلغیم یا خون ملا دست، کالا، ہلکا۔ سبز یا بدہضمی کے دست، پیٹ میں گرد گردا ہٹا بلا درد کے بعد دست کے مقعد میں تیز جلن، ہوا خارج ہونے سے درد شکم ہونا۔ آنکھیں میٹھ جانا، زبان سرد۔ مثل برف کے، خالی ڈکار۔ متلی، پتلی، کھٹی، قے، کلیرین یا ہیضہ کی یہ اچھی خاصی دوا ہے۔ (ہیضہ کے دوسرے یا شدت مرض کی حالت کے بیان میں "آئرس" ملاحظہ ہو۔)

کروٹن ۳۔ گولی یا چکاری کی طرح یکایک زور سے دست ہونا۔ سہرا سہرا

سبزی مائل، زرد، تیلے دست آتے ہوں۔ بدھمی کے دست ہوں مبتلی یا قے ہو۔
ناف کے چاروں طرف کھینچنے کی طرح درد ہو، پانی کی طرح دست ہو، پانخانہ زور سے
تیر کی طرح نکلتا ہو، کھانے پینے کے بعد بھی دست یاتے ہوتی ہو۔

دھیفہ میں اگر یہ تین علامات موجود ہوں تو کروٹننگ بیکار ثابت نہ ہوگی۔
ایلا ٹیر نیم ۳۔ جھاگدار پانی کی طرح دست، سبز رنگ کے دست، سفیدی مائل
درد شکم ہو، یا نہ ہو۔ ایسی دوا کے دینے سے دھیفہ میں زیادہ مقدار میں دست
یاتے ہوتے اور بند نہ ہوتے ہوں، تو ایلا ٹیر نیم دینا چاہیے۔

ہیلا ڈونا ۳۴۸۔ پانی کی طرح، سادہ یا پیلا آنکوں ملا تھوڑا ٹیلا، ترش
بدبو دار دست، آنکھوں کی اکڑن، پیشانی گرم، ہاتھ و پیر ٹھنڈے، سر میں تپک۔
کا درد یا سر ملنا، بخار، جسم خشک یا گرم، پسینہ سے تر غنودگی، بچہ کا ہمیشہ منہ
چلانا، غوں غوں کرنا، جو لوگ دھوپ میں، یا آگ کے سامنے کام کرتے ہیں۔ ان کو
دھیفہ ہو، یا دھیفہ کے ساتھ بخار ہو تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے۔

برایونیا ۳۔ تیلے سرخ رنگ کے دست، مقدار میں زیادہ، مار کی طرح گارھا
سبز رنگ یا پیلا خون ملا دست، بدھمی کا دست، شرابا بدبو دار دست، بخار۔
زبان اور منہ خشک، بہت زیادہ مقدار میں پانی پینے کی خواہش، درد سر، ڈالقا
کڑوا۔ مبتلی کرطوی۔ ہلی یا سبز رنگ کی قے، درد شکم، سر ملنا۔ بکنا جھکنا۔ ٹھنڈی یا کھٹی چیز
پینے کی خواہش، جس دھیفہ میں بخار بھی ہو تو بہت فائدہ مند ہے۔

پٹلیا ۴۸۱۔ پانی کی طرح زردی مائل بدبو دار۔ خون یا آنکوں ملا خون کے دست
قے و مبتلی، سانس اور پسینہ میں بہت بدبو، بخار، نبض ملائم اور بھری، کل جسم میں درد۔
مستی، چہرہ کا رنگ زیادہ سرخ، بکنا۔ جھکنا۔ غفلت۔ بات کرتے کرتے تیز
آ جانا۔ نیند نہ آ جانا۔ یا گھری نیند، مرنے کا ایسا خیال ہو کہ اس کا جسم کھڑے
کھڑے ہو کر بستر پر پڑا ہے۔ زبان کے بیچ میں زردی مائل اور گھاس کا رنگ، اور
کنارے چمکیلا اور سرخ، بغیر درد کے کراہنا۔ پیٹ، خوب دھنس جانا۔ بخار اور
دھیفہ کے ساتھ ہونے میں پٹلیا بہت اچھی دوا ہے۔

فاسفورس ۶۔ سبز یا آنکوں ملا۔ درد کے بغیر دست۔ مقعد کھلی رہے۔

اور بے اختیاری سے پانچا نہ ہو جائے۔ گرم چیز کھانے یا پینے کے بعد (یا بائیں کروٹ سوئے سے) مرض پڑھتا ہو، نمک کھانے کی وجہ سے دست آتے ہوں؛ پانی کی طرح بغیر درد کے دست، گرم دست، و گرم قے؛

کابلو ورج ۶ - ۳۰۔ مکھن، برت کا پانی۔ اس کریم، سٹری یا مکین مچھلی، یا گوشت، یا ترکاری، وغیرہ کھانے سے ہیضہ ہوا ہو، بوڑھے یا بچے آدی کو یا باورچی کہہ کر راج مٹری، وغیرہ جن کو ڈھوپ یا آگ کے پاس رہنا پڑتا ہے، اُن کو ہیضہ ہونے پر خون، یا خون کی قے، سرخ رنگ کے دست، بند یا گرم ہیضہ یعنی بلا دست آتے کے ہیضہ کل جسم سرد، خون کے دست وقت کے ہیضہ کی ایک مخصوص دوا۔ اور بند گرم ہیضہ کی اصلی درجہ کی کامیاب دوا ہے۔

رسی نس ۱۰۔ بہت دست وقت، بغیر درد اور تشخ کے ہیضہ۔ دست قے، یا دست زیادہ ہوں، ایسے ہیضہ کی خاص اور کامیاب دوا ہے۔ دوسرے یا حالت اشتداد کے بیان میں "رسی نس" ملاحظہ ہو۔

کیمو ملا ۶۔ غصہ یا خند سے جو ہیضہ ہو، دست، گرم، ترش، خراش پیدا کرنے والا۔ یا بلڈو دار۔ دانت نکلنے کے وقت (بچوں کے ہیضہ میں) صفراء بلا سبز رنگ کا دست، اور پیٹ میں درد، دست کے بعد پیٹ میں اینٹھن کم ہو جاتی ہے۔

اپیکاک ۳۶۔ مرض کے شروع ہی سے متلی، قے کرنے کی خواہش، یا قے، برنیت دست کے قے زیادہ سبز رنگ کا جھاگدار و بلڈو دار یا خون اور آنکھوں ملا دست دست ہونے کے بعد خون کی تیزی، مثل عیش کے مروڑ۔ نفخ شکم، ناف کے چاروں طرف دباؤ یا چٹکی کاٹنے کا ایسا درد۔ سینہ میں بوجھ اور ہنپی، قے کی خواہش یا خاص قے کے ہیضہ کی بہت اچھی دوا ہے۔

انٹم مارٹ ۶۔ قے کی تیز خواہش ہونے پر، لگے میں گھر گھرا ہٹ۔ لیکن کف نکلائے سانس میں تکلیف

یوڈو فاکلم ۶۔ بغیر درد کے یا گرم دست وقت، پیاس کا نہ ہونا۔ یا تیز پیاس بچوں کے (خاص کردانت نکلنے کے وقت) ہیضہ میں اچھی دوا ہے۔

سفید۔ سبزی ماہ، جھاگدار، یا خون ملے دست، یا اس حالت میں جب صبح کی قوت دست زیادہ ہو، اتنے زور سے اور مقدار میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مریض کے جسم میں پانی بہہ رہ جاتا۔ یا ایک بارگی رونق جاتی رہتی ہے۔ لیکن رہتا پیلے کی طرح ہی ہے۔ سس میں کوئی خراب علامت نہیں معلوم ہوتی، نکس و امیکا ۶۔ شراب کے کثرت استعمال، شب بیداری، کھانے کی بد احتیاطی ”گرم“ دواؤں کا استعمال۔ جلاب لینا، یا زیادہ دماغی محنت کرنے سے پتلے دست، نفخ شکم، بار بار یا ٹخا نہ جانے کی خواہش لیکن دست نہ ہونا۔ صفر اطا بد بودار دست، صبح یا بعد غذا دست جو آدمی دماغی کام بہت کرتے ہیں، ان کے لئے نکس و امیکا خاص کر مفید ہے۔

پلسا ٹیلا ۶۔ مرغن یا چربیلی چیز کھانے سے پتلے دست سبزی یا آنوں ملا دست کا رنگ بدلتے رہتا۔ پیاس کا نہ ہونا۔ رات میں مرض کی زیادتی، پلسا ٹیلا، حورتوں اور نازک مزاجوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے۔

مرک و ایوکس ۷۶۔ سفوف۔ خون، آنوں سے دست۔ کوہن، مسند سے خون نکلنا۔ آنوں خون ملے ہیفیہ کی اچھی دوا ہے (اگر پچیش کے اور بھی علامات موجود ہوں تو پچیش کی دواؤں میں سے ایلو، سلفر، کالوسنتھ، ونیرہ منتخب کرنی پڑے گی۔ ان ادویات کے علاوہ دوسری یا درجہ اشتداد کی بھی درجہ ابتدائی میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔

(درجہ اشتداد مرض کے مرض کے دواؤں کی فہرست ملاحظہ ہو۔)

(۲) درجہ اشتداد مرض کا علاج

حالت ابتدائی میں بیان کئے ہوئے کیمفر سے اگر فائدہ نہ ہو اور حالت شدت آجائے تو کیلی فاس، ورائٹرم، آرسنک وغیرہ دوائی، علامات کیمطابق دی جائیں۔ چاول کے مار کی طرح کے دست و قے، ہونے پر کالی فاس ۷۱۲۔ سفوف دینا چاہیے۔ اگر اس حالت میں ان دواؤں سے مریض کو فائدہ نہ ہو تو

پھر در اٹرم یا آرسنک دینا چاہئے۔

دریٹرم الیم ۴-۳۰-۲۰۰۔ زیادہ مقدار میں چاول کے مارکی طرح کے دست اور تھے، دھاگے کی طرح باریک نبض، پیشاب بند، تیز پیاس (زیادہ پانی پینے سے بھی نہ بچھے) دست کے پہلے در دشکم، سرد پسینہ (خاص کر سر میں) آنکھوں کی پتلی چھوٹی، ہاتھ، پیروں میں انٹھیں، نبض قریب قریب غائب، پیٹ یار ان میں شنج، قلب کا فعل سست، کل جسم سرد اور نیلا، چہرہ گلین اور دُبلّا، سانس اور زبان سرد وغیرہ علامات میں دریٹرم ۲۰- یا ۲۵ منٹ کے وقفہ سے استعمال کرنا چاہئے۔ دست وقفے یا دست کی خصوصیت والے ہیضہ میں یہ ایک اچھی دوا ہے۔ مفلوجی کیفیت کے ہیضہ میں یہ دوا فائدہ کرتی ہے۔

آرسنک ۴-۳۰-۲۰۰ وقفے اور دست کی مقدار کم نہ بچھے والی پیاس (خاص کر ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش) مگر تھوڑا پانی پینے سے تسکین، پانی پینے کے بعد ہی وقفے، پیشاب بند، سستی، اور بچینی، کل جسم سرد، یکایک جسم کا بدرنگ ہونا، نبض کمزور اور غائب کے مانند، ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا اگلا سرا سکڑنا۔ وقفے، کرنیکی خواہش، وقفے کرنے کے بعد معدہ میں آگ کی طرح جلن، چہرہ پر مژدنی چھائی ہوئی، تکلیف دہ جلد جلد سانس، سینہ میں بوجھ معلوم ہونا۔ دست اور وقفے کے بعد قلب کی حرکت تیز ہونا۔ آواز نادر، یا بہت کمزور، انٹھیں جسم

دریٹرم الیم اور آرسنک کے علامات کا فرق۔ دست وقفے کے مقابلہ میں سستی کم ہو یا برابر ہو تو دریٹرم الیم اور اگر دست کے مقابلہ میں سستی زیادہ ہو تو آرسنک دینا چاہئے، بغیر درد کے آسانی سے وقفے و دست ہوتا ہو تو دریٹرم الیم اور اگر متلی تکلیف دہ ہو اور پاخانہ کی خواہش کے ساتھ تھوڑا تھوڑا دست ہو تو آرسنک دوا ہے۔

پیاس زیادہ ہو، اور نہ بچھنے والی پیاس ہو تو تھوڑے پانی سے تسکین نہ ہو تو دریٹرم الیم، اور اگر پیاس زیادہ ہو، لیکن مریض بار بار تھوڑا پانی پیتا ہو تو آرسنک دینا چاہئے۔ دست وقفے کی وجہ سے کمزوری ہونے پر دماغی تکلیف نہ ہو تو دریٹرم الیم اور اگر بے مینی، دماغی تکلیف، بجد درد وغیرہ نمودار ہو تو آرسنک مفید ہوگا۔

میں تشنچ، زبان خشک، اور کھڑکھڑی، اور سرد پانی یا اور کوئی پتلی چیز پینے کے وقت گڑگڑاہٹ کی آواز ہونا۔ ایک ساتھ دست دتے ہونا وغیرہ علامات میں ۲۰ یا ۲۵ منٹ کا وقفہ دیکر آرسنک دینا چاہیے۔

اوپر کے علامات کی موجودگی پر بھی اگر چاول کے مار کی طرح دست نہ ہوں۔ لیکن صفر ملا زرد رنگ کا پتلا دست یا سفید رنگ کا بلغم دست ہو تو بھی آرسنک دینا چاہیے۔ ڈاکٹر رسیل کا بیان ہے کہ اگر کیفردینے کا وقت گزر گیا ہو تو آرسنک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور بہت سے معالجوں کی بھی یہی رائے ہے۔ ڈاکٹر ہیوج ہیفیہ کو مہلک پیر یا سمجھ کر آرسنک کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ بہت بچھنی، پریشانی، سستی، نیز پیاس، اور چہرہ پر مردنی ران کی رائے سے آرسنک استعمال کرنے کی خاص علامت ہے۔ ہیفیہ کی کل حالتوں میں آرسنک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دست دتے، یا قے زیادہ، بند یا گرم ہیفیہ اور مہلک ہیفیہ کی آرسنک نہایت مفید اور کار آمد دوا ہے۔

کپرم پیٹ الیکم ۶-۱۲-۳۰۔ اینٹھن کی یہ خاص دوا ہے۔ ہیفیہ کے اور علامات کے ساتھ جب اینٹھن اور تشنچ پیدا ہو جائے تو کپرم دیا جاتا ہے۔ کل جسم سرد اور نیلا ہو کر ہاتھ پیر (خاص کر اینٹھن کے سبب ہاتھ پیر کی انگلیاں سامنے کی طرف کوٹیرھی ہو جائیں اور پیر کی نینڈ یوں ہی اینٹھن ہو، بے چینی، یا گھبراہٹ، نبض مثل سوت کے باریک یا غائب ہونے کی طرح آنکھیں اوپر چڑھ یا بیٹھ گئی ہوں، کان سے کم سننا یا بند ہو جانا پانی یا پتلی چیز پینے کے وقت گھڑگھڑاہٹ ہونا۔ ٹھنڈی چیزوں کی بہ نسبت گرم چیز کھانے کی خواہش، اور اس کے ساتھ پیٹ میں سخت درد، سرد پانی پینے سے قے کا بند ہو جانا۔ قے کرتے وقت آنکھوں سے آنسو گرنا۔ مقعد میں کھلی، زبان اُکڑ جانے سے صاف بات نہ نکلنا۔ پانی کی طرح، پھٹے پھٹے دست دتے، پیشاب کرنے کی خواہش، لیکن پیشاب بالکل نہ ہونا، سانس تیز، بک بک کرنا، شور مچانا۔ ہاتھ و پیر میں تشنچ دانت مسٹکٹ کٹ کرنا۔ وغیرہ، علامات میں فائدہ کرتی ہے۔

تشیخ، ہلکے ہیفہ میں جب غذا کی نالی میں تیزی پیدا ہو جائے۔ جس سے غذا
تے ہو جاتی ہو۔ اس وقت کپڑم کا استعمال کرنے سے غذا یا مشروب بات
کے ہضم کرنے کی طاقت مریض میں پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر پوڈوکر کہتے ہیں کہ
انیٹھن بند کرنے کی کپڑم بہت اچھی اور کامیاب دوا ہے۔

سیکیل کار ۳۰۔ ۴۔ ۳۰۔ انیٹھن بند کرنے کی یہ بھی ایک اچھی دوا
ہے۔ کپڑم استعمال کرنے کے بعد اگر اگرٹن یا تشیخ بند نہ ہو بلکہ حسب فعل
علامات دکھائی دیں تو سیکیل دینا چاہیے۔

موت کا خوف، آنکھوں کا بیٹھ جانا۔ کان سے کم سُتنا۔ چہرے پریشان
و خشک، اور خون نہ اُرد، صاف یا سفید رنگ کی زبان، اور وہ بھی رہ رہ کر
کاپٹی ہو۔ تیز پیاس اور بھوک، یا تے کرنے کی خواہش۔ معدہ میں جلن پیشاب
بند، سینہ کے بائیں جانب کے حصہ میں تشیخ کی طرح درد، نبض کمزور یا قریب
قریب غائب، ہاتھ و پیر کی انگلیوں میں تشیخ، علیحدہ علیحدہ ہو کر پیچھے کی
طرف ٹیڑھی ہو جانا، جسم میں جلن، اور اسی وجہ سے جسم پر کپڑا نہ رکھ سکتا۔

ہاتھ و پیر کا کانپنا۔ یا ہلے رہنا، مُٹھ ٹیڑھا ہو جانا۔ زبان کھل جانا۔ اور نیچری میں
پاٹھانہ ہو جانا۔ وغیرہ علامات میں سیکیل زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

ہینہ کی انتہائی حالت میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔ ہاتھ و پیر میں انیٹھن
کراڑے مریض کی طرح پیچھے کی طرف اکڑ جانا۔ کل جسم میں (خاص کر چہرہ)
نیپ لگوں، کرم یا بلغم کی تے کرنا۔ اور تے کے بعد ہی آرام معلوم ہونا
وغیرہ اس دوا کے خاص علامات ہیں۔

کینتھس ۶x۳۔ خون میں دست، گوشت کے دھوئے ہوئے
پانی کی طرح کے دست، ازرد، سفید چڑے کی طرح دست، خون کے رنگ
کی آنکھوں میں ہوئے دست (آنت کے ٹکڑے کی طرح) خون کی تے کرنا۔
خون کا پیشاب بند، ہاتھ و پیر یا جسم کا بالائی حصہ مُٹھا (رایا اندر
جلن معلوم ہونا) خون کے دست و تے والے ہیفہ کی اعلیٰ درجہ
کی کامیاب اور مجرب دوا ہے۔

رٹاکس ۶۔ پتے پانی کی طرح، پتلے آنکوں بلے، یا گوشت کے دھوئے ہوئے پانی کی طرح، خون آمیز دست، گارٹھارڈ، پیلا، بدبو دار دست۔ پتلا خون ملایا زرد، بغیر توبہ کے دست بگ بگ کرنا زبان کا اگلا حصہ سرخ، مثلث نما، غذا سے نفرت، تیز میاں (خاص کر ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا دودھ، پینے کی خواہش، پیٹ کا گرٹ گرٹ آنا۔ بے ہوشی، نیند کی طرح کا تکلیف دہ خواب۔ بخار طے ہفتہ میں رٹاکس خاص طور سے فائدہ کرتا ہے۔

اکونائٹ رٹاکس: XI۔ دست وقے کے ساتھ ہی ساتھ کل جسم کا سرد پڑ جانا۔ کل جسم نیلا، سانس کی آمد و رفت میں سخت تکلیف، سخت درد شکم، چہرہ یا کوس، پانی کی طرح پتلا دست، سبز، کالا یا صفر ادوی قے ہونا۔ پیشاب بند، سر میں چکر، سانس ٹھنڈی، نبض کمزور اور غائب (کبھی کبھی پیٹ میں اٹیکھن وغیرہ علامات۔

جسم سرد ہونے کی حالت میں قلب کا فعل کم ہونے کی صورت میں اکثر بچہ اور موت کا خوف۔ درجہ انتہائے مرض میں پانچانہ میں گانٹھ ایسے سترے ایسی حالت میں اکونائٹ رٹاکس XI، دینا چاہیے۔ ہفتہ کے نتیجے میں بخار آنے پر بلایا ڈونا ۱۸۳۔ اور اکونائٹ رٹاکس XI۔ یکے بعد دیگرے دینا چاہیے۔ انٹرمٹارٹ۔ ۶، ۳۔ درجہ اشتداد مرض کے آخر میں جب قے کے بعد غشی یا بیہوشی ہو، اور پھر قے کے وقت مریض ہوش میں آجائے اُس وقت انٹرمٹارٹ دینا چاہیے۔ مذکورہ بالا علامات کے ساتھ سینہ میں جلن، یا درد، نیند میں پڑے رہنا۔ یا بیہوشی میں رہنا۔ کسی بات کا جواب دینے کو جی نہ چاہنا۔

بار بار کراہنا۔ سانس اندر زیادہ لینا اور باہر کم نکالنا۔ بہت کمزور اور طائف، نبض پانی کی طرح سبز رنگ کے دست، بے خبری میں دست ہو جانا۔ تکلیف دہ قے کی خواہش، بہت تکلیف سے تھوڑی قے، قے کرتے ہی قے کرنے کی خواہش بند ہو جانا، آنکھیں میٹھ جانا۔ اور دکھائی کم دینا وغیرہ علامات میں جب چچک، پیلی ہو، اور ہفتہ ہو تو انٹرمٹارٹ خاص کر مفید ہے۔ درجہ انتہائے مرض میں جب قلب کا فعل بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہو اس وقت

اٹم ٹارٹ دیا جاتا ہے۔ وریٹرم اور اٹم ٹارٹ کے علامات قریب قریب یکساں ہیں۔ لیکن عضلات کا کاتینا اور پریشانی اگر زیادہ ہو تو اٹم ٹارٹ دیں اور دل کی کمزوری اور فالج میں وریٹرم دینے پر کوئی فائدہ نہ ہو تو اٹم ٹارٹ دینا چاہئے۔

ایرس وارس (X) - ناف کے چاروں طرف اور پیٹ کے نیچے کے حصہ میں درد کے ساتھ بیو دار، خارش، دست دتے ہوں، سفید یا صفراوی پیلا دست کھٹی تھے اور صفراوی دست، خون لمبے دست، خون کی تھ، منہ سے مقعد تک جلن، رات کے آخر وقت میں مرض کا حملہ سینہ اور منہ میں جلن وغیرہ علامات میں علامات مذکورہ بالا کے ساتھ کل عضو کے سرد رہنے پر اس کے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہیفیہ کے ایسے دست دتے ہیں جن میں خون ملا ہو، نہایت مفید دوا ہے۔

رسمینس (X) - پانی کی طرح دست، صفراوی تھے، بخار، اور سر میں سرد پسینہ، تشنج، پیٹ میں جلن (لیکن پیٹ میں درد نہ ہونا، پیشاب بند بخار کے ساتھ ہیفیہ میں بھی رسمینس فائدہ دیتا ہے۔

ایلیٹرم ۳ - بہت زیادہ مقدار میں بغیر درد کے صفراوی یا جھاگدار پانی کی طرح دست دتے، پیٹ میں درد اور نفخ، سردی لگنا اور جھپٹائی آنا۔ سبب ۶ - دست ہونے کے بعد ہی تھے کی خواہش اور تھے ہونا۔ ذرا بھی پلنے پر متکی ہو رہے ہوتا۔ ہیفیہ جس میں دست دتے اور پیاس نہ ہو، سرد پسینہ، جسم سرد، پیروں میں اٹھن، کلیجہ دھڑکنے یا ایسا معلوم ہو کہ کس کس بندھا ہے (بچوں کا ہیفیہ اور بند یا گم ہیفیہ کی یہ ایک کامیاب دوا ہے۔ کیٹرم آر ۶ X - سفوف - پیٹ میں تیز درد اور اٹھن یا اگر ن (بچوں کے ہیفیہ کے لئے) اچھی اور کامیاب دوا ہے۔

فاسفورس ۳ - ۶ - پیٹ میں گر گر اٹھ اور آواز کے ساتھ دست ہونا۔ پینے کے بعد ہی (خاص کر ٹھنڈا پانی پینے کے بعد) گرم ہو کر تھے ہو جاتا ہے۔ سبز، نرم، نیلے رنگ کے صفرا، بلغم پلے یا بد ہضمی کے پتے دست، بہت خون لمبے اور مواد لمبے گوشت یا گوشت کے دھوئے ہوئے یا پی کی طرح پیلا دست، خون کی تھ، صفرا یا بلغم اور تھالی ہوئی غذا کے ساتھ خون کی تھ ہونا خون کی دست دتے

دلے ہنسیہ کی اچھی امد کامیاب دوا ہے۔

ایسکاک ۳×۶۔ سخت تسلی (یا تھے) کے ساتھ چمکدار (جس میں بلغم نہ ہو) سرخ رنگ کے خون کے دست۔

مرکب دل سس ۳×۱۔ سفوف بنر پانی کی طرح دست کے ساتھ پیٹ میں تشنج درد، آنوں اور خون ملا ہوا یا تھوڑا صفراء ملا ہوا دست پیاس بہت تھ اور نہایت مستی، پیٹ میں شدید ٹھنک کے ساتھ ناقابل برداشت درد۔

مرکب یوریں کار ۳-۶۔ ہنسیہ کے دوسرے علامات کے ساتھ (چاول کے مار کی طرح دست نہ ہو کر) خون ملا بلغم نکلنے پر یا اسہال کے بعد ہنسیہ ہونے پر اور اُس کے ساتھ کوٹھن اور تیز درد شکم ہونے پر مرکبوری کار وغیرہ علامات میں خاص کر خون کے دست اور تھلے ہنسیہ کی مفید دوا ہے۔

کروٹن ٹگس۔ ۳-۶۔ پھپھار سا کی طرح زور سے یکایک پیلا۔ پیلا دست معدے میں تیز تکلیف، کوٹھن، یا تیزی، پانی یا دوسری پستلی چیز پیتے ہی تھ ہو جانا وغیرہ علامات میں مفید ہے۔

جڑ و قاس ۳-۶۔ چاول کے عوض گانٹھ گانٹھ سفید رنگ کا پیلا دست پہلے تھ، اور بعد کو دست کل جسم ٹھنڈا۔ سر دسپینہ، ہاتھ، پاؤں میں اٹھن پیٹ میں گر گر اہٹ کی آواز۔

خوراک:- مرض کی تیزی کے موافق ۱-۵-۲۰۔ منٹ یا آدھے گھنٹہ کا وقفہ دیکر ایک ایک خوراک دوا دینی چاہیے۔

تدبیر معاوان:- مرض کی خبر پاتے ہی مریض کو صاف سُقے اور خشک کمرے میں سلا دینا چاہیے۔ ہمیشہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ مریض کے کمرہ میں صاف ہوا کی آمد و رفت ہو، کمرہ میں دُھوپ، دُھوئی، گندھک، کافور وغیرہ جلانا اچھا ہے۔ دوسرے درجہ میں مریض کو کوئی غذا نہ دینا چاہیے پیاس بجھانے کے لئے ٹھنڈا پانی پینے کے لئے یا برف کا ٹکڑا چوسنے کے لئے دینا چاہیے گھر سے بہت دور مٹی کے نیچے دست دتے دبا دینا چاہیے۔ جس عضو میں اٹھن ہو اسے ہاتھ سے رگڑنے یا کپڑے کی تھیلی میں بالو بھر کر گرم کر کے

کو برائیا ناجا ۶۔ آرسنگ کے استعمال کے بھی اگر سانس کی تکلیف کم نہ ہو تو ناجا دینا پڑتا ہے۔ مریض مُردہ کی طرح پڑا رہتا ہے۔ کچھ نکل نہ سکے، نبض سوت کی طرح باریک سانس کی تکلیف وغیرہ آخر وقت کے علامات۔

نکوشن ۳-۶-۳۰۔ اگر کسی دوا سے سانس کی تکلیف نہ دور ہو تو نکوشن دیا جاتا ہے، سر میں سرد پسینہ، دست وقے، پیشاب بند سانس کی زیادہ تکلیف وغیرہ اس دوا کے خاص علامات ہیں۔ مفلوجی ہیفیضہ کی یہ اچھی اور کارآمد دوا ہے اور اپنا اثر فوراً دکھاتی ہے۔

کاربوووج: ۱-۲-۳-۴۔ درجہ انتہائے مرض کی حالت میں کاربوووج زیادہ فائدہ مند ہے۔ کل جسم مثل برف کے سرد، زبان سرد۔ اور نیلی، نبض قریب قریب غائب آنکھیں دھنس گئی ہوں، سر اور گلے میں بوند بوند پسینہ، آواز بیٹھی، یا ایسی آواز جو صاف نہ ہو، دست وقے بند ہو کر نفخ شکم، سانس کی سخت تکلیف، بدن میں تیز جلن، کل جسم نیلا، ہو جانا۔ وغیرہ علامات میں کاربوووج دیا جاتا ہے۔ اگر اس حالت کے پہلے وراٹرم ایلم یا آرسنگ نہ دیا گیا ہو تو (کسی کسی کی رائے سے کاربوووج کے ساتھ وراٹرم ایلم یا آرسنگ، باری باری دینے سے فائدہ ہوتا ہے)۔ نفخ شکم کے ساتھ بدبو دار پانچانہ نہ ہونا۔ کاربوووج کے استعمال کی خاص علامت ہے۔

ایسٹہائیڈروسیانک ۳-۶۔ دست وقے ہوئے پر بھی آنکھ کا دھنس جانا۔ اور چہرہ کی رونق جاتی رہتا۔ چہرہ نیلا، جسم مُردہ کی طرح، پانی حلق سے نہ اُترتا، آہستہ آہستہ سانس نکلتا، سرد پسینہ، نبض ندارد، کل جسم دھماکر زبان، ٹھنڈا۔ آنکھیں آدھی کھلی، آنکھوں کی پتکی کا پھیلنا۔ ہاتھ پیر کے ناخن نیلے، اور اگلا جھٹکے اٹھ اٹھ، بے ہوشی یا غور غور کرنا۔ سانس کی تکلیف، یا مُنہ پھاڑنا (آخر وقت کی سانس کی تکلیف، یا مُنہ پھاڑنا) آخر وقت کی سانس کی تکلیف روکنے کی اچھی دوا ہے۔

بند یا کم ہیفیضہ: جس میں دست وقے نہ ہوں ایسے ہیفیضہ میں کمیغ دینے سے اگر فائدہ نہ ہو تو ہائیڈروسیانک دینا پڑتا ہے۔

کالی سیلے ٹیم ۳X- (سانس کی تکلیف میں جب ایڈ ہائپرڈروسے کام نہ نکلے تو کالی سیلیم دینا چاہیے)۔ سانس قریب قریب بند زندگی کی کوئی علامت نہ ہو، بجز اس کے کہ بیچ بیچ میں سینہ کھولتا ہو۔

ایکوناسٹ نیلسن X- دل کی کمزوری، لیکن کلجہ کی حرکت برابر بہت بے چینی، موت کا خوف، کل جسم سرد اور چہرہ پر مُردنی چھائی ہوئی۔

بخنارہ کے ساتھ ہیضہ میں (پانی کی طرح بسرنگ کا دست)۔ درد شکم، تیز پیاس، بے چینی، دل کی کمزوری کے ساتھ جسم کی حرارت بڑھنا۔ یا بخنارہ اور خون کے دست وقفے سے ہیضہ میں ایکوناسٹ خاصکر مفید ہے۔ ساکیوٹا ۶:- سانس کی تکلیف۔ نفخ، شکم، تھکی، اگرٹن،

لیکے سس ۶:- جس مہلک ہیضہ کا حملہ ہوتے ہی مریض مُردہ کی طرح (میں پر گر پڑے اور بے، اور بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوشی میں دست وقفے ہو تو لیکے سس خاصکر فائدہ کرتا ہے۔ اور تجرب ہے۔

ایکارنگس ۶:- جسم کا خوب سرد ہونا (جیسے کوئی برف کی سوئی مریض کے جسم میں چھو رہا ہے)۔ پیشاب بند، نفخ، شکم، بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنا۔ خوراک:- حالت کے مطابق ۱۰-۱۵-۲۰ منٹ کا وقفہ دیکر ایک ایک خوراک دوا استعمال کرنا چاہیے۔

تدابیر معیاریون:- تیز تشیخ، یا انیٹھن، سانس میں بہت تکلیف رہنے سے مریض کے فوراً امرمانے کا اندیشہ ہو تو کلجہ پر (مسٹر ڈی پلٹس باندھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ سرد لیسنہ، اگر زیادہ ہو تو سرخی ایک کپڑے میں باندھ کر گرم سینک دینا چاہیے۔

(۴) علاج درجہ الخطاط مرض

خلقی رد الفعل شروع ہو تو کوئی دوا دینا مناسب نہیں ہے۔ اسوقت غذا وغیرہ تشخیص کرنا چاہیے۔ رد الفعل شروع ہونے پر اگر ایک دو مرتبہ معمولی دست بھی ملیا تو بھی دوا نہ دینا چاہیے لیکن اگر تکلیف دینے والے علامات نمودار ہوں تو مرض کی شدت میں بیان کی گئی ہیں۔ جو دوا سب لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے

(علامات کے مطابق) تھوڑی مقدار میں (اعلیٰ طاقت) اور بہت وقفہ کے بعد کوئی دوا دینا چاہیے۔

ایک بات اور بھی: ہیفہ اور دست وقت کے ساتھ خون کا پانی والا حصہ اور نمک کا حصہ نکل جاتا ہے۔ اس لئے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس لئے پانی کے ساتھ تھوڑی مقدار میں نمک ملا کر مریض کو پلانے سے وہ پانی اور نمک سانی سے خون میں مل جاتا ہے۔ خون پتلا ہو جاتا ہے۔ اور جسم کے عضو میں خون جمع بھی نہیں ہوتا۔ اور خون زیادہ بھی نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لئے خلقی رد الفعل شروع ہوتے ہی مریض کو پانی (یا خوب پتلا اراروٹ) کے ساتھ تھوڑا نمک ملا کر کھلانا چاہیے۔

(۵) عوارض و نتائج کا اعلان

(۱) مرض کا پلٹنا۔ اکثر رد الفعل شروع ہونے کے بعد اگر دست دتے ہونا۔ دوبارہ شروع ہو تو ایسی حالت میں جو ادویات زمانہ ابتدائے مرض میں اور زمانہ اشتداد مرض کے بیان میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے جو دو علامات کے مطابق ہو، اپنی طاقت کی دینا چاہیے۔ اگر کرم کی وجہ سے پھر حملہ ہو تو سائٹاس $\times 200$ دینا چاہیے۔

(ب) بخار و خرابی کے علامات :- رد الفعل کی حالت میں اگر بخار کے علاوہ اور کوئی دوسری علامات نہ ہو تو صرف ایکونائٹ ۳۰ دینے سے بخار رفع ہو جائے گا۔ لیکن اگر بخار کے ساتھ دماغ میں خون اکٹھا ہو کر آنکھیں سرخ، سر اور کپٹی کے اوپر کی ورید میں تپک ہوئی ہو، پیشانی گرم ہو وغیرہ علامات موجود موجود ہوں، تو بیلا ڈونا ۶ یا ۳۰۔ مریض لیٹر سے بھاگنے کی کوشش کرے یا لیٹر نیچے اور کچھ بکے جھکے تو بائو سیاس ۶۔ پیٹ میں کرم رہنے کی وجہ سے دانت کڑکڑائے۔ ناک کا اگلا حصہ کھلائے۔ منہ سے لارہ پٹے اور آنکھیں چڑھی ہوں، وغیرہ علامات کے ساتھ بیک کرتا سائٹاس $\times 200$ پاگل کے مانند کام اور تیز دیک کے آدمیوں کو کاٹنے دوڑنا۔ وغیرہ علامات میں اسٹرا مونیم ۶۔ گہری نیند کی طرح بیہوشی ہو یا پتلیاں اور پگو

چرچہ جائیں اور آنکھیں نصف کھلی رہیں تو ادویم ۶۔ ۳۰۔ بخار کے ساتھ ذات
الصدر (منونیا) ہو، برائی ادنیٰ ۶۔ یا فاسفورس ۶۔ معدہ میں جلن یا سوزش
ہو تو آرسنک ۶؛ نکس و امیکا ۳۰۔ ۲۰۰۔ یا برائی ادنیٰ ۶۔ جگر اگر ماؤت ہو جائے
اور سوزش ہو تو برائی ادنیٰ ۶۔ نکس و امیکا، اپیکا، کاربووج یا ایسڈ فاس
کینتھر ۶۔ یا ٹر بنتھنا ۶۔ باری باری سے دیکر بھی کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا
ہے۔ سرسام کے ساتھ عقل کا زائل ہو جانا۔ بکنا۔ جھٹنا، پیاس، دست وغیرہ
علامات ہوں تو رسٹاکس ۳۰۔ دینا مفید ثابت ہوگا۔

(ج) پیشاب بند اور نیند کی شکایت :- رد الفعل شروع ہونے
کے بعد اگر پیشاب نہ پیدا ہوا ہو، یا بند ہونے کی وجہ سے پیٹ بھول جائے
اور بک بک جھک جھک اور شخ ہو تو کینتھر ۳۰ خاصکر فائدہ مند ہے۔
کینتھر ۶۔ پیشاب پیدا نہ ہونے اور پیشاب رکنے کی مخصوص دوا ہے۔
پیشاب بند ہونے کی وجہ سے اگر نیند کی شکایت ہو تو آرسنک ۳۰ x کینتھر ۳۰ دینے
سے اگر فائدہ نہ محسوس ہو، بلکہ نبض ڈوبتی جائے تو ٹر بنتھنا ۶۔ ڈاکٹر سرکار فرماتے
ہیں کہ اگر دو تین مرتبہ کینتھر دینے سے بھی کچھ فائدہ نظر نہ آتا ہو تو ٹر بنتھنا دینا چاہیے
پیشاب رکنے کے ساتھ ہی اگر نبض مضبوط ہو تو کالی بالی کروم ۶۔ پاؤڈر ٹھنڈے
پانی کے ساتھ ایک چھٹانک شورہ ملا کر اس پوشن میں کپڑا بھگو کر ناف
پر رکھنے سے رککا ہوا پیشاب اتر سکتا ہے۔ متذکرہ بالا ادویات سے
بھی اگر پیشاب نہ ہو، اور اس وجہ سے دماغ ماؤت ہو جائے میلادونا۔
اسٹرا مونیم، ہائیڈروسیاس، سائکیوٹا، ادویم، کنالیں انڈیکا وغیرہ دوائیں
حسب علامات دینا چاہیے ۶۔ یا ۳۰ طاقت کی۔
(د) ہچکی :-

درجہ انتہائے مرض کے بعد رد الفعل شروع ہونے پر اکثر ہچکی
آجاتی ہے۔ دوا ٹرم ۳۰، یا آرسنک ۳۰۔ استعمال کرنے کے بعد اگر ہچکی
نہ بند ہو تو دوسری دوا یہی چاہیے۔ بار بار دردہ کرتیز ہچکی، یا اس کے
ساتھ ملٹی، ہچکی رکنے کے بعد کان بند ہو جانا۔ ہچکی کے وقت تمام جسم

میں لرزہ، وغیرہ علامات میں سیلا ڈونا۔ بے ہوشی کی طرح پڑے رہنا اور بیچ بیچ میں زور سے آواز کے ساتھ ہچکی کے علامات میں سا کلیوٹا سو۔ معدہ میں درد۔ اور بوجھ، پیٹ میں اینٹھن، غذا کھانے کے بعد ہچکی، ہچکی کے وقت پیشاب بلا ارادہ نکل جاتا۔ اور پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ۔ علامات میں ہایو سیامس ۶۔ حرکت کرنے ہی سے تیز ہچکی، اور اسی وجہ سے سستی اور بند ہونے کے وقت آنکھ پلٹ جاتا وغیرہ علامات میں کار بووچ ۶۔ غذا کے بعد یا حقہ سگریٹ وغیرہ پینے کے وقت ہچکی ہو، تو یلسا سیلا ۶۔ غذا کے بعد معدہ میں دباؤ محسوس ہونے کے ساتھ ہچکی ہو، تو فاسفورس ۶۔ کھانے پینے کے بعد ہچکی، ناف کے چاروں طرف تشنجی درد۔ معدہ اور جگر میں درد کے علامات میں انٹیشیا ۶۔ ہچکی زیادہ اور تے کی خواہش، لیکن پیاس نثارو، تو اسٹانی سگریٹ ۶۔ اس کے علاوہ درمیان میں کریازوٹ، انٹیم ٹارٹ، ایکونائٹ، آرسنک، کیو پریم، سیکیل کار، ایڈ فامس وغیرہ دوائیں حسب ذیل علامات استعمال کرنا چاہئے۔ اگر ان کل دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو کالی بروم ۲ x سفوف کی بھی آزمائش کرنی چاہئے۔

(دس) متلی اور تے۔ بار بار ہچکی، تے یا متلی ہونے پر مریض ایک دم سُست، اور اُس کی نبض غائب ہو جائے، سفیدہ کا پہلے ہی سے ہو میو متیک طریقہ سے علاج کرنے سے اکثر یہ علامات نہیں ظاہر ہوتے، حالت نتیجہ میں تے، صفرا یا کھٹی چیز کی تے نہ ہو بلکہ متلی بنی رہے تو اپیکاک ۶۔ لیکن تے ہوتے ہی اگر تے کرنے کی خواہش بند ہو جائے تو انٹیم ٹارٹ ۶۔ اور تے کے ڈر سے تے ہو تو ٹکس و امیکا ۶۔ اپیکاک دینے سے اگر فائدہ نہ محسوس ہوا تو ٹکس و امیکا دینا چاہئے۔ اگر ٹکس و امیکا اور اپیکاک کی تین چار خوراکی دینے سے بھی تائدہ محسوس نہ ہو تو پوڈو قالم ۶۔ دپانی یا پتیلی چیز پینے کے بعد فوراً ہی تے ہونے پر یوٹے ریم پرف ۶۔ لیکن اگر فوراً ہی تے نہ ہو بلکہ کچھ دیر بعد تے ہو تو فاسفورس، نیر پیاس، ٹھنڈا پانی زیادہ پینے کی خواہش۔ پانی پیٹ میں گرم ہونے ہی تے ہو جائے۔ ایسی حالت میں ڈاکٹر نیش صاحب

نے فاسفورس کھلا کر ایک مریض کو اچھا کر دیا تھا۔

(س) اسہال :- رد الفعل شروع ہونے کے بعد یا پیشاب ہونے کے بعد کھوڑا کھوڑا پتلا دست ہو، تو خون کی کوئی بات نہیں ہے۔ عندا کی طرف اگر نظر رکھی جائے تو مریض جلد اچھا ہو جائے گا۔ اگر آرام نہ ہو اور متواتر بڑھتا ہی جائے تو ہیضہ کی تیز حالت کے بیان میں جو ادویات لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے حسب علامت اوجھی طاقت کی دوا زیادہ وقفہ دے کر دینا چاہئے۔ ان ادویات سے کبھی اگر تپلے دست بند نہ ہوں تو علامات کے مطابق مندرجہ ذیل ادویات دینا چاہئے۔

پیشاب ہونے کے بعد دست، اعصابی کمزوری میں الیڈ فاس ۶: ۱ یا ۱۲۔ جگر میں درد، اور صفرا کھوڑا پتلا دست ہو تو پوڈوف کلم ۳۰: ۳۰۔ پیٹ میں حقوڑا لہجہ ہو، پیلا۔ بدبودار دست، گڑگڑاہٹ سے ہو، تو چائنا ۶: ۳۰۔ بہت لوگوں کی رائے ہے کہ چائنا اور فیرم باری باری دینے سے تپلے دست، اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تپلے پاخانہ میں چھوٹے سڈے (گاسٹریکس) ہوں اور بلغم اور (کبھی خون ملا) دست، جگر میں درد، کچھ سفید رنگ لائے پھی آنکیس، اور منہ میں بدبو ہو تو مرک سول ۶: ۴۔ پیلا، سیاہ، پتلا دست ہونے پر ہڈیاں کس: خون ملا دست ہو نے پر کاربووج ۶: چمکیلے سرخ رنگ کے دست ہونے پر اپیکاک ۶: ۳۰۔

(ص) نفخ شکم، رد الفعل ہونے پر (یا رد الفعل کے بعد) کبھی کبھی نفخ شکم محسوس ہوتا ہے (ایلو پیٹیک طریقہ سے مریض کا علاج کرنے پر) ایون سے بنی دوائیں کھانے سے پیٹ میں نفخ ہو سکتا ہے۔

اسہال کے ساتھ پیٹ میں ریا ج جمع ہو یا پیٹ پھولتا ہو تو کاربووج ۳۰۔ قبض کے ساتھ پیٹ بھی پھولتا ہو، اور درد ہو تو لانگو پوڈیم ۳۰۔ اوپیم ۳۰: ۳۰۔ مرک کار ۶۔ دست یا قبض کے ساتھ نفخ ہو تو نکس و امیکا ۶۔ دینا چاہئے۔

(ط) کمزوری :- ہیضہ کے آخری درجہ و زنا نہ عوارض میں مریض

کے جسم میں اکثر خون نہیں ہوتا۔ کچھ پتلا پن لئے سفید جسم، آنکھیں، صفائی
آواز کمزور، وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ مریض اتنا کمزور ہو جاتا
ہے کہ اس میں اکٹھے کی طاقت نہیں رہتی۔ اس حالت میں چائنا ۳۰۔
یا الیڈ فاس ۳۰ فائدہ مند ہے۔

(ح) بے خوابی :- سیفہ کے بعد اگر نیند نہ آتی ہو تو کافیا ۶۔
(د) بھوڑا اور کان کی سوزش :- رد الفحل کے بعد جسم میں کسی جگہ
بھوڑا یا زخم ہو کہ پیپ نکلتی ہو، تو سپر سلفر ۶۔

بھوڑے کے ٹوٹنے یا نشر دینے کے بعد مواد نکلتا رہے تو سائی لی شیا
۳۰ دینا چاہئے۔ کان کی جڑ میں گانٹھ پھول سر سرخ، گرم، ٹپکن کی طرح درد ہو
تو میل ڈونا ۱۰ مواد پیدا ہو جانے پر لیکس ۶۔ یا سلکا ۳۰۔
بلیگ کا زخم ہونے پر اس سے اگر لبس دار مواد نکلتا ہو تو لیکس ۶۔
آرسنک ۶۔ کاربودج ۶، یا آرنیکا ۶۔

منہ میں یا دانت میں، یا منوڑھے میں درد ہونے پر ایڈنا ٹریک ۶۔
ہیپر سلفر ۶۔ یا کاربودج ۶۔ چائنا ۶۔ سلفر ۳۰۔ یا پلسا ٹیلا ۶۔ منہ میں زخم ہونے
پر، آرم ۶۔ آرسنک ۶، سلفر ۳۰، سائی لی شیا ۳۰، سٹرا زخم ہونے پر
آرسنک ۶، ۲۰۰، لیکس ۶۔ یا کرویٹس ۶۔

(ق) پھیپھڑے میں سوزش، ایکوٹائٹ ۲۔ اور فاسفورس ۶۔ مخصوص
دوائیں ہیں۔ اس کتاب میں (نمونیا) ذات الصدرا کا بیان ملاحظہ ہو۔

(لٹ) بچہ کا سیفہ، بچوں کی بیماریوں کے باب میں بچوں کا اسپتال اور
بچوں کا سیفہ ملاحظہ ہو، مرض سیفہ کا پورا پورا بیان اور علاج جاننے کے لئے
ہمارے شریاق سیفہ نامی کتاب بخور ٹپہ مٹا چاہئے۔ ۱۵

۱۵ سیفہ کی موت کی تعداد لندن میں ۱۸۵۷ء میں جب سیفہ خوب زوروں
سے پھیلا۔ اس وقت وہاں کے ایلیو پیٹیک اسپتال میں فی صد ۶ مریض مرے۔ اور
ہوسپیٹیک اسپتال میں فی صد ۱۶ مریض مرے۔ (اگلا صفحہ دیکھیے)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۱)

پارلیمنٹ بورڈ آف سلیکٹ نے جو رپورٹ لکھی اس میں ہوسپیو پیٹھک اسپتالوں کا نام تک نہ لیا۔ ہوسپیو پیٹھک اور ایلیو پیٹھک، دونوں اسپتالوں کی دیکھ بھال ڈاکٹر میکمل گن کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے بلا کسی طرفداری کے کہا: اگرچہ میری تعلیم ایلیو پیٹھک طریقہ کے مطابق ہوئی ہے۔ تو بھی اگر مجھے سپینہ ہو جائے تو میں اپنے علاج کا بار ایلیو پیٹھک کے ہاتھوں نہ دے کر ہوسپیو پیٹھک کو سونپوں گا۔ ایسا غیر جانبدار کے منہ سے کہی ہوئی ہوسپیو پیٹھک کے بارے میں اس بات کا وزن کم نہیں ہے۔

۱۸۶۶ء میں دنیا کی بہت جگہوں کی موت کی تعداد کی فہرست دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ایلیو پیٹھک علاج کرنے والوں کے ہاتھوں سے فی صد ۵۰-۶۰ مریض مرتے ہیں۔ لیکن ہوسپیو پیٹھک معالج کے ہاتھ سے فی صد ۲۰-۲۵ مریض سے زیادہ نہیں مرے۔ کلکتہ میڈیکل کالج میں ۱۸۹۵ء سے ۱۹۰۵ء تک ۶۶ مریض سپینہ سے موت کی تعداد فیصد ۶۰ تھی۔ ۱۹۰۶ء میں اس کالج کے متعلم میجر لیویار ڈاکٹر نے میلائیگ سیلائن کو جسم میں داخل کر کے علاج کیا۔ اس سے موت کی تعداد ۶۰ ہو گئی۔ ۱۹۰۶ء میں پھر پلائیگ سیلائن سے علاج کیا گیا۔ اب موت کی تعداد ۳۲ ہوئی۔ اب پلائیگ کے ساتھ پیر میگنٹس مریض کے جسم میں داخل کر کے علاج کیا جاتا ہے اس سے موت کی تعداد ۲۳ فیصدی ہو گئی۔ مرض سپینہ سے جسم میں پانی اور نمک کا درجہ ٹھٹھا جاتا ہے۔ اس کو پورا کرنا مناسب ہے۔ یہ بات ہمارے رد الفعل کے درجہ کے علاج کے مقصد میں فائدہ بتائی گئی ہے۔ ایلیو پیٹھک ڈاکٹروں کا مذکورہ بالا سیلائن انجکشن (یعنی جسم میں داخل کرنے کا) مقصد بھی وہی ہے (یعنی جسم کے پانی اور نمک کا حصہ کم ہو گیا ہے) انہیں پورا کر کے خون کے گاڑھے پن کو کم کرتا۔ یا خون کے دوران کے فعل میں مدد دیتا۔ ایسی جگہوں میں جب مریض قوی اور طاقتور ہو، وہاں اس سیلائن انجکشن سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے چھوٹے بچے یا بوڑھے، یا بہت کمزور آدمیوں کے جسم میں انجکشن دینے کے بعد ہی مریض کی موت ہو گئی ہے (مرنے کے پہلے کینا جھکنا وغیرہ، بڑبڑانا اور دماغ کی خرابی

امراض خون

(PLAGUE)

لیگ

اٹھارہویں صدی تک ملک مصر میں یہ مرض - دریب قریب
سال پہلے اس ملک میں یہ مرض پیدا ہوا۔ علیٰ غایت مختصر یہ
کا زور رہا۔ ہندوستان میں اس کی پہلی بار آمد ۱۸۵۷ء میں ہوئی
پلیگ یا طاعون ۱۸۹۶ء میں ہانگ کانگ سے نکال میں آیا تھا۔
بچے اور جوانوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس میں
ہونے سے دوبارہ ہونے کا خوف جاتا رہتا ہے۔

دقیقہ حاشیہ ۱۷۲) کے علامات ظاہر ہوتے ہیں اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ
(۱) شہداء میں اسپتالوں میں جن مریضوں کا علاج ہوا، ان مریضوں کا سہیفہ
پہلے کی طرح تیز تھا یا معمولی (ب) ایفون کلیور و ڈائن۔ کیمفر۔ درٹم۔ آر۔ نکا۔
کیٹر آئل (درسی انس) کا پیرسلش وغیرہ کو ان لوگوں سے جس طرح ایک ہی وقت میں
استعمال کیا تھا۔ اور پھر بند کر دیا تھا۔ اسی طرح پریسلٹن پر میگنٹش کی حالت
نہ ہو گی۔ اس کا ثبوت ہے ڈاکٹر نیگ لائیڈ و سٹامس لیبرٹ۔ ڈاکٹر الفریڈ
اسٹائل وغیرہ۔ مشہور ایلوپیتھک ڈاکٹروں میں بھی سہیفہ کے علاج میں بہت اختلاف
رائج ہے۔ ایلوپیتھک علاج کا طریقہ اور دوائیں برابر بدلتی جاتی ہیں۔ اس پر بھی
موت کی تعداد فی صدی ۵۰ سے کم نہیں کر سکتے۔

لیکن ہنی مین کے وقت میں "علاج بالمثل" کے موافق آج تک جو دوائیں
آئی ہیں۔ ان میں ایک بھی ہو میو پیتھک معالج نے نہیں بدلی یا چھوڑی ہے۔
اور آج کل ان کے ہاتھوں سے سہیفہ کے مریض کی موت کی تعداد فی صدی ۱۵-۲۰
سے زیادہ نہیں ہوئی۔ مختلف فرقوں کے داعی بھی کئی ملکوں میں بہت مریضوں کی
جان بچاتے ہوئے ہو میو پیتھک علاج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔

(VIDE ALSO THE WORLD. FEB. 1912)

ہندوستان میں اس کو مہاری اور مری ملا ، میں پلگ (PLAGUE)
 پستیلنس (PESTILENCE) یا بلیک ڈیٹھ (BLACK DEATH)
 کہتے ہیں۔ یہ بھی چمک کی طرح پھیلنے والی بیماری ہے۔ اس میں پہلے مرتبہ
 تیز بخار، اور اس کے بعد جسم کے بہت جگہوں کی گٹلیاں اُما س ہو جاتا ہے۔
 اور اس کے بعد مریض کی موت ہو جاتی ہے۔

کو کو بے بیس (COCC BACILLUS) جرم جو خوردین ہی سے
 دیکھا جاسکتا ہے۔ جسم میں داخل ہو کر یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ یہ جسم
 دیکھنے میں ٹیڑھا ٹیڑھا رہتا ہے۔ اور اس کی پیشانی گول ہوتی ہے، اس کی
 شکل سمی کولن کی طرح ہوتی ہے۔ اس لئے اکثر لوگ اس کو سمی کولن بے سیس
 کہتے ہیں۔ مریض کے خون میں آب خون میں (SERUM) گلیوں میں پیشاب
 یا قحطک میں اور لیسینہ میں یہ جرم موجود رہتا ہے۔ سانس، سامان، غذا
 یا جسم میں داخل ہو کر خون میں مل جاتے ہیں اور بیماری پیدا کر دیتے
 ہیں۔ تاریک کو ٹھریوں میں، جو سیلی جگہوں میں یہ جسم بڑھتے ہیں۔
 کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ بدبو دار کھانا سے ایسی بیماری کا جسم پیدا
 ہوتا یا بڑھتا ہے۔ ثبوت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جھوٹے جوندہ جگہوں میں
 اور مٹی کے نیچے ٹلوں میں رہتے ہیں۔ اُن کو یہ مرض پہلے ہوتا ہے۔ چٹریوں کو
 اکثر یہ مرض نہیں ہوتا۔ جو ہے ہی اس مرض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے
 جانے والے تسلیم کئے جاتے ہیں جو جھوٹے، کھٹل، کھٹی، جھینگہ وغیرہ کے ذریعہ
 سے یہ مرض دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ جس جگہ بہت بڑھ چکا ہوتی ہے
 (جیسے بڑے بڑے شہروں، لیتوں اور سڑکیں وغیرہ جہاں صاف ہوا
 کی آمد و رفت اور دھوپ کی گہنی نشی نہیں ہوتی۔ پانی کی نکاس کا بندوبست
 نہیں ہوتا۔ نالیاں، گندری، میلے پانی سے بھری رہتی ہیں۔ بدبو پھیلی
 رہتی ہے۔ اور سیلی جگہوں میں پہلے پہل پلگ کا حملہ ہوتا
 ہے، اور زیادہ ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا اسباب اور مناسب غذا
 نہ لینے کی وجہ سے قوت حیات کا کمزور ہو جانا۔ وغیرہ وجوہوں سے

غزیا پر ہی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، دھوئی، مچھوئے، ملاح دیا، جو پانی کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ یا جربی اور تیل کے تیار اور گاڑی یا نو بھی اس مرض کا حملہ ہوا کرتا ہے۔

یہ مرض متعدی یعنی چھوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بہت تھوڑے وقت میں یورپ اور یچیم کے بہت ملک، شہر اور گاؤں کو برباد کر دیا ہے۔ اور وہ جگہیں انسان سے فانی ہو کر جنگل ہو گئے ہیں۔ شرقی ہندوستان کی نسبت مغربی ہندوستان میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔

چو بھے، جھینگہ اور نکھیاں اس مرض کے پھیلنے کے اسباب ہیں۔ کیونکہ مغربی ہندوستان میں جو بھے اور نکھیاں بہت زیادہ ہیں۔ انہیں کے ذریعہ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتا ہے۔

اس کا حملہ ہر عمر کی عورتوں اور مردوں پر ہو سکتا ہے۔ لیکن مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو (۱۵ سال سے ۲۵ سال) زیادہ ہوتا ہے۔

ڈاٹسن اور کلیرٹ دونوں ڈاکٹروں نے علاج کی آسانی کے لئے پلگ کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۹۱۱ء میں کینی کی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جو بھے کے علاوہ ایک قسم کی مکھی پلگ کے جرم کو پہونچاتی ہیں۔ پلگ کے پھیلانے والے جو بھے یا نکھیاں ان کے پٹریے، چارپائی، سامان، غذا وغیرہ میں پھپ کر یا میٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مرض پہونچا دیتے ہیں۔ اس طرح سے پلگ کا جرم ان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ان مکھیوں کو زائل کر دیا جائے تو پلگ نیت و نابود ہو سکتا ہے۔ بہت جا بچ کرنے سے یہ اصول ملا ہے کہ روزانہ پہننے سے پٹریے اور بستر وغیرہ دھوپ میں اگر دیر تک خشک کئے جائیں تو یہ نکھیاں اور پلگ کے جراثیم برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس تہ پر سے پلگ کا پھیلنا بند ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ ہندوستان پلگ سے بری ہو سکتا ہے۔

۱) عفونی طاعون (SEPTICEMIC) خون خراب کرنے والا
یا سڑنے والا طاعون، یا جسم کے سب اعضا میں سرایت کر کے سڑن
پیدا کرتا ہے۔ یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ اس طرح خون خراب ہونے کا
نتیجہ نہایت خراب ہوتا ہے۔

۲) گلٹی واطاعون (BUBONIC) اس میں جاذب
گلیاں (LYMPHATIC GLAND) خاص کر ماؤف ہوتی ہیں۔
یعنی پیچھے، بغل، گردن، وغیرہ میں چھوٹی اور سخت گلیاں ہوتی ہیں۔
گلیوں میں مواد پڑ جانا اچھی علامت ہے۔ لیکن گلٹی کا پیچھا جانا نہایت
خراب علامت ہے۔ قبض، مثانہ، یا رحم سے خون بہنا۔ سرخ یا
سیاہ رنگ لگنے وغیرہ خراب علامات ہیں۔

۳) نمونیائی طاعون (PNEUMONIC) پلگ، اس میں خاص کر
پھیپھڑاؤف ہوتا ہے۔ یعنی خشک کھانسی، درد سینہ۔ سانس کی تکلف۔
پھیپھڑے سے خون نکلنا وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔

۴) طاعون شکمی (INTESTINAL) پلگ، اس میں خاص کر
آنتوں پر حملہ ہوتا ہے۔ یعنی پیچھا، پیٹا کے نیچے اور گھٹنوں میں درد، نفخ شکم،
دست دتے وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔

مرض کا حملہ ہونے کے بعد ایک ہفتہ تک مرض پوشیدہ رہ سکتا ہے۔
پہلے سستی، جسم میں بے چینی، درد سر، بھوک نہ لگنا، دماغی کمزوری،
اور درد چشم، علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ دل پہلے ہی سے کمزور ہو جاتا ہے۔
نبض آہستہ آہستہ نرم، تیز رفتاری سے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ تیز بخار،
۱۰۰ سے ۱۰۲ تک، سردی، لرزہ، نبض کی چال ۶۰ سے ۱۰۳ تک۔ بہت تکلیف
ہونے پر بالکل ساکت، بغیر حرکت کے پڑے رہنا۔ منہ میں تکلیف کے علامات
کا نہ ظاہر ہونا۔ اس کے بعد بے ہوشی، بکنا۔ اور سرسای علامات ظاہر ہونے
لگتے ہیں۔ معمولاً دوسرے سے پانچویں دن تک گلٹی نکل آتی ہے۔
زیادہ تر مریضوں کو گلٹی دار مرض میں گلٹی نکلتی ہے۔ اور یہ گلٹی زیادہ تر

بٹھے ہی میں ہوتی ہے۔ کسی کسی مریض میں بے چینی، تکلیف وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ ٹکلی چٹپی ہو جانا بد علامت ہے۔

یہ بیماری جب وبائی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس وقت تشخیص میں کوئی خاص وقت نہیں ہوتی۔ خور و بین کے ذریعہ سے دیکھنے پر اگر اکو کو بے بسی لمس، بل جائیں تو تشخیص میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا۔ اس کا تیز اچھا نہیں ہے۔ فی صدی ۵۰ سے ۹۰ مریضوں کی موت ہو جاتی ہے۔

علاج: — نذر یا بندہ نمودار جگہ کو جہاں گنجان آبادی ہو، ترک کر دینا چاہئے۔ جو جگہ کھلی اور نمودار خشک ہو، جہاں دھوپ اچھی طرح جاتی ہو، ایسے جگہ طے مانا چاہئے۔ میلے پانی کے نکاسی کا پورا پورا انتظام رکھنا چاہئے۔ روز بروز میں تیل مل کر بنانا چاہئے۔

ہلکی غذا اور تازہ چیزیں، وہی تھوڑا روز کھانا چاہئے۔ ہاتھ یا کمر میں اگنیشیا بن باندھ رکھنے سے اس مرض کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ طاعون وبائی شکل میں نمودار ہونے کے زمانہ میں ہر ہفتہ میں ایک خوراک اگنیشیا ۳۔ حقہ مقدم کے طور پر استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

آرٹھریٹک ۳۰۔ ۲۰۰۔ جلن، تیز بیاس۔ بے چینی، موت کا خوف، بہت زیادہ کمزوری اور سستی، دماغی پریشانی۔ لیکن سستی کی وجہ سے بلا حرکت خاموش پڑے رہنا، سانس میں تکلیف وغیرہ علامات میں فائدہ مند ہے۔

میلاڈونا ۱۰۰۔ ۲۰۰۔ مرض کے پہلے درجہ میں جب تیز بخار ہو، بلکہ جھک کر تا ہو، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوں، سر میں درد۔ ٹکلی کا مرض اما سو ہونا۔ اس میں ٹپکن کی طرح درد، اکڑن وغیرہ۔ سوزش کے علامات میں و انہایت مفید اور کارآمد ہے۔

پیشیا ۳۰۔ ۲۰۰۔ منہ میں بد بو، بول و براز میں بد بو۔ تیلے دست بے ہوشی کی حالت، ہلکا سر سام (انٹسٹینا)، بستر سخت معلوم وغیرہ سرسامی علامات کا زیادتی۔

کارپوور ۳۰۔ ۲۰۰۔ آخر حالت میں کل جسم میں سرو پینہ

ناک و منہ کے پاس متواتر ٹپکھا ہلانے کو کہنا۔ سانس میں تکلیف۔ آنکھ اور منہ کا بیٹھ جانا۔ سانس ٹھنڈی، آواز غائب وغیرہ آخر علامات ہیں۔
کارلوا نیملس۔ ۳۴، ۲۰۰۔ گھٹنوں میں درد، کمر اپن اور سوزش، تیز درد سر۔
کھانے کے نیلا پٹر جانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔

اچی نے شیا ۶، پتلے دست، بخار، سستی، بیہوشی کی حالت، ہر قسم کے اخراج، بد بو، درد انگلی، سوزش، اور اس، وغیرہ علامات ہیں۔ اچی نے شیا
سنگر۔ ۱ سے ۱۵۔ قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا چاہئے۔
فسیرم فاس۔ ۳، ۴، ۵، سفوف :- اگر سوزش کی علامت زیادہ
تو اس دوا کا سفوف دو گھنٹہ کا وقفہ دے کر استعمال کرنے
سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

کوبرا ۱۲۔ ۳۰۔ نبض غائب یا کمزور، سرد پیمہ، سانس میں تکلیف
نیند نہ آنا۔ یک یک کہنا۔ دل کی حالت خراب ہے
جلسمیم۔ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰۔ غنوزگی۔ نیند نہ آنا۔ داخلی حسستی۔ نشت میں درد۔
آہستہ بکنا اور درد۔

الگنشتیا۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ ڈاکٹر سنگ بار، برادر ڈاکٹر مہند رلال سرکار
الگنشتیا کو پیک کا بہترین دوا سمجھتے ہیں۔ اُن کی رائے میں پیک کی سب حالتوں میں
اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے مرض میں بھی آرام ہوتا ہے
اور اس کا ہونا بھی رکتا ہے۔ دونوں ہی کام نکلتے ہیں۔

۱۷۔ یہاں کوبرا یا گھن سانپ کے زہر کے بارے میں ایک بات کہنا بہت فروری
ہے۔ سچر (اب کرنل) ڈین (DEANIS) کے سریر جب پلنگ کے علاج کا بار بمبئی میں
ٹرا تھا۔ اُس وقت انہوں نے ناچا کوبرا (کوبرا ایک حصہ گلیسرین ۱۔
۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰۔ طاقت، لیکس وغیرہ زہر کھلا کر سیکڑوں پلنگ کے مریضوں کی
ان بچائی تھی۔ اس لئے سرکار اور عوام نے ان کی تعریف کی تھی
خوش قسمتی سے وہ اس وقت پینشن پار ہے ہیں۔

مرض کا حملہ روکنے کے لئے چار-پانچ دن کا وقفہ دے کر ایک خوراک انگنیشیا
۳۰۔ استعمال کرنا چاہئے۔ اور جب مرض پھینا ہو، تو ایک انگنیشیا کچلی کر سن
باندھ رکھنے سے بلیگ ہونے کا خوف دور ہو جاتا ہے۔

کالی میوور۔ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ بالو کی ایک فریقہ سے یہ بلیگ کی ایک اچھی
اجبی اور کامیاب دوا ہے۔ اگر سوزش زیادہ ہو، تو فرم فاس کے
ساتھ باری باری سے اس کا استعمال کرنا چاہئے۔

بلیگ کی ہر حالت میں کالی میوور کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

لیکس۔ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ بایں جانب مرض کا زیادہ علم اور اس کا داہنے
جانب پھیل جانا۔ چھوٹا برداشت نہ ہوتا۔ سونے کے بعد مرض کی زیادتی۔
جسم کے اخراج کے ساتھ خون نکلتا۔ درد سر، گلٹی کا رنگ سیاہی مائل،
نیلہ بیگنی۔ شستی، بکواس، وغیرہ علامات۔

میوور یا ملک الیڈ۔ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ بستر سے اتر پڑنا۔ یا سر ہانے
سے پائنتانے کھینا۔ کمزوری، سرد پسینہ، بہت زیادہ شستی۔ آنکھوں کا
بیٹھ جانا، بے ہوشی، چہرے پر شرمردگی کا بھجا جانا وغیرہ وغیرہ۔
اوپیم۔ ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ گلے میں بلغم کی گھڑ گھڑا ہٹ، بے ہوشی، گہرا سانس لینا،
ننید وغیرہ میں مفید و کار آمد ہے۔

تدا بیر معاون

مریض کو ہوا دار مکان میں رکھنا چاہئے۔

دودھ، ساگودانہ، باری، اراروٹ۔ نارنگی کے ساتھ نمک
گوشت یا مسور کی دال کا پانی، بیماری کے وقت (فردرت کے وقت
بچکاری کے ذریعہ سے) کھلاتا چاہئے۔

اگر گلٹی پک جائے تو پھر اس پر پٹس باندھنا چاہئے، اور ٹوٹ جانے
پر (یا چاک کر دینے پر) روغن کلینڈیو لا زخم پر لگانا چاہئے۔ سفوف
گندھک یا نیم کی پتی پس کر جلانے سے ہوا صاف ہو جاتی ہے۔

بخار۔ تب۔ جوڑی (FEVER) جسم کی حرارت بڑھ جانے سے ہوتا ہے۔
 لوگ ہمیشہ سے بخار (تب) کہتے ہیں۔ جسم کے کسی حصہ میں
 شش ہونے یا کسی قسم کا زہر خون میں بیل جانے سے بخار ہوتا ہے۔
 بخار ایک مرتبہ اتر کر پھر واپس آتا ہے۔ اُس کو نوبتی بخار
 کہتے ہیں۔ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اُس کو دائمی بخار کہتے ہیں۔ جو بخار
 ہو کر پھر بڑھ جائے؛ بالکل نہ اترے، اُس کو کھنڈے والا یا صفراوی بخار
 کہتے ہیں۔ معمولی بخار، سردی کا بخار، ملیر بخار، جو بخار اس ملک میں اتر
 ہوا کرتا ہے۔ اُن کی ماہیت، مذکورہ بالا تین قسم کے بخار میں کسی نہ کسی
 سے ملتی ہے۔ اُن کا بیان صوبہ ذیل ہے۔

سادہ بخار۔ حقیقی بخار (SIMPLE FEVER)

سردی لگنے، بارش میں بھیگنے، تیز دھوپ میں گھومنے؛ زیادہ کھانے پینے
 سے سبب یا محنت، اس کے سبب سے یہ بخار آتا ہے۔

علامہ:۔ خشک۔ سرد ہوا لگنے کی وجہ سے جو بخار آوے۔ یا ڈر کی وجہ سے
 تیز پیاس اور بے چہی سے ساتھ بخار ہو۔ نشتر کے بعد جو بخار موسم سرما میں
 اُس لگنے سے آوے تو ایکو نائٹ ۳۱۔ دو تین گھنٹہ کا وقفہ دے کر
 ایک قطرہ دینا چاہئے۔ تمام جسم میں (خاص کر کمر میں) درد ہو اور
 سانس کی ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے جو بخار آتا ہو۔ اُس میں رٹاکس
 استعمال کرنا چاہئے۔

شش میں بھیگنے کی وجہ سے جو بخار ہو؛ اُس میں ڈکھا ۶۱، تے یا مٹلی
 ۱۱۱، کھانے پینے یا نہانے سے جو بخار ہو؛ یا جس بخار
 میں پیاس بالکل نہ ہو؛ اُس میں پیاسٹیل۔ اور دوسرے بخاروں کی دوا ملاحظہ ہو۔

زکامی بخار (CATARRHAL FEVER)

(حمی۔ نزلہ۔ سردی کا بخار)

ناک سے پانی کی طرح کا بلغم نکلتا۔ جسم میں تشنج، یا کل جسم میں درد، سر میں شبکین۔ آنکھیں پانی سے بھری ہوئی، چھینک، سر بھاری، تھکے یا مہلے، قبض، جاتی آنا، آنکھ اور سینہ بھاری معلوم ہونا، آنکھیں سرخ، گلہ بھاری کھانسی، درد سینہ، وغیرہ زکام کے بخار کی علامتیں ہیں۔ سردی یا شبنم، پانی میں بھینکا، گرم شکم، یا ایک گرمی سے سردی میں جباتا۔ پسینہ یا ایک بند کرتا۔ دہی یا کھٹائی وغیرہ بلغم پیدا کرنے والی چیزوں کا زیادہ کھانا وغیرہ اس مرض کے قاص باعث ہیں۔

سردی کے شروع زمانے میں جب سردی کھوڑی محسوس ہوتی ہو، اور ناک سے پانی گرے تو ایک قطرہ عرق کا فوراً پانی کے ساتھ کھوڑے گا فوں کھانے ہی سے فائدہ ہو جاتا ہے، چھینک، حرارت زیادہ ہونا، ناک اور آنکھ سے پانی۔ بے چینی، پیاس، وغیرہ علامات میں ایکو ناکٹ ۳، ۴، ۶۔ آنکھ و ناک سے پانی جاری ہوتا۔ آواز بھاری، گلے میں ستر ستر اٹھ، بار بار زیادہ پیشاب ہونا۔ ہاتھ و پیر میں درد، گرم کرہ میں مرض کی زیادتی محسوس ہو، ایسے علامات میں ایلم سیپا ۳، ۴، ۵، قبض، تھکنے بند (قاص کرات میں) نکس و امٹکا۔ ۶۔ ۳۔ ہتلی یا تھکے۔ اپیک ۳، ۴، پانی کی طرح جلن پیدا کر دینے والی سردی۔ آر سنک ۶، آنکھیں سرخ نیند نہ آتا۔ درد سر وغیرہ علامات میں نیلا ڈوتا، ۶۔ درد سینہ اور سردی لگنے سے سر بھاری ہاتھ و پیر اور پیٹھ میں درد ہو، تو برائی او نیا، بخار دھج ہونے کے بعد نکس و امٹکا ۳، پلسا ٹیلا ۶، یا رسٹا کس ۶، علامات کے مطابق فائدہ مند ہیں۔ (نزلہ و بانی یا انفلوئنزا کا بیان ملاحظہ ہو)

علاج :- سردی سے بچنا۔ جسم ڈھانکے رہنا۔ ناک بند ہو، تو تو ناک کے اوپر، اور سینہ پر سرسوں کے روغن کی مالش۔ لاوا۔ ساگودانہ بارلی وغیرہ ہلکی غذا کھانا۔ (دوسرے قسم کے بخاروں کی دوائیں اور ان کے کے علاج معاون کا بیان ملاحظہ ہو۔)

(CONTINUED FEVER)

دائمی بخار

پہلے کچھ سردی محسوس ہوتی ہے۔ بعد لہزہ ! اور اس کے بعد بخار ہوتا ہے۔ کبھی سردی اور کبھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ جسم میں جلن ! جلد خشک ! اور کھکھری ! بے چینی ! پیاس ! زبان خشک ! نبض تیز ! اور بھاری ! جلد جلد سانس لینا۔ پیشاب سرخ ! مقدار میں ہٹوڑا۔ کمر اور ریڑھ میں درد ! کبھی قبض اور کبھی پتلے دست ! درد سر ! کھانے کی خواہش نہ ہونا۔ وغیرہ اس کے خاص علامات ہیں۔

اسباب :- تبدیلی موسم ! بہت گرمی یا بہت سردی لگنا۔ بھیگے کپڑے پہننا۔ یکایک پسینہ بند ہو جانا۔ بہت زیادہ دماغی اور جسمانی محنت۔ کھانے پینے کی زیادتی ! جسم کا میل نہ نکلنا۔ چوٹ۔ قبض۔ رات میں زیادہ جاگنا۔ وغیرہ دائمی بخار کے اسباب ہیں۔

اس بیماری میں مندرجہ ذیل ادویہ نہایت مفید ہیں۔

علاج :- ایکونائٹ ۳، x، نبض صغیر (تیلی) تیز صلب (سخت) چلتی ہو ! جسم گرم ! اور خشک ! کبھی جاڑا ! اور کبھی گرمی محسوس ہوتا۔ بار بار چھینک آنا۔ بے چینی ! تیز درد سر ! سانس تیز ! رات کو مرض کا بڑھنا ! بے چینی ! نکلنے کی رگوں کا تڑپنا ! بے چینی ! پیاس ! اور تیز بخار۔ مریض سمجھتا ہو کہ اس مرض میں وہ ضرور مر جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ علامات میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن پسینہ نکلنے پر ایکونائٹ بند کر دینا چاہئے۔ ورنہ نقصان پہونچائے گا۔

بیلادونا۔ ۳، ۴، ۵۔ پیشانی اور گلے کی نلی میں جلن۔ جاڑا عقوڑا۔ لیکن جسم میں جلن۔ زیادہ پسینہ نہ نکلنا۔ یا کپڑے سے ڈھکے حصہ میں کچھ پسینہ ہونا۔ آنکھیں سرخ۔ نیند نہ آنا۔ پیاس۔ سونہ اور مہونٹ خشک۔ یک یک گھرنا۔ اور درد سر۔ کمر اٹھنا۔ بچوں ! موٹے آدمیوں اور جنہیں خون کی زیادتی ہو۔ ایسے شخص کے لئے بیلادونا خاص طور سے نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

برایونیا ایلیبا ۳۰، ۴۰، ۵۰، سر بھاری، بٹلے کی رگیں، پیشانی،
مگردن، ہاتھ و پیر اور پشت میں درد، حرکت کرنے سے درد کی زیادتی
سانس کی تکلف، اور خشک کھانسی، معدہ میں جلن کی طرح درد،
زبان زرد دیتے میں غذا، بلغم یا صفرا گھرتا۔ چہرہ زرد، قبض اور تیز
پیس، جگر کے نزدیک درد، جسم کی حرارت کبھی کم کبھی زیادہ، قبض تیز،
کھانے کی خواہش نہ ہو۔ اور ڈکاریں آتی ہوں۔
ذائقہ کڑوا، منہ میں لسن لسا پن۔

سائنس ۲۰۰، پیٹ میں کرم۔ (کیر کے ساتھ بخار۔
جلیمیم ۱۔ بہت کمزوری۔ اس کی وجہ سے ہاتھ اور سر کانٹے ہوں۔
آواز بھاری۔ آنکھوں کا بند ہوتا۔ سر نہ اٹھ سکتا۔ نیند کی خواہش،
دھندلا دیکھنا۔ نبض ضعیف (کمزور)، اور بہت نازک یا نرم، تھوڑی پیاس،
یا پیاس ندارد (خاص کمر بچوں کے بخار میں)

ورائٹرم الیم۔ ۱۔ ۲۔ نبض بھاری، سخت، اور تیز زبان، زرد اور
درمیان میں سرخ لکیریں، لرزہ زیادہ، دوران سر، دوسرے اعضا کمر
سے اگلے حصے میں، مثلی، جسمانی کمزوری کی علامت ہیں۔
لو پلیوریم پرفا۔ ۳۔ درد سر۔ مثلی، صفرا کتے، پانی پینے کے بعد ہونے
لرزہ۔ کل جسم میں درد۔ (خاص کمر لڑکیوں میں)

فیرم فاس۔ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۴۰، ۲۵۰، ۲۶۰، ۲۷۰، ۲۸۰، ۲۹۰، ۳۰۰، ۳۱۰، ۳۲۰، ۳۳۰، ۳۴۰، ۳۵۰، ۳۶۰، ۳۷۰، ۳۸۰، ۳۹۰، ۴۰۰، ۴۱۰، ۴۲۰، ۴۳۰، ۴۴۰، ۴۵۰، ۴۶۰، ۴۷۰، ۴۸۰، ۴۹۰، ۵۰۰، ۵۱۰، ۵۲۰، ۵۳۰، ۵۴۰، ۵۵۰، ۵۶۰، ۵۷۰، ۵۸۰، ۵۹۰، ۶۰۰، ۶۱۰، ۶۲۰، ۶۳۰، ۶۴۰، ۶۵۰، ۶۶۰، ۶۷۰، ۶۸۰، ۶۹۰، ۷۰۰، ۷۱۰، ۷۲۰، ۷۳۰، ۷۴۰، ۷۵۰، ۷۶۰، ۷۷۰، ۷۸۰، ۷۹۰، ۸۰۰، ۸۱۰، ۸۲۰، ۸۳۰، ۸۴۰، ۸۵۰، ۸۶۰، ۸۷۰، ۸۸۰، ۸۹۰، ۹۰۰، ۹۱۰، ۹۲۰، ۹۳۰، ۹۴۰، ۹۵۰، ۹۶۰، ۹۷۰، ۹۸۰، ۹۹۰، ۱۰۰۰، ۱۰۱۰، ۱۰۲۰، ۱۰۳۰، ۱۰۴۰، ۱۰۵۰، ۱۰۶۰، ۱۰۷۰، ۱۰۸۰، ۱۰۹۰، ۱۱۰۰، ۱۱۱۰، ۱۱۲۰، ۱۱۳۰، ۱۱۴۰، ۱۱۵۰، ۱۱۶۰، ۱۱۷۰، ۱۱۸۰، ۱۱۹۰، ۱۲۰۰، ۱۲۱۰، ۱۲۲۰، ۱۲۳۰، ۱۲۴۰، ۱۲۵۰، ۱۲۶۰، ۱۲۷۰، ۱۲۸۰، ۱۲۹۰، ۱۳۰۰، ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۰، ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، ۱۴۰۰، ۱۴۱۰، ۱۴۲۰، ۱۴۳۰، ۱۴۴۰، ۱۴۵۰، ۱۴۶۰، ۱۴۷۰، ۱۴۸۰، ۱۴۹۰، ۱۵۰۰، ۱۵۱۰، ۱۵۲۰، ۱۵۳۰، ۱۵۴۰، ۱۵۵۰، ۱۵۶۰، ۱۵۷۰، ۱۵۸۰، ۱۵۹۰، ۱۶۰۰، ۱۶۱۰، ۱۶۲۰، ۱۶۳۰، ۱۶۴۰، ۱۶۵۰، ۱۶۶۰، ۱۶۷۰، ۱۶۸۰، ۱۶۹۰، ۱۷۰۰، ۱۷۱۰، ۱۷۲۰، ۱۷۳۰، ۱۷۴۰، ۱۷۵۰، ۱۷۶۰، ۱۷۷۰، ۱۷۸۰، ۱۷۹۰، ۱۸۰۰، ۱۸۱۰، ۱۸۲۰، ۱۸۳۰، ۱۸۴۰، ۱۸۵۰، ۱۸۶۰، ۱۸۷۰، ۱۸۸۰، ۱۸۹۰، ۱۹۰۰، ۱۹۱۰، ۱۹۲۰، ۱۹۳۰، ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰، ۲۰۲۰، ۲۰۳۰، ۲۰۴۰، ۲۰۵۰، ۲۰۶۰، ۲۰۷۰، ۲۰۸۰، ۲۰۹۰، ۲۱۰۰، ۲۱۱۰، ۲۱۲۰، ۲۱۳۰، ۲۱۴۰، ۲۱۵۰، ۲۱۶۰، ۲۱۷۰، ۲۱۸۰، ۲۱۹۰، ۲۲۰۰، ۲۲۱۰، ۲۲۲۰، ۲۲۳۰، ۲۲۴۰، ۲۲۵۰، ۲۲۶۰، ۲۲۷۰، ۲۲۸۰، ۲۲۹۰، ۲۳۰۰، ۲۳۱۰، ۲۳۲۰، ۲۳۳۰، ۲۳۴۰، ۲۳۵۰، ۲۳۶۰، ۲۳۷۰، ۲۳۸۰، ۲۳۹۰، ۲۴۰۰، ۲۴۱۰، ۲۴۲۰، ۲۴۳۰، ۲۴۴۰، ۲۴۵۰، ۲۴۶۰، ۲۴۷۰، ۲۴۸۰، ۲۴۹۰، ۲۵۰۰، ۲۵۱۰، ۲۵۲۰، ۲۵۳۰، ۲۵۴۰، ۲۵۵۰، ۲۵۶۰، ۲۵۷۰، ۲۵۸۰، ۲۵۹۰، ۲۶۰۰، ۲۶۱۰، ۲۶۲۰، ۲۶۳۰، ۲۶۴۰، ۲۶۵۰، ۲۶۶۰، ۲۶۷۰، ۲۶۸۰، ۲۶۹۰، ۲۷۰۰، ۲۷۱۰، ۲۷۲۰، ۲۷۳۰، ۲۷۴۰، ۲۷۵۰، ۲۷۶۰، ۲۷۷۰، ۲۷۸۰، ۲۷۹۰، ۲۸۰۰، ۲۸۱۰، ۲۸۲۰، ۲۸۳۰، ۲۸۴۰، ۲۸۵۰، ۲۸۶۰، ۲۸۷۰، ۲۸۸۰، ۲۸۹۰، ۲۹۰۰، ۲۹۱۰، ۲۹۲۰، ۲۹۳۰، ۲۹۴۰، ۲۹۵۰، ۲۹۶۰، ۲۹۷۰، ۲۹۸۰، ۲۹۹۰، ۳۰۰۰، ۳۰۱۰، ۳۰۲۰، ۳۰۳۰، ۳۰۴۰، ۳۰۵۰، ۳۰۶۰، ۳۰۷۰، ۳۰۸۰، ۳۰۹۰، ۳۱۰۰، ۳۱۱۰، ۳۱۲۰، ۳۱۳۰، ۳۱۴۰، ۳۱۵۰، ۳۱۶۰، ۳۱۷۰، ۳۱۸۰، ۳۱۹۰، ۳۲۰۰، ۳۲۱۰، ۳۲۲۰، ۳۲۳۰، ۳۲۴۰، ۳۲۵۰، ۳۲۶۰، ۳۲۷۰، ۳۲۸۰، ۳۲۹۰، ۳۳۰۰، ۳۳۱۰، ۳۳۲۰، ۳۳۳۰، ۳۳۴۰، ۳۳۵۰، ۳۳۶۰، ۳۳۷۰، ۳۳۸۰، ۳۳۹۰، ۳۴۰۰، ۳۴۱۰، ۳۴۲۰، ۳۴۳۰، ۳۴۴۰، ۳۴۵۰، ۳۴۶۰، ۳۴۷۰، ۳۴۸۰، ۳۴۹۰، ۳۵۰۰، ۳۵۱۰، ۳۵۲۰، ۳۵۳۰، ۳۵۴۰، ۳۵۵۰، ۳۵۶۰، ۳۵۷۰، ۳۵۸۰، ۳۵۹۰، ۳۶۰۰، ۳۶۱۰، ۳۶۲۰، ۳۶۳۰، ۳۶۴۰، ۳۶۵۰، ۳۶۶۰، ۳۶۷۰، ۳۶۸۰، ۳۶۹۰، ۳۷۰۰، ۳۷۱۰، ۳۷۲۰، ۳۷۳۰، ۳۷۴۰، ۳۷۵۰، ۳۷۶۰، ۳۷۷۰، ۳۷۸۰، ۳۷۹۰، ۳۸۰۰، ۳۸۱۰، ۳۸۲۰، ۳۸۳۰، ۳۸۴۰، ۳۸۵۰، ۳۸۶۰، ۳۸۷۰، ۳۸۸۰، ۳۸۹۰، ۳۹۰۰، ۳۹۱۰، ۳۹۲۰، ۳۹۳۰، ۳۹۴۰، ۳۹۵۰، ۳۹۶۰، ۳۹۷۰، ۳۹۸۰، ۳۹۹۰، ۴۰۰۰، ۴۰۱۰، ۴۰۲۰، ۴۰۳۰، ۴۰۴۰، ۴۰۵۰، ۴۰۶۰، ۴۰۷۰، ۴۰۸۰، ۴۰۹۰، ۴۱۰۰، ۴۱۱۰، ۴۱۲۰، ۴۱۳۰، ۴۱۴۰، ۴۱۵۰، ۴۱۶۰، ۴۱۷۰، ۴۱۸۰، ۴۱۹۰، ۴۲۰۰، ۴۲۱۰، ۴۲۲۰، ۴۲۳۰، ۴۲۴۰، ۴۲۵۰، ۴۲۶۰، ۴۲۷۰، ۴۲۸۰، ۴۲۹۰، ۴۳۰۰، ۴۳۱۰، ۴۳۲۰، ۴۳۳۰، ۴۳۴۰، ۴۳۵۰، ۴۳۶۰، ۴۳۷۰، ۴۳۸۰، ۴۳۹۰، ۴۴۰۰، ۴۴۱۰، ۴۴۲۰، ۴۴۳۰، ۴۴۴۰، ۴۴۵۰، ۴۴۶۰، ۴۴۷۰، ۴۴۸۰، ۴۴۹۰، ۴۵۰۰، ۴۵۱۰، ۴۵۲۰، ۴۵۳۰، ۴۵۴۰، ۴۵۵۰، ۴۵۶۰، ۴۵۷۰، ۴۵۸۰، ۴۵۹۰، ۴۶۰۰، ۴۶۱۰، ۴۶۲۰، ۴۶۳۰، ۴۶۴۰، ۴۶۵۰، ۴۶۶۰، ۴۶۷۰، ۴۶۸۰، ۴۶۹۰، ۴۷۰۰، ۴۷۱۰، ۴۷۲۰، ۴۷۳۰، ۴۷۴۰، ۴۷۵۰، ۴۷۶۰، ۴۷۷۰، ۴۷۸۰، ۴۷۹۰، ۴۸۰۰، ۴۸۱۰، ۴۸۲۰، ۴۸۳۰، ۴۸۴۰، ۴۸۵۰، ۴۸۶۰، ۴۸۷۰، ۴۸۸۰، ۴۸۹۰، ۴۹۰۰، ۴۹۱۰، ۴۹۲۰، ۴۹۳۰، ۴۹۴۰، ۴۹۵۰، ۴۹۶۰، ۴۹۷۰، ۴۹۸۰، ۴۹۹۰، ۵۰۰۰، ۵۰۱۰، ۵۰۲۰، ۵۰۳۰، ۵۰۴۰، ۵۰۵۰، ۵۰۶۰، ۵۰۷۰، ۵۰۸۰، ۵۰۹۰، ۵۱۰۰، ۵۱۱۰، ۵۱۲۰، ۵۱۳۰، ۵۱۴۰، ۵۱۵۰، ۵۱۶۰، ۵۱۷۰، ۵۱۸۰، ۵۱۹۰، ۵۲۰۰، ۵۲۱۰، ۵۲۲۰، ۵۲۳۰، ۵۲۴۰، ۵۲۵۰، ۵۲۶۰، ۵۲۷۰، ۵۲۸۰، ۵۲۹۰، ۵۳۰۰، ۵۳۱۰، ۵۳۲۰، ۵۳۳۰، ۵۳۴۰، ۵۳۵۰، ۵۳۶۰، ۵۳۷۰، ۵۳۸۰، ۵۳۹۰، ۵۴۰۰، ۵۴۱۰، ۵۴۲۰، ۵۴۳۰، ۵۴۴۰، ۵۴۵۰، ۵۴۶۰، ۵۴۷۰، ۵۴۸۰، ۵۴۹۰، ۵۵۰۰، ۵۵۱۰، ۵۵۲۰، ۵۵۳۰، ۵۵۴۰، ۵۵۵۰، ۵۵۶۰، ۵۵۷۰، ۵۵۸۰، ۵۵۹۰، ۵۶۰۰، ۵۶۱۰، ۵۶۲۰، ۵۶۳۰، ۵۶۴۰، ۵۶۵۰، ۵۶۶۰، ۵۶۷۰، ۵۶۸۰، ۵۶۹۰، ۵۷۰۰، ۵۷۱۰، ۵۷۲۰، ۵۷۳۰، ۵۷۴۰، ۵۷۵۰، ۵۷۶۰، ۵۷۷۰، ۵۷۸۰، ۵۷۹۰، ۵۸۰۰، ۵۸۱۰، ۵۸۲۰، ۵۸۳۰، ۵۸۴۰، ۵۸۵۰، ۵۸۶۰، ۵۸۷۰، ۵۸۸۰، ۵۸۹۰، ۵۹۰۰، ۵۹۱۰، ۵۹۲۰، ۵۹۳۰، ۵۹۴۰، ۵۹۵۰، ۵۹۶۰، ۵۹۷۰، ۵۹۸۰، ۵۹۹۰، ۶۰۰۰، ۶۰۱۰، ۶۰۲۰، ۶۰۳۰، ۶۰۴۰، ۶۰۵۰، ۶۰۶۰، ۶۰۷۰، ۶۰۸۰، ۶۰۹۰، ۶۱۰۰، ۶۱۱۰، ۶۱۲۰، ۶۱۳۰، ۶۱۴۰، ۶۱۵۰، ۶۱۶۰، ۶۱۷۰، ۶۱۸۰، ۶۱۹۰، ۶۲۰۰، ۶۲۱۰، ۶۲۲۰، ۶۲۳۰، ۶۲۴۰، ۶۲۵۰، ۶۲۶۰، ۶۲۷۰، ۶۲۸۰، ۶۲۹۰، ۶۳۰۰، ۶۳۱۰، ۶۳۲۰، ۶۳۳۰، ۶۳۴۰، ۶۳۵۰، ۶۳۶۰، ۶۳۷۰، ۶۳۸۰، ۶۳۹۰، ۶۴۰۰، ۶۴۱۰، ۶۴۲۰، ۶۴۳۰، ۶۴۴۰، ۶۴۵۰، ۶۴۶۰، ۶۴۷۰، ۶۴۸۰، ۶۴۹۰، ۶۵۰۰، ۶۵۱۰، ۶۵۲۰، ۶۵۳۰، ۶۵۴۰، ۶۵۵۰، ۶۵۶۰، ۶۵۷۰، ۶۵۸۰، ۶۵۹۰، ۶۶۰۰، ۶۶۱۰، ۶۶۲۰، ۶۶۳۰، ۶۶۴۰، ۶۶۵۰، ۶۶۶۰، ۶۶۷۰، ۶۶۸۰، ۶۶۹۰، ۶۷۰۰، ۶۷۱۰، ۶۷۲۰، ۶۷۳۰، ۶۷۴۰، ۶۷۵۰، ۶۷۶۰، ۶۷۷۰، ۶۷۸۰، ۶۷۹۰، ۶۸۰۰، ۶۸۱۰، ۶۸۲۰، ۶۸۳۰، ۶۸۴۰، ۶۸۵۰، ۶۸۶۰، ۶۸۷۰، ۶۸۸۰، ۶۸۹۰، ۶۹۰۰، ۶۹۱۰، ۶۹۲۰، ۶۹۳۰، ۶۹۴۰، ۶۹۵۰، ۶۹۶۰، ۶۹۷۰، ۶۹۸۰، ۶۹۹۰، ۷۰۰۰، ۷۰۱۰، ۷۰۲۰، ۷۰۳۰، ۷۰۴۰، ۷۰۵۰، ۷۰۶۰، ۷۰۷۰، ۷۰۸۰، ۷۰۹۰، ۷۱۰۰، ۷۱۱۰، ۷۱۲۰، ۷۱۳۰، ۷۱۴۰، ۷۱۵۰، ۷۱۶۰، ۷۱۷۰، ۷۱۸۰، ۷۱۹۰، ۷۲۰۰، ۷۲۱۰، ۷۲۲۰، ۷۲۳۰، ۷۲۴۰، ۷۲۵۰، ۷۲۶۰، ۷۲۷۰، ۷۲۸۰، ۷۲۹۰، ۷۳۰۰، ۷۳۱۰، ۷۳۲۰، ۷۳۳۰، ۷۳۴۰، ۷۳۵۰، ۷۳۶۰، ۷۳۷۰، ۷۳۸۰، ۷۳۹۰، ۷۴۰۰، ۷۴۱۰، ۷۴۲۰، ۷۴۳۰، ۷۴۴۰، ۷۴۵۰، ۷۴۶۰، ۷۴۷۰، ۷۴۸۰، ۷۴۹۰، ۷۵۰۰، ۷۵۱۰، ۷۵۲۰، ۷۵۳۰، ۷۵۴۰، ۷۵۵۰، ۷۵۶۰، ۷۵۷۰، ۷۵۸۰، ۷۵۹۰، ۷۶۰۰، ۷۶۱۰، ۷۶۲۰، ۷۶۳۰، ۷۶۴۰، ۷۶۵۰، ۷۶۶۰، ۷۶۷۰، ۷۶۸۰، ۷۶۹۰، ۷۷۰۰، ۷۷۱۰، ۷۷۲۰، ۷۷۳۰، ۷۷۴۰، ۷۷۵۰، ۷۷۶۰، ۷۷۷۰، ۷۷۸۰، ۷۷۹۰، ۷۸۰۰، ۷۸۱۰، ۷۸۲۰، ۷۸۳۰، ۷۸۴۰، ۷۸۵۰، ۷۸۶۰، ۷۸۷۰، ۷۸۸۰، ۷۸۹۰، ۷۹۰۰، ۷۹۱۰، ۷۹۲۰، ۷۹۳۰، ۷۹۴۰، ۷۹۵۰، ۷۹۶۰، ۷۹۷۰، ۷۹۸۰، ۷۹۹۰، ۸۰۰۰، ۸۰۱۰، ۸۰۲۰، ۸۰۳۰، ۸۰۴۰، ۸۰۵۰، ۸۰۶۰، ۸۰۷۰، ۸۰۸۰، ۸۰۹۰، ۸۱۰۰، ۸۱۱۰، ۸۱۲۰، ۸۱۳۰، ۸۱۴۰، ۸۱۵۰، ۸۱۶۰، ۸۱۷۰، ۸۱۸۰، ۸۱۹۰، ۸۲۰۰، ۸۲۱۰، ۸۲۲۰، ۸۲۳۰، ۸۲۴۰، ۸۲۵۰، ۸۲۶۰، ۸۲۷۰، ۸۲۸۰، ۸۲۹۰، ۸۳۰۰، ۸۳۱۰، ۸۳۲۰، ۸۳۳۰، ۸۳۴۰، ۸۳۵۰، ۸۳۶۰، ۸۳۷۰، ۸۳۸۰، ۸۳۹۰، ۸۴۰۰، ۸۴۱۰، ۸۴۲۰، ۸۴۳۰، ۸۴۴۰، ۸۴۵۰، ۸۴۶۰، ۸۴۷۰، ۸۴۸۰، ۸۴۹۰، ۸۵۰۰، ۸۵۱۰، ۸۵۲۰، ۸۵۳۰، ۸۵۴۰، ۸۵۵۰، ۸۵۶۰، ۸۵۷۰، ۸۵۸۰، ۸۵۹۰، ۸۶۰۰، ۸۶۱۰، ۸۶۲۰، ۸۶۳۰، ۸۶۴۰، ۸۶۵۰، ۸۶۶۰، ۸۶۷۰، ۸۶۸۰، ۸۶۹۰، ۸۷۰۰، ۸۷۱۰، ۸۷۲۰، ۸۷۳۰، ۸۷۴۰، ۸۷۵۰، ۸۷۶۰، ۸۷۷۰، ۸۷۸۰، ۸۷۹۰، ۸۸۰۰، ۸۸۱۰، ۸۸۲۰، ۸۸۳۰، ۸۸۴۰، ۸۸۵۰، ۸۸۶۰، ۸۸۷۰، ۸۸۸۰، ۸۸۹۰، ۸۹۰۰، ۸۹۱۰، ۸۹۲۰، ۸۹۳۰، ۸۹۴۰، ۸۹۵۰، ۸۹۶۰، ۸۹۷۰، ۸۹۸۰، ۸۹۹۰، ۹۰۰۰، ۹۰۱۰، ۹۰۲۰، ۹۰۳۰، ۹۰۴۰، ۹۰۵۰، ۹۰۶۰، ۹۰۷۰، ۹۰۸۰، ۹۰۹۰، ۹۱۰۰، ۹۱۱۰، ۹۱۲۰، ۹۱۳۰، ۹۱۴۰، ۹۱۵۰، ۹۱۶۰، ۹۱۷۰، ۹۱۸۰، ۹۱۹۰، ۹۲۰۰، ۹۲۱۰، ۹۲۲۰، ۹۲۳۰، ۹۲۴۰، ۹۲۵۰، ۹۲۶۰، ۹۲۷۰، ۹۲۸۰، ۹۲۹۰، ۹۳۰۰، ۹۳۱۰، ۹۳۲۰، ۹۳۳۰، ۹۳۴۰، ۹۳۵۰، ۹۳۶۰، ۹۳۷۰، ۹۳۸۰، ۹۳۹۰، ۹۴۰۰، ۹۴۱۰، ۹۴۲۰، ۹۴۳۰، ۹۴۴۰، ۹۴۵۰، ۹۴۶۰، ۹۴۷۰، ۹۴۸۰، ۹۴۹۰، ۹۵۰۰، ۹۵۱۰، ۹۵۲۰، ۹۵۳۰، ۹۵۴۰، ۹۵۵۰، ۹۵۶۰، ۹۵۷۰، ۹۵۸۰، ۹۵۹۰، ۹۶۰۰، ۹۶۱۰، ۹۶۲۰، ۹۶۳۰، ۹۶۴۰، ۹۶۵۰، ۹۶۶۰، ۹۶۷۰، ۹۶۸۰، ۹۶۹۰، ۹۷۰۰، ۹۷۱۰، ۹۷۲۰، ۹۷۳۰، ۹۷۴۰، ۹۷۵۰، ۹۷۶۰، ۹۷۷۰، ۹۷۸۰، ۹۷۹۰، ۹۸۰۰، ۹۸۱۰، ۹۸۲۰، ۹۸۳۰، ۹۸۴۰، ۹۸۵۰، ۹۸۶۰، ۹۸۷۰، ۹۸۸۰، ۹۸۹۰، ۹۹۰۰، ۹۹۱۰، ۹۹۲۰، ۹۹۳۰، ۹۹۴۰، ۹۹۵۰، ۹۹۶۰، ۹۹۷۰، ۹۹۸۰، ۹۹۹۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۳، ۱۰۰۰۴، ۱۰۰۰۵، ۱۰۰۰۶، ۱۰۰۰۷، ۱۰۰۰۸، ۱۰۰۰۹، ۱۰۰۱۰، ۱۰۰۱۱، ۱۰۰۱۲، ۱۰۰۱۳، ۱۰۰۱۴، ۱۰۰۱۵، ۱۰۰۱۶، ۱۰۰۱۷، ۱۰۰۱۸، ۱۰۰۱۹، ۱۰۰۲۰، ۱۰۰۲۱، ۱۰۰۲۲، ۱۰۰۲۳، ۱۰۰۲۴، ۱۰۰۲۵، ۱۰۰۲۶، ۱۰۰۲۷، ۱۰۰۲۸، ۱۰۰۲۹، ۱۰۰۳۰، ۱۰۰۳۱، ۱۰۰۳۲، ۱۰۰۳۳، ۱۰۰۳۴، ۱۰۰۳۵، ۱۰۰۳۶، ۱۰۰۳۷، ۱۰۰۳۸، ۱۰۰۳۹، ۱۰۰۴۰، ۱۰۰۴۱، ۱۰۰۴۲، ۱۰۰۴۳، ۱۰۰۴۴، ۱۰۰۴۵، ۱۰۰۴۶، ۱۰۰۴۷، ۱۰۰۴۸، ۱۰۰۴۹، ۱۰۰۵۰، ۱۰۰۵۱، ۱۰۰۵۲، ۱۰۰۵۳، ۱۰۰۵۴، ۱۰۰۵۵، ۱۰۰۵۶، ۱۰۰۵۷، ۱۰۰۵۸، ۱۰۰۵۹، ۱۰۰۶۰، ۱۰۰۶۱، ۱۰۰۶۲، ۱۰۰۶۳، ۱۰۰۶۴، ۱۰۰۶۵، ۱۰۰۶۶، ۱۰۰۶۷، ۱۰۰۶۸، ۱۰۰۶۹، ۱۰۰۷۰، ۱۰۰۷۱، ۱۰۰۷۲، ۱۰۰۷۳، ۱۰۰۷۴، ۱۰۰۷۵، ۱۰۰۷۶، ۱۰۰۷۷، ۱۰۰۷۸، ۱۰۰۷۹، ۱۰۰۸۰، ۱۰۰۸۱، ۱۰۰۸۲، ۱۰۰۸۳، ۱۰۰۸۴، ۱۰۰۸۵، ۱۰۰۸۶، ۱۰۰۸۷، ۱۰۰۸۸، ۱۰۰۸۹، ۱۰۰۹۰، ۱۰۰۹۱، ۱۰۰۹۲، ۱۰۰۹۳، ۱۰۰۹۴، ۱۰۰۹۵، ۱۰۰۹۶، ۱۰۰۹۷، ۱۰۰۹۸، ۱۰۰۹۹، ۱۰۱۰۰، ۱۰۱۰۱، ۱۰۱۰۲، ۱۰۱۰۳، ۱۰۱۰۴، ۱۰۱۰۵، ۱۰۱۰۶، ۱۰۱۰۷، ۱۰۱۰۸، ۱۰۱۰۹، ۱۰۱۱۰، ۱۰۱۱۱، ۱۰۱۱۲، ۱۰۱۱۳، ۱۰۱۱۴، ۱۰۱۱۵، ۱۰۱۱۶، ۱۰۱۱۷، ۱۰۱۱۸، ۱۰۱۱۹، ۱۰۱۲۰، ۱۰۱۲۱، ۱۰۱۲۲، ۱۰۱۲۳، ۱۰۱۲۴، ۱۰۱۲۵، ۱۰۱۲۶، ۱۰۱۲۷، ۱۰۱۲۸، ۱۰۱۲۹، ۱۰۱۳۰، ۱۰۱۳۱، ۱۰۱۳۲، ۱۰۱۳۳، ۱۰۱۳۴، ۱۰۱۳۵، ۱۰۱۳۶، ۱۰۱۳۷، ۱۰۱۳۸، ۱۰۱۳۹، ۱۰۱۴۰، ۱۰۱۴۱، ۱۰۱۴۲، ۱۰۱۴۳، ۱۰۱۴۴، ۱۰۱۴۵، ۱۰۱۴۶، ۱۰۱۴۷، ۱۰۱۴۸، ۱۰۱۴۹، ۱۰۱۵۰، ۱۰۱۵۱، ۱۰۱۵۲، ۱۰۱۵۳، ۱۰۱۵۴، ۱۰۱۵۵، ۱۰۱۵۶، ۱۰۱۵۷، ۱۰۱۵۸، ۱۰۱۵۹، ۱۰۱۶۰، ۱۰۱۶۱، ۱۰۱۶۲،

مضبب ضرورت فاقہ کرانا چاہیے۔ چنانچہ ان پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔

(MALTA FEVER)

مالٹا بخار

ہندوستان، جزیرہ قلیان، بحیرہ روم کے کنارے کی آبادی میں یہ مرض دیکھا جاتا ہے۔ جزیرہ مالٹا میں یہ بخار اس کثرت سے ہوتا ہے۔ کہ اس بخار کا نام مالٹا فیور ہو گیا ہے۔ یہ ایک قسم کا جرم ہے (جو خاصہ بکری کے دودھ کے ساتھ) جسم میں داخل ہو کر یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات:۔ ایک ہفتہ تک یہ مرض اندر ہی پوشیدہ رہنے کے بعد یکایک طبع یا بخار پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بخار دو تین ہفتہ تک رہتا ہے۔ اس کے بعد دو چار روز بخار چھوٹ جاتا ہے۔ اور پھر بخار چڑھ آتا ہے۔ اور مریض پانچ سات ماہ تک اس میں مبتلا رہتا ہے۔ اس بخار کے ساتھ سخت قبض، آہستہ آہستہ خون کی کمی، رستی، ٹلی کا بڑھ جانا۔ تمام رگوں، اور جوڑوں میں درد ہوتا۔ جوڑوں کا اس (وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں) کبھی کبھی کئی سال تک اس مرض میں مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ اور سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

علاج

مرض کی ابتدائی حالت میں برائیو نیا سو۔ ۳۰، ۳۰، جب خاصہ میلان بخار کا ہو۔ یا قبض ہو۔ پیشیا سو۔ ۳۰، ۳۰ اور آکس سو۔ ۳۰، ۳۰ مفید ہیں۔ اس کے بعد آکس آیوڈائیڈ سو۔ ۳۰، سفوف، مارک، نیٹرم میور، سو، سیوناٹس سو، ۳۰، فرم پاس سو، ۳۰، لائیگو پوڈیم سو، ۳۰، سپیا سو، ۳۰، سمی سی فیوگا سو، ۳۰، رٹاکس سو، ۳۰، وغیرہ دوائیں علامات کے مطابق دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مریض کو علیحدہ رکھنا۔ اس کے پانچا تر و پیشاب کو ہوشیاری سے بھینکنا، ہلکی غذا دینا اور گرم پانی سے نہانا مناسب ہے۔ اگر بخار ۱۰۵ ڈگری سے زیادہ ہو جائے تو ٹھنڈے پانی اسپنج سے جسم پر پونچھ سکتے ہیں۔ کونائن، یا الکوہل کے استعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

بکری کا دودھ نہ پینا، اس کے روکنے کی ترکیب اچھی ہے۔ (خاص کر مریضان جزیرہ مالٹا کے لئے)۔

ملیریا بخار

(MALARIA FEVERS)

ملیریا بخار چھوت دار نہیں ہے۔ بلکہ خون میں ایک قسم کا جرم ہیونینا اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ یہ بخار کبھی چھوٹ جاتا ہے کبھی نہیں چھوٹتا۔ تلی اور جگر وغیرہ کا بڑھنا اور خون کی کمی، اس مرض کے نتائج یا ثمرہ ہیں خاص کر موسم سرما میں، بنگال میں ملیریا بخار کثرت سے ہوتا ہے۔

ایک قسم کا جرم (HEINATOZA OF LAYRON) اس مرض کا خاص سبب ہے۔ اسباب سابقہ، میلی یا مرطوب جگہ، ترائی میں رہنا یا ایسی جگہ میں رہنا۔ جہاں پانی کی نکاسی اچھی طرح نہیں ہوتی۔ ایسی جگہ میں جہاں ملیریا بہت ہو۔ بلا مسبری کے سونا۔ موسم برسات یا سرما میں۔ ملیریا بخار خاص کر پانچ قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) تبِ نوبتی (۲) تبِ لازمی (۳) پوشیدہ یا شکل بدلا ہوا بخار
ملیریا یا سود مزاج (۵) مہلک ملیریا۔

۱۔ ملیریا تبِ نوبتی

(INTERMITTET MALARIOUS FEVER)

ملیریا رفع ہو کر پھر لوٹ آنا۔ اس کو تبِ نوبتی کہتے ہیں۔ یہ بخار بنگال میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس بخار میں آہستہ آہستہ تلی، جگر وغیرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماڈر بخار، ہلکا بخار، بتقاعدہ بخار۔ دن میں دوبارہ آتیو لا بخار، اس شکلی، امراض وغیرہ بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے مذکورہ بالا بخاروں کا علاج ایک ساتھ لکھا جاتا ہے۔

ہر روز (یعنی ۲۴ گھنٹہ کے لئے) صرف ایک بار جو بخار آ کر رفع ہو جاتا ہے۔ اس کو روزانہ کا بخار کہتے ہیں۔

باری کا بخار :- ایک دن ناغہ دے کر جو بخار ہو اس کو باری کا بخار یا
 انترا (TERTIAN) کہتے ہیں۔ دو دن دے کر آئے، دوجرا، تین روز ناغہ
 دے کر آئے اسکو بخاری یا تین جرا، اور چار روز ناغہ دیکر آئے، اُس کو چوتھا
 (QUARTAN) بخار کہتے ہیں؛ دن رات یعنی (۲۴ گھنٹہ میں) جو
 بخار دو مرتبہ آوے اُس کو دو وقت بخار کہتے ہیں۔ یہ دو مرتبہ آئیوالا بخار
 بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس کا علاج بہت غور و غوض سے کرنا پڑتا ہے
 صفرا کی وجہ سے پیدا ہوا بخار، ایک دن زیادہ اور ایک دن کم ہوتا ہے۔ کوئی کوئی بخار
 روز ایک ہی وقت پر آتا ہے، اور کوئی بخار ایسا ہوتا ہے جس کا وقت مقرر
 نہیں ہے، اور کوئی بخار ایسا ہوتا ہے کہ آج ایک وقت آیا تو کل اُس سے دو
 ایک گھنٹہ پہلے بھی آسکتا ہے۔ ایسا بخار بڑے خوف کا سبب ہے۔ لیکن یہ بخار
 اگر دو ایک گھنٹہ بعد بھی آوے تو اچھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ صبح بخار کی زیادتی
 بد علامت ہے، حنا صکر کو نین کے استعمال سے تلی اور جگر بڑھ جاتا ہے
 اور آماس، اور شکمی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

اوپر بتایا جا چکا ہے کہ تپ تو بتی کا دوسرا نام بیقاعدہ بخار ہے یہ بخار
 ہے۔ یہ بخار ایک دفعہ رفع ہونے کے بعد پھر آسکتا ہے۔ اسکا سکنا نام بیقاعدہ
 یعنی ٹھہرنے والا (INTER MITTENT) بخار ہوا اور اسی وجہ سے دو جاری

۱۔ باری کا بخار، دوجرا، بخاری، ان تین بخاروں کے پیدا ہونے کا
 سبب تین قسم کے خاص دوسرے کے جسم میں قوی خورہین سے دیکھنے والے جراثیم
 یہ باریک سے باریک جراثیم خون کے ذرات میں رہتے ہیں جو ان مریضان میریا کے
 خون میں یہ جراثیم بڑھتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ خون میں بڑھنے پر یہ جراثیم خون
 کی دھار میں دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی جسم کے ماہر (یعنی انوفیلز) مجھڑ کے جسم میں
 یہی جراثیم بڑھ کر آتے ہیں۔ ان کا خون پی کر ان مجھڑوں کو بھی میریا ہو جاتا
 ہے؛ اس کے بعد یہی مجھڑ جن میں میریا زیادہ پھیل گیا ہے۔ انسان کے
 جسم میں میریا کا زہر پھیلا دیتے ہیں۔

تجاری اور دو وقتا دوبار آنیوالے بخار کا نام معمولی نام بے قاعدہ بخار ہے۔

اسباب :- ہیفیہ پلگ، چیچک، وغیرہ مرضوں کے پیدائش کا سبب جس طرح مرض کے جراثیم (BACILLUS) ہیں، اُسی طرح مرض ملیریا میں بھی ویسا ہی ایک طرح کا جرم ہے۔ مقصد (ج) حصہ (۲) (ملاحظہ ہو)۔ ملیریا کے جراثیم بہت باریک ہیں، خوردبین کی مدد کے بغیر یہ دیکھ نہیں پڑتے۔ صرف اینوفلس (ANOPHELES) نام کے ایک قسم کا چھتر اور انسان کے جسم کے علاوہ یہ خوربین کی مدد سے دکھائی دینے والا جرم اور کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ چھتر یا انسان کے جسم میں چھوٹے سے جسم والا جرم داخل ہونے کے سبب کچھ ہی دیر میں اپنا نسل بڑھا کر بہت جلد مکمل جسم میں داخل ہو کر خراب کر ڈالتا ہے اسی حالت میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسکو ملیریا ہو گیا ہے چوں کہ جس طرح پلگ لے آتا ہے اُسی طرح چھتر ملیریا لے آتا ہے اندے اور بچے کی حالت میں یہ چھتر جماعت کے ساتھ ایسی جگہوں کی مہری پڑنے، چہرہ بچہ وغیرہ کے پانی میں جہاں ملیریا ہوتا ہے رہتے ہیں، بچپن میں یہ کالے کپڑے کی شکل میں رہتے ہیں۔ دیکھنے میں الپین کی طرح ہوتے ہیں۔ بعد جب بڑے ہوتے ہیں، تب باہر نکل آتے ہیں۔ یہ چھتر ملیریا کے جراثیم سے بڑ جب کسی تندرست آدمی کو کاٹتے ہیں تو اُس کے منہ سے نکل کر ملیریا کے جراثیم اس آدمی کے خون کے سرخ ذرات میں حل جاتے ہیں۔ اور بات کی بات میں اس کے کل خون کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دس پندرہ دن میں اسکو ملیریا بخار آنے لگتا ہے۔ اس طرح ملیریا کا زہر ایک انسان کے جسم سے دوسرے جسم میں چھتروں کے ذریعہ سے پہونچایا جاتا ہے۔

۱۔ اس تب نوبتی کو روزانہ (QUATIDIAN) تجاری۔ چوتھیا۔

۲۔ ہفتہ وار (DOUBLE QUATIDIAN) اور

(HOT STAGE AT TIMES LASTING FROM SEVEN TO TWELVE DAYS)

بھی کہتے ہیں۔

۳۔ ملیریا ٹی زبان کا لفظ ہے۔ جسکے معنی ہیں خراب ہوا (بقیہ صفحہ ۱۸۸ پر دیکھئے)

تین درجے :- اس بخار کے معمولاً تین درجے ہوتے ہیں :- لرزہ، بخار، پسینہ درجہ لرزہ میں جاڑا لگتا ہے ۔ بعد کو کپکپی ہوتی ہے ۔ (انتہا مانا لگ کر بخار چڑھتا ہے کہ تین چار رضامیاں بھی جاڑا روکنے کے لئے کافی نہیں ہوتیں ؛ جسم میں درد ؛ سر میں دھمک ؛ پیاس ؛ کبھی کبھی آہستہ کھانسی وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں ۔ درجہ بخار میں اکثر درد سر ۔ چہرہ سرخ ، جلد خشک ، پیاس ، سانس میں تکلیف ۔ جسم کی حرارت ۱۰۱ سے ۱۰۴ ڈگری تک بڑھ جاتی ہے ۔ جسم میں تپ آسنے پر ، جاڑا کم ہونے لگتا ہے کئی گھنٹہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۷) اس کے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ لیریا کا ذہر ہوا پانی میں ہوتا ہے ۔ نہیں یہ خیال غلط ہے ۔ آج کل کے ماہرین علم جراثیم کے لیریا سے پُر جگہوں کی مٹی ۔ ہوا ۔ اور پانی وغیرہ کی مختلف قسم یقوں سے جانچ کر مسمیٰ کیا ہے کہ انفرس محقر اور انسان کے جسم کے علاوہ اور کہیں لیریا کے کپڑے نہیں ملتے ۔ اس لئے ان کا دعویٰ ہے کہ اگر محقروں کی ہستی مصادی جائے تو لیریا سے انسان بچ سکتا ہے ۔ ان کے ارشاد کا خلاصہ درج ذیل ہے ۔

(۱) رہنے کی جگہ کے پاس جو چھوٹے تالاب یا چھبچھ وغیرہ ہوں وہاں تک کہ مکان میں پھول کے گئے وغیرہ (ہوں) اور اُن میں پانی بھرا ہو ۔ یعنی اس میں محقر رہنے لگے ہوں اُن کل نالیوں ، چھبچھ ، گئے ، وغیرہ ، کا پانی نکال دینا چاہئے ۔ یا مٹی ڈال کر اُس کو خشک کر دینا چاہئے ۔ اس میں تھوڑا سا کرسن تیل ۔ (مٹی کا تیل) دالنا چاہئے ۔ تاکہ پانی پر تیل اچھی طرح تیرنے لگے ۔ (اس سے محقروں کی سانس بند ہو کر وہ مر جائیں ، اُس کے بعد تیل میں آگ لگا دینے سے محقر مر جائیں گے ۔

۱۹۱۲ء میں لیریا کی ایک جلسہ ہوا تھا ۔ اُس میں قابل ممبر (بنگال کے مشہور ڈاکٹر سر (SIR) کیلاش چندر یوسی ، آئی ۔ اے ۔ نے کہا تھا کہ پانی کے گڈھوں میں درخت اُروسہ کے پتے ڈال دیئے جائیں تو محقروں کے انڈے آسانی سے نیست و نابود ہو جائیں گے اور پانی بھی زہر ملا ہوگا ۔

(۲) ہنس اور مچھلی وغیرہ محقروں کے انڈے کھا جاتے ہیں ۔ اس لئے لیریا کی جگہوں

بعد پسینہ اگر بخار اتر جاتا ہے۔ اس کو پسینہ کا درجہ کہتے ہیں۔ ۲۷ گھنٹہ کے اندر قدر کم نہ بخار آنا۔ صبح کا بخار، اور وہ سحر جس کی نوبت ایک دو گھنٹہ آگے یا پیچھے ہو۔ نوبتی تب لاری ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ بیماری مشکل ہو جاتی ہے اور اس کا علاج ناممکن۔

علاج

علامات پر نظر رکھتے ہوئے علاج کرنا پڑیگا دیکھو کہ مذکورہ بالا بخاروں کا علاج ایک ساتھ لکھا گیا ہے۔ بخار نہ رہنے پر دوا دینے کا اصول ہے۔ چینی نم سلف ایکس۔ سفوف۔ اگر شدید نوبتی بخار میں لرزہ بخار، اور پسینہ، یہ تین درجے مرفیق کے جسم میں درجہ بدرجہ صاف نمودار ہوں۔ (یعنی چارٹ ۱، گرمی، اور پسینہ، ان تینوں درجوں میں کسی تبدیلی یا کمی نمودار نہ ہو۔ اس کے بعد بخار نہ ہو، ایسی حالت میں جب بخار اتر جائے تین گھنٹہ کے وقفہ سے یہ دوا دینا چاہیے۔

(بقیہ حاشیہ ۱۸ کے رہنے والوں کو پانی کے مخزن میں جہاں پانی اکٹھا ہو، نہیں یا پھیلیاں پاں کر ڈال دیتا چاہئے اس سے ملیریا سے نجات پاسکتے ہیں۔ (The Lancet 1914) ملاحظہ ہو۔

(۲) چچر نہ کاٹنے پائیں۔ اس لئے مسہری لگانا چاہئے۔

(۳) اگر ان تین ترکیبوں سے بھی ملیریا نہ کم ہو تو باہران علم جراثیم کو نین کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کو نین کے جسم میں پہنچتے ہی جراثیم ملیریا کی انفرالشن بند ہو جاتی ہے اور جلد نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔

(۴) کئی فوج (SALVATION ARMY) کے کمشنر جناب یو تھ ٹھاکر صاحب

نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ چاچہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ درخت یو کلپس کی ہو ایلیریا کا خاتمہ کرتی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ملیریا ہوتا ہو وہاں یہ درخت خوب لگائے جائیں۔ تو ہندوستان سے ملیریا دور ہو جائے گا۔ اس کے تیل کی بکری سے اچھی آبرنی بھی ہوگی۔

میں پیاس کا مکمل طور پر فقدان ہو۔

کیپیکم، ۶؛ جاڑے کے پہلے پیاس (خاصکر صبح کے وقت) بخار کے صفرائی آتے؛ درجہ حرارت شروع ہونے کے تھوڑے ہی دیر بعد کچھ پسینہ نکلتا۔ درجہ پسینہ میں پیاس نہ رہتا۔ بدلیوں میں درد وغیرہ علامتیں۔ سائی کوٹا ۶؛ جاڑے کی حالت میں جسم کے جوڑوں میں (خاصکر رانوں میں) اتنا درد ہو کہ وہاں کے اعصاب اور ان کے بندھن جھوٹے محسوس ہوں، کیپیکم کے ساتھ یا پہلے پیاس، پسینہ، سر بھاری، جاڑے کے شروع میں مٹھی باندھے رہتا۔ جاڑا آجاتے کے بعد تیز پیاس، اور پانی پینے کے بعد ہی پیشاب ہوتا۔

آرنیکا مانٹ ۶؛ (صبح کے وقت نو بجتی بخار میں) جاڑے کے پہلے بہت جھپٹائی آتا۔ بہت کمزوری، ہڈیوں کے اندر تیز درد۔ نرم نستر بھی سخت محسوس ہوتا، اور اسی وجہ سے ہمیشہ کراٹے بدلے پٹیاں اور چہرہ گرم (لیکن اور جھٹھٹھٹا) پسینہ نہ نکلتا؛ یا پسینہ میں نرم نستر بدلے ہونا وغیرہ علامات میں (سادہ بخار) اندر سردی، اور باہر گرمی محسوس ہونے پر پانی پینے (یا باہری گرمی سے) جاڑا بخار کا بڑھنا وغیرہ علامتوں میں یہ بہت قاعدہ مت ہے۔ اگر بخار کا اچھی طرح علاج نہ ہوا ہو تو پاکوئین کا غلط استعمال ہوا ہو تو آرنیکا دینا چاہئے۔

اپریکاک ۳x۴۔ ۳۰۔ معده کے فعل کی حرابی سے بخار آتا ہو، متلی یا قے، زبان زرد۔ بہت تھوڑی دیر سردی محسوس؛ لیکن درجہ حرارت دیر تک رہتے، بخار آنے کے پہلے جھپٹائی۔ انگریزائیاں، بیرونی گرمی سے سردی زیادہ محسوس ہوتا ہو، درجہ حرارت میں تیز پیاس جاڑے کے درجہ میں پیاس نہ رہتا۔ درجہ حرارت میں بہت پسینہ سبز رنگ کا بلغم ملا دست، ذائقہ کڑوا۔ کوئین کے غلط استعمال کی وجہ سے بخار، پیریا سے پیدا ہوا مزمن بخار؛ (خاصکر دوبار آنے والا) کے مخصوص علامات اگر نہ ظاہر ہوتے ہوں تو اپریکاک ۳۰ دینا چاہئے۔

اس کے بعد جب دوسرے علامات صاف محسوس ہونے لگیں تو علامات کے مطابق دوا دینا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے۔
ہنگلی صلیغ کے ایک ڈاکٹر نے اپنے چالیس سال کا تجربہ ہم کو بتایا ہے کہ ”نوبتی بخار“ میں اپیکاک دینے سے اکثر بہت جگہوں میں اُس سے یا تو بخار ہی اچھا ہو جاتا ہے، یا علامات نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں موزوں دوا کے انتخاب کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔

مشہور ڈاکٹر جابر، جابر، بخار کے شروع میں صرف اپیکاک ۳، ایک خوراک دینے کی رائے دیتے ہیں۔ اس تدبیر سے ہم لوگوں کو اکثر بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔

اگنیشیا ۱۲۔ ۳۰۔ (تپ نوبتی میں) صرف درجہ لرزہ میں پیاس، درجہ حرارت، اور درجہ پسینہ میں پیاس نہ رہنا بیرونی گرمی سے جابرے کا کم ہونا، باہر جاڑا اور اندر گرمی، یا اندر جاڑا اور باہر گرمی، سر بھاری اور چہرہ بٹھکا ہوا

(تپ نوبتی میں) کل جسم میں کھلی، جسم میں اندھوری، پھنسیاں چہرہ کے ایک حصہ میں جلن، پسینہ کم یا صرف چہرہ پر پسینہ، تیز گرمی، لیکن پیاس نہ ہونا۔

پوڈوفٹالک ۶، صبح کے بخار میں، اور اُس کے ساتھ ہی اسپہال زہر باد کے دستوں کا رنگ بدلا ہوا۔ زبان پر سفید میل کی تہہ جمی ہوئی۔ بھوک کم، سانس میں بدبو۔ تلی، جگہ میں درد، جاڑا شروع ہونے کے پہلے پشت میں تیز درد۔ درجہ پسینہ میں نیند۔

آٹم کرود۔ ۶۔ (نوبتی بخار میں) نبض تیز، قاعد سے بہت جاڑا۔ یہاں تک کہ گرم کمرہ میں سردی محسوس ہونا۔ پیاس کا نہ رہنا۔ رات میں پیر کے تلوے ٹھنڈے۔ صبح اٹھنے کے وقت پسینہ، زبان سادی یا سفید تہہ چڑھی قبض، یا دست، (باری سے) بجز کھٹی چیزوں کے اور کسی چیز کے کھانے کی خواہش نہ ہو، مرنی کا میل بر سونا (پوڈھے

اور موٹے بدن والے جوانوں کے مرض میں یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

رسنا۔ ۲۔ 'X'۔ ۲۰۰۔ بچوں کو کرم کی وجہ سے جو بخار ہو، بخار اکثر نہ جاتا ہو، ناک کھجلاتا ہو، پیاس نہ ہو، کبھی کبھی بخار کسی طرح نہیں اُترتا ہو۔ بھوک نہ ہو، یا بے قاعدہ بھوک ہو۔ اگر لگاتار ناک کھجلائے تو رسنا دینے سے بخار چھوٹ جاتا ہے۔

ایلا ٹریم ۳۔ ۶۔ صبح کا بخار، بخار بند ہو کر بتی اُچھل آئے۔ کھجلائے سے آرام محسوس ہو۔

رسٹاکس ۴۔ ۳۰۔ اگر تب نوبتی، تب لازمی میں تبدیل ہو جائے پانی میں بھیگنے یا کیلے کپڑے پہننے سے بخار ہو، بے چینی، مریض بستر پر ہمیشہ کروٹ بدلتا رہے۔ کمر میں درد، خون ملا پتلا دست۔ ڈاکٹر ڈہنم کا بیان ہے کہ جس بخار میں جاڑا شروع ہونے سے کئی گھنٹہ پہلے تکلیف دینے والی خشک کھانسی ہو، سستی پیدا کرتی ہو، اور قیام سہری تک موجود رہے، ایسے بخار میں رسٹاکس نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

فاسفورک الیڈ۔ ۲X۶۔ تیز جاڑا اور لرزہ، جسم کی حرارت بہت تیز اس کے بعد کمزور کرنے والا پسینہ۔ اور درجہ جاڑا اور بخار میں پیاس لگنا۔ پسینہ شروع ہونے پر تیز پیاس، عمیقین رہنا، گہری نیند۔ بگ بگ، سر بھاری، بغیر تکلیف کے دست، خواب میں احتلام خون کا اخراج، وغیرہ علامات میں مفید ہے۔

ارے نیا۔ ۶۔ لرزہ تیز اور بہت دیر تک رہے ۲۴ گھنٹہ تک دن رات جاڑا لگے۔ گرم حرارت یا پسینہ کے درجات بالکل نہ ہوں (یعنی جسم میں حرارت نہ ہو، اور پسینہ نہ لگے)۔ پیاس نہ ہو۔ پانی میں بھیگنے، یا تری کی جگہ رہنے سے بخار ہو، تپ بڑھی ہوئی ہو۔

ہائیدر اسٹس۔ مریض کے جسم میں ملیریا کا نہ ہر رہنے کی وجہ سے سوراخ، آنر اور معدہ میں گڑ بڑی ہو۔

سپیا۔ ۱۲۔ ۳۰۔ پُرانا بخار ہر ماہ میں آنے والا بخار۔ حاملہ

کاجار بخار جس میں پیاس نہ ہو، حرکت سے جھڑا معلوم ہو، گویا کل جسم برف سے ڈھکا ہے۔ ایسا جھڑا معلوم ہونا۔

انجم نارٹ - ۳ - سفوف، یا ۴ - (نوبت والے بخار میں) درجہ سردی میں پیاس کی کئی ران میں درد۔ کل جسم میں جھڑا اور لرزہ، اور ٹھنڈا پسینہ بہت تیز بخار، بخار کے وقت نیند نہ آنا۔

کارپووج - ۴ - ۳ - (تپ نوبتی میں) نبض کمزور اور تیز، شام کے وقت زیادہ جھڑا معلوم ہوتا۔ کبھی کبھی جسم کے ایک حصہ میں جھڑا۔ جھڑا شروع ہونے کے پہلے ہاتھ و پیر ٹھنڈے اور پیاس، دھوپ لگنے سے بخار، درجہ سردی میں پیاس، اس کے بعد تیز جلن، آخر میں کمزور کر نیوالا ترش بو والا پسینہ، جھڑے کے آنے سے پہلے درد سرد۔ جسم میں درد، ہاتھ و پیر اور سانس ٹھنڈی، چہرہ سرخ۔ مریض متواتر ہوا چاہتا ہے مرکز کی یا کوئین کے غلط استعمال سے بخار۔

اوپیم - ۴ - ۳ - (نئے بخار میں) نبض بڑے اور چال دھیمی گہری۔ نیند میں متھ کھلا رہتا۔ اور اسی کے ساتھ ناک سے آواز نکلتا۔ تینوں ہی درجے لیتے جھڑا، بخار، اور پسینہ میں نیند نہ آنا۔ پسینہ کے بعد تیز جلن - (تپ نوبتی میں) بہت جھڑے اور لرزہ کے بعد بخار شروع ہو جاتا ہے۔ تیز جھڑے کی حالت میں نیند، اور جسم میں حرکت۔ پیاس نہ ہو۔ درجہ حرارت میں پیاس، بہت پسینہ، آنکھ کھلی، پتھوں اور بورھوں کے بخار میں خوب فائدہ کرتا ہے۔

کیکیس - ۱ - (تپ نوبتی میں) ٹھیک ایک مرتبہ (خاص کر دوپہر کے وقت) جھڑا لگ کر بخار آنا۔ بعد جلن اور تیز سانس، آخر میں یعنی جھڑے کے درجہ میں بوند بوند پسینہ، تیز پیاس۔ پشت میں سردی، ہتھیلی برف کی طرح سرد۔

چائٹا - ۳ - ۴ - ۲ - (چائٹا کے علامات کا بخار - کبھی رات میں نہیں آتا۔ نبض ہلکی تیز نبض، بے قاعدہ، غذا کے بعد نبض

کی رفتار کم اور نیند، تلی اور جگر میں درد، اور ان کا بڑھنا۔ پانی گوند کی طرح لیسدار، صفراء ملا دست، لرزہ، اور بخار کی حالت کے کچھ ہی پہلے یا بعد پیاس، بخار شروع ہوتے ہی دل دھڑکتا۔ اور ملتا۔ درد سر کل جسم میں جاڑا محسوس، متلی اور پیاس نہ ہونا بخار کی حالت میں مٹھ اور ہونٹ میں خشکی اور جلن، جاڑے کی نوبت سے پہلے بھوک، پیاس، لرزہ۔ اور بخار کی حالت میں پیاس نہ رہنا۔ بخار کے بعد پیاس، اور بہت پسینہ (جاڑے کے بخار اور پسینہ رہے یا نہ رہے کوئی غلط استعمال کرنے سے جو تپ نہ رہتی ہو، اس میں چائنا فائدہ نہیں کرتا۔) شاید چائنا۔ ۲۔ مفید ہو۔

جلیسم۔ آ۔ x۔ ۶۔ نبض کمزور، نرم، تیز، پیٹھ میں جاڑا الگ کر بخار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لشت میں یا کل جسم میں درد، تیسرے پر درد بخار آنا، ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے، سر گرم اور چہرہ سرخ، بخار کی حالت میں مریض سست پڑا رہتا ہے۔ اکثر پیاس نہیں رہتی، جاڑے کی حالت میں یا اس کے بعد نیند۔

بیلٹسیا۔ ۶۔ نبض کمزور، سٹرا پاخانہ۔ یا بدبودار۔ چہرہ تجھ کی گیس کا سانس کے درجہ جسم میں پہنچنا۔ یا خراب تالاب کا پانی نکالنے سے بخار آنا۔ اور چند دنوں ہی کے بخار میں مریض بہت کمزور ہو جائے۔ اور پڑا رہے۔ سر میں تیز درد۔ مہل باتیں بلنا، مریض کا خیال ہو کہ جسم کے دو تین حصہ ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کسی طرح بھی ان ٹکڑوں کو جوڑ نہ سکنے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنا۔ تپ۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔ ڈگری پیشاب، بہت تھوڑا۔ دست کالے یا سلی رنگ کے۔

نیکس و امیکا۔ ۳۔ x۔ ۶۔ ۴۔ صبح کے بخار میں تیسرے پر شام کے وقت یا رات میں بخار آتا ہو۔ ہاتھ و پیر دھیلے ہو جائیں قبل بخار کے جہائی اور اگڑائی، یا بدن ٹوٹتا ہو۔ اندر سردی اور باہر گرمی۔ اندر گرمی، اور باہر سردی محسوس ہو تیز تپ گویا تمام جسم

گرمی سے جلا جاتا ہے (خاصکر چہرہ بہت گرم اور سُرخ اور اتنی گرمی محسوس ہونے پر بھی مریض جاڑے کی وجہ سے کپڑا نہ اتارنا چاہتا ہو۔ تیز بخار کی حالت میں بھی کپڑا اتارنے ہی سے جاڑا لگنا۔ مثلی۔ دورانِ سُر قبض ہاتھ و پیروں ناخن نیلے، بیرونی گرمی سے جاڑا کم نہ ہو، لڑکھ کے درجہ میں کیسکی ہو کر جاڑا لگے۔ پانی پینے سے جاڑے کی زیادتی۔ جاڑے کے قبل اور بعد عین صبح یا آدھی رات میں ترشش، بد بو دار پسینہ، جو بخار ہمیشہ وقتِ مقررہ کے بعد آتا ہو۔ اُس کے روکنے کی ٹکس و امیکا اچھی اور کامیاب دوا ہے (ٹھیک غروبِ آفتاب کے وقت استعمال کرنے سے اور بھی اچھا اور جلد فائدہ کرتا ہے۔)

سلسلہ ۳۔ جاڑا لگنے کے پہلے پیاس، جاڑا لگنے پر پھر پیاس، نہیں رہتی۔ تیز تب (۱۰۳-۱۰۵) ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کل جسم جلا جاتا ہے۔ اور دن رات یہ تب موجود رہے، رات کے وقت بہت زیادہ پسینہ بخار اُترنے پر بہت سے کا بڑھنا، زبان سفید یا زرد رنگ کی، ان سب علامات میں مادیام من (خاصکر کونین کے غلط استعمال سے پیدا ہوا) بخار میں فائدہ مند ہے۔ کسی جلدی بیماری کے رب جانے سے بخار آتا ہے۔ اُس میں بھی سلسلہ فائدہ کرتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر سلسلہ سے فائدہ نہ ہو تو سورائی نم۔ ۳۔ ۴۔ دینا چاہیے۔

ڈاکٹر ایچ، سی، الین کی رائے کے مطابق پیریا بخار میں کونین کے بعد اگر سلفر دیا جائے تو مریض کو بہت فائدہ پہونچا سکتا ہے اس اصطلاح کی طابقی کام کر کے ہننے بھی بہت فائدہ اُٹھایا ہے۔ (ALLEN'S FEVER P. 355) ملاحظہ ہو۔ لو کھیس گلوب: کسی کسی پیریا سے پیدا ہونے والی بخار میں مریض کے جسم کی کوئی علامت صاف نہیں دکھائی دیتی۔ ایسی جگہ پر ڈاکٹر ڈیوی، بزرگ اور انسویج، یہ دوا دینے کی صلاح دیتے ہیں۔

مندرجہ ذیل علامات میں بھی یہ دوا بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ جسم کی گرمی کا بہت بڑھ جانا۔ کلیجہ دھڑکنے۔ پیپ اور پیچم ملاکت

نکلنا۔ مہرہ کی خرابی، غدود بول میں جلن۔ مہرہ میں بدبو، سستی، اور
خون کا خراب ہونا وغیرہ

سی ٹینٹھیس - ۳۰ - ۳۰ - بہت جاڑا، پیاس کا نہ رہنا۔ کم کے نیچے ہاتھ
پیر اور ناک کا اگلا حصہ ہرٹ کے مانند ٹھنڈا ہونا۔ اعصاب کا - کھڑنا۔
(TWITCHINGS) جو تھیں بخار (جو بخار دودن کا ناندہ دیکھ آئے)
میں نہایت فائدہ مند ہے۔

ٹیکسوس - ۳۰ - ۳۰ - چائے پر سب علامات کا بڑھنا۔
بھٹوں کیو آخر سراج کے وقت، غور توں کو جسٹا دیکھ بخار آدے۔
بھٹوں کے پسینہ میں لہسن کی بو، بخار کے وقت جسم کا پتلا رنگ،
کونین کے غلط استعمال کی وجہ سے بھٹا۔

کلیریا کا ریب - ۳۰ - ۳۰ - مرض میرا بخار اتر جانے پر بھی کچھ بخار
رہے، دھما بخار (گیارہ یا دو بجے کے وقت آدے)

جاڑے کی حالت میں پیاس نہ ہو، بدبوی کے دست ہوں۔ کبھی
قبض، کبھی تھیلے دست (بہن منہوں کا پیٹ بڑا ہو، یا جن کو درسا میں
سردی لگ جاتی ہے۔ ان کے لئے یہ دوا زیادہ کار آمد اور مفید ہے۔
کلیریا کا ریب - ۳۰ - ۳۰ - سفوف - نو بجی بخار میں تلی، اور جگر کا
بڑھنا (خاصہ بچوں کا تکلیف) سانس کی تکلیف، سینہ دھڑکنا۔

ایٹیلوٹیا - ۳۰ - ۳۰ - نرمی میرا بخار کے ساتھ پیشی، خون کی کمی۔
کیموٹلا - ۴ - ۱۲ - بچوں کے بخار میں دانت نکلنے کے وقت میں بنار
اور بقیہ دست۔ بچے کا چہرہ اڑا مزاج۔ گود میں گھر منا چاہے

بچے بے چین ہو، ایک گال سرخ، دوسرا افسردہ، زبان
زرد، بار بار اور زیادہ پیشاب ہو۔ تھوڑا جاڑا لگ کر بخار آدے۔
اور گرم پسینہ کی حالت میں پیاسی۔

جسم میں ایک جگہ سردی اور دوسری جگہ گرمی محسوس ہونے
پیشاب میں - ۲۰ - ۲۰ - ۱۱ بجے دن کے وقت

دراٹرم ورڈی ۳'x - نبض پُر اور سخت، تیز اور اچھلتی ہوئی۔
جسم بہت گرم۔ کلیجہ کی دھڑکن تیز۔ متلی کے ساتھ جاڑا سخت تشنج،
پیشانی میں اجتماع خون۔

دراٹرم البم ۳'x - ۳۰ - صبح ۶ بجے پیاس کے ساتھ جاڑا۔
لگ کر بخار آنا۔ بہت دیر تک جاڑا لگتے رہتا، لہذا لہذا کی حالت میں
کل جسم ٹھنڈا اور سخت، نبض کمزور، درجہ بخار میں سر میں ٹھنڈا
پسینہ، پسینہ کے درمیان چہرہ پر مڑنی چھائی ہوئی، بدنگ، تیز
پلیریا بخار میں دراٹرم البم بہت فائدہ کرتا ہے۔

لائیکو پوڈیم ۱۱' - ۳۰ - سہ پہر چار بجے بخار آکر ۸ بجے رات کو
اُتر چلے۔ بہت لہذا، اور جاڑا۔ تمام جسم میں ٹھنڈک محسوس
ہو، قبض، نفخ، شکم، جگر میں درد جلجلی۔

سڈرن ۱' - ۳'x - ۳۰ - پیشانی میں خون کا اجتماع۔
بہت تھوڑا پسینہ، یا بالکل ندارد۔ جاڑا اور لہذا، ہر روز
ایک ہی وقت بخار شروع ہو، ترائی یا آلاب وغیرہ پلیریا۔
جہاں ہوا کا بخار۔ ہر روز دوبار آئیو لے بخار میں: ایلاٹریٹم ۳ - جائنا ۶ -
گریفا ۶ - اسٹرامونیم ۳ - سلفر ۳ - انٹیم کروڈ ۶ -
بخار جو وقت بڑھ کر آوے: انٹیم ٹارٹ ۶ - آرس ۶ -
کینن سلف ۳ - سفوف، جائنا ۶ - اگنیشیا ۶ - نیٹرم ۳ - نکس دامیکا ۳ -
صبح آنے والے بخار

نکس دامیکا ۶ - برائی اونیا ۶ - ہیسیر ۶ - قیرم ۶ - لائیکو ۳ - جلس ۱'x -
نیٹرم ۳۰ - پوڈوفالٹم ۶ - سپیا ۳ - سلفر ۳ - تھو جا ۶ -
صفرار ۳ - پیدا ہوئے بخار میں: برائی اونیا - چیلے ڈونی ایم
ایپیکاک - پوڈوفالٹم - نیٹرم سلف۔

بخار آنے کے وقت نکس دامیکا، ایٹ سورنیم۔ اکن
جب تپ درودہ کے نویستہ ہو، کا وقت مقرر نہ ہو۔

(یعنی بخار کے ٹبر حصے یا زیادہ ہونے کا وقت مقرر ہو) آرس، اپیکاک، نکس و امیکا، سورنم، پلس، سیپ، اوپی ایم۔

روزانہ کے تپ و لرزہ میں

آرنا، آرس، ایکس، کیس، سڈرن، سائنا، جلس، نیٹرم میور، نکس و امیکا، پلس، رس، سلف، روزانہ بخار دو مرتبہ آوے، چائنا، ایلا، ٹی، گریف، اسٹرامونیم، سلف، ایپس، انٹم کروڈ۔

روزانہ وقت مقرر پر آوے

آرنا، سڈرن، جلس، می ایم، سیپ، اسپانی، جلیا، اینگسٹورا، روزانہ وقت بدل کر آئے، نیٹرم میور، یوپیٹ، پرف،

نوبتی بخار

ایک دن ناغہ دیکر آئے، آرنا، سلف، سڈرن، چائنا، نیٹرم میور، اینٹاکروڈ، ایپس، آرس، بل، براہو، کینٹو، کلک کارب، کیس، کاربووج، آپ، نکس و امیکا، میچ، پوڈو، پلس، رس، سلف، جلس، دباری کے بخار میں جاڑا نہ لگے، لاسیکو، دباری کے بخاروں میں ایک بجے سے ۵ بجے کے درمیان آوے، نوبتی بخار دوبار آئے، آرس، چائنا، الکیولاٹ، یوپیٹ، پرف، لاسیکو، نکس و امیکا، رس، اسکاٹا رس۔

دو بار ناغہ دیکر بخار آتا ہو تو

آرنا، آرس، کاربووج، چائنا، سٹا، ایلا، یالوس، آیوڈ، اگنے، آپ، مسن، نیٹرم میور، نکس و امیکا، پلس، سیپ، ورائٹم الیم، دو روز ناغہ دیکر دوبار کے بخار میں آرس، چائنا، ڈک، یوپیٹ، پرف، لاسیکو پوڈیم، نکس، پلس، رٹاکس، جو تپ و لرزہ ہفتہ وار آتا ہو، چائنا، لاسیکو پوڈیم، میوریا، رٹاکس، سلف، میور کیوڈنم۔

جو تپ و لرزہ دو ہفتہ ناغہ دیکر آئے، آرس، میور، کیلک کارب، چینی نم، سلف، چائنا، پلس، سورنم۔

جوتپ ولرزہ تین ہفتہ ناغہ دیکر آئے۔ سلف سینگے کارب، سورانی نم۔
 جوتپ ولرزہ چھ ماہ ناغہ دے کر آئے۔ لکے سیپی۔
 جوتپ ولرزہ سالانہ آئے۔ آرس کاربو وج۔ لکے نیٹرم میور۔ سورانی نم۔
 سلف، تھو جا۔ بیو بریکو لیم۔

محنت رت (اکھن ویوس) کے بخاریں، اکیو برالیو ویل
(موسم گرما) کے بخاریں، انٹھ مارٹ، نیٹرم میور، سوری۔
(موسم گرم) (جھٹھ واساڑھ) کے بخاریں، کیس، سوری، بیٹی۔ نیٹرم میور۔
برساتی بخاریں۔

شترت رت : کنوار کارنگ کے بخار میں میکيوس، برانی الیو، چائنا، آرس،
کولچہ، یوپیٹ پرف، نکس، ایلٹرم میور، ورے ایم، ٹیوبرکیولا سٹم،
موسم لبنت (چیت بیاکھ) کے بخار میں۔ اینٹ مارٹ، کیکے، سلف،
جلس۔ سورجی، سیپی، کاراجو، ج :

بخار میں سکھتی چیزوں کے کھانے سے ہونٹ میں چھائے پڑے ہوں۔
نیٹرم میٹور۔ کاربوج، رٹاکس۔ سلفر۔

تپ تو بتی اگر تپ لازم میں تبدیل ہو جائے۔ گیہون۔ ۶۔
جلس۔ ۱۰۔ پوڈو فالٹم۔ ۶۔ یو پیٹ پر غو۔ ۳۔
بخار آرام ہونے پر تلی بڑھی ہو

سنا نقش یا مارک بن۔ ۳۰۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ سفوف و جگر یا لیور کی خرابی رہے تو
 فاسفوا ۶۔ ۳۰۔ عصبی درد یا سرطان میں۔ چلی ڈروئیم۔ ۶۔

بہت عرصہ تک یلیریا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اگر مریض خراب ہو جائے تو آرس ۱۰۰ یا نیٹرم میکور ۱۰۰ یا ۲۰۰ یلیریا میں مبتلا رہتے رہتے مریض میں خون کی قلت اور ایک دم کمزور ہو جائے (اماسس ہونے کے پہلے) فیبرم ۱۰۰ یا نیٹرم آرس ۱۰۰ یلیریا میں مبتلا رہتے رہتے اگر مریض کو سبزی بیماری (دکھی خون) ہو جائے تو یلیس ۱۰۰ یا ۲۰۰

ملیر یا کی وجہ سے خون کا پیشاب وغیرہ علامات میں، ملیر بخاری میں،

کبھی کبھی پٹیاب میں خون، زور کا جاڑا، درجہ حرارت بلامقید وقت۔ سانس کی تکلیف، تپ، یرقان وغیرہ علامات ہوں تو چائنا آرس کی اچھی اور کارآمد دوا ہے۔

لیکن اگر زیادہ کونین کھانے سے پٹیاب میں خون وغیرہ آنے لگا ہو تو ٹیری نیٹھا۔ کینتھرس۔ نیوفریوٹم وغیرہ۔ خون کے پٹیاب کے مرض کی دوا انتخاب کرنی چاہئے۔ یا (ضرورت ہو) کونین کے غلط استعمال سے پیدا ہوئے مرض کی دواؤں میں سے انتخاب کرنا چاہئے۔

شاید افریقہ میں یہ مرض (BLACK WATER FEVER) کے نام سے کبھی کبھی خوب پھیل جاتا ہے۔ مہتوں کی جان بھی جاتی ہے۔

توتی بخار کا معمولی علاج

سڈن، چائنا، چیئم آرس، اپیک، سلفر، نیٹرم سیور۔ اور کاربووج، یہ آٹھ لیریا کی منتخب دوائیں ہیں۔ ان میں پہلی پانچ نئے (شدید حادثہ) مرض میں، اور آخری تین پرانے (مزمن) (CHRONIC) مرض میں فاعل کر کام میں لائی جاتی ہیں۔ سڈن ۳۳ - (عصبی درد کے ساتھ معمولی ڈھنگ کے لیریا بخار کی بڑی اچھی فاعل دوا ہے۔

چائنا، ۳۳، دجاٹا لگنے کے پہلے پیاس، جاڑا اور بخار کی حالت میں پیاس نہ ہو، پسینہ کی حالت میں تیز پیاس، اور کمزور کرنے والا پسینہ، مقام جگر میں درد، سر میں دھجک، اور بخار کی حالت میں مریض کپڑا اتار کر پھینکنے کی کوشش کرے۔ یعنی کپڑا اتارنے کے ساتھ ہی جاڑا۔ اکثر عموک اور نیند کا غلبہ، کھانے پینے میں زیادتی۔ چائنا دو تین گرین۔

(علامات کے لئے توتی بخار کا مقصد ملاحظہ ہو۔)

آرسنیکم۔ ۳۳، ۳۳، ۳۳ (جاڑا، گرمی اور پسینہ ان تینوں حالتوں میں بار بار) لیکن تھوڑا تھوڑا پانی پینے کی بے انتہا خواہش پسینہ کی حالت میں مرض کے کل علامات کم ہو جائیں۔ جاڑے کے درجہ میں ایک بارگی

پلسٹیل، ورٹیم، الیم، آگنیش، امپاک، نیٹرم میور، آرنیکا، کسپکم، ایڈفاس،
سلفا، ارینا، ٹرن، اور یو پی ٹوریم۔ یہ سب ادویات سر، سوراخ،
کی دینی چاہئے۔ شہید نوبتی میریا بخاریں کو نین سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم
پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ لیکن نرسن میریا بخاریں کو نین سے ذہنی فائدہ کھاتا ہے۔
بلکہ زیادہ تر اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ کو نین سے گھر کے ہوئے بخاریں
امراض ادویات کے باہر میں کو نین کا بیان ملاحظہ ہو۔

غذا :- بخار کی تیزی میں مریض کو بجز گرم پانی کے اور کچھ نہ دینا چاہئے۔
جب بخار نہ رہے تو ساگو، آرا روٹ، بارلی، دھان کے لاوا کا مٹر، بھداندہ،
ناریل، مہری کا پانی، وغیرہ ہلکی غذا دینی چاہئے۔
دھن، اور باری کے بخاریں، بخار کے روز ہلکی غذا اور ناعنہ کے دلوڑ،
میں پڑانے باریک چاول کا بھات، محلی کا شوربہ، اور محوڑا دودھ، میریا کے
ساتھ سچیش اور خون کی کمی ایسے علامات رہنے پر "کٹی" کے ساگ
کارس ٹما فائدہ مند ہے۔

جہاں میریا ہوتا ہو وہاں کے جنگلوں کو صاف رکھنا۔ لیکن سر دیا ترائی
میں نہ رہنا۔ طرا پانی کہیں جمع نہ ہو۔ اس کا بند و بست کرنا۔ جمع ہوا کوڑا
جلادینا یا بھکوا دینا، تالابوں کی صفائی۔ اندھے کنویں، تالاب وغیرہ کا
بند کر دینا۔ پینے کے لئے اچھے پانی کا بند و بست کرنا۔ یو کلیٹس کا روغن
سونگھنا۔ اور رات میں مسہری یا تخت لگا کر یا چار پائی پر سونا
بہت ضروری ہے۔

دوسرے بخار کی فہرست ادویات ملاحظہ ہو۔

آب و ہوا بدلنے کے لئے جگہ میں خرابی ہو کر میریا ہو گیا ہو۔ ایسے
مریضوں کو کاشی، کیا وغیرہ اچھی جگہوں میں رکھنا چاہئے۔
جگہ میں خرابی نہ ہو تو دھوپور، دیو گھر، گرمی ڈیہہ، رانچی، دارجلنگ،
شیلانگ وغیرہ اچھی جگہیں ہیں۔

۱۹۳۱ء میں ڈاکٹر سر رونیڈ راس نے میریا کے بارے

میں جو بیان کیا ہے۔ اُس کا خلاصہ ہم ولایت کے بہترین روزانہ اخبار
(THE TIME) ٹائمز میں سے لکھ کر نو جی بخار کا بیان ختم کرتے ہیں۔
دو ہزار برس سے پہلے پُرانے باشندگان اس بات کو نہ جانتے تھے۔
اور انہیں اس کا بخوبی علم نہ تھا کہ علیحدہ علیحدہ قسم کے لیبر یا فی مرض میں
اور ترائی کے پانی کے مخزن سے پیدا ہونے والے کیڑے اس مرض کے
سبب ہیں۔ سترھویں صدی کے پہلے حصہ میں چائنا (یا کوئین) پہلے
پہلے، دکن، امریکہ سے یورپ میں لایا گیا۔ تب سے ڈاکٹروں نے سمجھ لیا کہ لیبر یا
فی صرف یہی ایک تیر بہدف دوا ہے۔

۱۸۸۸ء میں ڈاکٹر لیو برن نے محسوس کیا کہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہی لیبر یا
کے خاص سبب ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ٹنگلی نے ثابت کیا کہ چوتھیا تجاری،
نہلک لیبر یا بخار کے ایک ایک قسم کے خاص جراثیم ہیں۔ ان جراثیم کو نیت و نابود کو مٹا
یہا کوئین کا خاص کام ہے۔ لیکن جراثیم خون سے شیطان کی طرح
ان بے شمار جراثیم کو انسان کے جسم سے ایک دم زائل کرنے کے لئے
بہت روز (یعنی کئی ماہ) کوئین استعمال کرنا ضروری ہے۔

ہندوستان میں تلاش :- پانی کی جگہوں میں لیبر یا کے جراثیم
ملنے کی اُمید سے بہت سی ترائی میں علمی جانچ ہوئی۔ لیکن اس طرح یہ
جراثیم نہیں ملے۔ ۱۸۹۲ء میں ڈاکٹر سٹریک مین سن نے اندازہ کیا کہ
مجھروں کے کاٹنے سے ہی لیبر یا ہوتا ہے۔ ۲۰ اگست ۱۸۹۶ء میں
نے (ڈاکٹر راس) امتحان کر کے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ایک طرح کے مجھروں
سے ہی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ لیبر یا کے جراثیم اس قسم کے مجھروں
کی رال میں رہتے ہیں۔ اور مجھروں کے کاٹنے کے وقت رال کے ساتھ وہ خون
میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لئے لیبر یا پیدا کرنے والے جراثیم یہی ہیں۔ لیکن جراثیم
کو لے جانے والا یہ کرم ہے۔ جو پانی سے تر جگہوں میں رہتا ہے۔

۲۔ تپ سادہ و لازمی۔ ملیریائی سادہ یا لازمی بخار (SIMPLE OR MALARIAL INTERMITTENT FEVER)

جو بخار بالکل نہیں اُتر جاتا (یعنی جسم کی حرارت ۹۸ یا ۹۶ ڈگری نہیں ہوتی) صرف کچھ دیر کے لئے جسم کی گرمی کچھ کم (۱۰۰ یا اس سے زیادہ) ہو جاتی ہے۔ اور بخار رہتے ہوئے جسم کی حرارت پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام "تپ سادہ لازمی" ہے۔ کچھ ہلکا جاڑا لگ کر بخار شروع ہوتا ہے۔ سر کے اگلے حصہ میں درد۔ جگر کی خرابی بخار ۱۰ سے ۱۰۷ قہقہ۔ اسہال وغیرہ اس مرض کے علامات ہیں۔ قیام مرض برابر دو ہفتہ ہے۔ صفرا زیادہ ہو جانے سے چار ہفتہ تک یہ بخار رہ سکتا ہے۔ پسینہ بہت نکل کر یہ بخار اتر جاتا ہے اور کبھی نوبتی بخار اور کبھی مرضی علامات بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے ملیریا کا جرم ہی اس مرض کا خاص سبب ہے۔

علاج

بخار کی شروع حالت میں دیب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نوبتی یا تپ لازمی ہے یا تیز پیاس، جسم میں سوزش، بے چینی، موت کا خوف وغیرہ علامات میں ایک یا کئی سے۔ 'x' سر میں زیادہ گرمی یا اجتماع خون، پر ٹھنڈے سر میں در تیز بخار، چہرہ سرخ، یک یک کرنا، زبان کارنگ، سرخ، نفخ، شکم وغیرہ علامات میں بیلادونا 's'، قے یا متلی کی تیزی ہو، تو ایکاک 's'، 'x' مرض بہت کمزور اور سست ہو جائے تو آرسنک 's'، 'x'۔ بچھو کے تپ لازمی میں بلسم 's'۔ صفرا زیادہ ہو تو برائی ایونیا۔ 's'۔ یا کروٹیلیس 'y'، 'x'۔ بخار ایک دفعہ اتر جائے تو چائنا 's'، 'x'۔ یا چینی نم سلف۔ 's'، 'x'۔ سفوف، گرم شکم کے علامات میں سائنا۔ 's'، 'x'۔ ۲۰۰۔ زیادہ علامات کے لئے دوسرے بخاروں کو دھاہکر سر سامی بخار علاج اور معاون علاج ملاحظہ ہو۔

۳۔ پوشیدہ یا کسی دوسری شکل میں ملیریا

(MASRED MALAROUS FEVER)

اُن لوگوں میں جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ملیریا کثرت سے پھیلا ہو۔ کسی کسی کے جسم میں ملیریا کا زہر رہتے ہوئے بھی سردی، گرمی، پسینہ، ان تینوں میں سے کوئی علامات نمودار نہیں ہوتی، بخار کی حالت میں کبھی نہیں رہتے۔ اس حالت میں کبھی کبھی صرف دردِ عصبی یا تلی کا بڑھنا، یا قلتِ خون، یا بے چیشی۔ اسی کا نام پوشیدہ یا دوسری شکل میں ملیریا ہوتا ہے۔ علاج کے لئے نوبتی بخار کے علاج میں سے سب علامات علاج انتخاب کرنا چاہئے۔

۴۔ ملیریا سے پیدا ہوئی سوز مزاجی

(MALARIAL CACHEXIA)

بہت روز تک ملیریا بخار میں مبتلا رہنے سے کبھی کبھی تلی اور جگر بڑھ جاتا ہے۔ خون کم ہو جاتا ہے۔ یوتقان (کالور)، دردِ عصبی، اسہال یا امعدہ کی خرابی وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

علاج :- قلتِ خون کی علامت میں فیرم سٹ۔ ۳۰، کچھ زرد یا سفید، سرخ، زبان، سستی، کونین کے غلط استعمال سے پیدا ہوئے علامات میں، آرسنک۔ ۴۔ ۳۰۔ ٹیلارنگ، جاڑا۔ تلی بڑھی، قبض، صبح کے وقت دردِ سر ہو کر تمام دن رہے، کونین کے غلط استعمال سے پیدا ہوئے علامات میں، نیٹرم میوور۔ ۳۰۔ تلی بڑھے اور درمیں سیانا نفع ۲۔ ۴۔ نکس و امیک، پلاسٹیک، مارک بن ایوڈرائڈ، وریٹرم البم، آرنیکا، اگنیشیا، اپیکا، کنیکیم، سٹرن، یو پی ٹوریم پرف، اربنا، فاسفورک ایسٹ، سلفر، وغیرہ دوائیں، وقت و وقت پر ضروری ہو سکتی ہیں۔ ان کے طریقے اور علامات کے لئے "ملیریا نوبتی بخار کا علاج" دیکھنا چاہئے۔

اس مرض میں کوئین کھانے سے نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی چائنا دینا چاہئے۔

مہلک ملیریائی بخار

(PERNIOUS MALARIAL FEVER)

یہ مرض نہایت خوفناک ہے۔ معمولاً گرم، ملک میں یہ تپانہ بخار (INTERMITTENT) یا تپ لازمی کی (REMITTENT) شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ جسم کے اندر دنی آلات میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو لوگ بنگلی بخار کہتے ہیں۔

دو تین روز بخار آنے کے بعد (PODXYSM) بخار کی خرابی کے سبب علامات محسوس ہونے لگتے ہیں۔

یہ بخار سات قسم کا ہوتا ہے: بے ہوشی کا بخار، سرسامی بخار، اسہالی بخار، خبیث بخار، پسینہ کا بخار، قلت خون کا بخار، خونی بخار۔

۱۔ بے ہوشی کا بخار۔ بے ہوشی کمرینوالا (COMATOSE VARIETY) دوسرا۔ دوران سر یا یوسمی انگلیسی آواز بیٹھ جانا۔ حرارت جسم ۱۰۵ سے ۱۰۷ تک ناک سے خرخر اہٹ کی آواز، بے ہوشی اس کے خاص علامات ہیں۔ مریض چند گھنٹوں میں مر جاسکتا ہے۔
اوپیم، ۶۔ ۶۔ ۶۔ اس کی خاص دوائیں ہیں۔

(۲) سرسامی بخار:۔ بخار کی تیز حالت میں تیز درجہ سرکان میں بھینٹنا ہٹ۔ بے ہوشی، حرارت ۱۰۵۔ ۱۰۸۔ اور بہت کتنا جھکنا اس کی خاص علامات ہیں۔ کبھی کبھی جسم کے سرد ہونے سے مریض ایک بار گہرے ہوشی ہو جاتا ہے۔ اور یہی بے ہوشی موت ہو جاتی ہے۔ بیلڈ ونا ۳۰۔ ۳۰۔ اور ہالیوسیا ۳۰۔ ۳۰۔ اس کی مخصوص اور نہایت کارآمد دوائیں ہیں۔

(۳) اسہالی بخار (DARRHOEAIIC) تپلے دست آنے والے بخار (DARRHOEAIIC) کی تیزی میں ایک دست، یا پسینہ کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ دست پانی کی طرح سبزی مائل خون ہلاتے تیز

کیٹس۔ x ۲۔ اس کی خاص دوائیں ہیں۔

علاج :- گچل۔ گیسٹس۔ سینڈس۔ بلس وغیرہ مشہور معالجات
بخار نہ ہونے کی حالت میں چائنا فی خوراک (۱۰-۱۵ گرام تک) مرض
کے مطابق استعمال کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ جاڑے کی حالت میں
ہاتھ و پیروں کو سینکنا اور بہت سست ہو جانے میں براڈ می یا دسکی
استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ تیز بخار میں برف کا ٹکڑا جو سننے کو دیا جاتا ہے۔

کالا آزار (KALA AZAR)

تپ سیاہ، کالا بخار، حمی، اسود

(LEISHMAN DONOVAN INFECTION DUMDUM FEVER)

یہ ایک مزمن مرض ہے۔ تلی بڑھی ہوئے خون کی تے اور بخار بلا قید وقت۔ اس
مرض کی تین خاص علامتیں ہیں۔ خون کی کمی کے ساتھ مریض کا جسم سیاہ
ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ملک آسام میں اس کا نام کالا بخار ہو گیا
ہے (PARASITIC) ایک قسم کے جراثیم اس مرض کے سبب
ہیں۔ آسام، لنکا، چین، مصر میں خوب پھیلتا ہے۔ اس میں
سردیہ ذیل علامات نمودار ہوتے ہیں۔

بڑھی ہوئی تلی :- کبھی کبھی بڑھا ہوا جگر۔ پھیپھارنگ۔ بلا قید
وقت لوبی بخاریں زیادہ روز بتلا رہنا۔ مسوڑھے۔ بے خون نکلتا۔ اور
دانے وغیرہ نکلتا (PURPURA) آماس، قلت خون اور اس کے
ساتھ کے دوسرے علامات وغیرہ۔ اس میں سردیہ ذیل ادویات کام کرتی ہیں۔

آرسنک - سو x ۲۰۰ - بخار آماس، خون کی کمی۔
فاسفورس - سو x ۳۰ - اخراج خون۔ سیاہی لونی تھس۔ x ۲ - بڑھی ہوئی تلی۔
ہارڈوس میریلس - سو x - بڑھا ہوا جگر۔
ایس۔ لیس۔ لیکس۔ گرڈمیس۔ انٹیمارٹ۔ ایڈفارس۔ فیرم آیرڈ۔

فرم آرس۔ فرم سیانیم، فرم ٹیالیم وغیرہ دواؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ سب دواؤں میں ۳۔ ۶ طاقت کی دہنی چاہئیں۔

ٹائیفائیڈ

تپ محرقہ، اسہالی۔ تپ محرقہ بطنی۔ آٹم فیور۔ اینٹرک فیور
(TYPHOID FEVER)

یہ ایک متحدی مرض ہے۔ ابرٹس۔ بے سسی لس۔ یا لے سسی لس یا مالکفوس

نامی ایک (EBERTE'S BACILLUS OR BACILLUS

(TYPHOSUS) ایک قسم کا جرم ہے۔ جو اس مرض کے پیدا ہونے کا

سبب ہے۔ داکئی بخار برابر رہتا، پیٹ میں اکثر ن، اور ریاح کا غلبہ
تلی کا بڑھنا۔ انٹرٹیوں میں زخم، درمیانی آنت کا بڑھ جانا اور بول و براز
خون، اور پسینہ میں، بیسی لس ٹائیفوسس کا دکھائی دینا۔ اس
مرض کی علامت مقصد ماطے شدہ ہے۔

اس بیماری میں رٹلیوں پر مرض کا خاص حملہ ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے اس کو اینٹرک (ENTERIC) یا بطنی بخار، اور موسم سرما
کے شروع یعنی کنوارا تک میں ہونے کی وجہ سے آٹم فیور
(AUTUMN FEVER) بھی کہتے ہیں۔

جو ملک نہ بہت سرد اور نہ بہت گرم ہیں۔ اور گاؤں کی نسبت شہر میں
اور بڑے شہروں کی نسبت چھوٹے شہروں میں یہ مرض زیادہ
ہوتا ہے۔ پانی پینے کی نالیاں، اور پیے کے پانی کی صفائی کی طرف
خیال رکھنے کی وجہ سے ان کی خرابی سے اور کھٹی وغیرہ کے ذریعہ
سے یہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہے۔

جن شہروں یا گاؤں میں ٹائیفائیڈ فیور (میعادی بخار) وبائی
شکل میں پھیلتا ہے۔ ان جگہوں کے پانی کا امتحان کر کے دیکھا گیا ہے۔
کہ اس میں ٹائیفائیڈ کے جراثیم موجود ہیں۔

جو ان لوگوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ طاقتور ہیں ان پر زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اس بیماری کے ہو جانے سے نر بکھر اس بیماری کے ہونے کا خوف جاتا رہتا ہے۔ لیکن آرام ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ حملہ ہونے کا خوف رہتا ہے۔

جبرائیم :- ٹائیفوس :- بے بسی :- ایک طرح کا چلنے کی طاقت رکھنے والا۔ باریک سوت کی طرح، خوردبین سے دکھائی دینے والا جسم ہے۔ ان کے دونوں کناروں پر دو گول شکل کے سر پوش (ڈسکن) کی طرح رہتا ہے۔ اس لئے کچھ لوگ اس کو ڈرم بے بسی (DRUM BACILLUS) بھی کہتے ہیں۔ خشک جگہ پر یہ جرم عرصہ تک زندہ رہتا ہے۔ لیکن سورج کی کرنوں سے ۴ سے ۱۰ گھنٹہ سے اندر ہی مر جاتا ہے۔

مرض کا حملہ ہونے سے، دوسرے ہی ہفتہ سے خون اور بول و براز (پاکخانہ و پیشاب) اور پسینہ میں خوردبین سے دیکھنے سے یہ جبرائیم دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ جبرائیم برف میں عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتے

کھپیلنا :- مریض کی تیمارداری کرنے کے بعد تیمار دار کے جسم میں پاکخانہ و پیشاب کے ساتھ اور خراب غذا کے ساتھ اور خراب غذا

بھاب پانی وغیرہ گرد و غبار کے خراب ذرات وغیرہ کے ساتھ سانس کے ذریعہ یہ مرض ایک شخص سے دوسرے شخص میں چلا جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی دیکھنے میں تو بالکل تندرست معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو کوئی اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ٹائیفائیڈ بخار ہو جاتا ہے۔ انہیں حاملہ گیر (دوسرے شخص میں مرض پہنچانے والا) کہتے ہیں۔ انہیں حاملوں کے ذریعہ یہ بیماری (دوہ) دھڑکھپتی ہے۔

اقسام مرض کا فرق :- ٹائیفائیڈ بخار کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً

- (۱) جس میں صرف انتڑیوں پر حملہ ہوتا ہے۔
- (۲) انتڑیوں پر کھوڑا حملہ ہوتا ہے۔ لیکن تلی۔ جگر۔ مثانہ، دماغ پر کی جھلی وغیرہ پر زیادہ حملہ ہوتا ہے۔

(۱۳) انٹریوں پر بالکل حملہ نہیں ہوتا۔

(۱۴) مخلوط ملاحوہ۔ حملہ جیسے ٹائیفائیڈ کی بیماری پر خاص طریقہ سے حملہ ہونے کے بعد اسٹپ لڈ کو کس، اسٹے فائلو کس، کولن بے سی لائی وغیرہ کا مریض پر حملہ ہوتا ہے۔

(۱۵) مقامی حملہ، جیسے ٹائیفائیڈ، بے سی لس کے ذریعہ پھوڑا یا مثانہ کی سوزش وغیرہ پر ٹائیفائیڈ کا حملہ،

(۱۶) کسی دوسری بیماری کے آخر حالت میں ٹائیفائیڈ کا حملہ

انٹریوں کی خسرابی

ان جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انٹریوں کے چھوٹی انٹریوں، اور کافی آنت (اعور)، کے خطہ کے آخر حصہ کی کئی گلیاں پھول جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جگہ سڑ جاتی ہے۔ اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ سڑی جگہ گل جایا کرتی ہے۔ اس طرح اس کے سڑنے سے زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خون نکلا کرتا ہے۔ اس کے بعد بیماری آرام ہونے سے ساتھ ہی ساتھ یہ زخم بہت کچھ کم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آنتوں کا زخم بڑھ کر پھیل جاتا ہے اور معمولاً فٹہ پیرو کی ۱۶ اینٹی آنت ایسا ہو جاتا ہے۔ عموماً کبھی مریضوں کی تلی بڑھ جاتی ہے۔ ہڈیوں کا ٹرٹا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جگر میں کبھی انٹریوں کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ مثانہ میں پھوڑا نکلا آتا ہے۔ سانس کی نلی میں خون کی زیادتی اور سوزش ہو جاتی ہے۔ دل سے اوپر کی جھلی (غلاف القلب) کی سوزش، غلاف دماغ کی سوزش، اور انٹریوں کی تبدیلی وغیرہ اس مرض کے دوران میں ظاہر ہوتے ہیں۔

علامات

جسم میں تو جراثیم داخل ہو گیا ہے لیکن مرض ظاہر نہیں ہوا۔ اس حالت کو مدت فحانت (INCUBATION PERIOD) کہتے ہیں۔ اس کی مدت ایک ہفتہ سے دو ہفتہ ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں جسم میں سستی اکام کرنے کو طبیعت نہ چاہتی ہو۔ جسانی اور دماغی

حکڑ بڑی ظاہر ہو جاتی ہے۔ آخر میں مریض بستر میں پڑ جاتا ہے۔ بیماری اکثر یکایک ظاہر نہیں ہوتی۔ درد سر، لرزہ، بھوک نہ لگنا۔ تپلے دست آنا۔ ناک سے خون کا اخراج، پیٹ میں تو لہج کا درد، وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

پہلا ہفتہ۔ کبھی کبھی بخار مقررہ طریقہ سے زیادہ ہو کر آخر میں سو۔ اسے ۱۰۔ ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سہ پہر کے وقت کی تیزی ایک یا ڈیڑھ ڈگری تک (بہ نسبت) صبح کے زیادہ ہوتی ہے۔ بخار کے مطابق نبض تیز نہیں ہوتی۔ سخت رہتی ہے اور ایک ہی ساتھ دو ضرب دیا کرتی ہے۔ زبان پر میل کی تہہ چڑھتی رہتی ہے۔ اور سفید رہتی ہے۔ پیٹ پھولا رہتا ہے اور اکڑن ہوتی ہے۔ اگر بخار زیادہ نہیں ہوا تو بکواس کی علامت بھی نہیں رہتی۔ لیکن درد سر اور رات کے وقت دماغ میں غلط خیالات کے چکر لگانے کے علامات رہ سکتے ہیں۔ یا تو تپلے دست آتے ہیں یا قبض رہتا ہے۔ پہلے ہفتہ کے آخر درجہ میں تپلی بڑھ جاتی ہے۔

پہلے پیٹ میں، اس کے بعد کل جسم میں گلابی رنگ کے دانے نکلتے ہیں۔ اگر جسم کا رنگ گورا نہیں ہے تو یہ دانے نہیں دیکھ پڑتے۔ سردی دکھانسی کی علامت بھی رہ سکتی ہے۔ دوسرا ہفتہ۔ کل علامات زیادہ ہو جاتے ہیں۔

بخار کی گری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور پہلے ہفتہ کی طرح بخار بہت کم نہیں ہوتا۔ نبض تیز رہتی ہے اور دو ضرب والی حالت نہیں محسوس ہوتی۔ درد سر نہیں رہتا، لیکن دماغی سستی اور خاموش رہنے کی عادت بڑھ جاتی ہے۔ چہرہ، ہونٹ، اور زبان خشک، مریض سست معلوم ہوتا ہے، تپلے دست، پیٹ میں ریا جھجھکتا۔ اکڑن کا درد رہ سکتا ہے۔ سخت بیماری کے مریضوں کی انٹریوں سے اخراج اور عصبی کمزوری کی وجہ سے موت ہو جاسکتی ہے۔ اور معمولی مرض میں بخار آہستہ آہستہ گھٹ کر مریض اچھا ہو سکتا ہے۔

تیسرا ہفتہ۔ نبض کی رفتار ۱۱۰ سے ۱۳۰ فی منٹ ہو جاتی ہے۔ صبح کے

وقت بخار کی کمی خوب نمایاں ہوتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ بخار گھٹتا جاتا ہے۔ کمزوری اور دیرپا پن زیادہ ہو جاتا ہے۔ پتلے دست اور نفخ شکم بھی رہ سکتا ہے۔ سانس کے عضو پر حملہ (نمونیا) برا نکائی لُس وغیرہ) قلب کی کمزوری کا بڑھتا۔ یک یک زیادہ کرتا۔ عضلات کا کانپنا اور خاص کر انٹریوں میں سوراخ اور اخراج خون وغیرہ خوفناک علامات ہیں۔

چوتھا ہفتہ :- اس ہفتہ میں بہت مریضوں کا رجحان صحت کی جانب ہوتا ہے۔ اور جسم کی حرارت بھی اپنی اصلیت پر آنے لگتی ہے۔ زبان صاف ہو جاتی ہے۔ اور بھوک لگنے لگتی ہے۔ مریضوں کے مریضوں میں تیسرے ہفتہ میں سب علامات بڑھنے لگتے ہیں۔ مریض بے ہوش بڑا رہتا ہے۔ پیچ پیچ میں کچھ آہستہ آہستہ بکتا ہے۔ جہاں کوئی نہ بھی ہو، ہاتھ پٹکتا ہے۔ گویا کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہے۔ مگر پکڑ نہیں سکتا۔ بخری میں پانچواں دن ویشاب ہوا کرتا ہے۔ اور پیچہ کی ریرہ میں زخم ہو جاتا ہے۔

پانچواں اور چھٹا ہفتہ :- ہلکا بخار رہتا ہے۔ آخر میں چالیس روز کے بعد بخار چھوٹتا ہے۔ مرض کا دوبارہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔

معمولاً ٹائیفائیڈ کے حملہ علامات مذکورہ بالا محسوس نہیں ہوتے۔ یا اس میں خرابی دکھائی دیتی ہے۔ اس لئے مرض کی شروع حالت میں مرض کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بے حد درد، عصبی درد، اکثر، دماغ میں جلن، سانس کی نلی کی سوزش، نمونیا، پلورسی، ایک یا ایک تسلی اور سوزش وغیرہ کے علامات کے ساتھ مرض شروع ہونے تک مرض کی تشخیص کرنا۔ مرض کی شروع حالت میں اکثر ناممکن ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائیڈ کے دوسرے علامات ظاہر نہ ہو۔ زیر ٹائیفائیڈ کا علاج نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ اکثر جگہوں میں انٹریوں کے زخم میں بھی سوراخ ہو کر جب تک بہت زیادہ اخراج خون نہیں ہوتا۔ تب تک مریض اس طرف خیال رجوع کئے بغیر رہتا ہے۔ ٹائیفائیڈ کی طرف کسی کا خیال رجوع نہیں ہوتا۔ اور یہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔

ٹائیفائیڈ بخار کی حرارت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، صبح کی حرارت شام کی حرارت سے ۱- یا ۱½ ڈگری کم ہوتی ہے۔ اگر مریض کا رجحان شفا کی طرف ہوتا ہے تو حرارت آہستہ آہستہ گھٹ جاتی ہے لیکن یکایک حرارت کا بڑھنا یا گھٹنا بھی دیکھا گیا ہے۔

کبھی کبھی بخار ایک بار کی چھوٹ جلنے کے بعد یکایک ایک روز بخار آجاتا ہے، یا اکثر تیسرے پر بخار کی زیادتی محسوس ہوتی ہے مگر دوسرے علامات نہیں ظاہر ہوتے۔ کبھی کبھی جتنی حرارت عادتاً ہونا چاہیے۔ اس سے کم ہوتی ہے؛ نمونیا، پلیورلسی وغیرہ علامات پیدا ہو جانے پر سردی بھی آسکتی ہے۔

ٹائیفائیڈ بخار میں ایک قسم کے دلے پہلے ہفتہ کے آخر میں، یا دوسرے ہفتہ کے شروع میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن سانپے یا میلے جسم میں یہ دلے نہیں دکھائی دیتے۔ ان دلوں کے علاوہ آماں، پسینہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اور بال گر جاتے ہیں، اور بستر کا زخم اکثر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی پورا بھی نکل آتا ہے۔ اور یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

ٹائیفائیڈ بخار میں خون میں بہت تبدیلی آجاتی ہے۔ خون کے سفید ذرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی دوسری دباؤ بیماری میں یا سوزشی مرض میں اس طرح سفید ذرات کم نہیں ہوتے۔ یہ ٹائیفائیڈ مرض کی ایک خصوصیت ہے۔ ہموگلوبن کم ہو جاتا ہے۔ اور خون کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ نبض تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن بخار قبضہ تیز رہتا ہے۔ نبض اتنی تیز نہیں رہتی۔

نبض کے دو ضربات ہوتے ہیں۔ یہ دو ضربات کسی دوسری شدید بیماری میں دیکھنے میں نہیں آتے، مرض بڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ نبض ترتیباً رپتی اور تیز ہوتی ہے۔ مرض رفع ہونے کے وقت مریض کی طبعی حالت درست ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کسی دوسرے مرض میں نبض کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ دل کی رفتار بھی کسی مرض میں بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ خون کا دباؤ آہستہ آہستہ کم

ہو جاتا ہے۔ معمولاً دل کی آواز میں کوئی خرابی نہیں محسوس ہوتی۔

پیر کی درد یوروں سے خون کا دباؤ کم ہو کر گرمی ہونا۔ سردی ہونا۔ درد، آماس، وغیرہ بھی دیکھے جلتے ہیں۔

ٹائیفائیڈ میں شروع ہی سے بھوک گھٹ جاتی ہے۔ زبان پر سفید موٹی تہہ جمی رہتی ہے۔ مرض کی حالت میں زبان اکثر تر دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آخر حالت میں زبان خشک رہتی ہے، زبان پر بھورے رنگ کی تہہ جمی رہتی ہے، ہونٹھ اور مسوڑھے پر میل کی تہہ جم جاتی ہے۔

کرنول کی گلی میں آماس، اور سوزش اکثر ہوتی ہے۔ متلی اور قے کسی کسی کو ہوتی ہے۔ بنیل تین تا فیصدی مریضوں کو بیماری کے پہلے ہفتہ کے آخر میں یا شروع دوسرے ہفتہ میں پٹے دست آنے لگتے ہیں۔ برازدانہ دار، پتلا اور بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ مریضوں کو قبض رہتا ہے۔ سات فیصدی مریضوں کو دوسرا ہفتہ ختم ہونے سے چوتھے ہفتہ کے شروع تک آنت میں زخم ہو جاتا ہے۔ جس سے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ خون نہایت بد علامت ہے۔ اس وقت تک اکثر مریضوں کی نبض خراب ہو جاتی ہے۔ اور گرمی جتنی چاہیے اس سے گھٹ جاتی ہے۔ اور سردی کی حالت آجلنے کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور مریض مر جاتا ہے۔ نفخ، شکم، اور پیٹ میں داہنے طرف تراقر کی آواز اکثر ہوا کرتی ہے۔ پیٹ میں درد اور اینٹھن رہتی ہے، انٹریوں کے اس زخم ہی کی وجہ سے مریض کی تہائی حصہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر تیسرے حصہ میں ہوتا ہے۔

یکایک پیٹ میں خاصکر جگر کے نیچے کے حصہ میں اکڑن کا درد دبلانے سے درد محسوس ہونا۔ پیٹ کے عضلہ کا اکڑنا۔ حرارت بڑھ کر یکایک گھٹ جانا وغیرہ آنتوں میں سوراخ ہونے کے علامات ہیں۔

متلی بڑھ جاتا ہے؛ لیکن جگر میں کوئی خاص قابل بیان علامت نہیں محسوس ہوتی۔ مرض کے شروع حالت میں اکثر شکم سے خون

نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ انتہائے شیب (BRONCHITIS) اور برانکو
 نمونیا بھی اکثر ہو جایا کرتا ہے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں یہ نمونیا ہوتا ہے۔
 خون ملی کھانسی یا پھیپھڑی بھی کسی کسی کو ہو جایا کرتی ہے۔
 ٹائیفائیڈ کے ساتھ گلے کی اکرن، گردن کا پیچھے کی طرف جکڑ جانا۔
 روشنی کی برداشت نہ ہونا۔ درد سبز درد عصبی وغیرہ، خرابی دماغ کے
 علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ بیک بک کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ہر
 ایک قریب المرگ مریض میں سراسامی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن معمولاً
 آہستہ آہستہ بڑبڑانا، رات کے وقت بیک بک کرنا۔ انگلیوں کا پھڑکنا۔
 بستر کی چادر نوچا وغیرہ علامات دکھائی دیتے ہیں؛ پیشاب رگنا۔
 یا بہت پیشاب ہونا بھی علامات ہو سکتے ہیں۔

خاص علامات:- بخار متواتر بنا رہنا۔ ناک سے اخراج خون؛
 آہستہ بخار بڑھنا۔ بہ نسبت صبح کے شام کو بخار زیادہ ہونا۔ نبض کا ایک
 دو ضربات، خون میں سفید ذرات کا برہ جانا۔ خون بول و براز، اور
 پسینہ میں ٹائیفائیڈ بے سیس کا ہونا۔ اس کے خاص علامات ہیں۔
 نتیجہ:- فیصدی ۵ سے ۵۵ تک مریض مر جاتے ہیں دماغ، شانہ، اور دل پر
 مرض کا حملہ ہونے سے یکایک موت آ سکتی ہے۔ بہت زیادہ گرمی، بکواس،
 نفخ شکم، انٹسٹائن سے خون گرنا۔ آنتیں پھٹ جانا وغیرہ علامات بد ہیں۔

حفظ بالقدم:- ٹائیفائیڈ بخار، جس وقت وبائی صورت میں پھیلا
 ہو تو، مکان کو خوب صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ پانی کے نکلنے کا پورا پورا
 بندوبست رکھنا چاہیے؛ پانی جو شش دیکر پینا چلیے۔ کھانے کی چیزوں
 پر مکھی نہ بیٹھنا چاہیے۔ یا اگر دو غبار گرنے نہ پائے۔ اسکو نظر رکھنا چاہیے
 سڑی چیزیں کھانا، زیادہ کھانا۔ بہت زیادہ محنت اور رات
 میں جاگنا۔ یہ سب ترکیب کر دینا چاہیے۔ مریض کو علیحدہ مکان یا
 رکھنا اور تھے بول و براز دور گاڑ دینا اور تیمار داروں کے علاوہ اور کسی
 کو اس مکان میں جہاں مریض ہونہ جانے دینا چاہیے۔

علاج۔ دوا کی نسبت غذا پر زیادہ نظر رکھنا ضروری ہے۔
 مریض کو روشنی، اور ہوا سے پرکرم میں صاف ستھرے بستر پر سلا نا چاہیے۔
 بستر کے چادر کے نیچے آئل کلا تھ، یا پھیلا رکھنا چاہیے۔ پتلا خوب پکا ہوا اور آسانی
 سے ہضم ہون والا کھانا ہونا چاہیے۔ پانی خوب پلایا جاسکتا ہے۔ چھینا کا پانی۔
 (پھیلا رادودھ کا پانی) گلو کوز واٹر۔ مصری ملا کر جوش دیا ہوا پانی یہ سب
 ہلکی غذا میں ہیں۔ منہ اور زبان خوب صاف کر دینا چاہیے۔ پشت پر بیچ
 بیچ میں بورک ایسڈ لگانا چاہیے۔ اس سے بستر کا زخم نہ ہوگا۔

آنٹوں کے پھٹ جانے پر سرجن (جراح) کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ثابت ہوئی ہے۔

ایٹک ایسڈ۔ ۶۔ ۳۔ ہلکا بخار۔ رات، میں پسینہ، تیز پیاس،
 پیشاب کی زیادتی، بہت تپنے دست، زیادہ کمزوری اور سستی۔ بکواس۔
 نفخ شکم، گہری نیند اور بیچ بیچ میں بکنا۔

ایلو مین۔ ۶۔ ۳۔ تپنے دست، خون ملا بدبودار دست، پاخانہ
 کے ساتھ بہت جھسا ہوا خون۔

اگاری کس۔ ۶۔ ۳۔ ہاتھ و پیروں میں اکرٹن، جلگئے، جھوٹے بک
 بک کرنا۔ سونے میں بک بک نہ کرنا۔ بستر سے بھاگنے کی خواہش۔

ایمون کارب۔ ۶۔ ۳۔ قوت زلیست کی کمزوری، بستر کا زخم۔
 پیشاب میں بدبو، ناک، مسوڑھے یا انٹریوں سے اخراج خون۔

ایس۔ ۶۔ ۳۔ آہستہ آہستہ بک بک کرنا۔ زبان اور ہونٹ
 پر چھالے کی طرح دانے، زبان باہر نکالنے پر کانپنا۔ کچھ دیر عظم ٹھٹھ
 کر چھنا۔ (یہ دماغ میں پانی جمع ہونے کی ایک علامت ہے۔)

آخر میں گہری نیند جسم کے کسی حصہ میں سوزش محسوس ہونا۔ اور قریب
 قریب ہ گھٹنہ بھوک نہ لگنا۔ آہستہ آہستہ کچھ بکے رہنا۔ لیکن پیاس تیز
 بے خبری سے پیشاب ہونا، بدبودار پا سٹھنا، پیشاب پسینہ نہ نکلنا
 آنکھ کے اوپر کی پلک میں آماس

آرنیکا۔ ۶۔ ۲۰۰۔ مرض کی شدید حالت میں بدبو دار۔ تیلے دست،
مستی، کمزور ہونا۔ مجبوراً سو جانا پڑتا ہے۔ بستر خواہ کتنا ہی ملائم ہو لیکن
مریض کو سخت محسوس ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بار بار کروٹ بدلا کرتا ہے۔
تمام جسم میں کچل جلنے کی طرح درد، جگہ جگہ پر چوٹ کے ایسے نشانات بے ہوشی
آہستہ بکواس پوچھنے پر ٹھیک جواب دیتا ہے لیکن فرد ای لا علم ہو جاتا ہے۔
اور فضول بکا کرتا ہے پوچھنے پر یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوں، لیکن حقیقت میں
اسکو تکلیف رہتی ہے۔ انتڑیوں سے خون گرنے کی اچھی دوا ہے۔ بخیری میں پیشاب
زبان کے درمیان بھوری تہہ جی ہوتی۔ منہ میں بدبو۔

آرسنک۔ ۲۰۰۔ مرض کے شروع سے آخر تک اس کا استعمال
ہو سکتا ہے۔ بہت مستی، کمزوری، بے چینی، اور موت کا خوف، داعی،
بے چینی میں جسمانی کمزوری کا درجہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ تمام جسم میں
سوزش اور علین دوپہر اور آدھی رات میں بخار اور اور دوسرے
علامات برص جلتے ہیں۔ تیر پیاس، ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے۔
دانت اور ہونٹھ پر میل کی تہہ جم جاتی ہے۔ منہ میں زخم اور اس زخموں
سے آسانی سے خون نکلتا۔ سونے میں خواب۔ بستر پر پڑے پڑے زخم۔ بہت
لوگوں کی رائے ہے کہ مرض کی شروع حالت میں ایکون اور آرسنک کا استعمال
نہ کرنا چاہیے۔ پانخانہ میں بدبو دار اور رنگ میلا۔

آرم ٹریٹمنٹ ۶۔ ۲۰۰۔ آہستہ آہستہ یکن۔ متواتر ناک اور
ہونٹھ نوچنا۔ ناک اور ہونٹھ اس وقت تک کہ بیدا کرتا ہے، جب تک
خون نہ نکلے اور کی پلک کا پھر کرنا۔ بستر کی چادر۔ نوچنا۔ منہ، خشک
پیشاب رکھا ہوا۔ ان علامات کے ساتھ آخری حالت کی یہ اچھی دوا ہے۔

ہیٹشیا۔ ۱۔ ۲۰۰۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مرض کے شروع سے
آخر تک اس دوا کی نیچی طاقت کے استعمال سے مریض کو شفا ہو جاتی
ہے۔ اور کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا مرض بڑھتا نہیں
ہے۔ ٹائیفائیڈ یا خراب بخار کی شروع حالت میں چہرہ اور اس گرمی، نیند،

آہستہ آہستہ بک بک کرنا۔ ہونٹھ اور دانتوں پر کالی تہہ بھی ہوتی، آہستہ کو اس کچھ لو جھنچھن پر نیند سے جاگ کر جواب دینا شروع کرتا ہے۔ لیکن پورا جواب ختم کرنے کے پہلے ہی پھر نیند میں ڈوب جاتا ہے، بول و برازا پسینہ اور منہ میں بہت زیادہ بدبو، زبان خشک پھٹی، زبان کے درمیان داغ، چہرہ روکھا صرف تیلی چیزیں نگل سکتا، خیال کرتا ہے کہ اسکے جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہیں۔ ان کے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ کسی طرح سوے لیکن جسم کے ان حصوں میں جو بستر سے لگے رہتے ہیں، زخم کی طرح درد اُگڑنا محسوس ہوتی ہے۔ بستر پر ایک طرف پڑے رہنے سے زخم ہو جاتا ہے۔

بسیلا ڈھونا۔ ۶۔ ۲۰۰۔ زور زور سے بکنا۔ مارنا چھینا۔ چلانا، ہڈیاں دباغ میں خون کی زیادتی۔ آنکھ سرخ و گرم، ہاتھ پیر ٹھنڈے درد سر، آنکھیں پھیلی، نبض موٹی اور سخت، خوفناک جاندار یا بھوت و پریت وغیرہ خواب میں دیکھنا۔ کپٹیوں میں تپ سکن،

براہونیا۔ ۶۔ ۲۰۰۔ آہستہ آہستہ بکنا۔ مریض بکنے میں دن بھر کے کام کا جبر چاکرتا ہے، خوف کھاتا ہے، درد سر۔ جیسے پیشانی پھٹ جائیگی۔ آرام سے کسی اور حرکت سے زیادتی، تیر پیاس، زیادہ دیر بعد بہت مقدار میں پانی پینا، قبض، خاموشی پڑے رہنے سے اچھا رہتا ہے۔

کاربووج۔ ۳۔ ۲۰۰۔ مریض کے آخر حالت کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔ جب مریض کی آنکھیں اور منہ نیلا ہو جائے۔ نبض ڈوب جاتی ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پسینہ نکلے۔ لگتا ہے۔ مریض ناک اور منہ کے پاس نیکھا جھلنے کو کہتا ہے۔ گلا گھر گھراتا ہے۔ آنکھ اور چہرہ دھنس جاتا ہے۔ پیٹ پھول کر آوارہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح جب موت کے علامات

پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں کاربووج نے بے شمار مریضوں کی جان بخشی کی ہے۔ بدبو دار پائخانا، منہ میں زخم، بستر کے زخم (بستر پر ایک طرف پڑے رہنے سے زخم) وغیرہ خون خراب ہو جانے کے علامات میں بھی یہ خوب کام کرتا ہے۔

کلیر یا کارب ۳۰۰۔ ۳۰۰۔ مریض کی کل جسم میں شروع حالت میں جسم میں خاصہ پیشانی میں پسینہ، تکیہ تر ہو جاتا ہے۔ پسینہ میں ترشی ہو جیند نہ آتا۔ بار بار مریض کا حملہ۔

جائنا ۴۰۰۔ ۴۰۰۔ ٹائیفائیڈ، ملیریا، بخار، سستی، سر میں جکے نفع شکم، دست آنا۔ تلی کا بڑھنا۔ نمکینی، براز کے ساتھ انٹریوں کے زخم کی کوجہ سے خون کا اخراج۔

سنا۔ ۳۰۰۔ ۴۰۰۔ اگر گرم کے علامات موجود ہوں، اور دوسری منتخب دوا سے امید کے موافق فائدہ نہ ہو تو یہ ایک بہترین دوا ہے۔ خاصہ لڑکیوں کے بیماری میں،

کو لچیک ۴۰۰۔ ۴۰۰۔ سر میں سرد پسینہ، سانس کی آمد و رفت سرد۔ چہرہ بگڑا۔ کھانے کی چیز دیکھنے یا اس کی بو سے متلی۔ غذا اچھی نہ معلوم ہو۔ پیٹ میں بہت زیادہ ریاح جمع ہونا۔ پیٹ میں آرٹن۔ پیٹ گرم لیکن ہاتھ پیر سرد۔ پانچا نہ ہونے کے پہلے پیٹ میں درد۔

کروٹیس ۳۰۰۔ دل کی خرابی، آنت میں زخم اور ناک مٹھ مقعد اور پیشاب کے راستہ۔ خون کا اخراج ہونا، پانچا نہ پتلا۔ سیاہ بدبودار، یکایک حالت خراب ہو جاتا۔

ڈیجی ٹیکس ۴۰۰۔ ۴۰۰۔ اندرونی سردی۔ لیکن یاہری گرمی، نبض کمزور، بقیاعده، معمولی حرکت سے محسوس ہو کہ قلب کا فعل بند۔ ہو جائے گا۔ اور خاموش بیٹھنے رہنے سے کمی متلی اور تھک، وغیرہ۔

لو کے لیس ۴۰۰۔ ۴۰۰۔ ٹائیفائیڈ، ملیریا، بخار، سستی، اسہال، یو پیٹو پر ۴۰۰۔ ۴۰۰۔ صفرار کی وجہ سے نازی بخار۔ ملیریا، بخار، آہستہ آہستہ اگر ٹائیفائیڈ کی صورت اختیار کرے تو یہ ایک بہترین دوا ہے، تمام جسم میں درد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ بخار بڑھنے کے وقت تیز پیاس۔

جلیسم ۴۰۰۔ ۴۰۰۔ بخار محسوس ہوتے ہی خوفناک کمزوری سستی،

گہری نیند بے رونقی کی کیفیت، آغاز مرض سے اقتدا تک دکھائی دیتی
 دیتی ہے۔ آنکھ و منہ خون کی زیادتی کی وجہ سے تھمایا ہوا۔ حرکت کی طاقت
 نہ رہنا۔ اعصاب کے مست پڑ جانے کی وجہ سے مریض خواہش کرنے پر
 پر بھی اسے جسم کو ہلانہیں سکتا۔ زبان باہر نہیں نکال سکتا۔ زبان بالکل
 مست پڑ جانے کی وجہ سے آواز بالکل نہیں کر سکتا۔ صفرار ملا گندا یا لیسدار
 دست، پیشانی کے پچھلے حصے میں درد۔ ڈر کر یا بیکایک دانے دب کر مرض پیدا
 ہو جانا (اگنے) ایکون آر سے نکم، کافیا وغیرہ اسکی ایک چھی دوا ہے۔
 ہیمیلی بورس - ۶ - ۲۰۰ - ۴ بجے شام سے ۸ بجے رات تک۔

گرمی یا بخار بڑھا (لاسیکو) دل بیٹھا ہوا۔ معمولی باتوں میں رنجیدہ ہو جانا۔
 اور سمجھانے سے اور بھی غصہ ہونا۔ بے ہوشی۔ سوال کرنے پر آہستہ آہستہ
 جواب دینا۔ یکایک چھینا، نظر کنڈ آنکھ کی پتلی پھیلی ہوئی۔ روسخی میں
 سکرطی ہمتیں۔ ایسا منہ چلاتا ہے گویا کچھ چاہتا ہے۔ متواتر ہونٹ اور ناک
 کریدنا۔ (ہمیشہ رہنے کی حالت میں ارم کرم، کی وجہ سے سہنا۔ پیشانی
 تکیہ پر رکھ کر ادھر ادھر بلانا۔ اور ہاتھ سے پیشانی ٹھوکانا۔ بے خبری سے
 ملا دست، سیاہ رنگ کا کھوڑا پیشاب یا پیشاب رکنا۔

بالوسیاس - ۴ - ۲۰۰ - آخری حالت میں گہری نیند۔ لیکن ٹھکانے
 پر ٹھیک جواب دیتا ہے۔ مریض کے دل میں شہات، بھوت، پریت،
 وغیرہ کے خواب دیکھتا۔ جاگتے ہی ایک ایک شہدہ کرنا۔ کوئی شخص موجود
 نہیں ہے۔ لیکن اس کی موجودگی سمجھ کر اس سے بات چیت کرنا۔ جسم کا
 کپڑا پھینک دینا۔ ننگے ہو جانا۔ متواتر آہ تناسل پر ہاتھ رکھ رہنا۔
 بد اخلاقی کی باتیں کرنا۔ بغیر لوے رہ نہ سکتا۔ بے خبری میں پانچانہ و پیشاب
 بستر کی چادر نوچنا اور جسم کے کپڑے نوچنا، دانت کڑکڑانا۔ پٹھے پھڑکتے
 ہوں۔ تنہائی میں ڈر محسوس ہو، دل میں سوچتا کہ کوئی نہ ہر نہ
 کھلا دے۔ کوئی شخص نہ ہر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ متواتر
 بکتا رہے۔ بے سلسلہ بات چیت کرنا۔

اگیشیا۔ ۳۰۔ ۴۰۰۔ محبت میں نا اُمیدی یا خوفناک رزخ کی وجہ سے بیماری۔
گہری سانس لینا۔ سینہ خالی محسوس ہونا۔ معمولی سی باتوں میں تکلیف محسوس
ہونا۔ وغیرہ ذہنی علامات میں خاصکر مفید و کار آمد ہے۔

اپیکاک۔ ۶۔ ۴۰۰۔ کسی مرض کی ابتدائی حالت میں جلن، بھوک،
ذکنا، بے چینی، ہلکا بخار موجود رہے تو یہ ایک اچھی اور کامیاب دوا ہے۔
مرض کی شروع حالت میں تلی، تھ، صفراوی دست، پیٹ میں
ریاح جمع ہونا۔ اور درد سر وغیرہ علامت میں مفید ثابت ہوا ہے۔

لیکسس۔ ۳۰۔ ۴۰۰۔ نیند کے بعد تمام علامات کا بڑھ جانا۔ جسم
میں حرارت، بخار، ہلکی، تالو میں جلن، کل جسم میں خاصکر گلے میں چھوٹا۔
برداشت نہ ہونا۔ گلے پر کیپٹر نہیں رکھا جاسکتا۔

دم رکنے کی طرح محسوس ہونا۔ لگاتار گڑ بڑ۔ بے تخی باتیں۔
انٹریوں کے زخم سے اخراج خون، مسحتی۔ جڑے ہل جانا۔ زبان،
خشک و سیاہ، زبان کا باہر نکلنے پر کاہنا۔

لائیکو۔ ۳۰۔ ۴۰۰۔ مرض کے تیسرے ہفتہ میں نفخ، شکم،
ہڈیاں، بستر نوچا۔ پیٹ گڑ گڑاتا۔ پیشاب، سرخ تہ نشیں ہونا۔ سست پیرا
رہنا۔ سانس کی آمد و رفت میں آواز (انیم ٹارٹ) ادیم، سانس کی آمد
ورفت میں ناک ہلنا تیسرے پہر ۴ بجے سے ۸ بجے تک اہل علامات کا بڑھنا، داہنے
طرف مرض کا زیادہ حملہ ہونا۔ ان سب علامات میں خاصکر مفید ہے۔

مارک سول۔ ۳۰۔ ۴۰۰۔ زبان پر گاڑھی زرد تہ جی ہوئی ہے۔ زبان تر، لیکن
پیاں کا رہنا۔ منہ میں بدبو دار پسینہ، لیکن پسینہ نکلنے سے بھی کم نہ ہونا۔

میوور یا ٹیک ایسٹر۔ ۴۰۔ ۴۰۰۔ مسحتی بے رد تھی، ٹھنڈا پسینہ۔
جڑے ٹنگ پڑنا۔ بستر پر اوپر سے نیچے کھسکتے جانا۔ بے ہوشی، زبان خشک۔
اور پچشیں بے خبری میں پاخانہ، پیشاب ہو جانا۔ متواتر بستر پر اوپر سے نیچے
کی طرف کھسک جانا۔ نوبتی حالت۔

نائیٹرک ایسڈ۔ ۳۰۔ ۴۰۰۔ انٹریوں کے زخم کی وجہ سے بہت

زیادہ چمک دار، سُرخ خون کا اخراج، پیلا، سبز پپ و خون ملا بدبودار اُچھا۔
 پیشاب میں گھوٹے کے پیشاب کی طرح بہو۔ پیٹ میں اکڑن بستی۔
 نکس و امیکا۔ ۶۔ ۲۔ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ صفرا ملے تیلے دست یافیں،
 چڑھڑا مزاج، شب بیداری اور ثقیل غذا کی وجہ سے بیماریاں علامت پر
 دھیان رہتا ہے۔ کمر میں درد، مریض جسم کو ڈھکے رکھنا چاہتا ہے۔
 ادھیم ۶۔ ۲۔ گہری نیند، نیند سے جگایا نہیں جاسکتا۔ سانس کی
 آمد و رفت میں گھٹا گھٹا، جسم پر گرم پستیا، خچلے جڑے کا لٹکنا۔ چہرہ سیاہ
 پیٹ میں نفخ، بے خبری میں زیادہ پیشاب ہونا یا پیشاب رکنا نصف کھلی
 آنکھیں، بستر کی چادر نو چھتا۔ وغیرہ۔

فاسفورس۔ ۳۔ ۲۔ پیاس، ٹھنڈا پانی پینے سے کمی۔ تمام جسم
 میں جلن بستی، پیشانی سینہ اور پیٹ خالی محسوس ہونا۔ پانی پینے کے
 کچھ دیر بعد تھ، اسہال، براز میں ساگو دانہ کی طرح چیز، انٹریوں سے
 خون کا اخراج، ٹائیفائیڈ۔ بھنا کے ساتھ منو نیا۔

فاسفورک ایسڈ۔ مریض کو شروع سے آخر تک اس دوا کی ضرورت
 ہو سکتی ہے، آنکھ کے کونے میں داغ، مُردہ کی طرح پڑے رہنا۔ انٹریوں سے سیاہ
 خون کا اخراج، سوزانی نم۔ ۳۔ ۲۔ اگر منتخب دوا سے اُمید کی موافق فائدہ نہ ہو۔
 پلسا ٹیلا: تیل یا گھی کی بنی ہوئی چیزیں کھانسی وجہ سے بیماری پیاس نہ ہونا، جسم
 کے ایک طرف گرتی، دوسری طرف ٹھنڈک، تیلے دست، ایک مرتبہ کا پائٹھانے دو مرتبہ
 مرتبہ کے پائٹھانے مختلف ترشیں ڈکاریں۔ متواتر علامات کا بدلنا۔

رٹا گس: کسی نئی بیماری میں اگر ٹائیفائیڈ کی علامت ظاہر ہو تو یہ بھی
 دوا ہے۔ بے صبری اور درد۔ حرکت سے کمی: نرم بستر پر برابر کر دٹا ادھر
 ادھر ہاتھ رہنا۔ مستعد اور ہونٹوں پر چھپا پے کی طرح دالنے
 ٹیٹرم میٹور: رات میں ڈرنا۔ یا تنہا نہ رہ سکتا۔ یہ ڈر کہ کوئی شخص زہر
 زہر کھلا دیگا۔ زبان خشک زخمی، درمیان میں میلی دانت کا داغ پڑنا۔ لیکن آگے کا
 مثلث نما حصہ سُرخ، مرض کے شروع ہی سے تیلے دست بستی بے خبری سے

پانچنانہ ہو جائے۔

سٹر امونیم۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ ہوش نہ رہنا۔ مریض ہاتھ پیر سکڑ کر سونا پسند کرتا ہے۔ نیچے بعد دیگرے (ایک کے بعد دوسرا) بکنا اور تہمت لگانا۔ ہاتھ پیر کو دانت سے کاٹنا۔ اور دوسروں کو مارنا چاہتا ہے۔ گفتگو سخت متواتر تکسب کیا کرتا ہے۔ روشنی اور انسان کے سامنے رہتا چاہتا ہے بکنے کے وقت دوسروں کو گالی دیتا ہے۔ گانا ہے۔ شعر بتاتا ہے۔ ہنسا ہے یا عرض معروض کیا کرتا ہے جھوٹے اور خوفناک خواب دیکھ کر جاگ اٹھتا ہے۔ سوچتا ہے کہ وہ دو حصہ میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یا پلنگ پر آڑے سویا رہتا ہے۔ آنکھیں پٹی، تتلا کر بولتا ہے۔ درد نہیں رہتا۔

سلفر۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ جب کسی دوا سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ صبح تپے، دست آتے ہیں، ہاتھ، پیروں میں جلن، مقعد کی کھال اُدھر جانا۔ زہر سوراخ کا مزاج، وغیرہ۔

سیر بنتھنا۔ مرض کے دوسرے درجہ میں پیٹ میں بہت زیادہ ریاخ۔ کل پیروں میں درد، چہرہ سرخ، زبان چکنی۔ پیشاب کرنے کے وقت جلن، پانچنانہ، پیشاب میں بدبو۔ خون ملا پیشاب، یوورکیولاٹیم، ۳۰۔ ۲۰۰۔ منتخب دوا سے فائدہ نہ دکھائی دینے سے، اور مریض کی خاندانی تاریخ میں دق کے علامات رہتے ہیں۔

ایک خوراک خاص طور سے فائدہ مند ہے۔

وراٹرم البم۔ ۶۔ ۲۰۰۔ دست و قے کے ساتھ مرض کی شروع ہاتھ پیر کھنڈے، سرد پسینہ، نبض کمزور۔ آنکھ، منہ جانا۔ سستی، کھنڈا پسینہ، سر میں کھنڈا پسینہ، چہرہ عمکین، پیاس وغیرہ علامات کی بہترین دوا ہے۔ زنکم میا لیکم۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ متواتر پیر ملنا۔ بے ہوشی رگ رگ کر چلنے والی کمزور نبض، نیچے کا جیڑا لنگ آنا۔ متواتر ادھر ادھر سر ملانا۔ چہرہ اداس، کل ریرھ میں جلن۔ ٹائیفا لڈیم۔ ۲۰۰۔ مرض کے شروع سے آخر تک اس دوا

بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ شبہ ہوتے ہی کہ مرض کی شروعات ہوئی ہے۔ اس دوا کی ایک ہی خوراک دینا چاہیے۔ جہاں یہ بیماری ہو وہاں کسی کو بخار آتے ہی یہ دوا استعمال کرانا چاہیے۔

بستر کے زخم :- بہت دنوں تک بخار میں پڑے رہنے کی وجہ سے مریض کے جسم میں زخم ہو جاتا ہے۔ اس کا نام بستر کا زخم (BED SORES) ہے۔ ایکس ۶۔ استعمال کرنے سے اور پلٹرا سٹس (۱)۔ ہفتہ چالیس گنا صاف پانی) یا کلینڈیولا (۱۔) ہفتہ صاف پانی) عرق (LOTION) کا بیرونی استعمال کرنے سے بستر کا زخم جلد اچھا ہو جاتا ہے۔

غذا وغیرہ :- مرض کے وقت ٹھنڈا پانی، آتش جو، ساگو، جو کا مار، اراروٹ دینا چاہیے۔ پتلے دست آتے ہوں، تو پھارے دودھ کا پانی (نیٹے توڑ (WHEY) اچھی غذا ہے؛ اکثر مریض کو شروع سے آخر تک توڑ (چھانے کا پانی) کے علاوہ اور کچھ نہیں دینے کی ضرورت ہے۔ ہو جائے تو پلازمن اراروٹ (PLASMON ARROWDOT)

یا مارگھیلی یا سنگی مچھلی کا شوربہ یا تھوڑا دودھ دینا چاہیے۔ مریض کو تنہا نہ چھوڑنا چاہیے۔ مریض کے کمرہ میں ہوا کی آمد ہونا چاہیے۔ اور دھوئی یا کالی کافی جلانا چاہیے۔ مریض کے کھانے کی چیز اور دوائی دوسرے کمرہ میں رکھنا چاہیے۔ مریض کو مضبوط رکھنے کے لئے شراب یا گوشت یا کوئی دوسری تیز دوا دینے کی ضرورت ہے دینے سے نقصان ہونے کا خوف ہے۔

مریض کے کمرہ میں بھڑنہ ہونی چاہیے۔ مریض کو بالکل آرام دینا چاہیے اور مناسب صحت کے اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے۔

دوسرے بخاروں کی دوائیں اور دماغ کے غلاف کی جھلی کی سوزش، سرسام (MENINGITIS) اور متحدی اور سری امراض اور ان کو رفع کرنے کا طریقہ ملاحظہ ہو۔

حمی مطبقہ متراکدہ۔ ہندیائی بخار (TYPHUS)

یہ بہت پھیلنے والا اور فحوت دار مرض ہے جس میں ایک ایک سردیوں ہو کر تیز بخار ۱۰۲ سے ۱۰۵- (گرہی) اور اس کے ساتھ ہی درد سر شروع ہوتا ہے۔ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس کا سارا جسم کالا یا نیلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ روز خوب بخار بڑھ جاتا ہے اور تب مریض بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ۵-۶۔ دنوں میں جسم پر بیگنی رنگ کے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں۔ نہ کبھی کبھی ان دانوں سے خون نکلتا ہے) اس بخار کی میعاد دو ہفتہ ہے۔ اس مرض کے ساتھ پھیپھڑا ماؤف ہو جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری بڑھ گئی ہے۔

علاج مختصر:- تیز بخار میں (ایکون۔ برائی اونیا۔ جلس۔ بیٹیا۔) دماغی علامت میں، رس، ہایوسیا مس۔ اسٹرامونیم۔ ڈیٹریم وڈ۔ ٹیمتھنا۔ پیشاب کی خرابی سے پیدا شدہ (نیند نہ آئے تو کافیہ۔ بل، ہمالس) بے ہوشی کی حالت میں (اوپیم۔ رس) گہری سستی میں؛ (ایڈفاس) آرس، ایڈمیور، پھیپھڑا ماؤف ہونے میں (ایکونائٹ۔ برائی اونیا۔ فاس فورس) خون خراب ہونے میں (آئرس۔ کاربودج) رسٹاکس۔ بیٹیا۔) شفا کی طرف رجوع ہونے پر، (ایڈفاس۔ ایڈنائیٹرک۔ چائنا سلف۔ سو رائی نم، مفید و کارآمد ہیں۔

چند خاص ادویات

رسٹاکس۔ ۳۔ ۳۰۔ معمولی ہندیائی بخار میں کوئی خاص علامت نہ ہوں۔
آرنیکا۔ ۶۔ ۲۰۰۔ گہری غفلت۔ بیگنی رنگ کے دانے۔
لیکس۔ ۶۔ ۳۰۔ خون خراب ہونے کی علامت میں۔
ایگاریکس۔ ۳۰۔ بہت بچینی۔ چھوٹے کاسکڑنا اور کانپنا۔
(سر سامی بخار، انتہا شب التشعب، اور ذات الرتہ کی دوا)

اور خارجی علاج کا بیان ملاحظہ ہو۔

قحط کا بخار - جمی قحطیہ

(RELAPSING FEVER)

مرض چچک کی طرح یہ بھی چھوٹ دار ہے۔ اسپائی روکٹیا اور بریز (SPIROCHAET & OHERNIEIER) نام کا جرم اس مرض کا خاص سبب ہے، ہندیانی بخار کی طرح اس میں بھی یکایک بدن میں کچھ سردی لگ کر تیزی سے زود کا بخار آ جاتا ہے۔ شروع میں چھ سات روز بخار رہتا ہے، اسکے ہفتہ بھر بعد، بخار نہیں رہتا۔ بخار اترتے وقت، بہت اسپینہ نکلتا ہے۔ اس طرح چار پانچ مرتبہ بار بار بخار کا حملہ ہوتا ہے اور اترتا ہے اس کا نام قحط کا بخار، یا لوٹنے والا بخار (بار بار آنے والا بخار) جسم، ہاتھ پیر، اور سر میں بہت تیز درد پیاں، ترش بدبودار اسپینہ، کانور وغیرہ اس کے خاص علامات ہیں۔

علاج

براہونیا - X^۳ - ۶۔ سر میں درد، جسم اور ہاتھ پیر میں درد حرکت سے بڑھتا ہے۔
 اپیکاک - X^۳ - ۶۔ قے یا منہ سے۔
 آرٹک - X^۳ - ۳۔ تیز اور کمزور نبض، گہری سستی اور بے چینی۔
 بیٹیشیا - X^۱ - ۱۔ معدہ کی خرابی،
 یو پیٹھوریم پروف - X^۳ - ۲۔ ہڈیوں میں تکلیف، درد، گھٹیا کی طرح درد۔
 رسٹاکس، بے چینی، اور مریض، ہمیشہ حرکت کرتا رہے۔
 ہندیانی بخار اور سرسامی بخار کی ادویات اور معادن علاج ملاحظہ ہو۔

تمی عالیہ ڈنگو فیور - ٹی ٹوڈ بخار (DENGUE)

۱۸۷۲ء کے درمیان اور ۱۹۱۱ء کے آخر میں یہ مرض کلکتہ اور بنگال کے بہت سے مقامات میں پھیل گیا تھا۔
 گل جسم میں (خاص کر جڑوں میں) تیز درد اور خفیف جاڑے کے ساتھ ڈنگو فیور شہ دت ہو آتے۔ دیکھتے دیکھتے سر میں درد، تبھی کبھی قے،

(لرزہ) اس کے بعد جسم گرم ہو جاتا ہے (۱۰۲-۱۰۹-ڈگری تک)

جسم میں کہیں کہیں آس ہو جاتا ہے کسی کو موتیا، سیتلا، کی طرح دانے نکل آتے ہیں۔ چہرہ سرخ، بھوک کم، قبض، کبھی کبھی ریتان وغیرہ کی علامات نظر پڑتے ہیں۔ تین چار دنوں سے لیکر ایک ہفتہ۔ (کبھی کبھی تین مہینہ تک رہتا ہے۔ کبھی کبھی مرض کے شفا ہونے کے وقت وہ علامات خفیف حالت میں پھر نمودار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی گہری، سستی اور بطنی جھلیوں سے انزاج خون ہونے لگتا ہے۔ اس مرض کے سبب کافی عرصہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کسی کی رائے ہے کہ چھوٹ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تمام ممالک میں اور کل موسم میں اور سبھی حالتوں میں لوگوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔

حال میں کلکتہ کے (TROPICAL MEDICINE) ٹراپیکل میڈیسن سکول کے معلم ڈاکٹر میگا (MEGAWAT COL. I.M.S) فرماتے ہیں کہ ڈینگو بخار کے ساتھ زرد بخار کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اور (SPIROCHETES)

۱۔ کلکتہ کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایچ، ایم ڈیکٹ کہتے ہیں کہ ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے یہ رنگ کے چھتروں سے یہ مرض پھیلتا ہے۔ ان چھتروں کے جسم اور پروں میں ایک سفید ڈورا ہے۔ اس کو لوگ باگھو۔ مجھ (TIGER MOSQUINO) کہتے ہیں یہ زیادہ تر دن ہی میں کاٹتے ہیں، چہرہ بچہ، پانی کے برتن، الماری کے نیچے، چائے کے برتنوں میں یہ رہتے ہیں اور نسل بڑھاتے ہیں۔ اس لئے ان سب برتنوں کو روزانہ صاف کرنا۔ اور رات میں مسہری لگا کر سونا چاہیے۔

ہر ایک بال بچہ، اور آدمی کو ضروری ہے کہ قیام کے مکان اور محلہ کو صاف ستھرا رکھیں، فاسکر باورچی خانہ۔ پائخانہ اور پیشاب کرنے کی جگہ۔ اور کوڑا پھینکنے کی جگہ، یا مہری کا گڈھا۔ جس میں بہت عرصہ سے پیشاب وغیرہ جمع ہوتا۔ رہتا ہے اسے ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ان سب (AN S) (CESS POOL) گڈھوں میں وقت فوقتاً کراسن تین (مٹی کا تیل ڈالنا چاہیے۔)

نام کے جراثیم غالباً اس مرض کے خاص سبب ہیں۔

(INDIAN MEDICAL GAZETTE) (دسمبر ۱۹۲۳ء ص ۴۱ ملاحظہ ہو)

اس مرض کے معمولی حملہ میں اکثر دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صرف فاقہ کرنے سے بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔

علاج

مرض کے شروع حالت میں جلس، X_1 یا بیٹایا X_2 استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد یو پیٹ پرف X_3 (ٹڈیوں کے درد میں) یا سسی سی فیکو X_4 ۔ آر سس X_5 فائدہ مند ہیں اور آخر میں بہت سستی وغیرہ علامات محسوس ہوں۔ تو ایسڈ فاس X_6 یا کاربووج X_7 ، دینا چاہیے۔ کاربووج X_8 ، سرگرم لیکن اور تمام جسم سرد ہو جائے۔ ایکلناٹ X_9 مرض کے شروع میں تیز بخار۔

(۱۰ سے ۱۵) علامات میں نہایت مفید ہے۔

بیللڈونا X_{10} ۔ سرخ رنگ کے دانے یا سر میں درد۔

برائیوٹیر X_{11} ۔ جسم میں درد، پسینہ، درد سر (خاص کر سر کی پشت میں) قبض۔ بہت پسینہ۔

پوپے ٹوریم پرف X_{12} ۔ ٹڈیوں میں سخت درد ہونے پر

لیک میں X_{13} یا کروٹیل X_{14} ۔ علامات اخراج خوں میں۔

سٹاکس X_{15} ۔ دانے کے ساتھ زیادہ سردی ہونا۔ ہاتھ

پیروں کا انیٹھنا۔ یا وجع مفاصل۔

جلیسم X_{16} ۔ ہلکا بخار ہو۔ آر سنگ X_{17} ۔ اسہال میں۔

انفلوئنزا کے علامات کے ساتھ اس مرض کے علامات بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ اس لئے انفلوئنزا کے مرض کی دوا میں دیکھنی چاہئیں۔ دوسرے بخاروں کی دوا میں بھی دیکھنی چاہئیں۔

حمی صفراء زرد بخار۔ (YELLOW FEVER)

آجکل ہندوستان میں یہ خوفناک مرض اپنی حکومت کا سکہ بٹھا رہا ہے

۱۹۱۵ء میں علاج کے محکمہ کے ڈاکٹر جنرل کی خواہش کے مطابق میجر کرسٹوفارس نے کلکتہ شہر کی بہت جگہوں کے محجروں کی جانچ کر کے یہ اصول قائم کیا تھا کہ بندر، محجر، نامی ایک قسم کا محجر اس زرد بخار کو پھیلاتا ہے۔ یہ محجر جہاز اور کشتی میں بہت پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں بندر محجر کہتے ہیں۔ جب امریکہ کے نہر موسوم بہ پنا یا بنا اس وقت سے یہ محجر جہاز کے ساتھ کلکتہ میں آ پہنچے۔ زرد بخار ایک قسم کی نئی چھوت دار بیمار ہے۔ گرم ملکوں میں خاص کر دکن، امریکہ، ممالک متحدہ کا جنوبی حصہ، غربی ہند کے جزائر۔ غربی افریقہ اور بحر روم کے باشندوں میں خاص کر یہ بھاری ہوتا ہے۔ اسٹیگومیا (STEGOMIA) نام کا شاید ایک قسم کا محجر ہے جو اس مرض کا جرم، یا زہر، پھیلاتا ہے۔ اس خوفناک مرض سے ایلو پیٹھک علاج کے مطابق فیصدی ۱۵ سے ۸۵ انسان مرتے ہیں۔ لیکن ہومیو پیتھک علاج سے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرض کے درجے یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتے ہیں مثلاً

- (۱) زمانہ حضانت (PERIOD OF INCUBATION) (۲) زمانہ تپ (STAGE OF REMISSION) (۳) زمانہ انحطاط خبری (FEBRILE STAGE) (۴) زمانہ بروز الاطراف یا درجہ انتہائے مرض (STAGE OF COLLAPSE) اس کا زمانہ قیام (بخار کی حالت سے زمانہ بروز اطراف تک) سات آٹھ روز تک رہتا ہے۔

(۱) زمانہ حضانت :- تندرست جسم میں اس مرض کا زہر داخل ہونے سے ایک سے پانچ روز تک یہ زمانہ حضانت رہتا ہے۔ سستی، بھوک کی کمی اور متلی، اس کے خاص علامات ہیں۔ اسپیکٹ ۳۔ (تیز متلی ہو تو) یا آرس ۶۔ رسی زیادہ ہو۔ اس زمانہ کی خاص دوائیاں ہیں۔

(۲) زمانہ تپ :- جاڑا لگنا، لرزہ ہونا، تیز بخار۔ (جسم کی حرارت ۱۰۱ سے ۱۰۶ تک) تبض تیز، چہرہ غمگین، جسم میں بدبو۔ سر میں تیز درد۔

جسم میں جگہ جگہ درد، پیشاب: تھوڑا اور قبض، یہ اُس زمانہ تپ کے خاص علامات ہیں۔ اسپرٹ کیمفر (تیز جب نہ اور نہ زہ کی علامت میں)

ایکونائٹ۔ ۳۔ ۴۔ (تیز بخار) ہیل ۳۔ (بخار کے ساتھ تیز درد دوسرے) سیمی سی فیوگا۔ ۶۔ (جسم میں بہت درد ہو)۔ برائیو نیام۔ ۳۔ جلس ۳۔ ۴۔ ۵۔ (بخار ۳۴ گھنٹہ میں اگر کچھ بھی کم نہ ہو)۔ یا اپیکاک۔ ۳۔ (بہت تپ یا متلی) اس زمانہ کی خاص دوائیاں ہیں ۲۴ گھنٹہ سے لیکر ۶ گھنٹہ تک بخار میں مبتلا ہونے کے بعد زمانہ انحطاط جزئی آسکتا ہے۔

(۳) زمانہ انحطاط جزئی :- درد سے نجات پانے کے ساتھ بخار اُترنا۔ اُس زمانہ کی علامات ہیں: اچھی طرح تیمارداری ہونے پر مریض جلد اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا زمانہ برو الاطراف یا درجہ انتہائے مرض نہیں ہوتا۔ لیکن نیند نہ آنا۔ بد ہضمی یا زیادہ بھوک جسم کا درد ہونا۔ وغیرہ قوت حیات کے گھٹنے کی علامت اس زمانہ میں ظاہر ہونا خطرناک بات ہے۔ (کافیائیند نہ آنے کے علامات میں) عام نازک حالت (جسم زرد ہونا) آرسنک ۳۔ ۴۔ (نہایت سستی) ایک مخصوص ادویات ہیں۔ دو ایک دنوں میں یا تو مریض طاقت پا کر آہستہ آہستہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ورنہ بخار وغیرہ علامات دوبارہ ہو کر برو الاطراف یا درجہ انتہائے مرض میں آ جاتا ہے۔

(۴) زمانہ برو الاطراف یا درجہ انتہائے مرض میں۔

جسم کی جلد زرد رنگ کی، بہت تپ یا متلی لگے اور پیٹ میں جلن سیاہ تپ کچھ سیاہ خون کے ساتھ بلغم طے دست دتے سیاہ پیشاب اور غفلت کے علامات زمانہ برو الاطراف یا درجہ انتہائے مرض میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کروٹلیس۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱

چند خاص دواؤں کے علامات

روہنی کا کیمفر۔ (ایک قطرہ دنل پندرہ منٹ کے وقفے میں بخار کی حالت کے شروع میں اور بہت دیر کے لئے والا تیز جاڑا اور لرزہ کے علامات میں۔

ایکونائٹ۔ 3×4 ۔ زمانہ شب میں جاڑا لگنے کے بعد جسم کی حرارت ۱۲۔ یا اس سے بھی زیادہ ہونا جسم کھردرا اور بیض بھری ہوئی سخت اور تیز بہت پیاس، چہرہ سرخ، درد سر، یلغم اور صفرا کی تہ۔

بیلادونا۔ ۳۰۔ ۳۰۔ دماغ میں خون زیادہ ہونے کی علامت میں (جیسے آنکھیں سرخ، سر کی نسن بھری ہو اور تیز، بک بک دانت کٹ کٹ کرنے کی کوشش۔

برایونیا۔ ۴۔ معدہ کی خرابی کے علامات میں (جیسے زبان سادی، یا درد، ہونٹ خشک، قبض، قے، یا متلی، پیاس کی شدت۔
(نیم ٹارٹ ۳۔ ۳۔ سفوف۔ تکلیف دہ متلی دیر تک رہے۔

آرنک البکم ۳۔ ۴۔ (زمانہ بہ طراوت یا درجہ انتہائے مرض میں خاصکر جب خرابی محسوس ہو ایسے علامات کی یہ ایک نہایت مفید دوا ہے) منہ زرد یا نیلا، یا ناک کا اگلا حصہ تپلا اور ٹھنڈا، زبان خشک، میلی یا سیاہ۔ جلد جلد بہت سست ہو جانا۔ کھانے پینے کے بعد ہی قے بار بار، زور سے قے، موت کا خوف۔ درد شکم۔ کھوڑے مقدار میں جلن کے ساتھ، یا قطرہ قطرہ پیشاب، پیشاب میں تکلیف، جسم سرد، ٹھنڈا اور لمبا پسینہ، مثانہ یا فرج سے اخراج خون۔

کروسیکس، ۳۔ زمانہ برو الاطراف۔ درجہ انتہائے مرض میں خون کی خرابی کے علامات میں (جیسے طاقت کا گھٹنا۔ آنکھیں سرخ، ناک، معدہ۔ انٹریوں، اور ویس کے سوراخوں سے جسم کے خون کا اخراج، خون پیسہ جسم کی چمک اور آنکھیں نہ رہنا۔

لیکس ۴۔ اعصاب کی خرابی کے علامات میں (جیسے سیاہ خون اخراج خون نہایت سستی، زبان خشک، اور لرزہ دہی ہوئی، بک بک لگے

رنگ کا پیشاب، پیٹ پر کپڑا نہ رکھ سکتا۔

کیڈیم سلف ۳۔ ۳۰۔ معدہ میں جلن اور کانٹے کی طرح درد۔
سانس بند کر نیوالی متلی، تیز قے، یا پاخانے کی خواہش، سیاہ قے۔

آرج نائی ۳۔ کینتھر س۔ ۳۰x۔ (پیشاب ہونے یا پیشاب کی تکلیف)
کا فیا ۴۔ (نیند آتی ہو۔) سکیل ۳۰x۔ (راسخا ط حمل کا اندیشہ ہو) فاسفورس
۳۰ (کرومیلز، اور یکے سبب احتمال کرنے سے اگر اخراج خون بند نہ ہو۔
اور یرقان درقع ہو۔ ورمیٹرم الیم ۴۔ اگر مارک سال ۳؛ جلس ۳۔ رستاکس
سر سامی حالت میں کاربوون ۳۔ (زمانہ بروالاطراف یعنی درجہ انتہائے
مرض میں) وغیرہ اویات بھی علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔

بالوکیک، طریقہ سے علاج:۔ فیرم فاس ۱۲x۔ سفوف۔ (بخار
کی حالت میں) نیٹرم سلف ۳۔ سفوف (تو جی صمرا دی بخار میں) اور
کیل فاس ۲۰x۔ (زمانہ بروالاطراف میں بے رونقی، یا بھری مائل یا سیاہ
رنگ کی قے، اور اخراج وغیرہ علامت میں دینا چاہیے۔

علاج معاون

مریض کو خوب صاف سکھرے ایسے کمرہ میں رکھنا چاہیے۔ جہاں ہوا کی
آمد و رفت ہو، مریض کا پانچناہ پیشاب، قے، وغیرہ مکان سے دور
زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ جاڑا یا لڑہ کی حالت میں سرسوں کا
سفوف ملا کر اس میں فٹ پاتھ دینا چاہیے۔
اگر بخار خوب تیز ہو تو اس حالت میں بھی گرم پانی سے صم پونچھ دینا
چاہیے۔ اگر قبض زیادہ ہو تو صابن کی پچکاری سے فائدہ ہو سکتا ہے۔

بخار کی حالت میں پانی یا کاغذی لیون کارسب غذا کی شکل میں دینا چاہیے۔
اور بخار اتر جانے کے بعد پانی کی بارلی، چھینے کا پانی، پانی کے ساتھ غوطہ
تازہ دودھ، دیا جاسکتا ہے۔ اگر بروالاطراف زمانہ میں مریض یکبارگی
رست ہو جائے تو وسم، شیمپن برانڈی وغیرہ ٹوت لانے والی
شراب غذا کی شکل میں دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

گلیٹیوں کا بخار۔۔ حمی غددود (GLANDULAR FEVER)

یہ ایک قسم کی چھوت دار بچوں کی بیماری ہے۔ تیز۔ (۱۰-۱۲) بخار کے ساتھ گلے کا کچھ حصہ سرخ ہو جانا۔ گلا اور ناک کی گلیٹیوں کا پھولنا۔ اور درد ہونا۔ چکر اور تلی کا بڑھنا۔ بھوک نہ لگنا۔ اس بخار کے خاص علامات میں بخار بہت تھوڑے روز رہ سکتا ہے۔ لیکن گلیٹیوں کی سوجن کا بڑھنا۔ دو تین ہفتہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ کسی کسی بچہ کو یہ مرض بار بار ہوا کرتا ہے جن کو بچپن میں یہ مرض ہوتا ہے۔ بڑے ہونے پر اکثر مرض دق ہو جایا کرتا ہے۔

علاج

بخار کی حالت میں گلیٹیاں آماس کریں تو ہیلارڈونا X۳۔ جن بچوں کی پرورش اچھی طرح نہیں ہوتی یا جو موٹے ہوتے ہیں۔ اور جن کو آسانی سے پسینہ نکل آتا ہے۔ ان کو کلکیر یا کارب ۴۔ ۳۰۔ جن کو بار بار یہ مرض ہو ان کو کئی ماہ تک وقتاً فوقتاً کلکیر یا کھلاتے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بخار رفع ہونے کے بعد اگر گلیٹیاں سوجی رہیں تو فائٹوٹک X۳۔ ۳۰۔ دینا چاہیے۔ اگر پیپ بڑ جائے تو ہیسر سلف ۶۔ مواد بیکل جلنے کے بعد سلکا ۶ دینا چاہیے۔ اور کلینڈر یولا۔ (ایک حصہ، پانی، آٹھ حصہ) ملا کر دھونا چاہیے۔ مزمن مرض میں بسیلیم ۳۰۔ کیلی آیوڈاڈ ۱۔ ۲۰۰۔ کلک آوڈس X۳۔ براہ شاکار ۶۔ وغیرہ ادویات نہایت مفید اور کارآمد ہیں۔ بچوں کے کھانے پینے اور اصول صحت پر کافی نظر رکھنا چاہیے۔

خسرہ خفیہ (MEASLES)

یہ چھوت دار بیماری ہے۔ صرف بچوں کو یہ بخار ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی اسکا حملہ بڑوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہوتا ہے تو بہت تیز ہوتا ہے۔ جاڑے یا بسنت کے موسم میں یہ بیماری ہوتی ہے اس کا نہ موسم میں

مصرایت کرنے کے ۱۰ یا ۱۲ روز بعد سردی، کھانسی، چھنکیں آنے لگتی ہیں۔
 ناک سے پانی گرتا ہے آنکھیں سُرخ، اور ڈیڈائی، درد، آواز بیٹھی، کھانسی
 بھجے میں درد، پیٹھ اور ہاتھ پیروں کے درد کے ساتھ بخار شروع ہوتا ہے۔
 اس کے تین یا چار روز بعد خسرہ نکلتا شروع ہو جاتا ہے خسرہ اولیٰ
 چہرہ میں، بعدہ گردن اور سینہ میں، اور آخر میں تمام جسم میں
 نکل آتا ہے۔ تین چار روز رہنے کے بعد یہ آپ ہی آپ رفع ہو جاتا ہے
 اور اُسی کے ساتھ بخار بھی جا تا رہتا ہے۔ اگر یہ بخار یکا یک آجائے
 حرارت ۱۰۲ سے ۱۰۶۔ ڈگری تک ہو کر مرض کو بڑھادے تو اُس
 وقت مریض انٹ سنٹ باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور غفلت میں ہو جاتا ہے۔
 غذا سے نفرت، قے، متلی، قبض، یا پتلے دست، خاص کر نلی میں
 سوزش، پھیپھڑے کی سوزش، سانس میں تکلیف وغیرہ علامات دکھائی
 دیتے ہیں کسی کسی مریض کو اسہال یا پیش ہو کر اُس کی زندگی خطرے
 میں پڑ جاتی ہے۔ خسرہ کا دب جانا۔ یا بہت سیاہ یا سُرخ دانے نکلتا۔ بد
 علامات ہیں۔ (امراض متعدی اور مسری اور اُس کے دقیقہ کا بیان ملا خطہ ہوم)
علاج مختصر:- شروع بخار میں ایکون ۳X دیں اور گرم پانی سے
 جسم پونچھ دینا چاہیے خسرہ نکل آنے پر پلس، یوفریشیا (ناک اور آنکھ سے
 بہت رطوبت نکلے) دانے اچھی طرح نہ نکلنے پر، بیل (اونگھنا یا نیند سے
 چونکنا۔ پلسٹیل (معدہ کی خرابی) ایمون کارب (دوبارہ مرض کے عود
 کرنے کا شبہ ہونے پر) اور جسم کو گرم پانی سے پونچھ دینا چاہیے۔
 دانے پیٹھ جانے پر، براؤیلز، ایمون کارب، زنگم، سلفر؛
 تکلیف دہ کھانسی، کیلی بالی، اسپنج، ہیل، اپیکاک، براؤ، ائیم ٹارٹ، بیماری
 بڑھ جانے پر، کیفیر، آرس، ایڈ میور۔ فاس ہیل، رس، مفید ہیں۔
 کچھ مخصوص ادویات کے علامات

حفظ ماتقدم :- (جب خسرہ خاص طور سے پھیل چکے ہیں) مارسلینم
 ۳۔ ۴۔ روزانہ ایک مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔

ان دنوں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مکان میں کسی بچہ کو خسرہ نکلے تو جن بچوں کو خسرہ نہیں نکلی ان کو دن میں تین مرتبہ پلساٹیل ۰.۲ استعمال کرنا بہت اچھا حفظ مالتقدم کا طریقہ ہے

علاج :- معمولی خسرہ، بخار میں دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔
ماربلی نم۔ ۲۔ ۲۰۰۔ مرض کے شروع سے آخر تک یہی دوا کھلاتے رہنے سے دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاص موقعوں پر ایکونائٹ
۳۔ تیز بخار۔ بھری۔ سخت اور تیز نبض۔ بار بار چھینک، آنکھیں پانی میں ڈبڈائی ہوئیں۔ سر میں درد، خشک کھانسی؛ نکلے میں سرسراہٹ قبض؛ سینہ میں درد۔ بے چینی اور تیز پیاس۔

پلساٹیل۔ ۳۔ ۶۔ شام اور رات میں کھانسی کی زیادتی، گلے میں سرسراہٹ؛ ناک سے گاڑھا بلغم؛ یا خون گرنا۔ تپلے دست؛ معدہ کی خرابی، پیاس نہ رہنا۔ یا مقوڑی پیاس، ہم نے اپنے مطلب میں پلساٹیل کھلا کر بہت مریضوں کو اچھا کیا ہے۔ ڈاکٹر (MILLS) فرماتے ہیں کہ یہ خسرہ بخار کی سب علامتوں میں اور سردی، دست، وغیرہ کے علامات میں بہت کارآمد و نامدہ مند ثابت ہوا ہے۔

جلیسم X۔ ۳۰۔ خسرہ پیچھ جانے سے تیز بخار اور سردی وغیرہ کے علامات ہونے پر طرح سے مریض کا غمگین رہنا اس کی خاص علامت ہے۔
براؤنیا X۳۔ ۲۰۔ خشک، تکلیف دہ کھانسی؛ خسرہ کا پیچھ جانا۔
کیسلی بانکر دم۔ ۳۔ سفوف۔ کھانسی، برانکائی کس۔
آرٹک۔ ۳۔ ۱۔ ۶۔ دانے سیاہ نکلیں، معدہ کی خرابی میں یہ مفید ہے

۱۔ ملک کے بہت آدمیوں کا بیان ہے کہ جب خسرہ، چھپک وغیرہ امراض بہت پھیلے ہوں تو وہاں کے باشندوں کو کر۔ بلے کا رس پلا دینے سے اس مرض کے ہونے کا دور نہیں رہتا۔ اس کا امتحاد کرنا چاہیے۔

وراٹرم وراٹڈ ۳'X - خسرہ اچھی طرح نہ نکلنے کی وجہ سے تشخ ہو؛ اور
پھیپھڑے میں خون جمع ہونے کی علامت میں نہایت مفید ہے۔
کیمفر - ۱۔ سب جسم ٹھنڈا اور نیلا۔ بہت سستی۔ یا ضعف کی حالت
ہو۔ (ایک قطرہ بار بار کھانا چاہیے۔ ۲)

انٹم ٹارٹ مارکیم ۶؛ فاسفورس ۶؛ ساکس کی تلی یا پھیپھڑے پر حملہ ہونے پر؛
بیلادونا، ۳؛ ۶؛ نبض پر؛ اور سخت آنکھیں اور چہرہ سرخ، کھانسنے کے وقت
حنجرہ میں درد۔ آواز بیٹھی، سر گرم۔ نیند میں غرق۔ یکایک چونکتا۔

اگر آنکھ، ناک سے پانی گرے تو یوفریشیا ۳۔ قے یا متلی کے ساتھ
سبز رنگ کے صفراوی تیلے دست اور خشک کھانسی کے لئے ایکاک ۳۔ مرض
گھٹنے کے بعد خشک کھانسی موجود ہو تو فاسفورس ۶۔ تر کھانسی ہو، اور
گلے میں کھڑکڑاہٹ ہو؛ انٹم ٹارٹ ۶X۔ سفوف؛ کان کے درد میں۔

فیم فاس ۶X؛ سفوف؛ کان میں ہونے میں کلکیر یا سائیکوٹا۔ ۳X۔ سفوف
خسرہ، اچھی طرح نہ نکلے یا بیٹھ جائے تو برائی یونیا ۳،۔ مجلس ۱X۔ یا زنگم ۶۔
رات میں بہت پسینہ اور کمزوری کے علامات میں آرسن آیوڈاٹڈ ۳X۔
خسرہ بیٹھ جائے اور تشخ ہو، تو گریم ۶۔ ناک، منہ سے تیلے پانی کی طرح خون نکلتے
تو کوڈیلکس ۶۔ ہیلی بورس ۳؛ سلفر ۳؛ وراٹرم ۶۔ رشاکس ۶۔
دکھی بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دماغ کی جھٹکی کی سوزش۔
سرسام (MENINGITIS) ملاحظہ ہو۔

علاج معاون :- تھوڑے گرم پانی سے جسم دھو کر خشک
کپڑے سے پونچھ ڈالیں؛ مریض کے جسم میں سرد ہوا لگنا مناسب نہیں
ہے۔ پلاسٹیل ۶؛ کھانسنے سے یا جارحی کے استعمال سے سردی اور دست
اچھا ہوتا ہے۔ بخار کی حالت میں ٹھنڈا پانی، مصری، بارلی، اراروٹ غذا، میا۔

۱۔ ابوائن۔ کوئے، گڑ اور میٹھی کو ایک ساتھ ملا کر جارحی بنتی ہے؛ بعض
لوگ ان چاروں کے ساتھ ناک چور کی خشک پھینکی ملا دیتے ہیں۔

چیچک - سیٹلا - ماما (SMALL POX)

یہ بہت چھوٹ دارا اور متعدی بیماری ہے۔ اس کا جرم یا زہر جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے مرض چیچک ہوتا ہے، چیچک کے جراثیماتے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ خورد کی مدد سے بھی آج تک نہیں دکھائی دیے۔ اس لئے آج تک چیچک کے جراثیم کا پتہ نہیں لگا۔ ہوا اور مکھیوں کے ذریعہ یہ زہر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ (مقصود حقہ ۴) ملاحظہ کیجئے۔ ایک مرتبہ چیچک نکلنے کے بعد دوبارہ نہیں نکلتی۔ چیچک کی خاص کردہ قسمیں ہیں۔ مجتہہ چیچک، اور متفرق چیچک۔

مجتہہ چیچک: دو تین یا اس سے بھی زیادہ دنوں تک ایک ساتھ ملے رہتے ہیں تو اس کو "مجتہہ چیچک" کہتے ہیں۔ یہ دانے پک جاتے ہیں اور ان میں پیپ موجود رہتا ہے۔ چہرہ، گلا، پیشانی اور ناک کے اندر دانے نہ ہونے پر مرض مہلک ہوتا ہے۔ چیچک کا جرم یا زہر جسم میں سرایت کرنے کے عیارہ یا بارہ روز بعد بخار (جسم کی حرارت ۱۰۳-۱۰۴) آتا ہے۔ اس بخار میں بخار گرمی، کل جسم میں درد، تھوڑے وغیرہ علامات ہوتے ہیں۔ بخار آنے کے دو تین روز بعد دانے نکل آتے ہیں، اور بخار کی تیزی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پانچ چھ دنوں میں ان دانوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ اور پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور کورس روز میں بخار بہت زیادہ ہونے سے مرنے کی موت تک ہو سکتی ہے۔

متفرق چیچک

اگر دانے علیحدہ علیحدہ نکلیں تو انھیں متفرق چیچک کہتے ہیں۔ ان میں مذکورہ بالا سب علامات ہوتے ہیں۔ لیکن بخار اتنا تیز نہیں ہوتا اور یہ دانے نکل آتے ہیں۔
حفظ ماتقدم :- انگریزی علاج کے رو سے ٹیکا (VACCINATION)

لے تندرست جسم میں بھڑکے کی رطوبت یا چیچک کا جرم (زہر) اندر پہنچا دینے کا نام ٹیکا ہے۔ طریقہ سے ٹیکا لیا جاتا ہے (بقیہ ۲۴۲ پر دیکھئے)

لگانا۔ معمولاً بازو خراش کر کے چھپک کا جرم ویاں پہونچا دیا جاتا ہے لیکن سچل ہو میو پیچک معارج ویکسی نینم۔ ویریولینم، یا ایس لینڈر نیم کھلا کر ٹیکے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ میں تراش کر رکے ٹیکا لگانے سے جو فائدہ ہوتا ہے، ویریولینم وغیرہ دوا میں کھلانے سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ پہلے طریقہ سے ٹیکا لگانے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے۔ اس سے نہیں ہوتا۔

امریکہ متحدہ میں اکثر جگہ کچھ لوگوں نے نالاش تک دائرہ کر دی تھی کہ اس طریقہ سے ٹیکا نہ لگایا جائے۔ لیکن غور کرنے کے بعد طے ہوا ہے کہ دونوں طرح سے ٹیکا دینا قانوناً جائز ہے۔ انگلینڈ میں ہو میو پیچک دوا کھلا کر ٹیکا دینا قانوناً اب تک نہیں مانا گیا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی مانا جائے گا۔ ایسی امید کرنے کا سبب یہ ہے کہ ایڈورڈ ہفتم مرحوم سابق شہنشاہ ہند کو آخری وقت میں ایسی ہی دوا کھلائی گئی تھی بلکہ

(It was officially stated that the late King Edward VII had undergone a "Vaccine Treatment for catarrh, and that the "Vaccines" had administered by the mouth, Dr. Clarke.)

دقیقہ ۲۳۱ کا) آئہ کے ذریعہ جسے جسم میں خاص کر بازو میں زخم کر کے وہ زخموں میں دیا جاتا ہے۔ (۲) وہ زہر ہو میو پیچک طریقہ کے مطابق لطیف حالت میں استعمال کرایا جاتا ہے پہلے طریقہ سے ٹیکا لگانے سے کل جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ نے تھوہا کھلا کر ٹیکا سے پیدا شدہ بہت سی امراض اچھکے ہیں۔ سلا کا ۲: مسزیریم ۲۰۰ کیلی میور ۳۰ وغیرہ ادویات بیج بیج میں کام آسکتی ہیں۔ دوسرے طریقہ سے ٹیکا لینے سے کسی خرابی کا خوف نہیں رہتا۔ ہو میو پیچک طریقہ سے قوی لطیف حالت میں ہونے سے زہر کا زہر بلا دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ (۲) ویکسی نم ۲۔ ویریولینم ۳۔ ہمیشہ دو مرتبہ دو ہفتہ تک کھلانا چاہیے (باقی صفحہ ۲۴۳ پر ملاحظہ کیجئے)

(بقیہ صفحہ ۲۴۲) ان دواؤں کے کھانے کی وجہ سے جب تک بخار نہ ہو جائے
 یا کسی طرح کی بیماری نہ ہو، تب تک سمجھنا چاہیے کہ اس دوائے اس کام نہیں
 کیا۔ اور ابھی ٹیکہ نہیں لگا۔ لیکن امریکہ کے بہت قابل ڈاکٹروں کی رائے
 ہے کہ ویکسی نیئم ۶x۔ سفوف، ایک خوراک کھانے سے ٹیکے کا کام ہو جاتا ہے۔
 بلکہ ٹیکہ لگانے سے جو نقصان ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا۔ اگر
 چیچک پھیل جائے تو تندرست اشخاص کو ویرولینیم ۲۔ ہفتہ میں ایک دو
 مرتبہ کھلانے سے مرض ہونے کا احتمال جاتا رہتا ہے اور اگر چیچک کا مرض
 انکو کھائے تو سخت بیماری بہت کچھ ہلکی ہو جاتی ہے۔

(A dose of the 6x Trit of Vaccinium is a
 "Homoeopathic vaccination) having it is claimed
 by competent observers far more prophylactic
 Power against small pox than vaccination and
 none of its danger or disagreeableness
 A few doses of Variolinum per week during
 epidemic protect from the disease and in the
 treatment developed cases it is excellent causing
 them to take one milder form" Boericke and Tafel)

اس لئے چیچک کی بیماری شروع کے وقت ویکسی نیئم ۶x۔ سفوف ایک
 گرین ایک مرتبہ کھلانا چاہیے، یا ویکسی نیئم ۳۔ ویرولینیم ۲۔ یا ویکسی نیئم ۳۔
 ہفتہ میں کم سے کم ایک خوراک ضرور کھلانا چاہیے۔ دانت نکلنے کے پہلے ہی
 بچوں کو ٹیکہ لگانے کا اصول ہے۔ اگر بچہ تندرست نہ ہو یا کسی دوسری وجہ
 سے اس کو ٹیکہ نہ لگایا جائے تو ویکسی نیئم ۶x۔ ایک خوراک بیچ ریم میں کھلانے
 سے ٹیکہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ گدھا کا دودھ پینا۔ یا جسم میں ٹائفائیڈ شاید حفظ
 ماتقدم ہے۔ متعدی مسری امراض اور ارفع کی تدبیر دیکھئے۔

مختصر علاج

شروع بخار میں ایکونائٹ۔ بیپٹ۔ وراٹرم دوائیڈ۔ دانے نکل آنے پر اٹم ٹارٹ۔
 تھوہا، سیرا۔ سینا۔ مولود بھرنے پر اٹم ٹارٹ؛ مارک لکے۔ اے پس۔

دانے بیٹھ جانے پر، کیمفر، سلفر۔

چمک کا داغ مٹانے کے لئے سر اسینا کا استعمال اور چہرہ دھکے رکھنا یا روشنی نہ لگنا۔

کھڑنڈ آجانے کے بعد گرم پانی سے جسم پوچھنا۔ اور صاف کھڑے رہنا چاہیے۔ سخت علامات میں۔ فاس اور انٹم ٹارٹ (پھیپھڑے کی سوزش) ایکون براؤ، (پھیپھڑے میں خون جمن) براؤ، کیلی کا، اور انٹم ٹارٹ۔ (برانکائی ٹس) ہونے پر، اسے لیں، اور بیلادونا، (آماس) آنکھیں بند ہونا، اور گلا آماس کرنا۔ بیلادونا۔ ہائوسیامس، اسٹریمو، درے ور (ہڈیان زیادہ ہونے پر) آرس اور ہیشیا، (یکایک سست ہو جانا۔ یا غشی، مارک کار اور سلف۔ رآنکھوں کی سوزش، ہیر سلفر۔ فاسفورس اور سلفر پھوڑا ہو، مفید و کار آمد ہیں۔

علاج:- شروع حالت میں (یعنی پیپ نہ آنے تک) انٹم ٹارٹ ۳۰-X استعمال کرنا: کے بارے میں سب کی ایک رائے ہے اور دوسری حالت میں پیپ ۲۰ (نئے پڑ) مارک سال خاص دوا ہے۔

مرض چمک کی شروع حالت میں، دانوں سے خون بہتا ہوا اور بعض یکدگی سست ہو گیا ہو تو ہیشیا ۳۰- دینا مناسب ہے۔

پشت یا کمر میں درد، نفص تیز، بخار اور پانی کی طرح اسہال میں وارٹرم در ۳۰- پیپ بھرے دلتے۔ سانس کی نالی میں درد۔ قے یا قے کر نیکی خواہش، بخار وغیرہ علامات میں انٹم ٹارٹ ۳۰-X۔ سفون، اور مرض کی تمام حالتوں کچھ لوگ دوسری دواؤں کو باری باری سے دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔

(دوسری حالت میں) بخار، دانوں میں مواد گلے میں زخم

خون یا آنوں ملا اسہال وغیرہ علامات میں، مارک سال ۶۰- دانے ہیر سلفر ۳۰- یا بیکاکہ۔ مٹھ گئے ہوں تو روہنی کا اسپرٹ کیمفر ۳۰- یا زخم ۳۰- استعمال کرنا چاہیے۔ دہنے کالے ہو صبا میں کر و شیاں ۶۰- مرین آرام ہونے کے قریب ہو یا مرض کے سخت علامات

دور کرنے کے لئے سلفر 'X'۔ عمدہ دوا ہے (کچھ ڈاکٹر ان حفظ ماتقدم کی دواؤں میں سے سلفر 'X'۔ کو بھی سمجھتے ہیں) اکثر ڈاکٹر ان کی رائے ہے کہ سرا سینا ۳۔ ۶۔ اس مرض کے ہر درجہ میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ مرض کی منت کم کر دیتا ہے۔ اور دانوں میں مواد آنے کو روکتا ہے۔ پھڑے کی چیچک کی رطوبت کا ٹیکا دینے کے بعد اگر چیچک نکل آوے اور اس و مہ سے دوسرے علامات نمودار ہوں تو تھو جاستمال کرنا چاہیے۔ دلتے بچتے وقت اگر سر سامی بخار کے علامات محسوس ہوتے ہوں تو رسٹا کس ۲۔ ۳۔ دلتے نکلنے کے بعد اگر چہرہ، اور دانوں کے گرد گرمی آس کر آوے۔ اور رات میں کھجلی بڑھ جائے تو اسے پس مل ۳۔ دانوں میں مواد ہونے کے بعد اسہالی بخار کے علامات ہوں تو آرسنک ۶۔ ۳۰۔ خون کے اخراج میں بھی میل ۳۰ X۔ چیچک میں مواد پیدا ہونے یا بڑھنے کی حالت میں رال بہنا۔ گلے میں زخم، سانس میں بدبو یا خون کے دست ہوں تو مارک والوس ۳۔ سفوف ۶۔ پلکوں اور چہرہ پر آس، اسے پس مل ۳۰ X۔ ۳۔ نیند نہ آنا، بے چینی کے علامات میں کافی ۳۔ یکایک دلتے بیٹے جائیں۔ جسم کھنڈا ہو جائے۔ سانس میں تکلیف ہو، یا دماغ مفلوج ہو جائے تو تھوڑے گرم پانی میں تین چار قطرے روہنی کا کیمفر دس پندرہ منٹ کے وقفے سے کئی مرتبہ دینا چاہیے، اس وقت تک۔ جب تک کہ جسم گرم نہ ہو جائے اور دلتے نہ نکل آویں۔ جسم پلنا، غشی، یا ناک سے خراٹے لینا، اد پیہم ۳۔ ۳۔ مواد بھرے دلتے صاف یا زرد رنگ کے نہ ہو کر سبز بیگنی یا کالے ہوں یا بہت کھلائے ہوں تو سلفر 'X'۔ ۳۔ دینا چاہیے۔ بعد کو کاربو ۴۔ ۶۔ یا نائٹرک ۳۔ یا آرسنک ۳ X۔ کھلانا چاہیے۔ اگر وہابی صورت میں چیچک نمودار ہو، یا عمل کی حالت میں چیچک ہو یا بہت مقدار میں تکلیف دہ قے ہوتی ہو، اور کل جسم میں درد ہو۔

توسرا سینا۔ X^۳۔ فائدہ مند ہے۔ وقت پر کھانے سے چھپک کے خاتمہ کو یہ دوا بدل دیتی ہے۔ اور جسم پر داغ پڑے تو بھی مٹا دیتی ہے اگر چھپک خوفناک ہو جائے تو کسی قابل ٹیکا لگانے والوں کی صلاح لینی چاہیے تاکہ علاج کرنے میں سہولت ہو جائے۔

علاج معاویہ

مریض کو ہوا دار کمرے میں رکھنا چاہیئے۔ بار بار مریض کا بستر بدلنا۔ اور ملائم بستر پر مریض کو ہمیشہ ایک طرح سے نہ سلائے رکھنا چاہیئے۔

دانوں میں مواد آنے پر بورک ایسڈ (ایک حصہ) آلیو آئل (۲ گنا) ملا کر تمام جسم میں مل دینا چاہیئے۔ جب دانوں میں پیب ہو جانے کے بعد خشک ہونے لگیں تو گرم پانی میں صاف کپڑا بھیکو کر پونچھ دینا چاہیئے مریض کے دقت ساگو، باری، آرا روٹ، سوڈا واٹر کے ساتھ۔ دودھ مانگوںر سیب، گدھی کا دودھ وغیرہ دینا چاہئے۔ اور آرام ہو جانے کے بعد ہلکی اور مقوی غذا دینی چاہئے۔

چھپک، اور گوشت وغیرہ کھانا منع ہے۔ پاک طریقہ سے رکھنا اور گدھی کا دودھ یا گائے کے دودھ کا مکھن مریض کے جسم میں روزانہ مالش کر دینا چاہیئے۔ خیال رکھنا چاہیئے کہ مریض اپنا جسم زور سے نہ کھیلے۔ اس لئے انگلیوں کے اگلے حصہ میں کپڑا باندھ دینا چاہیئے۔ یکپڑا ہمیشہ بدلتے رہنا چاہیئے۔ چھپک کا داغ مٹانے کے لئے زیتون کا تیل (OLIVE OIL) کے ساتھ دودھ کی بالائی ملا کر دانوں کے داغ پر لگانا چاہیئے۔ چھپک کے مریض کے پینے اور سوتے کے کپڑوں کو جلا دینا چاہیئے۔

ٹیکہ لگانے کے بعد لوگوں کی صحت ایک بارگی بگڑ جاتی ہے۔ یا کسی طرح کی جلدی بیماری نمودار ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں تنہا ۲۰ کھانا نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

(CHICKEN POX)

جل چھپک موتیا سیٹلا پنساھا

یہ چھپک کا ایسا چھوت دار مرض نہیں ہے یہ بچوں اور لڑکوں

کو زیادہ ہوا کرتا ہے۔ موتیا سیٹلا کا بخار ہلکا ہوتا ہے۔ دانے پھٹے نہیں ہوتے۔
 بلکہ اُس بھرے ہوئے اور نوکدار ہوتے ہیں۔ تین چار روز بعد دانوں میں پانی
 بھر جاتا ہے۔ اسوجہ سے وہ آبلہ کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ سات روز
 میں خشک ہو جاتے ہیں۔ اس میں موت کا خوف نہیں رہتا۔

اگر بخار تیز ہو تو ایکوٹاٹ سٹ۔ دینا چاہیئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سٹاکس
 سٹ۔ اس مرض کی ایک ہی دوا ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ اگر سٹاکس سے فائدہ
 نہ ہو تو انٹرمٹارٹ ۶۔ دینا چاہیئے۔ جسم میں درد، سر بخاری اور لرزہ۔
 جلس آ۔ سردی سے بچنا چاہیئے۔ دودھ وغیرہ ہلکی غذا دینا چاہیئے۔

سرخ بخار (SCARLATINA)

خسرہ، اور چھپک کی طرح یہ بھی ایک قسم کا شدید اور متعین مرض ہے۔
 کھجلی اور گلے میں زخم اس مرض کے خاص علامات ہیں۔ یہ بیماری اس
 ملک میں بہت کم ہوتی ہے، غالب ہے کہ (STREPTOCOCCI)
 جراثیم اس مرض کے خاص اسباب ہیں۔ نکتی ہوا اور خراب دودھ پینے یا جالی
 دار کپڑوں کے ذریعہ تندرست جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

جاڑا۔ جسم کی گرمی (۱۰۵۔ ڈگری تک) پیاس، درد سترے گلے میں زخم
 وغیرہ۔ اس مرض کے شروع کے علامات ہیں؛ ۲۴ گھنٹہ میں جسم پر سرخ
 رنگ کے چھیلے دانے۔ (پہلے کندھے اور سینہ پر پھر تمام جسم میں پھیل جانے
 ہیں۔ اس لئے کھجلی ہوتی ہے۔ تیز درد، ہڈیاں، زبان پر میلی تہہ۔ زبان
 کے دونوں کنارے اور اگلا جھٹہ (PAPILLAE) سرخ
 رنگ کا اور اونچا ہونا۔ وغیرہ اس مرض کے علامات ہیں۔

پانچ دنوں تک روزانہ بخار رہنے کے بعد جسم کی حرارت کم ہونے لگتی ہے۔
 دانوں کی سرخی، لمبائی اور چوڑائی بھی گھٹنے لگتی ہے۔ اور نوں دن کھرند
 اکھڑنے لگتا ہے۔ یہ مرض دو ہفتہ سے زیادہ کبھی نہیں رہتا۔ متعین اور
 مسری مرض اور اس کے دفعیہ کا باب دیکھیئے۔

خسرہ اور سُرخ بخار کا فرق

خسرہ کے بخار میں سردی کے علامات رہتے ہیں (جیسے ناک، آنکھوں سے پانی گزرا۔ ٹینک، کھانسی وغیرہ) لیکن سُرخ بخار میں سردی کے علامات زیادہ نہیں رہتے۔ لیکن جسم گرم اور گلے میں زخم رہتا ہے۔ تین چار روز بخار آنے کے بعد خسرہ کے دانے نکل آتے ہیں۔ لیکن سُرخ بخار میں ہمیشہ پہلے ہی دن سے تمام جسم سُرخ ہو جاتا ہے۔ یہ مرض تین قسم کا ہوتا ہے۔

(ا) تپ سُرخ سادہ (SIMPLE) سُرخ دلنے، گلا۔ سُرخ؛ (لیکن گلے میں زخم نہ ہونا۔ اس کی خاص علامت ہے۔ اچھی علاج کرنے سے آسانی سے آرام ہو جاتا ہے۔ بیلا ڈونا، ۳۔ ایکونائٹ، ۳۔ سلفر، ۳۔ آرٹک، ۳۔ ۳۔ اس کی خاص دوائیں ہیں۔

(ب) تپ سُرخ خنثی (ANGINOID) گلا سُرخ۔ گلے میں زخم، اور کندھے میں آماس، اس کے خاص علامات ہیں۔ سخت مرض ہے۔ (خاص کر موسم سرما میں) اچھا علاج نہ ہونے سے موت کا خوف ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا، ۳۔ مارک بن، ۳۔ سفوف، کروٹیل، ۳۔ گنیشا۔ اس کی مخصوص ادویات ہیں۔

(ج) تپ سُرخ مہلک (MALIGNANT) اس مہلک بخار میں یہ علامات دکھائی دیتے ہیں؛ تیز جاڑے کے ساتھ بخار کا شروع ہونا۔ غیر طبعی حرارت (۱۰۱۔ ڈگری تک) ہڈیاں، بے ہوشی، اور دائروں کا دکھائی نہ دینا۔ اگر دکھائی بھی دیں تو سُرخ نہ ہوں۔ بلکہ سیاہ ہوں، اکثر دانے دکھائی دینے کے پہلے ہی مریض مر جاتا ہے۔ ۱۔ ٹینکس، ۳۔ ۳۔ پیرمائیٹک، ۳۔ ۳۔ آرٹک، ۳۔ ۳۔ ایسٹمیور، ۳۔ اس کی مخصوص دوائیں ہیں۔

علاج حفظ ماتقدم:- بیلا ڈونا، ۳۔ ہمیشہ دو مرتبہ کھانا چاہیے۔

بیلا ڈونا، ۳۔ بخار۔ گلے میں زخم، سُرخ دلنے، ہڈیاں۔

ہنی مین نے سُرخ بخار میں بیلا ڈونا دینے کی صلاح دی ہے۔

فانی ٹوٹکا، ۳۔ گلے کی علامت سخت محسوس ہوں۔

مرک کار؛ ۳۔ گلیٹوں میں آنا۔ گلے میں زخم بہت رال ٹپکنا۔ سانس میں بدبو۔ سستی۔ اگر مٹانہ پر بھی حملہ ہو تو یہ دوا خاص کر فائدہ کرتی ہے۔
ایکونائٹ۔ ۴۔ بخار کے شروع میں یا انتہا ب الغشاء بطن القلب
اول کی اندرونی جھلی کی سوجن (ENDOCARDITIS) ہوتے ہیں۔
ایس ۴X۔ تیز بخار۔ چھوٹا۔ گلے میں آنا، منہ کے اندر زخم
اور زبان سُرخ، زبان میں چھان، استسقا، مٹانہ میں سوزش۔
دل کی اندرونی جھلی کی سوجن۔
آرمنگ ۴X۔ دانے اچھی طرح نہ نکلیں۔ یا نکلے ہی مر جھا جائیں۔ جسم سرد
بہت جلد غافل ہو جاتا۔ بے چینی، پیاس۔ استسقا، تشنج ہو یا نہ ہو
مٹانہ کی سوزش۔

سلفر۔ جسم کا چمکیلا، سُرخ رنگ۔ جسم میں کھجلی۔
ایلاٹھس ۴X۔ جھوننا۔ بے ہوشی، درد سر، چہرہ گرم اور خوب
سُرخ؛ گلا پھولا ہوا۔ ناک سے خراش پیدا کرنے والا پانی۔
دانے کالے یا نیلگوں یا بہت تھوڑے نکلتا، تیز قے؛ ہلک
حالت میں یہ دوا دینا چاہیے۔

ایسٹریوٹ ۴X۔ کان سے مواد آنے یا کم سننے میں۔
کپسرم ایٹمک ۴X۔ دانوں کا بیٹھ جانا، قے، تشنج، دماغ پر حملہ
ہونے میں۔ کروٹیل ۲۔ گلے میں زخم؛ کندھے میں گلیٹیاں پھولی ہوئیں۔
اگیشیا۔ خون زہریلا ہونے کی علامت میں، گلے میں درد، یا گلا
مرک جانا۔ گلیٹوں میں پیپ آجانے اور اس کے بڑھنے کی علامت میں
ہیپرسلفر ۳۔ مرض شروع ہونے کو، استسقا۔ پیشاب
میں کچھ خراپی۔ وجع المفاصل یا امراض قلب، تو ان کا بیان دیکھنا چاہیے

(ERYSIPELAS)

سُرخ بادہ

یہ ایک شدید نوعی متعدی اور چھوت دار مرض ہے، کسی حصہ میں

چوٹ لگنے یا پھیلنے کے ذریعہ (STREPTOCOCCUS) جراثیم جسم کے اندر داخل ہو کر جلد یا لعاب دار چھلتی کی سوزش پیدا کرتا ہے۔ اس کا نام سُرخ بادہ ہے۔ خلفی نقابہت یا صحت کے اُصولوں کی پابندی نہ کرنا۔ (جیسے قوت حیات کی کمی، پرسوت کی حالت، چوٹ لگنا وغیرہ) اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

جو سُرخ بادہ جسم کے ایک ہی حصہ میں نہ رہے بلکہ اکثر مقامات میں گھومتا رہے۔ اس کا نام (AWANDERING) پھرنے والا سُرخ بادہ ہے جس سُرخ بادہ میں آماس اور جلن ہو۔ اس کو (PHLEGMONOUS) سُرخ بادہ پلغمونی کہتے ہیں جس سُرخ بادہ میں سٹرن شروع ہو جائے اس کو فاسد (GANGRENOUS) کہتے ہیں۔

ایک سے سات روز تک اس مرض کا درجہ صحت رہتا ہے۔ جسم میں سہراون محسوس ہونا، بے چینی معلوم ہونا، ہلکا بخار، ماؤن جسم کا کانپنا وغیرہ اس کے اسباب سابقہ ہیں۔ اس کے بعد لرزہ، حرارت، جسم کا بڑھنا، بک بک کرنا، ماؤن حصہ جسم (جیسے ناک، گلا، وغیرہ) آماس کرنا، چمکنا، سُرخ دکھائی دینا، آہستہ آہستہ آماس زیادہ ہونا، پانی بھرنے والے یا چھالے پیدا ہونا۔

پانچویں دن دانے مڑھانے لگتے ہیں۔ جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے اور بیماری کو آرام ہو جاتی ہے۔ اس مرض کا دوبارہ حملہ ہوا کرتا ہے۔ خبیث بخار، سُرخ پیشاب، دل کی اندرونی چھلتی کی سوزش جیسے زخم ہو جائے۔ پھیپھڑے کی سوزش وغیرہ علامات دکھائی دیں تو خیال کرنا چاہیے کہ مرض بڑھ گیا ہے۔

اس میں مسند رجدیل ادویات مفید ہیں۔

(۱) بخار ہونے میں ایکوناسٹ۔

(۲) نرم یا ملاطوبتی پھنسیوں میں بل، براؤ، پلس، آرن۔

(۳) پانی یا مواد سے بھرے پھپھوے، اس ننھ اور ورٹرم وی۔

(۴) آماس کی خصوصیت میں اسے پس۔

(۵) گرمی کی خصوصیت میں۔ آرس، کاربودج۔ نائٹریک ایسڈ۔

(۶) فاسد سُرخ مادہ میں لگے۔ آرس۔

(۷) مرض مزمن ہو جائے۔ یا مرض آرام ہونے کی طرف مائل ہو تو سلفر۔

کچھ خاص دواؤں کے علامات

بیلٹ ڈونا۔ ۱۔ ۳۔ چلد گرم، چکداز سُرخ، خشک ہو، چہرہ تھمایا۔ سانس

پھولتی ہو۔ تیز درد سر۔ آنکھوں کی پستلی پھیلی، ہڈیاں، تشنج، ماؤں لگہ میں

تھوڑا آماس۔ (خاص کر چہرہ اور پیشانی کے سُرخبادہ میں؛

رستاکس ۶۔ گلا، چہرہ، سر کی چلد اور جسم کی دوسری جگہوں میں۔

سُرخ رنگ کے دانے ہوں، جن میں پانی بھرا ہوا اور ان دانوں کے گرد

آماس ہو، جسم میں چھوٹے کی طرح درد، دانوں سے پانی نکلتا ہو۔ اور جلن۔

سُرخبادہ۔ بائیں طرف شروع ہو کر دائیں طرف پھیل جائے۔

اے پس ۳۔ ۴۔ ۶۔ یا اوپیم یا دارُ رس ۶؛ رطوبت بھرے گرم دانے

جن میں سوزش ہو؛ یہ دانے آماس کر جاتے ہیں۔ اور ان میں کھجلی بہت

ہوتی ہے۔ چھوٹے کی طرح درد۔ سوزش کی جگہ سُرخ، ان میں رطوبت نہ ہو؛

بلکہ تیزی سے آماس کر جائیں۔

آرسنگ ۶۔ ۳۰۔ جلن اور درد کے ساتھ سیاہ چھلنے؛ یا

ان میں مواد بھرا ہوا۔ مستی اور دُبلان، بے چینی اور تیز پیاس، اور بخار

رہے۔ سرسامی علامت میں سڑنے کی علامات موجود ہوں۔

ایمون کارب ۳۔ بوڑھے یا لڑکیوں کے مرض میں دماغی علامت

نمودار ہو۔ سُرخبادہ، دائیں آنکھ سے شروع ہو کر بائیں آنکھ تک

پھیل جائے۔ کینتھرکس ۳، رطوبت بھری پھنسیاں، دانوں کی رطوبت لگنے

سے جلد میں خراش ہو جاتی ہے

ہیرسلفر ۶۔ مواد پیدا ہونے یا پکنے کے لئے۔

چائنا ۱x۔ معمولی قسم کے سُرخبادہ کی شدید حالت میں۔

گریفائٹس ۶: گھونے والا سُرخ بادہ۔ (جو سُرخ بادہ جسم کے ایک حصّہ سے دوسرے حصّہ میں پھیلتا ہو۔) مرض کا بار بار حملہ (خاص کر چہرہ پر) آئوڈین کے غلط استعمال سے جو علامات ہوں۔ ڈاکٹر گود نو (GOOD NO) کی رائے ہے کہ یہ سُرخ بادہ کی بہت اچھی اور کارآمد دوا ہے۔ اس کے استعمال سے مرض کی نوعیت بہت بدل جاتی ہے کہ اُس کو دوبارہ حملہ ہونے کا خوف نہیں رہتا۔ کروئیلز ۶: سڑنا (GANGRENE) شروع ہو۔ ایکونائٹ ۶: سُرخ بادہ کے دلے نکلنے سے پہلے اُس جگہ جلن ہو۔ جہاں دانے نکلنے والے ہیں، کانپٹا یا سوزش کے علامات۔ سوزشی سُرخ بادہ کے علامات میں۔ ماؤف جگہ میں جلن پیدا کرنیوالی گرمی۔ اور چھالوں سے رطوبت نکلتا۔

کینتھرس ۶۔ چھالوں میں مواد پڑنے کا اندیشہ ہو۔ آرسنک ۶۔ یا کاربووج ۶۔ سڑنا شروع ہو تو لیکس ۶۔ چھالوں کا ایک جگہ سے اچھے ہو کر دوسری جگہ نکلتا۔ پس۔ اگر مواد پیدا کرنا ضروری محسوس ہو تو ہیرسلف X ۲۔ سفوف دینا چاہیے۔

غذائے

مرض کی شدت کی حالت میں ساگو، باری، اراروٹ، ڈاکٹر آر بلڈ کا بیان ہے کہ میٹھا (یعنی مکھن نکالی ہوئی چھاچھ) ماؤف جگہ میں لگانے سے تکلیف فوراً کم ہو جاتی ہے۔ اور تھوڑے عرصہ میں سُرخ بادہ کم ہو جاتا ہے۔ حوالے کے لئے دیکھئے انڈین میڈیکل ریکارڈ۔ جنوری ۱۹۱۵ء۔ ص ۱۱۱ درد دور کرنے کے لئے گرم پانی سے سینکنا اچھا ہے (۳-۴ قطرے رسا کس ملا کر)۔ ماؤف جگہ روئی سے ڈھکی ہونا چاہیے۔

خناق و بائی

(DIPHTHERIA)

دُفقیص یا

یہ ایک قسم کی وبا کی بیماری ہے۔ ایک قسم کا زہر ملا

(KLEBE LOEFFIER'S BACILLUS) نامی جرم خون میں مل کر یہ بیماری

پیدا کرتا ہے۔ گلے کی رطوبت میں مرض کے جراثیم پلتے ہیں۔ یہ مرض بچوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی اُس سال میسور کے راجہ نے بھی اسی مرض میں جان دی تھی۔ اس مرض سے گلے کی بلغمی جھلی میں ایک قسم کا میلہ اور پھیکا مادہ پڑ جاتا ہے۔ اس سے سانس بند ہو کر مریض مر جاتا ہے۔ کچھ روز پہلے سانس بند ہونے کی علامت دیکھ کر گلے کی نالی کاٹ کر مریض کو کچھ عرصہ تک زندہ رکھتے تھے۔ غیر طبعی اور جھلی میں ایک طرح کی خراب خون ملی رطوبت نکلنے کی وجہ سے مریض کے سانس میں بڑی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ معمولاً ڈفتمیر یا میں گلے میں درد کسی چیز کے نکلنے میں تکلیف گلے سے برابر حقوک یا بلغم نکلنے کی خواہش کرنا۔

گلے کی گلیٹوں کا بڑھ جانا، غیر طبعی پردے کا پھٹنا، جراثیم سے ٹکراتے صورت میں باہر نکلنا۔ اور ثابت پردہ پھٹنے سے وہاں درجلد زخم بھری ہو۔ اور بالکل سرخ معلوم ہو۔ یہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرض مہلک شکل میں ظاہر ہو تو پہلے تیز بخار، دست و قے، لرزہ، کمزوری بے چینی، اس کے بعد جھلی ماؤف ہو کر سرخ ہو جاتی ہے۔

ٹانسل کی گلیٹیاں، اور تالو آماسس کر جاتے ہیں۔ اور اُس پر نقلی پردہ پڑ جاتا ہے، اگر یہ نقلی پردہ نہ ہوتا تو سانس بند ہو کر موت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی مریض کے نتیجہ میں تھوڑا یا پورا فاسلج، بھوک نکلنے میں تکلیف، آواز بیٹھی، قلب کا فعل کمزور ہو جانا، یا ایک دم بند ہو جانا۔ وغیرہ علامات میں مرض متعدی اور مسری اور اُن کے دفعیہ کا طریقہ اور بیان ملاحظہ ہو۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

(۱) شروع ڈفتمیر یا میں۔ ایکونائٹ، بل، یا بیسٹ،

اس کے بعد ضرورت ہونے پر مارک آیوڈ، ایسڈ ٹائیٹرک۔

(۲) شدت کی ڈفتمیر یا میں۔ مارک سیانٹم، کیلی، پرینگ ایسڈ،

کالی بائی، آرس، ایمون کارب، لیکے سبس، لائیگو، مفید اور کارآمد ہیں۔

مرض کی شکل بدلنے میں

فاس، اور فائٹو۔ (آواز بیٹھ جانے میں) دُج (دل کمزور ہو جانے میں) چائنا کونین (کمزوری میں) کونیم، جلس، آرس، راس، سلف، کار آمد ہیں۔
حفظ ماقدم :- محلہ یا گاؤں میں ڈقتھیر یا دوائی صورت میں پھیلا ہو تو
ڈقتھیر نیم ۳۰۔ صرف ایک مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔

علاج :- ڈاکٹر ایچ، سی، الین، نے بہت مریضوں کو صرف

ڈقتھیر نیم (اوپنچی طاقت کی) کھلا کر اچھا کر دیا ہے۔ کشتہ اع سے شروع
تک اس دوا کے استعمال سے وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوئے۔

اصلی ڈقتھیر یا کی علامت ظاہر ہوتے ہی کسی دوسرے طریقہ کے علاج
کرنے کے بعد سے اگر ہو میو پیٹھک طریقہ سے ان کا علاج کرنا ہو اور ڈقتھیر یا
آرام ہونے کے بعد کمزوری، سُستی، ہاتھ پیروں کا قابو میں نہ رہنا وغیرہ علامات
ظاہر ہوں تو ڈاکٹر الین ڈقتھیر نیم کھلانے کی رائے دیتے ہیں۔

ڈاکٹر کلارک طبعی مرض ڈقتھیر یا میں (۱) پہلے ڈقتھیر نیم (۳۰۔ ۲۰۰)
دو گھنٹہ کے وقفے سے (۲) مارک سائنٹس (۶۰۔ ۳۰) ہر گھنٹہ دینے کی رائے
دیتے ہیں۔ اور فائٹو لگا پانچ قطرے ایک آؤس پانی میں ملا کر اس سے
غرارے کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کسٹس (CUSTIS) کی
رائے ہے کہ مارک سائنٹس کا حسب ذیل علامات میں دینا اچھا ہے۔

سُرنے والا خناق و بانی کڑی سے مُنہ کے اندر، مری اور مُنہ اور گلے
کے اندر دینی جوف تک پھیلا ہو، اور رال بہتی ہو تو اس دوا کے استعمال
سے ایسے مریض شفا پا چکے ہیں۔ جن کے بچنے کی اُمید ہی نہ تھی۔

ڈاکٹر ڈلارس کی رائے ہے کہ بدبو دار اور قوت حیات کی نہایت کمزوری
میں مارک سائنٹس بہت فائدہ مند ہے۔ مُنہ اور گلے کا جو، خوب سُرخ
گردن کے اور رطوبتی غدود میں خوب آماس ہو۔ حقوک نکلنے میں تکلیف
اور گلے کا زخم سُرا ہوا معلوم ہو تو مارک بن آلوڈائن۔ فائدہ مند ہے۔

زیادہ آماس جو چکدار، سُرخ رنگ ہو، پیشاب بند، ان علامات میں
 اے پس، سخت بے لگم نکلتا ہو، زبان زرد، جھلی مٹی زرد اور سوت
 کی طرح سخت محسوس ہو تو کیلی بائی ۳۔ سفوف، لیکس ۶، (خون
 زیادہ خراب ہو گیا ہو) جیسے زیادہ سستی، قلب کا فعل بہت کمزور باہر دبانے
 سے گلے میں سخت درد محسوس ہو، مرض بار بار زبان باہر نکلے، گلے کی جھلی
 کی رنگت ہلکی نیلی ہو۔ گٹھیاں ماؤف، بائیں طرف سے شروع ہو کر مرض دائیں
 حصہ میں پھیلے تو لیکس ۳ کے عوض لائیکو ۶، دینا چاہیے۔

بدبودار پیشاب وغیرہ علامات نمودار ہونے میں پیشاب ۱۰۔
 بیماری کی جگہ میں جلن اور سُرخ، چہرہ اور آنکھیں سُرخ، دردِ سر
 نبض سخت اور تیز، ماؤ ترم، زبان سُرخ اور آواز کی نلی کی سوزش
 وغیرہ علامات میں ایکوٹائٹ ۱۰۔ یا بعضوں کی رائے ہے کہ بیلادونا ۳۰۔
 استعمال کرنا چاہیے۔ ماؤف جگہ میں درد، بہت سستی، مرض ہونے
 کے پید سے نبض کی چال تیز، گٹھیاں آماس کی ہوئیں، نقلی پردہ
 پیدا ہو گیا ہو۔ وزان اور حلق سُرخ، یا زبان بڑے رنگ
 کی سانس، آمدورفت میں بدبود، نکلنے میں تکلیف، بہت رال بہنا۔
 گلا دبانے سے درد محسوس ہونا وغیرہ علامات میں مرکوریس ۳۰۔ گلے کے
 اندر میٹلا زخم، سانس کی آمدورفت میں بدبود، ہو تو ایڈمیورک ۳۔ اندرونی
 اور خارجی (یعنی گلے کی کلی کرنا) استعمال کرنا چاہیے۔

کیلی میور ۶۔ نکلنے میں تکلیف، اور اسکے ساتھ ہی گلے میں پردہ
 پڑ جانا۔ آئینیا۔ (۵۔ ۱۰۔ بوند کی خوراک) بہت ڈاکٹر اکثر اسی دوا سے
 یہ مرض اچھا کرتے ہیں۔ (خاص کر سٹرنے کی حالت میں)
 آرسنک ۶۔ مرض کی آخری حالت میں نبض کمزور، زخم سے مواد
 یا خون بہنا وغیرہ علامات ہیں (نہایت سستی، گلا سوجا ہو، گلا اور سانس
 کی نالی سے بدبود، ناک کے اندر کا غلاف اور جھلی سے جما ہوا۔
 بدبودار اخراج ہونا وغیرہ خوفناک علامات پیدا ہوں تو کچھ لوگ آرسنک

کے ساتھ ایمن کاربائیڈ بعد دیگرے استعمال کرنے کی رائے دیتے ہیں۔

ڈنٹھیریا کے جراثیم دریافت کرنے کے بعد معلم فان بہرنگ (VON BEHRING) اور ڈاکٹر (ROTX) نے ثابت کیا ہے کہ یہ مرض انسان کے گلے میں جوڑھ (TOXIN) پیدا کرتا ہے۔ وہی مریض میں خلقی علامات پیدا کرتا ہے۔ اور وہی مریض کے جسم سے جو ایک دوسرا زہر خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ روک دیا جاتا ہے۔ مناسب زہر کے ذریعہ یہ دافع زہر (ANTITOXIN) گھوڑے کے خون سے پیدا کیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد وہی آب خون گھوڑے کے جسم سے لیکر ڈنٹھیریا کی شروع حالت میں مریض کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج کی عزت تمام جہاں میں آجکل کی جا رہی ہے

علاج معاون

ڈاکٹر فلور شیم کا بیان ہے کہ انارس کا زیادہ عرق کھلانے سے امید کا ثمرہ ملتا ہے۔ (THE HOM RECORDER 5th JUNE 1919)

(ملاحظہ ہو) انارس کا رس شاید چھٹی (MEMBRANE) کو صاف کر دیا جائے۔ ڈاکٹر کاربولک ایسڈ، بدبو کو دور کرنے والا ہے جب تک ڈنٹھیریا کا زہر مریض کے جسم سے پوری طرح نہیں نکل جاتا۔ اس وقت تک اس کا جسم خشک اور پانچا نہ پیشاب بند رہتا ہے۔ بہت گرم پانی میں غسل کرنے اور سرد پانی پینے سے یہ علامات دور ہو جاتے ہیں، پیاس رفع کرنے کے لئے برف کے ٹکڑے چوسنے کو دیئے جاسکتے ہیں۔ مقوی غذا پورے طور سے آرام اور آب و ہوا بدلنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی قابل جراح (SURGEON) سے سانس کی نالی کٹوانے (TRACHEOTOMY) کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

لے ایسے زہر کو دافع زہر (ANTITOXIN) کہتے ہیں (خاص کر حال معلوم کرنے کے لئے اس کتاب میں آب خون کا بیان ملاحظہ ہو۔

انفلونزیا

(INFLUENZA)

یہ مرض شدید متعدی ہے، جو وبائی صورت میں پھیلتا ہے؛ ایک قسم کے جراثیم (PFEIFFER'S BACILLUS) ملے اس مرض میں موجود رہتے ہیں۔ کرم جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک دو روز تک مریض کو بھڑبھڑاتی اور کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حسب ذیل علامات ظاہر ہوتے ہیں۔
بار بار جاڑا لگنا۔ بخار (۱۰۰-۱۰۳-۱۰۴)۔ بیماری سخت ہو تو ۱۰-۱۵-۱۶ تک (نصف کبھی سست اور کبھی تیز، درد سر، ناک اور آنکھوں سے پانی کی طرح لمعہ جاری ہونا۔ چھینک آنا۔ کھانسی۔ جسم میں اینٹھن۔ تمام جسم میں (خاص کر ہڈیوں میں) تیز درد، گردن میں اکڑن، زبان میلی، تھکے یا متلی۔ تھکاوٹ، نیند نہ آنا۔ بھوک نہ لگنا۔ سستی، لرزہ، بخار سے یہ مرض بہت بڑا جلتا ہے، اسی سے اس کا نام وبائی زکام رکھا گیا ہے۔

۱۹۱۹ء میں جاپان کے قابل ماہران جراثیم نے تحقیقات کر کے یہ اصول قائم کیا ہے کہ
(DIPLOCOCCI یا PNEUMO-COCCI یا PFEIFFER'S BACILLUS) یا کوئی
جراثیم انفلونزیا کے خاص سبب نہیں ہیں۔ (PROF. YAMANONCHR)
(AND DRS SAKAKMI AND IWASHIMA'S CONTRIBUTION
TO THE LANCET)

(ملاحظہ ہو - INDIAN DAILY NEWS JULY, 7 - 1919) اور
(JOURNAL OF THE ROYAL ARMY MEDICAL CORPS جولائی ۱۹۱۹ء)
میں ڈاکٹر (GORDON) نے کہا ہے کہ انفلونزیا کے جراثیم اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ آسانی سے
چھننے (FILTES) کے اندر سے جاسکتے ہیں اور صفر (ME-INTOSH MEDICAL

- KES EARCH COUNCIL SPECIAL SERIES)

کے جراثیم کے جانب دار العلوم
(PPIEFFERS) No. 13 SERIES ملاحظہ ہو
ہوئے ہیں۔ (DR. BROWNLEE) کہتے ہیں کہ مرض انفلونزیا ہر تینتیس سہفتہ بعد
(یعنی شیت اور بنت رت میں) بہت پھیلتا معلوم ہوتا ہے۔

کبھی کبھی معدہ، کبھی انٹسٹینوں کی خرابی سے اسہال یا پھیش، پیشاب کا کم - یا زیادہ ہونا - کلمجہ دھڑکنسا - خیالات پر آگندہ ذات الرتہ کی سوزشیں - (براڈی کی منونیا) وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں پھیپھڑے کی سوزش، یا ذات الصدر (منونیا) ذات الرتہ نرلی کی سوزش (کیپلری برا نکائی لٹ) کرنول میں سوزش، لوا زمان کی سوزش، ناک، منہ، یا مقعد سے خون گرنا - خناق و ہائی (ڈفٹیریا) سرسامی خرابی، بک بک کرنا - قوما (COMA) سانس کی تکلیف، اسہال، استسقا ریائٹن (GANGRENE) وغیرہ علامات ظاہر ہوں تو مرض سخت ہو جاتا ہے۔

اس مرض میں جسم کے تمام حصوں پر حملہ ہوتا ہے۔ اس لئے شروع ہی سے علاج اچھی طرح نہ ہونے سے مریض پر آفت آنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ عیسائی کے نویں صدی میں عالمگیر مرض کا حال معلوم ہوا۔

(PEPPERS SYSTEM OF MEDICINE) ملاحظہ ہو۔

۱۸۹۰ء کے موسم سرما میں یہ خوفناک مرض روس سے پھیلا اور پھر وہاں سے تمام دنیا میں پھیل گیا۔ ۱۸۹۱ء میں تپ جنگ (WAR FEVER) کے نام سے اسپین میں نمودار ہوا۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں عالمگیر ہو گیا۔ صرف بنگال میں ہنیں، بلکہ دنیا کے بیمار مرد و عورت موت کے منہ میں چلے گئے۔

لہ یورپ کی گذشتہ خونخوار جنگ عظیم کے وقت شہر کاؤں کی طاقت کا امریکہ نے ساتھ دیا تو اسپین کے دارالسلطنت شہر بڑوڈ میں جرمنی کے کسی بہت بڑے علی کیا گاہ (LABORATORY) کے عالموں کو شاید انفلویزیا کے جراثیم پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ غرض یہ تھی کہ یہ جراثیم امریکہ کے بندرگاہوں میں چھوڑ دیے جائیں۔ تاکہ وہاں کے طاع وغیرہ بیمار ہو جائیں، اور امریکہ کی فوج نہ آ سکے۔ لیکن یہ خیال عملی صورت میں نہ آ سکا۔ کیونکہ عالموں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اور سب جراثیم اسپین میں پھیل گئے۔ اس سے پہلے پہل ایک دم انفلویزیا ہو گیا۔ اور پھر عالمگیر ہو گیا۔

حفظ ماقدم :- مرض کے شروع ہونے کے وقت انفلوئنزا ۲۰۱-۲۰۰۔
ایک دو روز کا ناغہ دیکر ایک خوراک کھانا چاہیے۔ اگر انفلوئنزا نیم نہ ملے
تو پیشیا XI-۳۰ استعمال کرنا چاہیے۔ انگلستان کے کوئی کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں
کہ آرسنک ۳- (روزانہ تین چار عواراک اچھا مانع مرض ہے۔

(THE HOM WORLD APRIL 23-24) ملاحظہ ہو۔

۱۸۶۹ء میں نیگال کے محکمہ صحت کے اعلیٰ حاکم (SANITARY COMMISSIONER)
ڈاکٹر نینلی صاحب نے مشہر کیا کہ دارچینی کا تیل (CINNAMON OIL)
دو قطرے گرم پانی میں ملا کر تین بار روزانہ کھانے سے انفلوئنزا سے نجات مل
سکتی ہے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ مریض کا تھوک کف یا سانس کی ہوا تندرست
انسان کے جسم میں داخل ہونے سے اسکو بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ اسلئے مریض کو
علیحدہ کمرے میں رکھا جائے۔ اور اسکی تیمار داری کرنے والا بھی کپڑے سے ناک
منہ، اچھی طرح دھو کر اس کی تیمار داری کرے۔

کوئی کوئی 'معالج سردی اور جسم میں درد ہوتے ہی تک ملا کر پانی ناک
اندھڑپانے اور گلے کی نالی دھو ڈالنے سے بھی اس مرض سے بچنے کی صلاح دیتے ہیں
جلیسم ۲-X-۱۰ جارا بخار منہ سرخ، آنکھیں پانی سے بھری، درد سر سر بھارا
تمام جسم میں (خاص کر پشت میں) اکڑن، درد لرزہ، سستی ہو۔
برایونیا ۳-X-۱۰ (سانس کی نالی پھیپھڑے یا پھیپھڑے پر خاص طور
سے حملہ ہونے پر) کھانسی کلا اکڑ جانا۔ تمام جسم میں (خاص کر دماغ میں) درد ہونٹھ
خشک۔ اسی لئے مریض دونوں ہونٹھ زبان سے تر رکھنا چاہتا ہے۔ زبان میلی، سستی
(مریض بلا حرکت کے رہتا ہے۔ کیونکہ حرکت کرنے سے درد بڑھتا ہے) درد دالی
جگہوں (بغل کو) کو دبانے سے کھانسی دب جاتی ہے۔

آرسنک ۳-X-۱۰۔ ڈاکٹر ہووچ نے اس دوا کو مرض انفلوئنزا کی
سب سے اعلیٰ دوا بتایا ہے۔ شروع میں بہت زیادہ بلغم (خاص کر آنکھ)
ناک، خنجرہ کی سردی، اخراج پانا۔ پیلا۔ جلن پیدا کرنے والا بلغم، چھینک
آواز بیٹھی ہوئی، لرزہ، گرم، خشک، اور جلد کھر کھرئی تپ نوبتی۔ اور

تپ لازمی بخار میں۔ زیادہ سستی۔ یہاں تک کہ حرکت سے مرض کا بڑھ جانا۔
بے چینی، پیاس، گردن میں جلن ہونے پر، بھی ڈھکے رکھنے کی خواہش،
گھبراہٹ اور موت کے خوف کے علامات میں سخت درد اور لیسار مواد کھانا
تکلیف دہ کھانسی، سرد پسینہ اور سانس کی تکلیف۔

فرانس کے ڈاکٹر جوئے (DOUSSET) انفلوئنزا کے طبی بخار
میں، پاگن، کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسی جگہ
آرٹک کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

علامات کے مطابق متذکرہ بالا ادویات میں سے تین دواؤں کے استعمال
سے ہم لوگوں نے بہت فائدہ ہوتے دیکھا ہے۔

دوسری دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کاپر تھیوٹ سنگس میں۔ کسٹ
گیپل، گڈنی، وغیرہ؛ امریکہ کے بہت سے مشہور ڈاکٹر ان شروع میں
جلیسم، اور اس کے بعد برائون کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن
انگینڈ میں کلا راک و وغیرہ ڈاکٹر ان۔ پیشیا؛ انفلوئنزا کی سب سے اچھی دوا
سمجھ کر سب سے پہلے نام میں لاتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ دوا دینے
کی ضرورت نہیں پڑتی۔

پیشیا۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ سستی معلوم ہونا۔ بے وقوفوں کی طرح دکھنا۔
آنکھوں میں درد یا بوجھ محسوس ہونا۔ سر بھاری زبان میل، یا خشک، گلے میں
دھم۔ سیاہ رنگ کا پتلا دست۔ تمام جسم میں درد، اور اکٹھن، کھانسی، بے چینی،
ڈاکٹر و ہیلر کی رائے سے بخار دہنے پر یا نہ دہنے پر بھی بے چینی۔ سستی۔
سانس میں بدبو، بکواس؛ کبھی کبھی مریض یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا جسم، تین
ٹکڑے ہو کر بستر پر پڑا ہے۔ اور اس کے جوڑ نہ سکنے کی وجہ سے دل میں
تکلیف ہوتی ہے۔ نیشنل سلف ۱۲-X۔ سفوف،

ڈاکٹر بورک اور انیسوٹز کہتے ہیں کہ بہت سے معالجون کی رائے کیطابق انفلوئنزا
کی لاجواب دوا ہے۔ خاص کر تھنڈی ہوا سے یہ بیماری ہو۔ اس دوا کے
بارے میں ہم کو زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن مرض آرام ہونیکے بعد سردی

محسوس ہو، اور دُبلایا ہو تو اس دوا کے استعمال سے مرض جلد اچھا ہو جاتا ہے
 معمولی مرض میں صرف انفلوئنزا نیم۔ ۳، کی ایک دو خوراک کھانے سے مرض دُور
 ہو جاتا ہے۔ مرض کے شروع حالت میں بخار کے ساتھ پیاس، بے چینی، جسم خشک
 اور گھبراہٹ وغیرہ علامات میں ایکوٹائٹس X۱:

دن میں نیند کا غلبہ، اور شام کے وقت سردی لگنا۔ جوڑوں میں درد۔
 جلد خشک، سونے سے کھانسی، بہت زیادہ چھینک آنا۔ آنکھوں سے پانی
 گرنا۔ گویا جسم کے نیچے کے حصہ سے اوپر کی طرف کوئی کپڑا رینگ رہا ہے۔ ایسا
 محسوس ہونے کے علامات میں سبڈلا X۱- ڈنگو بخار کی طرح ہڈیوں میں درد۔

یوپے ٹوریم، پروفولٹیم، X۱- ۳، پشت میں شدت کا درد، ویری اولیم، ۳-
 کھانسی، ناک سے پانی گرنا۔ درد۔ (خاص کر دائیں طرف)۔

بلغم نکلانے میں تکلیف محسوس ہونا۔ لیکن نکال دینے کے بعد آرام محسوس
 ہونا۔ سنگوئیریا۔ X۳- تیز درد سر، ایسا محسوس ہونا۔ گویا درد سے سر
 پھٹا جا رہا ہے۔ گلوٹائن ۳۔ سر میں ٹنک کی طرح درد، گلے میں زخم، آواز
 بیٹھی، خشک کھانسی، جلد خشک، دائیں کان کی جلن، درد سر اور سر کے
 دائیں طرف عضلاتی درد میں۔ می ٹی فولیسا۔ X۲- ۶۔

سر اور پشت میں درد، تمام جسم میں ریاح بھری ہو۔ نوزان میں جلن،
 اور بڑھا ہوا، اور اس پر سادے دارغ۔ فائی ٹو نکالا۔ قے اور متلی میں۔
 اپیکاک، X۳- قے، متلی، اور اسہال میں چائنا X۳- وجع المفاصل
 کی طرح درد، درد کمر یا ٹائیفاڈ فیور کے خراب علامات میں۔ رساکس، ۳- ۳-
 سانس کی آمد و رفت، سائیں سائیں کی آواز۔ تکلیف دہ کھانسی، بلغم زیادہ نکلا
 گلا گھڑ گھڑانا، کمر اور پشت میں درد۔

انٹیم ٹارٹ X۳- سفوف ۶-، حجرہ اور سینہ میں جلن، تکلیف دہ کھانسی۔
 کبھی پیلے اور سفید رطوبت کی طرح سخت، بلغم کی کھانسی ہو۔ مرض کی مزمن
 حالت میں پھیپھڑے کی جلن (خاص کر بائیں طرف دبانے کے سونے سے کھانسی
 کی زیادتی)، کمزوری، بلغم نکلانے طاقت نہ رہنا۔ بیدار خون ملا یا پیپ

کی طرح بغم نکلنا۔ فاسفورس ۶۔ کوکر کھانسی کی طرح کھانسی ہونے پر

ڈرا سیرا۔ x۳۔ متواتر کھانسی۔ (ذرا بھی بند نہ ہو۔)

بائیڈروسیانک ایسڈ ۳۔ مٹانہ میں سوزش۔ یو کے ٹیس x۱۔

قلب پر حملہ ہونے پر آئی پیرس ۱۔ شدت کا درد ستر۔ متلی کوکٹن x۲۔
جگر ہونے میں کارڈیس میری۔ بخار کی تیزی کم کرنے کے لئے سیلی لک ایسڈ۔
انٹی فرین۔ اسپیرن ادویات بہت زیادہ نقصان کرنے والی ہیں۔

اسہال، نمونیا، تقطیر البول۔ (پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا۔) وغیرہ

علامات ہو جائیں تو اس کتاب میں درج کئے ہوئے آلہ تنفس کے امراض،
آلہ ہاضمہ، امراض وغیرہ ملاحظہ ہوں۔

علاج معائنہ۔ صاف اور ہوا دار کمرہ میں مریض کو گرم کپڑے سے

دھک کر سُلانا چاہیے۔ مرض اگر ہلکا بھی ہو تو مریض کو چار پانی پر لیٹا رکھنا
چاہئے۔ لیکن گرم کپڑے سے سر نہ دھکنا چاہیے۔ اور اس بات پر پورا پورا خیال
رکھنا چاہیے کہ جسم میں کسی طرح ٹھنڈک نہ لگنا چاہیے۔

بغم پیدا کرنے والی یا محرک شے کھانا۔ اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا۔
(ہاتھ پیر، دھونا وغیرہ) بالکل منع ہے۔ پانی ملا گرم دودھ، مصری،
شگھارا، انگور، کیلا، صاف شہد، یا شہد ملا دودھ، بہدانہ، شیریں،
انار، کیسرو۔ ٹھنڈا پانی پینا، شوربہ، وغیرہ پتلی چیزیں اچھی غذا ہیں۔

بیماری چھوٹ دار ہے۔ اس لئے جو تیمار دار ہوں، کو خوب ہوشیار
اور صاف ستھرے رہنا چاہیے۔ کھوک اور کف اور اگال دان میں
چونے کا سفوف ڈال دینا چاہیے۔ بیج۔ بیج میں اسکو صاف کر کے

لہ بہت تکلیف دہ کھانسی۔ یا گلے کی نالی پر حملہ ہونے میں گذشتہ

انفلوینزا کے مرض میں (DR. GRILHARD DE MARSEILLES) نے ڈرا سیرا اور مکی

کا استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔

بچہ کی ترکاری بھی فائدہ کرتی ہے۔

پھر اس میں چونے کا سفوف ڈال کر تھوکنا چاہیے۔ اس مرض کے نمودار ہونے پر ایک مکان میں بہت آدمیوں کو نہ رہنا چاہئے؛ مچھلی، و گوشت نہ کھانا اور سنگریٹ حقہ نہ پینا چاہیے۔

جہاں تک مرض پھیلا ہو وہاں تک منہ ڈھک کر چلنا چاہیے

۱۸ دسمبر ۱۹۱۸ء کے لندن ٹائمز نے لکھا تھا کہ اس کے پہلے ہفتہ

اس زبردست مرض سے قریب ساٹھ لاکھ انسان مرے۔

لندن ٹائمز نے حساب لگا کر لکھا تھا کہ اس حساب سے گذشتہ

جنگ میں اموات کی تعداد کے مقابلہ میں اس مرض سے اموات کی تعداد پانچ گنا زیادہ ہے۔ اس کتاب کی مختلف بحاروں کی دوائیں اور علاج معاون ملاحظہ ہوں۔

سلام

(CEREBRO SPINAL FEVER)

یہ ایک قسم کا پھوٹ دار جراثیم (DIPLOCOCCUS) سے پیدا ہوا شدید بخار ہے۔ جوانی کی آئندہ شیت (دماغ پھاگن) اور اصول صحت کی ٹھیک طور سے پابندی نہ کرنی ہی اس مرض کا عام سبب ہے دماغ اور حرام مغزو وغیرہ (ریڑھ اور سر کو ڈھکنے والی جھلی) کی سوزش ہی اس مرض کی خاص علامت ہے۔ یکایک جاڑے سے بخار آتا۔ (کبھی کبھی تیز بخار۔ ۱۰-۱۲-۱۔ ڈگری تک)۔ ہڈیاں، قے یا قے کرنے کی خواہش چہرہ پر پھنیاں نکلا۔ پھیپھڑے کی سوزش، پیچھے کی طرف یا ایک طرف جسم کا ٹیڑھا ہو جانا۔ آنکھیں کبھی کبھی (مگر دکھائی نہ دینا) کبھی نظر ٹھہری عضلات کا مسکڑ جانا۔ گہری سستی، سر اور پیچھ میں بہت تیز درد۔ چپ پرے رہنا (STUPOR) قوما (COMA) اعصاب مفلوج ہونا؛ اس کے خاص علامات ہیں۔ مختصر علاج:- پینگوکن ۳، کے ساتھ کلکیریا کارب، سلف، فرم وغیرہ دوائیں جو غلٹی طباح کی خرابی کو درست کر نیوالی ہیں۔ کھلانا چاہیے۔ بلے پس، آرس آیوڈ، کیویریم ایٹ، ہلی بورس۔ وجی، مارکٹ۔

تکلیف یا فاس آڈی: سفوف وغیرہ دوائیں بھی مدد کیئے کبھی کبھی ضروری ہو سکتی ہیں۔
 علاج: سائیکوٹاسس۔ ۶۔ (اگر اس کو اس مرض کی خطانہ کرنیوالی دوا کہنا
 ملے تو بچانہ ہو گا۔) خاص کر پیچھے کی طرف جسم پیڑھا ہونے کی حالت میں
 بیلادونا۔ سٹ۔ ۶۔ ہڈیان کے ساتھ دماغ کی خرابی کے تیزی میں
 اوپیم۔ ۳۔ ۶۔ گہری نیند یا کمزوری کی حالت سانس کی آمد و رفت،
 آہستہ آہستہ، کھٹکی جسم کے کسی حصہ کا پیڑھا ہونا، منہ کھلا اور ناک سے خراٹے
 کی آواز، بلی بورس، ۳۔ ۲۔ مڑھائی ہوئی طبیعت، سر کے پیچھے اور گردن کے پیچھے زیادہ درد۔
 در گرم و ردی:۔ ستر پیچھے کی طرف پیڑھا ہو جانا۔ انٹیکس یا شیخ۔
 سمی سائیفوگا، ۳۔ (عضلات کا سکرٹنا۔ یا انٹیکس بند کرنے کے لئے جب
 اور دوائیں بے سود ہوں۔) یہ دینا چاہیئے۔

ایمون کارب۔ ۲۔ کان کے نیچے اور پیچھے تیز درد۔
 کروٹیلِس، ۳۔ سر سام کی خرابی، علامت میں مرنی کا بست رہنا۔
 خون زہریلا ہو جانا۔ ایسٹہ ہائڈرو۔ سٹ۔ ۲۔ مرنی میں یکایک مہلک
 پیریا، یا سردی وغیرہ کے مہلک علامات ظاہر ہوں۔
 جلیسم، ۲۔ ۳۔ ۲۔ مرض کے بعد کے علامات میں (جیسے فالج۔ بہر اپن وغیرہ)
 سلکا، ۶۔ سلفز۔ ۳۔ بہر اپن علامات میں۔

تپ محرقہ، اسہالی، ہڈیان، بخار، سر سام، دماغی اور حرام مغز کا سر سام وغیرہ
 دو سر بخاروں کی دوائیاں اور علاج معاون دیکھنا چاہیئے۔
 علاج معاون:۔ ہوا دار اور اندھیرے اور شور و غل سے علیحدہ کرے
 میں مرنی کو رکھنا، گرم پانی میں استنجہ بھگو کر پونچھنا، مقوی، تیلی اور ہلکی غذا۔
 مفید ناشتہ وغیرہ دینا چاہیئے۔ شراب وغیرہ محرک شے منع ہے۔

خون کا زہریلا بخار

(PUTRID FEVER)

(SEPTIC POISONING PYAEMIA GANGRENE ETC.)

پلیگ شدید، زچہ خانہ کا بخار، جیفرادی بخار، ٹائیفاڈ بخار وغیرہ۔

امراض میں چوٹ لگنے خواہ کسی وجہ سے ہو، تندرست آدمی کے جسم میں جراثیم یا زہر داخل ہونے کی وجہ سے خون میں خرابی ہو جاتی ہے اور بخار، مرض، پسینہ، کمزوری، گلیٹوں کا سخت ہو جانا، اور مواد پڑ جانا۔ جسم میں جگہ جگہ زخم۔ اور مواد پڑ جانا۔ اور مواد پیدا ہو جانا۔ وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی کا نام عفونی بخار یا سپٹی سیمیا ہے۔ باہر سے اگر جسم میں زہر داخل نہیں ہو گیا ہو، اور پیپ جم کر خون خراب ہو گیا ہو تو کوئی کوئی اس کو پائیا ہی کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں سپٹی سیمیا اور پائیا میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ یہ آج تک ٹھیک طور سے طے نہیں ہو سکا۔ زندہ جسم کا جب کوئی حصہ سڑنے لگتا ہے اس کو سٹرا زخم یا گنگرین کہتے ہیں۔

خون میں زہر کی علامت ظاہر ہونے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں کسی جگہ مواد پیدا ہوا ہے، یا کسی عضو میں جلن یا جسم کے اندر گہرائی پر کوئی پھوٹا یا التهاب غشاء باطن اول کی اندرونی جھلی کی سو جن پیدا ہو گیا ہو (HUEFIOCHROITIS) تین طریقوں سے یہ زہر (SEPSIS) جسم میں پھیل سکتا ہے۔

(۱) کوئی کیمیاوی سڑنے والی چیز کا خون میں ہل جانا۔ بخار کی علامت محسوس ہونا (۲) خون میں جراثیم کے داخل ہونے سے بخار کی علامت ظاہر ہونا۔ (۳) جسم میں مختلف رگوں اور آلات میں پھوٹا وغیرہ کی وجہ سے پیپ پیدا ہونا۔ علاج:- فائی ٹو لگا۔ زنی خوراک ۳-۵ قطرے یہ مشہور ہوتے ہی کہ خون میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آر نیکا، ۳- چوٹ، گرنا۔ زخم یا شتر وغیرہ سے جو مرض پیدا ہوا ہو۔ سچے پیدا ہونے کے بعد خون خراب ہو جائے۔ پاسروجن ۳، تیز بخار میں مرکوریس سال ۶، سڑنے کی علامت ظاہر ہونے میں آر نیکا ۳- بخینی۔ جلن پیدا کرنے والا درد، بخار کے ساتھ سستی، زبان سرخ، شاید یہی اس مرض کی خاص دوا ہے۔

۱۰ رات میں پسینہ، جار الگنا، جسم کی گرمی کا بہت زیادہ ہو جانا۔ اور نفی کمزور اور تیز ہونے سے مریض کو خاموش رہنا چاہیے۔

لیکس۔ خون خراب ہونا۔ کمزوری۔ نیند۔ بک بک کرنا۔
 بیٹیشیا X۳۔ سرسای علامت میں (جیسے بخار ۱۰۴ سے ۱۰۵) تپلا بدبودا
 سلیٹی رنگ کا دست، جسم میں اور سانس میں بدبو۔ زبان خشک اور میلی۔
 چنی نم سلف X۳۔ زائے کرنیو الانجار۔ ہلکا، دھوا اور عرصہ تک ہنے والا بخار۔
 رسا کس؛ ۳۔ جسم کی گلیٹوں پر حملہ ہونے میں؛
 برا یونیاس X۳۔ حرکت سے درد زیادہ ہونا۔ اخراج وغیرہ علامات میں۔
 انگیشیا۔ خون بہت زہریلا مریض کا جسم بہت بدبو کرتا ہو۔
 کاربووج ۳۔ قوت حیات کی کمی، ہاتھ و پیر گھٹنے چلنے نیلگوں جلن
 پیدا کرنے والا درد، وغیرہ علامات میں۔

ایسڈ میٹور ۶۔ گہری سستی۔ زبان خشک، دانوں پر میل؛ چوٹ
 کی وجہ سے خون خراب ہو تو زخم کی جگہ نورک ایسڈ مرہم لگانا چاہیے۔
 چوٹ یا شتر گنے کی وجہ سے زخم ہو تو آرنیکا ۳؛ کاندر ونی استعمال اور آرنیکا
 آٹھ گنے پانی کے ساتھ، بیرونی استعمال کرنا چاہیے۔ یا ہائی پیرکیم ۲۰۰۔ کاندر ونی
 استعمال اور پھوٹے کو سینکنا مفید ہو تا ہے۔
 سیکیل ۳۔ کیوٹائن (فی خوراک ۲ گریں تین گھنٹہ کے وقفہ سے)
 کرٹیل ۶ X۶ (اخراج خون کی علامت میں) جلس X۱۔ فاسفورس ۶؛ سکلانڈ
 الایس ۶؛ ہیر سلف ۳۔ ادویات یخ۔ یخ میں دینا ضروری ہو سکتی ہیں۔
 علاج معاون۔ شکر گواشتہ پال کے ڈاکٹر لوب (DR. BOBE)
 نے اس مرض میں حسب ذیل طریقہ بتایا ہے۔

اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مواد اچھی طرح نکل جائے کہیں بھی پیپ
 جمنے پر وہ نکال دیا جائے اور برباد جگہ دھو دی جائے۔
 دست صاف آنے کے لئے جلاب لینا اور گرم پانی سے نہانا اچھا ہے۔
 دو تین گھنٹہ کے وقفہ سے ٹکی اور مقوی غذا مریض کو تھوڑی کھلانا چاہیے
 مریض کو ہوا دار کمرہ میں رکھنا چاہیے۔ اگر مریض بہت کمزور ہو جائے
 تو اس کو تھوڑی شرب دی جاسکتی ہے۔

مرض عام حصّہ (ب) یا

۳۔ امراض سور مزاجی یا جسّہ یا حلقی

(CONSTITUTIONAL DISEASE)

وجع مفاصل دق کی کھانسی وغیرہ بہت سے امراض تمام جسم دیا یکے بعد دیگرے دوسرے عضو پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کو امراض جسّہ یا سور مزاج حلقی کہتے ہیں۔ یہ سب امراض ادویات سے اگر اچھے نہ ہوں تو سلاً بعد سلاً چلا کرتے ہیں۔ ان کی تشریح درج ذیل ہے۔

وجع مفاصل بانی

(RHEUMATISM)

جسم کی بجلی کی کمی کی وجہ سے جسم کی پرورش کے فعل میں نقص ہوتا ہے اور قوت حیات کمزور ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ غالباً ایک قسم کے جراثیم اس مرض کے خاص سبب ہیں۔

(DR. PAINE اور (DR. POYNTON)

مرض وجع مفاصل میں عام طور پر بڑے جوڑے ماؤف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی عضلات پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ جب بڑے جوڑوں پر حملہ ہوتا ہے تو اسکو وجع مفاصل (درد بند یا جوڑوں کا درد) (RHEUMATISM) کہتے ہیں اور اگر عضلات ماؤف ہوں تو اسکو عضلاتی وجع مفاصل

(MUSCULAR RHEUMATISM) کہتے ہیں

علاوہ انکے کبھی چھوٹے جوڑے بھی ماؤف ہوتے ہیں۔ اس حالت میں اسکو نقرس یا گٹھیا (Gout) کہتے ہیں؛ اوسط درجہ کے لوگ یا جو کم کھانے والے ہیں انہیں کو وجع مفاصل یا عضلاتی وجع مفاصل زیادہ ہوتا ہے۔ نقرس یا گٹھیا زیادہ تر امیروں اور عیش سے زندگی

بسر کرنے والے کو ہوتا ہے؛ ڈاکٹر ہیگ کا بیان ہے کہ خراب غذا و مشروبات کھانے پینے سے بعضوں کو یورک (Uric Acid) پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ مفاصل یا تفرس پیدا ہوتا ہے۔ وجہ مفاصل عضلاتی وجہ مفاصل اور گٹھیا کی تشریح درج ذیل ہے۔

وجہ مفاصل حاد (شدید) (ACUTE RHEUMATISM)

علامات :- جسم کے جوڑوں میں یہ بیماری ہو ا کرتی ہے۔ کبھی ایک دو، اور کبھی کل جوڑوں میں درد، اور جوڑاؤں ہوتے ہیں۔ مرض کے شروع میں بخار کے ساتھ جوڑوں میں سوزش (جوڑے یعنی بندوں خاصکر برے بڑے آماس کر جاتے ہیں۔ اور سرخ ہو جاتے ہیں اور درد پیدا ہو جاتا ہے)۔ مریض خاموش چپ رہتا ہے۔ اور حرکت کرنے سے بھی درد یا کڑن زیادہ ہوتی ہے۔ لڑھکھک، جلد گرم، نبض بڑا اور سخت در دسر پسینہ بد بو دار۔ لیسڈار پسینہ میں اگر بد بو زیادہ ہو تو لٹمس یا پیلا کاغذ (LITMUS PAPER) لگانے سے کاغذ سرخ ہو جاتا ہے؛ پیاس، زبان میلی، پیشاب تھوڑا، سرخ اور ترش بو دار؛ قبض، آلات تنفس، یا دل کے فعل میں خرابی۔ رات میں مرض کا بڑھنا۔ وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

اس مرض میں جسم کی حرارت ۱۰۴-۱۰۵- ڈگری تک ہو جاتی ہے۔

حاد وجہ مفاصل تین چار ہفتہ میں اچھا ہو جاتا ہے۔ اور مرض صورت اختیار کرتا ہے۔ اس مرض میں دل ماؤں ہو کر بائیں طرف درد سینہ میں درد، سانس کی آمد و رفت میں تکلیف وغیرہ علامات موجود ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ مرض بڑھ گیا ہے، یا سخت ہو گیا ہے۔ بد ہضمی اس مرض کے ساتھ اکثر ہوتی ہے۔ برائیت عورتوں کے مردوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے اور وہ کثرت سے موذی مرض کا شکار ہوتی ہیں۔

اسباب :- اس مرض کی تیزی کا حال ابھی تک دریافت نہیں

ہوا ہے۔ لیکن شبنم یا سردی نہ لگنا بہت دیر تک گیلا کپڑا پہنے رہنا یا پانی میں بیٹھ کر رہنا۔ تر جگہ میں رہنا۔ تر سخی، گوشت یا ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانا۔ یا فطر چکر کی کمی۔ خون میں لٹک لٹک ایسڈ کا جمع ہونا۔ سردی لگنے کی وجہ سے بیک ایک پسینہ کا لڑک جانا وغیرہ۔ مرض کے عام اسباب ہیں۔ وجہ مفاصل جریان کی وجہ سے بھی اکثر پیدا ہوتا ہے۔ حصار وجہ مفاصل میں جتنا زور کا بحار ہوتا ہے۔ جریان سے پیدا ہوتا ہے وجہ مفاصل میں اتنے زور کا بخار نہیں ہوتا۔ غرابا کو یا جوگ بہت محو کرتے ہیں۔ انہیں کو یہ مرض بہت زیادہ ہوتے دیکھا گیا ہے کثیر اور پتہ وغیرہ کے مریضوں کی اولاد کو اکثر وجہ مفاصل میں مبتلا ہوتے دیکھا گیا ہے۔

علاج

ایکونائٹ، ایلڈ۔ (حادثہ مفاصل کے شروع ہونے بہت اچھی اور کارآمد دوا ہے)۔ وجہ مفاصل یا عضلاتی مفاصل میں کثرت یا چلنے کی طرح درد، تیز بخار، بے چینی، باؤت جگہ سوچی ہوا، سرخ اور جلن، جھوک کم، پیشاب سرخ، گردن اکڑ جانا۔ آنکھوں میں جلن، بے شیت رت (مالگہ۔ پھاگن) کی ٹھنڈی ہوا۔ خشک ہوا لگنے سے جو وجہ مفاصل ہوا۔ سلفہ:۔ ۳۰۔ ایکونائٹ استعمال کرنے کے بعد (خاص کر وجہ مفاصل کا حملہ ہونے کے بعد جوڑوں میں درد، آنا س۔ اور کمزوری کے علامات میں) حاد یا مزمن کی تمام حالتوں میں یہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سلفہ کے مریض ہمیشہ گرمی محسوس کیا کرتے ہیں۔ اور کپڑا اتار کر پھیلتے ہیں۔ جسم کی پیشانی اور پیر کا تلو اگر کم۔ پسینہ زیادہ۔ اور ٹرسس، بودار

لہ ڈاکٹر بیگ کہتے ہیں کہ خون میں پورک ایسڈ پیدا ہو کر جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے جس سے حادثہ مفاصل ہوتا ہے۔ اور زمانہ حال کے چند ماہران علم کی رائے ہے کہ ایک

(MISTOCOCCUS RHEUMATICUS)

قسم کا خاص جرم

اس مرض کا خاص سبب۔ لیکن متذکرہ بالا کوئی ثبوت یا رائے نہیں ہے

حاد سوزشی، وجع مفاصل لہ
پلسا ٹیلا ۳-۴-۵۔ جوڑھوڑا سو جا اور تھوڑا سرخ؛
درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ اور پھٹنے کی طرح گھٹنے اور
ہاتھ پیر کے چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں دبار کھنے کی طرح درد۔ بہت جاڑا۔
بے چینی، نیند نہ آنا۔ حاد یا مزمن وجع مفاصل، جوڑوں میں آگاس۔

جرمیان کی وجہ سے گھٹنے کے وجع مفاصل کے درد میں یہ بہت زیادہ
کار آمد ہے۔ مسخرخی اور بخار درہنہ میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔
سمی سی فیوگا ۳۔ سینہ اور کمر ماؤن ہو۔ پشت اور پسلیوں کے
دونوں طرف سوئی چھبھونے کی طرح درد۔ گردن جکڑی ہوئی۔ گرمی اور آگاس
کے ساتھ پیروں میں درد۔ لرزہ چل نہ سکتا۔ کل جسم کو دبار کھنے کی طرح رشتہ
چھبھونے کی طرح، درد، سر یا ریٹھ میں تیز درد، تیز بخار۔

ایکٹا سائی کٹا ۳۔ چھوٹی گلیاں، کلائی، ایٹری اور ہاتھ و پیر
کی انگلیوں میں تیز درد، چھبھونے اور رات میں درد کا بڑھنا۔
میکروٹن ۳X۔ عضلاتی وجع مفاصل۔

مرکیورلس و اوس ۳X۔ سفوف۔ ایک یا بہت جوڑوں میں درد۔ آگاس یا ہائ
بدبودار یا تیل کی طرح پسینہ، بخار۔ رات میں بستر یا گرمی سے بیماری زیادہ ہونا۔
وایولا اوڈریٹا ۳۔ جسم کے اوپر کے حصہ میں دایں جانب
وجع مفاصل میں اس کے ذریعہ سے ڈاکٹر ہو وجع نے بہت سے مریضوں کو

لہ جان ولارم نام کے ایک صاحب کے ہاتھ، نیز وجع مفاصل کی وجہ سے
بالکل رہ گئے تھے۔ شہد کے مکھیوں کے کاٹنے سے وہ اچھے ہو گئے (دسمبر ۱۹۱۲ء)
اس تعجب خیز بات کو فٹنر علاج بالشل میں جن کا اعتقاد نہیں تھا۔ اس سے
بہت سے ڈاکٹروں نے کئی وجع مفاصل کے بیماروں کو شہد کے مکھیوں سے
کٹوایا۔ اس طریقہ سے اچھا ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ شہد کے مکھیوں
کے ڈنک میں فارمک اینڈ ہے۔ اسی کی وجہ سے مرض اچھا ہو گیا ہے۔

اچھا کیا ہے اور وہ لوگ بالکل تندرست ہو گئے۔

یو پے لوریم پرف ۱۱-X۔ یہ نشت کے درد کی بہت اچھی دوا ہے۔ انفلوینزا
میرا۔ یا صفراوی طریقہ یا ٹڈی یا عضلات سے بہت کام لینے کی وجہ سے نشت
کے درد میں (خاص کر سورہضمی کے مریضوں کے لئے آرنیکا، بلیس پیرنسی، برالیو نیا
رٹاکس، وغیرہ ادویات فائدہ کرنے یا بہت کم فائدہ کرنے پر۔

آرنیکا ۳۔ ۳۔ عضلاتی درد۔ اس کے بعد عضلات سخت ہو جانا۔
چوٹ لگنے یا گر جلنے کی وجہ سے بعد کے وجع مفاصل۔
فانی ٹوٹکا۔ ۳۔ گرمی کی وجہ سے وجع مفاصل۔ (انگیوں کے جوڑ میں
آماس، درد، سختی اور تپک۔

نیریم سلف ۱۲-X۔ (سفوف) جریان کی وجہ سے وجع مفاصل۔
آرم میٹا لیکم، ۳-X۔ (سفوف) ۳۔ ایک جوڑے سے دوسرے جوڑ
میں منتقل ہونے والا وجع مفاصل، آخر میں سینہ پر حملہ کرتا ہے۔
سونامشکل، سامنے کی طرف جھک کر بیٹھا پڑتا ہے۔ بہت پسینہ
سوزاک یا آتشک کی وجہ سے وجع مفاصل۔

حال میں ۱۹۲۲ء میں پیرس کے ڈاکٹر گرینٹ (Greenet)
صاحب نے کہا کہ (Colledal Gold for 1500) کا انجکشن
حاد وجع مفاصل کی تہا دوا ہے۔ یعنی گویا انہوں نے ہی اتنے عرصہ
کے بعد سونے سے دوا تیار کی ہے۔

فاسفورس ۳۔ ۳۔ بہت دیر تک پانی میں کپڑے وغیرہ
دھوئے یا دھو بی کا کام کرنے سے پیدا ہوئے وجع مفاصل میں مفید ہے۔
ڈلکمار ۶۔ پانی میں (خاص کر برسات کے پانی میں) بھینکے کی دھ
سے وجع مفاصل ہو، حاد اور مزمن دونوں طرح کے وجع مفاصل میں مفید ہے
لیکٹیک الیسڈ۔ ۳۔ ۳۔ ران، کندھا، کلائی، کہنی اور ہاتھ
وپیر کے چھوٹے چھوٹے جوڑے وجع مفاصل، وجع مفاصل کے ساتھ
گرم دکار آنا، منہ سے پاتی نکلنا، منہ میں زخم، تے کرنے کی خواہش۔

وغیرہ، بد ہضمی کے مرض کی علامت میں، پیشاب زیادہ ہوتے ہیں، یا
خزن کی کمی کے وجہ مفاسل میں نہایت مفید و کار آمد ہے۔

کالو قالم ۳۔ چھوٹے چھوٹے جوڑوں (خاص کر ہاتھ پیر کے پینچے اور ٹخنے و
انگلیوں کے جوڑوں میں تیر درد) درد سر، درد ایک جگہ زیادہ نہ رہتا ہو، گلٹھیر یا
(۵۔ ۷۔ قطرے) بہت تیز سوزشی وجہ مفاسل میں۔

سیربیرس و لکیرس۔ پیشاب کی خرابی کے ساتھ مزمن وجہ
مفاسل میں (خاص کر گلٹھنے کے وجہ مفاسل میں)۔

فیرم فاس، X۱۲۔ سفوف، ایکونائٹ، کی طرح کے علامات میں۔
بنزوائیک ایسڈ، X۶۔ آماس ہو کر سرخ ہو جانا۔ اتنا درد کہ چھونا برداشت نہ ہو۔
آر جنٹیم مسٹالسیم، ۶۔ گلٹھنے یا کہنتی کے درد میں۔ (برچھا
بھونکنے کی طرح کے درد،) جلن یا آماس نہیں ہوتا۔

کیسلی بائی کروم ۳۔ مزمن وجہ مفاسل میں۔
کلکیر یا فاسس۔ برسات میں مرض مزمن کی زیادتی میں۔
لیسڈم ۶۔ عادی مزمن وجہ مفاسل میں (خاص کر دینے سے
اوپر کی طرف چڑھتا ہو۔ کلکیریا ۳۔ دائیں طرف (خاص کر بازو کے

دائیں حصہ میں وجہ مفاسل ہو۔ درد اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہو
کاسیکم ۶، ۳۔ بائیں ہاتھ کی وجہ مفاسل کی خرابی میں۔
حرکت کرنے سے درد بڑھتا، اعصابی کمزوری میں نہایت مفید ہے۔
روٹا۔ ۳۔ کمر کے وجہ مفاسل میں۔

مزمن وجہ مفاسل کی دوائیں ملاحظہ ہو۔
بہت دیر تک پانی میں رستے کی وجہ سے وجہ مفاسل ہو تو
فاسفورس، رشتا کس۔

وجہ مفاسل صلی۔ بخار میں جسم کی گرمی ۵۰۔ اڈگری سے زیادہ ہو۔
روبنی کاکینڈرائٹ ایکونائٹ X۱۲۔ اگر یکس وراٹرم ورائٹ۔
سی سی فیکوگا۔ ر۔ ہیلادونا X۱۱۔ وغیرہ ادویات مفید ہیں۔

جوڑوں کے وجع مفاصل اور آماس میں؛ بیلاڈونا، برائی اونیہ، کوچیکیم۔ سلفر۔
 وجع مفاصل کے ساتھ مقام ماؤن سخت اور ٹیڑھا ہونے میں؛
 چائنا۔ رشاکس۔ وجع مفاصل جو مستقل ہوا کرے؛ پلساٹیلہ۔
 پارہ کے غلط استعمال سے پیدا شدہ وجع مفاصل، چائنا گوٹیکم۔ ہیپز
 وجع مفاصل کی اچھی طرح علاج نہ ہونے میں۔ کلیٹس؛ حقو جا۔

سوزاک کی وجہ سے وجع مفاصل

میڈونیم، ایکونائٹ، مارک سال، آرچنٹیم، نائی، حقو جا۔ سلفر۔
 پلساٹیلہ، سار سا پر یلا۔ مارک بن آیوڈائیڈ؛ (مرض جریان ملاحظہ ہو)۔
 آتشک کی وجہ سے وجع مفاصل میں
 ایسڈ نائٹرک۔ کیل آیوڈ، مرک۔ سفلی نم؛ آرم (مرض آتشک ملاحظہ ہو)۔
 وجع مفاصل جو سرد ہوا گئے سے ہو؛ ڈکمارا، رشاکس؛ بکلیر یا کارب۔
 وجع مفاصل جو ہر موسم کے تبادلہ سے ہو۔ برائی اونیہ۔ کاربووج۔
 روڈر؛ سلا۔ وراٹرم ایلپ؛

سینہ کے وجع مفاصل میں۔ مندرجہ ذیل دوائیں نہایت کارآمد ہیں۔
 برائی اونیہ۔ آرنیکا۔ روڈوڈنڈران۔ رشاکس؛ سسی سی فیوگا۔
 دل کے وجع مفاصل میں۔ اسپائی جلیا۔ ڈیجٹ، ایکون۔
 پشت اور سینہ کے وجع مفاصل میں؛ رشاکس، یوپیٹ پرف، لا؛
 کمر کے وجع مفاصل میں۔ ایکون۔ آرنیکا؛ سسی سی سیکیں؛ انٹم مارٹ۔
 آرنیکا، ساس بنیفائیڈر۔ اور میگنیشیا فاسٹ گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا
 چاہیے۔ کمر کا درد ملاحظہ ہو۔

سینہ کے وجع مفاصل میں

کالوسنتھ؛ ایکون۔ راس؛ آرس؛ سسی سی؛ نکس؛ فائو۔
 پہونچا، انگلیوں، یا چھوٹے جوڑوں کے وجع مفاصل میں؛ اکیلیا۔ سپائی جلیا؛

گھٹنے یا پیر کی انگلیوں اور گلیٹوں کے وجہ مفاصل میں۔

پس۔ ۳۔ آرام سے رہنے میں مرض زیادہ ہونے میں رسٹا کس۔ ۳۔
حرکت بڑھنے میں برائی اونیہ۔ ۳۔ چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں درد ہونے میں
اور اس مرض میں جڑ سے آرام کرنے کے لئے سلفر۔ ۳۔ استعمال کرنا چاہیے۔
بازو کے وجہ مفاصل میں فاسٹو لگا۔

بائیں بازو کے وجہ مفاصل میں۔ نکس ماسکٹا۔
دائیں کندھے یا بازو کے وجہ مفاصل میں فیرم فاسفوریکم۔ فانی ٹولکا
شکوہ نیریا۔ دائیں پہونچے میں اور اتری میں درد ہونے پر۔ دگو یا دہاں کی
بڑی کھسک گئی ہے۔ (راس۔ برائی اونیہ۔ روٹا۔
بری ہڈیوں میں درد، میزیریم۔ دائیں پیر میں درد۔ لیکس۔
بائیں پیر میں درد۔ ایلاپس۔

گرم چیزوں کے استعمال سے وجہ مفاصل کی زیادتی۔ برائی اور برائی اونیہ۔
فاسفورس۔ پس۔ حرکت کرنے سے۔ برائی اونیہ۔ کلیریا کارب۔
شام کے وقت۔ پس۔ راس۔ کو پچیکم۔
رات میں۔ آرس ویکس۔

آدھی رات کے پہلے۔ برائی اونیہ۔
دوپہر سے آدھی رات تک۔ بیلادونا۔ رسٹا کس۔
آدھی رات کے بعد۔ آرسنک۔ مرکوریس، سلفر۔ تھو جا۔
صبح۔ آرس۔ نکس۔ کیلی کارب۔ تھو جا۔
گرم چیزوں کے استعمال سے وجہ مفاصل کم ہونے پر۔
آرس، راس، لائیکو۔ میگنے فاس۔ سلفر۔
سرد چیزوں کے استعمال سے، پس۔ تھو جا۔
دہلنے سے کمی، بل، پس، راس۔

ٹھنڈی خشک ہوا لگنے کی وجہ سے وجہ مفاصل۔ ایکون۔ برائی اونیہ۔
ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے وجہ مفاصل۔ ڈلکا مارا۔ کالجیکم۔ ورٹرا

مندرجہ بالا ادویات کا مرض کی کمی زیادتی کے لحاظ سے ۳۔ ۲۔ طاقت میں استعمال کرنا بہت مفید اور کارآمد ہے۔

غذا وغیرہ

مرض کے شروع میں بخار کی حالت میں ساگو، ارادوٹ، باری، اور کھوڑا دودھ دیا جاسکتا ہے۔ شبنم از سر دی سے بچنا چاہیے؛ ماؤف مقام کو گرم کپڑے یا روئی سے باندھ کر رکھنا چاہیے۔ مرض کے وقت شراب، گوشت اور محرک غذا و ترش پھل نہ کھانا چاہیے۔ آزی ترکاری ساگ مفید ہے، مرض کم ہو جانے کے بعد روٹی یا ماول کھایا جاسکتا ہے۔ گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ مریضان وجع مفاصل سے لے سمندر کے کنارے کے مقامات میں رہنا مفید ہے۔ درد زیادہ ہو تو درد کے مقامات کو سینکنا یا نمک کی پوٹی سے سینکنا یا ہتھ ٹیڈ اسپرٹ کی مالش کرنا نہایت مفید و کارآمد ہے۔ ہر ایک مریض کو کبیل استعمال کرنا چاہیے۔

علاجی وجع مفاصل

(MYALGIA OR MUSCULAR RHEUMATISM)

اس مرض میں جوڑوں کی نسبت عضلات زیادہ ماؤف ہوتے ہیں۔ عضلات (MUSCLE) اور اُن پر لگا ہوا صفاق یعنی موٹی پھٹی (FASCIA) اور باریکون یعنی صفاق کے نیچے باریک وادار چھٹی (PERICSTEUM) کا اکڑنا اور ڈھیرھا ہونا۔ اس مرض کی خاص علامت ہے۔ آماں، سُرخ و غیرہ، سوزش کے دوسرے علامات اس میں بہت کم، اور شاید ہی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ بیمار اکثر ٹھیک ٹھیک بتا نہیں سکتا کہ درد یا مقام ماؤف کے عضلات (MUSCLES) میں ہے یا

کہتے ہیں کہ ٹیکیں، خشک (DR. H. DRINK WATER OF WREXHAM)

سور کا گوشت بہت نقصان کرتا ہے۔

اعصاب (NERVES) میں محسوس ہوتا ہے۔

اس مرض کے درجہ حاد میں ایک خاص عضلہ یا عضلات ماؤف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ساتھ ہی بخار بھی ہو جاتا ہے۔

مرض کی مزمن حالت میں بیمار کے مقام ماؤف میں طرح طرح کا تیز درد محسوس ہوتا ہے (خاص کر موسم (WEATHER) کے تبدیلی کے وقت) مزمن حالت میں اگر مریض کو "مقیاس الہوائیئے اعلازہ ہوا کا (BAROMETER) کہا جائے تو بخیر نہ ہوگا۔

گردن کے عضلات ماؤف ہونے میں اگر گردن یا گلے کا وجع مفاصل کن دھے کے عضلات ماؤف ہونے میں اسکو "مشازہ کا وجع مفاصل" سینہ کے عضلات ماؤف ہونے میں ذب ذات الجنب اور کمر کے عضلات ماؤف ہونے میں اُس کو کمر کا وجع مفاصل کہتے ہیں۔ اس کا پورا پورا بیان آگے کے چاروں بابوں میں کیا گیا ہے۔

اسباب:- مرطوب ٹھنڈی ہوا لگنا۔ یا محنت کرنے کے بعد سردی کا اثر کرنا وغیرہ اسباب سے یہ مرض ہوا کرتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو وجع مفاصل یا نفرس ہوا ہے انھیں کو یہ مرض بھی ہوا کرتا ہے۔ بہ نسبت عورتوں کے مردوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔

علاج

سمی سی فینوگا 4×3 ۔ (یا میکر وین سفوف 3×3 ۔ عضلاتی وجع مفاصل کی بہترین دوا ہے۔ سنگوئیر یا 4 بھی ایک اچھی دوا ہے۔ (خاص کر جبائیں طرف ہو۔) برائی او نیا 3 ۔ 30 ۔ (خاص کر پشت کے وجع مفاصل میں۔ رٹا کس 4 ۔ 30 ۔) پشت کے نیچے سے پیر تک درد پھیلا ہوا ہو) کالجیکم 3 ۔ 30 ۔ (پیٹ، پیٹھ اور کندھے کے درد میں) رس کیولس 4×3 ۔ (درد پہلو میں) جلیسم 3 ۔ 30 ۔ کروٹین 3×3 دیکارا 3 ۔ کاسیکم 4 ۔ وغیرہ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کھانے پینے کا ٹھیک وقت ضروری ہے۔ سینہ یا بادر بھی اچھا ہے۔ وجع مفاصل اور نفرس کا علاج ملاحظہ ہو۔

(STIFF-NECK)

درد عضلاتی - گردن

گردن کے پیچھے رٹیرھ میں وجع مفاصل ہونے میں گردن سخت اور پُر درد اور اکڑ جاتی ہے۔ ایک طرف (خاصکر بائیں جانب زیادہ درد ہوا کرتا ہے۔ سر ایک جانب ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یا ایک جانب جھک جاتا ہے۔ ایکونائٹ ۳۔ (یہ شروع درجہ کی دوا ہے۔)

خاصکر بخار، بے چینی، سردی سے درد ہو۔

لیکنٹمس ۳۔ اس مرض کی بہت اچھی اور کامیاب دوا ہے۔ گردن ایک طرف (خاصکر دائیں طرف) ٹیڑھی ہو جائے اور اُس کے ساتھ گلے میں پسینہ ہو تو یہ زیادہ فائدہ کرتی ہے۔

بیلادونا۔ یکایک درد پیدا ہونا۔ اور یکایک غائب ہونا۔

سمی سی فیوگا ۳۳۔ بہت جگہ یہ بھی فائدہ کرتی ہے۔

برائی اونیاہ ۳۔ ڈاکٹر کاؤ پر تقویٹ کی رائے ہے کہ یہ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ (خاصکر گلے میں تیز درد ہو۔) لیکن مقام درد کو دبا رکھنے سے درد میں کمی ہو جائے۔

چیلے ڈونیم ۳۳۔ گردن کی دائیں جانب سختی اور درد ہو۔

میگنیشیا فاس ۲۴۔ سفوف۔ (غوب گرم پانی کے ساتھ استعمال

کرنا چاہیے۔) حاد اور مزمن مرض کی یہ بہت اچھی اور کارآمد دوا ہے۔

ڈاکٹر میگنیشی نے ایک مرض کو اٹھارہ ماہ یہ دوا کھلا کر ایک دم اچھا کیا ہے۔

علاج معاون:- مقام ماؤف پر نلائین رکھ کر اُس پر چکنا

لوبا یا استری رگڑنے سے سختی اور درد کم ہو جاتا ہے۔ مریض کے سر کے نیچے کا تکیہ اور بستر دھوپ میں ڈالنا چاہیے۔

(OMALGIA)

عضلاتی درد کٹ دھا۔

گردن کا عضلہ کچھ مثلث نما ہے۔ اسی لئے اس کو مثلث نما عضلہ (Deltoid) کہتے ہیں۔ اس عضلہ میں وجع مفاصل یا درد عصبی ہو تو

(ARM) کندھے کے جوڑ تک نہیں اٹھا سکتا۔ سینگو نیر یا اس کی خاص دوا ہے، مقام ماؤنٹ کو روئی یا فلائین سے ڈھک کر رکھنا چاہیے۔
وجع مفاصل کی دوائیاں ملاحظہ ہوں۔

(PLEURODYNIA)

کاذب ذات الجنب

پسلی کی ہڈی کے (خاص کر بائیں حصہ کی) درمیانی عضلہ کا ماؤنٹ ہونا۔ ذات الجنب کہلاتا ہے۔ حرکت کرتے، سانس نکالتے اور کھانسنے پر سینہ میں درد محسوس ہونا۔ اس مرض کی خاص علامت ہے۔
انین کیولس ایلب ۲۔ ۳۰۔ اسکی خاص دوا ہے "وجع مفاصل" اور "تھیا" کا علاج اور دوائیں ملاحظہ ہوں۔ وجع مفاصل کی دوائیاں دیکھئے۔

(LUMBAGO)

عضلاتی درد مکر

درد اگر کمر کے عضلات میں قائم رہے تو اسکو عضلاتی درد کہتے ہیں مگر یہ عضلات پشت کی ریڑھ کا بوجھ برداشت کرتی ہیں۔ اسی لئے معمولاً اس دوا کے زیادہ ہو جانے سے مریض نہ تو سیدھا بیٹھ سکتا ہے اور نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔
سردی کا لگنا۔ پانی میں بھینکا۔ بھاری چیز اٹھانا وغیرہ سے یہ مرض بیکایک پیدا ہو جاتا ہے۔ کمر میں تیز درد، ہلکا بخار۔ یا بخار نہ رہنا۔ دبانے یا حرکت کرنے سے درد کی زیادتی۔ تیز درد ہو جانے کی وجہ سے مریض کا بستر سے نہ اٹھ سکتا۔ وغیرہ علامات محسوس ہوتے ہیں۔

علاج

رسٹاکس ۴۔ ۳۰۔ اس مرض کی خاص دوا ہے۔
(خاص کر جب ٹھنڈی اور تر ہوا سے یا بھاری چیز اٹھانے سے یہ مرض ہو) (مزمن عضلاتی درد کمر، مزمن عضلاتی درد کمر میں۔ اگر ٹن رہے۔
یا رات میں آرام کے وقت یا صبح اٹھنے کے وقت ماؤنٹ کمقادات کے

حرکت کرنے سے درد زیادہ ہو تو رسٹا کس فائدہ کرتا ہے۔ اگر رسٹا کس سے فائدہ نہ ہو تو بریس و لگیٹس دینا چاہیے۔

بریس و لگیٹس ۳۔ اگر جگر اور پیشاب کی خرابی موجود ہو، پسلی کے نیچے درد ہو، جگر میں درد ہو۔

صفقرار کے تھیلی کی پتھری (GALL STONE) کے ساتھ درد ہو۔ ایکونائٹ ۳X۔ عارضی مفاصل میں خاصکر جب خشک سرد ہوا سے درد ہو۔ آرٹیکا ۳۔ ۳X۔ بھاری چیز اٹھانے سے یا چوٹ لگنے سے یہ مرض پیدا ہوا ہو۔ ایکونائٹ۔ رسٹا کس کے بعد یہ فائدہ کرتا ہے۔

سسی سی فیوگا، ۳X-۳۔ یا کروین ۳X-۳۔ عضلات کی تکلیف کے ساتھ بے چینی ہو۔ اور نیند نہ آتی ہو تو اس درد کو دینا چاہیے۔ ڈاکٹر کلارک، کہتے ہیں کہ میکروٹن ۳X کے استعمال سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔

انٹیمٹارٹ، ۳X-۳۔ سفوف، ۶۔ پشت میں درد (خاصکر غذا کھانے اور بیٹھنے کے بعد) ریڑھ کی ہڈیوں، اور کمر میں درد، لیڈار اور سرد پسینہ، کبھی کبھی تشنج، تھوڑی حرکت سے قے کرنے یا متلی ہونے، یا سرد لینڈا پسینہ نکلنے سے درد کی زیادتی، ڈاکٹر ان بیر، کلارک جوے کرومین، اس دوا کے بڑے حمایتی ہیں۔ لگاتار درد قائم رہے تو ایسی حالت میں ڈاکٹر ہونج نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

ڈاکٹر کلارک کی رائے ہے کہ یہ دوا ۱۲ طاقت میں دی جائے فانی ۱۲X-۱۲۔ تیز درد۔ (درد گردہ کی وجہ سے)

سلفر ۳۔ ۲۰۰۔ مرض مزمن میں بیچ بیچ میں دینا چاہیے۔

علاج معاون

شدید مرض میں درد کے مقام پر تھوڑا تار میں کا تیل ملنا چاہیئے یا گرم فلین سے سینکا چاہیئے۔ مزمن مرض میں روئی کا کمر بند کام میں لانا چاہیئے۔ (درجن وجہ مفاصل کے ادویات ملاحظہ ہوں۔)

لنگڑی کا درد

(SCIATICA)

ران کے عصب (Thigh - Nerve) کی سوزش کی وجہ سے جو عصبی درد کی طرح درد ہو۔ اس کو عرق النساء کہتے ہیں۔ ٹھنڈی خشک یا ٹر ہوا لگتا وزنی چیز اٹھانا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔ وجہ مفاصل، گھٹیا عصبی درد والوں کو یا ان لوگوں کو جو مرض جریان وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ مرض ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ یہ مرض جس جگہ ہوتا ہے اس میں نہ تو آنا س ہوتا ہے اور نہ سفر فی ہوتی ہے۔ اس مرض سے آہستہ آہستہ سل ظہری (Locomotor - staxia) ہو جاتا ہے۔

علاج

ایمون میور ۳۰ x ۳۔ بیٹھے رہنے سے درد زیادہ ہونا۔ چلنے سے کچھ کم ہونا اور سو جانے سے بالکل بند ہو جانا۔

کالوسنتھا ۳۰۔ اس مرض کی یہ مخصوص دوا ہے۔ درد یکایک پیدا ہو اور یکایک غائب ہو جائے۔ سردی یا نمی سے یہ مرض ہو۔

نفا لیم (GNAPHALIUM) ۳۰-۳۔ جب اعصاب میں درد ہو، درد کے ساتھ اینٹھن (یکے بعد دیگرے) ماؤف مقام میں تیز درد۔ اور بدحواسی۔

لامیکو ۱۲۔ دائیں جانب کا وجہ مفاصل، دن میں سہ پہر کو یا ماؤف حصہ دبا کر سونے یا ذرا اچھو جانے سے درد کا بڑھنا۔

کاربوونیم سلف۔ عادی مزمن عرق النساء، اگر آرام ہونے کے ناقابل سمجھا جائے۔ (کوئی دوسری دوا فائدہ نہ کرے)

میگنیشیا فاس ۲ x ۳ x ۵ (فی خوراک ۵۔ گرمین پانی کے ساتھ) بجلی کی طرح درد، گرمی سے درد کم ہو جاتا ہے۔

آرس سلف۔ ابرم ۶-۳۰۔ بوڑھے یا دم بڑے مریضوں کے لئے۔ انفلیزرا کے بعد وجہ مفاصل ہوتے ہیں۔

نیز سلف ۱۲ x سفوف ۱۰ بٹیکر کھتے ہی درد بڑھنے لگے ہو کر (کمر جھکا کر) بیٹھنے میں درد ہو۔ لیکس ۱۶۔ ۳۰۔ فیض کے بند ہونے میں مرض ہو۔ جاگنے پر درد بڑھتا ہو۔ ایکو نائٹ ۳ x۔ تیز ہوا لگنے سے کمر کے اعصاب میں وجع مفاصل ہو گیا ہو۔ جسم میں جھنجھٹا ہٹ اور شش محسوس ہو۔ رٹاکس ۶۔ تری یا نمی کی وجہ سے عرق النساء۔ آرسنک ۳۰۔ بوڑھے اور کمزور لوگوں کو عرق النساء یا فالج ہونے میں سیکنے سے درد کا کم ہو جانا۔

سلف ۶۔ ۳۰۔ مرض مزمن میں سلف کی ایک دو خوراک بیچے بیچے میں دینا چاہیے۔ "عصبی درد" اور "درد کمر" کی دوائیں ملاحظہ ہوں۔ علاج معاون:- جسم میں ہوا کا کھینچنا لگنے پائے۔ گرم کرے میں دوا یا زیٹون کے تیل کی مالش کرنا۔ کمر کو دبانا۔ مقام ماؤف پر کمبل رکھ کر اس پر استری کرنا اور لیون کا عرق پینا فائدہ کرتا ہے۔

مزمن وجع مفاصل (CHRONIC RHEUMATISM)

اس میں فاص کران کے جوڑ بیتلا ہوتے ہیں اور حادث وجع مفاصل کے دوسرے کل علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن بخار اور پسینہ بہت کم نمایاں ہوتا ہے۔ صرف جوڑ کا مقام سخت اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ درد اور آماس بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن ماؤف جگہ میں پانی جمع ہو کر آماس ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں بد سہمی کے علامات اکثر موجود رہتے ہیں۔

علاج:- (اس مرض کا علاج کرتے وقت مرمل سور د بد سہمی، بد سہمی کے علامات یہ نظر رکھتے ہوئے دوا منتخب کرنا چاہیے)

کیلی ہائیڈرو۔ ۱ x سفوف ۳۰۔ تیز درد ہو اور بیماری کی حالت بار بار بدلتی۔ حادث وجع مفاصل کے بعد جائے ماؤف سو جائے اور کھڑا ہو گیا ہو۔ بیماری میں چلنے کی طاقت نہ ہو۔ جوڑوں میں کمزوری۔ آتشک (ڈیٹھی) کی وجہ سے گھٹیا ہو۔

میں درد کی وجہ سے پیشانی کی طرف ہاتھ نہ اٹھایا جاتا ہو۔ شام کے وقت درد میں زیادتی، اور صبح کے وقت کمی۔ رات میں بغیر حرکت کے سویا نہ جائے۔ انگلی کے جوڑوں میں دبا رکھنے کی طرح درد۔

کھوجا ۶۔ ۲۰۰ ٹیکے کی وجہ سے (یعنی ٹیکہ لگانے کے بہت دیر بعد) وجع مفاصل ہو۔ ایک مرتبہ ایک ادویہ عمر کے آدمی کو بائیں کندھے کے مفاصل میں وجع مفاصل ہوا لیکن کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ بعد کو یہ ظاہر ہوا کہ اس زلزلہ کپن میں کئی مرتبہ ٹیکہ لگوا یا تھا۔ اس وقت اس کو کھوجا دینے سے بہت فائدہ ہوا۔

مرکیورلس سال ۶۔ ۳۰۔ نکلنے کی طرح ہڈیوں میں درد، اور تھوڑا بخار، جاڑا محسوس ہوتا۔ مرض کے مقام میں کھٹا بندہ بوڑھا لپینہ اور لپینہ نکلنے پر بھی درد کم نہ ہوا۔ رات میں ستر کی گرمی سے درد میں زیادتی۔ کبھی پیٹ میں اینٹھن کے ساتھ آنکھوں میں ملا دست، سوزاک یا آنکھ کے بعد آیا وجع مفاصل (اگر پارہ یا مرمری کھلا یا گیا ہو)۔

”مساد وجع مفاصل“ کی ادویات ملا دیتے ہوں۔

ٹائیسٹرک ایسڈ ۶۔ ۲۰۰۔ پارہ کے غلط استعمال سے وجع مفاصل میں سپیا، سلفر، وغیرہ ادویات کی بھی کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

غدا ج معاون :- دودھ، گھسن اور پینر مرغن وجع مفاصل میں غذا ہے۔ گوشت کبھی اچھی غذا ہے۔ پرانے مرغن کو خشک جگہ میں رکھنا چاہئے۔ پیر میں پانی یا سردی نہ لگنے پائے۔ کچھ گرم پانی میں (بہت تھوڑا سا گرم) غسل کرنا۔ زود سہم غذا کھانا اور تھوڑی مقدار میں کالہ آیل استعمال کرنا چاہئے۔

شراب وغیرہ نہ پینا چاہئے۔

نقرس گھٹیا
(Gout)
جسم میں چھوٹے چھوٹے جوڑے (small joints) جیسے (پیر کے

انگوٹھے جوڑاؤں پر ہونے والے لوگوں کو تقریباً گھٹیا ہوتا کہتے ہیں۔ غالباً
 ان چھوٹے جوڑوں میں یورٹ آتے سو ڈیم جمع ہوا کرتا ہے۔ اور خون
 میں یورک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ یہ مرض خاص کر امراہ عیاشوں
 کو ہوتے دیکھا گیا ہے۔ گھٹیا والے مریضوں میں پیٹ کی خرابی اکثر
 ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کو یہ مرض ہو، تو پشت و پشت ہوتا ہے۔
 بد ہضمی۔ جسم تندرست نہ رہتا، سر بھاری، کھنکھانے کا زیادہ لگا کرنا
 رات میں بیماری کا بڑا حصہ وغیرہ۔ گھٹیا کے علامات سابقہ ہیں۔ اس
 کے بعد آہستہ آہستہ جوڑاؤں کو ہوا جاتے ہیں اور مزمن تقرس
 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دل اور پیشاب کی بیماری بھی پیدا
 ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انگلیوں کی ٹھکیاں بڑھ کر بڑی دکھاال
 دینے لگتی ہیں۔

علاج

یورٹک ایسڈ کی خوراک ۵۔ (پانچ) قطرے خوب گرم
 پانی میں ہر چار گھنٹہ کے وقفہ سے دینا چاہئے۔ یورک ایسڈ اور
 پیشاب کے ذرات جسم سے نکل کر مرض جلد دفع ہو جاتا ہے۔
 کو لچیکیم ۳۰۔ مرض دل یا معدہ کی خرابی رہنے میں اس دوا سے ہم
 لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ ایو پیٹک ڈاکٹر ان مریض کو کو لچیکیم
 زیادہ مقدار میں کھلا کر بول زبانی پیدا کر دیتے ہیں۔
 آرم میوورس ۳۰۔ دل کی کمزوری کے علامات ہیں۔
 سیباکنا ۳۰۔ گھٹیا کے ساتھ اگر رحم کی خرابی ہو۔
 بلیساٹیل ۶۔ اگر ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں درد گھومتا ہو۔
 نیٹرم میوورس ۳۰۔ ہمیشہ جاڑا محسوس ہوتا ہو۔ سمندر کے کنارے
 کی جگہ میں رہنے سے مرض بڑھ جائے۔
 لائیکو لیو ڈیم ۱۲۔ پیشاب میں سرخ ذرات ملے ہوں۔
 آرنیکا ۳۰ مریض کو ایسا خوف ہو کہ گویا اس کا کوئی پیسہ
 کاٹ کر پھینک رہا ہے۔

سبز و نیک الیڈ ۳۔ ہاتھ کی انگلیوں میں گھٹیا ہو۔
 ایکون: کلک کارب، سیبنا: (شدید بیماری میں)۔ الیڈ فاس:
 کلک فاس، کاسٹیک، لائیکو، بلیس، نکس واء انٹم کمر وڈ، سلفر۔ (مرغن حالت
 میں) فائدہ مند ہیں۔ یہ ادویات ۲۔ ۳۔ قوت کی دینی چاہئیں۔
 ”وجع مفاصل“ کی دوائیں ملاحظہ ہوں۔

خلا:۔ زیادہ مقدار میں مرغن چیزیں اور سفید البومین ملی چیزیں
 مچھلی، گوشت، شراب منع ہے، پھرتے چاول، پھوڑا (دودھ)، دال، روٹی۔
 پوری، حلوا، سیب وغیرہ اچھی غذا ہیں۔ مرغان نقرس کو خوب گرم پانی
 اور پھل میں خوب رس ہوا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

جوڑوں کا پتھرا نا

(ARTHRITIS DEFORMANS)

بہت عرصہ تک جوڑوں (joints) کی سوزش رہنے سے
 اس جگہ کارنگ بدل جاتا ہے (deformed) یعنی ماؤف
 جوڑوں کا بندھن (ligaments) و سہمی (باندھی مچھلی)
 (Synovial Membrances) اور پٹیاں پتلی ہو جاتی ہیں۔
 یا بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح بدلنے یا بڑھنے کی علامت دکھائی دینے سے
 سمجھنا چاہیے کہ مرغن کو مرغن، وجع مفاصل ہو گیا ہے۔ متقدمین حکماء
 اس مرض کو وجع مفاصل گھٹیا (Rheumatic Gout)
 کہتے تھے۔ لیکن یہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ”وجع مفاصل“ یا گھٹیا
 ایک مرض نہیں۔ یہ ایک علیحدہ مرض ہے۔

اس کا سبب اب تک طے نہیں ہوا۔ لیکن نا انھیال یا دودھیال میں
 یہ بیماری ہوتا۔ نمی یا سردی لگنا وغیرہ اسباب میں سے کوئی یا کُل اسباب
 سابقہ ہو سکتے ہیں۔ بہت عرصہ سے پیپ ہنا۔ دانت یا سورھوں
 کی بیماری و جسم یاں۔ پیڑ و کی سوزش، سیلان،

رجم وغیرہ علامات میں مبتلا رہنے سے مزمن التهاب مفصل ہو سکتا ہے۔
 شروع میں بخار کے ساتھ ماؤف جوڑ ہو جاتے ہیں۔ اس کے
 بعد یکے بعد دیگرے جوڑ ماؤف ہو جاتے ہیں یعنی جوڑ سوج جاتے
 ہیں! سخت ہو جاتے ہیں اور حرکت کرنے سے کچھ کچھ آواز نکلتی ہے۔
 اور جوڑوں کے اُدھر اُدھر یا چاروں طرف کے عضلات پٹلے اور ٹیڑھے میڑھے
 ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مریض میں خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت
 مردوں کے عورتوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔

علاج

مریض کے شروع کی حالت میں۔ پلیسٹیل ۳۳x۶۶، ایکونائٹ ۳۳x۳۳۔ برالوینا ۳۔
 مزمن مرض میں

گوٹیکم ۳x۶ یا کوکچیکم ۶۔ (خاصکریب ران کے جوڑ ماؤف ہوں اور سلفر۔ ۳۰،
 رٹاکس ۳۔ ۳۰۔ حاد اور مزمن دونوں میں فائدہ کرتا ہے۔ مرک آئیوڈ اور سلکا
 کی بھی بیج بیج میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔

عورتوں کو یہ بیماری ہونے میں:- پلیسٹیل ۶ (اس مرض کے
 ساتھ اگر خون میض تھوڑا اخراج ہو یا بند ہو جائے) سیائٹا ۳۔
 (خاصکریون میض بہت اخراج ہو) سی سیوگا ۳ (در در پہنے میں کالوفالک ۱x)۔

علاج معاون

ابھی طرح آرام کرنا۔ اور معمولی صحت کے اصولوں کی پابندی کرنا۔ گرم کپڑے
 پہننا۔ ماؤف جوڑوں کو صبح و شام سینک دینے کے بعد کاڈلیور آئیا کی مالش کرنا۔
 چاہیے۔ محرک اشیاء جیسے شراب وغیرہ کھانا پینا منع ہے۔
 ("وجع مفاصل" اور "نقرس" کا علاج ملاحظہ ہو)

وجع مفاصل کی مختلف علامات اور ادویات

جسم کے اعضاء کا سن ہونا اور بے چینی کے ساتھ کل جسم ماؤف ہونا۔
 دانے عضو کا وجع مفاصل۔ کو بی وجع مفاصل، زور سے دبانے پر

درد کا کم ہوتا! قوتِ حیات کے زائل ہونے کی حالت میں سنگوتا۔ یا چائنا
زور کا درد بنارہنا۔ سنگنا اور ماؤف جگہ کا سن ہو جانا۔ خشکی اور جلن
ٹھنڈی ہوا سے وجعِ مفاصل ہونے میں۔ ایکونائٹ۔

ناقابلِ برداشت درد۔ کافیا۔

ناقابلِ برداشت درد۔ تشنج، کاٹ ڈالنے کی طرح کا درد۔
گھومنے والا درد، ماؤف جگہ تیلی ہونا۔ مریض کو ہمیشہ جاڑا محسوس
ہونا۔ ہوا اور جسم کا کپڑا پکڑے رہتا ہو۔ رات میں مرض کی علامات
بڑھنا۔ کھکی ہوا میں درد کا کم ہو جانا۔ پلساٹیل۔

درد ناقابلِ برداشت۔ رات میں درد بڑھنا۔ غصہ، و مزاج۔
احساس کی تیزی۔ کیمولا۔ بدحواسی، کمزوری، کانپنا۔ سوئی جھونے
کی طرح توڑنے والا یا برعکس بھونکنے کی طرح درد میں۔ فرم۔

جھونے یا دبائے کی طرح درد آہستہ آہستہ بڑھتا ہو۔ اور آہستہ
آہستہ کم ہوتا ہو۔ پلانٹا۔

گردن میں وجعِ مفاصل ہو یا وہ اکڑ جائے۔ لیکھٹس۔

کچلنے کی طرح درد۔ برابر بنا رہے۔ ایسی علامت میں۔ نیکموس۔

چاقو مارنے کی طرح درد۔ ٹیکہ لگانے کے بعد وجعِ مفاصل۔ بائیں
عضو میں وجعِ مفاصل۔ چائے پینے والوں کے وجعِ مفاصل میں۔ تھو جانا۔

جھل جانے کی طرح۔ دبا جائے یا جھونے کی طرح درد۔ غصہ سے

پیدا ہوئے وجعِ مفاصل میں کمر کا عضبی درد۔ کمر سے لیکر تلوے تک

سارا غصہ گویا گھٹا جاتا ہے۔ کالوسٹھ۔ پانی میں رہنے کی وجہ سے

ٹکیر یا کارب۔ درد جس میں جلن ہو۔ بے چینی۔ جاڑا محسوس ہونا۔

آدھی رات میں ہمیشہ درد بڑھنا۔ شرمی سے کم ہونا۔ جوڑ کے

مقام کا سو جانا۔ اور درد کی علامات میں۔ (دزمن وجعِ مفاصل۔ آرسنک،

آندھی طوفان آنے کے کچھ ہی پہلے کے وجعِ مفاصل میں۔ روڈروڈ نڈران ٹیکہ

لگانے کے بعد وجعِ مفاصل میں۔ نہانے کے بعد وجعِ مفاصل بڑھنے

میں انٹم کروڈ۔ ماد و جمع مفاصل کے جوڑوں کا بڑھنا۔ سختی، اور آماس کے علامات میں۔ آیو ڈاکٹن۔

حاد اور مزمن مرض میں سلفس بہت فائدہ کرتا ہے۔ ماد و جمع مفاصل میں ایکوٹائیٹ کھلانے سے مرض کچھ کم ہو جائے تو سلفس فائدہ کرتا ہے۔ ریفن کو ہمیشہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور جسم کا پڑا اتار ڈالتا ہے، سرگرم پر ٹھنڈے۔ ترش بودار پسینہ۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی پاخانہ کی حاجت۔ رات میں مرض بڑھ جاتا ہو۔ بائیں عضو کے وجہ مفاصل کے علامات میں سلفر دینا چاہئے۔

تیز چھیدنے یا برعکس بھونکنے کی طرح درد۔ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا کرے۔ فائٹو لکٹا۔

جسم کے دائیں طرف سے بائیں طرف درد پھیل جاتے۔ ماؤف جگہ کو بڑھانے سے درد بڑھ جاتا ہے۔

سہ پہر کو ۴ بجے سے ۸ بجے رات تک مرض کی ترقی ہو۔ وجہ مفاصل کی وجہ سے ہاتھ پیروں کی انگلیاں ٹیڑھی، بندرگ ہو جائیں۔ لائیکو پوڈیم۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم کا ماؤف حصہ گویا جھیل گیا ہے۔ آہستہ آہستہ درد بڑھتا ہو۔ اور آہستہ آہستہ ہی کم ہوتا ہو۔ آرج نائی۔ جسم کے اکثر حصہ ماؤف ہوں۔ بد مواسی، ٹھنڈک۔ اور کانٹا۔ صبح کی طرح درد و جمع مفاصل، اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ کلیمیا۔

نیچے کے حصہ سے اوپر کو درد جاتا ہو۔ ریفن گرمی نہ برداشت کر سکتا ہو۔ برف کے پانی میں پیر ڈبوئے رکھنا چاہتا ہو۔ لیسٹم۔

عضلات میں بھونکنے کی طرح درد سے ریفن پاگل کی طرح چلاتا ہے۔ کیرم۔ برعکس بھونکنے کی طرح درد۔ ماؤف مقام کو دبا کر سونہ سکتا ہو۔ خاموش نہ بیٹھ سکتا۔ نیند کھانے پر سستی۔ دوپہر کے پہلے پسینہ وغیرہ میں سیپا۔ برعکس بھونکنے کی طرح درد۔ صبح بھونکنے سے جلن محسوس ہوتا۔ دائیں حصہ میں وجہ مفاصل؛ نیند کھانے پر تکلیف کا بڑھنا وغیرہ علامات میں۔ لیکس۔

بائیں عضوں میں وجع مفاصل یا عرق النسا رکھا لسنے یا رات کو چٹ لیٹنے میں درد
بڑھنا وغیرہ علامات میں۔ ٹیلیوریم۔

بجلی کی طرح درد، خون روکنے والا کانٹا چھونے کی طرح درد، یا وریدوں
میں کو یا نگھا ہوا سیسہ کسی نے ڈال دیا ہے۔ پلاٹینیئم۔

جسم کے اعضاء میں مثل جلن کے درد کی علامت میں کاربووج۔

بہت درد محسوس ہوتا ہو۔ لیٹر سخت محسوس ہونا۔ اس لئے ریفنی
ادھر ادھر کر ڈے بدلتا ہو۔ کچلنے کی طرح درد محسوس ہو۔ چوٹ لگتا یا
بھاری چیز اٹھانا۔ بہت سخت کرنا وغیرہ سے وجع مفاصل ہو، آرنیکا۔

درد یکا یک بڑھ کر بند ہو جائے۔ سیلاڈونا۔ الیا درد محسوس ہو
گویا جسم کے بیرونی راستہ میں لکڑی کی کھونٹی ٹھونکی گئی ہے۔ الیڈناٹیرک۔

چہرہ میں درد، گویا گوشت کا حصہ نوچا جا رہا ہے۔ اس قسم کی علامت میں
فاسفورس بہت مفید اور کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔

رات میں درد (گویا بڑی لوٹ گئی ہے) کی علامت میں، الیڈ فاس

خشک ٹھنڈی ہوا سے لگنے سے وجع مفاصل، کھوڑی حرکت سے ہی

وجع مفاصل کی زیادتی۔ مریض مستقل طور سے ایک جگہ بیٹھ نہ سکتا

ہو، دل کے وجع مفاصل کی علامت میں برالیوینا۔

سوئی چھینے کا سا درد، جس میں جلن ہو۔ اور چلتا پھرتا ہو اور جوڑ

سو جے۔ چکیلے سرخ رنگ کے عضلات میں۔ اے اسپس۔

تمام جسم کے عضلات کا کڑا زبردیٹ کے بڑے عضلات میں وضع مفاصل

مرض پیدا کرنے والا نو بی اعصابی درد، بجلی کی طرح یکا یک تیز درد،

گردن میں وضع مفاصل، اریٹھ کے مقام جوڑ میں درد۔ سمی سی فیکو۔

سوئی چھونے یا چھونے کی طرح درد۔ کمر سے جاتنگھ تک تیز چھینے

کٹنے یا نکتا تار تکلیف دینے کی طرح درد (خاکر داہنے حصہ میں رات

کے دو بجے سے ۵ بجے صبح تک مرض کا بڑھنا۔ کیلی کارب۔

ہاتھ کی انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں وجع مفاصل

فرمن اعصابی درد۔ آنکھ کی وجہ مفاصل کے شروع میں۔ کالوفالئم
دل کے چاروں طرف درد۔ (دل میں قوی لہج کی طرح) گرمی پہونچانے
سے کمی، وجہ مفاصل، یا عصبی قوی لہج کا ناقابل برداشت درد۔ دفا صکر
داہنے حصہ میں) سردی لگنے کی وجہ سے بڑھتا۔ گنٹیشیا فاسس۔
بہت مفید اور کارآمد ہے۔

کنٹھ مالا

(SCROFULA)

خون خراب ہونے میں جسم کی بہت سی جگہوں (جیسے گلہ، گم دن،
بغل، کوکھ) کی گلیٹیوں میں آما س ہوتا۔ یعنی گلیٹی نکل آتا۔ آما س
سرخ رنگ، زرد، وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سینہ، آنکھ،
کان، ناک وغیرہ کے مقام میں زخم ہو کر ریفن کو کمزور کر دیتا ہے۔
والدین کو کنٹھ مالا یا آتشک کی خرابی، ایسی جگہ میں رہنا جو مفر صحت
ہو، اچھی غذا کی کمی وغیرہ کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اچھی طرح علاج
نہ ہونے سے تپ دق کی پیداوار کا اندیشہ رہتا ہے۔

علاج

بیلادونا ۳-۶۔ سوزش کی وجہ سے گلیٹیوں میں سوجن، درد،
گلے سے نکلنے میں تکلیف۔

کلکیریا کارب ۶-۳۰۔ آنکھوں میں جلن، پیٹ بڑا، اسپہال۔
کان یا گلیٹی سوجن، اور پیپ بھری۔ ناک بھولی اور سرخ، بچہ کے سو کی
چند یا۔ یا پلیسی۔ سلینیا ۶-۳۰۔ بغل کی گلیٹیاں۔ نورتان، ناک
اور ہونٹ کی سوجن، گھٹنے اور دوسرے جوڑ سخت، پٹے کی سوجن،
لڑکے، لڑکیوں کے آنکھ کی سوزش، کان میں پیپ، کان کے نیچے
اور اکثر جگہوں میں بھینیاں، جسم ریفن۔

لے لیس الیس (LAPS ALBUS) جسم کے جس کسی جگہ کی گلیٹیاں
سوج گئی ہوں، بد یا باگھی نکلی ہو، اس کی یہ ایک اچھی دوا ہے۔

مرکیورس آیوڈائیڈس ۳ x - سفوف - لوزمان میں زخم اور جلن۔ گلے
کی ٹکٹیاں سوجی، سخت؛ لوزمان میں درد۔ سلکا ۶ - ۳۰ - کل ٹکٹیاں سوج کر
سخت ہونے کی حالت میں، بھوڑا یا پیپ ہونے کی شروعات ہو۔
بیلیم ۳۰ - ۲۰۰ - ہفتہ میں ایک مرتبہ استعمال کرنا چاہئے۔ اگر
مریض وجہ مفاصل کے والدین کے خاندان میں دق ہو۔
کلکیریا فاس ۱۲ x - سفوف - کنٹھ کالا کے مریض کو گھٹیا۔
وجہ مفاصل ہو تو یہ سب سے اچھی اور کارآمد دوا ہے۔

اے تھو لیس انٹی مونیس (Acthiops Antimonials)

(Dr. Gouillon) کے رائے ہے کہ کنٹھ کالا کے مریضوں کے لئے یہ سب
سے اچھی اور کارآمد دوا ہے۔ ۲ x ۶ x - سفوف - فی غوراک دو تین گرین
دن میں دو مرتبہ دینا چاہئے۔ چلنے کا وقت ہو گیا ہو لیکن بچہ چل نہ
سکتا ہو۔ درمض شروع ہونے پر، سلف ۳۰ - کلکیریا کارب ۳۰ - لائیو ۳۰ -
بلاڈونا ۶ - سلکا ۳۰ - ہاتھ پیر میں پسینہ آتا ہو۔ جسم کی گرمی معمولاً کم ہو۔
جسم کے دوسرے حصوں کی بہ نسبت اگر بچہ کا پیٹ بڑا معلوم ہوتا
ہو۔ آرسنک ۳۰ - برائٹا کارب ۶ - سائٹا ۳ x -

گلیٹیوں کے ماکوف ہونے میں

بیلادونا ۳۰ - مرکیورس آیوڈائیڈ ۳ x - برائٹا آیوڈ ۶ - کلکیریا کارب
۳۰ - کلکیریا آیوڈ ۳۰ - سلکا ۳۰ - گریفائٹس ۶ - بیلیم ۳۰ - ہفتہ
میں ایک خوراک، آرم ٹالیکم ۶ - فاسفورس ۶ - فرم ۶ - چائٹا ۶ - سیپا ۶ -
آیوڈیم ۶ - ڈلکارا ۶ - بڑیاکا - آرسنک آیوڈ ۳۰ - آرسنک منٹ
۳۰ - ہیرسلف ۶ - کلکیریا فاس ۳ x -

سندف کی بھی درمیان میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔

غذا - اچھی ہوا اور کنٹھ بے پانی سے بنائے سے فائدہ ہوتا
ہے۔ لیمو، مچھلی، گوشت، روٹی، دودھ، غذا ہیں۔
جسم کو ڈھکا رکھنا اور دھوپ لگنا اچھا ہے۔

تپ کہنہ۔ دق سِل

(TUBERCULOSIS)

تپ دق۔ متحدہ مرض ہے۔ اس مرض کے مریض کے تھوک اور نسج میں ایک قسم کا جرم دکھائی دیتا ہے۔ یہ جرم کانٹھوں کے شکل کے دانہ دار (No dulen) ہوتے ہیں۔ یہ ہی اس مرض کے پھیلانے والے ہوتے ہیں تندرست آدمیوں کے جسم میں اُن کے داخل ہونے سے وہاں کے نسج میں ایک طرح کے دانہ سِل (Tubercule) پیدا ہو جاتے ہیں۔ اُس وقت ہم لوگ اس کو دانہ سِل و دق (Tuberculosis) کہتے ہیں۔

جسم کے اندر کسی بھی عضو میں یہ دانہ سِل ہو سکتا ہے لیکن اس مرض کے جو مریض دکھائی دیتے ہیں۔ اُن میں پھیپڑاؤں فہونے والے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آنتوں کے دانہ سِل کے مریضان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ قوت زلیست کی کمی کی حالت و غذائی خرابی، بند یا مفر صحت والی جگہ میں رہنا۔ پتھر کڑھنے کا کام کرنا۔ انفلوئنزا کے حملہ وغیرہ کی وجہ سے جب جسم ایکیارنگی کمزور ہو جاتا ہو، تو آسانی سے سل ہو جانے کا ڈر رہتا ہے۔ دانہ سِل کے جراثیم (Tubercule bacillus) اس مرض کے خاص سبب ہیں۔

غذا کے جانے والی نئی پائسانس کے راستہ سے یعنی جوف وہاں پائناک کے اندر سے، یہ جراثیم جسم کے اندر داخل ہو جایا کرتے ہیں۔
 ٹوبرکیولینیم ۳۰۔ آرس آیوڈیم ۳۰۔ سفوف ۶۔ پانی کے ساتھ کھانا منج ہے
 کلکیر یا کارب ۳۰۔ سلفو ۳۰۔ آیوڈیم ۶۔ فرم ۶۔ فاس ۳۰۔
 آرس ۳۰۔ مرک وائے ۳۰۔ سفوف ۶۔ وغیرہ اس کی خاص دوائیں ہیں۔
 یہاں صرف (۱) پھیپڑاؤں کے دانہ سِل یا دق اور (ب) آنتوں کے سِل کے بارے میں تفصیل گے۔

(۲) تپ دق یا رسل

(TUBERCULOSIS OF THE LUNGS OR PHTHISIS OR CONSUMPTION)

ایک قسم کے روانہ دار جرثیمہ سانس کے (Tubercule bacillus) ساتھ پھیپھڑے میں یا ہڈا کے ساتھ جسم میں جانے سے پھیپھڑا جلدی جلدی تکمیل ہونے لگتا ہے۔ اس میں زخم ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام دق ہے۔ صرف پھیپھڑا ہی نہیں۔ ریفین کے جگر، آنت اور مثانہ وغیرہ میں بھی اس مرض کے جرم آتے ہیں اور کف اور پاخانہ، پیشاب کے ساتھ نکلا کرتے ہیں۔ کھچیاں اس مرض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ غذا کی چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ اس مرض کا بیج آنتوں میں داخل ہو کر مرض دق پیدا کر دیتا ہے۔ باپ، ماں، کو یہ مرض پہنچنے سے اُن کے بچوں کو بھی یہ مرض ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن مرض تپ دق اگر ماں باپ کو ہوگا تو اُن کے خاندان والوں کو یہ مرض ہو جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ خراب ہوا میں رہنا، تر جگہ میں رہنا، ایسی اشیاء کھانا جو طاقت نہ پیدا کریں۔ خون کی زیادتی سانس کے ساتھ رُھول کے ذرات خاص کر پتھر کے ذرات جسم میں داخل ہونے، بہت محنت، فکر، بار بار عالمہ ہونے وغیرہ اسباب سے جب جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تب آسانی سے اس مرض کا حملہ ہو سکتا ہے۔ پہلے خشک کھانسی شروع ہوتی ہے۔ دفاہکر صبح اور شام کو تھوڑی محنت کرنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بد ہضمی، تپ یا متلی، زبان میلی، اور سرخ رہنا۔ کبھی زبان کا درمیانی حصہ سادہ اوٹھلا اور آگے کا حصہ خوب سرخ، بار بار پیاس لگنا۔ سینہ میں لگاتار درد رہنا۔ سانس لینے میں تکلیف، بفق تیز، شام کو جسمانی حرارت کی زیادتی رات میں زیادہ پسینہ نکلنا۔ آواز بیٹھی۔ بلغم وغیرہ علامات نمودار

ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانسی بڑھکر زرد رنگ کا بلغم نکلنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اس میں اخون بھی ملا رہتا ہے۔ اس طرح دو چار ماہ تک مریض اس میں مبتلا رہ کر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آواز کی نلی میں بھی زخم ہو جاتا ہے۔ اور آواز مٹیٹ جاتی ہے۔ اور خون نکلا کرتا ہے اور اسہال اور استفقار بھی ہو جاتا ہے۔ بخار اور رات میں پسینہ اس مریض کے مخصوص علامات ہیں۔

علاج

مسیلیم یا ٹیوبرکیولیم - ۳-۲۰۰ - تب دق کی یہ مخصوص دوا ہے۔ یہ دونوں دوائیں مریض تب دق سے تیار کی جاتی ہیں۔ اسے اور پندرہ روز یا ایک دو روز وقفہ دے کر آئے۔ اور پھر طاقت کی دوا دی جاتی ہے۔ پیچھے کی طاقت میں بار بار کھانے سے مریض کو نقصان ہوتا ہے۔ اور مرض بڑھ جاتا ہے۔

اس دوا کے استعمال کرنے کے کئی خاص علامات

کھانسی کی کھانسی - اولاً خشک بعد پتلی - بہت زیادہ پتلا - کف نکلتا - بہت آسانی سے مریض کو سردی ہو جانا - مرض کا حملہ ہوتے ہی جلد ہی جلدی ڈبلا ہونے لگتا ہے۔ مریض کی تکلیف روز کچھ نہ کچھ بدلا کرتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے مریض بہت ڈبلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ پیچھے مریض میں دھماکہ بائیں پیچھے سے

۱۔ مریض خلقی تب دق کے پیچھے کو ترک کرنے کے بعد انگریز ڈاکٹر ڈارلٹ نے مسیلم پہلے تیار کیا ہے اور مریض تب دق کے ماؤن پیچھے کے زخم سے جبرن ڈاکٹر کوک صاحب نے ٹیوبرکیولیم تیار کیا ہے۔ مریض پیدا کرنے والا ان دونوں دواؤں کا فعل یکساں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔

خفا - ملک میں تب دق کو ٹیوبرکیولیم زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اور مریضوں کے مریضان میں کو مسیلم زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

میں) دانہ ابھار یا گانٹھ ہو جاتی ہے۔

کلکیر یا کارب، ۳، ہضم کی طاقت کی کمی۔ کھٹی ڈکار (خاص کر تیل، گھی، یا میٹھی شے کھانے سے رات کو کھانسی بڑھنا) کھانسی کھانسی سخت زردی، ناکل سبز رنگ کا مواد سے بھر ابلغم نکلتا، کمزوری، پسینہ، جریان خون، گھٹیوں میں آئس، سینہ میں درد، موٹے تازے مریض یا من کے پیر ہمیشہ سرد رہتے ہیں۔ ان کو زیادہ فائدہ کر تل ہے۔

کلکیر یا آلیوڈ انڈس ۳۳ X۔ سب علامات تو کلکیر یا کارب کے ہوں؛ لیکن مریض دُبلّا ہوا اس کو یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ خاص کر صفرا کی بیماری ہو۔ کلکیر یا آلسنگ، ۳۳ X بھیجڑے کافر من سل، خاص کر جریان خون کی علامت ہونے میں جیورنڈی ۲۲ X۔ بہت پسینہ نکلنے میں۔

بائڈر اسٹیس :- دنی خوراک تین بوند روزانہ تین مرتبہ استعمال کرنا چاہئے۔ غذا سے نفرت کے علاوہ جب مرض کی دوسری علامات نہ محسوس ہوتی ہو۔

کلکیر یا فاس ۱۲ X۔ سفوف۔ ۳۳ X مریض میں خون کی کمی۔ رات میں بہت پسینہ اور ساتھ ہی ساتھ پیر سردی بخار۔ تھوڑا اور دست پٹل آتا۔ گلا خشک ہو جانا۔ جی ملیں سیاہ جما ہوا خون نکلنے میں۔ ایکلیفا انڈیکا ۱۱ X خشک کھانسی کے بعد خون ملا تھوک نکلتا۔

آرس آلیوڈ انڈس ۳۳ X۔ ۶ سفوف (تازہ کیا ہوا) مرض کے تمام حالتوں میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ اس دوا کو کھانے کے بعد کھانا چاہئے۔

زکام۔ زیادہ کستی، نبض تیز۔ بخار روزانہ اور رات میں پسینہ۔ بہت دُبلّا پن۔ خون کی کمی۔ خون کی خرابی۔ خاص کر لوزتان میں سوزش۔ یا انفلا سٹرا ہونے کے بعد مرض دق میں یہ دوا فائدہ کرتی ہے۔ پانی کے ہمراہ آرس آلیوڈ سفوف نہ کھایا جائے۔ یہ دوا کھانے کے بعد ہی پانی پیا جائے۔ ایبرو ٹینم ۱۱ X۔ دنی خوراک ۵ بوند۔ دو گھنٹہ کے وقفے سے

تپ دق کے ساتھ باریلون (PERITONITIS) ہو۔ (خاصکر
مندرجہ ذیل علامات میں) ٹانگوں کا بہت ڈبلا پن رہنے کے ساتھ ہی
پیٹ ہمیشہ بھولا رہے۔ چہرہ سکڑا ہوا۔ ٹھنڈا اور درد۔ مریض
کو ایسا محسوس ہو، گو یا اس کا پیٹ چپکا ہوا ہے۔

بسیلا ڈونا X۳-۶: خشک کھانسی، یا ہر دبانے سے آواز کی تلی
میں درد۔ آواز بیٹھی، تیسرے پہر جسم کی حرارت بڑھ جانا۔ بہت
کھانسنے سے خون ہلاکف نکلتا۔ (شام یا رات میں سونے کے وقت
سینہ کے درد کے کھانسی کا بڑھنا۔)

آیوڈیم X۳-۶: دق کی کھانسی کے ساتھ گلیٹوں کا آماس۔
پیٹ میں درد اور اسہال، جسم کی جلد سوکھی اور کھکھری، چہرہ
سرخ، بھوک کی تیزی، مرغن غذا۔ اور دودھ ہضم نہ کر سکتا۔
جلدی جلدی جسم کا زائل ہو جانا۔

نا سفورس ۳-۳۰: دن میں صرف ایک خوراک استعمال
کرنا چاہیے۔ نبض ہلکی۔ لیکن تیز۔ جلد خشک، اور گرم۔ سینہ میں درد کے
ساتھ خشک کھانسی، پھیپھڑے میں زخم کی وجہ سے کچھ ہلکا سبز رنگ
کا بدبو دار کف نکلتا۔ اکثر پسینہ اور تپلے دست آتا۔ بھوک نہ لگنا۔ جسم
کمزور جابھوا۔ خون آتا۔ شام کے وقت بخار اور تکلیف بڑھنا۔
تندرست آدمیوں کے لئے یہ دوا فائدہ مند ہے۔

برایونیاس X۳-۶: خشک کھانسی، کھانسنے کھانسنے گو یا کچھ بھٹا
جاتا ہے۔ دونوں طرف گو یا سوئی چھبھونے کی طرح درد، سانس میں تکلیف
پیشانی کے آگے یا پیچھے درد۔

فیبرم مٹ ۳- (سفوف ۶)۔ پھیپھڑے سے خون نکلتا۔ ہاتھ
وپیر میں آماس۔ اسہال، جسم میں خون کی کمی، خشک کھانسی اور
سینہ میں درد کے ساتھ خون نکلتا۔ ڈراسیرا۔ X۱-۳۰۔
زور کی کھانسی، کھانسنے کھانسنے خون نکلتا۔ کھانسی کی وجہ سے سینہ میں درد۔

پکسا ٹیکلا X-۶۔ مرض کے شروع حالت میں جب بھوک کم ہو کر روغن یا چربی ملی شے یا کاڈیوور آئیل نہ ہضم ہوتا ہو۔ رات میں کھانسی اور کف زیادہ ہو، زیادہ مقدار میں زرد رنگ کا کف ذائقہ میں کڑوا نکلتا ہے۔ نکس جگنکس X-۳۱۔ کھانسی، آواز بیٹھی، سینہ میں بوجھ محسوس ہونا۔ پیٹ پھولنا یا سخت محسوس ہونا، اسہال، سوزنہمی، بقل یا پیچھے میں گٹی نکلتا۔ لاسیکو۔ ۳-۱۲۔ معدہ اور پیٹ میں درد، آنتوں کے آماس کی وجہ سے پاخانہ بند۔ بھوک نہ نکلتا۔ خون ملائیں کف نکلتا۔ خشک کھانسی، کھانتے کھانتے تھک جانا۔ پھیپھڑے میں جلن، بدبو دار دکا۔ تھوڑا کھانے سے بھی پیٹ پھولنا، ہمیشہ بولنا۔ ہر پر ۲ بجے بخار اور دوسرے علامات کا بڑھنا۔ آرٹنگ X-۳۲۔ مرض کی تمام حالتوں میں (خاص کر آخر درجہ کے اسہال میں) اس کو دیتا چاہئے۔

ہیپیرسلفر ۳۰۔ ۲۔ آواز بیٹھی، گٹی، کھانسی (خشک سرد ہوا سے زیادتی) کھانتے کھانتے کف اور خون نکلتا۔ (یا پیپ نکلتا) سوتے میں سانس لینے اور نکالنے میں تکلیف۔ کنبہ والا کے مزاج والے نوجوان مرد اور عورتوں کے لئے یہ دوا زیادہ فائدہ مند ہے۔

ملیریا آفنی سی نے لس (DR. BOWEN) کہتے ہیں کہ ملیریا ہوتا ہو۔ (اور جہاں پانی کے مخزن میں پیڑ پتے سٹڑتے ہوں) وہاں کے مریض ان دق کو یہ دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔

نیزٹرم آرٹس ۲۔ سفوف۔ (فی خوراک تین گریں روزانہ تین مرتبہ استعمال کرنا چاہئے)۔ مریض ترقی کر کے سبز رنگ کی حالت میں آجائے (یعنی جب بہت سبزی مائل بلغم نکلا کر آہو) تب اس کے استعمال کرنے سے اکثر فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ روزانہ استعمال کرنے کے بعد جب مرض کم ہونے لگے تو دوبارہ کرنی چاہئے۔ تھلا سپائی (TILAPI BURSA PASTORIS) کھانسی کے ساتھ خون آنے میں مفید و کارآمد ہے۔

ملی فرلیم X-۳۱۔ معمولی کھانسی کے ساتھ خون آنے میں۔

سلفر۔ ۳۔ بیج بیج میں (خاص کر بیماریاں مرنے میں) دینا چاہیے۔
 نائٹریک ایسڈ ۶۔ چمکدار سُرخ رنگ کے خون کا جریان
 ایک ایک ۳x۔ کھانسی زرد مہ کی طرح آتی یا متلی چمک اور
 سُرخ رنگ کا خون نکلتا۔

اولیو آئیل یا زیتون کا تیل۔ فی خوراک نصف آؤنس سے
 ایک آؤنس تک۔ دو گھنٹہ کے وقفہ سے استعمال کرنے سے دق کے
 مرتضیوں کا وزن بڑھتا ہے۔

دوسری دوا استعمال کرتے رہنے میں بھی اسکو بلا ضرورت کھایا جاسکتا
 ہے۔ اس سے اس دوسری دوا کے فعل میں بہت کچھ علل نہیں پڑتا۔ تھوڑا سا
 ہلا کر اس روغن کے استعمال کرنے سے لافضہ کے فعل میں مدد ملتی ہے۔

پیار:- بہت معالجوں کی رائے ہے کہ پیاز کا عرق یا کچا پیاز رنگ
 کے ساتھ کھانے سے مریض کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر پیرس کا
 بیان ہے کہ اگر مریض کچا پیاز نہ کھا سکتا ہو۔ اسکو پیاز چھونک کر کھلانا
 چاہیے۔ مشہور عالم لینسٹ اخبار میں ڈاکٹر (W.G. MINCHIN)
 نے لکھا ہے کہ جو جراثیم انسان کے جسم پر حملہ کرتے ہیں، پیاز اُن کو
 ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا کاٹ کر اس کو سونٹھانے سے بھی مریض
 دق اچھا ہوتا ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم میں یہ بڑے ہو چکا ہے کہ لہٰذا
 لافضہ کے فعل میں مددگار (ANTISEPTIC) ہے۔

تہین

میتھوڈسٹ نام کے عیسائی مذہب کی جماعت کے قابل تعظیم ڈاکٹر
 جان ویلیلی نے (۱۷۹۱-۱۷۹۳) اپنی پری میڈیٹا پو فیزک۔

(PRIMITIVE PHYSIC) نامی علاج کی کتاب میں تب دق کے
 بارہ میں ایسا فیصلہ کیا ہے۔ صاف گھاس کے میدان میں کسی جگہ مٹی میں ایک
 چھوٹا سا گڈھا کھود کر (وہاں پٹ سو کر) اس پر ناک رکھ کر روزانہ منٹ
 تک سانس لینا اور نکالنا چاہیے۔ اس کا امتحان کرنا چاہیے۔

ایکونائٹ ۶، ڈکمار اس، ڈرو سیرا ۱، اسٹیم ۶۔ (بہت کمزوری۔
برائی اونیا ۶۔ کاربووج ۳۔ سورن ۲۰۰۔ کبھی کبھی فائدہ کرتا ہے۔

(SAINTE JACQUES) اسپتال کے سابق اور (THERAPEUTIQUE DES)
نام کے کتاب کے مصنف فریخ ڈاکٹر (VOIES RESPIRATOIRES)

(CARTIER MD.) اور مرض تپ دق کے علاج میں کئی قابل اور
مشہور ڈاکٹروں کی کتابوں کا لب لباب اس خوفناک مرض کا
علاج مندرجہ ذیل ہے۔

یہ خیال ہوئے کہ مرض دق ہوا ہے (یا مرض ہونے کے آخر تک
کل حالتوں میں) سنگریزا، یو برکیو لنیم، ۲۰۰۔ (ہفتہ میں ایک
خوراک) فیرم فاس، (بخار کے ساتھ خون آتا ہو) اور آرس آیوڈ
۱۲ سفوت (تین دفورو زائد) بخار رہنے میں۔ بلیٹی شیا۔
فیرم فاس، چائنا۔ چینم آرس، انگشتار، یاخرون۔

طبعی خرابی میں:- آرس آیوڈ، سلف، آرس۔ ٹککے آیوڈ۔ مرک آیوڈ۔
بہت پسینہ:- کلکریا کارب۔ جیرنڈی۔ انیکا۔ ایڈ فاس۔ سلکا۔
معدہ کی خرابی میں:- نیکن، پلس۔ اپین سیٹ (بھوک نہ لگتی ہو)۔
جفٹا ناٹیا۔ (بھوک بالکل نہ لگتی ہو)۔

اسہال:- آرس نکم آیوڈ۔ کئی غم، فاسفورس ایڈ۔
خون آنا:- جونیم، ایکالیفا، ملی، اپیک، ٹریم، فاس فو، ہما۔
فیرم ایڈ۔ آر نیکا۔ لک۔ پیٹھ پرے کی سوجن، اسے پس، ایوسائی۔ آرس آیوڈ۔
نیگ۔ کھانسی:- فاسفورس، بل، ڈریس، برایو، ہایوسیاں۔
کوئم اسٹیم، انیم ڈارٹ، کیلی بائی، کیلی کارب۔

کسانسز کی تکلیف:- آرس، انیم ڈارٹ۔ سڈکنی۔ ٹامٹر۔
(IOWA UNIVERSITY) کے میٹریامیڈیکا کے مدرس جارج رائل

(M.D.) اپنے تیس سالہ تجربہ کا لہرہ ۱۹۲۳ء میں اپنی کتاب
موسوم بہ (PRACTICE) میں لکھا ہے۔ انھوں نے بتایا ہے کہ

آیوڈیم، کلک ایوڈ ۳، سفوف، مرک پروٹو آیوڈ، آرس آیوڈ ۳، یا ۲۔
 فاس فو: ۳، کیے فاس ۱۲۔ ٹیوبریکولینم: اونچی طاقت میں۔
 کلیریا کارب ۱۳، پلس ۳، ۲۰، تھاکرو ۳، فیسمیٹ ۳، سلف ۳۔
 ۱، بانڈر آسٹس، مارکنگ ایسٹ، ایسٹ فاس، ایسٹ میور۔
 اری جیم، اسپیکاک، جلی۔ اور ایسٹ نائٹرک یہ ۲۱۔ دوائیں، تپ دق کی
 مخصوص دوائیں ہیں۔

غذا وغیرہ ۱۰۔ پیڈ کھجور، یا بکس کھجور، بکری کا دودھ، گائے کا
 دودھ، گھی، تازہ مکھن، چھوٹی چھلی، یا بکرے کے گوشت کا شوربہ۔ روئے
 کی روٹی، مونگ، کیلے کا پھول، پودل وغیرہ اچھی غذا ہیں۔
 قبض رہنے میں بکس کا کھجور، زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اس مرض میں کاڈیو
 آئیل تھوڑی مقدار میں فائدہ کرتا ہے۔

اوس یا سردی بھی نہ لگنی چاہیے۔ نہانا اور نہانے کے بعد جسم پوچھ ڈالنا چاہیے۔
 شب بیداری، بہت محنت کرنا۔ اور عورتوں کو ہم بستر ہونا۔ (صحیح کرنا)
 منع ہے، مریض کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھنا چاہیے
 اچھی طرح ہوا کھانے سے پھیپھڑا پھیلتا ہے؛ تپ دق کے مریض کو
 سمندر کا کنارہ کے مکان میں رہنا بہتر ہے (خاص کر جب جگر کی خرابی
 موجود ہو) اگر جگر کی خرابی نہ ہو تو چھوٹا ناگپو اچھی جگہ ہے۔

حفظ ماتقدم:- تندرست آدمی کے جسم میں سل کا زہر نہ داخل
 ہونے پائے۔ اس لئے مندرجہ ذیل باتیں ترک کر دینا چاہیے۔

(۱) مریض کا استعمال کیا ہوا کھانے کا برتن، کپڑے، بستر، رال،
 جوٹھا حقہ، سواری، اور مریض کے کمرے میں رکھے ہوئے اسباب؛

(ب) مریض کے کمرے میں ایک بستر پر سونا۔ مریض کا منہ چونا
 مریض کی کھانسی، اور سانس کی آمد و رفت، جہاں مریض بیٹھا یا کھوتا
 پھرتا ہو۔ جیسے اسپتال، پڑھنے کی جگہ، تھیٹر، کھیل کا میدان وغیرہ
 ان جگہوں کے دھول کے ذرات، تندرست انسان کے جسم میں نہ لگیں۔

ان باتوں سے ہوشیار رہنا ہے۔

(ب) آنٹوں کی سِل

(TUBER CULOSIS OF THE INTESTINE)

یہ مرض بھی پہلے مقصد میں بیان کئے ہوئے مرض تپ دق کی ایک معمولی طاقت ہے۔ یہ بہت کم اپنی خاص حالت میں دکھائی دیتا ہے۔ مذکورہ بالا جراثیم سِل (TUBERCLE BACILLUS) اس کی خاص علامات ہیں۔

آرام نہ ہونے سے اسہال مزمن آنٹوں سے خون نکلنا، سوجنا، پیٹ پھپکا جانا، بد ہضمی، پیٹ میں میٹھا میٹھا درد یا میٹھن (پیٹ میں تپھر کی طرح سختی محسوس ہوتی ہے) پاخانہ میں بدبو، دست کے ساتھ غیر منہضم غذا نکلنا، جسم کی جلد بد رنگ، بہت زیادہ یا وقت بے وقت بھوک لگنا، دھما دھما زانے کرنے والا بخار، نواسیر، دہانے، استسہار بھس وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں لیکن اچھا نہیں ہوتا ہے بھگ ہے

علاج

چاپروار گو سا۔ ۳۔ ڈاکٹر (BLEIM) نے چاپرونی خوراک دو چار ڈرام (روزانہ دن میں تین مرتبہ) استعمال کر کے پیرانے اسہال کے رضیوں کو پوری طرح اچھا کر دیتا ہے۔ بہت قبض رہتا ہو تو پیم ایسٹ X۶ سفوف (دن میں فی خوراک دو تین گرین) بہت فائدہ کرتا ہے۔ کلکیر یا کارب ۶، آیوڈیم ۶، سلفر ۳، آرس آیوڈ ۳ X سفوف (پانی کے ساتھ یا دوا کھانے کے بعد پانی پینا منع ہے۔ ۱ یلوز ۶ - ۲۰۰ - کاٹیکم ۶ - کروٹن ٹک ۶ - رسٹاکس ۳ - وغیرہ دواؤں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مرض تپ دق کی غذا ملاحظہ ہو۔

علاج معادن

دست زیادہ ہوں، تو بکری کا دودھ، دودھ کے ساتھ سوڈا اور ادر کا ڈیور آئیل استعمال کرنا اچھا ہے۔ اور پیٹ پر کا ڈیور آئیل لٹنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

(DIABETES)

ذیابیطس

اس ملک کے بہت بڑے بڑے مشہور آدمیوں نے اس مرض سے اپنی جان دی ہے؛ آج تک اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ مرض کے شروع حالت میں جلد خشک اور روکھی، جسم کی حرارت ۹۴ سے ۹۶؛ پیاس تیز، بھوک کی بہت زیادتی، دانت کی جڑ میں سوجن، قبض یا خشک، پائخانہ، برابر پیشاب ہونا۔ جسم کا تحلیل ہونا۔ سانس میں بدبو۔ زبان کھٹی اور سُرخ، پائخانہ اسپنج کی طرح یہ سب علامات نمودار ہوتے ہیں۔ بعدہ آہستہ آہستہ بھوک نہ لگنا۔ جسم دُبلتا، پیر سوجے، یا قوتِ احمر (ایک قسم کا خراب پھوڑا) یا مہلک زخم، مستورات کے اندام نہانی میں ٹھنکی، مردوں میں قوتِ باہ وغیرہ علامات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور آخر میں پھیپھڑے کی سوزش اور دق کی کھانسی تک ہو جاتی ہے۔

مریض دن رات میں دوسیر سے سینا سیر تک پیشاب کرتا ہے۔

پیشاب کا وزن ۵۲.۵ - ۵۰.۵ - پیشاب میں شکر موجود ہو تو اُسکو

ذیابیطس شکر (DIABETES MELLITUS) کہتے ہیں شکر

نہ ہو تو ذیابیطس سادہ (DIABETES INSPIDUS) کہتے ہیں۔

پیشاب کرنے کے بعد اگر اس میں مکھی یا بیونٹی لگتی ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں شکر ہے؛ مرض ذیابیطس شکر کے یہ تین خاص علامات ہیں۔

(۱) پیشاب میں شکر موجود رہنا (ب) بہت پیشاب ہونا (ج) رات میں تیز پیاس کے ساتھ گلا خشک ہو جانا۔ مرض مزمن ہو جانے میں سُرخا وغیرہ علامات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذیابیطس شکر کا علاج لکھا جاتا ہے۔

ذیابیطس سادہ کے لئے "امراض مشانہ" کے باپ میں "ذیابیطس سادہ"۔
کثرت البول ملاحظہ ہو مرض ذیابیطس سادہ ذیابیطس شکرى، کے پہلے۔ یا
بعد کو ہو سکتا ہے۔
علاج

سی زى حجم بولینیم XI۔ (یہ کالے جامن کے بیج کے سفوف سے
بنایا جاتا ہے)۔ یہ مرض کے ہر حالت میں دیا جاسکتا ہے اس کے استعمال
سے پیشاب کا وزن اور شکر کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔

تیسٹرم سلف (XII) اور تیسٹرم فاس (XIII)۔
اس مرض کی اعلیٰ دوائیں ہیں۔ خواہ کتنا ہی خوفناک مرض ہو۔ دونوں
دوائیں چار پانچ ہفتہ تک استعمال کرنے سے پیشاب کے شکر کا حصہ ایک بار لگا
کم ہو جاتا ہے اور لگاتار چار ماہ تک استعمال کرنے سے مرض ضرور دیر ہی
اکثر جز سے اچھا ہو جاتا ہے۔ ولایت کے اکثر سینگر نے انھیں دونوں
ادویات کے ذریعہ بہت سے مریضوں کو اچھا کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ
آج تک ایسا کوئی مریض نہیں ملا جس کو آرام نہ ہوا ہو۔ خاص کر جن مریضوں
کو نفرس ہو ان کو تیسٹرم سلف زیادہ فائدہ کرتا ہے

لیگ ٹک ایسڈ ۳۔ یہ پیشاب زیادہ ہونے کی اچھی اور کارآمد دوا ہے
پلیس آلوڈ۔ X4۔ جو مریض یورک ایسڈ میں مبتلا ہیں ان کو یہ دوا
خوب فائدہ کرتی ہے۔

سیکیل 4۔ اس دوا سے پیشاب کا شکر کم ہو جاتی ہے۔

ایسڈ فاسفورک XIII۔ کسی اعصابی مرض کے ساتھ بہت مرتبہ
پیشاب ہونا رات میں کمر میں درد جسم کا تحلیل ہونا متی تیلی، طبیعت
کا چنچل رہنا۔ مندرجہ بالا علامات میں ایسڈ فاس سے بہت زیادہ
فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کی بستی شکر آلوڈ بہت پیشاب، پیٹھ اور
مشانہ میں درد۔ آر جنٹیم میڈا لیکم ۳۰۔ ۲۔ ایٹری یا دونوں پیروں
میں سوجن کے ساتھ مریض کا تکرار ہونا زیادہ پیشاب اور اس میں شکر۔
دکار کسی کام میں جی نہ لگنا۔ پیشاب کے وقت جلن۔

ہلویس ۶۔ زیادہ مقدار میں پیشاب اور اس کے ساتھ خون کا سفید جھڑا (انڈے کے اندر کے سارے جھڑے کی طرح) نکلتا۔
پیشاب میں شکر یا فاسفیٹ موجود رہنے میں، پیاس، بے چینی، اور مریض یکبارگی تحلیل ہو جائے۔

یورمینم نائٹریکیم، ۳ X ۱۔ ہضم نہ ہونا، بہت پیاس، قبض، زبان سرخ، نیند نہ آنا، پیشاب کی وقت آلہ تناسل میں جلن، آنکھ و ناک سے مواد کی طرح رطوبت نکلتا، کوری۔ پیشاب میں شکر زیادہ ہو، تو یہ دوا بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔
کریازوٹ، ۶۔ ۱۲۔ ۳۰۔ بار بار، پیشاب کرنے کی حاجت۔
بے رنگ کے ذریعہ پیشاب میں سرخ رنگ کے ذرات تہ نشیں ہوں۔
پیشاب کے روکنے کی طاقت نہ رہنا۔

گوڈینیم (CODEINUM) کثرت بول کے ساتھ
بے چینی (داغی سرسام، جلد کی جلن، جیسے کھجلی، گرم محسوس ہونا۔)
بدحواسی، کانٹا چھونے کی طرح درد، کل جسم میں لرزہ، ہاتھ اور پیروں کا آپ ہی آپ بیٹھنا۔

نیرم میوڑ، ۳۔ پیشاب کی زیادتی۔ کھانے یا گھومنے پر آپ ہی آپ پیشاب نکل جانا۔
پیشاب ہونے کے بعد ہی درد۔ ان تمام دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو سلیکا، ۲۔ ۶۔
کثرت بول کے ساتھ استسقا میں آرٹیک ۶۔ ۲۔

پیشاب کرنے کے وقت جلن ہو، کینتھر میں ۳۔ چند ڈاکٹروں نے پیشاب کے ساتھ اس ایروشکا۔ ذرا قطرے یا اس سے بھی زیادہ کی خوراک دے کر مرض اچھا کیا ہے۔ گرنے کی وجہ سے کثرت بول ہو، تو آرنیکا ۲۔ ۳۔ مرض کثرت البول (COMA)

بے ہوشی ہو، تو اوپیم ۲۔ ۳۰۔ ایکیولا ۲ X ۲۔ (پیشاب کی زیادتی میں) ایرم ٹرائی، ڈج، نکس، جے، وغیرہ ادویات کی وقت بے وقت ضرورت پر سکتا ہے۔ اور اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، کینڈا۔ امریکہ، ایسے معذب ممالک میں۔

آج کل ان سولن (INSULIN) انجکشن بہت استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس سے مرض کی بڑھتی حالت کچھ روز کے لئے ٹھوڑی کم ہو جاتی ہے۔

بھٹروں کے بلبلہ (PANCREAS) سے یہ ان سولن تیار کیا جاتا ہے۔ کینڈ کے ڈاکٹر ایف ڈی ہنگ نے ان سولن تیار کیا ہے۔

۱۹۲۲ء کے آخری حصہ میں امریکن کیمیکل سوسائٹی کے نام مشہور علم کیمیا کے صدر ڈو۔ بی۔ یمن، نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر کلڈ نے گلوکونن (GLUCOKININ) نام کی ایک اور دوا دریافت کی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ کثرت البول میں مذکورہ بالا دوا ان سولن سے زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ اور ان سولن کی ایسی قیمت بھی نہیں ہے۔ بلکہ بہت سستی ملتی ہے۔

بربی کا پتہ۔ گوند کچا کا جوشاک (lettuce) پیاز کی جڑ اور بھی کچھ جڑی بوٹیوں سے انھوں نے جان نو سویت سارا نام کی دوا تیار کی ہے۔ ہم کو ان سولن، یا گلوکونن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہے۔ لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے ذریعہ اس دوا کا استعمال ہونا چاہئے۔

غذا و غنیمہ

دیر تک کڑوائیل کی مالش کر کے تھانے سے جلد کی حالت اچھی رہتی ہے۔ مسدہ کی روٹی یا نئے چاول، مچھلی، شکر، گڑ، مسٹھائی، گھی یا تیل کی پکائی ہوئی غذا منع ہے۔

پڑنے چاول، دھان کالاوا۔ کھیل، شہد، جو کی بھوسی کی روٹی۔ اور سوڑھا، سوچا، مولی، مولی کے پتوں کا ساگ۔ پرول کی ترکاری، گوشت کا شوربہ، مکھن نکالا ہوا دودھ کھایا جاسکتا ہے۔ آب و ہوا بدلنے کے لئے چھوٹا ناگپور۔ پرگنہ سنھل یا سمندر کے کنارے کی جگہ فائدہ کرتی ہے۔

لفٹ کرنل ای، ای، وائرس نے حال میں انڈین میڈیکل

گڈٹ میں کثرت بول کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے اس میں انھوں نے بتایا ہے کہ شروع میں دو تین روز ناقہ اور اس کے بعد قاعدہ مقررہ کے مطابق انھوں نے غذا کے ذریعہ سے اس مرض کے چھ مریضوں کا (۱- آئرش۔ ۲- بنگالی۔ ۲- ہندوستانی اور ایک مارٹاری اکثریت بول میں شکر آنا بند کر دیا ہے۔ اور وہ ایک بارگی تندرست ہو گئے۔

برائٹس ڈیزیز - ورم گرڈہ

(BRIGHT'S DISEASE)

مثانہ کے عضو میں تبدیلی ہو کر پیشاب کے ساتھ خون کا بور یا جب ٹھیک ٹھیک نہیں نکلتا ہے۔ اور پیشاب میں ایلیو من یا پیشاب زلالی کی زیادتی ہو جاتی ہے اور استقار ہو جاتا ہے۔ اسی کو برائٹس ڈیزیز کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام ورم گرڈہ ہے۔ ڈاکٹر براٹھ ہی نے اول اول اس مرض کو تحقیق کیا تھا۔ اسی لئے انہیں کے نام سے اس کا نام منسوب ہوا۔

اصلی سبب :- گرڈہ کے عضو میں تبدیلی اس بیماری کا اصلی سبب نہیں ہے۔ دوسرا سبب یا انجام مرض بھی اسکو کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ کسی وجہ سے خون کے دوران میں خرابی پیدا ہو کر گرڈہ میں اس قسم کی تبدیلی ہی اس مرض کا خاص سبب ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی یہ بھی رائے ہے کہ جلد کے خلیقہ فعل میں خرابی کی وجہ سے پہلے خون میں تبدیلی ہو کر ایلیو من کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد پیشاب میں یہ ایلیو من بڑھ جاتا ہے۔ اور خون کے دوران میں خرابی

اور (CHRONIC PARANCHYMATOUS NEPHRITIS)

(INTERSTITIAL NEPHRITIS) (۴) گرڈہ کی لاغری

پیدا کر کے استسقاء کا باعث ہوتا ہے اور گردہ کے عضویں خرابی ہو جاتی ہے۔
 فرق درمیان اقسام امراض ورم گردہ کی وجہ سے عضو کی تبدیلی ہونے سے
 اسکو ورم گردہ کہتے ہیں۔ یہ براؤنس ڈزیز معمولاً دو حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے
 (۱) نئی شدید اور (۲) پرانی مزمن ورم گردہ۔ مزمن ورم گردہ بھی
 دو قسم کا ہوتا ہے (۱) دانہ دار ورم گردہ مزمن۔

(CHRONIC PHRANCHY MATOUS NEPHRITIS)

اور (۲) گردہ کی لاغری۔

شدید ورم گردہ

(ACUTE NEPHRITIS)

OR

(ACUTE BRIGHT'S DISEASE)

خون سے پیشاب نکالنے کے لئے مشانہ کی بہت سی تپلی نالیوں
 ہیں۔ کسی وجہ سے بھی، ایک مرد کا کٹنا (دفتھیریا) چھپک، تپ، صفرا
 وغیرہ بہت سی شدید بیماریاں اور تار پین، آرسنک، کاربوکلاید
 کینتھرکس، کوپے وا، وغیرہ بہت سی دواؤں کے استعمال سے اور بہت
 شراب پینے یا آگ سے جل جانے سے مشانہ کی ان تپلی نالیوں میں
 سوزش ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کو پہلے پہل لڑکا ہونے والا ہو
 ان کو ساتویں یا آٹھویں ماہ میں یہ سوزش ہو سکتی ہے۔ شدید سوزش
 کو شدید ورم گردہ کہتے ہیں۔ اس سوزش کی وجہ سے مشانہ
 آماس کر جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے۔ اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔

شروع میں بخار، اور کمر میں کھینچنے کی طرح درد، قلی اور قے ہونے
 لگتی ہے، جلد سخت اور خشک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مشانہ میں
 درد ہوتا ہے۔ اور در دینچے کی طرف پھیلتا ہے، بار بار پیشاب مطوم
 ہوتا ہے۔ لیکن ہر مرتبہ پیشاب سرخ، اور تھوڑا ہوتا ہے۔

چہرہ پر استسقاء یا سوجن ہو جاتی ہے اور بعد کو وہ آہستہ آہستہ تمام جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اور سانس میں تکلیف اور پھر خون میں پور یا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہڈیاں تشج، یوریمیا (ہفتہ میں پیشاب بند ہو جانے کی وجہ سے جیسا ہوتا ہے) جو کہ مریض مر جاتا ہے۔ پیشاب کا امتحان کرنے سے یوریمیا کی زیادتی اور البیومن (درطوبت سیفہ) کی کمی، سوزش کی علامت۔ دانہ ہائے خون کی زیادتی وغیرہ علامات پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کی مدت عموماً ایک ہفتہ سے تین ماہ تک ہے۔ ٹھیک ٹھیک علاج ہونے سے مریض اچھا ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں مریض آرام سے بستر پر لیٹا رہتا ہے، رقیق چیزیں جیسے دودھ، باری، ساگو دانہ، وغیرہ زیادہ مقدار میں پانی پیتا اور درمیان میں اسپنج کے ذریعہ جسم کو پونچھ ڈالنا ضروری ہے۔

مرضِ ورمِ گردہ

(CHRONIC PHRANCY MATOIS NEPHRITIS)

OR

(CHRONIC BRIGHT'S DISEASE)

اس مرض کا اصل سبب اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ عموماً مردوں کو اور خاص کر جوانوں ہی کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ شراب پینا۔ آتشک۔ دق، سینہ کا زہر اور پارہ کی خرابی اس بیماری کے محرک اسباب ہیں۔ مرض کی شروع حالت میں

گردہ یا مثانہ پھول جاتا ہے، خون نڈار دادرنگ سفید ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں گردہ سفید اور بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت میں گردہ سکڑ جاتا ہے۔ اور سفید ہو جاتا ہے۔

مرض کا پہلا حملہ بہت ہلکا ہوتا ہے، پہلے بھوک نہ لگنا، باضمہ کا نقص، اسہال ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوت وزن گھٹنے لگتی ہے

جسم دُلا ہو جاتا ہے، جلد خشک، سخت، چہرہ غمگین اور سفید ہو جاتا ہے پہلے نیچے کی پلک سوچی محسوس ہوتی ہے۔ اور تمام جسم میں پھیل جاتا ہے دل بھی اکثر بڑھ جاتا ہے۔

اکثر یہ مرض کچھ عرصہ تک دبا رہ سکتا ہے، لیکن کچھ آماس اور پیشاب میں رطوبت بقیہ کی زیادتی رہتی ہے۔ پیشاب کی مقدار دست گھٹ جاتی ہے، کبھی کبھی پیشاب کے رنگ اور مقدار میں تبدیلی نہیں محسوس ہوتی۔ پیشاب میں البیومن (رطوبت بقیہ) اور دوسری بیرونی شے پائی جاتی ہیں۔ اس مرض کے سبب نونیا انتہاب باری طوفان دماغ کی جھلکی سوزش، جھوٹی آنتروں کا آماس وغیرہ علامات محسوس ہوتے ہیں۔ اس مرض کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن اچھی طرح علاج ہوئے سے آرام ہونا ناممکن نہیں ہے۔ بالکل دماغی اور جسمانی آرام جسم گرم رکھنے کے لئے گرم، ادنیٰ کپڑا پہننا۔ روز گھٹے پانی سے کھانا اور بہت دودھ اور مسھا پینا چاہئے۔

مرض ورم گردہ کی لاغری

(INTERSTITIAL NEPHRITIS)

ایک طرح کی مرض سوزش گردہ ہے اور اس کے ساتھ اعصاب کی سوزش ہوتی ہے اور اسی عصب کے سکڑنے سے مثانہ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا دوسرا نام (CIRRHODLOTIC BRIGHT'S DISEASE) ہے۔

معمولاً ادھیڑ ہی عمر میں اس مرض کا حملہ ہوا کرتا ہے۔ وجہ مفصل گھٹیا۔ زیادہ شراب پینا اور آتشک اس مرض کے خاص اسباب ہیں۔ اس مرض کا حملہ یکایک ہوتا ہے۔ لیکن مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہوتا ہے۔ روز بروز طاقت ناک، خون کی کمی۔ پیٹ اور آنتروں میں درد۔ دل کی سوچن، نبض سخت۔ سر میں چکر اور نیم بند آنے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ استسقا کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔

ہوتا ہے۔ آنکھ کی طبقہ شبکیہ (یعنی جن پردہ پر چیزوں کا عکس پڑتا ہے) کی سوزش کی وجہ سے نظر قائب ہو جاتی ہے۔ سفید پلا۔ بہت پیشاب، پیشاب میں رطوبت کی زیادتی

دل کی بیماری۔ آنکھ کی طبقہ شبکیہ کی سوزش شکستہ۔ یوریا کی خرابی۔ نمونہ۔ برانکائیٹس وغیرہ امراض اس مرض کے علامات کی شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں۔

آرام دماغی اور جسمانی، دودھ اور تمباکو، پیلا۔ گرم پانی سے نہانا اور آدنی کپڑے پہننا فائدہ مند ہے۔

اے ایس، ۴، ۳۰۔ تمام جسم میں استسقاریہ استسقار جیرہ میں خاص کر آنکھ کے بالائی پلک میں، بار، بار، تھوڑا تھوڑا پیشاب ہوتا۔ پیاس میں نہ رہنا۔ پیٹ میں استسقار اور پسینہ نکلنا۔ پیٹ کو ذرا بھی چھونا برداشت نہ ہونا۔

پیشاب میں مختلف قسم کے سفید رطوبات، خون کے ذرات اور گردہ کے اعصاب برابر موجود رہتے ہیں۔ مثلاً کی سوزش کے کل مریضوں کے ۴ کی جگہ اکثر خشک رہتی ہے؛ اسلئے اے ایس، اس مرض کی ایک اچھی اور کارآمد دوا ہے۔ آرسنک، ۳، ۲۰۰۔ مرض کی شدید حالت میں یہ دوا زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔

شروع میں ہاتھ پیر اور ٹانگیں اس کے بعد تمام جسم میں سوجن دکھائی دیتی ہے۔ سانس کی آمد و رفت میں تکلیف ہوتی ہے۔ رات کے وقت اوپر لیٹر پر سونے میں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا سانس رک جلائے گی۔ جلد ٹھنڈی اور پسینہ پسندار ہے۔ لیکن اندرونی جلن، بے معنی تیز پیاس، سستی وغیرہ آرسنک کے علامات موجود ہوں تو اس بہت زیادہ فائدہ ہونے کی امید پائی جاتی ہے۔

پیشاب میں بہت زیادہ مقدار میں سفید رطوبت اور چربی سے لپٹے نکلتے ہیں۔ آرسنک کے بہت سے علامات اے ایس کے خلاف ہیں۔

آرم میسکو، ۳۰۔ ۲۰۰۔ گردہ سگڑا ہوا؛ دل کے فعل کی خرابی کی وجہ سے پیشاب کی بیماری، دل کا پھیلنا۔ آتشک اور پارہ کی خرابی سے بیماریاں، جگر کا بڑھنا۔ شروع میں زیادہ پیشاب ہونا۔ اور آخر میں تھوڑا اور رطوبت، بیضہ ملا پیشاب ہونا۔ سانس کی تکلیف۔ کلیجہ دھڑکنا۔ موت کا خوف، وغیرہ علامات میں نہایت مفید ہے۔

بریکی ری لنس X۱-X۶۔ بہت زیادہ محنت کرنے سے بیماری ہو۔ تو اس دوا کی نیچی طاقت سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

برنیرس ۳۰۔ جن کار حجان؛ دھج مفاصل کی جانب ہو، اور شریوں کی بیماری پیشاب تھوڑا۔ اور بار بار، پیشاب ہونا۔

پیشاب ہونے کے وقت جلن اور درد، پیشاب میں بہت زیادہ رطوبت بیضہ اور خون کے ذرات نکلتا۔ متلی اور درد کمر اور اکڑنا۔

کلکے آرس ۳۰۔ سستی، بے رونقی، چہرہ خمگین، پیاس۔ بار بار پیشاب بے مینی، ٹکر، ہاتھ پیر میں استسقار۔ بخار، پیشاب میں بہت زیادہ

رطوبت، بیضہ نکلتا، غفلت وغیرہ علامات کی بہت اچھی دوا ہے۔

کلکیر یا کارب ۳۰۔ ۲۰۰۔ چٹے والی بیماری، خاصکر چیچک کے بعد پیشاب میں بہت زیادہ رطوبت، بیضہ نکلتا، کمر اور مشانہ میں درد۔

درد دبا رکھنے کی طرح، ذرات بھی حرکت کرنے سے کلیجہ دھڑکنا اور سینہ خالی محسوس ہونا۔ جگر اور تہلی کا بڑھنا اور سختی، بار بار پیشاب ہونا؛

کینتھر س۔ مرض کے شدید درجہ میں، یکایک تبدیل آب و ہوا کمر

میں چوٹ کی وجہ سے بیماری، مشانہ میں درد، اکڑنا، پیشاب تھوڑا۔ جلن کی

طرح درد، پیشاب میں خون جانا۔ تیز بخار، بار بار پیشاب کرنے کی حاجت۔ لیکن قطرہ قطرہ پیشاب نکلنا۔

ککس کیسکٹ X۱-X۱۲۔ پیٹ کے استسقار سے پیدا ہوئی سانس

کی تکلیف۔ اور گھسانسی اس دوا سے اچھی ہو جاتی ہے۔ بلغم کا ذائقہ

میٹھا۔ بار بار پیشاب لگنا۔ تمام جسم میں سستی۔ درد سوس میں اس

سے خاص فائدہ ہوتا ہے۔

ڈبکی ٹلیس ۳۰۔ دل کی کمزوری، آہستہ نوعیتی نبض، جلد کا رنگ نیلا، تمام جسم میں خاص کر پٹرو میں استسقا، کھوڑا پیشاب، پیشاب رطوبت بیضہ، گردہ سنگڑا اور اونگھائی کے علامات میں فائدہ مند ہے۔
کوئیچیکم ۶۔ ۳۰۔ مرض کے شروع میں پیشاب کھوڑا۔ قطرہ قطرہ ہوتا ہے۔ پیشاب میں سفید تلچھٹ، سیاہی کی سیاہ پیشاب۔
پیشاب میں خون یا رطوبت بیضہ۔ سیدھے سو کو کھڑے ہونے میں یا لیٹنے میں درد مشانہ۔

ہلی بورس ۶۔ ۳۰۔ پیشاب میں بہت زیادہ سیاہ خون۔ شریان کا نکلنا۔ سیاہ گاڑھی تلچھٹ جم جاتی ہے۔
دل کے پیچھے بے چینی، ڈفٹیہر یا کے بعد کی بیماری۔

کیلی بائی ۳۔ ۲۰۰۔ آتشک کی وجہ سے بیماری، دل کے مقام میں ٹھنڈک محسوس کرنا۔ دل کے خط میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔
سونے بڑھنا اور بیٹھا گھٹنا، آنکھوں کے سامنے بستر دکھائی دینا۔
پیشاب کے ساتھ بہت زیادہ رطوبت بیضہ نکلنا۔

کلمیا ۳۰۔ دل کی بیماری سے جو علامات پیدا ہوں۔ سردی لگنے سے مرض کا حملہ اس کے ساتھ وجہ مفاصل۔ پیشاب کھوڑا۔ پیشاب میں رطوبت بیضہ، سانس کی تکلیف۔

لیکسس ۳۔ ۲۰۰۔ بہت زیادہ شراب پینے کی عادت، ڈفٹیہر یا کے بعد کی بیماری، پیشاب میں گاڑھا، سیاہ رنگ کا مٹھا، پانی بھرا نا یا بھیکا محسوس ہونا۔ بہت زیادہ رطوبت بیضہ نکلنا۔ دل کی بیماری کی وجہ سے سینہ میں خرابی اور خلاف توقع دل میں پانی جمع ہونا۔
فاسفورس ۳۔ ۳۰۔ دل کے فعل کی خرابی سے خون کے دوران میں خلل ہو کر مشانہ کے مختلف آلات میں خرابیاں ہو جاتی ہیں۔

پیشاب میں بہت رطوبت بیضہ وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

پلیم ۳۰۔ مشن میں دانہ دار شے ہو جاتی ہے۔ بدبودار پیشاب،
پیشاب کا وزن مخصوص طور پر گھٹ جاتا ہے۔ اور رطوبت بقیہ
نکلتی ہے۔ خون کے ذرات، ہوا وغیرہ نکلتے ہیں۔ آخر استقار ہو جاتا ہے۔
سارسا پر ۳۰-۲۰۰۔ آتشک کی وجہ سے بیماری، پیشاب میں
اینٹ کے سفوف کی طرح تلچھٹ، پیشاب ہو جانے کے بعد جلن،
تھوڑا پیشاب، منہ میں چھالے، بار بار پیشاب کی حاجت۔
سیکل ۳۰-۲۰۰۔ پیشاب کے ساتھ تازہ خون نکلتا یا پیشاب
میں سرخ تلچھٹ جمتا۔

گرنبھن ۶-۳۰۔ اس مرض کی ایک خاص مفید دوا ہے
شروع میں خوب فائدہ کرتا ہے۔ استقار۔ پیشاب تھوڑا۔ پیشاب
میں خون کا تلچھٹ، رطوبت بقیہ۔ مشا کے فط میں درد۔
ان کے علاوہ آرنج ٹائٹرس، ہارڈ رو۔ آرس، آلیوڈ۔ برائیو، کنائنڈ،
کاربولک ایسڈ، چلی ڈونی ایم۔ کروٹیس۔ کیرم مرٹ۔ لاسیکو، مارکاسپی
مرک کار، وغیرہ ادویات بھی علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔

استقار جلد صر (DROPSY)

تمام جسم میں یا کسی خاص حصہ میں (جیسے منہ، ہاتھ، پیر میں)
پانی جمع ہونے سے وہ جگہ بھول جاتی ہے۔ اسی کو استقار جلد صر
کہتے ہیں۔ سر، پیٹ، پاؤں وغیرہ۔ جسم کے کسی خاص حصہ میں سو جی
ہونے کو مقامی استقار (edema) کہتے ہیں۔ اور
کل جسم میں استقار ہو تو استقار (anasar) (سوار القینہ)
کہتے ہیں۔ جلد کے نیچے ہوا استقار و ریدی ہوتا ہے۔ وہ پہلے پیروں میں
ہوتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔
تلی یا جگر کا بڑھنا، اہواری کی خرابی۔ ملیر یا یا تپ سرخ زیادہ

سنگینا کھانے، ازمن اسبہال، دل یا مثانہ کے مرض کی آخری حالت میں استسقاء ہوتا ہے۔ جسم سے پائخانہ، پیشاب، پسینہ وغیرہ اچھی حالت نہ نکلنے سے استسقاء ہو سکتا ہے۔

سوچی ہوئی جگہ نرم اور گدگدی ہو جاتی ہے۔ انگلی سے دبانے پر گدھا پڑ جاتا ہے۔ جھوک نہ ارد یا سس؛ جلد خشک اور کھڑی۔ پیشاب سرخ اور کھوڑا وغیرہ علامات دکھائی دیتے ہیں۔ اگر دل کی کسی بیماری کی وجہ سے جلد بھر ہو جائے تو وہ پہلے ران اور پاؤں پر صدمہ کرتا ہے۔ امراض جگر اور کلی میں بہت روز تک بتلا رہنے سے جو جلد بھر ہوتا ہے۔ وہ پہلے پیٹ پر ہوتا ہے۔ (دیکھئے استسقاءے زرقی (ASCITIS) ہوتا ہے) خون خراب ہونے سے سوجن ہوتی ہے؛ وہ پیر و ہاتھ پر ہو سکتی ہے۔ استسقاء تین قسم کا ہوتا ہے

(۱) استسقاءے وریدی

(ب) وریدوں میں دوران خون کے رکنے کی وجہ سے جو بہت زیادہ وریدوں میں پھیل جائیں، اُن سے "استسقاءے وریدی" پیدا ہوتا ہے۔ جگر کے دوران خون رک جاتے سے استسقاءے زرقی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں برابر سانس کی تکلیف، مثلی، اسبہال، بواسیر یا خون کی تہ ہونا، تلی کا بڑھنا، پیٹ کے دائیں طرف کی وریدوں کا پھیلنا وغیرہ علامات پیدا ہوتے ہیں۔ (ب) غلاف دل کے دونہ میں خرابی یا دل کے دائیں طرف کے آس کی وجہ سے وریدوں کا دوران خون رک جانے سے پہلے پیر ماؤٹی ہو کر "استسقاءے وریدی" پیدا ہوتا ہے۔ بعد کو یہی استسقاءے عامہ ہو جاتا ہے۔

(ج) مثانہ کے متعلق استسقاء "استسقاءے عامہ" جی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور ایسے مریض کے پیشاب میں بیضہ (بیضہ کے اندر کاسفید حصہ کی ایسی شے) (ALBUMAN) موجود رہتی ہے۔ گروہ کے فعل کمزور ہو جانے سے یہ استسقاء ہوتا ہے۔

روزانہ دونوں وقت استعمال کرنے سے جوانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔
 اے پوسٹم۔ سر میں گرمی۔ کمزوری۔ ہمیشہ غشی یا تھیدی میں بے چینی،
 نبض بلی، قبض، لیکن پانچا نہ سخت نہ ہوا بے خبری سے پیشاب نکل جاتا۔
 پیٹ سے لیکر مینہ تک بھاری پن محسوس ہوتا۔ اور سینہ کے درد
 کی وجہ سے مریض بار بار لمبی سانس لیتا ہے۔
 دل کا فعل کمزور۔ سینکے سے درد میں کمی۔

اے لیس مل ۳ x ۳۔ پیشاب کی خرابی کی وجہ سے استسقاء
 سرخ بخار کے بعد کا استسقاء۔ پیروں میں آماس (فاصلہ حالت حمل میں)
 شدید استسقاء میں، اگر پیاس کم ہو، بڑیاں، ادھر ادھر دیکھنا۔
 دانت کڑکڑانا۔ جسم کے نصف حصہ کا بھڑکنا۔ پیشاب مقدار میں کم اور
 سر میں پسینہ، تھوڑی مقدار میں کالایا تھوڑا سرخ پیشاب۔ ٹھنڈی چیزوں
 کے نگانے سے تکلیف کم ہو، ڈاکٹر پیرس، اے لیس، ۲۔ طاقت کے استعمال
 کی رائے دیتے ہیں۔

اے لیس اور اے پوسٹم کا فرق

گرمی میں (جیسے گرم کرہ میں رہنا۔ گرم کپڑے پہننا۔ گرم پانی سے سینگ
 دینا۔ روزانہ سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک، دھوپ کی
 گرمی بڑھنے کے ساتھ استسقاء کا بڑھنا۔ اور رات میں آماس کا کچھ
 کم ہو جانا۔ مرض استسقاء کی تکلیف بڑھنے میں اے لیس دینا پڑتا
 ہے۔ سردی میں دھبے ٹھنڈا پانی پینا۔ ٹھنڈے پانی سے بدن
 پوچھنا۔ ٹھنڈی ہوا لگنے وغیرہ میں (مرض استسقاء کی تکلیف بڑھنے
 میں اے پوسٹم دینا چاہیے۔

ڈبھی ٹلیس ۳ x ۳۔ کمزوری، ضعیف، تیز اور بے تاملہ سانس
 لینے اور نکالنے میں تکلف۔ چہرہ غمگین
 مریض بیت ہو کر سو نہیں سکتا۔ دل کے فعل کا بگڑنا۔ دل کی بیماری
 یا کمرہ کی بیماری کی وجہ سے استسقاء۔

ایٹک الیڈ ۳۰ - پیر کے زیادہ آس اور تیز بیاس میں؛
ہلی بورس ۲ - ۲۰ - استسقاءے داغ - استسقاءے سینہ
استسقاءے عامہ یا پیشاب کی خرابی کے بعد استسقاء
ٹیری بنتھنا - ۳ - گردہ سے فون نکلنے میں۔

برائی اونیا ۳ - امراض جگر میں، یا قبض کی وجہ سے استسقاء۔
حالت حمل میں پیر میں سو جن، اسپینہ رہنے یا جسم کے دالوں کے غائب ہونے
کی وجہ سے استسقاء۔ جوڑ یا استسقاء۔

سانس کی تکلیف - خشک کھانسی - سینہ میں درد
پلساٹیل ۶ - عورتوں کے فیض کی خرابی کی وجہ سے استسقاء۔
اسکیولس ۳۰ - شدید استسقاء میں، پیشاب نہ آتے ہیں۔
آرس آلیوڈ ۳۰ - کھانا کھانے کے بعد دیگرین استعمال کرنا چاہئے۔
(امراض قلب کی وجہ سے استسقاء)

آرس آلیوڈ - سفوف - کبھی پانی کے ساتھ نہ کھانا چاہئے۔
اسٹریٹ فیتھس - مرض عضلات - دن کی بیماری کی وجہ سے
استسقاء - نبض صغیر، تیز اور بے قاعدہ؛ سانس کی تکلیف - نگلا اور
معدہ میں جلن - متلی یا قے، اسہال؛
سلفا ۳۰ - کوئی دن کی بیماری دہ جانے کا استسقاء ہو۔

فیرم مٹ ۶ - ۳۰ - جلد سیاہ یا پیلی، بہت کمزوری؛
قبض - کھانے کے بعد متلی؛ فون کی خرابی سے استسقاء - کبھی کبھی جائنا ۶۔
کوٹچیکم ۶ - لیکس ۶ - لاسیکو پوڈی ایم ۳۰ - ایکونائٹ ۶ -
دیگرہ دوائیں بھی دی جاتی ہیں۔

۱۹۲۳ء میں ایک قسم کا مرض استسقاء کلکتہ میں نمودار ہوا۔
گودام میں چاول بہت روز تک رکھنے سے اس میں میٹرے لگ
جاتے ہیں۔ جالی پڑ جاتی ہے۔ یہی جالا لگا ہوا چاول کھانے
کی وجہ سے کلکتہ میں یہ مرض پھیل گیا تھا۔ اور پکایا ہوا چاول

(بھات) کھانا بند کر دینے ہی سے آماس کم ہو گیا تھا۔ شہر کے
SCHOOL OF TROPICAL MEDICINE اور HEALTH OFFICER
کے ڈاکٹروں نے اس بارے میں بہت تحقیقات کی ہے۔

THE INDIAN DAILY NEWS

(DATED OCTOBER 4th: 1923 EPIDEMIC PROPSY)

اور اس کتاب میں "بیری بیری" مرض کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔
علاج محاذی:۔ مندرجہ ذیل تین باتیں قابل یاد رکھنے کے ہیں۔
(۱) مریض کا جسم اچھی طرح ڈھکا رکھنا چاہئے۔ جس میں سردی یا ہوانہ لگے!
(۲) پیشاب زیادہ ہونے سے آماس کم ہو جاتا ہے اس لئے پانی زیادہ
پلانے سے پیشاب بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔

(۳) (SWEATING BATH) ہمیشہ ہی مریض کو روزانہ اس
طرح نہلاتا چاہئے کہ پسینہ خوب نکلے۔ پہلے مریض کا جسم کھل سے
ڈھک کر سر پر ٹھنڈے پانی سے کپڑے باندھ کر بھگو دیں، اور دونوں
پیر گرم پانی میں ڈبو کر جسم پر گرم پانی ڈالتا چاہئے اور پیرانے صاف کپڑے سے
بدن پوچھ کر مریض کو بستر پر لٹا کر گرم کپڑے سے ڈھک دینا چاہئے۔ خبردار!
کسی بھی طرح سردی نہ لگنا چاہئے۔ نہانے کے ایک گھنٹہ پہلے یا بعد مریض
کو کھانے اور سونے نہ دینا چاہئے۔

غذا وغیرہ

شدید استسقاء میں شدید بخار کی طرح ہلکی غذا۔
مزمن استسقاء میں مقوی ہلکی غذا تازہ مٹھا یا مانڈ مسٹڈ مفید ہے۔

لے تازہ مٹھے کو ہانڈی میں رکھ کر ہلکی آبیچ دینے سے آہستہ آہستہ اس میں کار مچا
آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے نیچے اتار کر موٹے کپڑے سے چھان لینے سے صاف پانی نکل آتا
ہے۔ یہی پانی تھوڑا تھوڑا پلانا چاہئے۔ لے جھوٹے مٹھے مانڈ مسٹڈ کو تازہ دودھ
میں اچھی طرح موش دینے سے منڈ تیار ہو جاتا ہے۔

اس ملک کے دیہوں کے موافق پانی اور نمک کھانا مسخ ہے۔ اگر مرض کی وجہ سے جلدھر ہو، تو دودھ اور مسٹھائی نہ کھانا چاہیے گوشت کاشور بہ اچھا ہے۔ لیکن قبض رہنے میں مسخ ہے۔ روٹی اچھا غذا ہے۔ لیکن اگر اسہال ہو تو مسخ ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کو دیا جاسکتا ہے۔ لیکن پیناب میں نقص ہونے میں نقصان کرتا ہے۔ اس کے بدلے خالص دودھ پینا چاہئے۔ گرم پانی میں نہانا فائدہ مند ہے۔ مرض کچھ کم ہو تو پیرا نے چاول کاجات، مونگ یا مسور کی وال گوشت کاشور بہ، سبجے کا ڈانٹا، کچ، بڑوں اور بکین وغیرہ پر پزری غذا ہیں۔

بیری بیری

(BERI BERI)

لطیف جو ہر غذا یا دھما من کی کمی کی وجہ سے سوزش اعصاب، استقار اور عضلات کا ڈبلا پن، وغیرہ علامات ظاہر ہونے کو "بیری بیری" کہتے ہیں۔ چین، جاپان اور ہندوستان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ اس ملک کے باشندگان کی کثرت غلہ فور ہے۔ غلہ کی بیرونی تہ یا پرت یعنی چھال یا تھلکے ہی میں طاقت واقع سوزش اعصاب ہے۔ لیکن کلوں (مشین) سے صاف کئے چاول بہت عرصہ تک اندھیری اور تر جگہ میں رکھنے سے یہ سوزش اعصاب کے دفع کرنے کی طاقت غائب ہو جاتی ہے۔ اور ان کو کھانے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اس اعصاب کی سوزش روکنے کی طاقت کو ایران علم سائنس لطیف جو صریا غذا یا دھما من بی کہا کرتے ہیں۔ اس دھما من بی کی کمی سے جو جو علامات پیدا ہوتے ہیں ان کو "بیری بیری" کہتے ہیں۔

چاول کے صرف چھلکے والے باریک بیرونی پرت ہی میں یہ دھما من رہتا ہے۔ اسی بات کو نہیں ہے۔ بلکہ گیموں، دودھ، ساگ، انڈا

آلو اور کھجور وغیرہ میں بھی دُمان یا لطیف جو ہر غذا رہتی ہے۔
ہندوستان میں دیوتاؤں کو بھوک لگانے کے لائق اُر و اچا دل،
گھڑا، ناریل، انگلی، شہد، کیلا، اور مختلف کھجور، پھول وغیرہ میں بھی یہ
لطیف جو ہر غذا کافی مقدار میں رہتی ہے۔ اس لئے ان چیزوں کے
کھانے والوں کو یہ بیماری کم ہوتی ہے۔

کھانے کی چیزوں کو بہت پکانے سے لطیف جو ہر غذا زائل ہو جاتی
ہے۔ اس لئے ایسی چیزوں کو جن میں لطیف جو ہر غذا ہوتی ہے، بڑی
ہشیاری سے کھڑا پکانا چاہئے۔ موجودہ زمانے کے مہذب اور شہر کے رہنے
والوں ہی کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ شوق اور تہذیب کے حکم میں
وہ لطیف جو ہر غذا ہی کو زائل کر دیتے ہیں۔ لیکن کانٹوں کے باشندے
بزکے سہارے تہذیب کی ترقی ہوتی ہے وہ لطیف جو ہر غذا کو زائل نہیں
ہونے دیتے۔ دیہات میں ہاتھ کا کٹا ہوا چاول یا غلہ اور گڑ وغیرہ کھاتے ہیں۔
اس لئے یہ مرض اُن کے قریب آنے نہیں پاتا۔ دوسرے نیم جگہ میں اور جہاں
بہت لوگ رہتے ہوں رہنے سے اور مناسب غذا کی کمی، اس بیماری کے اسباب
ہیں۔ موسم برسات میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔

”بیری بیری“ معمولاً تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

(۱) پیرا بلنک بیسری بیسری

اس میں بچے کے حصے میں اعصاب کی سوزش کی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔
اور خاص طور سے دکھائی دیتی ہے۔ پیرا ٹکوان یا پیر کی بیٹھ۔ اور
انگلیوں کی جس آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے۔ اور وہ جگہ سن ہو جاتی ہے۔
عضلات کو حرکت دینے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔

آسانی سے چلا جوا نہیں جاتا۔ بلکہ تکلیف کے ساتھ اکثر عضلات کا چھوٹا
برداشت نہیں ہوتا۔ کلیجہ دھڑکتا ہے۔ سانس کی آمورنت میں
محمولی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پیٹاب کرنے کے وقت اکثر پیٹاب
میں روکاؤں محسوس ہوتی ہے۔

(۲) اوریت یا ڈراپ سسٹم

(مطلوب یا استقار پیدا کرنے والا)

کلا جسم میں خاص کر پیچھے کے حصہ میں استقار ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرض برائٹ (گروہ کی سوزش) ہو گیا ہے۔ لیکن پیشاب کی جانچ کرنے سے شک رفع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس میں مرض برائٹ کی طرح پیشاب میں رطوبت بقیہ کی تکلیف دیتی ہے۔
درید میں بھی سخت اور نہ لچکنے والی نہیں رہتی۔
(۳) کارڈیک (معلق دل)

اس طرح کا بیری بیری خوفناک ہوتا ہے۔ اس میں دل پھیل جاتا ہے۔ اسی لئے انگلی سے ضرب دینے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خطہ سینہ کی بہت جگہ کو گھیرے ہے۔ دل کا دایاں ہی حصہ بہت پھیلتا ہے۔ خطہ نان کے کچھ اوپر کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ کلیجہ میں دھڑکن ہوتی ہے اور سانس کی آمد و رفت میں تکلیف ہوتی ہے۔ نبض تیز رہتی ہے وغیرہ علامات اس مرض میں محسوس ہوتے ہیں۔

موسم برسات میں ایسی جگہ میں جہاں کثرت سے لوگ رہتے ہیں یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اسی لئے مریض کو صحت مند جگہ میں نہ جاسکے پر بھی کھل جگہ میں خشک مکان میں ٹہا کر رکھا جائے۔ ڈھیک سے کوٹا ہوا چاول، انڈا، دودھ، چھاننا، چنا، گڑ، ساگ، سبزی، تازہ چوکر کا آٹا وغیرہ غذا کی اشیاء کا بند و بست کر دینا چاہئے۔ ایسی چیزیں جن میں اور چیزیں ملی ہوں اور کل (شین) سے صاف کیا ہوا چاول ترک کر دینا چاہئے۔ بالکل آرام کرنا چاہئے۔ ایسی غذا اور دوا کا انتظام کرنا چاہئے۔ تاکہ پانکھا اور پیشاب صاف ہو۔ جس میں کلیجہ میں طاقت پہنچے۔

پیشاب کی مقدار کم ہونا۔ پھیپڑے کے اوپر کی جھلی میں پانی کا جمع ہونا۔ لیمبوں کے عضلات یا عضلہ حجاب مابین کا فالج۔ مسدود کا پھیلنا۔ گلے کے درید کا یا ناف کے کچھ اوپر دھڑکن۔ دل کا پھیلنا۔

یہ بہت خراب علامات ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات کارآمد ہیں۔

نیٹرم سلف X_4 - ۲۰۰۔ تریہو امیں اور غرم جگہ میں رہنا۔

اسہال (اگتے ہی پانخانہ) سانس کی تکلیف، ہاتھ پیر اور چہرے پر استسقاء کی علامات میں X_4 ۔ سفوف ۵ گریں کی خوراک ہر چھ گھنٹہ کا وقفہ دے کر استعمال کرنا چاہئے۔

اے لیس ۶۔ ۳۰۔ حقوڑا پیناب۔ دل کی کمزوری۔ سانس کی تکلیف۔ پیر، پیٹ اور سینہ میں پانی جمع ہونا۔ چہرہ خاصکر اوپر کی پلک کا استسقاء، لبینہ اور پیاس کا نہ رہنا۔

اے پوساٹم X_1 ۔ دل کے فعل میں نقص کی وجہ سے استسقاء۔ پیٹ، سینہ اور پیر میں استسقاء۔ پیاس تیز، سانس کی تکلیف، پیناب حقوڑا۔ اس میں دوا کا مدد نہ پہنچے کی طاقت فائدہ مند ہے۔

آرس X_4 - ۲۰۰۔ پیاس تیز، سستی، پیر چینی، پیر و کا استسقاء۔ مقام جسم سرد، لیکن اندرونی جلن، موت کا خوف۔

کلیس ۶۔ ۳۰۔ ہاتھ، پیر کا استسقاء۔ موت کا خوف۔ جسم میں جگہ جگہ ایسا محسوس ہونا کہ کس کس پر ہاتھ دیا گیا ہے۔ دل کی سختی، بندھا ہوا محسوس ہونا۔ کلیجہ دھڑکنا۔ چلنے پھرنے اور دائیں کروٹ سونے سے بڑھنا۔

ایسپیرکس X_1 - ۶۔ دل پر مرض کا حملہ زیادہ ہونا۔

ڈیجیٹلیس ۳۔ دل کی کمزوری۔ ذرا سی حرکت سے کلیجہ دھڑکنے لگنا۔ نبض بے قاعدہ۔

رسٹاکس ۶۔ ۳۰۔ پیر و کا استسقاء۔ برسات میں تر جگہ میں رہنے سے مرض کا شدت اختیار کرنا۔

کنوئیر سینلیس ۳۔ دل پر مرض کا حملہ، ہاتھ پیر کا استسقاء

الائیریم ۶۔ ۳۰۔ اسہال کے علامات میں۔

کیلی کارب ۳۰۔ ۲۰۰۔ آنکھ کے اوپر کی پلک کا استسقاء۔

ٹانگوں میں ٹپک مارنے یا کاٹنے کی طرح درد۔

کمرے ٹیکس ۶۔ دل کی کمزوری، کلیجہ دھڑکنا۔ ٹانگوں کا استسقا۔
بے قاعدہ نبض۔ سانس کی آمد و رفت میں تکلیف۔ خطہ دل میں درد۔

کمی خون۔ کمبیس

(ANAEMIA)

کسی کے طبی خون کی مقدار کم ہونے سے یا اس کے دانہ ہائے کم ہو جانے سے یا اس کے فعل دھیسے اس کے دانہ ہائے خون
(HAEMOGLOBIN) رطوبت بیضہ (ALBUMEN) وغیرہ کی
کمی سے اس کو کمی خون یا کمبیس کہتے ہیں۔
طاقت اور جھوک کا کم ہو جاتا۔ بد سہمی۔ بلنتی جھلیوں میں خون کی
کمی محسوس ہوتا۔ درد سر۔ یا دوران سر۔ نبض کی رفتار فی منٹ ۸۰
مرتبہ، حرارت جسم کی کمی (کبھی کبھی انتڑیوں میں سوجن، جسم ڈبلا۔ میلا
اور زرد کاہلی اور سانس لینے میں تکلیف، کلیجہ میں دھڑکن
وغیرہ۔ اس مرض کے معمولی علامات ہیں۔ روشنی اور ہوا کی کمی بہت
زیادہ صیف کے خون کا اخراج ہو اسیر۔ جسم سے زیادہ رطوبت خون
وغیرہ نکلنے کی وجہ سے یہ مرض پیرا ہوتا ہے۔
علاج مختصر

زیادہ خون اور رطوبت نکلنے کی وجہ سے مرض ہو۔ چائنا۔ الیڈ ناس،
تھوڑے صیف کے اخراج خون میں

پس۔ فیرم

روشنی اور ہوا وغیرہ کے اثر سے ہو تو؛ فیرم۔ پس؛
ٹیکس و امیکا۔ نیٹرملٹ۔

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے

(PRIMARY)

(۱) ابتدائی یا ذاتی

(SECONDARY)

(۲) ثانوی یا عارضی

ذاتی یا ابتدائی کمی خون

(PRIMARY ANAEMIA)

ابتدائی یا ذاتی (بذات خود پید ا ہوئی) کمی خون دو قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) سبز بھس یا سبز کمی خون - (CHLOROSIS PROGRESSIVE)

(۲) خبیث بھس یا خبیث کمی خون (PERNICIOUS ANAEMIA)

(۱) سبز بھس یا سبز کمی خون۔ یہ مرض جوانی میں ہوا کرتا ہے۔ جلد زرد یا خاک رنگ کی، یا سبزی مائل ہو جاتی ہے، بھوڑا رنگ دیکھنے کی گمرہ کی جگہ سرخ، کلیجہ دھڑکتا، چہرہ پر سوسن، سانس میں تکلیف، خشک کھانسی، طبعی گرمی (۹۸/۴) جسم کی گرمی ۱۰۰ کم ہو جاتا۔ ہمیشہ مغموم رہتا۔ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔ یہ مرد عورتوں اور مردوں دونوں ہی کو ہوا کرتا ہے۔

بہ نسبت مردوں کے عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ جب عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے تو مذکورہ بالا علامات کے علاوہ صفیض کی خرابی ہوتی ہے۔ سبز بھس کے ساتھ دق یا دل کی بیماری، زخم شکم، استسقا، صفیض بند، ورم گردہ، بہت زیادہ اخراج خون وغیرہ علامات موجود رہتے ہیں۔

علاج

مرض کے شروع میں فرم میٹور ۳ x ۱ یا پلساٹیل - (خاکسور توں کے لئے) ڈاکٹر میولر۔ ڈاکٹر بارٹ۔ ڈاکٹر جارج وغیرہ بہت سے ڈاکٹروں کی رائے سے پلس زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ اگر یہ مرض مزمن، اور بڑھ چکا ہو تو نیٹریم میٹور ۳۰ (خاکسور جب قسم اور دل سست اور کاہل رہتا ہو) یا کلیریا فاس ۶ x ۱ سفوف دینا چاہیے۔ کلیریا فاس ۳۰ کا استعمال کر کے ڈاکٹر جارج رائٹ نے امید سے زیادہ فائدہ پایا ہے۔

(THE HOM. WORLD FOR DEC 1914) ملاحظہ ہو؛ عورتوں کو کمی خون کے ساتھ اگر سبز بھس ہو تو شو سلسر صاحب کی رائے کے مطابق

کلیر یا فاس سب سے اچھی دوا ہے۔ فرم میٹور ۳۳-X (کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہئے) کی خون کی ایک اچھی دوا ہے

علاج معاون

عام اصول صحت کی پابندی کرنی چاہئے۔ مقوی اور ہضم چتر کھانا چاہئے۔ صبح و شام ہوا غوری، اچھے مکان میں رہنا۔ اگر برداشت ہو سکے تو دریا میں نہانا۔ کچھ گرم پانی میں نمک ڈال کر نہانا چاہئے۔ کلے کا ٹٹا کا شوربہ کھانے سے دانہ ہائے شمرخ زیادہ اور جلد جلد بڑھتے ہیں۔ اس لئے مریض جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی سبزی بیماری کا حال معلوم کرنے کے لئے عورتوں کی بیماری کے باب میں سبزی بیماری ملاحظہ ہو۔

(ب) خبیث (مہلک) کمی خون

یہ مرض بڑھتے بڑھتے بہت سخت علامات پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لئے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس کا خاص سبب اب تک معلوم نہیں ہوا۔ لیکن ایسی جگہ میں جو صحت بخش نہ ہو، رہنا۔ اعصابی یا داغی چوٹ، بہت دنوں تک ماں کا دودھ بلانا۔ پیٹ کی فراہمی وغیرہ کی وجہ سے خون کے شمرخ دانے آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں اور دانوں کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس مرض کا حملہ ہونے پر، (بے خبری میں) نیوٹروفیل کی طرح ہاردرنگ، یا موم کی طرح سفید، کچھ ڈبلا پن، تشنج، نرم اور ڈھیلے کشتی۔ جسم کی حرارت بڑھ جانا۔ کلیمہ بھونکنا۔ بے ہوشی۔ ناک سے خون آنا۔ سانس کی تکلیف۔ بد ہضمی۔ بھوک کم ہو جانا۔ تپے دست آنا۔ بسم اور دل کی کشتی وغیرہ۔ اس کے خاص علامات ہیں۔

آخری حالت میں کوئی کوئی موٹا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی مدت کئی ہفتوں سے کئی برسوں تک ہے۔ انجام بد ہے۔ اچھی طرح علاج ہونے پر بھی شاید ہی مرض اچھا ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا سبزی بیماری میں جلد سبزی مائل۔ لیکن اس میں جلد موٹی ہوتی ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات کارآمد

علاج

ثابت ہوتی ہیں

آرسنک ۲x، اس دوا کے استعمال سے بہت فائدہ دکھائی دیتا ہے۔
بہت کمزوری! اس دوا کی خاص علامت ہے۔

لگئے چپیں، سینڈس، مس، وغیرہ۔ امریکہ کے مشہور ہومیو پیتھک
ڈاکٹر ان کیلی آرسنک (FOWLARS SOLUTION) ایک قطرہ سے
اقتطہ تک دن میں تین مرتبہ علاج کرنے کے لئے فرماتے ہیں۔

جب تک یہ اچھی طرح معلوم ہوتا رہے کہ سرخ دانہ ہائے خون بڑھ
رہے ہیں۔ اس دوا کو بلا ناغہ دینا چاہئے۔ لیکن اگر مودہ میں
سوزش (IRRITATION) یا آکھ کے نیچے کی پیک سو جی ہو، تو
آرسنک دینا بند کر دینا چاہئے۔ پھر ضرورت پڑنے پر آرسنک ۳x: ۳x
یا کوئی دوسرا دوا انتخاب کر کے دینا چاہئے۔

فاسفورس ۳x: ۶x: خون کا اخراج، جگر کا بڑھنا۔

بیلیکیم ۳۰: ۲۰۰ (ہفتہ میں ایک خوراک استعمال کرنا)

چائنا ۳۰: ۳۰: ارجٹائی ۲۰: ہائیڈراسٹس ۳۰: مرک وائی ۶x:

سفوف ٹیڑم ۲: پلمیم ۶: وغیرہ دواؤں کی بھی کبھی ضرورت
پڑتی ہے۔ اس مرض میں فریم یا لوہے سے تیاری کی ہوئی دوائیاں
فائدہ نہیں کرتیں۔

اگر مچھلی کا شوربہ کھانا ڈاکٹر یا کاتیل ماش کرنا فائدہ مند

ہے۔ مزمن مرض بچہ کا علاج ملاحظہ ہو۔

(۲) عارضی یا ثانوی کمی خون

(SECONDARY ANAEMIA)

جسم کی رنگت تبدیل، سفیدی مائل، زردی مائل، یا کچھ ٹیلا۔

پایلا۔ لاغری، معدہ یا آنتوں میں خرابی۔ نبض کمزور۔ استفادہ

نمرین درد۔ سر میں چکر۔ بے ہوشی۔ بھوک نہ لگنا۔ اعصابی درد۔

تمام جسم میں کمزوری اور دماغ میں سُستی، وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔ مفرجکہ (یعنی صحت کو خراب کرنے والی جگہ) میں رہنا غیر مقوی غذا کھانا۔ اخراج خون طفیلی متعدی مرض (جیسے ملیریا، کالا زار، آتشک، دق، زہریلی چیزیں، (کونین، آرسنک، پارہ، تانہ، جستہ، بہت عرصہ تک یا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا۔

معدہ میں سوزش یا زخم، مزمن گُردے کی سوزش، بچوں کی بڑی کی خرابی۔ بھوڑے، چوٹ، گرنے یا نشتر لگنے یا ولادت کی وجہ سے زیادہ خون نکلنا۔ شراب زیادہ پینے یا ادبائی وغیرہ دہوں سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔

علاج :- فیرم ریڈیکٹم، چائنا ۳۔ آرسنک ۳۔
کلکے کارب ۴۔ بیلونیس ۳۔ پلمیم ۳۔ فاسفورس ۳۔ اس مرض کی خاص دوائیں ہیں۔ اصلی سبب (ملیریا، دق، اسہال، وغیرہ) معلوم کر کے اُس کی دوا دینی چاہئے۔

جب مرض کمی خون کے اصلی سبب کا پتہ نہ چلے تو آرسنک ۳۔ ۳۔ ۱۔ پس ۳۔ ۳۔ کلکے کارب ۴۔ ۳۔ کاربووج ۴۔ ۳۔ چائنا ۴۔ پلساٹیل
وغیرہ دواؤں کی جانچ کرنی چاہئے۔
مرض ملیریا میں مبتلا رہنے سے کمی خون کی بیماری ہو، تو نیٹریم میو ۳۔ ۳۔ ملیریا کی وجہ سے کمی خون میں زبان زرد بھوک نہ لگت۔

متلی کے ساتھ ہی درد سر، صفرا کی زیادتی وغیرہ کے علامات میں اسٹریا ورچنکا ۴x۲ سفید ہے۔ جسمانی یا دماغی محنت سے نفرت، پیشاب میں (URATES) اور (PHOSPHATES) برسنے کے علامات میں پیکرک ایسڈ ۳۔ (فی خوراک ۵ گرامین، چھ گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرنا چاہئے) زیادہ قبض ہو تو پلمیم اسٹیکم ۳۔ (فی خوراک دو تین گرامین تین مرتبہ روزانہ استعمال کرنا چاہئے) حیض کے کم ہونے یا بند ہونے سے اگر یہ مرض ہو تو پلساٹیل ۳۔ یا

فیرم مٹ ۶؛ سیلان الرحم، جریان، منی، اخراج خون یا اسہال کی وجہ سے خون کی کمی ہونے میں جائز اس۔ یا فاسفورک ایسڈ ۳۔
استسقا یا مفلوجی یا قوت حیات کی کمی کی حالت میں آرٹک۔
تب دق کی علامت رہنے میں فاسفورس ۶۔ اگر شراب وغیرہ پینے کی وجہ سے ہو تو نکس و امیکا x۱- ۳۔

پارے کے غلط استعمال کی وجہ سے ہو تو نائٹریک ایسڈ ۶۔ یا آرم مٹ ۶۔
۴۔ ۳۔ یا کوئین یا لوہے کے غلط استعمال کی وجہ سے کمی خون کی بیماری۔
ہو یا جسم میں سہراون ہو، تو نکس ۶۔ ۳۔ مذکورہ بالا کسی دوا سے
نائدہ نہ ہو تو سلفر ۳۔ دو دن استعمال کرنے کے بعد دو دن تک
کوئی دوا نہ کھانی چاہیے۔ اس کے بعد علامات کے مطابق مذکورہ
بالا دواؤں میں سے کوئی دوا منتخب کر کے دینا چاہیے۔

اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو نیٹرم سلف x۳؛ سفوف دینا چاہیے
یہ دوا مرض کی تمام حالتوں میں نائدہ کرتی ہے۔

اس کتاب میں ”طحال“ ”اسہال“ ”کثرت طمت“ ”مزمن امراض
زچہ خانہ (پرسوت) عورتوں کی بیماری کے باب میں ”مرض کمی خون“
وغیرہ بیماریاں ملاحظہ ہوں۔

خون کا سفید ہو جانا

(DEUKEMIA)

جس مرض میں کمی خون میں دانہ لے خون بڑھ جاتے ہیں اس کا نام
”دم ایمن“ یا ”خون سفید“ ہے۔ اس دم ایمن کے ساتھ تلی یا
(LYMPHATIC GLANDS) غدود مفاویہ کی بڑھتی ہوئی ہے۔
یا مغز استخوان (ہڈیوں کا گودا ماوت) (BONEMARROW) ہو جاتا ہے مرض
کمی خون کے علامات کے ساتھ تلی، جگر یا غدود مفاویہ (خاص کر گردن
کی گلیٹیاں) میں چہرہ زرد یا موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ جلدی بیماری
استسقا زناک سے رطوبت کا جریان۔ در کے ساتھ ایسا دگی وغیرہ اس

مرض کے علامات ہیں۔ یہ مرض آرام نہیں ہوتا۔ لیکن اچھی طرح علاج کرنے سے اس کے علامات دبے رہتے ہیں۔

علاج

آرسنک آیوڈ x_2 :- (غذائے بعد فی خوراک ۲ گرین کے حساب سے استعمال کرنی چاہیے)۔ انکی اچھی دوا ہے۔ تلی کے درد میں سیونو تھیس x_2 :- درد کے ساتھ استادگی میں پیرک ایسڈ x_2 :- (فی خوراک ایک گرین) جسم کا رنگ ٹیلا۔ سردی، منی کی خرابی وغیرہ علامات نیٹرم سیور x_2 :- سردی و پیدار پسینہ، دونوں پیروں میں استسقا کی وجہ سے آماں۔ سردیانی سے نہانے کے بعد مرض بڑھنے کی علامات :- گلے کا رب x_4 :- سوزاک میں مبتلا لوگوں کے لئے ٹھو جا۔ ۳۔ ٹیرم سلف x_3 :- کھلی ہوئی رہنا۔ آرام کرنا۔ قوی غذا وغیرہ فائدہ مند ہیں جن کو ہمیشہ سہراون محسوس ہوتی ہو۔ وہ صبح جسم میں شراب مالش کر سکتے ہیں۔

جسم پر خونی دھبے

(PUR PURA)

اس مرض میں پہلے جلد پر سیکنی رنگ کی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوتی ہیں اور جلد اور بلیغی جھلیوں میں خون تراوش پاتا ہے۔ اس خون کے تراوش پانے کے بعد جلد کی رنگت ٹیلی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اس کا نام فر فوراً ہے۔ اس مرض کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) سادہ فر فوراً (SIMPLEX) اس میں پھنسیاں ہوتی ہیں۔

(ب) خونی فر فوراً (HAEMORRAGIC) اس میں پھنسیوں کے ساتھ دانت کی جڑ، دماغ، معدہ، جگر، پھیپھڑا، گردہ جسم کے اندرونی اعضاء سے خون بہنا اور پیٹ درد ہوتا ہے۔

(ج) وجع مفاصل (NNEUMATIC) اس میں بخار کے شدید

وجع مفاصل کے علامات (کبھی کبھی پتی) معلوم ہوتے ہیں۔

تھکاوٹ محسوس ہونا، جسم کے اکثر جگہوں میں ٹیلی پھنساں (پھنسیاں نہ کھلائی، یا نہ پکیں، اور انکی سے دبانے سے نہ دیں) (معمولی ضرب سے)

جسم پر سیاہ داغ ہوئے جریان، استسقا۔ کمی خون جوڑوں میں آس اور درد ہوتا۔ اس مرض کے خاص علامات ہیں

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہوتی ہیں

(۲) سادہ مرض فرفور کی خاص دوائیں۔ آرینیکا ۳ x (خاص کر سیاہ داغ پڑے۔ مار کھانے کی طرح درد ہو) اور ایکون ۳ x۔

(بخار کے علامات میں) بن، سلف، ایسی، مرک۔ راس۔

(ب) خونی فرفور کی خاص دوائیں۔ فاسفورس ۳۔ (نکسیر پھوٹنا۔

یا مسور سے خون نکلنا۔ کلیجہ دھڑکتا۔ جلد کی رنگت زرد۔

ذرا سی چوٹ لگنے سے خون نکلا) کروٹیل ۳۔ (خون کی علامت غیر منتظم میں) ہیمی میل ۳۔ (سیاہ خون نکلنا۔ تھکاوٹ محسوس ہوتا۔

اور کھانے کی طرح درد) لیکے ۶۔ مرک آرس۔

(ج) وجع مفاصل فوراً کی مخصوص دوائیں۔ ایکوناٹ ۳ x۔

(بخار کے ساتھ جسم میں درد اور اکڑن) مرک، وائی ۶۔ نہ زیادہ

گرمی نہ زیادہ سردی کی برداشت، رات میں مرض کی زیادتی۔

منہ میں جلن اور زخم۔ راس وینا (بے چینی۔ کل جسم میں کڑا۔

آرام میں درد کی ترقی کے علامات) اے لیس ۳۔ (استسقا میں) آرسنک

۶ x ۳۔ (بخار میں مریض کے زیادہ کمزور ہونے میں)

کھلی ہوا میں رہنا، سورج کی روشنی اور مقوی غذا۔

(خاص کر تازے پھل فائدہ مند ہیں۔

سکروی گوشت خورہ

(SCURVY)

تازہ سبز ترکاریاں، یا مناسب غذا نہ کھانے سے پرورش فعل

میں جو نقص پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک طرح کا مرض فر فور پیدا

ہوتا ہے۔ اس مرض میں خون کا نام سکروٹ ہے۔ بیگنی رنگ کی

چھوٹی چھوٹی پھنیاں، کمزوری (جیسے دم پھوٹنا۔ کلیجہ دھڑکتا۔

توڑی جس میں چربی ہو۔ کلیر یا کارب ۳؛ جلیں والے آب میں ہائیڈرٹس
۶۸۱۔ (خاص کر گلیٹین اور رحم کے آب میں) پیشاب کی نالی کی سوچن۔
یوکیلپٹس ۳x؛ کھانا اور یوکیلپٹس، ماؤت جگہ پر ملنا۔ تھو جیا۔
کاربوائین؛ کونیم؛ اکون رڈ کس۔ (نی خوراک نصف قطر ہے، سے ۳۔
قطر ہے۔ فاسفورس وغیرہ کا استعمال فائدہ کتنا ہے۔

بیرونی علاج :- زخم والے آب کے اوپر ایڈونٹام سفوت
یا کاربوج چھڑک دینے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر (COOPER)
روٹلے کے مریض (تازہ روٹا کے ساتھ کیلین ملایا ہوا) کے استعمال سے
فائدہ ہوتا ہے۔ مریض سرطان کی ادویات ملاحظہ ہوں۔

آتشک (گرہی) اور سوزاک

ان متعدی امراض کا پورا حال اور علاج کے لئے آئٹن سلسل کے مریض کے باب میں
امراض زہریہ آتشک و سوزاک (VENEREAL DISEASES) کا مقصد دیکھئے۔

امراض نظام اعصابی

دماغ اور اعصاب بل کر نظام اعصابی کہلاتے ہیں۔ اس نظام
اعصابی کے اندر ایک ایسی طاقت پوشیدہ ہے کہ جس کے بھروسہ
پر دل وغیرہ جسم کے آلات اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے
ہاتھ و پیر ہلاتے ہیں۔ اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں سمجھنے کی
طاقت ہوتی ہے۔

امراض دماغ میں ٹھنڈی اور پیٹری جگہوں میں پیچ پیچ میں آب
دھوا بہ لینے کے لئے جانا اور رہنا بہت فائدہ کرتا ہے۔

دماغ اور حرارہ مغز کی سوزش

اس باب میں دماغ اور مغز کی جھلی کی سوزش کا بیان کیا
ئے گا۔ دماغ کے پردہ اور دماغ کے گڑھے کے پردہ کی سوزش کو

دماغ کی جھلی، سوزش کہتے ہیں؛ کپٹی میں چوٹ لگنے یا کان کے درمیانی حصہ میں مرض ہونے یا پھیلنے سے یہ مرض ہوتا ہے۔ دماغ تین پردوں سے چھپا ہوتا ہے۔ اُس میں سے ایک کو دماغ کے پردہ کی جھلی کہتے ہیں۔ پہلے دماغ حرام مغز کی سوزش اس کے بعد دماغ کی جھلی کی سوزش لکھا جائے گا۔ یہ مرض آسانی سے آرام ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے اچھے معالج کے ہاتھ پیر میں سپرد کرنا چاہیے۔

علامات:- دماغ کی سوزش میں تیز بخار، درد، سر درد، ہڈیاں، چہرہ سرخ، نبض تیز، سر اور گلے کی سنوں کا پھٹکنا۔ قبض، قے، متلی، بے خوابی، شروع ہی مرض میں آنکھوں کی پتلی کا سکرنا۔ لیکن بیماری زیادہ ہو جانے میں اُس کا پھیل جانا اور اس وقت روشنی کا بالکل برداشت نہ ہونا۔ مرض کی تیز حالت میں کبھی کبھی دانت کڑکڑانا۔ سر میں جکڑ آنا۔ سانس میں تکلیف اور پیشاب میں رُش ہو۔ حرام مغز کی سوزش میں سہراون محسوس ہونا۔ دھیمہ بخار، ہاتھ و پیروں میں تیز درد۔ پشت کا سخت ہونا، جسم ڈبلا اور آہستہ آہستہ فالج ہو جانا۔

اسباب:- گرنا۔ یا کسی دوسرے طریقہ سے سر میں چوٹ لگنا۔ زیادہ دیر تک دھوپ میں گھومنا۔ دماغی تھکاوٹ، یا تحریک وغیرہ اس مرض کے اسباب ہیں۔ بچوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔

علاج

تیز بخار۔ پیاس۔ موت کا خوف۔ وغیرہ علامات میں

ایکون X۲۔ چوٹ کی وجہ سے دماغ کی سوزش میں بخار نہ ہنے میں آرنیکا۔ ۶X۳۔ بخار کے ساتھ ہڈیاں، دماغ گرم، آنکھیں سرخ وغیرہ علامات میں بیلاڈونا ۶۔ ۳۰۔ تکیہ پر سر رکھتے رہنا۔ یا یکایک زرد سے چمچ اٹھنا۔ اے پس X۳۔ ۳۰۔ سر میں درد اور اُس کے ساتھ ہی رات میں کچھ ہڈیاں، نیند کھل کر یکایک چونک پڑنا۔ وغیرہ علامات میں براونیا۔ ۶۔ ۳۰۔ یا سلفر۔ ۳۰۔ دینا چاہیے۔

جی غشیہ، ورم غشا۔ دماغ۔ ورم غشا۔ حرام مغز، ورم حرام مغز ملاحظہ ہوں۔

(MENINGITIS)

دماغی پردوں کا ورم

یہ ایک شدید متعدی مرض ہے۔ اور اکثر یہ وبائی صورت اختیار کرتی ہے۔ مینجائٹس ایک قسم کا جرم ہے جو اس بیماری کا سبب ہے۔

ناک ہی کے ذریعہ سے یہ جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے پیدا ہوتے وقت امتحان کر کے دیکھا گیا ہے کہ کسی کسی کی ناک میں یہ جراثیم لے ہیں۔ یا وہ اس بیماری میں مرض کا حملہ نہیں ہونے دیتے۔ لیکن جوان کو چھو جاتے ہیں۔ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو کیریر یا چھوٹ والا جراثیم لے جانے والے کہتے ہیں۔ اس بیماری کے پیدا ہونے کے وقت ہنایت غور و خوض طریقہ سے امتحان کر کے دیکھا گیا ہے کہ ایسے شخصوں کو دوسرے اشخاص سے علیحدہ رکھ کر علاج کرنا پڑتا ہے۔

مذکورہ بالا متعدی شدہ قسم کے علاوہ دوسرے قسم کا منہ جائٹس ہو سکتا ہے۔ جیسے سل۔ (یو۔ برکیولر) یا (جب جراثیم سل دماغ پر حملہ کرتے ہیں)۔ انفلوئنزا، منونیر، خسرہ، چیچک، وجع مفاصل گلینڈیولر۔ ڈفٹیریا یا ٹائیفائیڈ، بخار وغیرہ کی مدد کی صورت میں یا وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔

ان کے انتخاب میں کسی طرح کی خاص وقت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وبائی متعدی بیماری بہت پھیلی ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ اور کر کے مقام رکر کے مقام پر رپڑھ کے اندر سے رطوبت نکلتا، کو چھید کر جو رطوبت نکلتی ہے۔ اُس میں خوردبین کی مدد سے جانچ کرنے سے منہ جائٹس کے جراثیم ملتے ہیں۔ اور بیماری کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ ایک دوسرے طرح کی بیماری میں پہلے کسی دوسری طرح کی تاریخ ملتی ہے۔ یا مرض کی حالت اتنی نہیں بدل جاتی۔

صدمہ دماغ، بہت زیادہ محنت کی وجہ سے سُستی، اس بیماری کا سبب
حرکہ ہو سکتا ہے۔ مہلک قسم کے حملہ دماغ میں حرام مغز میں خون کی زیادتی
دماغ کے نیچے حصہ میں بہت زیادہ مواد کی طرح کی چیز جمع ہوتی ہے۔

فرمن اور ایسے فن جاٹس میں جو بہت زیادہ مہلک نہیں ہے اُن کے
حملہ ہونے پر دماغ کی جھلٹی موٹی ہو جاتی ہے۔ دماغ ملام ہو جاتا ہے۔
مختلف جگہ خون جلنے کی علامت دکھائی دیتی ہے۔ دماغ کے اعصاب
میں خرابی ہو جاتی ہے؛ اور کبھی کبھی ناک کی رطوبت میں بھی جراثیم ملنے
ہیں۔ آخر میں نمونہ یا پلورسی ہو جاتی ہے۔

علامات

مہلک قسم کی بیماری :- بہت ٹھنڈک لرزہ، اور دوسرے ساتھ
فرمن کا حملہ ہوتا ہے۔ ترتیب اراؤنگھائی، سُستی، معمولی ہڈیاں میں بکواس۔
نبض ملام اور تیز جسم میں چھوٹی چھوٹی پھسیاں نکلا وغیرہ علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔
۵ سے ۲۰ گھنٹہ میں موت ہو جاتی ہے۔

سادہ قسم کی بیماری

بھوک نہ لگنا۔ درد سر۔ درد کمر۔ اور اس کے علامات سابقہ ہیں۔
کبھی کبھی درد سر، چارڈا، لرزہ، نبض سخت، اور متلی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا
بھی ہوتا ہے کہ ۱۰ سے ۱۰ ڈگری کے بخار کے ساتھ یکا یک مرض کا حملہ
ہوتا ہے۔ گلے کے عضلات میں آکڑن، اس کی ایک سابقہ اور شخصی علامت
ہیں۔ ترتیب وار درد سر، بے چینی، اور آواز برداشت نہ ہونا۔ بڑھ جاتا
ہے اور پانی سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔

مرض مہلک میں گلے کے عضلات میں آکڑن شروع ہی میں آ جاتی
ہے۔ اور جسم کمان کی طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

عضلات میں تشنج ہو جاتا ہے۔ گردن اکڑ جاتی ہے۔ اور پیچھے کی
طرف ٹیڑھی ہوتی ہے۔ منہ کے عضلات میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے
آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ٹیڑھی نظر میں مرض فرمن میں جاٹس

کے علامتوں میں آتی ہے۔ اکثر مریضوں میں ہڈیاں درد سر اور ریڑھ کا چھوٹا برداشت نہیں ہوتا۔ بے ہوشی آجاتی ہے اور بے ہوشی ہونے کے ساتھ ہی بکواس گھٹ جاتی ہے۔ اکثر مریض ایک دم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ گویا گہری نیند میں پڑے رہتے ہیں۔ گرمی کے وقفہ کا مستقل قیام نہیں رہتا۔ کبھی کبھی ۵۰ سے ۱۰۰ ڈگری تک بخار رہتا ہے۔ کبھی کسی کو کچھ گرمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ جلد ریت قسم کے دانے نکلتے ہیں۔ سفید دانہ ہائے خون بڑھ جاتے ہیں۔ خوردبین سے کباخ کرنے پر سفید دانہ ہائے خون میں نفیائٹس کے جراثیم ملتے ہیں۔ بڑھ جاتی ہے۔ اور قے ہوتی ہے۔ اسہال یا قبض بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب میں سفید رطوبت نکلتی ہے۔

اس مرض کے قیام کی مدت مقرر نہیں ہے۔ وہ کئی گھنٹوں سے لے کر کئی ماہ ہو سکتی ہے۔ ایک ہفتہ میں گرمی اور تشنچ کم ہو جاتا ہے اور عقل و فہم کا لوٹ آنا امید افزا علامت ہے۔

یہ ایک بخار کا گھٹنا علامت نیک نہیں ہے، اس مرض کا یہ انجام ہوتا ہے کہ عموماً پھیپھڑوں کے غلاف کی سوزش، دل کے غلاف کی سوجن، کان کے جڑ میں سوزش آتا۔ دماغ میں پانی اکٹھا ہو جاتا۔ دماغی کمزوری۔ قوت گویائی کا غالب ہو جانا۔ تھوڑی دیر کے لئے بے ہوشی، یادداشت کا زائل ہو جانا۔ وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ ۵، ۷، ۱۰ فیصد مریض مر جاتے ہیں۔ بچوں میں موت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔

مریض کو علیحدہ سنان جگہ میں بستر پر آرام سے سٹار رکھنا اور سر کے بال کٹوا دینا چاہیے۔ اور سر پر آئس بیگ۔ اگر وہ نہ ملے تو گھنٹے پانی کی دھار دینا چاہیے۔ خوب پانی پلانا چاہیے۔

اگر مریض غذا نہ نگل سکے تو ربر کی نلی سے معدہ میں غذا پہنچا دینا چاہیے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بستر کا زخم نہ ہو، پیچ پیچ میں حسب ضرورت تیلی چیزیں کھانے کو

دینا چاہیے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ثابت ہوئی ہیں۔
 ایکون۔ ۲۰۔ مرض کی شدید حالت میں جب درد سر بے چینی، پیاس،
 وغیرہ زیادہ رہے۔ خاص کر جب غصہ یا کو لگنا۔ اس مرض کے اسباب
 ہوں۔ میلادونا۔ ۳۰۔ یہ اس مرض کی سب سے اچھی اور کامیاب دوا
 کہی جاسکتی ہے۔ درد سر، سر میں خون کی زیادتی کی وجہ سے چہرہ اور
 آنکھیں سرخ، کپٹی میں تپکن کے ساتھ درد، ہڈیاں، سرگرم جسم اور پیر
 نسبت سر کے ٹھنڈے، سر کو تکیہ پر چھپانے کی خواہش۔ آواز۔ یا
 روشنی برداشت نہ ہونا۔ تشنج، سر کے پیچھے کی طرف ٹیڑھا ہونا۔
 بے ہوشی وغیرہ اس کے خاص علامات ہیں۔

برایونیا۔ ۳۱۔ ۲۰۰۔ جلد کے دانے بیٹھ جانے سے دماغی
 پردہ کی سوزش، ہڈیاں، اور تشنج، جو اس میں دن کے کئے ہوئے
 کاموں کو بکنا، تیز پیاس، معمولی حرکت سے درد کا بڑھ جانا۔ ایسا محسوس
 ہوگا یا مرض کچھ تیز ہوا ہے۔ جڑے، ہلکا قبض، سارے جسم میں درد،
 پیشیا X۶۔ ۳۰۔ بعد ٹائیفا ئیڈ کے دماغی پردہ کی سوزش۔
 تمام جسم میں اینٹھن کی طرح درد، ایسا محسوس ہوگا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے
 ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو بچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہلکا سر سام، بڑبڑاہٹ،
 بستر سخت محسوس ہونا۔ تمام جسم میں بدبو، بول و براز میں بدبو وغیرہ۔
 ٹائیفا ئیڈ کے علامات میں بالخصوص مفید و کارآمد۔

آرنیکا۔ ۴۰۔ ۲۰۰۔ چوٹ وغیرہ کے سبب دماغی جھٹکی کی سوزش۔
 تمام جسم میں اینٹھن۔ گلے کی ہڈی کا چھوٹا برداشت نہ ہونا۔ چہرہ سرخ،
 آنکھوں کی پتلی سکڑی ہوئی، بے خبری میں پیشاب و پاؤں نہ نکل جانا۔
 نبض سخت اور پر، بے ہوش ہو جانا۔ بے ہوشی کی طرح تیز۔ بستر
 سخت محسوس ہونا۔ آہستہ آہستہ بڑھائے۔

کیمف۔ ۴۰، ۳۰۔ دماغ میں انجماد خون کی وجہ سے غشی، سر
 ہلانے سے تپکن، کراڑی دانت لگنا۔ سر ایک طرف ٹک پڑنا۔

جب کوئی دوسری دوا کام نہ کرے تو اس کا استعمال ہونا چاہیے۔

ہائی بورس ۶۔ ۲۰۰۔ جگایا نہیں جاسکتا۔ سر پیچھے کی طرف ٹیڑھا۔
ہو جاتا ہے۔ آنکھ کی پتلی پھیلی ہوئی۔ روشنی میں مسکڑتی نہیں ہے۔
لگاتار دانت پینا۔ پیشاب رُک جانا۔ متواتر ایک ہاتھ اور ایک پر
ہلاتے رہنا سستی، بعد اے پس، کے خوب کام کرتا ہے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ ۳۔ مرض کا ایک حملہ۔ آنکھ نصف
کھلی، آنکھ کی پتلی پھیلی ہوئی۔ چہرہ دب جانا۔ زبان سیاہی مائل۔ زبان
بیخبری میں باہر نکل پڑتی ہے۔ گلے میں گھڑ گھڑا ہٹ سستی، تمام جسم سرد۔
نبض سوت کی طرح نہایت کمزور، اور بے قاعدہ چلتی ہے۔

جلس۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ مرض کے شروع میں زور کی قے۔ سر میں خون کی
زیادتی۔ سر میں پیچھے کی طرف درد، عضلات کے ہلانے کی طاقت نہ رہنا۔
یا کم ہونا۔ لرزہ، آنکھ کی پتلی پھیلی ہوئی۔ مُردنی چھا جانا۔ بول نہ سکا۔
زبان کاسٹن ہو جانا غشی نہ آنا۔

گلوٹائن ۶۔ ۲۰۰۔ سر بڑا معلوم ہونا۔ سرگو یا پھٹ جلے گا۔
تپکن درد۔ گردن کے پچھلے حصہ سے شروع ہو کر سر کے پیچھے کی طرف پھیل
جاتا ہو۔ قوتِ باصرہ کا زائل ہو جانا۔ متلی اور بے ہوشی۔ کل ریڑھ
میں درد۔ سورج کی کرن لگنے سے گھٹنا، گیس کی روشنی میں بہت دیر
تک کام کرنے کی وجہ سے جب تکلیف آتی ہو، یا خصوصاً جن مریضوں
میں خون کی زیادتی ہو، اُن کے لئے نہایت مفید و کار آمد ہے۔

ہائیوسیا مس۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ آہستہ آہستہ بڑبڑانا۔ بستر کی چادر
لوچیا۔ ہریان۔ شہوانیہ ننگا ہو جانا۔ ہمیشہ آلہ تناسل پر ہاتھ رکھنا۔
گردن ایک طرف سے اکر جاتی ہے۔ دانت بیٹھ جانا۔ درد سر۔ تشخ،
ہائی پیریکیم ۶۔ ۲۰۰۔ ریڑھ میں چوٹ کی وجہ سے بیماری۔
ریڑھ کا چھوٹا بڑا شست نہ ہونا۔ سستی پن وغیرہ۔

اگنیشیا ۳۔ ۲۰۰۔ غم یا دائمی خواب کی وجہ سے بیماری۔

نکس۔ ۳۔ ۲۔ کزاز کی طرح تشنج۔ لیکن بہت تھوڑی سی بہوشی نہیں آتی۔ (یعنی بے ہوشی ذرا بھی نہیں ہوتی)۔ ذرا بھی چھو دینے سے تشنج اوپکم۔ ۳۔ ۲۰۰۔ غشی؛ ہذیان۔ ایک طرح کا پاگل پن۔ سر کے پچھلے حصہ میں سیسہ بھرے ہوئے کی طرح کا بوجھ۔ نصف آنکھیں کھلی۔ غٹکھٹکی لگا کر ایک طرف دیکھتے رہنا۔ آنکھ کی پتلی پھیلی۔ یا سگری ہوئی، روشنی سے آنکھ کی پتلی نہیں سکڑتی۔ منہ میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے۔ دانت بیٹھ جانا۔ پسینہ نکلنے پر زیادتی۔ زنگم۔ ۳۔ ۲۰۰۔ بینائی زائل ہو جاتی ہے؛ یادداشت کا گھٹنا۔ نبض یکا یک سرگرم محسوس ہونا۔ دانے بیٹھ جانے کی وجہ سے بیماری۔ متواتر ہاتھ و پیر ہلانا۔ ان کے علاوہ اے پس، تھوچا۔ مرگ۔ نائٹیری۔ آرس۔ کینتھر۔ کنا بس۔ انڈیکا۔ سائیکوٹا۔ سمی فوگا۔ کروٹلیس؛ ڈج، لاسیکو؛ فاس؛ ویرے؛ ایلپ۔ کیوریم۔ ٹیرن ٹیولا۔ وغیرہ بھی علامات کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔

دماغ میں پانی کا جمع ہونا

(HYDROCE PHALOID BRAIN)

ہیڈرو سہال اور دوسرے مستی پیدا کرنے والے امراض میں خون زائل ہو جانے کی وجہ سے پرورش کا کام بند ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں پہلے بے مینی، بخار۔ بڑھتا آیا۔ زور سے سانس نکالنا۔ چونک اٹھنا۔ سینہ میں یکا یک پیچھے اٹھنا۔ دانت پینا۔ سینہ اور گلے میں گھڑ گھڑا ہٹ۔ سبز رنگ کا بدبودار دست۔ آنکھ نصف کھلی وغیرہ علامات معلوم ہوتے ہیں۔ اسکے بعد آداس ہونا۔ چہرہ کا بد رنگ ہونا۔ جسم کا ٹھنڈا رہنا۔ تمام جسم (خاص کر ہاتھ و پیر) ٹھنڈے سانس اور نبض کمزور۔ بچوں کے تالو میں گرہا پڑ جاتا ہے۔ غفلت پیدا ہو جانا۔ اس غفلت کے بعد ہی موت ہوتی ہے۔

دماغ میں مناسب خون کے دوران کے غل (یا سرخ دانہ ہلے خون) کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔

علاج:۔ فاسفورس ۳، اسکی بہترین دوا ہے اگر فاسفورس سے پورا فائدہ نہ ہو تو زکیم ۳۰x۔ سفوف، یازنک دینا چاہیے۔

علاج معاون:۔ (مرغی کو بستر پر چٹ لٹائیں۔ دونوں پیروں کی بہ نسبت سر کچھ نیچا رہے) ایک کیسٹے میں برف رکھ کر روز تین مرتبہ جسم پر ملنا چاہیے۔ اچھی ہوا اور مقوی غذا دینا چاہیے۔ (جیسے دودھ یا مسور کی دال کا پانی، پانی کے ساتھ شراب نمی بوندیں۔ اندھے کا سفید حصہ، سینگی ٹھیلی کا شوربہ وغیرہ) فائدہ مند ہے۔

دماغ میں پانی جمع ہونا۔ اور مذکورہ بالا ورم غشاء دماغ اور خون اور طاقت کو گھٹانے والے اس مرض کا فرق اور دوسری دواؤں کے لئے ہماری کتاب اور اس کا علاج ملاحظہ ہو:

دماغ میں خون کی زیادتی

(CEREBRAL CONGESTION)

جسم کے کسی حصہ میں غیر طبعی یا بے قاعدگی سے خون جمع ہونے کا نام اس حصہ کے خون کی زیادتی یا انجماد خون ہے۔ سر کے بال والی نالیوں میں بہت زیادہ خون بڑھ جاتا ہے۔ تو اسکو دماغ میں انجماد خون کہتے ہیں۔ یہ انجماد خون دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) شریانی یا فاعلیہ اجتماع الدم

(ARTERIAL OR ACTIVE CONGESTION)

(ب) اجتماع الدم وریدی یا حالیہ

(VENOUS OR PASSIVE CONGESTION)

تیز یا زور کی تیزی سے خون کے دھارے کے فعل کی وجہ سے پیدا ہوئے

اجتماع خون کا نام "شریانی اجتماع الدم" ہے۔ اور خلاف یا کمزور دوران خون کے فعل سے "اجتماع الدم حالیہ" کہلاتا ہے

(۲) شریانی یا فاعلیہ اجتماع الدم

چہرہ سُرخ اور سوجا ہوا، سر گرم، آنکھوں کا پردہ چمکیلا۔ اور سُرخ۔ (کبھی جگر کی خرابی سے زرد) جسم کا رنگ ٹیلا؛ ہاتھ گرم اور پسینہ زرد۔ سر اور سر کے تالو میں درد۔ اور کبھی کبھی تیک ہوتی ہے، یا کسی چیز سے مارنے کی طرح درد۔ یا زور سے دبانے کی طرح یا بھاری پن کا احساس۔ ہڈیاں رہے یا درہے پیشاب مقدار میں تھوڑا، اور رنگت سُرخ تیز روشنی، اور تیز آواز برداشت نہ ہو،

شریانی یا فاعلیہ اجتماع الدم کے علامات نمودار ہوا کرتے ہیں۔ دل کے فعل کا تیز ہو جانا۔ دموی مزاج والوں کو اچھی غذا رہنے پر بھی حسب ضرورت سخت نہ کرنا۔ یکا یک کسی مزمن جلدی بیماری کا دپ جانا۔ مزمن زخم کا یکا یک اچھا ہو جانا۔ یکا یک پسینہ بند ہو جانا۔ یکا یک جریانی (جیسے ماہواری یا بواسیر خون کا جریان ہونا یا رگ جانا۔ شدید تقرسن و صج مقاصل کی تیز حالت میں تقرسن کے درد کا یکا یک رگ جانا۔ بہت شراب پینے کی وجہ سے "دماغ میں شریانی یا فاعلیہ اجتماع خون ہوتا کہ" علاج

بالعموم بیلا ڈونا $\times 3$ ۔ ۳۔ فائدہ کرتا ہے۔

بیلا ڈونا ۳۔ چہرہ اور آنکھیں سُرخ، کپڑے سے ڈھکے جسم میں پسینہ نہ دیا، آنکھوں کی پتلی پھیلی ہوئی وغیرہ، خون کی زیادتی کے معمولی علامات ہیں۔ (اور پچوں کی زیادتی خون کی اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔)

ایکون $\times 3$ سردی لگنا یا تیز دماغی جذبہ سے پیدا ہوئے زیادتی خون کے ساتھ بخار۔ گلوٹائن ۳۔ (تیز ٹنک) دھوپ یا گرمی لگے۔ یا ماہواری بند ہو جانے کی وجہ سے زیادتی خون ہونے پر، بخار کا آ جانا۔ ورائٹم در $\times 3$ ۔ (بخار کے ساتھ سرگرم، چہرہ اور آنکھیں

سُرخ: گردن کے پیچھے سے سر تک درد: آنکھوں کی پتلی پھیلی ہوئی؛ اور درد کھائی دینا: سر بھاری۔ چہرہ کے عضلہ کا پتھر کتنا وغیرہ۔

گرم ایٹیکم ۳۔ دانتوں کا بیٹھ جانا۔ یا دانت نکلنے کی وجہ سے زیادتی خون میں۔ دماغ کے بہت زیادہ زیادتی، خون کی مخصوص دوا ہے۔ مرض کو بہتر سے نہ اٹھنا چاہیے۔ جسمانی اور محنت دماغی جذبات سے بچنا چاہیے۔ پتلی چیزیں پینا اور سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف رکھنا چاہیے۔

(ب) اجتماع الدم حالیہ

روز کچھ نہ کچھ درد سر۔ مزاج پڑ پڑا۔ سر میں خرابی۔ سستی۔ دل کمزور: نسوں میں آہستہ آہستہ خون چلنا۔ چہرہ، دل اداس، اور پریشان، (پچھے سُرخ) ہاتھ ٹھنڈے یا پسینہ سے تر۔ آنکھوں میں چمک کی کمی۔ اور بے رونقی۔ مرضیہ اپنے سر میں، سر کے تالو میں، یا سر کے پچھلے حصہ میں ہمیشہ ہاتھ رکھے۔ (مرضیہ کہتی ہو کہ اس کا "سر بہت گرم ہے۔ لیکن کسی دوسرے کے ہاتھ لگانے پر بالکل ہی گرم نہ محسوس ہوتا ہو)۔ سر بھاری۔ عقل ذرا ابل ہوئی جائے۔ تنہا اور خاموش رہنے کی خواہش۔ ہلکی روشنی یا آہستہ گانا بجانا بھی ناگوار گذرے۔ قے یا متلی۔ کبھی کبھی درد سر سے بے چین ہو کر رونا۔ وغیرہ اس کے خاص علامات ہیں۔

دل کے فعل کا کمزور ہونا۔ بہت عرصہ تک جربان، کثرت مباشرت بہت دنوں تک دل کی تکلیف متواتر دماغی محنت، مرض سوء مزاجی (جیسے گرمی، دق، سرطان، پیتھیا زلالی، وجع مفاصلی، تقرس، بہت دنوں تک بخار، یا گرم میں مبتلا رہنا، صفراء کی زیادتی، بد ہضمی وغیرہ کے اسباب سے دماغ میں اجتماع الدم حالیہ ہوتا ہے۔

علاج

جلسیم 'X'، ۳۔ شدید حالت میں سب سے بہترین دوا ہے۔
فرمن حالت: میں سلفر ۳ سے فائدہ ہوتا ہے، جلس ۳-X (دوران سر)

ایسا محسوس ہو جیسا سر کے چاروں طرف کسی سر کو کس کر باندھ دیا ہے۔
دل کو کیسو نہ کرنا۔ ایک کے دو دیکھنا۔ اوپیم ۳۰۔ ۳۰ دگری نیند، قبض،
اور دباؤ محسوس ہونا، خراٹے بھرنا وغیرہ۔

دماغی تھکاوٹ

(BRAIN FAG)

جب بہت زیادہ دماغی محنت کی وجہ سے دماغ میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اسی کا نام دماغی تھکاوٹ ہے۔
اعصاب کی تھکاوٹ میں ایسٹھاس ۳ x، بہت نکلین۔ ایسڈ پیکرک ۳۔
یادداشت کی کمزوری اور ذہن کا کند ہو جانا۔ زنک پیٹا لیکم ۶۔ یا زنک
پیکرک ۳۰۔ یادداشت کا زائل ہو جانا (خاص کر امتحان دینے کے وقت)
آٹھو زاسو۔ انارڈی ایم ۳۰۔ تیز بیماری یا امورات خانگی سے گھبرا جانے سے
اگر دماغ کمزور ہو جائے۔ کلکیر یا فاس ۶ x۔ سفوف۔
مزمن درد سر۔ بہت محنت کرنے کے بعد قوت یادداشت کا کم ہو جانا۔
اعصاب کی کمزوری۔ کھٹنڈک سے علامات کا بڑھ جانا۔ اور گرمی میں کم
ہو جانا وغیرہ علامات میں سلیکا ۶۔

درد سر

(HEADACHE)

درد سر اکثر دوسرے امراض کی علامت ہے۔ اعصابی درد سر اور
رگوں میں تپکن ہوتی ہے۔ سر میں تیز درد، بھوک نہ لگنا۔ ذائقہ نہ محسوس
ہونا۔ تے متلی وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔
زیادہ چائے یا کافی پینا۔ میریا۔ درد دانت۔ بہت شراب پینا۔
دھوپ میں کھومنا۔ ڈرنا۔ جسم یا دماغ کی تھکاوٹ، خیالات بد۔ نیند نہ
آنا۔ اور معدہ کی خرابی سے یہ مرض ہوتا ہے۔
اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ثابت ہوئی ہیں۔

شدید حملہ میں

نکس و امیکا۔ سر میں انجی د خون کی وجہ سے سر درد کے ساتھ دوران سر اور قبض۔ بل۔ چہرہ سرخ۔ آنکھیں بڑی معلوم ہونا۔ برائی ادنیٰ۔ تلخ تے۔ سرد۔ گویا سر بھٹا جاتا ہو۔ کالیوس دتے یا مثلی کی وجہ سے درد سر؛ حقوڑا پانی یا کھانکنا، ورائٹم الب۔

دتے کی وجہ سے سر درد کے ساتھ شستی اور سرد پسینہ کا خیال۔ اعصابی درد کے ساتھ نیند نہ آنا۔ سسی سسی فیوگا۔ عورتوں کو سپر یا کا وجہ سے درد سر (خافکر ماہواری میں خرابی کی علامت میں) ایکونائٹ۔ سردی کے ساتھ درد سر ہونے میں؛ دوران خون کی خرابی میں آکرس۔ ورس کیولم۔ درد سر کے ساتھ صفراوی تے ہونے کی حالت میں مفید ہے۔ (۲) مزمن درد سر میں

سلفر۔ کلیر یا کارب۔ نیٹرم میوور۔ چینی نم سلف سو X۔ ۳۔ کیلی بائی کارب سیپا۔ کیلی کارب۔ سنگو نیر یا نکس و امیکا۔ آر سے نکم البم؛ کالیوس؛ رنگم۔ اعصابی کمزوری میں؛ یہ سب دوا میں ۶ سے ۳۰ تک فائدہ کرتی ہیں۔

چند خاص دواؤں کے علامات

ایکونائٹ ۶۔ ۳۰۔ دوران خون سے پیدا ہوئے درد سر میں؛ خوفناک درد سر۔ ایسا محسوس ہونا گویا سر کے اندر کی کل چیزیں باہر نکل جا رہی ہیں۔ آدھے سر کا درد۔ کبھی کبھی سر اور کنپٹی میں درد۔ یہاں تک کہ آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ حرکت کرنے، سر جھکانے سے سر درد کا بڑھنا۔ ۱۰۔ آرام کے وقت کم ہونا۔ سرد، خشک ہوا لگنے کے بعد سرد درد کا نمودار ہونا۔ بیلاڈونا ۶۔ ۳۰۔ سر میں تپکن کی طرح؛ روشنی یا کوئی آواز مریض برداشت نہ کر سکتا ہو؛ یکایک شروع اور بند ہوتا ہوتا ہو۔ میلی لوٹس ۱ X۔ اجتماع خون سے پیدا ہوا تیز درد؛ گویا مری

بٹھا جاتا ہے۔ درد سر سے مریض پریشان ہو کر دیوار یا زمین پر سر ٹپکنے۔ یا
پانگلوں کی طرح بکنا شروع کر دے تو اس دوا کے ایک دو روز استعمال کرنے سے
قائدہ ہوتا ہے۔ (نصف گھنٹہ کے وقفہ سے سیلی ٹوٹس مڈرنکچر کے دس
قطرے فی خوراک کے حساب سے استعمال کرنا چاہئے۔)

جلسیم ۳۔ درد سر کی وجہ سے مریض کو چاروں طرف اندھیرا دکھائی دے،
کروٹیلکس ۶۔ درد سر کی وجہ سے مریض خاموش رہے یا لنگڑا کر چلتا
ہو دینے زور سے ٹہن۔ کچھ بڑبڑاتے ہوئے گھومنا۔

اگنیشیا ۳۔ ۶۔ ۱۲۔ گھبراہٹ۔ چڑچڑاپن۔ یاد دہانی جذبہ کی وجہ
سے درد سر۔ نہایت غم کی وجہ سے درد سر۔ مریض سہڑیا کے درد سر میں
نہایت مفید ہے۔ سر میں میخ کھونکنے کی طرح درد ہو۔
نائٹرک الیڈ۔

لگنیشیا فاس ۲، ۱۲، ۱۸۔ سفوف (گرم پانی کے ساتھ استعمال
کرنا چاہئے) ناقابل برداشت درد سر۔ ایک طرف سے دوسری جگہ
سٹ جاتا ہو۔ کبھی کبھی بند ہو کر پھر شروع ہو جائے۔

آرنیکا ۶۔ ۱۲۔ اجتماع خون، یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے درد سر،
آنکھوں کی پلک کا بھاری معلوم ہونا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس
ہونا۔ آنکھ سرخ۔ آنکھوں میں جلن۔ سر کا گرم رہنا۔ سر، گردن
اور کینٹی کی رگوں کا پھڑکنے اور اونچی آواز، روشنی، حرکت اور
سونے سے مرض کی ترقی۔ اور خاموش بیٹھنے سے کم معلوم ہونا۔
گر جانے کی وجہ سے مزمن درد سر۔

ہیرالونیا ۳۔ ۶۔ ۱۲۔ ۳۰۔ اجتماع خون اور وجع مفاصل
کی وجہ سے درد سر، حرکت سے بڑھتا۔ دوران۔ سر زیادہ بھاری محسوس
ہونا۔ سر جھکانے سے ایسا محسوس ہو گا یا سب کی سب چیزیں نکل
آویں گی۔ سر اور کینٹی میں درد۔ دبانے سے یہ درد کم ہو جاتا ہو؛
نیم سر درد (خاص کر داہنے طرف) بار بار ڈکار اور پیٹ گاتے ہوتا؛

درد سر کے بعد ناک سے خون گرتا۔ کھوپڑی کے اگلے حصہ میں درد سر گویا بچھا جاتا ہے۔ ایسے علامات میں براہِ یوتیا ۳۰۔ کے استعمال سے اثر فائدہ ہوا ہے۔

کلکیر یا کارب ۳۰۔ بہت دماغی فکر کی وجہ سے درد سر۔ سر میں زور کا درد۔ بالخصوص صبح کے وقت درد کا بڑھنا۔ جسم کے بالائی حصہ میں کثرت سے پسینہ آئے۔ خالی پیٹ رہنے پر ڈکار آنا۔ اور دماغ ٹھنڈا محسوس ہونا۔ نیم سر درد۔ چائنا ۶-۱۲۔ کان میں گن گن کی آواز۔ سرخ چہرہ۔ جسم کمزور۔ بار بار جانی آنا۔

لیلیئم ٹنگ ۶-۔ کلی سر کے اوپر درد محسوس ہونا۔ دونوں ہاتھوں سے بکڑے رہنے کی خواہش۔ بالکھوپڑی سے لیکر سر کے پچھلے حصہ تک درد۔ صبح اسہال کے ساتھ سر میں بھاری پون۔ مہواری کی خرابی سے درد سر کھلی ہوا میں سر درد بڑھنا۔ اور غروب آفتاب کے وقت کم ہونا۔

نکس و امکا ۶-۱۲-۳۰۔ دورانِ سر کھوپڑی، اور کینٹی کی رگوں کا پھٹنا۔ پھٹنے کی طرح کا درد۔ تھمتلی۔ قبض۔ غذا کے بعد۔ دماغی محنت کے بعد۔ اور سر جھکانے پر درد کا بڑھنا۔ طاقت و ریاضت و موسمی مزاج والوں کا درد سر۔ آدھے سر کا درد۔ صبح شروع ہوتا ہے اور بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور شام کو کم ہو جاتا ہے۔ ترشش اور صفراوی تھے۔ معدہ کی خرابی کی وجہ سے یا بواسیر کی وجہ سے درد سر اور شراپیوں کے درد سر میں یہ دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔

پلسا ٹیلا ۳-۶-۱۲۔ ہاضمہ کے فعل کے فتور کی وجہ سے مزمن چیزوں کے زیادہ کھانے کے بعد ہی درد سر۔ عورتوں کے آلات تناسل کے فعل میں خرابی ہو جانے کی وجہ سے درد سر۔ ایک طرف کے کان کے پیچھے درد محسوس ہو۔ گویا کانٹا گڑ رہا ہے۔

فاسفورک الیٹر ۶-۱۲-۳۰۔ اعصابی کمزوری مادی قوتِ باہ کی کمزوری کی وجہ سے دماغ اور گلے کے پیچھے درد۔ یا زداشت کا کم ہونا۔ قوتِ بینائی کم ہو جانا اور کان سے کم سُنا۔

سلا ۶ - ۱۱ - یا ۳۰ - تیز درد کی وجہ سے عقل جاتی رہنا - صبح کے وقت جاڑا محسوس ہونا - اور متلی کے ساتھ دبانے کی طرح درد سر کے ایک طرف ہٹ جانے کی طرح درد - آنکھ کے اوپر درد یہاں تک کہ دیکھنا نہ جائے۔
سیا ۶ - ۱۲ - ۳۰ - دماغ میں بوجھ اور چپکنے کی طرح درد - ماہواری کی خرابی کی وجہ سے متلی کے ساتھ سر درد - قبض - دائیں یا بائیں آنکھ کے اوپر والے حصہ میں درد کے علامات -

اے - بی - نگس ۳ - عورتوں کو متلی کے ساتھ درد سر - گھومنے یا بہت محنت کرنے کی وجہ سے سر درد -

ارجلٹم نائٹرکیم ۶ - سر گھومنا - سر کے اندر درد، کپڑے باندھنے سے کم ہونا -

یکیم ۶ - معدہ کی سختی سے پیدا ہوا زمن - درد سر -

فلانڈرکیم ۳ - سر کے تالو میں درد، گویا اس پر کوئی بھاری چیز رکھی ہے -
سمی سی فیکو کا ۳ - اعصابی وجہ مفصل یا خرابی حیض کی وجہ سے درد سر - سر اور آنکھوں میں تیز درد - حرکت سے درد کا بڑھنا - کھوپڑی سے لیکر پشت تک آنکھوں کی تیلیوں کا پھیل جانا - ہڈیاں اور لنگر کی خرابی - دہلی - تپلی مریضہ ہسپتال کو تھے کے ساتھ درد - شرابی اور طالب علموں کا درد سر - نیند نہ آنا -

سائیکلک من ۳ - تیز درد سر - آنکھوں کے سامنے رنگ برنگی چیزیں چلتی پھرتی نظر آئیں - صبح اور ماہواری کے وقت مرض کا بڑھنا -

آکرسس والرسیکلر ۳ - تے یا متلی کے ساتھ دائیں جانب درد، خاص کر جگر کی خرابی - اور بہت بڑھنے کی وجہ سے ہو -

کیلی بائی کروم ۶ - ایک آنکھ کے فاعلکرومیں آنکھ کے ٹھیک اوپر کے حصہ میں درد - درد کی جگہ انگلی کے ایک سرے کے نیچے آجائے -

اسپائی جلیا ۳۰ - کھوپڑی کے سامنے نوچنے کی طرح درد - آنکھوں تک پھیلا ہوا ہوا، حرکت سے درد کا بڑھنا اور اس کے ساتھ ہی سینہ کا دھڑکنا اور پیٹنی لہجہ سے

دیار کھٹنے پر درد کا کم ہونا۔ نصف جانب درد، طلوع آفتاب کے وقت درد کا شروع ہونا۔ اور دو پہر تک آہستہ آہستہ بڑھنا۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہو کر غروب آفتاب تک جاتے رہنا۔

سنگوئیر یا ۳۰-۳۰۔ دن میں (یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک) سر میں درد، نیم سر۔ خاص کر دائیں طرف، ہر ساتویں روز درد سرا خون نکلنے کے وقت درد سر۔

کیونٹنس ورجیکا ۱۰۔ مستی کے ساتھ یا صفا وی درد سر۔ پانچ۔ دس۔ پندرہ منٹ کا وقفہ دے کر وقت مقررہ پر آنے والے درد سر میں یہ ذوا فائدہ کرتی ہے۔

گلوٹامین ۳۰۔ دھوپ یا آگ کی گرمی کی وجہ سے درد سر۔ کلرک! اخبار کے رپورٹر، کمپوزیٹر وغیرہ۔ (جن کو گیس یا بجلی کے بچے روشنی میں ہمیشہ کام کرنا پڑتا ہے) کے سر میں درد میں بالخصوص یہ دوا مفید اور کارآمد ہے۔

سلفر ۶-۱۲-۳۰۔ سر میں یا کان کے پیچھے ٹپکن کا درد سر، سر کے بالائی حصہ میں گرمی، صبح اسہال، یو اسیر سے اخراج خون کے رک جانے سے دماغ میں اجتماع خون کی وجہ سے درد یا دوران سر۔

ورینٹم ورس ۳-۴-۳۰۔ مریبھرا اور بوجھل کل رنگوں کا بچڑکنا، بیہوشی کان میں بھون بھون کی آواز۔ تے یا مستی کے ساتھ اسہال۔

عناب۔ شروع شروع میں کچھ نہ کھانا اچھا ہے۔ اگر دبانے سے درد میں کمی ہو تو کپڑا (خاص کر گیل کپڑا) سر میں باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں آرام۔ تھوڑی مقدار میں خوب گرم چائے یا کافی پینا کبھی کبھی فائدہ کرتا ہے۔

آدھے سر کا درد۔ ادھائیسی (HEMICRANIA)

معدہ یا اعصاب اکس (SENSORY NERVES) کی خرابی

ڈبوسن ۳۰ x ورٹیرم ورائٹ ۳۰ x۔ ایپیک ۳۰۔ اسٹرکینا ۳۰۔
 ٹروپن ۲۰ x یا ۳۰۔ ہالوسیا مس۔ ہائڈروبرومیٹ ۳۰ x سفوف اور
 کنالینڈیکا ۳۰ x۔ مرض کے حملہ کے وقت اگر تیز درد ہو، تو حلیم الکساکس
 ۳۰ x۔ کیونٹنٹس ۲۰ x۔ اسٹیگنیریا وغیرہ دوائیں فوراً فائدہ کرتی ہیں۔

علاج معاون

تاریک کوٹھری میں سونا۔ اور تیلی چیزیں کھانا چاہئے۔
 ٹھنڈی یا بہت گرم گیلی ٹی سر میں باندھنے یا سرسوں کی گرم پولٹس
 گردن کے نیچے۔ یا بہت گرم گیلی ٹی سر میں باندھنے سے فوراً فائدہ
 ہوتا ہے۔ بروماکٹ اور افیون ملی دوائیں یا جلاب سے نقصان
 ہوتا ہے۔ پشاپ کی دوسری بیماری ہونے میں اس کا علاج کرنے
 سے یہ مرض بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ مرض آلات بول ملاحظہ ہوں۔

سرچکرانا

(VEROTIGO OR GIDDINESS)

مرض دوران سر میں مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ گویا اس کا جسم
 ہل رہا ہے۔ یا اس کے چاروں طرف کی چیزیں گھوم رہی ہیں۔
 یکایک اُٹھ کر کھڑے ہونے پر مریض کی آنکھوں کے سامنے سرسوں کا
 بھول یا اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چکر کھا کے گر پڑتا
 ہے۔ سر میں خون کی کمی، یا اجتماع خون کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔
 بہت بڑھنے یا زیادہ جماع کرنے سے، نشہ، شب بیداری، سر میں
 چوٹ لگنے، بد ہضمی، دماغ، دل یا گردہ کی بیماری، وغیرہ کی وجہ
 سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ سر گھومنا۔ یہ دوسرے امراض کی علامت بھی
 ہے۔ اس لئے اصلی بیماری کا علاج کرنے سے ہی یہ اچھا ہو جاتا ہے۔

علاج

معمولاً سر میں چکر آنے میں حلیم ۳۰۔ مریض کو خود کہ شاید وہ
 پیچھے گر پڑے گا۔ ایسے علامات میں بورکس ۴۔

سونے کے وقت سر میں چکر آنے میں کون نم ۳ یا نیٹرم میور ۶۔ تلی کی وجہ سے
سر میں چکر آنے میں کیو رگس ۳۳۔ بھرے پن کے ساتھ دوران سر اور کان
میں مختلف آواز آنے کی علامت میں جانا ۳۔ یا نیٹرم سلی سل ۳۔
نید کے بعد دوران سر ہو تو ٹیکس ۶۔

۱۱ اعصابی دوران سر۔ دماغ کے بہت مرضوں کی وجہ سے خاص کر
چوڑا ہونا۔ دوران سر۔ کافی ۶۔ ٹکس ماسکٹا ۱۲۔ اگنیا ۳۔
زخم ۳۔ ۶۔ تقریبین ۳۔ قے یا متلی کی وجہ سے دوران سر۔
چلنے پھرنے یا آنکھیں بند کرنے سے بڑھنا۔ امبر ۳۔
(۲) آنکھوں کے درد کی وجہ سے دوران سر۔ بہت دیر تک آنکھیں کھلی
رہنے یا پھیلنے سے۔ تکان کی وجہ سے سر میں درد ہو، توروٹا۔ ۱۔ ۳۔
آنکھوں کی چلیاں اور عضلہ سکڑنے پر غائی سوٹنگ ۳۔

(۳) ابران کان کی وجہ سے دوران سر۔ کاسٹیکم ۶۔ جلیسم ۳۔ ۳۰۔
اسٹرامونیم ۳۰۔ ۳۰۔ آنتوں کی خرابی کی وجہ سے ٹکس و امیکا ۲۰۔ ۳۰۔
پلس ۶۔ برالیو نیا ۳۔ (۵) خون کی کمی کی وجہ سے دوران۔ صبح کے وقت
شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں درد سر اکثر نہیں ہوتا۔

غذا کے بعد اکثر دوران سر نہیں ہوتا۔ اور محنت سے زیادہ ہوتا
ہے۔ براٹس کارب ۶۔ لائیو پوٹیم ۱۶۔ یا سلکا ۳۔ اس کے عمدہ دوائیاں ہیں۔
مقوی غذا اور زیادہ محنت نہ کرنا فائدہ مند ہے۔

(۶) خون کی زیادتی کی وجہ سے سر چکرانا۔ تکلیف اکثر صبح ہی شروع
ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ درد سر بھی موجود رہتا ہے۔ غذا کے بعد
سر چکرانا بڑھ جاتا ہے اور محنت کے بعد کم ہو جاتا ہے۔

بیلڈ ونا ۳۰۔ ۳۰۔ ٹکس و امیکا ۳۰۔ آر نکا ۳۰۔ جلیس ۱۲۔ ۳۰۔ گلوٹائین
۳۰۔ کائیوٹس ۳۰۔ نیٹرم میور ۱۲۔ سفوف ۳۰۔ ٹیکس ۶۔ اس کی
اعلیٰ دوائیں ہیں۔ ہلکی غذا اور مقررہ محنت مفید ہے۔ اگر سر جھکانے
سے تکلیف بڑھے تو ٹکس یا کرب ۶۔ ۲۰۰۔ برالیو نیا ۳۰۔ ۳۰۔

یا سیپا ۶۔ ۲۰۰ نہایت مفید و کارآمد ہیں۔

اعصابی کمزوری کی وجہ سے دوران سر۔ فاسفورس ۲۔ الیسنٹس

۳۰-۳۱۔ پائتا ۳۔ زنگم ۶۔ ٹیالیکم ۶۔ حسب علامات مفید و کارآمد ہیں۔

دوران سر سے آگے کی طرف گرنے میں سپائی جلیا ۳۔ ۳۰۔ سائیگوٹا ۶۔

سر میں جکڑ آکر پیچھے کی طرف گرنے میں برائیو نیا ۶۔ ۳۰۔ ٹکس و امکا ۳۰-۳۱۔

رٹاکس ۶۔ ۳۰ دوران سر سے دائیں بائیں گریزے۔

علاج معاون:- جذبہ پیدا کرنے والی اشیاء کھانا منع ہے۔ پاک ہوا میں رہنا۔ گھنٹے پانی سے نہانا۔ زود سہم اور مقوی چیزیں کھانا مناسب ہے۔

تشخ حلقوم

نخرہ کے بالائی حصہ کا نام حلقوم ہے۔ نیند کے شروع میں (خاکر دانت نکلتے وقت) اگر بچے کے حلقوم کا سوراخ بند ہو کر اس کی سانس رکنے کے علامات ہوں تو اس کو تشخ حلقوم کہتے ہیں۔ یہ ایک عصبی مرض ہے۔ آگے تنفس کا مرض یا کھانسی کی بیماری نہیں ہے۔ ناناہل یا دادیہال میں یہ مرض رہتا۔ بچوں کی پٹریوں کا ٹیڑھا ہونا۔ سر دی لگنا۔ سمدہ کی خرابی۔ دانت نکلتے کا وجہ سے سوزش وغیرہ اسباب سے یہ مرض ہوتا ہے۔

(۱) مرض کے حملہ کے وقت کا علاج

ایکون ۱-۲۔ (فشک کھانسی) سانس بند ہو جانے کا ڈر۔ بیل ۳-۴ یا جلیس ۴-۶ (تشخ ہونے پر) اپیک ۳-۴ کف بڑھنے پر کیوپر ٹیالیکم ۶۔ (تشخ زیادہ ہو) ہر مرض کی تیزی کے مطابق یہ دوائیں دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے دینا چاہیے۔

(۲) مرض کی تیزی کم ہونے پر

فاسفورس ۳۔ (کھانسی کے ساتھ درد سینہ) سپینیا ۱-۲۔ ۳۰-۳۱۔

(فشک سخت کھانسی) یہ سب ہی دوائیں تین چار گھنٹے کے وقفہ سے دینا چاہیے۔ زیادہ مال کے لئے امراض اطفال میں حلقوم کا بڑھنا ملاحظہ ہو۔

(SLEEPLESSNESS)

نیند نہ آنا

یہ بھی اکثر دوسرے مرض کی علامت ہے۔ سر میں خون کی زیادتی اور پیٹ سرد ہونا۔ بہت کھانا۔ قاتہ۔ بہت چائے یا کافی پینا۔ قبض۔ دماغی جذبہ۔ تفکرات وغیرہ اسباب سے نیند نہیں آتی۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید کارآمد ہیں۔
کافیا۔ ۶۔ ۳۰۔ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ خاص کر جب کسی وجہ سے دل میں جوش ہو۔
اگنیشیا۔ ۳۔ ۳۰۔ تکلیف تردد، وغیرہ کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو۔ متواتر چونکنے کی وجہ سے نیند میں خلل ہو۔

کیوملا۔ ۱۲۔ دانت ٹککنے کے وقت بچہ کو نیند نہ آئے۔
بیلڈونا۔ ۳۔ کیوملا سے اگر فائدہ نہ ہو۔ نکس و امیکا۔ ۶۔ ۳۰۔
رات کے دو تین بجے نیند کھل جائے۔ پھر بہت دیر تک نیند نہ آئے۔ بعد کو آوے۔ بہت کھانے یا قبض کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو۔ پڑھنے یا شہ پینے۔ بدبھمی یا کرم کی وجہ سے فرابی۔ ورائٹرم الب۔ ۳۰۔ خوف۔

لائیکولوپڈیم۔ ۳۰۔ دوپہر کے وقت غذا کے بعد ہی نیند نہ روک سکتا۔
جاگتے ہی بہت نستی محسوس ہوتا۔ کاکیلوس۔ ۳۰۔ آنکھیں بند ہوتے ہی بڑے خواب دیکھنا۔ نیند کی خواہش۔ ٹکرسو تے میں ڈرتا ہو۔

امبراگریشیا۔ ۳۰۔ کاروبار کے تفکرات کی وجہ سے نیند نہ آنا۔

پلساٹیلہ۔ ۶۔ ۳۰۔ رات کے کچھلے حصہ میں نیند نہ آوے۔

سائنٹا۔ ۸۲۔ ۲۰۰۔ کرم کی وجہ سے نیند نہ آوے۔

آرم۔ ۶۔ یا نائٹسٹک الیڈ۔ ۶۔ گرمی یا پارہ کھانے کی وجہ سے نیند نہ آنا۔
چائنا۔ ۶۔ ۳۰۔ جریان خون یا اسہال کی کمزوری کی وجہ سے نیند نہ آنا چاہیے۔ پینے سے بے خوابی ایسی حالتوں میں خاص کر مفید ہے۔

نکس۔ ۶۔ ۳۰۔ نیند کھلنے کے بعد ہی کسی مرض کا بڑھنا۔
اونیا سیوا مدر ٹینکچر (فی خوراک ۳-۵۔ پوند) نیند نہ آنے کی

خاص وجہ نہ معلوم نہ ہو۔

پیشی فلورائٹکا رنٹیا :- نیند نہ آنے کی اعلیٰ دوا ہے۔ فی خوراک مدر پچرا ایک قطرہ سے تیس قطرہ تک دینا پورے ایک صاحب کو دس برس تک نیند نہ آئی۔ ایک مہرودھم کے دوا غلنے اس کتاب کو دیکھ کر یہ دوا دی اور اسی دوا کو استعمال کرنے سے ان کو آرام سے نیند آنے لگی۔ اور تب سے ان کا مرض بخوابی بالکل جاتا رہا۔ ایکو نائٹ :- بچپنی کی وجہ سے نیند نہ آنا۔ اوپیم، سائی پری پیڈیم، فاسفورس

(ڈبرھاپے میں نیند نہ آنا) سیپا ۱۲۔ اور سی سی فیکو کا ۳۰۔ دھورلوق کے پٹرو کی خرابی سے بے خوابی، فیرم فاسفوریکم ۶۔ اور کھو جا ۶۔ (چائے پینے اور کی خون کمی وجہ سے نیند نہ آنا، کیلی بروٹیم، آر سے مکمل کیلی آیوڈ کی میفر وغیرہ دوائیں علامات کے موافق دینا چاہئے۔ اجتماع خون کی وجہ سے بے خوابی میں فیرم فاس ۳۰ بہت دنوں تک استعمال کرتا چاہئے۔ سلفر ۳۰۔ خامکر رات میں دو بجے سے ۵ بجے تک، نیند نہ آتی ہو۔ پیشی فلورائٹ کے علاوہ بے خوابی کی سب دوائیں معمولاً ادنیٰ طاقت میں دی جاتی ہیں۔

نہیر محاور

سونے سے پہلے منہ سرگردن کا پکھلا حصہ۔ کان اور دونوں پیر ٹھنڈے پانی سے دھو ڈالنا چاہئے۔ اور کیلے کیڑے، یا گرم پانی سے تام جسم پونچھ ڈالنا چاہئے۔ یا تھوڑی دیر تک ٹھنڈی ہوا میں ٹھونا چاہئے۔ اس سے خوب نیند آئے گی۔

غن اکھانا۔ نشہ پینا۔ یا خوب ادنیٰ تکیہ پر سر رکھ کر سونا منع ہے۔

(SLEEPING - SICKNESS)

نیند کی زیادتی

یہ گرم ممالک کا ایک مرض ہے۔ اس خوفناک مرض نے افریقہ کے چند مقامات کو انسانوں سے خالی کر دیا ہے۔ اس ملک میں کبھی بھی مرض نواں دالے مرض ملتے ہیں۔ ایک کبھی موسوم بہ گلو سینا کے کاٹنے کا وجہ سے شروع میں بخار، لاغری، سستی، تلی کا بڑھنا۔ ناک اور

گال کا پھولنا۔ ہاتھ و پیر میں کپکپی۔ آواز بلند وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گہری نیند آتی ہے اور آغوش موت ہو جاتی ہے۔ اس مرض کی پہلی علامت یہ ہے کہ مریض چند دنوں تک مُردے کی طرح پڑا رہتا ہے۔ اس وقت بات کا پتہ رگنا شکل ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا کہ مُردہ۔ بہت لوگوں کا بیان ہے کہ یہ ایک خاص طرح کا لیریا بخار ہے۔ کبھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ پھیلتا ہے۔ اسی لئے فنگل ٹیبا ٹری صاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔

حفظ مالِ مقدم :- اگر ایسا انتظام کیا جائے کہ لگو سینا ٹکٹی کاٹنے نہ پائے تو اس مرض سے نجات مل سکتی ہے۔

علاج

اس مرض کا پتہ چلتے ہی آر سنگ $x2$ یا انٹیم مارٹ (x3) سفوف دینا چاہئے۔ اگر اس دوا سے فائدہ نہ ہو تو کلورل پاڈریٹ $x2$ ۔ تین چار گھنٹہ کا وقفہ دیکر استعمال کرنا چاہئے ایک دو ہفتہ کھانے کے بعد اگر فائدہ نہ ہو تو $x3$ کے عوض $x4$ دینا چاہئے۔ پورا مائدہ ظاہر ہونے پر دوبارہ دینا چاہئے۔ کلورل سے اگر فائدہ نہ ہو تو حسب علامات ادپیٹم۔ ٹیکس ماسکیٹا۔ اے لپس آر سنگ، ہلی بوریس، ٹیکس، ناچا، کیلا بروم، اسکس، سلفوڈین۔ یہ نہایت مفید اور کارآمد ثابت ہوئے۔

۱۹۳۲ء کو روٹر کے تاریں حسب ذیل اشاعت ہوئی تھی۔
کہ فرانس، انگلینڈ، سوئزر لینڈ، اور کنڈا میں بچکی کے ساتھ ایک قسم کی گہری نیند (SLEEPING HICCUGHS) نام کا ایک

خوفناک مرض نمودار ہوا ہے۔ اس کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے۔ اس لئے ایلو پیٹھک ڈاکٹر اس کی دوا دے کہ اچھا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم لوگوں کو ناامید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اچھا میٹر یا مسیڈیکا لے کر اس کی مدد سے جن دواؤں سے مرض کی کثرت علامات ملتے ہوں وہی

دوا انتہی بکر کے مریض کو دینا چاہیے۔ اس سے مریض کو بہت فائدہ ہونگی امید ہے۔

(NIGHT MARE)

خواب میں ڈرنا

بد ہضمی: بستر پر ایسی حالت میں سو جانا۔ رات کے وقت بہت کھا جانا۔ بچوں کے حلقوم کا بڑھنا وغیرہ۔ اسباب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

سینہ پر گویا کوئی بھاری چیز رکھی ہے۔ ایسی تکلیف دینے والے خواب کو خواب میں ڈرنے کا مرض کہتے ہیں۔ خواب کی حالت میں مریض کو حرکت کرنے یا بولنے کی طاقت نہیں رہتی۔ چیخ کر نیند کھل جانے پر مریض کو آرام محسوس ہوتا ہے۔

علاج

کیلی بروٹیم X- (یا پی اوینا ۳ X) سونے سے کچھ سہ پہلے استعمال کرانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ غذا کا خوراقی سے مرض س داما کا ۶۔ چائنا ۳ (سینہ پر دباؤ) بوجھ محسوس ہونے پر، سفر ۳۰ کلیمچ (ڈھکنا)، اجتماع خون سے بیماری ہونے کی وجہ سے: فیروم فاس ۶ X- یا ایکونائٹ ۳۰۔ بہت زیادہ کھانا۔ محرک غذا کھانا پینا۔ اور چیت سونا ترک کر دیتا ہے۔ مکان کے باہر کھیلنا یا جسم دباتا مفید ہے۔

ہسٹیریا

(HYSTERIA)

باؤ گولہ جس کا ذکر آلیور ویڈ میں آیا ہے۔ وہ اربسٹریا ایک ہی بیماری نہیں ہے۔ گو کہ دونوں میں بہت کچھ مشابہت ہے۔

نظام اعصاب کی خلل کی وجہ سے نمونہ یہ مرض ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پیٹ بھولنا۔ تکلیف دینے والی ڈکار۔ یا ہچکی۔ تیز سانس میں تکلیف۔ اور سانس لینے اور نکالنے میں زور کی آواز۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ پیشاب بند۔ آواز بند۔ پیٹ سے گلے تک گولے کی طرح چیز بڑھتے ظاہر ہونا۔ سر میں درد۔ وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہسٹیریا میں ایک بارگی عقل زائل نہیں ہوتی۔ بہت سی جگہوں میں رم یا خصیۃ الرحم کی وجہ سے یہ بیماری

ہوتی ہے۔ جو ان عورتوں میں کبھی کبھی مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔

علاج

بے ہوشی کے وقت کیفریا ماسکس یا ایونیا۔ ناک کے پاس رکھنے پر ماسکس ۳۔ استعمال کرانے سے، مریض جلد ہی ہوش میں آجاتا ہے۔ اچھی حالت میں مندرجہ ذیل دوائیں دینے سے مرض دور ہو سکتا ہے۔

مریض ہمیشہ اداس، بے چین رہے، وقت مقررہ میں عرصہ تک میض کا خون جاری ہو، یا ایک بارگی میض بند ہو کر رحم میں انجماد خون کا وجہ سے ہسٹریا ہو، تو پلاٹینیٹا ۶۔ ۳۰۔ (جو عورتیں ہمیشہ اپنی تکلیف دوسروں سے کہا کرتی ہیں۔ ان کو پلاٹینیٹا سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے)

پیٹ سے گلے تک گولہ اٹھتا محسوس ہو۔ اسی کے ساتھ سانس رکٹی ہو، تھوک نہ نکل سکے۔ اینٹھن یا شنج۔ سر کا بالائی حصہ گرم۔ آنکھوں میں پانی بھرانا۔ ایک مرتبہ فوشی۔ ذرا بات رنج کی علامات میں اگنیشیا۔

۶۔ ۳۰۔ (جو عورتیں اپنے دل کا حال پوشیدہ رکھتی ہیں۔ ان کے لئے اگنیشیا زیادہ کار آمد ہے۔

پیٹ سے گلے تک گولہ اٹھنا اچھو طرح مظلوم ہو، سانس میں تکلیف ہو کر نفخ شکم ہو۔ اسے علامات میں اسافوٹیڈا ۶۔ ماہواری بند ہونے یا ماہواری کے درد کی وجہ سے ہسٹریا ہونے میں پلساٹیڈا ۶۔ ساٹنا ۶۔ سلکا ۳۰۔

یا کایوولس ۶۔ رحم کی خرابی سے ہسٹریا ہونے میں دمانی بے چینی۔ تیرکا، تا امیدی۔ یا این بگل میں یا بائیں پستان کے نیچے درد۔ سمی سی فینوگا ۳۰۔ بے ہوشی کے وقت ہڈیاں۔ اور بے ہوشی نہ رہنے کے وقت بہت

قسم کی بیماری نمودار ہونے پر وے ری آتا۔ درد زیادہ پیشاب۔ آواز بھیجی ہوئی۔ اداسی وغیرہ علامات میں کاسٹیکم ۶۔ بیلاڈونا ۶۔

نکس و امیکا ۳۰۔ کیو ملا ۶۔ کنابس انڈیکا ۳۰۔ کافی ۶۔ نکس موسکاٹا ۳۰۔ ۴۔ ہالیوسیا مس ۶۔ آرم ٹیالیکم ۶۔ ٹیرنڈون

۶۔ اور زنگم فاس ۳۰۔ درمیان دینا چاہیے۔

ہسٹریا کائٹ (دورہ) ہوتے ہی مریضہ کا کپڑا ڈھیلا اور منہ پر ٹھنڈے پانی کا چھٹا دینا چاہئے۔ اس کے بعد کچھ ہمدردی نہ رکھیں۔ زیادہ پیشاب ہونے پر مرض آپ ہی آپ کم ہو جاتا ہے۔ اس نئے مریضہ کو بار بار پیشاب کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہئے۔

”مرض مائخولیا غشی، ہسٹریا (اختناق الرحم ملاحظہ ہو) ہسٹریا کے مریض کو ٹھنڈی جگہ میں رہنا اچھا ہے۔ کاشی وغیرہ جگہیں اچھی ہیں۔

سکتہ

(APDPLEXY)

اچھی خاصی حالت میں چلنے پھرنے کے وقت یکایک گر کر بالکل یا کچھ بیہوش ہو جانے کو سکتہ کہتے ہیں۔ اس مرض کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں۔

- (۱) دماغ میں خون لے جانے والی رگوں میں خون زیادہ ہو جانا۔
- (۲) دماغ کی نسیں بن میں خون کا دوران ہوتا ہے۔ کٹ جانے سے خون نکلنا۔
- (۳) یا ایک ترم میں پانی جمع ہونے کے سبب یہ مرض بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی یکایک شروع ہوتا ہے۔ مریض اچھا اور تندرست ہے۔
- یکایک گر پڑا۔ اور ہوش و حواس یا چلنے پھرنے کی طاقت کھو بیٹھا۔ لیکن سانس اور دوران خون کے فعل میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔
- نفس نہایت کمزور یا آنکھوں کی پتیلی پھیلی ہوئی۔ یا ایک پھیلی ہوئی۔ دوسری سکڑی ہوئی۔ یا نصف کمزور یا پورے جسم میں تشنج۔ ایک طرف کا اکڑ جانا۔ وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی مریض کے یکایک بے ہوش ہونے کے پہلے کئی دنوں تک سر جھککنے سے متسلک بنے ہوشی کی طرف رجحان۔ سر میں درد آتی، سر کا بالائی حصہ گرم محسوس ہونا۔ قبض، پیشاب کا وزن مخصوص گھٹ جانا، دل بے چین۔ وغیرہ علامات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے قسم کا بھی مرض سکتا ہوتا ہے (تعف و سحر کے نام سے) سر بھاری۔ ناک سے زور کے ساتھ خون گرنے لگتا۔ گہری نیند نہ آنے لگتی۔ اندر ایک قسم کی آواز محسوس ہونا۔

نبض کمزور یا تیز:۔ کسی حصّہ جسم کا بے قابو ہونا۔ مثلی: چلنے کی طاقت نہ رہنا۔ وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں شراب وغیرہ پینا۔ بہت زیادہ کھانا پینا۔ کندھے پر بھاری چیز کا بوجھ اٹھانا۔ سینہ چوڑا۔ اور گردن چھوٹی، دماغی تفکرات یا تحریک۔ حیض رکنا؛ دل کے فعل کی خرابی، گرنا۔ سر کے کسی حصّہ میں جھٹ لگنا۔ مرض آتشک؛ پیشاب میں البومن ملی ہوئی۔ زیادہ عمر (۴۰ سال کے بعد) میں وجع مفاصل، نقرس، سیسہ کا غلط استعمال وغیرہ اسباب مرض سکتے ہوتا ہے۔ عالم ضعیفی میں بہت زیادہ کھانے پینے؛ یا زیادہ دماغی تحریک گردہ، یا دل کی وجہ سے پیدا ہوا سکتے بہت ہی اندیشہ ناک ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات کار آمد ہیں۔

- (۱) شروع میں نکس و امیکا؛ ایکون؛ بیل، مفید ہیں۔
- (۲) سر سے خون نکلنے کی وجہ سے (لقوہ، وغیرہ علامات میں) ایکون۔ بیلادونا۔ فاسفورس۔ کایکولس، رسٹاکس۔

اس مرض کی کچھ مخصوص دوائیں مندرجہ ذیل ہیں۔

لاروسیرلیس X۔ مرض سکتے کی ایک اعلیٰ دوا ہے۔

خاص کر جب مرض یکا یک شروع ہوئے۔

ایکونائٹ X۔ نادر ہوا میں نبض متلی، تیز، یکساں، جلد گرم، اور خشک، زبان مفلوج ہونے کی وجہ سے بات نہ کر سکے۔ ڈاکٹر سائڈرس نے ایک بے چین 'قرب الگ' مریض کو ایکون ۲۰۰ کھلا کر شفا بخشا ہے۔ آرنیکا؛ بوڑھے آدمیوں کے دماغ میں اجتماع خون؛ بالخصوص

اگر مرض کا سبب گر پڑنا۔ یا جھٹ لگنا ہو تو یہ مفید ہے۔ بیلادونا۔ بے ہوشی۔ آواز نکلنا۔ چہرہ سرخ، اور سوجا ہوا سر اور گلے کی دہیدوں میں جن میں خون کا دورہ ہوتا ہے آماس اور شخ، چہرہ اور ہاتھ پیروں میں شخ۔ آنکھوں تلی پھیلی، پیشاب بند۔

ہیجری میں پیشاب نکل جانا۔ نبض کمزور چلے تو بیلا ڈونا کا استعمال کارآمد ہے۔
برائیاں کا رب ۶۔ ضعیفوں کی۔ میساری میں یازبان ماؤن ہونے
پر۔ یاد اپنے طرف فاتح ہونے۔

ہایوسیا مس ۳X ۶۔ بے خبری سے پیشاب ہو جانے میں۔

ادیم ۶X ۳۔ گہری نیند۔ (بے ہوشی کی طرح) نبض محبتلی؛ سانس۔
میں زور تکی آواز۔ چہرہ میں آماس۔ سیاہی مائل سرخ رنگ۔ نصف
کھلی آنکھیں۔ آنکھوں کی پتلی پھیلی ہوئی؛ ہاتھ پیر ٹھنڈے خون لے
جانیوالے نسوں سے خون بہنا۔ کوئی فائدہ نہ ہونے سے یہ دوا ہر گھنٹہ پر دینا چاہیے۔
نکس دامیکا ۶۔ ۱۲۔ ۲۰۔ سر میں انجماد خون کی وجہ سے سکتے؛ سرے
رطوبت یا خون اخراج ہونے میں بہت غذا؛ شراب پینا۔ رات میں جاگنا۔
کثرت سے کھانا۔ یا کسی اور وجوہات وغیرہ سے سکتے ہوئے۔
گلوتائن ۳۔ دوران سر۔ سر میں سانس اور پیچھے درد۔ متلی روشنی میں مرض بڑھنا۔
سٹرگینیم فاس فوریکا ۲X ۳۔ یہ بھی اس مرض کی اچھی دوا ہے۔

خوراک دوا

سخت حالت میں بتیل بینٹ منٹ کے وقفہ سے دوا دینی چاہیے۔
مرض سکتے کے بعد فاتح ہونے میں کاسٹیکم ۶۔ کپرم ۶۔ کائیوس ۶۔ سلفر ۳۔
پلمہ ۶۔ ۲۰۔ زنم ۶۔ ۱۲۔ فاسفورس ۳؛ آلی ڈری سیلن ۳X ۱۰۔ یا
ایسٹری الین، ۶۔ دینا چاہیے۔
ہائڈروسیانک ایسڈ ۳X ۱۰۔ یا آسج نالی ۶۔ ڈرائیڈ سائیڈ ۶۔
وغیرہ دوائیں بھی پیچ پیچ میں ضروری ہو سکتی ہیں۔ دوا سے زیادہ فائدہ نہ ہونے
سے بجلی کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

علاج معاون

بستر پر پوری طرح آرام کرنا۔ دائمی جذبات ترک کرنا۔ اس کا خیال رکھنا کہ مرض کو بستر
کاظم نہ ہو جائے۔ تھوڑا گرم پانی (۹۵-۹۰) تھوڑا نمک ملا کر ایک دن کا ناغہ
دیکر اس سے نہانا چاہیے۔ شروع حالت میں بجلی کا استعمال۔ ایک

ماہ بعد جسم و ہاتھ پیر دینا چاہیے
 غلہ، مٹھائی، دودھ، تازہ میچلی کا شوربہ مفید غذا ہے۔ چائے،
 کافی، شراب وغیرہ اشیاء محرمہ اور گوشت، یا گھی یا گرم مصالحہ کی بنی چیزیں
 کھانا منع ہے۔ مرض کی شدید حالت میں۔ یا بے ہوشی ہوتے ہی مریض کو بڑے
 کمرے میں لے جا کر بستر پر سلا دینا چاہیے۔ تنکیر پر سدا کھ دینا چاہیے۔
 اور گرم کپڑے اُتار دینا چاہیے۔ بعدہ گرم پانی میں کپڑا بھگو کر،
 اور نچوڑ کر ہاتھ پر سینک دینا چاہیے اور پیٹ پر رانی کی پٹی باندھنا
 ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایکونائٹ، بیل، یا بیلا ڈونا یا اویم (علامات
 کے مطابق) استعمال کرنا چاہیے۔ (مرض کی شدید حالت میں) ہاتھ و پیر
 ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی سے سینکنا چاہیے۔
 سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی باندھنا اور کپڑا جو مریض پہنے ہو
 ڈھیلے کر دینا چاہیے۔ مریض کے قریب صاف ہوا کی آمد و رفت میں کچھ
 خلل نہ ڈالنا چاہیے۔ (بیان کو لگتا ملاحظہ ہو۔)

مرگی۔ صرع (EPILEPSY)

مرگی عضوی بیماری نہیں ہے۔ یہ نظام عصبی کی ایک مزمن بیماری
 ہے۔ اس کے خاص علامات ہیں۔
 یکایک بے ہوش ہو جانا اور ہاتھ پیر میں تشنج ہونا۔ اسکا اصلی
 سبب آج تک طے نہیں ہوا۔ لیکن کبھی کبھی موروثی ہوا کرتا ہے۔
 چوٹ لگنا۔ ڈر جانا۔ چھوٹ دار بیماریاں، خلق، آتشک، زیادہ
 مے خواری، بہت بولنا۔ یا بالکل خاموش رہنا، رسولی، گرم، جسمانی یا
 دماغی بے حسی، دوسری مرتبہ دانستہ نکلنے کے وقت، لڑکپن کی حالت
 میں۔ دوسرے مرگی کے مریض کا تشنج وغیرہ دیکھنا۔ اس مرض کے
 عام اسباب کہے جا سکتے ہیں۔

یکایک بے ہوش ہو کر مریض زمین پر گر پڑتا ہے۔ کسی کسی کو مرض شروع ہونے کے پہلے دوران ستر ہوتا ہے۔ درد ستر ستر کے اندر کوئی گیرانگیٹا ہوا محسوس ہونا؛ دھندلا پن دکھائی دینا۔ کان میں آواز آنا، جسم میں درد، تمام جسم میں لرزہ۔ سر بے قابو ہونا۔ وغیرہ علامات دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر مریض زور سے رو کر یکایک گر پڑتا ہے۔

مرض شروع ہوتے ہی تمام جسم میں اکڑن؛ گردن سخت، اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں نیچے اور اٹھنے لگتی ہیں۔ ہاتھ کی انگلیاں سکڑنے لگتی ہیں۔ اور کلیجہ دھڑکنے لگتا ہے۔ چہرہ پہلے زرد؛ بعدہ سرخ ہو جاتا ہے؛ منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ ہاتھ دھیر دھیر سرد جما ہوا پسینہ نکلتا ہے۔

بیزل بینس منٹ کے بعد یہ علامات کم ہونے لگتے ہیں؛ اور مریض سو جاتا ہے۔ بہت دنوں تک اس مرض میں مبتلا رہنے پر آہستہ آہستہ دماغی فطرت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور مریض کو پاگل پن یا تمام جسم میں فالج ہو جاسکتا ہے۔

تشخیص مرض

اختناق الرحم (ہسٹیریا) میں مرگی کی طرح ایک بارگی بے ہوشی نہیں آجاتی۔ یا مرض ہونیکے پہلے مریض ایک دم چیخ نہیں اٹھتا۔ مرض ممکنہ میں مرگی کی طرح متواتر تشنج نہیں رہتا۔ اور مرض ممکنہ جھاگ کی طرح سانس لینے اور نکلانے میں آواز نہیں رہتی۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

- (۱) شدید مرض صرع میں:- اگنیا، ایڈہائڈرو، سیانک، کیلی، بروم۔
- (۲) مرض مزمن صرع میں:- بیلاڈونا، کیوپرم ایڈ، کلیریاکارب، ہائڈرو، انڈیگو، سننے، پلیم۔

(۳) کرم سے پیدا ہوا۔ سائنا x۲۔ سینٹ نائن x۱۔ سفون۔

فلکس ٹیوکریم ۶۔ اینڈی گو۔

(۴) جلق وغیرہ کے اسباب سے
ایڈ فاس، ہائٹنا، فاسفورس، فرم، ایڈ سلف،

(۵) خوف نہ ہو۔ (یا نیند کے وقت بے ہوش ہوتے ہیں)۔ اوہیم۔
(۶) دانت نکلنے کے وقت۔ بچوں کے امراض کے بیان کے مرض
تشخ کی دوائیں دینی چاہئیں۔

چند مخصوص ادویات:- اناٹھ کرڈکیا ۳x۳:- عالم نسفی میں۔
شدید حملہ کے شروع حالت میں (خاصکر تیر تشخ) اگر ٹنے کی طرف
رجان اور منہ سے نکلنے کے علامات میں یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔
پیٹ سے سر کی طرف گرمی کی پیٹ اٹھتی ہیں۔ دورے کی ابتدا کندھوں کے
درمیانی حصہ سے ہوتی ہے۔ جہاں درد ہوتا ہے۔ گلے میں گھٹن کا احساس؛
سائیکوٹاما ۶:- خوفناک تشخ (خاصکر بچوں کو)
آرٹے یسیا ۶x۱:- (شراب یا انگور کے جھاگ دار عرق سے تیار
ہوئی شراب کے ساتھ اس کو استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
بار بار جلد جلد مرض کا حملہ۔

ایڈ ہائڈروسینا کم ۳x۳:- آنکھوں کی پتلی پھیلی۔ ساکت اور نظر تیز۔
آنکھیں، جنج کر بے ہوش گر پڑنا۔ جھاگ نکلنے کی علامت میں۔
بیلارڈونا ۱x۱:- چمکیلی، سرخ آنکھیں، چہرہ سرخ، آنکھیں پھیلی یا اندھلن۔
روشنی کا برداشت نہ ہونا۔ چونکنا وغیرہ علامات شدید مرض میں۔
کیلی سیانے لٹس ۳:- بیہوش ہو کر گر پڑنا۔ تیر تشخ یا اگر ٹن۔
جسم نیلا ہو جانا، سانس لینے میں تکلیف وغیرہ علامات میں۔

اکنیشیا ۶:- دماغی خرابی (جیسے رنج و خوف، کام کئے ہوئے پر،
افسوس کرنا) کی وجہ سے یا کسی قسم کی نفرت کی وجہ سے پیدا ہوئے
شدید امراض میں: ہوش میں رہتے پڑے۔
کیوپرم ایسٹیکم ۳x۳:- سفوف۔ بہت تشخ، اور چہرہ نیلا۔

کلکیر یا کارب۔ ۳۔ کنٹھ مالاکے مریضوں کے لئے نہایت مفید و کارآمد ہے۔
 بیوفو۔ ۶۔ جاتی سے پیدا ہوئے مرض میں۔ یا مخصوص مریض صرع کی یہ ایک عمدہ دوا ہے۔
 اوپیم۔ ۶۔ (مریض میں) اگر تشنج کے بعد بہت دیر تک مریض
 سوتا رہے۔ اور خراہے بھرے۔
 کنٹا بس اندیکا۔ ۱۔ ۳۔ مریض صرع کے ساتھ معدہ، گردہ،
 اور آلہ تناسل میں خرابی۔

مرض شدید کی اور بھی چند کارآمد ادویات ہیں
 اینتھیم۔ ۲۔ ایڈ سوٹیم۔ ۳۔ آرج نائی۔ کیسلی برو میٹم۔ ۳۔
 ہایو سیامس۔ ۶۔ زی جیا۔ ۱۲۔

مریض میں مرض کی اور بھی کئی ادویات ہیں۔

زینک فاس۔ ۳۔ سلاک۔ ۳۔ پلیم۔ ۲۔ اینگار یکس۔ ۶۔ یا سلف۔ ۳۔
 باہ کی کمی کی وجہ سے صرع ہو تو ایڈ فاس۔ ۶۔ فاسفورس۔ ۶۔ چائنا۔ ۶۔
 یا فیرم فاس۔ ۶۔ خوف کی وجہ سے صرع ہو تو اوپیم۔ ۳۔ ایکون۔ ۱۲۔
 کسی کسی کی رائے ہے کہ کیلی میوٹور۔ ۱۲۔ کیلی فاس۔ ۱۲۔ سفوف۔
 کیلی سلف۔ ۱۳۔ سفوف۔ اس مرض کی عمدہ دوائیں ہیں۔ مریض اگر اچھی حالت
 میں ہو تو علامات کے مطابق مذکورہ بالا دوائیں دی جاسکتی ہیں۔

علاج معاون

اگر مریض کی زبان باہر نکلی ہو تو اسکو اندر کر دینا مناسب ہے۔ دانت بھی
 گئے ہوں تو اسکو چھڑا کر دانتوں کے درمیان ایک کاگ یا لکڑی کا نرم ٹکڑا۔ یا
 کیشے کی پوٹی لگا دینا چاہیے۔ مریض کو زور سے ہوا کوٹنے اور اجل ٹاٹ رٹ
 ناک کے پاس رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

اگر حملہ زور کا ہو تو کلوروفارم سونگھانا ٹہرتا ہے۔ غذا محرمہ اور قہر
 کانشہ اور زیادہ لکھنا پڑھنا منع ہے۔

بغیر گوشت کے ہلکی غذا، فاقہ، اور ٹھنڈے پانی سے نہانا مناسب ہے۔
 کسی کسی کی رائے ہے کہ چونکہ سونگھنے سے بھی صرع اچھا

ہو جاتا ہے۔ اور اسی وقت ہوش آ جاتا ہے۔ جانچ کیجئے۔

(TETANUS)

اکڑن۔ کزاز

اس مرض میں جسم کمان کی طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی جگہ کے کٹ جانے سے اس میں دھول کے ساتھ ایک قسم کا جرم (ج) مقصدِ حقہ ملاحظہ ہو۔ داخل ہو کر یہ مرض پیدا کرتا ہے۔ گھوڑے کی لید میں اس مرض کے جراثیم بہت رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اس مرض کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) کزاز ذاتی۔ اور (۲) کزاز مری۔

خون خراب ہو کر نظامِ عصبی میں نقص ہو جانے سے جو کزاز ہوتا ہے اس کو کزاز ذاتی کہتے ہیں۔ اور جسم کے کسی حصہ میں سخت چوٹ لگنے سے ماؤف جگہ اعصاب کی تحریک ہونے کی وجہ سے جو کزاز ہوتا ہے اس کو کزاز ذاتی کہتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کی یہ رائے غلط ہے۔ کیونکہ جگہ کے بغیر (یا بغیر زخم ہوئے) یہ مرض نہیں ہوتا۔ پہلے مریض منہ کھولنے کے ناقابل ہوتا ہے۔

گردن سخت لگے میں درد، جڑ ہنسد، مریض کا چہرہ بٹاش معلوم ہوتا ہے چہرہ کے عضلات سخت ہو کر تشنج شروع ہو جاتا ہے۔ چہرہ سے تکلیف نمودار ہوتی ہے مریض کھٹکی لگائے دیکھا کرتا ہے۔ آخر میں اسٹیفن شروع ہو کر تمام جسم مثل کمان کے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کوئی مریض آگے کی طرف

۱۔ ڈاکٹر کلارک کا بیان ہے کہ ۲۲ دنوں تک صرف پانی پلا کر انہوں نے بہت سے مریضوں کو اچھا کیا۔ ان کے بیان کے مطابق ۲۰ سے ۶۰ روز تک اسی طرح فاقہ کرائے، ۳۰ بچوں میں سے ۳۰ بچے ایک دم آرام ہو گئے۔

چہرہ سرخ، مُنہ سے جھاگ نکلتا۔ اور پیچھے کی طرف جھک جاتا۔ سائیکوٹا اور
وساۓ ضرب سے پیدا ہوئے کزاز میں ہوش میں رہنے میں اور جب سانس بند
ہونے لگے۔ بالکل جسم کبھی نرم اور کبھی سخت ہو تو ٹکس و امیکا ۲-۳۔ چوٹ کی جگہ
پر کلینڈیولا کالوشن۔ (ایک آؤنس پانی میں ایک ڈرام کلینڈیولا) لگانا چاہیے
پیچھے کی ریشہ پر بوت ملنا چاہیے۔ امراض طفلان میں کزاز طفلان۔ ملاحظہ ہو۔
پیکا میلا، کیرم، اگنیشیا۔ لیگیس، اس، میٹا لیکم، سٹرمونیم،
وغیرہ دوا میں کبھی کبھی ضروری ہو سکتی ہیں۔

خوداک: مرض کی پہلی علامت ظاہر ہوتے ہی ہر نبی منٹ پر دوا دینا چاہیے

حفظ ماقدم

سونے کا کرہ، بادرجی خانہ، کھاتے کا کرہ وغیرہ جگہوں میں جوتا اتار
کر جانا چاہیے۔ کیونکہ کھوڑے کی لیسڈ (یا گراز کے جراثیم) سے
بھرا ہوا جوتا، اس جگہ لے جانے سے مکان کے تندرست اشخاص
کو بھی مرض کزاز ہو سکتا ہے۔

دودھ، ساگو دانہ، بارلی، شوربہ وغیرہ تیلی اور ملکی میزیں
بار بار کھلائی جائیں۔ مریض کو زمین پر سٹلانا چاہیے۔ کیونکہ حار
چار پانی، چوک، وغیرہ سے گرنے پر چوٹ آ سکتی ہے۔

(HYDRO PHOBIA)

کتے کا پاگل پن

پاگل کتے، سیار لاکڑ، یا بلی کے کاٹنے یا لٹی ہوئی جلد کاٹنے سے یہ مرض پیدا
ہوتا ہے۔ انکے دانت یا ناخن سے کسی کسی جگہ میں زخم ہو کر اس جگہ پر انکے منہ
کی رال لگنے سے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ کاٹنے ہی بیماری نہیں ہوتی۔ ۱۸۴۱ء
تک مرض کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی۔ کپڑے کے ادھکاٹنے سے رال
کپڑے میں لگ جاتی ہے۔ اس لئے بیماری ہونے کا کوئی خوف نہیں رہتا۔
کاٹنے کے ۱، ۱۰ دن بعد زخم کی جگہ میں معمولی جلن ہوتی ہے۔

اور اس کے اس پاس کی جگہ کھلوانے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ دل شوح فرج
 چرچہ ا۔ رات میں بڑے خواب۔ گلے کے عضلات بکڑ کر عضلات اکر جاتے
 ہیں۔ تیز روشنی زبرداشت ہونا۔ رقیق چیز گلے سے اترنے میں تکلیف
 سانس میں تکلیف، پانی یا پتلی شے دیکھتے ہی مریض کو خوف محسوس
 ہو۔ اسکے بعد کمزور ہو کر تشنج، سرگی، کراڑ، وغیرہ علامات ہوتے ہیں۔
 اور مریض جلد مر جاتا ہے۔ کبھی پاگل کی طرح چیخا ہے۔ کاٹا ہے یا دیوا پر سر
 ٹپکتا ہے اس مرض کے مریضوں کے ریڑ یا دماغ میں بہت فرق آ جاتا ہے

علاج

کاٹنے ہی زخم سے اور کس کر باندھ دینا چاہئے اس کے بعد جسم کے
 دانت میں کوئی بیماری نہ ہو، اسے وہ جگہ جو سن کر تھوڑا خون نکال
 ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد لوہا خوب گرم کر کے اس جگہ کو داغ دینا چاہیے۔
 اور کاربوئک ایسڈ یا نائٹرک ایسڈ سے وہ جگہ جلا دینا چاہیے۔
 شروع میں بائیس روز فوئی نم ۲۔۰۰۔۲۔۰۰ ایک ہفتہ تک تین بار
 روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ بعد ایک سال تک بیلا ڈونا ۳۰۔
 روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ بعد ایک سال تک بیلا ڈونا ۳۰۔
 ۳۰۔ روزانہ دو مرتبہ کھانا چاہیے۔
 ڈاکٹر ہیوج کی رائے کے موافق بیلا ڈونا اور ڈاکٹر سیل کی رائے کے
 مطابق اس مریض کی خاص دوا ہے۔

اعصابی تحریک اور ہڈیاں زیادہ ہونے میں سٹرا موئیم 'X'۔ دینا
 چاہیے۔ تشنج زیادہ ہونے میں ڈاکٹر ہیزنگ۔ لکیس '۶'۔ ۳۰ کی رائے
 دیتے ہیں، یا یوسیا من '۱'۔ بیلا ڈونا 'X'۔ آرنگ '۶'۔ بیج بیج میں ضروری ہونگے
 ہیں۔ لائیسن 'X' یا ٹرڈر فوئی نم 'X'۔ اس مرض کی اچھی دوا ہے۔
 گلے کا گھی اور دودھ اچھی غذا ہے۔

مریض کے منہ سے جو رال نکلتی ہے۔ وہ بہت زہریلی ہوتی ہے۔
 اس وقت سفید مدار کے پتے کا عرق نصف پاؤ اور کچا خالص دودھ

نصف پاؤں شیشہ۔ یا پتھر کے برتن میں مل کر کے کھلا دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
چکروت کے مندرجہ ذیل طریقہ پر عمل کر کے بہت لوگوں نے کتائے کاٹنے
کے علاج میں بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

دھتورہ کے پتے کا عرق ایکہ کاگر۔ گائے کا خالص گھی، یا کچٹا
دودھ، یہ چاروں چیزیں دو دو تولہ وزن کے حساب سے ملا کر کتے کے
کلاٹے ہوئے مریض کو صبح نہاد منہ کھلا دیں۔ کھانے کے بعد مریض کو
کھوڑا نشہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوکر اٹھنے کے بعد یا گل پن کی حالت
بہت رہتی۔ دوا کھانے کے بعد اگر مریض کو نشہ محسوس ہو تو نہلا کر اس کو
سمٹھا اور چاول (بھات) وغیرہ کھلانا چاہیے۔

رات کے وقت حسب معمول دال، چاول کھا سکتے ہیں لیکن پاگل
بچن دور ہونے تک میٹھی چیز نہ دینا چاہیے۔

مندرجہ بالا مقدار ادویات جوان اشخاص کے لئے ہے۔

بچہ وغیرہ کے لئے اس کی عمر کے مطابق مقدار تجویز کر لینا چاہیے۔
اگر دوا کھانے کے بعد نشہ زیادہ ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ کتے
کا نہ ہر ضائع ہو گیا ہے۔ اس لئے اس کو جتنی خوراک میں نشہ ہو وہی مقدار
اس کے لئے موزوں اور مناسب ہے۔

اگر مقدار کم ہونے کی وجہ سے نشہ ہو تو کئی روز تک یہ دوا کھلانی چاہیے

لقوہ۔ فالج۔ ادھرنگ (PARALYSIS)

کبھی حصّہ کا (نصف حصّہ ایک جانب) قوت حمل، اور قوت حرکت
سے محروم ہونے یعنی قابو میں نہ رہنے کو فالج کہتے ہیں۔

فالج کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے ریڑھ میں چوٹ کی وجہ سے فالج

لہ دھتورہ کے پتے کو دھو کر خشک کپڑے سے پونچھ کر عرق بخور کر
صاف کپڑے میں چھان لینا چاہیے

چہرہ کا نقوہ، تشنجی فالج (ہاتھ بازو) سر یا کل جسم کا برابر کانپتے رہنا، یا اوپر کے حصہ جسم کا فالج۔
علاج مختصر

- (۱) تمام جسم کے فالج میں :- پلیم۔ (کمزوری، لاغری کے ساتھ فالج، فاسفورس۔ (فعل بد کی وجہ سے) برائٹا کارب (عالم ضعیفی کے مرض میں) مرک کارکیولس، کو نیم۔
- (۲) نصف حصہ جسم کے فالج میں :- نکس و امیکا، فاسفورس، (مرض دق، حرام مخز میں) آرنیکا۔ (بائیں حصہ جسم میں فالج)
- (۳) چہرہ کے فالج میں :- برائٹا کارب، کاسٹیکم، بل، ایکون۔
- (۴) آنکھوں کے اوپر کی پلکوں کی فالج میں :- مجلس، سپائی جی، بیلاڈونا، سٹرامونیا۔
- (۵) متعلق پھیلتی تشویش کے فالج میں :- مجلس، کو نیم۔
- (۶) مصوروں کے فالج میں :- آیوڈ، کو پرم، مٹالیکم۔
- آرے نکم، ایلو، سٹے نم۔
- (۷) حرام نر کے مرض میں :- الومینا، آرج نائی، آرس۔
- آرم، فاس (۸) جب اجسم سخت مثل پتھر یا لوہے کے سخت ہو کر بے حس ہو جائے تو سپیا، سلفر، کیلی کارب، فاسفورس،
- (۹) بچوں کے فالج میں :- فاسفورس، آرس، برائٹا کارب -

چند ادویات کی علامت

ڈاکٹر ہارٹ :- ٹیزٹولا، ۴، ۳۰۔ کو تشنجی فالج کی بہت اچھی دوا سمجھتے ہیں۔ اشکرینا فاسفوریکم، ۳، ۳۰، ۴۰۔ بہت جگہ فائدہ کرتا ہے۔ یہ اعصاب میں تحریک پیدا کرنے والا ہے، پلیم، ۴، ۳۰۔ بھی بہت مرتبہ فائدہ کرتا ہے۔
تمام جسم کے فالج میں پلیم، ۴۔ (خاص کر کمزور ہوتے جانے پر استعمال کرنا چاہیے۔ تشنج کے ساتھ فالج میں :- ٹرنیٹولا کیو نیسیس، ۴۔

مرکب والوس: ۱۔ ۲۔ انٹرمٹ مارٹ۔ ۳۔ دماغ کے فالج میں۔ بیلڈوفا۔ ۳۔
 اجتماع خون کی زیادتی میں۔ اوپیم ۲۔ بے ہوشی کی طرح نیند، چہرہ سیاہ
 آر نیکا ۲۔ چوٹ کی وجہ سے پہونچے یا کلائی میں فالج، پلیم ۶۔
 پاگلوں کے فالج میں بل ۳۔ گاریکس۔ ۳۔ فاسس ۳۔ مرکب کار
 ۳۔ کینا بس انڈیکا ۳۔ بڑھتے ہوئے عضلات کی لاغری کے فالج میں
 فاس فورس ۳۔ پلیم ۶۔ شدید امراض میں:۔ خاص کر بچے اور
 کی طرف بیماری پھیلے۔ ہائڈرو فور بی نم۔ ۳۔
 چوٹ کی وجہ سے فالج میں۔ آر نیکا ۳۔ ٹانگوں کے فالج میں رٹاکس ۲۔
 یادداشت کی کمی میں۔ اور شیخ کے ساتھ بوڑھوں کے تمام جسم کے فالج میں
 اور چہرہ اور زبان کے فالج میں۔ برائٹا کارب ۶۔ ۳۰۔
 چہرہ، یا زخرو یا مثانہ کے فالج میں۔ کاسٹیکم ۶۔ ۳۰۔ جسم چھوٹے
 پر جسے محسوس نہ ہو۔ لیکن کانٹا چبھانے سے درد محسوس ہو۔ اور
 ماؤف جگہ میں جھنخننا ہٹ پیدا ہو جاتی ہو: نصف حصہ جسم قلاب میں
 نہ ہو۔ یعنی بیکار ہو گیا ہو: شدید فالج میں یا خشک ہوا لگنے کی وجہ سے
 لغو ہو گیا ہو تو ایکوٹائٹ X۔ ران میں وجہ مفاصل کی طرح
 درد کم دکھائی دینا۔ رات میں پیشاب نہ روک سکتا۔ چل نہ سکتا۔
 بیلڈوفا X ۳۔ بہت مٹی نکل جانے کی وجہ سے فالج ہونے میں
 فاسفورس ۶۔ ۳۰۔ انگلیوں کے فالج یا شیخ میں جو لوگ لکھنے کا کام
 زیادہ کرتے ہیں: یہ مرض انھیں کو ہوتا ہے۔ جیس X ۲۔ ۲۰۰۔
 خسرہ وغیرہ کے رانوں کے بیٹھ جانے کی وجہ سے فالج میں سلفر ۶۔ ۲۰۰۔
 ہاتھ و پیروں کا شیخ۔ نظام عصبی کے مرض کی وجہ سے فالج ہونے
 میں، مارک سال ۶۔ کانٹا اگڑنے پر درد محسوس ہو۔ لیکن چھوٹے
 جتن نہ ہو: جوڑوں میں کرٹک کی آواز کے ساتھ نصف حصہ کے فالج
 میں: اور جسم کے نیچے کے فالج میں کایکولس ۳۔ بوڑھوں کے فالج
 کو نیم ۶۔ بہت شراب پینے کی وجہ سے ریڑھ کے فالج میں۔

ہونے میں) اور ایل نائٹریٹ سو۔ استعمال کرنا چاہیے۔ جسم کی گرمی ۱۰۲۔ ڈگری سے کہ ہو جانے پر پانی ڈالنا بند کر دینا چاہیے۔ مریض کی طاقت زیادہ کرانے کے لئے شراب یا الکوہل پلانا کبھی مناسب نہیں ہے۔

(۲) بہت گرمی کی وجہ سے آفتابی بخار

ظاہر ابراہ راست سورج کی کرن نہ لگنے بلکہ دوسری وجہوں (جیسے گرم کمرہ یا آگ کے گنڈ، وغیرہ کے پاس رہنا۔ اور رات میں سخت گرمی ہونے کی وجہ سے گرمی کا دھکا) یعنی گرمی کا خاص سبب ہے۔ جسم کی حرارت۔ (۹۸-۱۰۰) طبعی حرارت سے بھی کم۔ نبض بطنی د آہستہ اور ضعیف (کمزور) سردی کے دوسرے علامتوں کا نمودار ہوتا۔ اسکی خاص علامت ہے۔ اس میں جسم کی حرارت بڑھانے کے لئے مریض کے سر اور ہاتھ پیروں پر سینکنا اور چینی کے ساتھ اسپرٹ کیمفرہ، منٹ کا وقفہ دے کر ایک ایک قطرہ استعمال کرنا چاہیے۔ جسم کی حرارت طبعی کم ہو جانے پر مریض کو خوب گرم پانی سے نہلاتا۔ اور چرچ پیچ میں شراب یا الکوہل پلانا ضروری ہے۔

علاج

ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ ٹولنا یا گرمی کا دھکا جسم کی تحریک کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ رائے غلط ہے۔ اب سب لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ جسم کی تکلیف سے تشنیں ہوتی ہے۔ اب فصد کھولنے وغیرہ کے عوض۔ سر۔ گردن کے پیچھے کے حصہ اور سینہ پر ٹھنڈے پانی کی پٹی یا ٹھنڈا پانی چھڑکا جاتا ہے۔ اگر دوران سر درد سر، بار بار پیشاب آنا وغیرہ تشنیں کی علامات شروع میں معلوم ہوں تو مریض کو ٹھنڈی جگہ اور اندھیری جگہ میں جانا۔ اور پہننے کے کپڑے ڈھیلے کر کے جلس X_1 ۔ یا X_3 ۔ فی گھنٹہ استعمال کرنا چاہیے۔

اگر تشن بند ہو جائے تو ڈاکٹر آئسل کور و فارم سونگھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مرض کا رجحان شفا کی طرف ہوا خاص کر درد سر موجود ہونے پر۔ گلوٹائین۔ ۶۔

کا استعمال کرنا چاہئے۔ دودھ یا کچے آم کا شربت۔ مکھن نکالا ہوا دودھ وغیرہ تلی چیزیں کھانے کو دینا چاہئے۔ سخت دُورے۔ اندر جلن کی طرح گرتی۔ سہ کے پشت میں درد۔

یکایک ہوش و حواس کا غائب ہو جانا۔ وغیرہ علامات میں گونا گوں ۳۔ (ہر پانچ منٹ پر) متذکرہ بالا علامات کے ساتھ آنکھیں اور چہرہ سُرخ ہونے پر بلا ڈونا ۳۔ ہر سال گرمی کے ایام میں تشنہ کی وجہ سے درد سر ہونے میں نیٹرم کارب ۶۔ بیج بیج میں ایکونائٹ ۳۔ ورائڈ ۶۔ ۳۔ لیکس ۳۔ نیٹرم میوور ۶۔ سفون، الو پیم ۶۔ کاربووج ۳۔ اور مقصد (۲) اور (ب) میں بیان کی گئی۔ دواؤں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مرض سکتہ ملاحظہ ہو۔

تشنج - اسپٹھن (SPASM)

عضلات کے سکڑنے کا نام تشنج ہے۔ اس میں چہرہ کے عضلات کا تشنج یا مُتھیرھا (CLONIC) یا مُتھیرھا (GRIMACES) بازو، ہاتھ یا ہاتھ کی انگلیوں کا کانپنا۔ (خاص کر انگوٹھا اور چنگیاں) سب سے چھوٹی انگلی کے عضلات کا تشنج، شکم وغیرہ کا تشنج، خصوصیت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ ہاتھ بیروں سے زیادہ کام لینا (جیسے درزی کرک) کمزور ٹیر وغیرہ؛ خون زیادہ فکر وغیرہ؛ اسباب یہ مرض ہوا کرتا ہے۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (۱) بہت دیر پا (TONIC) اس میں جن عضلات پر حملہ ہوتا ہے وہ بہت دیر تک سکڑے رہتے ہیں جیسے کراڑ (ب) جھٹکے وار۔ (CLONIC) تشنج، اس میں متواتر عضلات کا سکڑنا اور پھیلنا ہوا کرتا ہے۔ جیسے مطلق تشنج۔

علاج

کیوریم، میا لیم ۶۔ نکس و امیکا ۳۔ اس مرض کی عمدہ دوائیں ہیں۔ چہرہ کا تشنج؛ ایکون ۳۔ (مُتھیرھا خشک ہوا سے

پیدا ہوا تشنج، کاسٹیم ۶۔ پارٹاکیس ۶۔ (فر من حالت میں) مائی پرکیم X_{۳۰}۔
 (اعصاب میں چونک گئے تشنج) کیلی آئیڈوائڈ مدر ٹرنکچر (۳۰-۳۱) آتشک
 کی وجہ سے تشنج) کلرکوں کے ہاتھ کا تشنج، ایکو ٹائٹ ۳۰۔ ہاتھ کی انگلیوں
 کے تشنج میں آر ج مٹ ۶۔ کھنے والوں کے تشنج میں جلیس ۳۰۔ یا ایڈسلفا
 ۳۰۔ تلوے کے تشنج میں ایکو لچکم ۳۰۔ پیر کی انگلی یا اٹیری کے تشنج میں مایسیر
 ٹھنڈے ہونے کی علامت میں کیمفر ۳۰۔ ۲۰۰۔ درد عصبی ملاحظہ ہو؛
 اچھی طرح آرام، جسم کی مالتش کثرت اور بجلی کا آلہ
 استعمال کرنا چاہیے۔ معدہ کے تشنج کے لئے۔ معدہ کا درد۔ اور درد اعصاب
 ملاحظہ ہو۔ پیٹ کے تشنج کے لئے، قورنچ، اور تشنج کے لئے:-
 "تقطیر البول" اور امراض پیشاب سے تشنج کے لئے۔ پیشاب کا رک
 جانا۔ اور پیشاب کے پیدا ہونے کے مرض کی دوا میں ملاحظہ ہوں۔

المنبھن (CONVULSION)

بچوں کی اکڑن یا تشنج (پہلا مقصد ملاحظہ ہو) کو مطلق تشنج یا ام البصیان
 کہتے ہیں۔ بچپن میں دماغ یا کسی مرض کی وجہ سے یا دانت نکلنے کے وقت برابر
 تشنج ہوتا ہے۔ کبھی دماغ میں انجماد آب یا کوئی دوسرا شدید مرض ہونے کے
 پہلے علامات، بہت بچپن میں یہ تشنج ہوا کرتا ہے۔ عمر زیادہ ہونے کے
 بعد جوام البصیان ہوتا ہے، سکوام البصیان نہیں کہتے بلکہ تشنج کہتے ہیں۔
 معمولی ام البصیان میں بچہ چونک پڑتا ہے۔ چہرہ کے عضلات سکڑ
 جاتے ہیں۔ سانس تکلیف ہوتی ہے۔ آنکھوں کی پشلیاں گھومتی ہوئی
 وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔

نیز ام البصیان میں بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سر ہاتھ دیر وغیرہ
 کے عضلات کا سکڑنا اور اکڑنا آنکھوں کے سامنے تیز روشنی رکھنے پر
 بھی وہ آواز نہیں دیتا۔ منہ سے پھین نکلتا ہے۔ مٹھی باندھ لیتا ہے
 پیر کی انگلیاں تلوے کی طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور دو ایک منٹ بعد یا

اُم البیان بالکل اچھا ہوتا ہے یا کچھ دیر بعد پھر ہونے لگتا ہے۔
علاج بل ۱:- ہر نیدرہ منٹ بعد ایک قطرہ فی خوراک استعمال کرنا
 چاہیے۔ (تشخ کے ساتھ سر میں سوزش، یادماغ میں اجتماع خون ہو
 چہرہ گرم، سُرخ۔ نیند سے یکا یک چونک پڑنا۔ ٹیکٹکی لگا کر دیکھنا
 خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو بل بہت فائدہ کرتا ہے۔

ایکون X۱:- بخار۔ بے چینی، چہرہ تھمایا ہوا۔ تشخ ہونے کی علامتیں۔

جلس، X۲:- امراض دماغ کی وجہ سے تشخ۔

سنا، X۳:- سوت کی طرح کرم کی وجہ سے تشخ

اوپی ایم، ۴:- خوف کی وجہ سے تشخ میں تشخ کے بعد ہی بیہوش

ہو جانا۔ آنکھوں کا ادھ کھلا رہنا۔ سانس کا گھر گھرا نا۔ قبض۔

کیو ملا:- بد ہضمی کی وجہ سے تشخ، آنکھوں کی پلک اور چہرہ کے
 عضلات کا تشخ۔ بچے کا ایک رُخ سُرخ، دوسرا سفید (چمچے
 مزاج والے بچوں کو کیو ملا فائدہ کرتا ہے۔

کیو پرم، ۶:- چہرہ سُرخ اور سو جا (تشخ شروع ہونے کے پہلے)۔
 سکڑا ہوا۔ علامات مثل مرض صرع کے۔

علاج معاون

گردن کا پچھلا حصہ سینہ، اور تمام بدن کے کپڑے ڈھیلے کر دینا چاہیے۔ سر اوچا رکھنا
 چاہیے۔ منہ پر ہوا کرنا چاہیے۔ گرم پانی سے نہانا اور ٹھنڈا پانی میں کپڑا کا ٹکڑا بھگو کر
 سر پر رکھنا چاہیے اور پانی کا چھینٹا دینا چاہیے۔ (اور دوسری دواؤں کے لئے
 بچوں کی بیماری کے بیان میں اُم البیان ملاحظہ ہو)۔

سوزش عصب (NEURITIS)

جملہ اعصاب یا کسی عصب میں آئاس۔ سُرخمی اور درد ہونے کو
 التهاب کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تیز جلا ماؤٹ عصب یا کُل اعصاب
 میں درد کی زیادتی، سوزش والی جگہ سس، اور ٹنگ اس مرض کے

مخصوص علامات ہیں، چوٹ، بخار، کے بعد کی حالت عصب کے قریب کے آلات کی سوزش، دق، وغیرہ متعدی بیماریاں سینہ، کلیجہ وغیرہ ذریعہ ہری پنے وینہ کے غلط استعمال کیوجہ سے یہ بیمار قاپیدا ہوتا ہے۔

سوزش عصب دو قسم کا ہوتا ہے۔ مقامی (LOCALIZED OR SIMPLE)

(NEURITIS) یا عامہ (POLY NEURITIS) ایک عصب کی سوزش کو۔ مقامی عصب۔ سوزش کہتے ہیں۔ اور بہت اعصاب میں سوزش ہو تو اس کو سوزش اعصاب عامہ کہتے ہیں۔ (زیریں زیری ملاحظہ ہو۔)

علاج

اس سوزش کو کم کرنے کے لئے عرصہ تک ایکون سٹ-X کا استعمال کرنا ضروری ہے۔
پیس ڈالنے یا توچنے یا اینٹھن کی طرح درد، یا ٹنک کی طرح درد ہو تو بل X-۲۔
زیادہ بخار، سوزش والی جگہ چھونے سے درد کی زیادتی وغیرہ علامات میں بل X-۳۔
شراب کیوجہ سے مرض ہو تو نکس و امیکا X-۱۔ شدت کی سستی ہو تو آرٹنک X-۴۔
یا سٹرکینا X-۲۔ وجع مفاصل کی علامت میں سی سی سفیو گا X-۱۔ علامت لاغری میں
بلیم فاس X-۳۔ انفلوئنزا ہونے کے بعد سوزش عصب ہو تو ٹیو برکیو سینم X-۲۔
(منہتر میں ایک مرتبہ دینا چاہیے) اگر نیند گھٹنے کے بعد ہی مرض بڑھ
جائے تو لیکس ۶۔ کاربووج کا استعمال مفید ہو سکتا ہے۔

علاج معادن

بستر سے نہ اٹھنا چاہیے۔ زیادہ مقوی غذا۔ لیکن وہ تحریک کرنے والی ہو۔ استعمال کرنا
چاہیے۔ ماؤن جگہ دبوانا چاہیے ضرورت پڑے پہلے (GALVANISM) یا شتر لگوانا چاہیے

عصبی کمزوری

(NEURASTHENIA (NEURAGIA)

یہ نظام عصبی کی خاص کمزوری ہے۔ کسی کام میں طبیعت نہ لگنا۔
دماغی اور جسمانی سستی، نیند نہ آنا۔ دوران سر، درد سر، ہیشیر یا۔
سر کے سامنے اور پچھلے حصہ میں درد۔ کلیجہ دھڑکتا، قوت سامعہ یا باعثر
کاکم ہونا۔ نفخ شکم، کھانے سے نفرت، بد ہضمی اور باقہ، پیر

میں جھنجھناہٹ۔ یادداشت کا کم ہو جانا۔ وغیرہ عصبی کمزوری کے علامات ہیں۔
 بہت زیادہ جسمانی اور دماغی محنت کرنا۔ جلق، کثرت جماع، تفکرات، ماں باپ
 کافرض، ضعف عصبی، بہت زیادہ جریان، بار بار عالم ہونے کے وجوہات،
 سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو یہ مرض آجکل ہو جاتا ہے۔

علاج

کبھی ہنسنا اور کبھی رونا وغیرہ ہیشہ یا کی علامات ملی عصبی کمزوری
 میں اگیشیا ۶۔ پیٹ پھولنا۔ قبض یا زیادہ اسہال اور زکام ہونے
 میں آرج نائی، ۳۰۔ اخراج منی کی وجہ سے یادداشت کم ہو جانے
 میں۔ آنا کارڈیم، ۳۰۔ ہمیشہ کام میں مشغول رہنے سے دماغ میں تھکاوٹ
 ضروری محنت کرنے سے مستی، دردِ پشت، پیکر ایکٹو، نیند کھلتے ہی
 علامات مرض بڑھنے میں لیکس ۶؛ خواہش شہوانی کی پریشانیوں سے
 عصبی کمزوری، پلاٹنا، مریض ہمیشہ ڈرتا ہے (خاص کر تنہائی میں)
 ایکونائٹ ۳۰X۔ مریض ہمیشہ گھومنا چاہتا ہے۔ (کیونکہ اس کا خیال ہے
 کہ نہ گھومنے سے اسکے دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ دل کو یا سست ہو گیا۔)
 دماغ کی بچے دباؤ وغیرہ علامات میں جلس ۳۰X۔ مریض خیال کرتی ہو کہ چلنے
 پھرنے سے وہ گر پڑے گی۔ تھکاوٹ یا کمزوری محسوس ہونا۔
 مستی وغیرہ علامات میں نکس و امیکا۔ عصبی سورمہسی اور کلیجہ دھڑکنا۔

کیکٹس گرانڈی سلورا۔ ۱X۔ بہت ریاچ کی وجہ سے کاربوہیڈرٹ ۳۰X۔
 سفوف، یا نکس و امیکا ۳X۔ گھر واپس آنے کی گھبراہٹ میں ایڈفاس
 ۶۔ آسانی سے تھک جانا۔ اور کسرت کرنے کی طرح تمام جسم میں درد۔
 محسوس ہونے میں آرنیکا، ۳۰۔

کیمو ملا ۱۲۔ امبرا گریسیا ۳۔ پلسا ٹیلا ۶۔ ہایوسیا بس ۳۔
 کیلی برو میٹم ۶۔ زنکم ۶۔ ہرایونیا ۳۔ شکنیا۔ سلف ۳X۔ شکنیا ۳۔
 باجیلزن ۳X ۳۔ سفوف۔ ماسکس ۶۔ ادویات بھی گاہے گاہے ضروری
 ہو سکتی ہیں۔ روزانہ کھلتی ہوئی رہنا۔ جسم کا دیوانا۔ مقوی غذا

(جو ثقیل نہ ہو)۔ دلت پر نہانا۔ کھانا اور سونا وغیرہ صحت کے اصول کی پابندی مرضی کے لئے مفید ہے۔ ام وغیرہ کی فکر جہاں تک ہو ترک کر دینا چاہیے۔

وجع العصب عصبی درد۔ (NEURALGIA)

یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے۔ دوسرے امراض کی علامت ہے عصبی درد کی وجہ سے پیٹ کے اکثر مقامات میں تپکن۔ بھونکنے۔ یا جلن کی طرح درد ہوتا ہے۔ اس کو عصبی درد کہتے ہیں۔

عصبی درد کئی قسم کا ہوتا ہے۔ جیسے چہرے کا عصبی درد شقیقہ فجل کے نیچے عصبی درد عصبی درد کمر جسم، جسم کے اندرونی اعضا میں بھی درد ہو سکتا ہے جیسے پیٹ میں۔ دل میں۔ جگر میں۔ بچہ دانی میں، بیضہ میں۔ ان میں چہرہ کا عصبی درد زیادہ ہوتا ہے تبدیلی موسم۔ پیر یا وجع المفاصل یا تقرس، مرض آتشک، فاندانی نقص، بوسیدہ دانت۔ کسی حصہ جسم سے زیادہ کام لینا۔ چوٹ یا سردی لگنا۔ شراب پینا وغیرہ اسباب سے جسم خراب ہو جانے پر یہ مرض ہوتا ہے۔

علاج

چہرہ کا عصبی درد۔ بیلاڈونا، آرسنک، ایکوناٹ، کالوفالٹم۔ سپائی جلیا۔ اور فاسفورس۔ شقیقہ یا آدھی سیسی میں۔ آرسنک۔ اگنیا، کافیا، کافیا، جلس، نکس و امیکا۔ اور بیلاڈونا۔

پیٹ کے عصبی درد میں۔ آرسنک، ایلو، کالونٹھ، نکس و امیکا۔ اور لائیو پوڈی ایم۔ دل کے عصبی درد میں کیکٹس۔ بیلاڈونا۔ اور وائرم ڈراگس۔ اور سپائی جلیا۔ کمر کے عصبی درد میں۔ کیمپولا۔ اگنیا، کالونٹھ۔ آرسنک۔

لائیو پوڈی ایم، سلفر، اور فاسفورس

یہ دوائیں بھی ۶۔ طاقت میں دینا چاہیے۔

آرسنک ۳x۶۔ ۳۰۔ مریض بہت گھبرا تا ہو۔ یا

تکلیف سے پریشان۔ غصہ ورا کزور۔ آرام کرنے کے وقت سردی لگنے یا ڈرنے سے خاص کر رات میں مرض کا بڑھنا۔ پیر یا کادجہ سے عصبی

ہو: گویا۔ اور آنکھوں کے اوپر کوئی سولی چھو رہا ہے۔ کان کی اندرونی
وریدیں کا پتی ہوں۔ اور ساتھ ہی آنکھ کی پتیلی میں جلن اور کترنے
کی طرح درد کے ساتھ آدھا سیسی درد ہیں، دائیں بیفہ کے درد میں۔

سمی سی نیو کا سٹم X: - عصبی اور وجع مفاصلی درد میں۔

سٹاکس X: - کمر کے عصبی وجع مفاصل میں اور جوڑے کے عصبی درد میں۔

بائی پیریکیم X: - یا آرنیکا X: - چوٹ یا گرنے کی وجہ عصبی درد میں

پلین ٹیکو X: - دانت اور کان میں درد۔

جلس سر۔ عصبی لاغری کی وجہ سے کل جسم میں پھر کن کے ساتھ عصبی درد

میں، پشت۔ کندھا، اور گردن کے پشت میں درد۔

کافیا س: - دائیں جانب کے درد شقیقہ میں جو صبح سے شروع

ہو کر تمام دن رہتا ہو بستر کے نسل میں۔ سچ کھٹو کنے کی طرح درد۔ گویا

سر پٹھا جاتا ہے۔ حرکت یا آواز سننے سے درد کی زیادتی۔ ہاتھ پیر

کھنڈے رہنے کے ساتھ بہت جاڑا محسوس ہونا۔

دائیں جانب کے عصبی درد میں بیلارونا۔ اور کیمولا۔ بائیں جانب کے

عصبی درد میں سپائی جلیا اور کالوسنتھ، طیریا سے پیدا ہوئے عصبی درد میں

سپائی جلیا اور کالوسنتھ، طیریا سے پیدا ہوئے عصبی درد میں۔

چینی تم سلفا X: - سفوف اور آرسنک X: - ۳۔

کیمولا، ۱۲۔ اگنیشیا، روٹا، ۳۔ کلیا، ۳۔ آر جیم نائیر کم ۶۔

مزیرم ۳، زنک فاس X: - سفوف۔ پلسا میلا ۳۔ ۲۰۰۔

وغیرہ دوا میں سچ سچ میں دینا چاہیے۔ کلکیر یا فلو ریکا اور کلکیر یا

سلف، کے علاوہ کل باوریکیم دوائیں فائدہ کرتی ہیں۔

نیند آنے سے پہلے کم ہو جائے گی۔ اس خیال سے مریضوں کو مارفیا۔

وغیرہ دوائیں کھلانے سے بہت نقصان پہونچا ہے۔

ماؤف جگہ پر گرم گرم سینکنا فائدہ کرتا ہے۔

عصبی کمزوری کے لئے اصول صحت کی پابندی کرنا چاہیے۔

میگنیشیا فاش X_2 ۶۔ خوب گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے اکثر ہر قسم کا عصبی درد اچھا ہو جاتا ہے۔ گلٹیہریا۔ ۵۔ قطرے فی خوراک دینا چاہئے۔ بہت کم عصبی درد میں اور سوزش۔ وجہ مفاصل میں اس سے خوب فائدہ ہوتا ہے۔ پلین سیکوا۔ ۱۔ خوب گرم پانی میں ملا کر لگانے سے ہر قسم کے عصبی درد میں فائدہ ہوتا ہے۔

فاسفورس ۴۔ ۳۔ چہرے کے عصبی درد میں ایکوٹائٹ ۳۔ سر دھوا گئے کی وجہ سے شدید عصبی درد میں سر میں درد۔ اور کمال میں تشنج، یا در کھنے کی طرح درد۔ اجتماع خون کی وجہ سے چہرہ میں درد، اور کمر کے عصبی درد میں۔ سلاڈونا ۶۔ تحقیق جو بہت بڑھ جاتا ہو اور اسی کے ساتھ چہرہ سرخ ہو جاتا ہو، چہرے کے دائیں جانب کے عصبی درد میں گلے کے نیچے کے حصہ میں، کسی جگہ کے عصبی درد میں چہرہ اور دانت میں اتنا درد ہو کہ مریض اس کو چھوئے نہ سکے۔

ایسے علامات میں ڈاکٹر سینڈس لسن، صرف ایک خوراک بیلادونا X_2 ۶۔ استعمال کر کے بہت کامیاب ہوئے ہیں۔

سپالی جلیا ۳۔ سر اور چہرہ میں کاٹ ڈالنے اور نوچ ڈالنے کی طرح درد۔ یہ درد آنکھوں تک پھیل جاتا ہے۔ اس وقت سر جھکانے یا ہلانے سے درد بڑھ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کلیجہ دھڑکتا ہے۔ اور بے چینی کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ کالوسٹھ ۶۔ درد نیم سر۔ سر اور دانت کے درد کے ساتھ چہرہ کے بائیں جانب توڑنے۔ یا سوئی چھوئے کی طرح درد۔ یہ درد گرمی اور حرکت سے بڑھتا ہے۔

عضلات میں پھڑکن۔ اور عورتوں کی دشواری حیف، اور مردوں کے درد مزہ، بواسیر میں کمر کی بیماری میں بھونکنے کی طرح درد۔ حرکت سے درد میں ترقی۔ متواتر ہلانے سے درد میں کمی۔ سر میں تیز درد، ایسا محسوس

مالینخولیا

(HYPOC HONDRIASIS)

درحقیقت یہ ایک دماغی بیماری ہے جسم کے کسی عضو کی بیماری نہیں ہے۔ کوئی مرض نہیں ہوتا۔ لیکن دماغ خراب کرے کہ اس کو کوئی خوفناک مرض ہوا ہے۔ جیسے اسکی تندرستی خراب ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ کر وہ پریشان رہتا ہے اسکو مالینخولیا یا مران کہتے ہیں شروع میں نفخ شکم، قبض، بھوک نہ لگنا۔ یا زیادہ بھوک وغیرہ ہمارے پیرا ہونے پر مران نفس بھٹتا ہے کہ اسکو سویر ہضمی یا کوئی خوفناک مرض ہوگا ان علامات کی برابر فکر کرتے ہوئے مریض کو کچھ کی دھڑکن، اسہالی وغیرہ علامات نمودار ہو جاتے ہیں۔ ۱۔

علاج

بکس وایکا ۳، ہر مضمی کے علامات میں، آرم میوور ۳۔ خود کشی کرنے کی خواہش۔ آتش کی وجہ سے آرس ۳۔ جھوٹے خیالات کمزوری، جلس پیدا کرنے والا درد۔ پیاس، زبان سرخ۔ اگنیشیا۔ ۳، دولت کے نقصان سے کسی سے صدقہ جدائی سے یہ مرض ہوا ہو۔ پلاٹینا، خرابی رحم کی وجہ سے یہ مرض ہو۔ کوئیم ۳۔ خواہشات کو زبردستی روکنا۔ خوف، خاموشی، آدمیوں علیحدہ رہنے کی طبیعت۔ ہایوسیا مس ۲۔ ایک ہی مضمون میں (جیسے مریض ہمیشہ سوچتا ہو کہ اسکو گرمی یا کوئی بیماری ناقابل شفا ہوئی ہے)۔ کاذب خیالات۔ ولیرنیا ۳۔ عصبی کمزوری۔ جذرہ۔ نیند نہ آنا۔ دماغی یا کمزوری کے باب میں مالینخولیا ملاحظہ ہو۔

رعشہ

(CHOREA OR VITUS'S DANCE)

چہرہ یا کسی دوسرے عضو کے عضلات کا ارادہ نہ رہنے پر بھی پڑنے کے رعشہ کہتے ہیں۔ اسے غیر ارادی عضلات کا مرض چون بھی کہتے ہیں۔ خوف، دل بتر مرد، وجع مفاصل، مشت رنی، دل کی خرابی۔ ۲۔

باکرم وغیرہ کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
خوف سے یہ مرض ہو تو ایکونائٹ۔ اگیشیا۔ سٹرامونیم۔ کرم کی وجہ سے
ہو تو، سائٹنا۔ اسپائی جلیا۔ سنٹونائکس، مرکوریس۔ دلچھ مفاصل کی وجہ سے
ہو تو سبھی میں فیوگا۔ اسپائی جلیا۔ استعمال کرنا چاہیے۔
مشت زنی (جلیق) کی وجہ سے ہو تو کینتھرکس۔ پلاٹینا۔ کمزوری سے
ہو تو آیوڈی ایم، فرم۔ اگر مرض کا اصلی سبب نہ معلوم ہو تو بیل۔ اگاری کس۔
اگر سے نکم، ہایوسامس، سٹرامونی ایم، زنگم۔ آرس۔ اسکی اچھی دوائیں ہیں۔
کاسٹیکم، ٹرین یٹولا، کلیریا کارب، وغیرہ بیج۔ میں دی جاتی ہیں۔
مذکورہ بالا ادویات ۳x۴۔ طاقت کی دینی چاہیے۔

علاج مساوین

جسانی اور دماغی آرام، کسرت، کھلکی جگہ میں ہوا خوری، مقوی صحت بخش
غذا کھانا مناسب، کبھی کبھی بجلی کی مدد سے بھی یہ مرض کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ مرض ریشہ
ہو۔ اس کو دوسرے ریشہ کے مریض سے بلنا جلنا نہ چاہیے۔

ارتعاش

(TREMOR)

مرض صرع میں جس طرح مریض ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔
اس مرض میں بھی کپکپی ہوتی ہے۔ لیکن بے ہوش نہیں ہوتی۔
اگاری کس۔ سر سے کپکپی شروع ہو کر ہاتھ کی ہتھیلی تک پھیل
جائے۔ خاص کر بوڑھوں کو ایسا ہوا کرتا ہے۔ اگاری کس ۲-۱۔
ہاتھ پیر کا کانپنا، جسم کا نیلا ہونا، جسم سرد ہونا، مرک۔ سول ۲-۱۔
۲-۲۔ (ہاتھ کی انگلی سے کپکپی شروع ہونے پر اگیشیا) دماغی تحریک کی
وجہ سے ارتعاش) سٹرامونیم ۳-۱ یا ایکونائٹ ۳-۲۔ خوف سے ارتعاش
(ہو)۔ ۳-۱۔ اپیکاک ۳-۲۔ یانکس و امیکا ۳-۲۔ (افیون کھانے کی
وجہ سے ارتعاش) انٹم ٹارٹ ۶-۱۔ یانکس و امیکا ۳-۱۔
شرابیوں کے ارتعاش میں) جلسیم ۳-۱۔ ۲-۱۔ (ہاتھ کی انگلی یا جسم کے ارتعاش

یہ بھی سی فیوگامس۔ (ارتعاش کی وجہ سے چل نہ سکتا) ہایوسیماس (۳)
اور زیکم پیکرک X۳۔ بھی درمیان میں فائدہ کرتی ہیں۔

حمود مخصوص آختہ

(CATAPLEPSY)

عصبی یا تشنجی مرض ہیں۔ اپنے ارادے کے موافق چلا پھرانہ جائے۔
یا بے ہوشی کے ساتھ کل عضلات اکڑ جائیں (لیکن دوران خون برابر ہوتا رہے۔
اس کا نام حمود ہے۔ حمود کی حالت میں مریض کے ہاتھ، پیر۔ وغیرہ جس
حالت میں دوسرے رکھ دیتے ہیں۔ اسی حالت میں پڑا رہے۔ اس کو
اس وقت اپنے چاروں طرف کی کسی بات یا چیز کا علم نہیں رہتا۔
اس مرض کا اصلی سبب آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ یہ کوئی خاص بیماری
نہیں ہے۔ ہسٹیریا، ایپیلپسیا، ویم۔ فالج یا امراض دماغی کی علامت ہے۔
کنالیں انڈیکا XI۔ ۲۰۔ اس کی بہت اچھی دوا ہے۔ کئی روز تک اس کے
اس کے بعد ہی اگر اس کے استعمال سے فائدہ نہ ہو، تو سائیکوٹاوا۔
روب ۳۔ دینا چاہیے۔ دوران سر۔ اونگھنا، جھٹکی کی خواہش،
وغیرہ علامات میں نکس ماسکٹا X۲۔ ۳۔ اخراج کے ساتھ موجود رہے
تو ماسکس ۶؛ دماغی نقص یا ہسٹیریا کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو، تو اگیتا ۶۔
مذہبی خیالات کی وجہ ہو تو سٹرا مونیم X۳۔ ۳۔ وراٹرم ورائٹ
X۴۔ سلفر ۳۰۔ دینا چاہیے۔

عضلہ کا دبلا پن

(MUSCULAR ATROPHY)

عضلات ارادیہ کا آہستہ آہستہ کمزور ہونا۔ یا چھوٹا ہونا۔ صفر عضلی کہلاتا ہے
انگوٹھے اور پھلی کے عضلات پہلے پہلے ہو جاتے ہیں۔ اسکے بعد چہرہ اور زبان پر
اس مرض کا حملہ ہوتا ہے۔ اس وقت بوسنے اور نگنے میں بڑی دقت ہوتی ہے
آخر میں مریض کا کل جسم سوکھ کر پڑی پڑی رہ جاتا ہے۔ مریض کا کل
جسم ٹھنڈا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی فالج بھی ہو جاتا ہے۔

پلیم ۶... ۲۔ آلوڈی ایم۔ ۳۔ اس کی اچھی دوا ہے۔ آرج نامی
۶۔ پلیم ایکٹیکم۔ ۶۔ آرنیکا۔ ۳۔ جلس ۳X۔ ۳۔ قاسفورس، ۳۔ سلفر ۶۔ زنگ ۶۔
کیو پریم ۶۔ آرس ایلیب ۳X۔ نیٹرم میوور ۳۔ کی بھی یخ یخ میں ضرورت
پڑ سکتی ہے، مزید واقفیت کے لئے عضلات کا بتدریج دبلاؤ اور ملاحظہ ہو۔

امراض ریڑھ یا حرام مغز

(DISEASES OF THE SPINE)

یہ بتایا جا چکا ہے کہ نظام عصبی کس کو کہتے ہیں۔ نظام عصبی کا جو حصہ ریڑھ
کی نلی (SPINAL CANAL) میں ہے۔ اس کا نام حرام مغز ہے۔ مہروں
کاستوں، یا ریڑھ کے امراض ترتیب وار مندرجہ ذیل ہیں۔
(۱) ضعف عصبی، ملاحظہ ہو۔

(۲) ورم حرام مغز (SPINAL IRRITATION) پیچھے میں
(خاص کر سر کی نلی میں) اور گردے میں درد۔ اس مرض کی خاص علامت ہے۔
دبانے یا تھوڑی محنت کرنے سے چلنا بھرنا۔ لکھنا۔ پڑھنا۔ سونا وغیرہ
ریڑھ میں درد۔ (یا دوسرے حصہ میں) درد بڑھ جاتا ہے یہ ایک
قسم کی عصبی کمزوری ہے۔ اور یہ بہ نسبت مردوں کے عورتوں کو زیادہ
ہوتی ہے۔ جسم سنسناء یا سن ہو جانا۔ احلام، یا قوت باہ کی
کمی، یا بالکل غائب۔ مثانہ کی تحریک وغیرہ علامات ہی موجود
نہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سینڈلس کا بیان ہے کہ عرصہ تک کسی ایک
کا کھانا۔ اس مرض کی سب سے اچھی دوا ہے۔

ڈاکٹر ہیوز، ٹل یوریم ۶۔ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
اگر خاندان باب، دار ۱۰۔ میں مرض دق رہا ہو تو پلیم ۶۔ درد
سرخ جسم، یا کوئی حصہ جسم سن ہو جائے۔ پیٹ درد، نفخ شکم، تھیں، وغیرہ
علامات میں آرج نامی ۶۔ دینا چاہیے، ریڑھ کی جلیں
اور دونوں پیروں کمزوری، ریڑھ سے سر تک درد کی علامت۔

میں پکڑک ایسڈ ۳۰۔ زیادہ چمکے پینے کی وجہ سے توڑھو جاۛ۔
 کمزور عورتوں کو ہوتا یگار یکس ۳۔ اگنیشیا ۳۔ سلک ۳۔ سلفر ۳۰۔
 سسی سیوگا ۳۰۔ سکیل ۳۰۔ بل ۴۰۔ رسٹاکس ۴۰۔ کاکیلوس ۴۰۔ سافوٹیدا ۳۰۔
 وغیرہ ادویات علامات کے مطابق بیج بیج میں دینا چاہئے۔

سرد پانی سے نہانا۔ یا گرم پانی سے پیٹھ کو دھو ڈالتا چاہئے۔
 کھلی ہوا میں رہنا اور مقوی غذا کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ضعف عصبی۔
 درد عصبی، اور امراض مستورات میں ریڑھ کی سوزش ملاحظہ ہو۔

(۳) حرام مغز کی کمی خون (SPINAL AN-AEMIA) خون
 کا کم ہونا دل کی کمزوری وغیرہ، اس مرض میں پیدا ہونے کے اسباب
 ہیں۔ فیرم ۴۰۔ آر س آلوڈ ۴۰۔ سفوت۔ ایسڈ فاس آف۔ کلکیر یا کارب ۴۰۔
 چائنا ۴۰۔ سکیل ۳۰۔ اس مرض کی عمدہ دوائیں ہیں۔
 علامات کے مطابق ان کا استعمال ہونا چاہئے۔

(۴) حرام مغز میں خنہ کی زیادتی (SPINAL HYPER AEMIA)
 حیض کا بند ہو جا۔ بوا سیر۔ سردی یا چوٹ لگنا۔ بہت جماع یا
 محنت کرنا۔ یا سٹرکینا وغیرہ دوائیں کھانے سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
 ریڑھ اور کمر میں درد اور پیٹ میں بے جسی، اس مرض کے خاص
 علامت ہیں۔ آر سے نکم الیم ۴۰۔ ہائی ڈیرنیم ۳۰۔ رسٹاکس ۴۰۔ سلفر ۴۰۔
 اس مرض کی خاص اور کامیاب دوائیں ہیں۔

(۵) حرام مغز سے جریان خون (SPINAL APOPLEXY) حرام
 مغز، یا حرام کی ڈھکنے والی جھلی میں جریان خون ہونے سکتے۔ یا
 فالج کی طرح کے علامات نمودار ہوتے ہیں۔ سکتے اور فالج کی دوائیں
 اس مرض میں علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ جریان خون کی وجہ سے
 زبان اور ہاتھ پیر وغیرہ سُن ہو جانے میں گوا سیکم ۳۰۔

(۶) حرام مغز میں اجتماع آب۔۔ دماغ میں اجتماع آب کی
 طرح حرام مغز میں بھی پانی جمع ہوتا ہے۔

(۱) امراض طفلان میں :- حرام مغز میں اجتماع آب سے پیدا ہوا بچہ کا منقسم مہرہ یعنی بھرا ہوا مہرہ :- (SPINAL BIFIDA) ملاحظہ ہو۔

۱۔ ورم پر دہ طائے نخاع :- حرام مغز کے پھلیوں کی سوزش

(SPINAL MENINGITIS) مغز کی ڈھکنے والی جھلی کی سوجن

کی طرح حرام مغز کے ڈھکنے والی جھلی میں بھی ورم ہوتا ہے دونوں

امراض کا اصلی سبب اور علامات وغیرہ ایک طرح کے ہیں، بخار، بے چینی،

پسینہ رگ جانا، یا چوٹ کی وجہ سے درد میں ایکون ۲-۳۔ تمام جسم میں

درد۔ حرکات کرنے سے درد میں ترقی۔ براہیو نیا ۳۔ بہت سستی۔

بدحواسی، کپکپی، وغیرہ علامات میں جلس الہیہ، پیر سخت، اور

فالج کی طرح ہوجانے میں آگزیٹک الیڈ ۲-۳۔ محرقة سرسامی ملاحظہ ہو۔

(۸) ورم حرام مغز :- گر پڑنا، چوٹ، یا سردی لگنا ہے۔

ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانا، کوئی تیز بیماری زچے سرسامی بخار

بہت محنت کا وجہ سے کل حرام مغز میں یا اسکے کسی حصہ میں سوزش

ہوتی ہے۔ گو یا جسم کھیا ہوا محسوس ہوتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر

ی فالج ہونے کے شبھنا چاہیے کہ کل ریڑھ یا اس کے کچھ حصہ میں

سوزش ہوئی ہے۔ محرقة سرسامی ملاحظہ ہو۔

شدید حملہ :- ایکون ۳۔ ریڑھ میں تیز درد، کزاذ کی طرح

تشنج، بخار، نکس و امیکاس ۳۔ چھوٹے سے کزاذ زیادہ ہونا، سائیکوٹام

(تیز تشنج، تیزی سے چھینٹا)

مزمن میں :- آگزیٹک الیڈ ۲-۳۔ پیر سخت، اور سردی سے درد

آرس ۳؛ (مفلوج حصہ کا سکڑنا۔) (CONTRACTION) معمولی

محنت سے ہی تھکاوٹ آجانا (بدحواسی) لمبے ۶۔ (ریڑھ کی بیماری

میں۔) پیکر کی الیڈ ۱۰۔ (اعضاء تناسل کی گزاردی میں۔) مر سورس

۳۔ (پیر بے تالو۔) یا پیسروں میں فالج ہونے میں۔ فاسفورس ۲۔

(ہاتھ پیر بے قابو ہوں۔) یا قہور ای چلنے سے کانپنے لگے، اسکا ۴۔

ایک حصہ وغیرہ میں فالج اور مادہ جگہ میں درد محسوس ہو۔

علاج معاون - آرام سے سونا۔ ملائم بستر پر سونے سے بستر کا زخم (BED - SORES) اچھا ہو جاتا ہے۔ دودھ وغیرہ مقوی پیتی چیزیں، بیماروں کی اچھی غذا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں کپڑے کا کڑا بھگو کر سر کی ہڈی پر لگا رکھنا چاہیے۔ فالج کی علامت میں یہ فائدہ کرتا ہے۔

(۹) حرام مغز کا فالج: یہ مرض زیادہ تیز بچوں کو (شاید ہی کبھی جو انوں کو) ہوا کرتا ہے۔ امراض طعنان میں بچوں کے حرام مغز کا فالج، ملاحظہ ہو۔

(۱۰) بتدریج ترن سر نیوالی عضلی لاغری (PROGRESSIVE MUSCULAR ATROPHY) یہ لاغری عضلات (MUSCLES) کی ہے۔ حرام مغز کی (SPINAL CORD) اب تک ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ یہ لاغری خاصہ عضلات کی ہے۔ لیکن اب بلا شک و شبہ کے طے ہوا ہے کہ یہ مرض حرام مغز کا ہے۔ دُبلایا پن پہلے ہاتھ کے انگوٹھے (THUMB) میں محسوس ہوتا ہے۔ بعدہ بازو اور کندھے بھی لاغر ہو جایا کرتے ہیں اور آخر میں عضلات کے بعد عضلات پر حملہ ہو کر مریض زندہ ہی بالکل ٹھسٹری (LIVING SKELETON) ہو جاتا ہے۔ صغر صفلی دیکھئے۔

پلیم ۶۔ اور فاسفورس کے استعمال سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ راج ناٹی ۲۔ جلس ۲X آر نیکا ۳۔ اور سلفر ۳ کا امتحان کیجئے۔

(۱) اور دُمجی (COCCYGDYNIA) ریڑھ کے نیچے کا حصہ دیکھنے میں کوئل کی چونچ کی طرح ہے۔ اور اسکو دُمجی کہتے ہیں۔ سردی یا چوٹ لگنے۔ خارش کے دب جلنے۔ آلہ کے ذریعہ سے پتھر پیدا کرنے کے سبب سے، الم عصب، یا درد دُمجی کا مرض ہوتا ہے۔ کھینچ کر پکڑنے، کھینچنے کی طرح درد میں کا شکم ۶۔ توج ڈالنے کی طرح درد میں ساکیوٹا ۱۔ اگر دبا رکھنے سے درد بڑھتا ہو تو سلکا ۶۔ بیٹھنے سے درد چھوٹے یا جلنے سے درد میں ترقی کے علامات میں، کبکی بائی ۲X۔ دُمجی کی ہڈی کے پچھلے حصہ میں بھاری بین محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ مریض سو جاتا تو انٹارٹ ۶۔

درد میں ٹنک ہو تو رٹاکس ۶ - یارو دغا ۱۰

امراض مستورات کے باب میں الم حصص یاد درد رچی ملاحظہ ہو۔

(۱۲) حرام مغز کا زوال

(LOCOMOTOR ATA) سردی

یا زیادہ فرق سے ۱ صحت یا بہت محنت (جسمانی یا دماغی) آتش کی وجہ سے حرام مغز کا زوال ہوتا ہے۔ اول معدہ کی خرابی اور تمام جسم میں (خاص کر) دونوں پیروں میں) وجع مفاصل یا عصبی درد کی طرح۔ بعدہ سوچنے کی طاقت کم ہو جانا۔ اور آخر میں مریض کا اپنے ارادہ کے موافق ہر کھٹیک نہ رکھنا۔ اس مرض کے خاص علامات یہ ہیں۔

مرض کے شروع حالت میں سیکل ۳۔ بعد میں فلورک ایسڈ ۲۔ گرمی سے پیدا ہوئے مرض میں کیلی آیوڈ ۳۔ مریض کے جلدی تھک جانے میں پیرک ایسڈ ۳۔ با تھک کا پینا اور قوت باصرہ کم ہونا۔ آر ج نالی ۳۔ یا فاسفورک ۲۔ ٹکس و ایمکا ۳۔ آرم ۲۰۰۔ میڈورنیم ۲۰۰۔ میگنیشیا فاس ۲۰۰۔ سفوف ۳۰۰۔ ایلیوسن ۶۰۰۔ لائیو پورٹ ۱۰۰۔ آرس ۳۰۰۔ کاربووج ۳۰۰۔ سفوف بل ۳۰۰۔ ٹرکینا ۱۰۰۔ ٹیوربا ۳۰۰۔ مفید ہیں

علاج معاون

شراب اور تمباکو نوشی منع ہے۔ مچھلی گوشت اور انڈا اس مرض میں قطعاً منع ہے۔ سردی لگنا بہت نقصان دہ ہے۔ کوٹھڑی بند کرے تاکہ سردی نہ لگے۔ تھلانے سے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں دودھ زیادہ مفید ہے۔ تھوڑی ورزش سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

(۶) امراض چشم

آنکھ کی بیماریوں کے چند مخصوص ادویات

آرم بیٹ ۲۰۰۔ سفوف ۲۰۰۔ معلوم ہو کے آنکھ کے باہر کی طرف سے گویا اندر کے چاروں طرف درد پھیلتا رہتا ہے۔ آر جیم نالی ۳۰۰۔ آنکھیں چمک جائیں۔ آنکھوں سے مواد نکلنا۔ آنکھ

کے سامنے گویا سائیکل رک رہا ہے۔ اس البم ۳ جلتا ہوا آنسو زخموں پر گرنے سے گویا وہ جگہ مفید ہو جاتی ہے۔

۱ یوڈی ایم :- آنکھوں میں جلن ہو تو کچے آلو کو چھیل کر اس کا گودہ کچھ در تک آنکھوں میں باندھ کر رکھنا مفید ہے۔

۲ ایلو نائٹ ۳ :- بلاشبہ یکایک اندھے ہو جاتے ہیں۔

۴ سیما :- آنکھوں سے پانی ہو۔ اور اس میں کڑکڑاہٹ ہو۔

ایکایک ۳ :- پلوں کی نسین شکر تزی ہوں؛ ایسا فوٹو ۲ :- ۴ :-

آنکھوں کے اندر سے گویا باہری حصہ کے حاروں طرف درد پھیلتا جاتا ہے۔

یوڈی ٹوڈیم پروف ۳ :- آنکھوں کی پتلیاں اکڑ جائیں۔ پانی جاری ہو۔

خاص کر کھانسی کے وقت۔ یوفریشیا ۳ :- جلن پیدا کر دینے والے پانی کا اخراج۔ بہت آنسو نکلتا۔ آنکھیں سُرخ۔ صبح آنکھوں کا چسکنا۔

قرنہ (CORNEA) میں کچھ ضرورت ہونے پر یوفریشیا۔

آنکھ کے پانی میں ملا کر بیج بیج میں آنکھ میں دالنا چاہئے۔

۱ اینتھس ۳ :- آنکھوں میں اجتماع خون ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں۔

۲ اے پس ۴ :- آنکھوں کے نیچے آماں ہو۔ کاشم ۴ :- آنکھوں کا پلک

آپ ہی آپ گر جائیں مریض خوش کرنے پر بھی دباؤ کھٹا کے۔

کیلی کارب ۳ :- آنکھوں کے اوپر آماں :-

کیلی سلف ۴ :- مواد کی طرح آنسو نکلتا۔

کیلی سٹیس ۳ :- آنکھیں سُرخ اور خشک اور گرم، آنکھوں کے بیچ

میں سوزشی درد۔ سردی یا رات میں درد کی ترقی۔ آنکھوں سے پانی گزرتا۔

گروٹیل ۳ :- آنکھوں سے خون گرتا ہو۔ آنکھوں میں زردی :-

جلیم :- آنکھوں کے عضلات پھڑکتے ہوں، یا قابو میں نہ ہوں :- کم

دکھائی دیکتا ہو۔ نیٹریم میٹورم ۲ :- سفوف ۳ :- آنکھوں میں پانی

بھرا ہونا۔ آنکھوں سے پانی گزرتا۔ (خاص کر کھانسی کے وقت) :-

پلسا ٹیل ۲ :- منالی جگہوں میں یا ٹھنڈی ہوا میں، آنکھوں سے

پانی نکلے میں نہ درد رنگ کا اخراج۔ پس، ۳۔ (انجی خاصہ بلیک کے اوپر کی گوبانجی میں اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ پروفن سپائوزا۔ آنکھوں کے درد کی بہت اچھی دوا ہے۔ آنکھوں میں سرپ تیز درد ہو۔ دوسری کوئی علامت نہ ہو۔ اس دوا کے مدر سچر کو سادی کجیر یا گولی میں جذب کر کے استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

پلائی ٹینا ۴۔ کوئی چیز جھوٹی دکھائی دے۔
پلاٹینس ۱۔ (کچھ دنوں تک استعمال) پلکوں پر پھنسیاں بونے میں گولہ نمکی وغیرہ۔ نصف آؤنس پانی میں باخ قطرے لاکر آنکھیں دھو دالنی چاہئیں۔ فانی سو سٹکما۔ ۳۔ آنکھوں کی گرد لگڑا ہٹ۔ یہ درد اگر چشمہ لگانے پر بھی دھلے۔ فلورک ایسڈ ۴۔ ایسا محسوس ہو۔ گویا آنکھوں میں ششدری ہوا لگ رہی ہو۔ سیلا ڈونا ۴۔ آنکھوں میں روشنی مطلق برداشت نہ ہو، بوریکس ۳۔ سفوف۔ پلکوں پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ پلکوں کی برونیا کا آپس میں مل جانا۔ پلکوں کا اندر کی طرف اٹ جانا۔ آنکھوں کے کونوں میں کھجلی اور درد، رسٹا کس ۶۔ کل آنکھیں اور اسکے چاروں طرف آماس، آنکھوں سے گرم آئسو نکلا۔ پلکس بھاری اور گرمی محسوس ہوں روٹا ۳۔ سلائی۔ پڑھنا وغیرہ اسباب سے۔ آنکھوں پر زیادہ زور ڈالنے اور آنکھوں کی کمزوری میں۔

سیفی سگر یا ۶۔ پلکوں پر سخت تہوڑی۔ یا ابھرے ہوئے دانے سے۔ اور آنکھوں کی کمزوری میں (NODES) ہوتے ہیں۔

سٹرامونیم ۳۔ درد دکھائی دینا۔

سائیوٹا ۳۔ آنکھوں کی پتلی بڑی ہو جانا۔ آنکھیں سن ہو جانا، نظر ٹھہری ہو جانا۔ پڑھنے کے وقت حروف اونچے نیچے یا بالکل نہ دکھائی دینا۔

سنا ۳، ۴، ۵۔ دھندلا پن دکھائی دینا لیکن آنکھیں مل دینے سے صاف دکھائی دینا۔ سلفس ۳۔ آنکھوں میں جلن۔ آنکھوں میں ایسا محسوس ہو گویا بالو پڑ گیا ہے۔ آنکھیں دھونے سے درد میں ترقی۔ آنکھوں

کے سامنے پردہ پڑا محسوس ہونا۔ آنکھوں میں سوئی کی طرح چبھن۔
سلکانہ۔ آنکھوں کے سامنے دُھندلا دکھائی دینا۔ آنکھوں کے سامنے
دُھواں یا کھرا دکھائی دینا۔

سیاہ ۱۲۔ آنکھیں بھاری ہونا (فالج کی وجہ سے) ہلکیوں کا آپ ہی
آپ گر جانا۔ سبھی سی فیوگا۔ ۴۔ آنکھوں کی پتلیوں میں درد۔
آنکھوں میں یا کانوں میں یا کانوں میں برابر تیز درد دُکھا ہونا۔ آنکھ کے
کوڑے میں روئی سے سبھی سی فیوگا لگانا اور سطاقت کا استعمال کرنا مفید
سیکا۔ ۳۔ آنسو بہانے والی گلیٹیاں اور آماس۔

آنکھانا

(OPHTAL MIA)

آنکھوں میں گرہو غبار کے ذرات؛ دُھوپ، دُھندھی ہوا۔ دُھواں
چوٹ؛ صحت کی خرابی وغیرہ اسباب آنکھیں آشوب کر آتی ہیں۔
خسرہ، چچک اور سوزاک کی وجہ سے کبھی آنکھوں میں سوزش ہوتی ہے۔

علاجات

آنکھوں کا سفید حصہ (کوئی) سُرخ آنکھوں سے یا بیانی یا مواد نکلنا۔
آنکھیں جھپک جانا۔ آنکھوں سے میل نکلنا۔ بالو یا کانٹا گڑے کی طرح
درد۔ آنکھیں گڑا کر زنا۔ روشنی برداشت نہ ہونا۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد

ہیں۔ قیصر م فارٹ ۴X۔ معمولی قسم کا درد

بیلادونڈ ۳X۔ چھیلی، سُرخ آنکھیں؛ بہت درد، آنکھوں میں
آماس۔ آنکھوں میں سر کی جانب ٹنگ۔ دونوں گال سُرخ۔ روشنی
یا سورج کی گرمی برداشت نہ ہونا۔

ایومنا ۳X۔ آنکھیں بہت خشک (یا آنسو نہ ہونا) ہوتے ہیں

آرم میٹ ۴۔ آنکھ کے فساد سے آنکھوں میں بیماری ہو

ایکونکٹ ۳X۔ وجہ مفصل رقت منی، یا سردی سے پیدا ہوا

حاد۔ آشوب چشم۔ سادہ بخار۔ درد بند نہ ہونے تک بورک ایسڈ

۸۔ گرین x پانی ایک آؤنس) کا عرق لگانا چاہیے۔ اگر ۸ گھنٹہ میں سوزش کم نہ ہو
 نو فریشیا۔ ۱۔ قطرے + پانی ایک آؤنس) عرق کا خارجی استعمال
 کرنا چاہیے۔ زیادہ بیماروں کو سلفر ۶۔ ۳۰۔ دینا چاہیے۔
 ایکوتا سٹ سے فائدہ نہ ہونے، اور زیادہ مواد نہ ہونے پر رٹاکس ۶۔
 کا استعمال کرنا چاہیے۔

مرکیوریس کار ۴۔ آنکھوں سے پانی گرنے کے بعد بھی جب مواد زیادہ
 ہو جائے، میل نکالے، آنکھیں چپک جائیں۔ کرکرائیں، گرم اور درمخوس ہو۔
 دیکھنے اور حرکت کرنے سے درد میں ترقی ہو۔ روشنی برداشت نہ ہو، رقت
 منی کی وجہ سے آشوب چشم میں مرکیوریس کار کے بعد ہیرسلفر فائدہ کرتا ہے۔
 ہیرسلفر سے فائدہ نہ ہو تو سلیکا ۶۔ دینا چاہیے۔

رے پس مل، ۳۰۔ زیادہ مواد آتا، روشنی برداشت نہ ہونا، جلن، کھجی۔
 سوئی چھنے کی طرح درد، آنکھوں کی پلکیں سوچی ہوئیں۔

یوفریشیا ۳۰ x۔ (یہ دوا ہر حالت میں دیجا سکتی ہے)۔
 آنکھیں سوجھ، روشنی ناقابل برداشت، ناک اور آنکھوں سے بہت پانی
 گریںا۔ درد، بار بار چھینک، آنکھوں کا سفید حصہ اور پلکوں کے کنارے
 چھوٹی چھوٹی پھنساں، آنکھوں سے مواد نکلنا۔ اور سوت کی طرح مواد کا
 پردہ آنکھوں پر پڑ پڑ کر دیکھنے میں خلل ڈالتا۔ یوفریشیا ۱۔ دن قطرے
 ایک آؤنس پانی میں ملا کر دھونا چاہیے۔

پلسا ٹیلا ۳۰۔ ۳۰۔ حاد اور مزمن آشوب چشم، سوزاک کی وجہ سے آشوب چشم
 آر جنٹیم فائیر ٹرکم ۳۰۔ ۳۰۔ بہت مواد نکلنا۔ (خاص کر بچوں کے
 آشوب چشم میں) مرض آنکھ میں جب کچھ زرد رنگ کا مواد آتا ہے
 اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

ہیرسلفر ۶۔ ۲۰۔ جریان کی وجہ سے آشوب چشم
 نائٹریک ایسڈ ۶۔ ۲۰۔ آنکھ کی وجہ سے آشوب چشم، یا سوزاک
 کی وجہ سے آشوب چشم۔ سلفر ۳۰۔ ۳۰۔ آنکھوں کے پتلیوں کی

سوزش۔ اور اس کے چاروں طرف سرخ رنگ کے گول گول زخم۔ سوئی چھنے کی طرح درد۔ پانی لگنے سے درد بڑھنا (کنٹھ مالا کی وجہ سے آستوب چشم) آنکھوں کے کوئے سفید جھتے) پر چھوٹے چھوٹے دانے ہونے میں مرکبوریس ۶۔ ۳۰۔ آنکھوں کی سوزش کے ساتھ پلوں میں اسی طرح دانے ہونے پڑیں ۶۔ یا سلفر ۲۔ جلن کے ساتھ مواد نکلتے پڑے۔

آر جنٹیم ٹائیٹریکیم ۳۔ ۳۰۔ ضرورت پڑنے پر دو قطرے آرج نائی؛ ۸۔ کلکیر یا آیوڈین X۶۔ کیلک کارب ۶۔ سلیکا ۶۔ سیٹھا سیگر یا ۶۔ آرنک ۶۔ زخم ۶؛ وغیرہ ادویات بیج بیج میں ضروری ہو سکتی ہیں۔ غدا وغیرہ ہلکی مقوی غدا۔ مچھلی اور میھی چیزیں کھانا منع ہے۔ مریض کو صاف بستر پر رکھنا چاہیے۔ عرق گلاب یا نیم گرم دودھ سے آنکھیں صاف کرنا چاہیے۔ آکھ گرین ٹھنڈی (یا بور اسک ایڈ) ایک آؤنس پانی میں اچھی طرح ملا کر آنکھیں دھو ڈالنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔

بند گو بھی کا پتہ بخور کر اس کے عرق میں ایک دو بوند شہید ملا کر آنکھوں پر لپیٹ کر نئے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی یا برف کسی حالت میں نہ لگانا چاہیے۔ زرد رنگ کے ٹکڑے سے آنکھ دھکی رکھنا چاہیے۔

آنکھوں میں کالا داغ پڑنا

چوٹ لگنے، بار بار کھانسی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی آنکھوں سے خون گرے گا۔ یا آنکھوں کے سفید جھتے میں سیاہی دیکھ پڑتی ہے۔ اسی کا نام کالا داغ پڑنا ہے۔

آرنیکا ۳۔ ۳۰۔ استعمال درنچر (۵ قطرے) کو نصف آؤنس پانی میں ملا کر آنکھوں پر پی باندھنا مفید ہے۔

کم دکھائ دینا

(AMBLYOPIA)

اسباب :- بہت اسباب نظر کم ہو سکتی ہے۔ بہت چھوٹی چیز یا جھکیلی چیز کو دیر تک نظر جما کر دیکھنا۔ بہت سونا۔ بہت زیادہ نشہ پینا۔ سردی لگنے کی وجہ سے یکایک پسینہ رُک جانا۔ حیض رُک جانا وغیرہ اس مرض کے خاص اسباب ہیں۔

علاج

زیادہ اخراج خون کی وجہ سے نظر کا کم ہو جانا۔ چائنا ۴۔ ۲۰۔
چائنا سے فائدہ نہ ہو تو فاسفورس ۴۔ ۲۰۔
زیادہ نشہ کے استعمال سے ضعف بصارت۔ نکس و امیکا X۔
زیادہ انجماد خون کی وجہ سے بیلادونا ۴۔ ۳۰۔
حیض بند ہو جانے میں پلساٹیل ۴۔ ۳۰۔ امراض دل کی وجہ سے گیس ۴۔
تیز درد کے ساتھ ضعف بصارت سنگوینریا ۳۰۔
آنکھوں کی پتلی میں درد ہو تو سسی سی فیکوگا ۳؛ کو یہ میں بہت درد ہو پائی بیٹیا
۴۔ یا کالوسنتھ ۴۔ سر میں خون کی زیادتی اور تکسیر پھوٹنے میں فاسفورس ۴۔
وجع مفاصل سے برائیو نیا ۴۔ خون کی کمی کی وجہ سے فیرم ۴۔ ایڈ فاس ۴۔
آر شک ۳۰۔ چائنا ۴۔ یوفریشیا M-X۔ قوت باضمہ کی کمی کی وجہ سے نکس و امیکا
۳۰۔ پلساٹیل ۳۰۔ مرکوریس ۴۔ چائنا ۴۔ سلفر ۳۰۔ یا بیلادونا ۳۰۔

معمولی اصول

آنکھوں میں گرد و غبار نہ پڑے۔ تیز روشنی نہ لگے سینا یا باریک حروف میں کتا میں چھپی۔ اخبارات پڑھنا منع ہے۔ ضرورت پر عینک استعمال کی جا سکتی ہیں، کمی خون کی وجہ سے ضعف بصارت ہو تو مقوی چیزیں کھانا۔ دریا میں نہانا۔ صاف ہوا میں رہنا وغیرہ مفید ہے۔

(NIGHT - BLINDNESS)

رتوندھی

بہت لوگ ہلکی روشنی میں ریا غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک

بالکل ہی نہیں دیکھتے۔ ان کا نام رتوندھی ہے۔

فانی سوشنگام ۳۔ کے استعمال سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ محسوس ہوا ہے۔ جگر کی خرابی سے ہوتو نکس و امیکا۔ ہلی بورس، ٹائیگر اس ۳۰۔ پائنا ۶۔ بیلا ڈونا ۶۔ لائیو پوڈی ایم ۳۰۔ ہاپو سیاس ۶۔ رین ۳۰۔ ٹائیگرک ایسڈ ۳۰۔ وغیرہ دواؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔

دونندھی

(DAY-BLINDNESS)

بہت لوگوں کو تیز روشنی میں دکھائی نہیں دیتا۔

باتھ روپس (BOTH ROPSO) اس مرض کی اعلیٰ دوا ہے۔ سلیکا ۳۔ فاسفورس ۶۔ سیلفورک ایسڈ ۶۔ بیلا ڈونا ۳۰۔ سٹرامونی ایم ۶۔ دواؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔

جزوی اندھاپن

(PARTIAL-BLINDNESS)

کسی چیز کا بالائی حصہ نہ دکھائی دے۔ آرم میٹ ۶۔
کسی چیز کا داہنا حصہ نہ دکھائی دے۔ لیٹھم کارب ۶۔
کسی چیز کا صرف بائیں حصہ دکھائی نہ دے۔ آٹو لائیو پوڈیم ۱۲۔

نظر نصفی۔ آدھی

(HEMIOPIA)

کسی چیز کا بالائی یا نیچے کا حصہ دکھائی نہ دے۔ اس کو نظر نصفی یا آدھی نظر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فارش کا بیان ہے کہ کیلی کارب، چنی نم، سلفٹ ایسڈ میو، نیٹرم میو، راس، سپیا۔ اور سٹرامو۔ اس مرض کی بہترین دوا یہ ہیں۔ یہ کل ادویات ۳۰۔ ۳۰۔ طاقت کی دینی چاہیے۔

نظر کا تکان

کسی چیز کی طرف تھوڑی دیر تک دیکھنے سے اگر آنکھیں

تھک جائیں تو کلکیر یا کارب ۶۔ یا نیٹرم۔ ۳۔
ایک فرانسیسی مصنف کا بیان ہے کہ بہت دیر تک لکھنے پڑھنے سے
اگر آنکھیں بہت تھک جائیں تو کئی رنگ کے چمکیلے ریشمی کپڑوں کے ٹکڑوں کی
کی طرف دیکھنے سے نظر کی تکان دور ہو کر آنکھوں کو آرام ملتا ہے۔

بھینگاپن

دائیں یا بائیں کسی ہی آنکھ سے ٹیڑھا پن دکھائی دینے میں ایو منا ۶۔
اچھو اور کامیاب دوا ہے۔ پیٹ میں کرم کی وجہ سے بھینگاپن ہو تو پائی جلیا
۳۔ یا سائناسو۔ ہائیو سیامس ۳۔ جلس ۲۔ سگلا من ۳۔ یا سٹری موئی ایم ۳۔
درمیان درمیان میں ضروری ہو سکتے ہیں۔

آنکھ کے ترے۔ خیالات چشم

(MUSCAE VOLITANTES)

اس مرض میں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا آنکھوں کے سامنے چھوٹے
چھوٹے پتے، یا کوئی چھوٹی چیز سوت کی طرح یا ذرات گرد وغبار اُڑ رہے ہیں۔
پُرانا بخار، بہت زوال منی، خون کی کمی وغیرہ وجوہ سے یہ مرض
پیدا ہوتا ہے۔ اسباب کا پتہ لگا کر اصلی امراض کا علاج کرنے ہی سے
اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کمزوری کے سبب سے
یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پر چائنا ۶۔ یا ایسڈ فاس ۳۔
عموماً کل علامات میں دیا جاسکتا ہے۔

دور کی چیز نہ دکھائی دیتا

(SHORT - SIGHT)

جن کی نظر کم ہو، یا دور کی چیز نہ دیکھ سکتے ہوں، یا دُھندلی دیکھنے
ہوں۔ ان کے لئے فائی سگلا ۲، ۶، فائدہ مند ہے۔

سبز موتیا

(GLAUCOMA)

کبھی کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا یا کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہی اس مرض کی علامت ہے آج تک اس مرض کا سبب ٹھیک ٹھیک طے نہیں ہو سکا۔ جسم خراب ہو جانے پر ہی یہ بیماری ہوتی ہے۔ کسی کسی بیماری میں یہ مرض دکھائی دیتا ہے: ایکوئٹ ۶، آر جینٹیم نائٹرک ۶، فاسفورس ۶، سیلا ڈونا ۶۔ جلسیم ۳، سپائی جلیا ۳۔ علامات کے مطابق دینا چاہیے۔

آنکھ کے انگوری پردہ کا آئس

(IRITIS)

آنکھ کی پتلی کے چاروں طرف کے رنگین حلقہ کو آنکھ کا انگوری پردہ کہتے ہیں۔ اسی آنکھ کے انگوری پردہ کے آئس ہونے پر اگر اس کا ٹھیک ٹھیک علاج نہیں ہوتا تو آنکھوں میں جالا پڑ کر بالکل نہیں دکھائی دیتا۔ یہ آئس بہت اسباب سے پیدا ہو سکتا ہے۔ چوٹ، وجع مفصل، سوزاک، اسکے اسباب ہیں۔ معمولی علامات

آنکھوں سے کم دکھائی دینا۔ یا بالکل نہ دکھائی دینا۔ چرخ یا سورج کی روشنی میں تکلیف، آنکھیں بند کرنے میں سوئی چھکنے کی طرح درد۔

علاج

اگر چوٹ کی وجہ سے آئس ہو تو آرنیکا ۳، کاندرونی استعمال کرنا چاہیے اور آرنیکا ۸، ۱۰۔ قطرے نصف آؤتس پانی میں ملا کر دن میں تین چار بار دھو ڈالنا چاہیے۔ اگر آئس کے ساتھ بخار ہو تو ایکوئٹ ۳، ۳X۔ اگر رخاغ پر حملہ ہو تو آرنیکا ۳۔ یا سیلا ڈونا ۳۔

وجع مفصل کے سبب سے ہو تو برائی ادینا، سپائی جلیا۔ یو فریشیا۔ غدوی وجع مفصل کی وجہ سے ہو تو آرنیکا۔ کالو سٹھ، کالو سٹ، یا سلفر، مرض آتشک کی وجہ سے ہو تو کیلی بائی کرڈم، مرک سال، ایڈزاس سوزاک کی وجہ سے ہو تو ایڈزاس، مرک سال۔ آر جینٹیم نائٹرک۔

یہ سب دوائیں ۶۔ طاقت کی دینی چاہئے

(STVE)

انجن ہاری۔ گوبانجی

پر پلک کے اوپر ایک قسم کی پھنساں ہوتی ہیں۔ ان کو انجن ہاری یا گوبانجی کہتے ہیں۔ سردی، کمزوری وغیرہ اسباب سے گوبانجی ہوتی ہے۔ پلسا ٹیلا ۴۔ ۳۰ اس کی اعلیٰ درجہ دوا ہے۔ اگر پلسا ٹیلا سے فائدہ نہ ہو تو ہیر سلفر ۶۔ بار بار پھوڑا ہونے پڑے۔ یا پھوڑا خشک ہو کر وہ جگہ سخت ہو جائے تو سلفر ۳۔ اسٹے فی سکر یا ۶۔ آنکھوں کے اوپر پلک پر انجن ہاری ہو تو مرکوریس ۳۔ سلفر ۳۔ کاسٹیکم ۶۔ ایلو منا ۶۔ فائدہ کرتا ہے۔ بچے کی پلک پر گوبانجی ہو یا آنکھ کے کونے میں گوبانجی ہو تو اسٹے فی سکر یا ۶۔ فاسفورس ۶۔ رسٹا کس ۶۔ فائدہ کرتا ہے۔ لائیو ۱۲۔ شینم ۶۔ دینا چاہئے۔ مواد ہو تو ہیر سلفر ۶۔ مرکوریس ۶۔ دینا چاہئے۔ پلکس گرم پانی سے سینکنا چاہئے۔ گوبانجی آسانی سے اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں گرم نگلنے سے جلد ہی بھی خشک ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہو جائے پر کہ پلک پکڑ رکھنے سے انجن ہاری ہوئی ہے تو میننٹھس۔ انجن ہاری ہونے یا اس میں مواد ہو تو لاسیکو پوڈی ایم۔ گوبانجی کے ساتھ پلکیں سُرخ ہونے میں سی پیار گوبانجی میں دبانے یا نوچنے سے طرح طرح کے درد (رہ رہ کر) ہو تو اسٹے فانی سکر یا گوبانجی میں لیٹخ محسوس ہو تو ایمون کارب۔ ٹیکن کادرد یا سینکے سے کمی۔ ہیر۔ جھوٹے سے ترقی ہیر۔ اوپر کی پلک پر گوبانجی ہو تو ایمون کارب۔ دائیں آنکھ کی گوبانجی میں کیلک کارب۔ نیٹرم میور ایمون کارب۔ کنٹھرس پلسٹز (TEPLETZ) نہ جیا۔ بار بار گوبانجی نکلتا بند کرنے کے لئے اسٹے فانی سکر یا گوبانجی۔ سلفر یا میں آنکھ میں گوبانجی ہو تو اسٹے فانی سکر یا۔ لے بس۔ لائیو۔ پوریجیم۔ ٹائیٹریکیم ۳۔ مسفوف۔

(NIGTITATION)

آنکھوں کی پلک پھڑکنا

اگر آنکھیں برابر پھڑکتی ہوں تو پلسا ٹیلا ۶۔ یا اگنیشیا ۶۔ دینا چاہئے۔

پلک لٹکنا

مریض اوپر کی پلک اٹھانہ سکتا ہو۔ اس وجہ سے آنکھوں میں دھواں گرد وغبار رہ جائے؛ آنکھ کھلنے پر آئسوگرتا ہو۔ ۴۔ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں۔ جلیسم ۳۳ x ۳۳۔ اسکی بہترین دوا ہے۔ شروع ہی سے علاج کرنا مناسب ہے۔ ورنہ آنکھوں میں فالج ہو سکتا ہے۔

پلکوں کا سکرٹنا

(۱) پلک باہر کی طرف اینٹھ کر سکرٹ جاتی ہے۔ اسے پس؛ آر جلیسم ۶۔ (پلک پھولی۔ آنکھوں سے پیپ گزرتا، نائٹریک ایسڈ ۶۔ آتش سے پیدا ہونے پر)۔ ہامیلس ۸۔ (دش گئے پانی کے ساتھ) لگانا چاہئے۔
(۲) پلک اینٹھ کر اندر کی طرف سکرٹ جائے۔ گلکیر یا کارب ۶۔ پورٹس ۳ لائیکوپوڈیا ایم ۳؛ سلفر ۲۰۔ مرکوریس ۳۔ فائدہ کرتا ہے۔
معدہ کی خرابی میں (یا عصبی کمزوری میں) اکثر پلکوں کا سکرٹنا۔ یہ علامت لگی رہتی ہے۔ اس لئے کھٹیک کھٹیک عینک لگانا یا کسٹامیکا پس؛ لائیکو۔ وغیرہ ادویات۔ (جن سے مرض سورہ عصبی دور ہو) استعمال کرنا چاہیے۔ اور صحت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔
اس سے مریض کی عصبی طاقت بڑھ سکتی ہے۔

(CATTRACT)

موتیا بند

چوٹ لگنے کی وجہ سے پستلی پر ایک قسم کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ نظر کمزور ہو جاتی ہے اور پھر بالکل ہی نہیں

دکھائی دیتا۔ یہ بیماری ایک یا دونوں آنکھوں میں ہو سکتی ہے۔

علاج

سنارے ریاء مارٹیماسکس :- حاد اور مزمن دونوں قسم کے موتیا بند کی بہترین دوا ہے۔ اسکو ماؤف آنکھ میں ایک ایک بوتل دن میں تین چار مرتبہ عرصہ تک (۵ مہینہ) ڈالنے سے بہت سے آدمیوں کو اچھا ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس دوران استعمال میں گلکیر یا فلوریکا x۱۲ - سفوف اندرونی استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے فائدہ ہو تو کنالین انڈیکا ۳ - استعمال کرنا چاہیے۔

کوئی کوئی فلورک ایسڈ استعمال کر کے اچھے ہوئے ہیں۔
مرض کی شروع حالت میں آیوڈو فارم ۲ - سفوف (خاص کر پورھوں کی آنکھوں میں موتیا بند ہونے میں) گلکیر یا فاس x۶ - سفوف (خاص کر دائیں آنکھ میں مرض ہو) کاسٹیمک ۱ - سیپا ۶ - لائیگو پوڈی ایم ۱۲ - یا فاسفورین ۶ - وغیرہ دواؤں کا استعمال کرنے سے بہت جگہوں میں آرام ہوتے دیکھا گیا ہے۔

آنکھوں میں کیڑا پڑ جانا

’اتفاقی حادثات‘ میں ناک، کان، آنکھوں میں کیڑا پڑ جانا ملاحظہ ہو۔

امراض چشم کے علامات اور علاج

- آنکھوں میں جلن محسوس ہونا۔ ۱۔ آرس ۶ - سلفر ۴ -
- آنکھوں میں سردی محسوس ہونا۔ ایسڈ فاس ۶ -
- آنکھوں میں بوجھ محسوس ہونا۔ یا آنکھ بند نہ کر سکتا۔ جلیسم x۱ -
- آنکھیں آماس کرنا۔ اے پس، رسٹاکس ۶ -
- آنکھیں کانپنا۔ آنکھوں کی پستلی یا پلک ہلنا۔ ایکارکین ۶ - پلس ۶ -
- آنکھیں ہمیشہ کھلانا۔ سلفر ۳ - پلس ۳ -
- آنکھوں سے پانی گرنا۔ یوفریشیا ۳ - پلس -

آنکھوں سے گرم پانی گرنا: آرس ۳X، ۳۔

آنکھوں سے جلنا۔ پانی گرنا۔ پلس ۳X، ۳۔

آنکھیں اکڑنا۔ درد کرنا۔ (مریض آنکھیں چھونے نہیں دیتا۔)

سرم میور ۱۲X۔ سفوف ۳۰۔ برائی اونیا ۶۔ ہیر سلف ۱۔ میلا ۳۰۔

آنکھوں میں درد۔ مثل عصبی درد کے: آرس ۳۔ جلس ۱X، ۳۔

سیائی جلیا ۶۔ ۳۰۔

آنکھیں گویا اندر کی طرف اکڑ گئی ہیں۔ ایڈفاس ۶۔ کروٹن ۶۔

آنکھیں گویا باہر کی طرف اکڑ گئی ہیں۔ برائیونیا۔ لایکو پوڈیم ۱۲۔

آنکھوں میں اس قسم کا درد۔ گویا دب گئی ہیں۔ ہرنکاس۔ جلس ۱X، ۳۔

آنکھوں میں کٹ جانے، یا سوئی چھونے کی طرح درد۔

برائیونیا ۳X، ۳۰۔ نائٹرک ایڈ۔

دھردار جھونکے کی طرح درد (SPLINTER LIKE) محسوس ہونا۔

ایڈ نائٹرک ۶۔ ہیر ۶۔ ۳۰۔ تھوجاس۔

آنکھوں میں تپ۔ بنے کی طرح درد، اے، پس۔

آنکھوں میں نوپار پھینکنے کی طرح درد۔ اے، پس، ۳۰۔ آرم میور ۶۔

آنکھوں میں ٹنک محسوس ہونا، بل ۳۰۔ ہیر ۶۔

آنکھوں میں درد بیکایک بڑھے اور کم ہو جائے۔ بل ۶، سڈرن ۶۔

آنکھوں کا درد آہستہ آہستہ ترقی کرے اور آہستہ آہستہ کم ہو۔ سٹیم ۶۔

آنکھوں کا درد، آنکھوں کے چاروں طرف پھیل جائے۔

۶، سفوف ۳۰۔ میزیریم ۳۰۔

آنکھوں کا درد، طرف پھیل جائے۔ آرم۔ سفوف ۳۰۔

آنکھوں کا درد باہر کی طرف پھیل جائے۔ اسافو ٹیڈا۔

آنکھوں میں ٹھیک وقت مقررہ پر درد شروع ہو، سڈرن ۶۔

آنکھوں کا درد ناقابل برداشت۔ کیوٹلا ۱۲۔

آنکھوں میں درد کے بعد وہ جگہ سن ہو جائے۔ منتر پریم ۶۱۔

آنکھوں میں درد کے ساتھ زخم، کو نیم ۶۔
 آنکھوں میں بغیر درد کے زخم۔ کبیلی بانی۔
 آنکھوں میں گویا بالو پڑی ہے۔ کاسٹیکم ۴۔ ہیپر ۲۔ نیٹریم میور ۳۔ سلفر ۳۔
 سورج کی روشنی کی نسبت گیس کی روشنی میں درد بڑھتا۔ سلفر ۳۔
 تیل کے مانند آنسو۔ سلفر ۳۔
 آنکھوں میں اکڑن معلوم ہوتا۔ نیٹریم میور ۶۔ سفوف ۳۔ روٹا ۲ X ۶۔
 رات میں آنکھوں کے درد کی ترقی۔ آرس ۶۔ سفلی نم۔
 دھوپ یا تیز روشنی میں درد کی ترقی۔ مرک ۳۔
 آنکھ ملانے سے درد بڑھتا، بلاوینا ۳۔ نیٹریم میور ۳۔ آرج نائی ۶۔
 سینکے سے آنکھوں میں درد بڑھتا۔ سلفر ۳۔
 سینکے سے آنکھوں کا درد کم ہوتا۔ ہیپر ۶۔
 آنکھوں کی پتلی پھیلی ہوئی۔ بل ۶۔ سٹرامونیم ۲۔
 آنکھوں کی پتلی سکڑی ہوئی۔ سائٹا X ۲۔ ۲۔ اوپیم ۶۔ فائی سٹگما ۳۔
 بھینگادیکھنا۔ سنوٹائن X ۲۔ بیلاڈونا ۳۔ جیسیم X ۳۔ یاپوسیا مس ۶۔
 رنگ نہ پہچان سکتا (COLOUR BLINDNESS) بن زائٹم ڈی ٹائیٹریم۔
 (BENZINUM DINITICUM) ۳۔ ۴۔ ۳۔ سنوٹائن X ۳۔
 رتوندھی ہو۔ یردھتویس ۶۔ (رتوندھی کا بیان ملاحظہ ہو)۔
 رتوندھی ہو۔ بیلاڈونا ۶۔ نکس وایکا ۶۔ ۴۔
 فائی سوسٹگما ۳۔

(رتوندھی کا بیان ملاحظہ ہو)
 کمزور بصارت۔ فاسفورس ۶۔ کاسٹیکم ۶۔ ٹے بیکم ۶۔
 دھندلا دیکھنا۔ فاسفورس ۶۔ ٹے بیکم ۶۔ کاسٹیکم ۶۔
 پلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ جلن اور زخم۔ کرپوزوٹ X ۱۔
 آنکھوں کے آگے سرخ یا سبز رنگ دکھائی دینا۔ فاسفورس ۶۔

چند سائنس دانوں کا بیان ہے کہ آنکھ کے آنسو مرض کے جراثیم کو زائل کرتے ہیں۔

آنکھوں کے سامنے زرد رنگ دکھائی دینا۔ سنیٹو نائٹ (X)، سنیٹو (X)۔
 پڑھنے کے وقت آنکھیں فوراً تھک جانا۔ جیورنڈی ۳۔ نیٹرم آر ۲۔ ۳۰۔
 پڑھنے کے وقت حروف نئے معلوم ہوں؛ نیٹرم میور ۳۰۔
 پڑھنے کے وقت میں سب حروف غائب ہو جاتے ہیں۔ سائیڈ ۳۰۔

۷۔ امراض گوش

(DISEASES OF THE EAR)

کان تین حصوں میں منقسم ہے۔

(۱) کان کا بیرونی حصہ (OUTER EAR) (۲) کان کا درمیانی حصہ (MIDDLE EAR)

(۳) کان کا اندرونی حصہ (INNER EAR)

ہم لوگوں کو کان کا جو حصہ دکھائی دیتا ہے اور اس کا جو سوراخ،
 پیشانی سے اس کو ملتا ہے اس کو کان کا بیرونی حصہ کہتے ہیں، کان
 کے سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا پردہ ہے اسکو طبل اذن (DRUM)
 کہتے ہیں۔ اس، طبل اذن کے ذریعہ سن پڑتا ہے۔ اس لئے یہ پردہ
 پھٹنے یا اس میں کوئی خرابی ہو جانے پر قوت سامعہ (سننے کی طاقت)
 میں نقص ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہرا ہی ہو جاتا ہے۔ اس طبل
 اذن سے کان کے اندرونی حصہ کے گڑھے کا نام 'کان کا درمیانی حصہ'
 ہے۔ اس کے بعد ہی 'کان کا اندرونی حصہ' ہے۔

درحقیقت یہی نفقوں کو لیکر چھوٹی چھوٹی ٹنوں کے ذریعہ دماغ میں پہنچاتا
 ہے۔ زیادہ تشریح کے لئے ہماری کتاب موسومہ 'نردیہہ پر ہیچے'۔ پڑھیے۔

کان کے متعلق کچھ ضروری باتیں

(۱) نبلنے کے بعد سر اور کان اچھی طرح پونچھ دینا چاہئے تاکہ بالکل گھلا نہ رہے۔

(۲) استاد یا دیکھ بھال کرنے والوں کو ٹوکوں کا کان سے اینٹھنا۔ یا کان پر

مارنا نہ چاہیے۔ ایسا کرنے سے لڑکے بہرے ہو سکتے ہیں۔

(۳) بہرے بچوں کو بیوقوف سمجھ کر اس کی بیوقوفی دور

کرنے کے لئے سزا دی جاتی ہے۔ ایسا کام بہت بیجا ہے۔

کان کا ورم

(OTITIS)

اکثر سردی لگنے سے شدید ورم انون ہوتا ہے اور گلہ یا حلقوم (صلق) کی خرابی یا کسی جلدی بیماری کے ساتھ یہ ہمیشہ ملا رہتا ہے۔ کان میں ٹنک آواز، سُرخی اور بخار کے ساتھ کم زیادہ (دُسن) پڑتا۔ اس مرض کی خاص علامات ہیں۔ کبھی کبھی بیکانیک درد بند ہو کر مواد گرتا ہے۔ شروع میں علاج نہ کرنے سے کان کے اندر رونی حقیقت تک ماکوٹ ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ بدبودار مواد نکلا کرتا ہے۔

علاج مختصر

ایکون-۱۔ (ورم کی شروع حالت میں ابل ۳-X)۔ (دماغی علامات میں اجتماع خون) اے پس (خسرہ کے بعد ورم گوش) نوچنے والے، یا تیر کے چھنے کی طرف درد، مرک دانی ۳-X۔ سفوف (چھپک کے بعد کان کے ورم میں اور دانت تک پھیل جاتا ہے۔ یا بستر کی گرمی سے بڑھ جاتا ہے۔ کیو ملا ۳-۔ درد ناقابل برداشت سلفر شفا ہونے کی طرف! اکثر دواؤں کے علامات میں خاص کر درد سر میں، شروع کی حالت میں (خاص کر درد سر) اور گلے کے درد میں بیلا ڈونا ۳-X استعمال کرنا چاہئے۔ اور منالین سے سینکنا چاہئے۔

سردی سے پیدا ہوئے کان کے ورم میں پکٹا ٹیلا ۳-۔ لیکن کان کے اندر درد ہو۔ اور بخار بھی ہو تو ایکونائٹ ۳-X سوئی چھنے کی طرح درد اور کان کی جڑ میں ناقابل برداشت درد میں کیو ملا ۴-۔ کان میں ٹنک اور درد اور کلٹی کی سوچن میں مرکورس سال ۴-، ان ادویات کے دینے سے بھی اگر درد کم نہ ہو تو پلٹین ٹیگ ۸- دینا چاہئے۔

مرض مزمن ہو تو نائٹرب ایسڈ ۴- یا سلفر ۳ دینا چاہئے۔ کان کے باہر ورم اور دباں چھوٹی چھوٹی مواد بھری پھنسیاں جوڑنے کے علامات میں

کلیر یا پکرک ۳۔ استعمال کرنے سے چھوٹی چھوٹی مواد بھری
چھنیاں روئی سے ڈھکے رہنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔

علاج معاون

روئی یا فلائین سے کان ڈھکے رکھنا چاہیے۔ جس میں کان کے سوراخ
میں سردی نہ اثر کرنے پائے۔ فلائین یا نمک کی پونٹی گرم کر کے یا خشک اسپنج
خوب گرم کر کے سینکے سے یا دو قطرہ میوٹن آئیل یا سرسوں کا گرم
تیل، یا پلساٹیلہ۔ کان میں ڈالنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔

(OTALGIA)

کان کا درد

متذکرہ بالا کان کے ورم میں بخار۔ ٹنک اور کان کے درد
میں صرف پھیدلنے کی طرح تیز درد ہوتا ہے۔

یہ درد کبھی کبھی دانت کی جڑ تک پھیل جاتا ہے۔

سردی یا چوٹ لگنے، کان کو بار بار کھودنے۔ کان میں پانی جلنے
کان کا میل اور کان کی جلد کو ہلانے، کان میں ٹھنسیاں یا زخم ہونے وغیرہ
اسباب سے یہ ناقابل برداشت درد پیدا ہوتا ہے۔

خسرہ یا چوپک کے بعد کبھی کبھی کان میں درد ہوا کرتا ہے۔

علاج: سردی لگنے یا کان میں ٹھنڈا پانی جلنے کی وجہ سے

کان کھولانے میں ایکونائٹ ۳-X۔ ڈنک مارنے کی طرح درد ہو، تو

اے پس، ۳۔ درد ایسا ہو گا یا کوئی نوچکر پھینک رہا ہو، تیر چھوڑ رہا ہو

تو ٹیکس ۳-X (سردی کی وجہ سے کان کے درد میں بھی پلساٹیلہ مفید ہے

دانت میں درد ہونے کے ساتھ کان میں درد ہونے میں کمیولا ۱۲۔

یا مرک سول ۴ (ورم اُن کے بیان میں علاج معاون" ملاحظہ ہو۔)

(PAIN IN THE EAR)

کان درد

کان کی سوزش کرن سول، یا کان مل دینے کی وجہ سے کان اڑتا ہے۔

یا اس میں ایک طرح کا درد رہتا ہے۔ اس کا اصلی سبب تلاش کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ایکن، بل، کیمولا۔ فیسرم فاس، ہیرسلفر، مرک، مپلس، سلفر۔ وغیرہ ادویات اس مرض کی بہترین دوائیں ہیں۔
(امراض گوش کی ادویات اور علاج معادن، ملاحظہ ہو۔)

درد کی خاصیت کیمطابقی علاج

پلسا ٹیلا۔ ۲۔ استعمال کرنا چاہیے۔ اور مرک سول روئی میں چند قطرے میولن آئیل (یا پلین ٹنگ) درنچر ڈال کر اس کے ذریعہ کان کا چھید بند رکھنا اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ کان ہمیشہ درد کرتا رہے تو مرک سول ۶۔
کان میں کوئی چیز گڑی ہو۔ یا سوراخ ہونے کا ایسا درد محسوس ہو تو کیسپیکیم ۶۔ چلن پیدا کرنے والے درد میں آر سے نکم ۳۰۔ بھونکنے جیسے درد میں، پلسا ٹیلا ۳۔ عصبی درد میں کیمولا ۶۔ یا بیلا ڈونا ۳۔
ٹنگ ایسے درد میں بیلا ڈونا ۳۔ ڈنگ مارنے کی طرح درد میں اے پس، کانٹا چھنے کی طرح درد میں کیمولا یا کیلی کارب ۶۔ پھٹ جانے کی طرح درد میں بیلا ڈونا ۳۔ کیمولا ۶۔ پلسا ٹیلا ۳۔
کیل جانے کی طرح درد میں، یا کان میں چوٹ لگنے کی وجہ سے درد میں، آر نکا ۲۔ بچوں کے کان کے درد میں کیمولا ۲۔ ۱۲۔ اچھی دوا ہے۔ نگلنے کے وقت کان میں درد ہو تو فانی ٹو لگا ۳۔ دینا چاہیے۔

کان میں پھوڑا

(FURUNCLE OF THE MEATUS)

کان کے سوراخ کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوتی ہیں جس سے درد ہوتا ہے۔ آما س ہوتا ہے اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔
اس سے سنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔
علاج :- ڈنگ چھنے کی طرح درد۔ رنگ سرخ اور آما س۔
ہو تو بیلا ڈونا ۳۔ کھانا چاہیے۔ اور بیلا ڈونا ۸ لگانا چاہیے۔

اگر بیلاڈونا سے نائندہ نہ ہو تو سلیکا ۳۔ مواد آنے کو ہو تو جلد بچانے کے لئے ہیرسلفر ۶۔ سوزش کم ہونے پر سلفر ۳۰۔
(کان کے اندرونی پھوڑے کا بیان ملاحظہ کیجئے۔)

(POLYPUS OF THE EAR)

کان کی بواسیر

تھو جیا ۳۰۔ استعمال کرنا اور متے کے اوپر تھو جیا ۸۔ لگانا اچھی دوا ہے اس سے فائدہ نہ ہو تو نائٹریک ایسڈ ۶۔ استعمال کرنا چاہیے۔

(TINNITUS AURIUM)

کان بجنا

اس مرض میں کان میں گنگن، سوسوں، پھس پھس، یا باجے کی آواز سن پڑتی ہے۔ دوسرے امراض کے بعد کی علامت کی وجہ سے یا عصبی کمزوری کی وجہ سے کان بجنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اس مرض سے آہستہ آہستہ بہرا پن بھی ہو سکتا

علاج

کان گھٹنے کی آواز آنے میں ایڈفاس ۳۔ ۳۰۔ کوئین کے غلط استعمال کی وجہ سے مختلف قسم کی آواز سن پڑتا ہے۔ ایڈنا ٹریک-یاچائنا ۳۰۔ دماغ میں اجتماع خون کی وجہ سے کان میں آواز آنا بیلاڈونا ۶۔ کان میں بھینھنا ہٹ، بادل گرجنے، راگ گانے، مہر میں کی آواز سن پڑنے میں کینین سلف ۳x۔ کان میں بھینھنا ہٹ، سائیں سائیں کی آواز۔ گانا۔ مہر میں آواز سننے میں ڈیجی ٹیلیس۔

بہرا پن کے ساتھ کان میں گھٹنے کی آواز آنا۔ یا جھن جھن کی آواز آنا۔ کاربون سلف ۳۔ گرجنے یا زور کی آواز سننے کے ساتھ بہرا پن۔ لیکن کچھ شور و غل کا سن پڑنا ۲ گریفٹا ٹس ۶۔ مزمن مرض دوران سر کے ساتھ کان میں گرجنے کی آواز آنا اور کان سے کم سننا۔ میٹرم میلی سل ۳x۔

میں صرف ایک خوراک، کیلی آلوڈائنڈ - دینا چاہیے۔
 ہائی ڈرائسٹس ۳۔ مرک سول ۶؛ بھی بیج بیج میں ضروری ہو سکتا ہے۔
 اگر بچے کے ساتھ کان میں بنجے کی آواز ہو تو وراٹرم الیم ۳۔
 انجن کی آواز کی طرح مہس مہس جیسی آواز میں ڈیجی ٹیلیس ۶۔
 وغیرہ کا استعمال حسب علامت مفید ہے۔
 تھیوسٹنا من ۶۲ - ۲۰۔ ہر قسم کی آواز جو مرض 'کان بنجے'
 میں بہت اچھی اور کارآمد ہے۔

(PAROTITIS)

کرن مول

درحقیقت یہ ایک معمولی بیماری ہے۔ 'امراض معمولی ملاحظہ ہو'۔
 کان کی بیماری نہیں ہے۔ ایک قسم کے جراثیم اس مرض کے خاص سبب
 ہیں۔ جو چھوٹے سے پھیلنے ہیں۔ دو۔ تین ہفتہ تک ادائیگی حالت میں
 رہنے کے بعد یہ متعدی مرض اکثر وہابی شکل میں پھیل جاتا ہے
 (خاص کر جاڑے یا برسات کے موسم میں بچے کے جڑے کے کونے میں اور
 کان کے نیچے لار پیدا کرنے والی بڑی گلی (Gland) ہے۔ اسکو 'کرن مول'
 کہتے ہیں۔ یہ کرن مول درم ہو جانے سے دو گلیاں (ایک دونوں طرف
 کی گلیاں یعنی کان کے سامنے یا نیچے والی گلیاں) آماس کر جاتی
 ہیں۔ اور سُرخ اور سخت ہو جاتی ہیں۔ درد کرتی ہیں)
 بخار، متلی، لار بہنا، گال آماس ہو جانا، چبانے اور نگلنے میں
 تکلیف۔ گلے کا آماس کرنا۔ گردن نہ ہلا سنا وغیرہ اس مرض کے
 خاص علامات ہیں۔ معمولاً یہ مرض چوتھے روز برقی پذیر ہوتا ہے۔
 اور آٹھ یا دس روز میں اس مرض کے علامات دب جاتے ہیں۔
 اس لئے اس میں ڈر کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مرض گلیوں کو
 چھوڑ کر دل و دماغ، عورتوں کے پستان یا مردوں کے بیضہ پر حملہ آوار
 ہو تو خوف ہو سکتا ہے۔ یہ مرض بچوں اور جوان ہی کو زیادہ ہوتا ہے۔

لوڑھوں اور عورتوں کو کم ہوتا ہے۔
 نئی یا سردی لگنا وغیرہ اسباب سے یہ مرض شدید صورت میں پیدا
 ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت بے وقت بخار وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔
 علاج مختصر

- (۱) گلیاں آماس کرنے یا چبانے سے تکلیف ہونے میں مرکب بن آیوڈائنڈ X۶۔
 سفوف۔ قافی ٹولیکا X۱۔ منتخب دوا۔ چھ گھنٹہ کے وقفہ سے دینا چاہیے۔
 (۲) بخار کی علامت میں ایکون X۲۔ دو تین خوراک کافی ہے۔
 (۳) دماغ پستان یا بیضہ وغیرہ میں بیماری ہونے پر ڈرج ۱۲ اسپاچ ۳ بکلیٹ

چند دواؤں کی خاص علامات

ایکوناسٹ X۳ ۳۔ بخار۔ پیاس۔ بے چینی، تکلیف وغیرہ
 علامات میں (خاصکر مرض کے شروع حالت میں) جاڑے کے دنوں
 میں سردی سے اس مرض کے ہونے میں مرکبوریس بن آیوڈائنڈ
 X۲ ۳۰۔ اس مرض کی بہت اچھی اور کارآمد دوا ہے۔ (خاصکر مریض کے
 کچھ ترقی کر جانے میں بخار کم ہونے اور رال زیادہ گرنے میں۔
 پلسا سیلا X۳ ۳۰۔ فوٹوں میں مرض کا حملہ ہونا۔ اور کرن مول،
 ہونے کے بعد مرض وحشت نمودار ہونے میں۔ یا اگر مرض بن گھوش چھوڑ
 کر یہ آماس، بیضہ یا پستان پر حملہ کرے تو پلسا سیلا، فائدہ کرتا ہے۔
 بیلاڈونا ۳۰۔ ۳۰۔ (گال خاصکر دایاں گال) آماس کرنا۔
 یا سرخ ہو جانا۔ ہڈیاں، تیز درد۔ دماغ میں بیماری کا حملہ ہونے
 کے علامات میں۔ لیکن آماس کی جگہ سخت ہونے میں۔ کاربوڈج X۳
 سفوف دینا چاہیے۔

سٹاکس X۳۔ کان کی جھڑ (خاصکر بائیں جانب) کی سوجن
 گہری سرنجی۔ تیز درد وغیرہ علامات میں (خاصکر برساتی ہوا لگنے پر)
 سلفر ۳۰۔ مواد پر جانے کا خوف۔ سہیر سلفر ۶۔ ۳۰۔ مرض کی

آخری حالت میں۔ سلکا ۶۔ ۳۔ ناسود ہو۔

علاج معاون

مریض کو بیشہ آرام سے کھاٹ پر رکھنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھنڈی ہو مریض کو نہ لگے۔ ماؤف جگہ کو سینکنا مفید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باہر کی ہر قسم کی سردی نقصان کرتی ہے۔ زیادہ دودھ مچھلی، گوشت، کھانا مناسب نہیں ہے۔ ماؤف جگہ کو روئی سے ڈھکار رکھنا چاہیے۔
مرض کی شروع حالت میں، ساگو، باری، شوربہ، وغیرہ رہنا چاہیے۔ اسکے بعد مقوی ہلکی اور پستلی غذا۔

کان بہنا

(OTORRHOEA)

خسرہ کے بخار وغیرہ کے بعد جس بچہ کو کنٹھ مالار ہوتا ہے۔ اس کے کان میں مواد ہوا کرتا ہے۔ یہ بیماری اگر بہت دنوں تک آرام نہ ہو تو بہرا پن، اور دوسری خوفناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لئے اسکے بند کرنے کی ترکیب بہت جلد کرنی چاہیے۔ جوان آدمیوں کا کان بہنا آئندہ بہرا ہونے کی علامت ہے۔ بہت لوگوں کا بیان ہے کہ 'میولن آئیل' اس مرض کی اچھی دوا ہے جس کا نام سے مواد بہتا ہو آپس ہر روز 'میولن آئیل' کی قطرے ڈال دینا چاہیے۔

علاج

ڈاکٹر ہاؤٹن کا بیان ہے کہ کیپیکم اس مرض کی بیش بہا دوا ہے۔ کان سے مواد نکلنے پر ہم لوگوں نے کیپیکم ۶، سے اکثر فائدہ اٹھایا ہے۔ گاڑھا اور بدبو دار اور خون نکلنے پر۔ (خاص کر مرض چھوک نے بعد کان پکنے پر) اور ساتھ ہی کان کے چاروں طرف کی گلٹیاں، سوجنے، اور درد کرنے میں، اور ماؤف جگہ میں نوچنے کی طرح درد ہونے میں مرکوریس سول ۶X سفوف دینا چاہیے۔
بغیر بدبو کے تیل پانی کی طرح سیال یا مواد نکلنا (خاص کر خسرہ) یا کنٹھ مالاکے درم کے بعد کان پکنے پر ۳-۶۔ اگر پلس سے فائدہ نہ ہو تو کیلی بائی ۲- سفوف دینا چاہیے۔

پیپ و خون بہنا۔ (خاصکر مری یا پارہ کے غلط استعمال سے بیماری ہونے پر) پیپر سلفر ۶۔ کان میں درد اور پیپ ہونے میں آرٹیکا ۳ X۔ کھانا اور آرٹیکا کا تیل۔ ایک دو بوند کان میں ڈالتا چاہیے۔

اگر زیادہ بدبودار مواد نکلتا ہو تو آرم میٹا لیکم ۶۔ کان کے پیچھے اندر نیچے درد اور سوجن کے ساتھ بدبودار مواد نکلتا۔ (خاصکر جسم میں پارہ کی خرابی رہنے میں) نائٹریک ایسڈ۔ مزمن کان کا بہنا۔ جو بہت کوشش کے بعد بھی آرام نہ ہو تو سلفر ۳ یا کلکیر یا کارب ۶۔ ۳۔ کان کے باہر آماں اور کان کے اندر سے پتلا مواد بہنا۔ سلکا ۳۔ کان میں ہمیشہ تالا بند رہنا۔ (لیکن زور سے آواز ہونے پر یہ تالا کھل جانا۔ کان میں پیٹری وغیرہ علامات کے ساتھ کان سے پتلا مواد بہتا ہو تو سلکا ۳۔ فائدہ کرتا ہے۔

خون آلودہ چپکنے والا بدبودار مواد بہنا۔ گریفٹس ۶۔ بہت بدبودار مواد بہنا۔ سوراخی تم ۳۔ خوب مزمن کان پکنے کی بیماری میں لیوریم ۶۔ فائدہ کرتا ہے۔ مواد خشک ہونے سے اگر بہا رہا ہو تو کچھ روز سلفر ۳ اور فاسفورس ۶۔ یکے بعد دیگرے دینے کے لئے کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں۔

علاج معاون:- کسی تیز دوا کو دیکر مواد بند کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ صاف پانی کا دو گنا دو دھ ملا کر کان دھونا۔ اور پھر بلاٹنگ پیپر (سوختہ کاغذ) سے خشک کر لینا چاہیے۔ اسکے بعد روئی سے ایک دو بوند سٹرا عطر یا کاربوٹک ایسڈ کا لوشن (کاربوٹک ایسڈ ایک ڈرام۔ گلیسرین ایک آؤنس مقطر پانی (DISTILLED WATER) ۵ آؤنس ملا کر لوشن تیار ہوتا ہے) ڈالتا چاہئے۔ اس سے کان خوب صاف رہتا ہے۔ اور پیپ کی بدبو کچھ دفع ہو جاتی ہے۔ پچکاری سے کان دھونا ہی بہتر ہے

۴۵۔ گرین بورک ایسڈ خوب پیس کر رات کے وقت کان میں ڈال دینا چاہئے رات کے وقت کسی طرح پیپ گرنا بند نہ کیا جائے۔

برابر مواد گرتا رہے۔ کوئی نقصان نہیں (۱۰) اور صبح گرم پانی سے کان دھو ڈالنا چاہیے۔

کان کے سوراخ میں پھوڑا

(ABSCESS OF THE MEATUS)

کان کے اندر پھوڑا ٹھنسی ہونے سے کان میں تسپکن، سوجن موتی ہے اور کبھی کبھی کم سنائی دیتا ہے

علاج

سُرخ اور تسپکن کی طرح درد، درد سر، چہرہ تھما جانا، بیلا ڈونا X-1۔
مناسبت پر دینے سے سوزش کم ہو جاتی ہے اور مواد پیدا نہیں ہونے پاتا۔
اگر بل سے فائدہ نہ ہو تو سلکا ۶- دینا چاہیے۔ مواد ہوتا مرکب سول ۶-
پھوڑا پکے پر۔ ہیر سلفر ۶- استعمال سے مواد آسانی سے نکل آتا ہے آرام
ہونے کی حالت میں سلفر ۳- دینا چاہیے۔ شروع میں سینے اور پھر بل دو
تین بوند ایک کپڑے میں ڈال کر کان کے سوراخ میں بیچ بیچ میں رکھنے سے
درد کم ہو جاتا ہے اور پھوڑا جلد اچھا ہو جاتا ہے۔

بہرا پن

(DEAFNESS)

بہرا پن تین قسم کا ہوتا ہے (۱) اعصاب کی خرابی یا جسانی کمزوری
کی وجہ سے (۲) دوسرے دوسرے امراض سے پیدا ہوا اور (۳)
پیدائشی بہرا ہونا۔ اول دو قسم کا بہرا پن علاج سے اچھا ہو سکتا ہے۔
سردی لگنا۔ بیک ایک ادبھی اور تیز آواز کی وجہ سے کان میں قفل پڑنا۔
سر میں چوٹ یا گھونسا لگنا۔ نہانے کے بعد کان کا پانی اچھی طرح پونچھ نہ
ڈالنا۔ یا کان میں سخت میل جھنا، کان کا پکنا۔ دماغ یا گلے کی
کوئی سخت بیماری۔ کسی شدید یا مزمن بیماری کا عرصہ تک رہنا۔ یا کوئین
وغیرہ تیز دھاردوں کے غلط استعمال سے بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے

- علاج مختصر:- (۱) جسمانی کمزوری کی وجہ سے بہراپن (فاس)
 اعصابی کمزوری کی وجہ سے بہراپن:- کیونٹائن سلف X۳۔ سفوف
 (اعصابی یا وقت پیر کا بہراپن) کیلکس X۳۔
 (بہراپن کے ساتھ کلیجہ دھڑکنا) پیٹرولی ایم X۳۔ آر سے نکم البم ۳
 (۲) سردی لگنے سے بہراپن۔ پلس ۳۔ (شدید بہراپن)۔
 کیلی ہائڈرو آکس X۳۔ سفوف یا مرک وائی X۶۔ سفوف (مزمن میں) ڈلکا مارا ۶۔
 برسات کی تر ہوا لگنے کی وجہ سے بہراپن (ایکون X۲۔ (ٹھنڈی خشک ہوا
 لگنے کی وجہ سے) براونیٹا۔ (وجع مفاصل کے ساتھ بہراپن)۔
 (۳) بخار وغیرہ کے ساتھ بہراپن ہونے میں بل ۳۔ (بہراپن کے ساتھ
 سرگھوٹنا) چائنا X۳۔ یا ایسڈ فاس۔ جسم سے خون وغیرہ نکل جانے
 کے بعد بہراپن۔ پلس ۶۔ سلف ۳۔
 (۴) جلد کا پھوڑا وغیرہ دب جانے یا کان کے مواد بند ہو جانے کی وجہ سے
 بہراپن۔ ہیر سلف ۶۔ سلف ۳۔ آرم X۴۔ ۲۰۰۔
 (۵) ورم توزین۔ یا ورم بالائی۔ زبان کی وجہ سے بہراپن ہونے
 میں مرک بن آیوڈ X۶۔ سفوف۔ مرک، کار۔ کیلی ہائڈرو آکس X سفوف۔
 یا ۳۰۔ طاقت۔ براسٹا کارب۔
 (۶) سر میں سخت چوٹ لگنے کی وجہ سے یا بہراپن کے ساتھ
 کان میں سرسری ہو۔ آرنیکا X۳۔
 (۷) کان بچنا۔ (کان میں آواز) نیٹرم سائی لکم ۳۔ (بہراپن کے
 ساتھ بہت زور کی آواز سُننا) نکس ڈامیکا ۳۔ یا اگنیشیا مارا ۶۔
 (بہراپن کے ساتھ سُننے کی تیزی میں) پشیا X۳۔ سفوف۔
 بہراپن کے ساتھ کان میں گرج۔ یا آہستہ آواز سُننا۔ یا جھٹکا لگنا۔
- چند دواؤں کے علامات

شروع بہراپن میں میولن آکیل ۳-۴۔ بوند۔ دن میں دو مرتبہ

کان میں ڈالنا چاہیے۔ یار دلی کر کے رکھنا چاہیے۔ تمام جسم کی
گزوری یا کنٹھ ملا کی وجہ سے بہر اپن میں باجے کی آواز یا دوسری
آوازیں کا سننا۔ یا انسان کی بات نہ سمجھ سکتا۔ اور کان میں ہمیشہ
ایک طرح کی آواز معلوم ہونے کی علامت میں فاسفورس . ۳۔
اجتماع خون کی وجہ سے دوسریں کان میں ایک طرح کی آواز معلوم
ہونے کے ساتھ بہر اپن میں کینٹھ سلف ۳ X - سقوط۔

بہت زیادہ رقت منی کی وجہ سے بہر اپن - سُختے کی طاقت کم ہونے
میں ایسڈ فاس، عرصہ کے بہر اپن میں کان بہنے میں اے پس ۲۔
وزن بڑھنے کے ساتھ بہر اپن میں کلکیر یا فاس ۲ X -

مریض کی اپنی ہی بات اپنے کان میں بازگشت آنے میں یا اپنے کان
میں خشکی محسوس ہونے میں گریفائٹس ۶۔

بخار کے بعد بہر اپن میں گریفائٹس . ۲۰؛ سردی کی وجہ سے شدید بہر اپن
میں؛ ایکونائٹ ۶۔ بیلا ڈونا ۶۔ پلساٹیل ۶۔ اور مزمن حالت میں۔

بیلا ڈونا ۶۔ پلساٹیل ۶۔ سلیکا . ۳۰۔ چائٹنا ۶۔ سلفر . ۳۰۔ یا ایسڈ فاس ۳۰۔
یا ایسڈ فاس ۲۰۔ جوف گوش میں زخم ہو کر اس میں سے اخراج خون بند
ہونے کی وجہ سے بہر اپن ہو؛ سلفر . ۳۰۔ ہیپر سلفر ۶۔ آرم مٹ ۶۔

کاسٹیکم ۶۔ یا انٹیم کروڈ ۶؛ کان میں میل ہونے میں، یا کم سنائی دینے میں
کرن مول، ملاحظہ ہو؛ ٹائٹریک ایسڈ؛ آکسڈائٹ؛ مرک آکسڈ؛ آرم۔
کیسی آکسڈ؛ وغیرہ دوائیں بیج بیج میں ضروری ہو سکتی ہیں۔

بچوں کا کان ملنا یا کان پر مارنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔
نہانے کے بعد کان میں پانی نہ رہنا چاہیے۔

کان میں سخت میل ہونے پر گرم پانی کی پچکاری سے میل نکالنا
چاہیے۔ کان میں ڈالنے والی کوئی دوا نہ دینی چاہیے۔

(امراض کان کے باب اطلاع میں کان کے متعلق کچھ ضروری باتیں

ملاحظہ ہوں۔)

اونچا سٹائی دیتا

(HARDNESS OF HEARING)

سردی لگنا۔ درم گوش۔ کان میں میل جتنا یا مواد ہونا۔ عصبی کمزوری۔ وغیرہ اسباب سے قوت سامعہ کم ہو جاتی ہے۔

علاج

جارے کے دنوں کی خشک ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے ہو تو ایکونائٹ X۳؛ کیموٹلا ۶۔ پلساٹیل ۳؛ یا مرکوریس ۳۔

برسات کی تر ہوا لگنے کی وجہ سے اگر کم سٹائی دے تو ڈنکار ۶۔

درم گوش کی وجہ سے اور کان میں گن گنا ہٹ معلوم ہو تو بیلا ڈونا ۲۔ کاسٹیکم ۶۔ سلکا ۶۔ سلفر ۳۔ کان میں مواد یا زخم۔ یا مواد تکلف یا یکایک بند ہو جانے کی وجہ سے ہو تو ہیر سلفر ۶۔ سلفر ۳۔ پلس ۳۔

مرکوریس ۶۔ کلکیریا ۶۔ میٹالیکم۔ خسرہ وغیرہ۔ ہمیا ریوں کے بعد ہو تو پلس ۳؛ سلفر ۳۔ مرکوریس ۳؛ کاربووج ۳۔ عصبی کمزوری کی وجہ سے ہو تو فاسفورک ایسڈ X۶؛ فاسفورس ۶؛ زیادہ پارہ یا مرکری کے غلط استعمال سے اونچا سٹائی دے تو نائٹریک ایسڈ ۶؛ ہیر سلفر ۶؛ آرم میٹالیکم X۲۔ سفوف۔ ۲۰۰۔ کوئین کے غلط استعمال سے ہو تو کلکیریا کارب ۶۔ بورھوں کے اونچا سٹائی دینے میں پیرولی ایم ۶۔ یا سالی کیوٹا ۳۔ ٹائیٹانیڈ بنجار میں یکایک ہر ہو جانے میں آرج نائی ۶۔ بال کٹوانے کے بعد یا سر میں سردی کے لگنے سے قوت سامعہ کم ہو جائے۔ کیڈم ۶۔ شدید جلدی مرض کے بعد یا خسرہ۔ چچک، یا پارہ کے غلط استعمال کے بعد طاقت سامعہ کم ہو جائے تو کاربووج X۳۔ ۲۰۰۔ دینا چاہیے۔

کان میں میل

(EARWAX)

کان سے ایک چمیز تیل کی طرح نکلتی ہے۔ اور جم کر سخت ہو جاتی ہے اس کو میل کہتے ہیں۔ کان صاف رکھنے کے لئے بار بار کان کریدنے

سے زیادہ میل جمتا ہے؛ کچھ لوگوں کے کان میں میل زیادہ ہوتا ہے اس سبب سے درد ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کان میں میل ہوتا ہی نہیں۔

علاج :- میل جم کر پیپ یا بدبو ہونے پر کیونیم ۲۔ یا کاربووج ۳۰۔ کان بہت خشک اور میل نہ نکلنے پر ٹیکسیس ۶۔ یا میووریاٹک ایڈ ۶۔ یا گریفائش یا پونجیا ۲۲۔ یا سلفر ۲؛ کان کے میل کا رنگ سُرخ ہو تو کو نیم ۶۔ علاج معاون

تین چار روز رات کے وقت کانوں میں برابر نیم گرم تیل ڈالنے سے اور گرم پانی کی پچکاری کے ذریعہ کان دھونے سے میل آسانی سے نکل جاتا ہے۔ رات میں روغن بادام نیم گرم ڈالنے سے نیند بھی خوب آتی ہے۔

کان کا چھپا جھن

(ECZEMA OF EAR)

کان کے ارد گرد کبھی کبھی سُرخ پھنسیاں (یا اگزیمیا) ہونے پر وہ کھلاتا ہے۔ یا پکتا ہے۔ اور کبھی کبھی بہہ رہا پن بھی ہو جاتا ہے۔ علاج :- کان کے پچھے اکوتہ ہونے پر گریفائش ۶؛ پھنسیاں چکنی ہونے پر سیلاڈونا ۳؛ یا پلس ۳۔ چھالے میں راس ۶؛ باورے ور ۳۲۔ مزمن ہو تو آرسن ۳ یا سلفر ۳۰؛ مسرنیم ۲۰۰؛ اور پٹرولیم ۳۰۔ کبھی درمیان میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔

علاج معاون

پچکاری سے کان دھونے کے بعد اسکو اچھی طرح پونچھ دینا چاہیے۔ گھیلا نہ رہ جائے۔ ٹرا عطر روئی میں ڈال کر کان میں رکھنا اور کان کے باہر خاص زیتون کا تیل (OLIV OIL) اکوتہ پر لگانا چاہیے۔ روز نہانا اور آسانی سے منہم ہونی والی چیزیں کھانا چاہیے۔ ہوشیار! زنگ یا گندھک کا مرہم کبھی باہر نہ لگایا جائے۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگزیمیا آرام ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں مرض آرام نہ ہو کر اندر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے عضو پر حملہ

کرتا ہے۔ مریض کی موت تک ہو سکتی ہے۔ ہاں زیتون کا تیل (OLIVE OIL) بغیر کسی اندیشہ کے لگایا جاسکتا ہے۔

کان میں کپڑے وغیرہ کا جل جانا۔ حادثات کے باب میں۔ ٹانگ، آنکھ، اور کان میں کپڑے وغیرہ کا داخل ہونا؛ ملاحظہ ہو۔
امراض کان کے چند دیگر علامات اور ان کے ادویات
انٹم کروڈ۔ کان کے پشت میں تردد آئے ہونا۔

ایٹرنائیٹرک ۶۔ چبالے کے وقت کان میں ایک ایک کی آواز
سنتا۔ قوت سماعت کا گھٹنا۔

لے لیس ۳۰۔ برابر ہر اپن۔ مختلف قسم کے باجوں کی آواز
سنا۔ زمین پر چڑھتے وقت سانس بند ہونا
کیلی بانی کروم ۶۔ یا ہسپر سلف ۶۔ گلے میں زخم کے ساتھ کانوں
میں سوئی چھیننے کی طرح درد۔

کلینڈیولا ۸۔ (پانی کے ساتھ پانچ قطرے استعمال کرنا چاہیے)
نہانے یا دوسرے بیماریوں کے بعد ہر اپن۔
کلکیر یا کارب ۶۔

گریٹاٹس ۳۰۔ ۲۰۰۔ بخار کے (خاص کر تپ سرخ کے بعد ہر اپن۔
چائنا ۲۔ آواز کے ساتھ مختلف قسم کی آواز

(CHIRANTHUS CHEIRI)

کانی ریشم کائی ری

دو قطرے فی خوراک استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ہر اپن نفع ہو جاتا ہے۔
یکووریم ۶۔ ۲۰۰۔ کان میں تپن کی طرح درد ہو۔ ساتھ ہی کھجلی اور آواز
ہو۔ تین چار روز بعد پانی کی طرح بدبودار اخراج ہونا۔ یہ پانی جس
جگہ لگے وہاں کھجلی ہو۔ کان نیل گوں سرخ۔ دیکھنے میں استقرار
کی طرح محسوس ہو۔ سینے کی طاقت کم ہو۔
کھو جسا ۲۰۔ (روز ایک مرتبہ استعمال کیا جائے) کان میں

پھنسی ہو۔ اور پیپ خون نکلتا ہو۔

تھیوسہی-ٹامائن (THIOSINA MINE) X۳۔ کان میں

مختلف آواز جیسے بھوں بھوں، ہنس ہنس، وغیرہ۔

فاسٹو کا X۳ یا لیکس ۶۔ نکلنے کے وقت درد۔

بیلادونا ۶۔ اونچی آواز بالکل برداشت نہ ہو۔

برائٹا کارب۔ قوت سامعہ کی کمی۔ کان کے چاروں طرف

کی گلیٹوں میں درد۔ اور آٹاماس ہو۔

امراض ناک

(DISEASES OF THE NOSE)

التهاب الف۔ ورم بینی۔ ناک کی سوجن (RHINITIS)

ناک کی جھیلیوں کی سوزش میں ناک سوجی گرم اور سرخ رہتا ہے۔
بیلادونا X۱ ۳۔ ایکونائٹ X۳؛ مرکوریس ۳۔ اس مرض کی خاص دوا
ہیں۔ پیپ ہو تو ہیر سلفر ۶۔ مرکوریس ۶۔ کیلی بائی کروم ۳۔

ناک میں سردی زکام

(CORYZA)

ناک کی بلغمی جھیلیوں میں خون زیادہ ہونیکے وجہ سے بلغم کا نام 'زکام' ہے
ایکونائٹ X۳۔ (چھینک۔ ناک کے آگے جلن۔ بخار۔ وغیرہ مرض کے شروع میں
کیمفر۔ (جسم میں سہرا دن محسوس ہو یا سردی کا درجہ مذکورہ بالا علامات۔
ایکون کے نمودار ہونے کے پہلے پانچ دن منٹ کا وقفہ دیکر پانچ یا چھ مرتبہ
استعمال کرنے سے مرض کا زور کم ہو جاتا ہے)
ایلیم سیپا X۱ ۳۔ ناک سے بہت پتلی تیز خراشیں پیدا کر نیوالی
رطوبت نکلتے ہیں۔

آرسنک X۳۔ ناک سے آنکھوں سے تیلی رطوبت نکلتے پر بھی

بیج بیج میں ناک بند ہو جاتا۔ ملیس ۳۔

(دیکھا ہوا بلغم؛ زرد رنگ کی پیپ کی طرح بلغم۔)

نکس و امیکا ۶۔ (رطوبت کا اخراج بند ہو کر چپک جانا۔ درد سر۔
قبض۔ دہن میں ناک سے رطوبت جاری ہونا۔ اور رات میں کھلی ہوا میں بند
ہو جانا۔ وغیرہ۔ شدید زکام کے علامات کی خاص دعا ہے) (فرمن زکام میں
کیلی بائی X۳۔ سفوف ۳۔ (سبز سخت رطوبت میں) اور کلگیر یا کارب ۶۔
(بدبودار رطوبت میں فائدہ مند ہے۔ اور دیگر علامات اور دواؤں کے لئے
نظام تنفس کے امراض میں) حاد اور فرمن زکام، ملاحظہ ہو۔
مرض کی حالت میں ہلکی غذا دینی چاہیے۔ مرض کم ہونے کی حالت میں
کھلی ہوا میں ٹہلنا۔ اور صبح ٹھنڈے پانی میں تہنا نامفید ہے۔

سُرخ بینی۔ لال ناک

(FLUSHING)

ناک کا باہری حصہ سُرخ ہونے میں بیلاڈونا X۳ (ناک کے باہری
حصہ کے شدید سوزش میں) سلفر X۳۔ (ایسی سوزش میں جو بہت
تیز نہ ہو)۔ آرم میوور X۳۔ یا فریلوک ایسڈ ۳ (فرمن سوزش میں)
لے پس X۳۔ (بعد غذا ناک سُرخ ہو)۔ یوریکس ۳۔ (جوان
عورتوں کی ناک سُرخ ہونے میں)

ناک میں پیسے بھری پھنسیاں

(PUBTULE)

ناک میں پھنسیاں، جن میں مواد ہو۔ پیرولیم ۳۔ اچھی دوا ہے

ناک کی جڑ (ROOT) کے امراض

ناک کی جڑ میں دباؤ ہو تو کیلی بائی ۳۔ درد سر کی وجہ سے ناک کی جڑ
میں بوجھ محسوس ہونے کی علامت میں کیپاسیکم ۳۔

ناک کے آگے کے حصہ کے مرض میں

ناک کی نوک میں پھنسیاں ہوں۔ امین کارب ۳۔ پھنسی میں مواد۔

ہو، کیلی بروم x۳۔ کھجور جس میں تیز درد ہو۔ بوریکس ۳۔ سرخی کے ساتھ دیاو
محسوس ہو، کیلیکم ۳۔ کھجلائے اور سرخ ہونے میں سلیکا ۶۔ جلن کی علامت
میں ایکڑ ایکٹریٹ ۳۔ کھجلائے اور اکڑنے میں کاربو اینی ۶۔

ناک کا زخم یا درد

(SORENESS)

درد کی علامت میں گریفا کا اندرونی استعمال اور گریفا کا مرہم
بیرونی استعمال میں مفید ہے۔ (رات کو سوتے وقت ناک کے سوراخ میں مواد
درد یا ایسی پھنسی ہونے میں جس میں مواد ہو، کیلی بائی x۳۔ سفوف۔

ناک کے سوراخ میں کیسٹرا داخل ہونا

ناک کے سوراخ میں کیسٹرا یا کوئی چھوٹی چیز عرصہ تک پڑے رہنے پر ناک کے
ایک سوراخ سے بدبودار رطوبت نکلا کرتی ہے۔ پچکاری وغیرہ سے نکلنے کی
کوشش نہ کرنی چاہیے۔ کان کڑیدنا۔ جھٹی یا کوئی پھندا وغیرہ بنا کر آہستہ
آہستہ اس کو پھینچ لینا چاہیے۔ (خبردار یہ سب چیزیں ناک کے سوراخ میں
زیادہ نہ داخل کرنا چاہیے۔)

پنیس

(OZAENA)

ناک کی بلفی جھلی میں زخم ہو کر بدبودار مواد یا خون آلودہ بلغم یا رطوبت نکلتی
ہے۔ ناک کی جھلی کا پتلا پن اور نتھنے میں کیسٹرا ہونا۔ اس کی خاص علامت یہ ہے
اس مرض کے ہونے میں ناک کی بڑھی صنایع ہو کر قوت شامہ زائل ہو جاتی ہے۔
پارہ کا غلط استعمال، آتشک کا زخم، مزمن زکام۔ چوٹ نتھنے میں
تھپکر کے درات کا جانا۔ حنا ندانی پارہ کی خرابی۔ جسم کمزور ہونا وغیرہ
اسباب سے یہ مرض ہوتا ہے۔

علاج:- مرض نمودار ہونے پر کیسٹیم سلف x۳۔ سفوف ۳۰۔
ناک سرخ اور سوچی۔ یا ناک کے سوراخ میں گرمی۔ اور تھوڑا تھوڑا

درد۔ یا زردی مائل بدبو دار پیپ نکلتا۔ کبھی کبھی خشک پیپ ملی و طبیعت غیرہ علامات میں آرم میٹ ۶۔ (شدید زکام میں) ناک سے بہت پانی بہتا۔ یا ناک کا بالائی حصہ سرخ ہوتا۔ اور درد کرنا۔ اس کے بعد ناک سے بعد بیچ کا حصہ بیٹھ جاتا۔ اور قوت شامہ کا زائل ہوتا۔ اس میں سے پیپ آلودہ۔ اخراج۔ یا گوشت کے دھوڑن کی طرح بدبو دار اخراج وغیرہ علامات میں کیلی بائی کروم ۳۔ x۔

پارہ کے غلط استعمال کی وجہ سے، یا آتشک کے بعد والدین میں پارہ کی خرابی کی وجہ سے پنس کی بیماری ہونے پر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سوزش اور آماس ہو۔ اور ناک سے بدبو دار پیپ یا بظہم ملا مواد نکلنے پر۔ ایپٹائٹریک ۶۔ بہت گرمی اور جلن کے ساتھ ناک سے پانی کی طرح پیپ نکلنے پر۔ اور اس کے ساتھ چھینک اور آواز بیٹھ جانے وغیرہ علامات میں (مزمن زخم ناک) آرنک ۳۔ ۳۰۔ سفلی نم ۲۰۰۔ آیوڈیم ۳۔ (زیادہ بدبو اور سرد زخم) مارک بن آیوڈ۔ سنگو نیریا۔ اسٹکینیا۔ (خشکی زک) ساکھے۔ (لگاتار چھینک) ہامایلس ۶۔ مورٹیم ۳۔ کلیریا کارب ۳۔ مرکیورس ۳۔ ایومنا ۶۔ سنگو نیریا x ۶۔ پلساٹیل ۶۔ سائی کلیمن ۳۔ ۳۰۔ ۱۔ اور آرم میٹ ۳۔ x ۳۔ کی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

علاج معاون

نچھتے صاف رکھنا چاہیے۔

گرم پانی میں کھوڑا نمک ملا کر اس پانی سے مریض کے ناک اور منہ کو دھو دالنا چاہیے۔ یہ بہت مفید اور کارآمد ہے۔

نکسیر ناک سے خون گرنا

(EPISTAXIS)

یہ مرض اگر معمولی ہو تو دوا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن بار بار یہ مرض ہو تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ خون ہمیشہ ایک ہی طرف کی ناک سے نکلا کرتا ہے کبھی کبھی یہ خون

خون ناک سے نہیں نکلتا بلکہ نرخرہ یا حلق یا معدہ میں آجاتا ہے۔ ناک میں یا سہ میں
 چوٹ لگنا۔ دماغ میں خون کی زیادتی یا زور کی چوٹ لگنا۔ آتش کی خسرانی
 یا محنت اور کھانسی کی وجہ سے ناک سے خون نکلنا ہے۔ کبھی کبھی حیض بند
 ہو کر بوا سیر کے مشہ سے خون نکلتا بند ہو کر ناک کے راستے سے خون
 نکلنے لگتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید اور کارآمد ہیں۔
 نسیم آیوڈائنڈ ۳ x سفوف۔ یا ملی فولیم ۸-۳۔ یا امبرا گریٹیا۔
 فی خود آگ دس قطرے خون نکلتے وقت اور بعد کو استعمال کرنا چاہیے۔
 یہ اس مرض کی بہت اچھی دوا ہے۔ کچھ لوگ نیٹرم نائیٹرکیم ۳ x سفوف۔
 ناک سے خون گرنے کی معقول دوا ہے۔

برابر جاسوا خون۔ اخراج خون ہونے میں ہی میلس ۱ x۔ کے اندرونی
 استعمال اور دو تین قطرے ناک میں ڈالنے سے خون بند ہو جاتا ہے
 دماغ میں خون کی زیادتی کی وجہ سے اخراج خون بند ہو تو ایکونائٹ ۳ x-
 بیلاڈونا ۳ x۔ جلس یا اورا ٹرم ورائڈ ۳ x-۔

گم زوری کی وجہ سے ہو تو ایکونائٹ ۳-۲۰۔ شراب وغیرہ پینے یا بدہضمی
 کی وجہ سے اخراج خون ہو تو نکس و امیکا ۱ x-۶۔ سٹرنے سے ٹیکس ۶-۱۳۔
 یا آرسنک ۳-۳۰۔ حیض کے بعد یا بوا سیر کے مشہ سے خون بند ہو کر ناک سے
 گرے تو پلس ۶-۔ یا سلفر ۳۰-۳۔ یا پوڈو ۶-۔

سر یا ناک میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اخراج خون ہو تو آرنیکا ۳ x-۔ رک رک
 کر جلد جلد اخراج ہو تو چائنا ۶- یا کاربوونج ۱۰-۱۲۔ آواز وغیرہ کے علامات کے
 ساتھ اخراج خون میں سیکیل ۳-۔ سر میں تپک کا درد اور اخراج خون میں بیلاڈونا ۳-۔
 ادویات مذکورہ بالا میں سے اگر کسی وجہ سے مرض تھوڑا بھی ہو تو فریم پیکریم ۲ x-۳ x-
 کے استعمال سے بقیہ مرض بھی آرام ہو جاتا ہے۔

علاج معاون

ہی میلس مدرٹن کچر کے دو تین قطروں کی ناس لینے سے ہلکا اخراج
 خون اکثر بند ہو جاتا ہے۔ معمولی گرم پانی میں تھوڑا نمک ملا کر

اس سے ناک دھونے سے ناک کی پیسٹری باہر نکل آتی ہے۔ اور کبھی کبھی خون گرنا بند ہو جاتا ہے۔ سر کے بالائی حصہ میں دونوں ہاتھ اوچھا رکھنے سے خون گرنا بند ہو جاتا ہے۔ منہ بند کر کے ناک سے سانس لینا اچھا ہو جاتا ہے۔ گردن اور ناک کی جڑ میں اور تیز جریان خون میں ریڑھ پر برف یا ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو آلہ تناسل پر برف یا سرد پانی رکھنا چاہیے۔ اس سے تھوڑی دیر کے لئے تو اخراج خون ضرور بند ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی اگر فائدہ نہ ہو اور مریض کے جلد مر جانے کا اندیشہ ہو تو لٹنٹ (LINT) یا خوب ملائم کیڑے کی پولٹی بنا کر ناک کا سوراخ خوب بند کر دینا چاہیے۔

خالی سرسوں کے تیل کا ناس لینا یا سرد پانی میں نہانا۔ ہلکی اور تھوپی غذا وغیرہ فائدہ مند ہے۔

نشہ یا غذا اور مشروبات محرکہ کا کھانا پینا۔ زیادہ پڑھنا۔ لکھنا یا محنت کرنا منع ہے۔

ڈاکٹر ہیزنگ کا بیان ہے کہ مریض کے فائدہ ہی کے لئے نیچر خون نکالتے دیتی ہے۔ نیچر کے ذریعہ خون نجات کا فعل ہے اسلئے خون گرنے کو کبھی بھی بند نہ کرنا چاہیے۔ اگر چوٹ وغیرہ کی وجہ سے خون گرنا یا کسی وجہ سے زیادہ اخراج ہو تو دوا دینا چاہیے۔

تپ سوزش بینی

INFLAMMATORY SWELLING AND REDNESS
OF THE INTERNAL NOSE WITH FEVER

جوف بینی ناک کے سوراخ میں لہسن یا پیاز کے خول کی طرح ورم کرنے کو سوزش بینی کہتے ہیں۔ یہ ناک کے ایک یا دونوں جوف میں ہو سکتا ہے اس مرض کے ہونے کے پہلے اکثر سردی ہوتی ہے۔ بیشتر وع میں گردن میں تھوڑا تھوڑا درد۔ اس کے بعد تمام جسم میں درد آگھیں

اور چہرہ سُرخ، بخار، بسم میں جہن، وغیرہ علامات ہونے میں یہ مرض یکایک شروع ہو جاتا ہے۔ اور یکایک کم ہو جاتا ہے۔ فوراً تکلیف دور کرنے کے لئے اندرونی متورم جگہ کو جو پیاز کی طرح آہستہ کر جاتا ہے۔ سوئی سے توڑ دیتے ہیں۔ اسے ترکیب سے تو وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بار بار مرض کا حملہ ہونے سے مرض بڑھ سکتا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل ادویات کو استعمال کر کے مرض کو جڑ سے نابود کر دینا چاہیے۔

بیلڈ ونا ۱۰۔ اور سنکو نیو ۱۸۔ اس مرض کی تخصیص دوائیں ہیں۔
کچھ لوگ ان دونوں دواؤں کو یکے بعد دیگرے استعمال کر کے مفید بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ کلکیر یا کارب ۳۰۔ اور میلیوٹس ایاب ۳۰۔ اس بیماری کی اچھی اور کارآمد دوا ہیں۔

کیڈیم سلف ۳۰۔ بدبودار اخراج؛ ناک نہ سکڑنا وغیرہ علامات میں۔
ٹاسفورس ۳۰۔ چھوٹے ہی سے اخراج خون ناک سے سبز یا زرد بلغم نکلنا۔
وغیرہ علامات میں۔ سورنیم ۳۰۔ مزمن اخراج محسوس ہونا۔ کمزوری
وغیرہ علامات میں۔

قوت شامہ کا زوال یا خرابی

دوسرے مرض (خاص کر مزمن سردی) کی وجہ سے یہ علامت ہوتی ہے۔
سردی لگنا یا وضع مفاصل کی وجہ سے شدید بیماری میں ایچون کارب ۳۰۔
فائدہ کرتا ہے۔ قوت شامہ کی مزمن بگڑی حالت میں پلساٹیل ۱۰۔
مرک ۱۰۔ سفوف یا سلف ۳۰ اکثر فائدہ کرتا ہے۔

کیلک کارب ۳۰۔ پیاجنس۔ کیلی بائی۔ کیلی آئیوڈ کی بھی کبھی
بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

(NASAL) POLYPUS

ناک کی بواسیر

نتھے کی باغی جھٹلی سے ناک کی بواسیر پیدا ہوتی ہے۔

یہ مٹہ متورم اور بلغمی جھلتی مجموعہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ مٹہ اکثر شمار میں زیادہ چکنے، نرم، نیلگوں سفید اور ادھر ادھر شے والے ہوتی ہیں کبھی کبھی ان میں مواد پیدا ہو جاتا ہے۔ ناک سے بولنا منہ سے سانس لینا منہ کھلا رکھنا پستلی چیز نگھانے میں تکلیف۔ ماؤف ناک کا باہری حصہ بڑھ جانا۔ ناک صاف کرتے وقت ناک کا مٹہ۔ نتھنے کے پاس تک جھک آنا۔ اور سانس بند ہو نا وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

علاج

فارمکار وفا ۱-۱۔ ڈاکٹر کوپر کی رائے ہے کہ ناک کی بوا سیر کی اس سے بڑھ کر دوسری دوا نہیں ہے۔ یہاں پر تھو جا۔ ۳ کا اندرونی استعمال اور تھو جا ۸ کو مسوں پر برابر لگانا فائدہ کرتا ہے۔ اگر مٹہ سے خون نکلتا ہو تو فارس ۳، مزمن مرض میں سورنیم ۲۰۔ ٹیو کریم ۱-۱۔ اندرونی استعمال کرنا چاہیے۔ سنگو نیر یا ۱-۱۔ اور ٹیو کریم ۵۔ لگانا چاہیے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سنگو نیر یا ۱-۱۔ کا اندرونی استعمال اور سنگو نیر یا کے سفوف سے بیرونی استعمال سے اکثر فائدہ ہوتا ہے کلکیر یا کارب مرک آیرڈ ایڈ کیلی بائی۔ اور ادنی ایم۔ وغیرہ ادویات کی بھی آزمائش کرنی چاہیے۔ ضرورت پر نشتر بھی دیا جاتا ہے۔

ناک اور حلق کے تسج کا بڑھنا

(ADENOIDS)

اس مرض میں ناک اور گلے کے غدود سے ملے ہوئے تسج بڑھ جاتے ہیں۔ لوز تین کا ورم۔ یا حلق کی سوزش یا زکام کی وجہ سے یہ مرض بنا رہتا ہے۔ پانچ برس کی عمر سے پندرہ برس کی عمر تک برابر یہ مرض بڑھتا ہے۔ اس کے بعد بڑھنے کے عوض ڈیلاپن بھی معلوم ہوتا ہے۔ ناک سے سانس نکالنے میں تکلیف۔ منہ سے سانس لینا اور نکالنا۔ سردی ہونا۔ کان میں درد۔ کان میں پیپ کچھ نہ کچھ بہنا وغیرہ اس مرض کے مخصوص علامات ہیں۔

براٹھا کارب۔ کلکیر یا کارب۔ ۳۰۔ فاس۔ ۶۔ میٹرم میو۔ ۳۰۔ پلساٹیل۔ ۳۰۔
 سلف۔ ۳۰۔ امونیم کا۔ ۳۰۔ وغیرہ اوریات علامات کے موافق دی جاتی ہیں۔
 خاص خاص امونیموں پر زہتر بھی لگوا یا جاسکتا ہے۔ منہ بند کر کے ناک سے
 سانس لینا۔ مقوی غذا اور کھلی ہوا اور سورج کی روشنی میں گھومنا وغیرہ
 اور صحت کے اصول کی پابندی کرنا لازمی اور ضروری۔

ناک کے امراض کی علامات اور دوائیاں

۱۔ اورم مٹ ۳۰۔ سفوف۔ بدبودار سٹرا ہوا خون آلودہ اخراج اور
 اس کے ساتھ ہی ناک کی بڑی کاکھچلا مایا زخم۔
 ۲۔ آر جیم نائٹ ۶۔ کھچلا نا اور ذرا بھی رگڑنے سے خون گرنا۔
 ۳۔ آر نیکا ۳۰۔ رگڑنے یا چوٹ کی وجہ سے ناک سے خون گرے۔ ضرورت پر چوٹ
 والی جگہ پر آر نیکا ۸۔ دبیس گنا پانی ملا کر سے دھونا چاہیے۔
 ۴۔ ایلیٹیم سییا ۶۔ ناک سے پانی کی طرح جلن پیدا کرنے والی بہت رطوبت
 نکلنا۔ گرم اکڑنے میں جانے سے چھینک آنا۔
 ۵۔ ایگاری گس ۶۔ بوڑھوں کی ناک سے اخراج خون میں۔
 ۶۔ ایون کارب ۶۔ رات میں ناک بند ہو جانے کی وجہ سے سانس لینے میں
 تکلیف۔ ناک میں زخم۔ خون آلودہ بلغم کا اخراج، ناک کی نوک سرخ۔ صبح منہ
 دھونے کے وقت ناک سے خون گرنا۔
 ۷۔ یوفریشیا ۱۔ جلتے ہوئے آنسو کے ساتھ بلغم نکلنا
 ۸۔ ایس ۳۰۔ ۳۰۔ ناک پھولنا۔ اور سرخی۔
 ۹۔ کاربووی ۶۔ ناک کے راستہ عرصہ تک جریان خون کئی ہفتہ تک
 روزانہ کئی مرتبہ جریان۔ چہرہ زرد۔

نوٹ ۱۔ ناک کے پیچھے اور حلق کے پیچ میں جذب کرنے والی شے
 کا انگریزی نام (SPONGE) انڈی ناس ہے۔

کیلی آیوڈا۔ ۳۔ زکام جلتا ہوا پانی کی طرح احسراج۔ اور ساتھ ہی ناک کی جڑ میں درد۔

کیلی بانی۔ ۳۰۔ زردی مائل بدبودار اخراج باغم نکلتا۔ ناک میں زخم۔ قوت شامہ کاکم ہونا۔ یا بالکل زائل ہو جانا۔

کیکسٹس اید۔ قلب کی بیماری کے ساتھ ناک سے خون گرنا۔

کلکیریا کارب۔ یونیکم ۶۔ ۳۰۔ بدبودار اور زرد رطوبت ناک میں بدبو۔ بو معلوم نہ ہوتا ہو۔

کروٹیلس ۳۔ ناک اور جسم کے دوسرے اعضا سے خون بہنا۔

جلس ۱۷۳۔ زکام میں پانی کی طرح رطوبت کے ساتھ لرزہ اور خارش ٹیو کریمی ۶۔ عینک لگانے کی وجہ سے ناک میں کوئی خرابی ہونے میں منتخب عمدہ عینک لگانے پر بھی اگر ناک میں کوئی خرابی ہو تو یہ بہت اچھی اور کامیاب دوا ہے۔

نکس و امیکا ۳۔ ایک ناک بند ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ناک سے رطوبت گرتی ہے اور رات میں بند ہو جاتی ہے۔ جلن پیدا کرنے والی رطوبت۔

پلسا میٹلا ۳۔ زردی مائل سبز رنگ۔ اخراج قوت ذائقہ اور قوت شامہ کاکم ہونا۔ گرم کمرہ میں سانس بند ہونا۔

مرکیوریس ۳۔ پیپ کی طرح گاڑی سبز رنگ کی رطوبت نکلتا۔ ناک کی بندھی میں زخم۔

ستاس ۳۔ لگاتار ناک کھجلا نا۔ مریض ناک کی وجہ سے گھبرا یا ہوا رہتا ہے۔ جب تک اس سے خون نہیں کرتا ہے۔

سی پیاس ۳۔ بارھوں مہینہ (ہمیشہ) جس ناک سے پانی کی طرح رطوبت اور بلغم نکلتا ہو۔

ہائڈراکسٹس اید ۳۔ پانی کی طرح زردی مائل سبز گاڑھی بدبودار رطوبت جہاں لگتی ہو۔ وہاں کی کھال اُدھرتی ہو۔ بلغم گلے میں گرتا ہو۔ عاجز الفنی۔ یا ناک کا درمیانی

پروہ (SEPTUM) میں زخم۔ سپر سلفر۔ ناک کے زخم میں

امراض نظام دوران الدم

(DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM)

دل اور عروق دمویہ: سینہ کے گڑھے کے ٹھیک پہنچ پہنچ سینہ کی
بڑائی کے پچھ اور دونوں پھلیپھروں کے پہنچ میں دل (HEART) یا کلیجہ
ہے۔ اس کا اگلا حصہ (APEX) ہمارے جسم کے دائیں طرف اور
نیچے کا حصہ (BASE) بائیں طرف لٹکا ہوا ہے۔ (تصویر ملاحظہ ہو۔)

یہ دل ایک پھولی ہوئی چیز ہے جس کا اندر دنی حصہ ہمیشہ خون سے
بھرا رہتا ہے۔ دل کے بائیں حصہ میں جو خون رہتا ہے وہ ہمیشہ صاف
اور دیکھنے میں سُرخ معلوم ہوتا ہے۔ دائیں حصہ میں جو خون رہتا ہے
وہ خراب دیکھنے میں سیاہ یا سیکنی رنگ کا۔ دل سے بہت چھوٹی۔ چھوٹی
نسیں (عروق) نکلی ہیں۔ انھیں عروق کے ذریعہ دل جسم کے تمام حصوں
میں پہونچایا کرتا ہے۔ اسلئے اس کا نام عروق دمویہ: یہ خون
لے جانے والی نسیں (Blood VESSELS) ہے۔ ان خون لے
جانے والی نسیں میں کچھ کا نام شرا، کچھ کا نام ورید ہے۔ اور چند
کا نام "عروق شریہ" ہے۔ جس نس میں خون سُرخ ہوتا ہے اس کو شرا
(ARTERY) جس میں بیگنی اور سیاہی مائل خون ہوتا ہے اس کو
ورید (VEIN) اور بال سی باریک نسیں جو شرا اور ورید کو ملاتی
ہیں۔ ان کو عروق شریہ (CAPILLARIES) کہتے ہیں۔ "شرائین"۔ دل
سے خون لیکر پھیپھڑے میں اور جسم میں اور تمام جگہوں میں پہونچاتی
ہیں۔ وریدیں پھیپھڑے اور جسم کے دوسرے حصوں میں سے میلا
خون لوٹاتی ہیں اور عروق شریہ شرائین وریدوں میں خون پہونچانے
میں ہلکا کام دیتی ہیں۔ قریباً ہر سکند میں ایک قطرہ
خون دل سے نکل کر شرائین عروق شریہ اور گردنیں خون

وریدوں وغیرہ سے ہو کر جسم کو گل جگہوں میں جیکڑ لگاتا ہوا دل کے اسی مقام پر لوٹ آتا ہے۔ اس طرح خون کے دوران کو گردش خون کہتے ہیں۔ اور یہ کام ہمارے جسم میں برابر ہوا کرتا ہے۔ سینہ کے بائیں طرف دل کے اوپر، ماتھ یا کان رکھنے سے کلیجے کی دھڑکن اچھی طرح محسوس ہوتی ہے۔ یہ آواز ٹھیک برابر ہوا کرتا ہے۔ پہلی آواز کچھ دیر تک دوسری ضرب اس سے تیز اور پھر خاموشی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح تال کے مطابق چال شروع ہو جاتی ہے۔ گویا، لپ، ڈپ، لپ، ڈپ، آواز ہوتی ہے پھر بند، پھر لپ، ڈپ، آواز؛ پھر خاموشی۔ اسی طرح زندگی بھر سوتے جاتے گل حالتوں میں دن رات دل کی ضرب برابر ہوا کرتی ہے۔ اگر لپکا یک جسم کی کوئی شراکت جائے تو سرخ رنگ کے خون کی دھار برابر یکساں نہ نکل کر رک رک کر تیزی سے یا جھونکے سے باہر نکلتی ہے یہ بھی دل کی ہر تڑپ یا چال کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ورید کٹ جائے تو سیاہی مائل جریان جھونکے سے یا تیر کی طرح تیزی سے نکل کر آہستہ آہستہ یکساں نکلتا ہے۔ یا قطرہ قطرہ ٹپکا کرتا ہے۔ اس کا بھی سبب ہے کہ شرائین کے ساتھ کلیجہ کی چال ملتی ہے۔ لیکن ورید کے ساتھ دل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

شرائین کی تڑپیں دل کی تڑپیں کی طرح ہے۔ جس طرح جھونک کے ساتھ خون کا دور شرائین میں ہوتا ہے۔ شرائین کی تڑپیں بھی دل کی تڑپیں کی طرح ہوا کرتی ہے۔ اسلئے شرائین میں جو تڑپیں معلوم ہوتی ہے۔ اس سے دل کی پوری پوری حالت دینے دل کی تڑپیں کا ثمرہ) اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ماتھ کی کلائی میں پیر کی ہڈی کے پاس گلے میں۔ سر کی رگوں میں یا جلد کے پاس جو لسنیں ہیں انھیں چھونے سے سیاہیوں کی شرائیں یا نبض کی تڑپیں محسوس ہوا کرتی ہے۔

طیب یا معالج ہمیشہ مریض کی کلائی سے شرائین کی تڑپیں معلوم کیا کرتے ہیں۔ اسی کا نام نبض دیکھنا ہے۔

ہمارا کتاب موسومہ نزویہ پرچے، ملاحظہ ہو۔ وجہ مفاصلی بخار زیادہ
جسمانی یا دماغی محنت و پریکشی برائے نام آرام کرنا وغیرہ اسباب سے
جوانوں کو بھی آج کل دل کی بیماری ہوتے ہوئے دیکھیں جاتی ہے اور الفلوئینزا
گردہ کی بیماریاں، اتھیر و مائنام کی تھوڑی وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہونے سے
بوڑھے آدمیوں کو بھی دل کی بیماریاں ہو جاتا کرتی ہے۔

نبض (PULSE)

نبض کی چند حالتیں

نبض کا امتحان :- نبض دیکھنے کے بارے میں اوپر بیان کیا گیا
ہے۔ ہاتھ کی کلائی کے یا من جو شرا کے اندر سے دل سے خون بہتا ہے اسی
شرا کو لوگ معمولی طور سے نبض (PULSE) کہتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں
کہ مرض کی تشخیص کے لئے نبض دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن بغیر عرصہ کے
تجربہ اور مشق کے کسی کو نبض کا اچھا علم نہیں ہو سکتا۔ انگوٹھے کے اوپر ٹھیک
باقاعدہ کلائی کو چھونے سے نبض ضرب یا تڑپیں محسوس ہوتی ہیں تین انگلیوں
سے کلائی ذرا دبا کر بہت ہوشیار قلب سے نبض دیکھیں جاتی ہے نبض دیکھتے وقت

۱۔ نبض دیکھنے کا طریقہ کتاب موسومہ ناڈی پرکاش، اس کتاب میں اسی طرح درج ہے
نبض دیکھتے وقت معالج اپنے بائیں ہاتھ پر دھکیں کو دھک کر دھکیں کی نبض دبا کر اپنا ہاتھ تھوڑا اٹھایا
دھک کر دائیں ہاتھ کی دوسری اور تیسری اور چوتھی انگلیوں (یعنی پچ کی انگلی اور اس کے دائیں
بائیں کی انگلی) سے دھکیں کے انگوٹھے کی دھکا کا نیچے والا حصہ جہاں چھوٹی گرہ ہے۔ اس کے
کینچے سے دو انگلی کی (یعنی دو جو کی لمبائی کی) جگہ پر نبض دیکھیں۔

ہمارے ناظرین جو اچھی طرح علم نباضی جانتا جانتے ہیں ان کو ہم مندرجہ ذیل دو کتابیں
پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں ۱۔ ناڈی و گیتا نم مہنت کڑ اور ۲۔
(۲) ناڈی پرکاشم۔ مصنف رشتہ کر سین۔

نبض کے ہاتھ کی کوئی جگہ نہ دے۔ یا بند نہ ہو جائے نبض دیکھنے کے وقت نبض کی چال کی منت، نبض کے قریب کے ضرب کا شمار ضرب کی چال دینے ایک ضرب کے بعد دوسرا باقاعدہ ہوتا ہے۔ یا نہیں۔) طبعی (یعنی نبض کا پُر سخت ہیں یا نرم صغیر عظیم یا بڑی تھرائی؛ وقفہ، غائب ہونا وغیرہ) نبض کی علیحدہ علیحدہ حالتوں کے علاوہ بر خالص نگاہ رکھیں۔

مختلف حالتوں کی نبض

نبض دیکھنے کے وقت انگلی رکھنے پر مر لیں کی نبض موٹی ہو تو اس کو نبض ممتلی یا پُر (FULL) کہتے ہیں یا موٹی ہو تو اس کو نبض عظیم (LARGE) کہتے ہیں۔ بہت پتلی معلوم ہو تو اس کو نبض صغیر (SMALL) بہت پتلی، یعنی سوت کی طرح پتلی معلوم ہو تو اس کو نبض خالی، (THREADY) سخت، معلوم ہو تو اس کو نبض صلب، (HARD) نرم معلوم ہو تو نبض لین (SOFT) طاقتور معلوم ہو تو نبض قوی، (STRONG) کمزور معلوم ہو تو اس کو نبض ضعیف (WEAK) کلائی میں نبض بالکل ہی نہ معلوم ہو تو اس کو نبض ساقط، (PULSELESS) انگلی کے دبائے ہی سے اگر نبض کا ضرب ہو جائے تو نبض نحیف، (COMPRESSIBLE) انگلی کے دبائے سے اگر نبض بند نہ ہو کر چلتی رہے تو اس کو نبض غیر نحیف، (INCOMPRESSIBLE) نبض کی ضرب تیز معلوم ہو تو نبض سریع، (QUICK) نبض کا ضرب آہستہ آہستہ ہوتا ہو تو نبض بطی (SLOW) نبض کی چال یکساں ہوتی رہے تو اس کو نبض مستوی یا یکساں نبض (UNIFORM OR REGULAR) نبض کی چال یکساں نہ ہو تو نبض غیر مستوی (IRREGULAR) نبض چلتی چلتی کچھ دیر کے لئے اگر اس کی چال رک جاتی ہو تو وقفہ دار (INTERMITTENT) نبض نبض جھوٹا دیتی ہو۔ (یعنی معالج کی انگلیوں سے زور سے جھٹکا دیتی ہو) تو اس کو نبض مسرتی یا ہتھوڑا (JERKING) انگلی رکھنے سے اگر مر لیں کی نبض کا نبض ہو تو اس کو لرزتی نبض

(TREMULOUS) معالجہ کی انگلیوں میں دھڑ دھڑ و مرتبہ نبض کی چال معلوم ہوتی
اسکو صغیر الوزن یا نبض مجاور الوزن (DICROTIC) کہتے ہیں۔

تندرست اور مریض نبض کے علامات

حالت صحت کی نبض :- صحت کی حالت میں نبض بہت کچھ مستحکم

(MODERATELY FULL) مستحکم (UNIFORM) اور بھلی یعنی

انگلی کے نیچے آہستہ آہستہ چلتی ہو (SWELLING SLOWLY UNDER THE FINGERS)

عورتوں اور بچوں کی نبض بہ نسبت مردوں کے زیادہ تیز رہتی ہے۔ بوڑھاپے کی نبض

سخت ہو جاتی ہے۔ مختلف عمر میں نبض کی ترقی یا ضرب فی منٹ اکثر مندرجہ ذیل

ہوتی ہے وقت پیدائش ۱۴۰ ضرب۔ بہت بچپن میں ۱۲۵۔ بڑھاپے میں ۱۰۰

جوانی میں ۹۰۔ اور اوسط عمر میں ۷۵۔ بوڑھاپے میں ۷۰۔ بہت بڑھاپے میں

۶۵۔ ضرب نبض کا بیان ملاحظہ ہو۔

حالت مرض کی نبض

حالت صحت میں نبض جس طرح مستحکم مستوری اور بھلی ہوتی ہے اس میں نقص

ہونے سے نبض بیمار ہو جاتی ہے۔ (آگے کا مقصد ملاحظہ ہو۔)

نبض سے ہماری کیفیت دل معلوم ہوتی ہے

موجودہ تلاش علم سے یہ بلا شک و شبہ طے ہو گیا ہے کہ ہماری نبض ہمارے

دماغی حالت کے تابع ہے۔ یعنی انسان کی طبیعت اپنے جسم کے دوران

خون کو قابو میں رکھ سکتی ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ ایک تختہ کے بیچ میں ڈورا

باندھ کر اس طرح لٹکا دیا جائے کہ وہ ذمیں کے ساتھ متوازی (PARALLEL)

رہے اور یہ بھی فرض کیجئے کہ اس تختہ پر کسی آدمی کو لٹا کر فیتے

سے تختہ کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے۔ اس حالت میں

اگر یہ آدمی پیر کی بات پر غور کرے۔

دیکھ اپنی قوت خواہش کی مدد سے اپنے جسم کے خون کا دور پیر کی

طرف لے جائے تو اس کے سر کی طرف تختہ جھک جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے سر کے بارے میں غور کرے۔ یعنی اپنی قوت خواہش کی مدد سے اپنے جسم کا خون سر کی طرف بہائے تو اس کے سر کی طرف کا تختہ جھک جائے گا۔

نبض کی مختلف حالتوں میں امراض اور ادویات

پہلے مقصد میں چار نبض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بیمار پڑنے ہی سے مریض کی نبض بیمار ہو جاتی ہے۔ (یعنی مریض کے نبض کی خیال) (ضرب) اور وقفہ وغیرہ بدل جاتا ہے۔ بیمار نبض کی علامت اور ادویات مسد رجبہ ذیل ہیں۔

نبض کی حالت سے معلوم ہونے والے امراض

نبض سریع (پر دھمکی) صلب ہونے والے مریض کو بخار یا سورنہ میں مبتلا سمجھنا چاہئے۔ اگر نبض ت سریع اور صغیر ہو تو مریض کی کمزوری بتاتی ہے۔ نبض ممتلی (پراہ اس) شدید حادثہ یا ذاتی خون بتاتی ہے۔ نبض ہنغیف، کمی خون اور تمام جسم کی کمزوری کی دلالت ہے۔ نبض غیر مستور کی لرزتی نبض، یا وہ نبض جو معالج کی انگلیوں میں زور سے دھکا دینی ہو تو دل کے کسی مرض کی طرف اشارہ ہے۔

وقفہ دار نبض (یعنی چلتے چلتے کچھ دیر کے لئے رک جاتی ہے) بد نبض یا دل کی بیماری میں بہت مہیا کو پہنچے، یا چائے سے پیدا ہوئے نقصانات کا پتہ دیتی ہے۔ نبض تغیر الوزن (یعنی یکے بعد دیگرے نبض کا عظیم اور صغیر ضرب طیب کی انگلی میں معلوم ہوتا ہو) بہت تیز بخار، یا سرسامی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لرزتی نبض آخری وقت یا سخت تکلیف کا پتہ دیتی ہے۔ نبض اگر سوت کی طرح چلے تو سمجھنا چاہئے کہ مریض مرض ہیضہ، جریان خون، یا دق میں مبتلا ہے۔ غذا کے بعد ہی یا شام کے وقت مریض کے نبض کی خیال سے ظاہر ہوتا ہے۔

بیمار نبض کی چند خاص ادویات

آرم منٹ - نبض تیز، ضعیف، غیر مستوری۔
 آرٹس - نبض صغیر، سریع، خالی، واقفہ دار۔
 ایکونائٹ - نبض سریع، صلب، قوی۔
 اینٹنٹ نارٹ - نبض کی تڑپ یا ضرب صغیر (Audible)۔
 ایسڈ میوور - نبض سریع، صغیر، ضعیف، نبض کی تیسری ضرب کے بعد سمجھ دیر
 کے لئے وقفہ ہو۔ (INTERMIT'S EVERY THIRD BEAT)۔
 اوپیم - ناک کی آواز کے ساتھ نبض بڑا اور بطنی۔
 کوپیکم - نبض مثل سوت، خالی، کرڈٹیل، نبض خالی، سوت کی طرح۔
 گلوٹائن - (8) نبض سریع، غیر مستوری، واقفہ دار۔
 جلیسیم - نبض صلب، نبض کا ہر ضرب (BEAT) سر میں محسوس ہو۔
 ڈے جی آٹیل - نبض بے، ضعیف، سریع۔
 کرڈٹیل - نبض غیر مستوری، صغیر، وقفہ دار، بے ERECT۔
 ہوتے ہی مرض بڑھتا ہے۔ فاسفورس - نبض بھاری۔
 بیٹیشیا - دبی ہوئی نبض، وراٹرم ورائٹ (x2) - نبض پر، بطنی۔
 صلب مثل لوہے کے اور سریع، ضعیف، خالی، سوت کی طرح۔
 لوروسریس - نبض بطنی، سیکل، نبض صغیر، سریع، خفیف، وقفہ دار۔

ضرب نبض

(BEAT) -

نبض کی ضرب کے مطابق دو ایٹیں۔ جیسے
 نبض متلی (پڑ) اور قوی - ایکونائٹ، آرم، بیلڈونا، اوپیم۔
 وراٹرم اور وقفہ دار نبض - کاربوی، ڈیجی، آئی برس۔
 مرکب سیکل، لائیو، نیٹرم میوور، اسپانی، ورے وریگس۔

۱۸) ایکو ٹائٹ۔ بیلڈو نارکس دامیکا۔ ایسڈ فاس۔

ڈاکٹر جبرٹسن فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دامائی محنت۔ ریخ تکلیف۔
بایوسی۔ کاروبار میں نقصان۔ غصہ وغیرہ کی وجہ سے نبض اکثر وقفہ وار ہو جاتی ہے۔

نبض۔ (برایک تیسرا۔ چوتھا) پانچواں۔ چھٹا۔ ساتواں۔ ضرب معلوم
ہونے پر ایسڈ میور۔ ڈیجی۔

نبض غیر مستوری۔ آر۔ نکا۔ آر۔ س۔ آر۔ م۔ کیکٹس۔ گریٹائیٹس۔ ڈیجی۔
ایسڈ ہائیڈرو۔ آئی بیرس۔ لاسیکو۔ ناجا۔ فاسفورک ایسڈ۔ نیٹرم میور۔
سپائی۔ ٹے بیگم۔ ورے ور۔

نبض سریع۔ ایکون۔ انٹیم ٹارٹ۔ بیلڈو نارکس۔ آئی بیرس۔
لاسیکو۔ ناجا۔ ڈیجی۔ فاسفورس۔ کراکس۔

نبض سریع۔ (صرف صبح) آر۔ سنک۔ سلفر۔

نبض لہنی۔ ۸۔ کنالیں انڈیکس۔ ڈیجی۔

نبض۔ (باری باری سے سریع اور لہنی)۔ ڈیجی۔

نبض لین یا دی۔ آر۔ س۔ جلی۔ فاس ورے ور۔ فیبرم۔

نبض صلب یا غیر نحیف۔ انگلی سے دبائے جانے سے نبض بند نہ ہو۔
بلکہ جلتی رہے۔ ایکون۔ بل۔ براپوٹیا۔ لایس۔ ہائی بیرس۔ جیلی۔ انٹیم ٹارٹ
کین۔ کیکٹس۔ سائنا۔ چائنا۔ ڈیجی۔ ہیر۔ یکے۔ مرک۔ سلف۔ نکس
دامیکا۔ فاسفورس۔ سپیا۔ سڈکا۔

نبض ضعیف۔ سترج۔ ساققا۔ یا خالی (سوت کی طرح)

آرم۔ آر۔ س۔ کیکٹس۔ کیمفرا۔ ڈیجی۔ جلی۔ ایسڈ ہائیڈرو۔

لارو۔ یکے۔ فاسفورس۔ فاسفورک ایسڈ۔ ایسڈ میور۔ سپائی۔

ورے۔ ایلپ۔ ورے ور۔ فیبرم میٹ۔

معتصر ڈی نبض۔ (آجھلتی ہوئی)۔ ایکون۔ آر۔ نکا۔ آر۔ م۔ پلم بم۔

تنبض لرزنی۔ (کاہنتی ہوئی)۔ انٹیم ٹارٹ۔ کیکیریا۔ کارب۔ سپائی۔

آوس۔ سائیکوٹا۔ رٹائس۔ سپیا۔ ہلیس۔ سبائنا۔ بل۔ جلی۔

نبض تغیر الوزن :- (نبض کی ہر ضرب دوبار معلوم ہونا)
 فاسفورس۔ اسٹرا مری ایم۔ پلمبم۔ اگاری کس۔ بیلا ڈونا۔
 نبض ساقط :- کاربوی۔ نیوپرم۔ ورے۔ ایلب۔ اوپیم۔ کیلچر۔ سیکیل۔
 مرکب۔ ناجا۔ آرس۔ سڈکا۔ کینتھرکس۔ اے پس۔ ٹیبا۔ اسٹرا مونیم۔ فاسفورس۔
 رسٹاکس۔ ایلڈ فام۔ کیک لٹ۔
 دل کی تڑپن کی نسبت نبض کی ضرب :- بطنی ہونے میں ڈبھی۔ سیکیل۔
 لارو۔ ورے۔ ایلب۔ ہلی۔ کنابس سٹیوا۔ اگاری کس۔ ڈایا مارا۔

مندرجہ ادویات x۳- طاقت کی استعمال کی جاتی ہیں

(HYPERTROPHY OF THE HEART)

دل کی شکل بہت کچھ نارم شپاتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ لیکن کھجے کے بڑھنے کے مرض میں یہ بڑھ جاتا ہے۔ دل بڑھنے پر گول اور بھاری ہو جاتا ہے۔ اندر عضلات بھر جاتے ہیں۔ بہت محنت اور کثرت کی وجہ سے دوران کے بند ہونے کے فعل سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- دل کا فعل تیز ہو کر آواز کے ساتھ دھڑکن ہوا کرتی ہے۔ کلیجہ دھڑکنا۔ اور ایک طرح کی تکلیف محسوس ہونا۔ کلا بولنا۔ اور کھٹس کھٹس کھانسی۔ محنت کرنے پر سانس لینے اور نکالنے میں تکلیف اور نبض صغیر ہوتی ہے کبھی کبھی سینہ کی بفل کی جگہ آہاس کر جاتی ہے۔
 دل کی بیماری میں سمندر کے کتے پر رہنا مفید اور کارآمد ہے۔

علاج

دل کے فعل کی زیادتی اور تیزی میں بائیں جانب درد، نبض ضعیف اور سریع ؛ سانس کی تکلیف کی علامات میں، ایکونائٹ ۳۰۔ دل کے عضلات کی کمزوری، دوار نبشی، محنت سے سانس کی تکلیف اور دل کی دھڑکن اور سینہ کی بڈھی کے نیچے درد میں، ڈبھی ٹیلس۔ ۳۰۔ دل کا بڑھنا۔ نبض ساقط جسم کا زوال۔ سانس لینے اور نکالنے میں بہت تکلیف۔ اس وجہ سے مریض کو سونے یا بات

کرنے میں تکلیف ہونے میں نیند نہ آتی ہو۔
 پیر میں آنا میں قلب کی سوزش۔ دل کی دھڑکن اور درد میں کیکٹس XI۔
 کشتی چلانے والے ملائے اور ملگرد وغیرہ ہلاتے ہیں ان سب لوگوں کے دل کے
 عصبی درد، عضد کے درد اور دل کے بڑھنے میں ارنیکا۔ دوسری دوائیں آرنیکا۔
 اور سبائی جلیا۔ نہایت مفید اور کام آمد ہیں۔

ورم غلاف دل (PERICARDITIS)

عموماً تین وجوہات سے ورم حجاب القلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جوٹ
 یا مرض دق وغیرہ اسباب ہیں۔ دوسرے وجع مفاصل، زرد بخار۔ مرض دق
 دفتیر یا ٹائیفائیڈ یا سرسامی بخار، چیچک، کثرت، پیشاب، گردہ کی سوزش
 وغیرہ اس کے معمولی اسباب ہیں۔ تیسرے بخونہ، پلیورسی، وغیرہ اطراف و
 جوانب میں بیماری پھیلنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔
 یہ بیماری سب ہی عمر میں ہوا کرتی ہے۔
 ورم حجاب القلب ہمیشہ تین قسم کا ہوتا ہے۔

(ACUTE FIBRINOUS PERICARDITIS) ۱) شدید سوداوی حجاب القلب

غلاف دل میں زیادہ ریشہ جمع ہونے سے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اور
 دل کے سکڑنے اور پھیلنے کے وقت آہستہ آہستہ درد ہوا کرتا ہے۔ اسی کے
 ساتھ ہلکا بخار بھی رہتا ہے۔ اسٹے تھسکوپ (سینہ جا پخ کرنے کا آلہ)
 کی مدد سے جا پخ کرنے سے دل کے سکڑنے اور پھیلنے دونوں کی وقت ایک
 طرح کی مرمراؤز (FRICTION) سن پڑتی ہے۔ ویسی ہی یہ آواز
 بھی ہوتی ہے۔ اسٹے تھسکوپ کے ذریعہ سننے سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ گویا
 یہ آواز ٹھیک سینہ کی دیوار کے نیچے سے آرہی ہے۔ اور اگر اسٹے تھسکوپ
 ذرا دبا کے رکھے تو یہ آواز اور صاف سنائی دیتی ہے۔

یہ مرض مہلک نہیں ہوتا۔ اکثر دو چار روز کے اندر ہی مرض کی تیزی ختم ہو
 جاتی ہے کسی کسی مریض میں یہ رطوبت تراوش کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

(۲) انسکاب الدم فی التامور۔ (ورم غلاف۔ دل میں خون کی تراوش پانا) (PERICED TIS WITH EFFUSION) اکثر ورم غلاف دل سے ہی اس طرح کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ مفصل عقونتی۔ بخار۔ مرض دق وغیرہ ہی اس بیماری کے خاص اسباب ہیں۔ آنجنون (SEROUS) کی طرح پیپ کی طرح یا آنجنون آلود کسی طرح کا بھی اخراج اس مرض میں ہو سکتا ہے۔ غلاف دو پردوں کے بیچ میں یہ رطوبت تراوش (EFFUSION) پاتی ہے۔ پھرتی مارنے کی طرح تیز درد۔ خطہ دل میں ایک طرح کی بے چینی۔ سانس میں تکلیف۔ بے چینی، نبض تیز اور بے قاعدہ؛ سانس کھینچنے کے وقت نبض کا ساقط ہو جانا۔ بخار بائیس کروٹ سوتا ہے۔ یاد سوٹکنے کی وجہ سے بیٹھا رہتا ہے۔ مرض کے سینے کے دونوں طرف کی پسلیوں کے درمیان کا کچھ حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کلیجہ پر ہاتھ رکھنے سے دل کی چال بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ یا صاف نہیں محسوس ہوتی ہے۔

سینہ پر انگلی سے آہستہ آہستہ ضرب لگانے سے حوالی دل میں زیادہ تر بھاری آواز سن پڑتی ہے۔ جس سے صاف ناہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی بھرا ہے۔ اسے تھکوپ کی مدد سے سنے پر رقیق چیز سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے آواز ہلکی سن پڑتی ہے۔ مرض کے شروع اور آخر حالت میں جب یہ رقیق حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ اُس وقت بھاری مرمری آواز سن سن پڑتی ہے۔ نتیجہ اور مرض میں مبتلا رہنے کا وقت ٹھیک ٹھیک نہیں بتایا جاسکتا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ بیماری نہایت خوفناک ہے۔

تشخیص مرض

دل پھیلنے کے مرض کے ساتھ اس مرض کی تشخیص میں مندرجہ ذیل علامتیں آتی ہیں (۱) دل پھیلنے میں دل کے ضرب آسانی سے دکھائی پڑتی ہے اور معلوم بھی کیا جاسکتا ہے

(۲) دل کے پھسلنے میں مثلث نما جگہ میں دھیمی (جو صاف نہ ہو) آواز نہیں سن پڑتی (۳) دل کی آواز صاف اور چال تیز سینائی پڑتی ہے۔
 معاً ون ترکیب:- مذکورہ بالا ادویہ دونوں قسم کی بیماری میں مناسب ہے کہ مریض بستر پر بالکل آرام کرے حوالی دل میں برف کی تحصیل رکھنا فائدہ کرتا ہے۔ اسی اور سینا کی پولش باندھنا بھی فائدہ کرتا ہے اور مریض کو اس سے آرام ملتا ہے۔

(۳) فرمن ملتصق (ملنے والا) ورم غلات

(CHRONIC ADHESIVE (PERICARDITIS)

عموماً یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک میں تو دو ڈھکنے والے پردے ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ دوسرے میں بیرونی پردہ حجاب الریہ پھیسچرٹے کا غلاف (PLEURA) یا سینہ کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے۔

اس قسم کی بیماری بہت خوفناک ہوتی ہے۔
 دل کا پھیلنا، اور دل کی کمزوری کے ساتھ اسکے علامات بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ بالکل آرام، رقیق، لیکن مقوی کھانا، ملائم بستر پر سونا، روشنی اور ہوا سے پرکمرہ میں رہنا۔ اور منتخب دوا کا استعمال کرنا مناسب اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید اور کارآمد ہیں۔

علاج:- ایکون ۲-۳۔ تیز بخار، موت کا خوف، بے چینی، نبض تیز، پیاس، حوالی دل میں دباؤ محسوس ہونا اور کھجہ دھڑکنے۔
 برالونیا۔ ۳۔ ۳۔ مرض مفاصل کی تاریخ پائی جائے حرکت سے تکلیف پڑھے۔ حوالی دل میں سوئی کی طرح یا تو سوئی چھنے کی طرح یا توڑ ڈالنے کی طرح درد ہو، پیشاب تھوڑا، بخار پیاس تیز وغیرہ ایکونارٹ کے بعد یہ دوا بہت فائدہ کرتی ہے۔
 مولچیکم ۶x۱۔ مزمن وجہ مفاصل کی تاریخ پائی جائے درد بے چینی۔ دل کی آواز بے قاعدہ اور صاف نہ ہو، بے قاعدہ اور بے نبض

سپانی بھلیا س۔ ۲۔۔۔ کچھ کانینا۔ بے حد درد دل۔ دل سے کاٹنے کی طرح تیز درد شروع ہو کر بایاں کن رہا اور بازو سے ہوتا ہوا انگلی تک پھیل جانے کی علامت میں آرٹیکلوس۔ ۳۔۔۔ چوٹ کی وجہ سے بیماری ہو۔ ٹیکٹس۔ معلوم ہو کہ دل کسی سخت چیز سے دبایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے غلاف کے عضلہ کی مندرجہ ذیل چار بیماریاں اور ہوتی ہیں (۱) غلاف دل کے پردہ میں اجتماع آب و پانی جمع ہونا۔ (HYDROPERICARDIUM) دو تھیلیوں کے اندر یہ پانی جمع رہتا ہے۔ فاسد یا جراثیم (نشر دینے والے ڈاکٹر) کی مدد سے ٹوک کر آلے کے ذریعہ ٹپ کر کر پانی نکال دینا اور علامت کے مطابق ہو میو پیٹھک دواؤں کا استعمال کرنا مناسب ہے۔

(۲) غلاف دل کے پردہ میں اجتماع خون (HÆMOPERICARDIUM) دل میں چوٹ یا زخم اور آورٹا (اورٹی) عضلہ دل کی شرائین کی رسولی کی وجہ سے یہ بیماری ہو کر پڑتی ہے۔ (ANEURISM) یہ مرض اکثر مہلک ہوتا ہے۔ علاج کرنے کا بھی وقت نہیں بٹتا۔ اگر شدید حالت میں بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے تو آرٹیکلوس، ایمپیک، کلینڈیولا، ہامامیس، وغیرہ خون بند کرنے والی دواؤں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(۳) غلاف دل کے پردہ میں اجتماع ہو۔ (PNEUMOPERICARDIUM) یہ بیماری شاید ہی کسی کو ہوتی ہو۔ عموماً یہ بیماری چوٹ، غذا کی نالی کے ادھر ادھر پھیل جانے، معدہ کے کینسر کے پھٹ جانے وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مقام سینہ کے جس حصہ میں دل ہوتا ہے اس مقام پر انگلی سے آہستہ آہستہ ضرب لگانے سے آواز صاف نہیں سن پڑتی ہے۔ لیکن اس مرض میں اس جگہ پر اجتماع ہونے کی وجہ سے اونچی آواز سن پڑتی ہے۔ اس مرض کے ہونے پر بہت جلد نشتہ لگو آنے والے ڈاکٹر کی مدد لینا چاہیے۔ (۴) غلاف دل میں چونا اکٹھا ہونا۔

(CALCIFIED PERICARDIUM) کل پردہ میں یا اُس کے کسی حصہ میں جوئے کی طرح کی چیز جمع ہو کر صاف اور پھیلے پردہ کو خراب اور سخت بنا دیتی ہے، عموماً دق کی وجہ سے یا درم غلاف دل (جس میں رطوبت تراوش پاتی ہے) کیوجہ سے بیماری ہوتی ہے۔

اے پس، برائی ادویہ۔ کالی کارب۔ ٹو برکیولینم وغیرہ دوائیں علامات کے مطابق استعمال کرنے سے فائدہ کی اُمید کی جاسکتی ہے۔

شدید التهاب الغشاء المبطن القلب یا حاد ورم غشاء رباطن قلب
(ACUTE ENDODERMITIS)

دل کے اندر کی ڈھکنے والی جھلی کے شدید ورم کو حاد اندوکاڈٹس کہتے ہیں۔ اس مرض کا حملہ دل کے کواٹر پر زیادہ ہوتا ہے۔ اور ورم ہونے کا نتیجہ ہے کہ زخم ہو جاتا ہے۔

یہ مرض خود نہیں ہوتا بلکہ جگہوں میں وجع مفاصل، خسرہ، چھپ، نمونیہ، ڈفٹیریا، مری کے غدود کی سوزش، وغیرہ بیماریوں سے نتیجہ کی شکل میں یہ بیماری پھیلتی ہے۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ مری کے غدود کے راستے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسی بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ورم غدود مری ہو جاتا ہے۔ سوزاک کے نتیجہ میں بھی یہ بیماری ہوتے معلوم ہوتی ہے۔

موت کے بعد دل کو چاک کر کے دیکھنے سے سوئی کے نوک کے برابر سے لیکر مٹر براہ تک زخم اور کسی کو بہت گلیٹوں کی طرح بھاری بھی دکھائی دیتا ہے۔ زخم سے منجمد خون یا سڑے ریشے نکل کر آلات بول وغیرہ کے خون کے دوران میں خلل ڈالتے ہیں۔

شروع حالت میں سادہ بخار، بیقاعدہ نبض سخت بیماری میں تیز بخار، پسینہ، زبان یا گہری نیند (غشی) جسم میں جگہ جگہ خون کی رسوائی نکل کر خون کا دوران رکتا۔ جسم کا وجع مفاصل

وغیرہ علامات دکھائی دیتے ہیں۔ تندرستی کی حالت میں دل کی پہلی اور دوسری آواز کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اس بیماری میں یہ وقت کم ہو کر ٹھیک پہلی اور دوسری آواز کے بیچ کے وقت کی طرح تھوڑے وقت تک رک جاتی ہے۔ کسی کسی مریض میں مرکز کی آواز بھی سن پڑتی ہے۔ یہ بیماری اکثر دل کے کواٹر کے مستقل تبدیلی کے ساتھ فرمن انڈو کارڈ انٹیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

شدید بیماری کو تشخیص کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے اور مرکز کی آواز رہنے پر بھی بائیں طرف کی آواز دھیمی (صاف نہ ہو کر) ہوتی جائے تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ بیماری ہوئی ہے۔ معمولی قسم کی بیماری اکثر مہلک نہیں ہوتی۔ لیکن خرابی دے والے مریض کے لئے بہت خوفناک ہو جاتی ہے۔

اس بیماری میں روشنی اور ہوا دار مکان میں نرم بستر پر سونا اور پورے طور سے آرام کرنا بچہ ضروری ہے

علاج

اکٹیارلس موساس ۳-۳۰۰ مرض وجع المفاصل اور ریشہ کے نتیجہ کی شکل میں اگر یہ بیماری ہو تو اکٹیارلس موساسے خاص فائدہ ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ دل میں سوئی جھننے کی طرح درد، کلیجہ دھڑکنا اور بیہوشی ہونا بے قاعدہ، سرخ کوزہ، رک رک کر چلنے والی وقفہ دار نبض۔

کو لچیک ۱X۶ وجع مفاصل کی وجہ سے بیماری اور ضعیف، اور بیض دیکھی اسٹیکس ۳۰X۱ شروع حالت میں اس کا استعمال کرنا مناسب ہے۔ وقفہ دار (رک رک کر چلنے والی) کمزوری اور تیز نبض سانس میں تکلیف۔ ایسا محسوس ہوگا یا دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ سکیکٹس :- مدر ٹینکچر ۲X۲۔ گویا کوئی سخت چیز دل کو دبا رہی ہے ایسی علامت محسوس ہونے میں اس کے نیچے کی طاقت مفید ہے۔ سپائی جلیا ۲X۳۔ شدید فرس، دونوں حالتوں میں تیز درد۔

آرم میٹالیسکم ۶۔ یہ بیماری وجع مفاصل کی وجہ سے ہو جس میں موت کا خوف مریض میں موجود ہو، آیوڈیم ۳۰۔ اگر سپائی جلیا سے پورا فائدہ نہ دکھائی دے اور وجع مفاصل کی وجہ سے بیمار کا پیدا ہوئی ہو۔ ایکون ۳۰، ۸۳، ۳۰۸۔ مرض کی شروع حالت میں بخار، بیاس، بے چینی اور موت کا خوف ہونے کے علامات ہیں۔

تخمقہ۔ دیکھی سلیس کی طرح طاقت پہونچانے کا کام کرتا ہے۔ وراپیٹرم وی ۱۔ تیز بخار، موٹی اور نہ کھانے والی تھیں، دریدہ، پیر، وغیرہ علامات ہیں۔ اگر علامات ایکون سے بھی تیز ہو، تو بعد ایکونائٹ کے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

مزمن ورم غشار باطن قلب

(CHRONIC ENDO CARDITIS)

دل کے کوڑ کی بناوٹ شکل یا اس کے مقام میں اگر مستقل طور سے تبدیلی ہو جائے تو اسکو "مزمن ورم غشار باطن قلب" کہتے ہیں۔ شدید ورم غشار باطن قلب سے بھی یہ بیماری زیادہ تر پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر وجع مفاصل کی تاریخ ملتی ہے۔ بہت اولاد ہوتا۔ وجع مفاصل، نقرس، مرض آتشک۔ بہت زیادہ شہاب پینا، شرایین کی سختی، ورم گردہ امراض کے شکل کے علامات میں یہ پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ سب عمر والے انسان کو یہ بیماری ہوتی ہے لیکن جوان اور ادھیڑ عمر والوں ہی کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ دل کے کوڑ کا زخم یا کوڑ کے بندھن کا چھوٹا ہو جانا وغیرہ

(CHORDEE TENDINAL) کوڑ کا اچھی طرح بند نہ ہونا۔ اسی

حالت میں دل کے کوڑ کا کافی نہ رہنا (VALVULAR INSUFFICIENCY)

ہوتا ہے اسکے علاوہ کوڑ میں کوئی دوسرا ریشہ پیدا ہو کر یا ارد گرد کے مقام سے مل جائی وجہ سے یہ کوڑ پورے طور سے بند نہیں ہو سکتے۔ اس حالت کو کوڑ، دل کی تنگی (VALVULAR STENOSIS) کہتے ہیں۔

ساتھ ہی ساتھ کچھ خون اسی راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ انگریزی میں (REGURGITATION) تھپتھپہ کہتے ہیں۔
 اس حالت میں دل کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جسمانی دوران خون سے فعل کو پورا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے عضلہ دل کا بڑھنا (HYPERTROPHY)
 ہوتا ہے اس حالت کو دل کے نقصان کا (COMPENSATION)
 معاوضہ کہتے ہیں۔

(۱) دو دندانہ کو اڑ کا تھپتھپہ۔ دو دندانہ کو اڑ سے خون واپس آنا۔

(MITRAL REGURGITATION)

مذکورہ بالا وجوہات سے مائٹریل یا دو دندانہ کو اڑ کے بند نہ ہونے پر خون نکل آتا ہے۔ اس کو دو دندانہ کو اڑ کا تھپتھپہ (خون واپس ہونا۔ یا خون بازگشت) کہتے ہیں۔ دل کے کو اڑ کی بیماریوں میں یہی بیماری زیادہ ہوتے دکھائی دیتی ہے۔ نیچے باطن کے سکڑنے کے ساتھ دو دندانہ کو اڑ کے راستے سے تھوڑا خون اوپر بائیں اذن القلب (کان دل) میں چلا جاتا ہے۔ اس لئے شہر رگ میں (AORTA) خون بھیجنے کے لئے بائیں نیچے بطن کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے دل کے بائیں حصہ کا بڑھاؤ اور پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ترتیب سے دل کا دایاں نیچلا بطن اور آخر میں تمام جسم کی شرائین میں خون کے دوران میں رکاوٹ پڑ کر جسم کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ شروع میں چہرہ پر اور نیچے کے دھڑکن میں اور بعد تمام جسم میں آنا س ہو جاتا ہے۔

اسے تھکوپ کی مدد سے چایخ کرنے پر دل کے سب سے نیچے اور آگے کے حصہ (راس القلب) (AFEXI) میں پہلی آواز کی جگہ میں گہری سکڑن اور انقباض القلب خیر۔ (دھکنی سی آواز جو قلب سکڑنے سے ہوتی ہے) (SYSTOLIC MURS) سن پڑتی ہے۔ نیچلا اور آگے کا حصہ اپنی مقررہ جگہ سے بائیں بغل کی طرف ہٹ جاتا ہے، ہاتھ سے

ٹھونک کر امتحان کرنے پر بھی دل بائیں بخل میں پھیلتا اور کسی کے دائیں طرف پھیلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

(ب) دودندانہ کو اڑ کی تنگی

(MITRAL STENOSIS)

موٹا پڑ جانے کی وجہ سے یہ دونوں دروازے تنگ ہو جانے پر بائیں اذن القلب (دل کا کان) بطون میں خون آنے میں خلل پڑتا ہے۔ اس مرض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائیں جانب کے بالائی سینے کے عضلات کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اسلئے پہلے وہ بڑھتا ہے اور پھر پھیلتا ہے۔ بائیں بطن میں ٹھوڑا خون آتا ہے۔ اس وجہ سے خون کے تمام جسم میں دوڑنے کے وقت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسلئے یہ آہستہ آہستہ زیادہ سکڑ جاتا ہے۔ بائیں اذن القلب (دل کا کان) کشادگی، اور بڑھنے کی وجہ سے دائیں بطن کو خون بھیجنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسوجہ سے اس حصہ کی بڑھاؤ اور کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عضلات دل کو کافی مقدار میں اچھا خون نہیں بلتا۔ یہی وجہ ہے کہ دل کا فعل بقاعدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں نبض بطی (آہستہ) ہوتی ہے اس مرض میں گلے کی شرائین زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ ان کا پھڑکنا صاف دکھائی دیتا ہے۔ دل کا بچلا اور اگلا حصہ اپنی طبعی حالت میں رہتا ہے۔ انگلی سے ٹھونک کر سینہ کا امتحان کرنے پر یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دل دائیں اور بائیں پھیل گیا ہے۔ اسے تھکوپ کی مدد سے امتحان کرنے پر دل کے اگلے حصہ میں پھیلنے کے وقت کی یا سکڑنے کے پہلے کی دھونکی کی آواز سن پڑتی ہے۔ یہ بیماری بہت خوفناک ہے۔ کبھی کبھی عرصہ تک علاج کرنے پر بھی شفا دینا مشکل ہو جاتا ہے۔

(ج) شہ رگ یا اورطی کے کوڑے سے خون کا بازگشت یا تقہقر

(AORTIC REGURGITATION)

چربی کی بتوڑی اور آتشک اس مرض کے اسباب ہیں۔ اس مرض میں عموماً شہرہ رگ کے دروازے کے کوڑے کے سُکڑنے کی وجہ سے اور کبھی کبھی قریب کی جگہ سے مل جانے سے یا یکایک جسمانی محنت سے جھٹکا را پانے کے لئے (ATHLETICS HEART) یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔

اس کوڑے کے یکساں نہ بٹھرنے کی وجہ سے بائیں بطن کے پسیلاؤ کے وقت شہرہ رگ سے حقوڑا خون بائیں بطن میں چلا جاتا ہے۔ اسلئے پہلے بایاں بطن پھیلتا ہے۔ بعد اُترھ جاتا ہے۔ اس طرح اتنا زیادہ بڑھنا اور کسی بھی دل کی بیماری میں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ شروع کی حالت میں بہت عرصہ تک مریض کی ناواقفیت میں یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور یکایک تیزی سے بڑھ کر مریض کو موت کے منہ میں پہونچا دیتی ہے۔

دل کے اگلے حصہ کی آواز ساتویں پسلی کے نیچے سُنی پڑتی ہے، نکلے دونوں جانب کی شرائین کا پھر کنا صاف دکھائی دیتا ہے۔ سینہ کی جلد پر معمولی دباؤ ڈالنے سے ہاتھ میں شرائین کی تسپکن محسوس ہوتی ہے۔ سینہ کو انگلی سے کھونک کر امتحان کرنے پر ایک کشادہ جگہ میں ٹھہری آواز سُنی پڑتی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دل پھیلا ہوا ہے۔ شرائین، موٹی اور سرخ ہو جاتی ہے۔

اُسے حقوڑا پے امتحان کرنے پر سینہ کی بڑی یا اسٹرنم کے بالائی حصہ میں دل کے پھیلنے کے وقت ایک مَر مَر اس طرح کی آواز گویا ہنسی بج رہی ہے۔ آواز سُنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی شرائین میں بھی دو آوازیں سُنی پڑتی ہیں۔ اس بیماری میں مقررہ خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے شرائین میں زیادہ اجتماع ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانسی، سانس کی تکلیف۔ خون ملی کھانسی اور اس کے بعد آہستہ دکھائی دیتا ہے۔

(۵) شہرہ رگ کے کوڑے کی تنگی

(AORTIO STENOSIS)

یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ شہرہ رگ کے دروازے کے کوڑکی موٹائی یا اس پائس کے حصّہ سے اسکا جڑ جانا۔ اس بیماری کے اسباب ہیں۔ اسلئے بائیں بطن سے شہرہ رگ میں قدرتی دوران خون میں خلل یا رد کا واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائیں بطن کے بہت زیادہ فعل کی وجہ سے بڑھساؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور شہرہ رگ میں خون کا دوران خون تھوڑا ہونے سے نبض کی چال بطنی اور مپٹلی ہوتی ہے۔

ہاتھ سے چھو کر یا اسٹتھسکوپ کے ذریعہ سے امتحان کرنے پر دل کے اگلے حصّہ کی آواز کچھ بائیں جانب نہٹ کر اور زیادہ صاف سنائی دیتی ہے۔ سانس کی تکلیف بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں پھیپھڑے میں زیادہ ہوا ہونے کی وجہ سے دل کی جگہ کچھ بڑی معلوم ہوتی ہے دائیں دوسری لپٹلی کی جگہ پر دل کے سکڑنے کے وقت مرکز کی آواز سن پڑتی ہے۔ عروق دمویہ کے سخت ہونے کی وجہ سے بوڑھوں ہی کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بیماری اکثر بہت دنوں تک رہتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی مرض کا حملہ ہونے کے ساتھ سہ میں چکر، غشی وغیرہ علامات پیدا ہو کر کچھ ہی عرصہ میں مریض موت کے منہ میں جا پڑتا ہے۔

(س) سہ دندانہ کوڑ کا تقہقر سہ دندانہ کوڑ سے خون کی واپسی

(TRICUSPID REGURGITATION)

یہ بیماری اکثر خاص طور سے نہیں ہوتی۔ دل کے بائیں جانب بیماری کے نتیجہ کی شکل میں ہی زیادہ تر یہ بیماری ہوتے دکھائی دیتی ہے، دل کے بائیں کوڑوں کا سکڑنا یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی کسی جگہ پر دائیں بطن کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے کوڑ اچھی طرح سوراخ کو بند نہیں کر سکتا۔ اسلئے دائیں بطن کے سکڑنے کے وقت تھوڑا خون دائیں اذن القلب میں لوٹ آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دائیں اذن القلب میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے آہنیں سکتا۔ اس لئے تمام جسم میں کثیف نیگلوں خون کی زیادتی

پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی کسی جگہ تمام جسم کی شریانیں میں نبض (PULSE) ملتی ہے۔ خطہ حلق کے خاص کردائیں عضو میں ہی یہ شریانیں کی نبض زیادہ تر صاف معلوم ہوتی ہے، عموماً ذرا غور سے دیکھنے پر ایسی شریانیں کی نبض (VENOUS PULSE) دکھائی دیتی ہے۔ گلے کی شریان گردن ہی کثیف خون بالائی اعضاء سے دل میں صاف ہونے کے لئے بھیجتی ہے۔ اور اس سے خون کا دورا اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے اگر نیچے سے دبا کر کچھ خون اوپر تک لے جا کر دیا رکھا جائے تو ہر مرتبہ دل کے سکڑنے کے ساتھ ہی خون لوٹ کر اس میں بھر جائے گا۔

اٹے تھکے سے امتحان کرنے پر سینہ کی ہڈی کے نیچے کی طرف اور دائیں بغل میں دل کے سکڑنے کے وقت مَرَمَر کی آواز سن پڑتی ہے۔

(س) سہ دندانہ کواڑہ کی تنگی

(TRICUSPID STENOSIS)

یہ بیماری بہت کم دیکھنے میں آتی ہے عموماً یہ موروثی معلوم ہوتی ہے۔ عموماً دو دندانہ کواڑہ کے کمزوری کے ساتھ ہی یہ مرض ہوتا ہے۔ مَرَمَر آواز معمولاً سینہ کی ہڈی کے نیچے کے حصہ میں اور دل کے بطن کے پھیلنے کے وقت ہی ہوتی ہے۔

(ص) شریان الرتہ کے دروازہ سے خون کی واپسی

یہ مرض تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ شہرہ رگ کا تقریباً جس طرح دل کے بائیں بغل کی بیماری کو پیدا کرتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک اسی طرح دل کے بائیں بغل میں علامات پیدا کرتی ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ شہرہ رگ میں بائیں بطن کے ساتھ اور شریان الرتہ دائیں بطن کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

(PULMONARY STENOSIS)

(ط) تنگی پھیپھڑا

یہ مرض بھی زیادہ تر موروثی ہوتا ہے اس مرض والے مریض پندرہ برس سے زیادہ عمر نہیں پاتے۔ جسم بھی ٹھیک ٹھیک مضبوط نہیں ہوتا۔ ان کی انگلیاں نسبتاً موٹی ہوتی ہیں۔ اور دونوں آنکھیں بہت چمکیلی رہتی ہیں۔ جسم نیلگوں ہو جاتا ہے۔

دل کا دایاں حصہ پھیلا ہوتا ہے۔ دل میں سب ہی جگہ سگڑنے کے وقت کی آواز مر مر سن پڑتی ہے۔ یہ آواز بائیں طرف دوسری پسلی ہی میں زیادہ سن پڑتی ہے۔ عموماً خون کے دوران کی کمی سے یا مرض تپ دق کی وجہ سے اس کے مریض کی موت ہو جاتی ہے۔

یہ سب بیماریاں ایک ہی ساتھ یا دو تین بھی ایک ساتھ حملہ کر سکتی ہیں

علاج

ایکون ۲۰۔۲۰۰۔ ان کے علامات کے موافق دوا منتخب کرنی پڑتی ہے۔ مرض کی شروع حالت میں اور شدید بیماری میں بھینی، پیاس وغیرہ علامات موجود رہتے ہیں۔ اے پس ۳۰۔۳۰۰۔ دل کے کواڑوں کی بیماری میں بے چینی۔ تمام جسم کانسیلا ہو جانا۔ ڈنک مارنے کی طرح درد۔

آرس ۳۰۔۲۰۰۔ آماس و بھینی و پیاس، جلن و کمزوری۔ آرنیکا ۳۰۔۳۰۰۔ بہت زیادہ محنت و چوٹ کی وجہ سے ہو۔ کیفیر۔ دل کا فعل بند ہو کر اس طرح کی علامت ہونے پر کیفیر ۵۔ نظرے کی مقدار میں دس دس منٹ کے وقفے سے استعمال کرنا چاہیے۔

ڈیجیٹلس ۱۵۔۲۰۰۔ حرکت کرنے سے دل کے فعل بند ہو جانے کی طرح محسوس ہونا۔ آماس وغیرہ علامات میں۔ ان کے علاوہ اسٹروپنٹیسین، ڈکریٹیس، وکیٹس وغیرہ دواؤں کا بھی علامت کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔

معاون علاج

رجن بیماریوں کے نتیجہ میں مندرجہ بالا دل کی

بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ان سب بیماریوں کے ہونے پر نہایت اطمینان سے دل کے فعل کو دیکھتے رہنا چاہئے۔

مرض کے حملہ آور ہونے پر پورے طور سے آرام (جسمانی و دماغی) کرنا مناسب اور بہتر ہے۔ اگر متلی کی علامت ظاہر ہو تو متلی بند کرنے کے لئے بستر پر چپ چاپ بیٹھے رہنا مناسب ہے۔

خود بنیاد طریقے سے اور نمائش ترک کر کے زندگی بسر کرنا چاہئے۔ شراب پینا، ثقیل غذا کھانا عورتوں سے صحبت کرنا وغیرہ ترک کر دینا چاہئے۔ اگر آماس کی علامت نہ ہو تو متلی اور مقوی غذا کھانا چاہئے۔

التهاب (ورم) عضلہ قلب

(MYOCARDITIS)

دل کے عضلہ کے ورم کو مایو کارڈائٹس کہتے ہیں؛ حاد۔ مزمن۔ محدود کا انتشار (پھیلاؤ) اس طرح چار قسم کا مایو کارڈائٹس ہو سکتا ہے۔ دل کے پاپلیوٹری، اریٹری کے راستہ سے جراثیم کے اندر داخل ہونے پر عضلہ قلب میں محدود شدید ورم عضلہ قلب ہوا کرتا ہے اس کو کچھ لوگ دل کا پھوڑا بھی کہتے ہیں۔

دل کا غلات اور دل کے اندرونی جھلی ورم کے نتیجہ میں کبھی کبھی یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔

ٹائیفائیڈ، ڈفتھریا، متعفن زخم وغیرہ کے جراثیم داخل ہونے کا وجہ سے بہت ورم پیدا ہوتا ہے، وجع مقاصل، آتشک۔ ورم مثانہ، مزمن وغیرہ اسباب سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔

تھوڑی سی بھی محنت کرنے سے سانس میں تکلیف، تھوڑی محنت یا کوشش سے ہی شریان کا بیقاعدہ ہو جانا، کلیجہ دھڑکنا، کلیجہ میں پیلینی محسوس ہونا، کلیجہ میں قوی لہجہ درد، قلب کے عضلہ کی کمزوری کی وجہ سے ہاتھ دیر و ناک کی جگہ ٹھنڈی ہونا، کانٹھوں میں یا ہاتھ دیروں میں آماس ہونا، اور پیشاب کی مقدار کم ہو جانا وغیرہ

علامات پیدا ہو سکتے ہیں۔

اسے تھکوپ کی مدد سے سینہ کا امتحان کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ دل کا فعل بے قاعدہ اور کمزور ہے۔ دل پھیل گیا ہے اور دل کے اگلے حصہ میں تشنج کے وقت آواز مَر مَر سن پڑتی ہے، نبض کی چال فی منٹ ۵۰-۶۰ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں کسی حصہ جسم میں خون کی زیادتی، اور کسی حصہ میں خون کی کمی۔

کورونری ورید میں خون منجمد ہو کر یا ول کے پھیلنے کی وجہ سے دم پھولنے موت ہو سکتی ہے۔

اس مرض میں اکثر یکا یک یا مرض تشنج ہونے کے پہلے ہی موت ہو سکتی ہے۔ مرض تشنج ہوتے ہی یا اندیشہ ہوتے ہی کہ مریض ہوا ہے بستر پر اورے طور سے آرام کرنا۔ پتلی اور ہلکی غذا کھانا۔ مقوی غذا کھانا مناسب، مرض کا حملہ دب جانے پر آہستہ آہستہ ہلکی محنت شروع کیا جاسکتا ہے۔ شراب یا تمباکو کا استعمال کرنا بالکل منع ہے۔ ڈیجی ٹیلیس۔ اٹرافینٹھس وغیرہ رائج الوقت ادویات کا استعمال کرتا ہے۔

ورم عضلہ قلب۔ حرکت سے بڑھنا۔ ٹائیفاؤڈوجع مفاصلی۔ بخار۔ وغیرہ کا سابق تواریخ کے لئے علامات میں برائیوں یا ۶-۷-۲۰۰۔ اس مرض کی عمدہ اور کارآمد دوا ہے۔

(PERCAR DITIS) اور اندرونی قلب

(INDOCA DITIS) کی ادویات ان مرض کے علاج کی وقت دیکھنا چاہیے۔

(DILATION OF THE HEART)

دل کا پھیل جانا

یہ بیماری بھی خود ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ دوسری بیماریوں کی علامت ہے۔ دل کے کواڑوں کی مزمن بیماری، شدید ورم عضلہ قلب۔ بہت زیادہ جسمانی محنت، یکا یک جسم پر غیر طبعی جھٹکا لگتا۔ نوبتی متحدہ بیماریاں زیادہ رنج، دماغی چوٹ وغیرہ اسباب سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔

اس سے دل کے سب حنائے پھیل سکتے ہیں۔ اور انقطاع قلب طبعی شکل میں بڑھ سکتا ہے یا سہل پڑ جاتا ہے۔

درم مزمن اندرونی جھلکی کی طرح اس میں سانس کی تکلیف، کلیجہ دھڑکنا، جسم زرد ہو جانا، نبض تیز اور کمزور، غشی، متلی وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔

انگلی سے ٹھونک کر امتحان کرنے پر پھیلی ہوئی جگہ میں سخت آواز سن پڑتی ہے اس خیال سے بھی خیال کیا جاتا ہے کہ دل پھیل گیا ہے۔

دل کے اوپر ٹھونکنے سے دل کو گوشت کے عصلہ سے بنا ہے لیکن سخت چیز پر ٹھونکنے سے جس طرح سخت آواز آتی ہے اُسی طرح کی آواز سن پڑتی ہے۔ اور پھیپھڑا ہوا سے بھرا ہونے کی وجہ سے ڈب ڈب کی آواز سن پڑتی ہے۔ اسے تھسکوپ کی مدد سے امتحان کرنے پر کشادہ جگہ پر دل کی آواز سن پڑتی ہے۔

دوسری دوسری دل کی بیماریوں کی طرح اس میں بھی بالکل آرام کرنا اور دماغی آرام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔

دل کی بیماریوں کی طرح علامات کے موافق ادویات استعمال کرنے پر فائدہ کی اُمید کی جاتی ہے۔

ہول دل

(PALPITATION OF THE HEART)

تندرست جسم میں دل کا فعل یکساں ہوا کرتا ہے، اس سے خلالت ہونے پر سمجھنا چاہیے کہ کوئی مرض ہوا ہے، عصبی کمزوری، دُموی مزاج، بہت زیادہ دماغی فکر، زیادہ جسمانی محنت یا کثرت، اختناق الرحم، (ہسٹیریا) زیادہ مقدار میں جسم سے رطوبت نکلتا، خوف، فکر، رنج، حیض کی خرابی، زیادہ عورتوں سے صحبت کرنا، زیادہ تباکو نوشی چیزیں کھانا، نیز مرض حیزاب وغیرہ اسباب سے کلیجہ دھڑک سکتا ہے۔

علاج

کلیجہ میں دھڑکن، دل کی تڑپ، شروع ہونے پر کسی دوسری دوا کو دینے سے پہلے کر ٹیکس D۔ فی خوراک پانچ قطرے روزانہ تین بار استعمال کرنا چاہیے خاص کر دل کی تیز چال یا تڑپ، سانس میں تکلیف، نبض کی چال بے قاعدہ

انگلیاں ٹھنڈی، خون کی کمی، دماغی پریشانی وغیرہ علامات میں یہ دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ گر کر ٹیکس سے زیادہ فائدہ ہو تو آٹھ دس D۔ دین قطرے فی خوراک دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ (خاص کر جب جگر کی خرابی رہتی ہے۔ چہرہ گرم، اور سرخ، ہاتھ، پیر، بے قابو ہونا، جلد جلد سانس لینا اور چھوڑنا۔ تھوڑا جذبہ ہونے پر، کلیجہ دھڑکنا، ایسا محسوس ہو کہ گویا دل کا فعل بند ہو رہا ہے۔ وغیرہ علامات میں ایکو نائٹ ۶۔ دل کے درد کی وجہ سے سینہ میں تکلیف۔ چہرہ سرخ اور درد سر میں بیلا ڈونا ۳۔ دل کا فعل کبھی کم، کبھی زیادہ، حرکت کرنے یا سونے سے ایسا محسوس ہونا کہ دل کا فعل بند ہو جائے گا۔ بہت بے چینی، بہت محنت، اور بہت دماغی جذبات کی وجہ سے اختلاج قلب۔ ڈیجی ٹالس ۳۰۔ ۳۰۔ ایسا محسوس ہو گویا کوئی دل ہلا رہا ہے یا دماغ ہو رہا ہے۔ زیادہ زور سے اچھل رہا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ دھک دھک ہوتا۔ اور ملتے رہتا۔ بائیں کروش سونے یا کھونٹے سے زیادتی کی علامت میں ٹیکس ۳۰ X۔ کبھی کبھی سانس بند ہو کر بے ہوشی آجانا۔ کمزور اور ضعیف نبض، بائیں جانب سوئی چبھنے کی طرح درد، بار بار۔ زور سے سانس لینا۔ دل کا فعل ہمیشہ ایک طرح سے نہ رہتا۔ کبھی تیز۔ کبھی سست وغیرہ علامات میں ٹیکس ۳۰۔ زیادہ خوشی کے بعد اختلاج قلب میں کافی ۶۔ غصہ کی وجہ سے کلیجہ دھڑکنے میں کمی ۶۔

خوف کی وجہ سے اختلاج قلب، اوپیم ۶۔ بد ہضمی کی وجہ سے کلیجہ دھڑکنے میں نکس دامیکا۔ (مردوں کے لئے) اور ٹیکس ۶۔ (عورتوں کے لئے) کمزوری کی وجہ سے کلیجہ دھڑکنا۔ (خاص کر بڑھوں کے لئے) آرم میٹ ۶۔ ۲۰۰۔

زیادہ محنت، دوڑنا، اچھلتا، کودنا، وغیرہ کی وجہ سے دل کی اور دوسری بیماریوں کے ساتھ تپاک قلب ہونے دکھائی دیتا ہے۔
دل کا فعل معلوم ہونا۔ کبھی کبھی ایسا درہوتا کہ بہت خراب دل کی بیماری ہوئی ہے! خوف، دماغ، انتشار، سینہ میں بے چینی، اور تپاک وغیرہ اسکے علامات ہیں۔

مذکورہ بالا جن اسباب سے یہ بیماری ہوئی ہے سمجھ میں آنے پر ان سب اسباب کو دور کر کے بستر پر پورے طور پر آرام کرنا مناسب ہے۔
مقوی ہلکی غذا کھانی چاہیے۔ اور مریض کو خوب بہت دانا چاہیے اس طرح اکثر بغیر دوا کے بھی مرض آرام ہو جاتا ہے۔

علاج

۱۔ یون ۳-۳۰۔ خوف اور بے چینی کی وجہ سے بیماری میں۔
آرنیکا ۶-۳۰۔ چوٹ وغیرہ کی وجہ سے بیماری ہونے پر۔
کیکٹس ۵-۳۰۔ گویا دل کو کسی نے سخت چیز سے جکڑ رکھا ہے۔
باہیں کروٹ سونے پر زیادتی۔
کرسٹیکس ۶-۳۰۔ اعصاب کے جذبات سے بیماری۔
جلس ۳-۳۰۔ مودہ میں احتیاج ریاح۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے اور سن پڑ جانا۔ خواب دیکھتا۔ درد سر اور تشنج۔
چائنا ۳۰-۲۰۰۔ کمزوری یا کسی بیماری کے بعد کی کمزوری کی وجہ سے تپاک قلب۔

آہستہ تپاک قلب

(BRADY CARDIA)

ضرب دل سے باہر میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ تندرست جسم میں فی منٹ ۷۴ سے ۸۰ مرتبہ دل ضرب کرتا ہے اور ۷۰ سے کم اور ۸۰ سے زیادہ ہونے پر یہ سمجھ کر مرض ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو دراصل اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔
آہستہ اور تیز تپاک قلب۔ یہ دونوں ہی کوئی خاص بیماری نہیں ہیں۔ دوسری بیماری کے علامات میں لوڑھا یا بشرائیں میں سختی پیدا ہونے اور

شدید نوبتی بیماری کے بعد اس کا آہستہ تپاک قلب ہونے
ہوتے ہوئے معلوم ہوتا ہے۔
مقوی اور زود ہضم غذا، جسمانی اور دماغی محنت کرنا فائدہ مند
ہے۔ بوڑھوں کے لئے جلس اچھی دوا ہے۔

وجع مفاصل قلب

(RHEUMATISM OF THE HEART)

اس بیماری میں سینہ کے بائیں جانب درد یا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔
مریض بائیں جانب سونہیں سکتا۔ سانس باہر نکالنے میں تکلیف ہوتی
ہے۔ نبض ضعیف، اور انگلی سے دبانے سے نبض کی چال دب جاتی
ہے۔ یہ مرض بہت سخت ہے مرن ہو جانے پر بہت تکلیف ہوتی ہے۔
اور اکثر اچھا نہیں ہوتا۔

سمی سی فیوگا x۳ - آرسنک x۳ - رسٹاکس ۶۔
کرے ٹیگیس ۵ اس بیماری کی خاص خاص دوائیں ہیں۔

اسٹوکس آڈمس ڈیزیز

(STOKES ADAM DISEASE)

یہ ایک خاص قسم کا آہستہ تپاک قلب ہے۔ بڑھاپے میں وریڈوں
میں سختی ہونے سے یہ بیماری اکثر ہوا کرتی ہے۔ اس مرض میں نبض کی
چال فی منٹ ۲ یا اس سے بھی کم ہو جایا کرتی ہے۔ اور درد سر،
غشی، یہاں تک کہ تشنج بھی پیدا ہو جاسکتا ہے۔
نبض بے قاعدہ رہا کرتی ہے۔

بستر پر پورے طور سے آرام کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
جس سے دماغی اور جسمانی کسی طرح کا جذبہ نہ ہو۔
غذا مقوی اور زود ہضم ہونی چاہیے۔

ہارٹ بلاک (HEART BLOCK)

اذن القلب و دماغ کے بالائی خانے اور بطون (دل کے زیرین خانے) ان دونوں کے درمیان ایک عصبی دائرہ ہے جس کا کام ہے دل کی چال کو قاعدہ میسر رکھنا۔ دل کا سکڑنا۔ پہلے اذن القلب کے دریدوں سے شروع ہوتا ہے اور عصبی دائرہ کے راستہ سے بطون میں پھیل جاتا ہے اسی عصبی دائرہ کا نام آرو ونٹر بکیو لرنڈل ہے (AUR. VENTR. CULER BUNDLE) یا اذن اور بطون کے درمیان کا عصبی دائرہ ہے۔ اس عصبی دائرہ کے انکشاف کرنے والے نام پر اس کو بڈل آف ہمس بھی کہتے ہیں۔

اس عصبی دائرہ میں پھوڑا، ورم، دق، وغیرہ یا کسی وجہ سے فعل میں خرابی ہو جانے پر یہ سکڑنا قدرتی اصول کے موافق نہیں ہو پاتا اور اذن اور بطون قلب مناسب طریقہ سے سکڑنے نہیں پاتا۔

اس میں دل کا تپاک فی منٹ کم سے کم، مہم مرتبہ ہوتا ہے اسے تھسکوپ سے مرقع آواز بھی سن پڑتی ہے۔ الیکٹرو کارڈیو گراف کی مدد سے یہ بیماری ٹھیک ٹھیک تشخیص کی جاسکتی ہے۔

پہلے بستر پر اچھی طرح آرام کرنے کا بندوبست کر کے منتخب دوا کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (COWAN) کی رائے کے موافق اس بیماری میں ڈیجی ٹالس دینا مناسب نہیں ہے اس سے فائدہ کی بجائے نقصان کرتا ہے۔

دل کے اور کئی علامات اور ادویات

آرم: تپاک قلب: دل میں اور سینے کے گڑھے میں خون کی تیزی سے روانی پریشانی۔ نبض کمزور۔ لیکن تیز۔ آرنیکا بہت زیادہ محنت دوڑ۔ دھوپ۔ ڈانڈیں چلانا وغیرہ (کچھ وجہ سے دل بڑھتا ہو)۔

ایکونائٹ: معمولی مرض قلب۔ خاصکر بائیں بازو کے کس ہونے پر بے ہوشی۔ ہاتھ کی انگلیوں میں درد۔ (جھن جھنانا)

ایسا کرنا۔ دل میں درد اسوئی چھینے کی طرح اٹھنا ہو جانا۔
 ایسا غصہ۔ دل میں دباؤ محسوس ہونا۔ ڈکار آنے پر درد کم ہو جانا۔
 ایسا فاس۔ پشت زنی کی وجہ سے تپاک قلب ہو سکتی کارب۔ کمزور۔
 بیقاعدہ یا رک رک کر تپاک ہو۔ سینے سے کندھے تک سوئی چھینے کی طرح درد۔
 کنا بس اند لکھا۔ معلوم ہو کہ دل سے کوئی تپیل چیز گرتی ہے۔
 کیکیٹس۔ دل کا رکنا۔ رگوں یا لوہے کی بیڑی دل کو جکڑے ہوئے ہے۔ اور
 اس کے طبعی چال کو روکے ہوئے ہے۔

کیفین (CAFFEIN) دل کا فعل بہت جلد بند ہونے کا اندیشہ دھڑکن
 پر کیفین دل کی تحریک کیلئے بہت اچھی دوا ہے۔ بھمیا۔ خوف دلانے والی
 دھڑکن۔ آگے جھکنے سے زیادتی، سانس میں تکلیف دل دسینہ تک درد بڑھنا۔
 گلوٹائن۔ دل کا تیز تپاک۔ سانس کے فعل میں تکلیف۔

گرینڈیولا۔ دل کی کمزوری۔ ہونے کے وقت سانس کے فعل کا بند ہونا۔ اسی
 سے مریض یہ سمجھ کر کہ دم بند ہو جاتا ہے۔ جاگ پڑتا ہے۔ اور سونے سے ڈرتا ہے۔
 چائنا ایسا فاس۔ دست یا جسم سے رطوبت یا خون نکل جانے کی وجہ سے۔
 ٹپاک۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے تپاک۔ سانس لینے پر دھڑکن پر دھڑکن کی زیادتی
 ایسا محسوس ہو کہ کلیجہ چپک گیا ہے۔

ڈیجیٹالس۔ دل کے اگلے حصہ (PRAECORDIA) میں ناقابل برداشت
 باسوئی چھینے کی طرح درد ایسا محسوس ہو گویا دل کی چال بند ہو گئی ہے۔
 یا سانس کی سخت تکلیف۔

نیٹرم میور۔ دل یا نبض کی چاک رک رک کر بیقاعدہ (خاص کر بائیں کروٹ سونے پر)۔
 بیلڈونا۔ مریض دل میں بیلہ کی طرح آواز محسوس کرتا ہو۔
 اسٹیس۔ عصبی تپاک قلب نبض کمزور۔ لاروسکریس۔ دل کا فعل بیقاعدہ،
 نبض بطی، بچہ کا نیلا مرض، چہرہ نیلا، منہ کھلا رکھنے کی عادت
 لی لی ایم۔ دل کا فعل تیز (گو یا سانس رک جائے گی) مریض کو ایسا
 محسوس ہو گویا اس کے دونوں دل دو پتھر یا چمٹے سے دبائے یا پکڑے گئے ہیں۔

گو یا دل پھٹ جائے گا۔ یکبارگی کس کریکڑا جاتا ہے۔ اور لمحہ بعد دھبیلا ہو جاتا ہے۔ سیانی جلیبا۔ صبح بستر سے اٹھنے پر یا بیٹھنے پر تپاک قلب یہ دھڑکن مریض سنتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں۔
دل میں پھر پھر آواز۔ سوئی چھینے کی طرح درد۔

غشی بے ہوشی

(SYNCOPE OR FAINTING)

عصبی کمزوری کی وجہ سے کچھ لوگ بالکل یا تھوڑا بہت بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عموماً اسی کا نام غشی ہے۔ بہت کمزوری۔ آب خون وغیرہ جو ہر کا ذائل ہو جانا خوف، دماغی خرابی یا ایک خوشی، رنج وغیرہ اسباب سے بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ دل کی بیماری کی وجہ سے غشی ہونے پر ڈیجیٹالس۔ ماسکس یا ورائٹرم ورائٹ فائندہ کرتا ہے۔

علاج بے ہوشی ہوتے ہی مریض کو جیت سلا کر سر میں ٹھنڈے پانی کا چھینٹا دینا اور ایلنائٹرک یا کافور یا مشک سونگھانا چاہیے اور اسٹس ۳۰۔ بار بار درمض کی تیزی کے موافق ۵ منٹ سے لیکر نصف گھنٹہ کا وقفہ دیکر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مریض میں طاقت ہو تو خاص خاص علامت کے موافق حسب ذیل ادویات استعمال کرانے سے دو بارہ مرض کے حملہ کرنے کا اندیشہ نہ ہوگا۔ اور بے ہوشی جلد ہی دور ہو جائے گی۔

۱۔ یکایک دماغی خرابی یا ڈر کی وجہ سے غشی ہونے پر ایکو نائٹ ۳۰۔ ۱ اور اوپیم ۳۰۔ مریض بالکل ساکت پڑا رہے تو نکس و امیکا ۳۰۔ یا ایمون کارب ۶۔ آب خون وغیرہ جو ہر کا زوال ہو تو چائنا ۶۔ جسمانی کمزوری اور بے چینی میں آرسنک ۳۰۔ معمولی قسم کی غشی میں ماسکس ۳۰۔ ہسٹریا کی وجہ سے یا دماغی محنت سے پیدا ہوئی غشی میں آگنیشیا ۳۰۔ تمام جسم ٹھنڈا ہوا تو ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنے کے ساتھ کمزوری کی وجہ سے غشی ہو تو ورائٹرم ورائٹ فائندہ ۳۰۔ ریاچ کے غلیبہ والے کمزور شخصوں کے لئے نکس ماسکیٹیا ۳۰۔ اور دل کے فعل کی وجہ سے غشی ہو تو ڈیجیٹالس ۶۔

• حادثات اتفاقی کے باب میں بہوشی یا مردہ کی طرح پڑا رہنا ملاحظہ ہو۔

خون کا دباؤ بڑھنا۔ بلڈ پریشر

(BLOOD PRESSURE)

بلڈ پریشر کہنے سے ہی خون کا کسی طرح دباؤ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے خون کا دباؤ گھٹا ہوا بھی معلوم ہو سکتا ہے لیکن عموماً معالج اور عوام خون کا دباؤ بڑھنے ہی کو بلڈ پریشر (BLOOD PRESSURE) کہا کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ اکثر دوسری جسمانی خرابی یا بیماری کے نتیجہ کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ اور عموماً اس بیماری کے اچھے ہوتے ہی بلڈ پریشر آپ ہی آپ اچھا ہو جاتا ہے۔

خون کے اس دباؤ کے بڑھنے (HYPERTENSION OF THE ARTERY)

(DILATION OF THE ARTERY)

کو اور خون کا دباؤ گھٹنے کو کہتے ہیں

انسانی جسم کی شرائین ربر کی طرح پھیلنے والی ہیں۔ اور یہ علی الترتیب منقسم ہو کر عروقِ شریہ (بال کی باریک رگیں) (CAPILLARIES) کے ذریعہ تمام جسم میں پھیل کر خون کی روانی کرتی ہیں۔ اور ہر دل ایک منٹ میں ۸۰۰ مرتبہ خراب خون شہہ رگ میں بھیجتا ہے۔ یہ خون کا دباؤ شرائین میں لگ کر شرائین پھیلتی ہیں۔ اس شرائین کا پھیلاؤ ہم لوگ ہاتھ کی شرائین میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی کو نبض کہتے ہیں۔

علی الترتیب ایک چھوٹے لطیف منہ والی نلی کو اس طرح لگاتا ر رقیق چیز سے بھر کر دیکھنے پر پھیلنے کی علامت ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔

بلڈ پریشر کے ناپنے کے آلہ کا نام (SPHYGMOMANOMETER) اسفکٹومیٹر ہے۔ دل کی سکڑن (SYSTOLE) کے وقت خون کے دباؤ کی وجہ سے بلڈ پریشر کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور دل کا پھیلاؤ (DIASTOLE) کے وقت گھٹ جاتا ہے۔ تندرست جسم میں دل کے

سکڑنے کے وقت یہ دباؤ ۱۶ اور پھیلنے کے وقت ۴۰ سے ۵۰ گم لینے والا
۱۲۰ رہتا ہے۔ یہ سکڑنے کا دباؤ فطرتاً زیادہ یعنی ۱۶ سے زیادہ
ہونے پر سمجھنا چاہیے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔

دل کے بائیں بطن قلب (VENTRICLE) سکڑنے کی طاقت
شہ رگ میں گئے ہوئے خون کی مقدار شریان کے جسم کی دیوار کا جھکاؤ
پھیپھڑے کی شریان کے اعصاب کا فعل خون کے پانی کا حصہ انہیں
کئی چیزوں کے گھٹنے و بڑھنے کے مطابق خون کا دباؤ گھٹاؤ بڑھا کرتا
ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چیزوں اور جگہوں کی ادنیٰ علیحدہ
علیحدہ (عمر) مختلف قسم کی غذا میں مختلف دماغی حالتوں کی وجہ سے
بھی خون کا دباؤ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لئے ٹھیک ایک ہی وقت
میں ایک ہی حالت میں ایک ہاتھوں سے ایک قسم کی غذا کھانا اور
دماغی حالت ٹھیک رکھ کر خون کا دباؤ ناپنا بڑھتا ہے۔

جسم میں مناسب طریقہ سے خون کا دوران کرنے کے لئے اوپر کے موافق
ہی خون کا دباؤ ایک معمولی ناپ کے موافق ہونا ضروری ہے۔

اس ناپ میں خرابی ہونے ہی سے سمجھنا چاہیے کہ بیماری پیدا
ہو گئی ہے۔ اور مناسب غذا، آرام اور دواؤں کی مدد سے
علاج کرنے کا فوراً بندوبست کرنا چاہیے۔

دانت میں مواد ہونا۔ حلق کے گلیٹیوں کی خرابی، مزین صفرار کی نلی کی
بیماری۔ بہت زیادہ دماغی محنت اور اس کے موافق جسمانی محنت
کا نہ ہونا۔ ہاضمہ میں نقص، جگر کی خرابی۔ قبض۔ بہت کھانا۔ زیادہ شراب
پینا۔ اور تھکا کو نوشی۔ سوزاک۔ بہت زیادہ عورتوں سے بہستری
عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے دریدوں کی سختی اور ان کے پھیلنے کی
طاقت کا کم ہونا۔ گردہ کی بیماری۔ دل کی بیماری وغیرہ
اسباب سے خون کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ عورتوں کو جب ۵۰ سے ۵۵
برس کی عمر میں حیض ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ بیماری ہوتی ہے۔

جسم کی اندرونی بہت سی بلارطوبت (ENDOCRINE GLANDS) والی گلیٹیوں کے فعل کی خرابی پر بھی خون کا گھٹنا بڑھنا بہت کچھ منحصر ہے۔
 عموماً امیر بہت دماغی محنت کرنے والے اور بہت تھوڑی جسمانی محنت کرنے والے، اور عورتیں جن کے حیض بند ہونے کا وقت ہو۔ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔

درد سر، سر میں جکڑنا، سر میں بھاری پن محسوس ہونا، سر میں خون کا دوران، اس مرض کے معمولی علامات ہیں۔ مریض بہ نسبت مرض کی تکلیف کے، مرض کے فکر سے زیادہ ڈر پوک ہو جاتا ہے۔

اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مریض اس مرض کے خوف سے بستر پر پورے طور سے آرام کر رہا تھا۔ اور موت کے دن گن رہا تھا ایک قدم بھی وہ نہیں چل سکتا تھا۔ ہمیشہ سست اور بالکل ناامید رہ کر رہا تھا۔ ایسے آدمی کو قابل عزت اور سائنسدان نے شروع ہی میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو یہ بیماری نہیں ہوئی ہے۔ اور بغیر علاج کے ہی دنیاوی کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ بس اسی وقت مریض پورے طور پر تندرست ہو کر نئی کوششوں سے کام کرنے لگا۔ گویا وہ کوئی نیا شخص ہو گیا۔ صرف اعصابی فوقیت والے اشخاص کے لئے ہی یہ ترکیب مفید اور کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ اور دو قسم کے اعصاب کے لئے علاج کی ضرورت رہتی ہے۔

علاج

سب سے پہلے اسباب تحریک مرض کو دور کر دینا چاہیے۔
 مریض کو خوف کی زیادتی کی بات بتا کر ڈرانا مناسب نہیں ہے۔ معالج کو لازم ہے کہ مشورہ دیکر مریض کو قاعدے سے رہنے کے لئے تیار کرے۔ بستر پر پورے طور پر آرام کرنا اور دنیاوی اور دوسری فکر وں کو دور رکھنا۔ یا حتی الامکان گھٹا دینا بہت ضروری ہے۔
 غذا کی مقدار جہاں تک ہو سکے گھٹا دینا اور بیج بیج میں فاقہ کرنا مناسب ہے۔ اس کا خیال رکھنا حساس ہے کہ یا حساس یا پیشاب

صاف ہو۔ اور مقوی اور زود مضمر غذا کھانی چاہیے۔ شراب پینا اور
تفصیل غذا کھانا منع ہے۔ نمک کبھی تھوڑا کھانا چاہیے۔

عموماً ایسی جگہ پھر رہنا مناسب ہے جہاں نہ بہت گرمی اور نہ بہت
سردی ہو، ایسی ادویات استعمال کرنا چاہئے جن سے شراب میں پھٹلیں
اور عموماً ایسی ہی ادویات اس مرض میں مفید و کارآمد ہیں۔

مندرجہ ذیل ادویات اس میں مفید و کارآمد ہیں۔
برائٹا کارب ۴-۲۰۰۔ سر میں جگر، دل میں درد۔ بے وقت بڑھا پایا۔
اور گلیٹیوں کا بڑھنا۔ اور سختی کے علامات میں مفید اور کارآمد ہیں۔

کو نیم میکو رٹم ۳۰۔ سر میں جگر اور ہلانے سے بڑھنا۔ یادداشت کی
کمزوری۔ دماغی محنت کرنے کی طاقت نہ رہنا۔ کلیجہ دھڑکنا۔ پیر کا کانپنا۔
کھڑے نہ رہ سکتا، گلیٹیوں کا بچھو لینا۔ اور سختی، بالکل نامرد۔ یا جماع سے
نفرت۔ وغیرہ علامات میں خاص کر مفید اور کارآمد ہے۔

بیلڈ ڈونا۔ سر میں جگر، سر میں درد۔ بالائی حصہ گرم، چہرہ سرخ، پیشانی
میں خون کی جھلک، آنکھ سرخ، کنپٹی میں ٹنک۔ جسم کی جلد گرم اور چمکیلی
نبض عظیم، موٹی، سخت علامات کی مفید اور کارآمد دوا ہے۔

گلو نائن۔ تیز درد سر۔ دماغی تحریک۔ سر میں خون کی زیادتی۔ دماغ بڑا معلوم
ہونا۔ گویا سر کے خوگ میں نہیں آتا، کنپٹی میں ٹپکن۔ حیض کے بند ہونے کے
وقت شدید بیماری کے علامات میں مفید ہے۔

سنگوئیریا۔ طلوع آفتاب سے درد سر شروع، دو پہر میں زیادتی،
اور عروب آفتاب کے وقت گھٹنا۔ بالکل اندھیری جگہ میں درد سر گھٹ جانا۔
چہرہ سرخی مائل بو قونی حیض میں مرض کا بڑھنا۔

جلیسیم۔ دماغ میں خون کی زیادتی۔ سرد درد۔ سر میں بوجھ معلوم ہونا۔
سن معلوم ہونا اور عنشی تشنج، زبان کا کانپنا۔ خشک وغیرہ علامات میں
اسی سے خاص کر فائدہ کی امید کی جاتی ہے

لیکس، اگر شہس، باقی، رو جہا، اد، ہیم، نائیٹرک ایسڈ۔

لیک ڈیلورے ٹم۔ بی بورس، ہامیلرس۔ فیرمافاس۔ آرنیکا۔ وغیرہ کی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔

درد دل

(ANGINA PECTORIS)

درد دل خود ہی کوئی بیماری نہیں ہے۔ کروہری آرٹری (عضلہ، دل کو پرورش دکنے والی شریان) کا کٹنا، عضلہ کی خرابی، یا بیماری وغیرہ (DEGENERATION) اسباب سے درد دل ہوا کرتا ہے۔ جوانی کے بعد یہ بیماری زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ نسبت نوروتوں کے مردوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ جگہوں میں ہی مریض کی ستیریاں میں سنحتی (ARTERIO SCLEROSIS) ہو جاتا کرتی ہے۔

وجع مفاصل، سفلس، بہت زیادہ تبا کو پینا، شراب پینا، بہت عرصہ کے دماغی پریشانی وغیرہ امراض میں اس مرض کے اسباب محرک ہیں۔ کبھی کبھی یہ بیماری موروثی ہوتے ہوئے بھی معلوم ہوتی ہے۔

جسمانی محنت، بد بعضی، امورات خانگی کی پریشانی وغیرہ کے ساتھ یہ بیماری یکایک پیدا ہو جاتی ہے۔ یکبارہ کی اتنا تیز درد ہونے لگتا ہے کہ مریض اپنی زندگی سے ناامید ہو جاتا ہے۔ اور جسم کا رنگ خاک کی طرح بدرنگ ہو جاتا ہے مریض ناقابل برداشت دردی وجہ سے تڑپنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی درد کم کرنے کے لئے سانس بھی روک لینی پڑتی ہے۔ تمام جسم میں پسینہ نکلنے لگتا ہے۔ درد بائیں کندھے اور بائیں بازو میں پھیل جاتا ہے۔

نبض تیز اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ مرض کا حملہ نصف گھنٹہ سے نصف گھنٹہ تک یا اس سے بھی زیادہ وقت تک قائم رہ سکتا ہے۔ پہلے ہی حملہ میں مرض مٹ سکتا ہے۔ جینے پر بھی بہت زیادہ پیشاب اور خالی ڈکار آئی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں مریض اکثر درد سے تڑپا کرتا ہے۔

اس بیماری میں مریض کو علیحدہ ایسی جگہ رکھنا چاہئے جہاں کسی قسم کی تحریک پیدا نہ ہو۔ سینہ پر برف رکھنا اور پیٹ کو سینکنا خاص طور پر

سے فائدہ کرتا ہے۔ مرض ہوتے ہی ایک رومال میں یا کسی صاف کپڑے کے ٹکڑے میں دو ایک قطرے امل نائٹریٹ (AMYL NITRATE) ڈال کر اس رومال کو سونگھانے سے فوراً ہی درد دور ہو جاتا ہے اس میں سناہرہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

ایکوناس ۳۰۔ ۳۰: سردی لگ کر بیماریاں بے چینی، موت کا خوف۔ ایک ایک مرض کا حملہ وغیرہ علامات رہنے پر:

گلوٹائٹ ۳۰: ۲۰۰ تمام جسم کے وریدوں میں تسکن معلوم ہونا۔ سانس لینے اور نکالنے میں تکلیف۔ تیز درد، سردی، علامات میں۔

سمی سی نیوگا ۴۰: ۳۰۔ کل جسم میں درد کا پھیل جانا۔ بائیں حصہ اور بائیں بازو میں ناقابل برداشت درد۔ کمزور اور لمبی (دھمی نبض)

کرے ٹیگس ۵۰: ناقابل برداشت درد۔ بائیں ہاتھ اور بازو میں درد کا پھیلنا۔ کرے ٹیگس مدرٹن کچر پانی کے ساتھ دینا چاہیے۔

کالمیا ۳۰۔ ۶۰: پشت کے اوپر والی ہڈی میں تیز درد ہونے پر۔ مگ فاس X۶۔ چارٹ کے وقفہ سے گرم پانی کے ساتھ کھلانا چاہیے۔

آرم ۶۰: موت کا اندیشہ۔ سپائی جلیا۔ نبض بے قاعدہ۔ کلچر دھڑکنے والی نبض لین خالی (SOFT)

اور خالی (THREADY) یا نبض صلب اور متلی اور غشی کی طرف رجحان۔ کیکٹس ۶۰۔ کسی سخت آگ سے حکڑا ہوا۔ معلوم ہونے کی علامت میں نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

آرنیکا۔ دل میں زخم کی طرح درد معلوم ہوتا۔ اور برداشت کے باہر درد۔

امراض شریانیں

(DISEASE OF THE ARTERIES)

سوزش شریان (ARTERITIS) کسی شریان کے حلقہ میں جلن ہو۔ تو اس کا نام سوزش شریان ہے۔ سوزش شریان شدید حالت میں

اکثر مریض کو معلوم نہیں ہوتی۔ اسلئے علاج کے لئے ڈاکٹر بلایا نہیں جاتا۔ شدید سوزش، شریان میں ڈاکٹر ہونچ ایکونائٹ نیچے کی طاقت جلد جلد دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔

سوزش کی ضمن حالت میں حلقہ شریان کے کل طبقے کتر می (CARTILAGE) کی طرح سخت اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی حلقہ شریاں کی بتوڑی (ATHEROMA) اور کبھی شریان کا ابھار پیدا کرتا ہے۔

(۲) حلقہ شریان کی بتوڑی (ATHEROMA)
ماؤف شریان سخت، ٹیڑھی، موٹی اور لٹٹنے کی طرح ہونا۔ اس مرض کی مخصوص علامت ہے۔ یہ مرض بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ اور بیمار کی وجہ سے سبب ضعیف ہو کر دردل، اسکستہ، سوزش، یا وارم گردہ، سڑن وغیرہ علامات پیدا ہوتی ہیں۔

علاج

بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتے ہی فاسفورس ۳۰ دینا چاہیئے۔ اگر فاسفورس سے فائدہ نہ ہو تو کنڈیم ۶-۱۲ دینا مناسب اور بہتر ہے۔
آرم ۶۶ سانس کی تکلیف میں سڑنے کی حالت میں سیکیل ۳۰۔
فیرم فاس ۲۰ یا لیکیس ۶۔ پلمبم ۶۔ کا بھی امتحان کرنا چاہیئے۔

(ب) شریان کا ابھار۔ گرہیں (ANEARISM)

شریان کے پھیلنے کی وجہ سے شریان میں خاصکر ران کی شریان میں (خون سے پرگرہیں پیدا ہوتی ہیں۔ شروع میں گرہوں کا خون پتلا ہوتا ہے۔ اور پھر کا کرتا ہے۔ بعدہ یہ خون منجمد ہو کر کتاب کے صفحہ کی طرح بہت سے باریک باریک طبقوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ شروع کی حالت میں گرہوں کے اوپر کی طرف کی شریان پر دبائے سے تڑپن بند ہو جاتی ہے۔ اور نیچے کی طرف دبائے سے تڑپن زیادہ ہو جاتی ہے۔

مرض آتشک، شراب پینا، جوڑوں میں وجع مفاصل، بہت زیادہ جسمانی محنت وغیرہ اسباب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ تیز

سے پچاس برس کے اندر یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔ بہ نسبت عورتوں کے مردوں کو یہ بیماری ہوتے ہوئے زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) خود درو۔ (آپ ہی آپ پیدا ہوا) فاسفورس ۳: برائٹ ۶: کیو پریم ۶: ایڈری نیلین، لائیکو ۱۲: اس کی عمدہ اور کارآمد دوائیں ہیں۔
۱۲) جوٹ سے پیدا ہوا۔ (یعنی شرائین میں جوٹ لگنے کے سبب سے پیدا ہوا ہوا) آر نیگا ۳: ایکونائٹ ۱۰: اس کی اچھی دوائیں ہیں۔

برائٹ کارب ۱۳: آر نی خوراک ۵: گرین اس کی اچھی دوا ہے۔ بتوڑی کے ساتھ دل کمزور ہونے پر کرے ٹیگس ۵: (نی خوراک ۵ قطرے) یا آر س آلوڈانڈ ۳: (غذا کے بعد کھانا چاہیے) آر س آلوڈانڈ ۳: بٹک فاس ۳: کیل آلوڈ ۵: کرے ٹیگس ۵: کی بیج بیج میں ضرورت پڑتی ہے۔ بستر پر چت آرام کرنا۔ غذا حرکت اور ہر قسم کی جسمانی اور دماغی محنت ترک کرو دینا چاہئے۔

روزانہ ایک پاؤ رقیق چیز پینا۔ اور جبہ جھٹانک ٹھوس غذا کھانا وغیرہ ضروری ہے۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ شرائین کی سوزش بہت زبردست مرض ہے۔ ناواقف معالج کے بھروسہ پر مریض کو نہ سپرد کرنا چاہیے۔

شریان کی سختی (ARTERIO-SCLEROSIS)

یہ عالم ضعیفی کی بیماری ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ شرائین میں خون کا دباؤ بڑھنا دہائی بلڈ پریشر اس بیماری کا سبب ہے۔ لیکن معاملہ میں بھی اختلاف رائے ہے۔

شرائین میں خون کا دباؤ بڑھنے سے یہ بیماری ہوتی ہے تو شرائین کی سختی کیوجہ سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات اب تک بھی نہ طے ہو سکی۔ بہت عرصہ تک مستقل کوشش، پریشانی، اور جسمانی محنت۔ بہت کھانا۔ بہت زیادہ شراب پینے کی عادت۔ سینہ کی خرابی، وجع مفاصل، نفرس، آتشک اور مزمن سوزش مثلاً نہ۔ اور ذق کی خرابی اس

بیماری کے خاص اسباب ہیں۔

اس میں شریانیں موتی اور سخت ہو جاتی ہے۔ شریانیں کا پھیلنا کم ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے دل کو بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ اسلئے دل پھیل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وری اور ٹری دھنسلہ دل کو برداشت کرنے والی شریان کی سختی کی وجہ سے دل میں بہت مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تمام جسم کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں۔ اُبھر آتی ہیں۔ کوئی شریان ہاتھ سے محسوس کی جاسکتی ہیں۔ سر کی شریانیں پر مرض کا حملہ ہونے پر درد سر۔ سر میں چکر آنا۔ بے خوابی۔ فالج وغیرہ علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نہ کی شریان پر مرض کا حملہ ہو کر مثلاً نہ کی سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ اور خون کے دوران میں نقص پیدا ہو کر ہاتھ پیروں میں سٹرن یا انگلیں پیدا ہو جاسکتی ہے۔

اس مرض میں بالکل ہی آرام کرنا سب سے پہلا کام ہے۔ کافی اور متناوب فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پائسٹا اور پیشاب صاف ہو بہت زیادہ پانی پینا۔ اور غذا میں پروٹین کی مقدار گھٹا دینا چاہیے۔

ادویات

سخت درد سر۔ اور ورم گردہ کی علامت میں گلوٹائین ۴-۳۰۔ عالم ضعیفی کی وجہ سے برائٹا کارب ۳-۱۲۔ اور کوئیم ۳-۲۰۰۔ آتشک کی وجہ سے کیلی آیوڈ ۴x۲۰۰ مفید ہے۔

امراض آورده

(DISEASE OF THE VEINS)

۱۱۔ سوزش ورید (PHLEBITIS) دل اور پھیپھڑے وغیرہ

جسمانی عضلات کی سوزش ہونے پر ان عضلات کی وریدوں میں ہی سوزش ہوتی ہے۔ (یعنی وریدیں پھول جاتی ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہیں۔ اور درد کرتی ہیں)۔ چوٹ لگنا۔ زہریلا زخم۔ زہر باد۔ مواد ہڈیوں کی سوزش وغیرہ اسباب سے سوزش آورده ہوتی ہے۔ شدید

سوزش میں ہامیلس ہڈیوں کے ساتھ ترپٹی باندھنی چاہیے۔ اگر ولادت کے بعد سوزش ورید ہو تو پلس ۳۰۔ داخلی استعمال اور ہامیلس ہڈیوں کی ترپٹی خارج باندھنی چاہیے۔
 خفیض کے اخراج میں خرابی ہونے سے سوزش ورید ہو تو پلس ۳۰۔ ۳۰۔ زیادہ گھومنے یا جوڑ کی وجہ سے ہو تو آرنیکا ۳۰۔ داخلی استعمال کرنا چاہیے۔
 اور آرنیکا۔ ہڈیوں کی (ہڈیوں) گنے پانی کے ساتھ ترپٹی باندھنا چاہیے۔
 خون خراب ہو کر سوزش ورید ہو تو آرس ۱۰۔ ایکس ۳۰۔ یا پائروجن ۱۰ کا داخلی استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایکس ۱۰۔ (جو گنے پانی کے ساتھ ملا کر) کی ترپٹی خارجی استعمال کرنا چاہیے۔ پوری طرح آرام کرنا چاہیے۔
 گرم پانی سے سینکنا اور ہلکی غذا کھانا مفید ہے۔

۳۰ اپنڈلیوں کی رگوں کا پھول جانا

(VERICOSE VEINS VARICOCELE ETC)

۱۔ پیرامبرز (بائٹمانہ کا مقام) خفید وغیرہ کی وریدوں میں خون رکھنے کی وجہ سے یہ پھول جاتی ہیں۔ اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ انگلی کے دبانے سے یہ بڑھی ہوئی وریدیں۔ ڈھیر گئے ہوئے کپڑے کی طرح ٹیڑھی اور بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔

شدید مرض میں ہامیلس ۳۰۔ داخلی استعمال اور ہامیلس ۱۰۔ (آٹھ گنے پانی کے ساتھ) کی ترپٹی کا خارجی استعمال کرنا چاہیے۔
 بیماری مزمن ہونے پر فلوئو رک الیڈ ۳۰۔

بست درد ہونے پر پلس ۳۰۔ خیم فام ۱۰۔ سفوف پالم ۱۰۔ آرنیکا ۳۰۔
 آرس ۱۰۔ ایکس ۳۰۔ بیلاڈونا ۱۰۔ فارم کا ۳۰۔ سفوف ۱۰۔ کبھی کبھی ضروری ہو سکتی ہیں۔ بڑھی ہوئی ورید کے اوپر کلیپس کے عرق پوش (کلیپس) ایک حصہ پانی چھ حصہ ملا کر) کا خارجی استعمال فائدہ مند ہے۔ کبھی کبھی موزے یا برکے بنیدگی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

سُدہ دم - خون کا تھک

(EMBOLISM AND THROMBOSIS)

منجمد خون کا ایک تھک (CLOT OF BLOOD) یا کوئی دوسری چیز شج کے ذرات، ہڈی کے مغز کے چربی کے ذرات، بڑا "متعفن" مرض کا حصہ، شریانی گرہ کا جدا ہوا ٹکڑہ، جسم کے خون کی روانی میں کسی شریانی یا کوئی دوسری خون لے جانے والی عروق میں داخل ہو کر وہاں رُک جاتے ہیں۔ اس سے خون کے دوران کے کام میں خلل یا رُکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اسی رُکاوٹ کا نام سُدہ دم یا خون کا تھک (EMBOLISM) ہے۔ اور اگر کسی

منجمد خون کا ٹکڑا، دل، سر، ورید یا جسم کے کسی دوسرے عروق دمویہ میں خون رُک جاتا ہے۔ اس لئے اس رُکاوٹ کی رُک ہوئی چیز (خون کے سُدہ) کو اس مقام کا تھک دم فی الادیعہ درگوں میں خون کا سُدہ یا لوتھڑا بن جانا (THROMBOSIS) کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے خون کے سُدے۔ یا لوتھڑے عموماً مہلک ثابت ہوتے ہیں۔

ہیضہ، سرسام کی خرابی وغیرہ بیماریوں میں رگوں میں خون منجمد ہو کر مریض فوت ہو جاتا ہے۔ دونوں مرضوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔

جس شریان میں سُدہ ہوتا ہے اُس کے چاروں طرف کی عروق شعریہ (CAPILLARIES) خون جم کر کیلے کے پھول کے اگلے حصہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ دماغ کی رگوں میں سُدہ دم کے رُکنے میں سکته وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ عروق شعریہ (CAPILLARIES) کے بیچ میں خون کا دباؤ رُک جاتے پڑ، مرض خور یا یار عشه (ST. VITUS'S DANCE) ہو سکتا ہے۔ دل میں خون منجمد ہو کر سُدہ بن جانے پر جسم سادہ اور غشی میں رہنے کی تکلیف پیدا ہو کر مریض کی یکایک موت بھی ہو سکتی ہے۔

علاج :- کیلک آرس X۶ - سفوف ؛ ان دونوں امراض کی

خاص دوا معلوم ہوتی ہے۔ اے پس ۲۔ اوپیم ۲۳۔ کیلی میوڑ ۳۰۔ ۳۰۔ وغیرہ دوا میں بھی ضرورت پر دی جاسکتی ہے۔

امراض نظام تنفسی

(DISEASES OF THE RESPIRATORY ORGANS)

اطلاع :- ڈاکٹر ہیوز فرماتے ہیں کہ صرف سردی ہی لگتا آدھی بیماریوں کا سبب ہے۔ ان کی رائے سے درد سوز کام۔ انفلوینزا۔ تپ دق، بخار، فالج (لقوہ) اسمہال، چیش، یرقان، بخوں کا ہیضہ، بہراپن، ہوا کی نلی کی سوزش، نمونیہ، دمنہ، گلے کا زخم، ناک کا زخم۔ کان میں مواد؛ آئاس، تکلیف دہ، کسی حیض، استقاط حمل۔

گھر گھر اہٹ کی کھانسی، پلوریسی، وجع مقاصل، زہر باد، عصبی درد۔ صفراء کی وجہ سے پیدا ہوئے امراض، آشوب چشم، ورم مٹانہ، یا ورم جگر۔ بلا ارادہ عضلہ کا تشنج، زیادہ پیشاب ہونا۔ آنکھ کی سوزش۔ قبض۔ آواز نہ بچھ جانا۔ درد دندان، لوڑمان کا بڑھنا۔ وغیرہ امراض کا سردی لگنا ہی پہلا یا سبب محرکہ ہے اس لئے سردی نہ لگنے پائے۔ اس بارہ میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔

پیرا نے عالم بلجیٹ لکھا ہے کہ خچر کے منہ پر تین مرتبہ بوسہ دینا ان امراض کو جو سردی سے پیدا ہوتے ہیں آرام کرنے کی اعلیٰ ترکیب ہے۔ آجکل بھی کوئی معالج کہتے ہیں اس آسان طریقہ علاج کو آزمانا چاہیے۔

شدید زکام۔ حاذزلہ
(CORYZA OR CATARRH)

سانس کی نلی کے کسی حصہ میں سوزش ہو کر زکام ہوا کرتا ہے صرف ناک کی لعابدار جھلیوں میں سوزش ہو کر زکام ہوا کرتا ہے۔ اور ناک اور گلے کی جھلیوں کی جب سوزش ہوتی ہے۔ تب زکامی بخار ہوتا ہے مرض کے شروع میں جسم میں سنسی، انگڑائی۔ جمائی؛ درد سر سر میں

چکر۔ آنکھیں سُرخ، سانس گرم، ناک میں سُسرُراہٹ۔ بار بار چھینک۔
 اور اس کے ساتھ ہی ناک اور آنکھوں سے پانی جاری ہوتا۔ وغیرہ
 علامات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سہراون، تیز نبض، خشک کھانسی،
 آواز بھیجی، گاڑھا اور زرد کف نکلتا۔ بھوک جاتی رہنا۔ تمام جسم
 میں درد وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ مائی کروکاکس کے شارلس
 وغیرہ جراثیم زکام کے خاص سبب ہیں۔ بہت دیر تک گیلہ کیڑا
 پھنر رہنا۔ برساتی پانی میں بھینکنا۔ اوس یا سردی لگنا۔ یکایک پسینہ
 بند کرنا۔ وغیرہ شدید زکام کے اسباب ہیں۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید و کار آمد ہیں۔
 اسپیرٹ کیمفر۔ (مرض کی شروع حالت میں) جب تھوڑا تھوڑا
 جاڑا لگتا ہو، جسم میں انگرہائی ہوتی ہو، ناک سے پانی گرتا ہو لیکن بخار نہ ہو،
 ایکونائٹ ۳-X۔ (مرض کے شروع حالت میں) تھوڑی سردی
 کے ساتھ بخار، جمائی آنا۔ جسم ٹوٹنا۔ آنکھوں میں جلن، آنکھوں میں
 پانی بھرا رہنا۔ سانس گرم، بار بار چھینک، سر بھاری، تپلا، بلغم
 نکلتا۔ اور بہت سستی۔ جسم کھردرا۔ تیز پاس، ایام۔ سرمائی شبنم
 اور ٹھنڈی ہوا لگ کر زکام کا ہونا۔

ڈلکارا، ۳۔ تر ہوا یا برساتی ہوا لگ کر زکام ہو۔
 برائی او نیا ۳-X، ۴، ۳۔ سانس کی نالی کے لعابدار جھلی میں
 سوزش، تکلیف دہ خشک کھانسی، بہت کھانسنے پر تھوڑا بلغم نکلتا۔
 بلغم کی وجہ سے ناک بند ہو جانا۔ کھانسنے کے وقت سینہ میں درد۔ آنکھوں سے
 پانی اگڑنا۔ معدہ کے فعل کی خرابی۔ سینہ کے پاس سوئی چھیننے کی طرح درد۔
 نکس و امیکا ۳۔ ایک ناک بند ہو جانا۔ دن میں دونوں نکتھنے
 کھلے رہنا۔ لیکن رات میں بند ہو جانا۔

جلسیم ۳-X، پشت میں جاڑا لگ کر بخار آنا۔ بخار آنے کے پہلے
 پشانی گرم، پیاس، سر بھاری، چہرہ سُرخ، پانی بھری آنکھیں۔

سردی کی وجہ سے آنکھ کی سوزش، نبض تین (ملائم) یا بطی (دھیمی) لگے میں
 درد کھانسی، آواز بھی ہوئی۔ موسم گرما میں سردی لگنے سے زکام۔
 آرٹنگ البم ۳ x ۴۔ نتھنوں سے بہت زیادہ مقدار میں تپتی گرم
 جلن پیدا کرنے والی رطوبت کا اخراج؛ بار بار چھینک؛ آنکھوں سے پانی گرنا۔
 بہت سستی اور گہری نیند، سستی، ناک؛ آنکھیں نرم اور خجرہ کی بیماری۔
 پلسا ٹیلا ۳-۴-۵۔ ۳۰۔ (بکے ہوئے زکام کی اچھی دوا ہے۔)
 ناک سے بدبو دار بلغم نکلتا۔ کان اور سر کے اطراف میں تیز درد۔
 سر بھاری؛ کسی چیز کا ذائقہ اور بونہ محسوس ہونا۔ گرم کرہ میں یا شام
 کے وقت مرض کی زیادتی۔

مرکیورس ۴؛ گلے میں درد اور زخم، ناک میں درد اور زخم، بار بار۔
 چھینک؛ مواد کی طرح زرد رنگ کا گاڑھا بلغم نکلتا۔ ایک بار چار اور بعد گرمی
 محسوس ہونا۔ آنکھ کی سوزش؛ شام کے وقت مرض کی زیادتی۔ گلایا گلے
 کی گلیٹوں کی سوجن۔ بہت پسینہ؛ گلے کا زخم، ناک سے سبز بدبو دار مواد نکلتا۔
 مرک ڈل سس ۲۰۔ کان سے پانی نکلتا۔ بہراپن کے ساتھ
 بھوں بھوں کی آواز سنائی دینا۔
 آرم ٹری فلم؛ جسم کے کسی حصہ میں سردی لگنے سے وہاں کی
 کھال اُدھرنا؛ گلے میں زخم۔

ایمن کارب ۳۔ رات کے آخر میں کھانسی کی زیادتی۔
 اسپیکاک ۳ x ۴۔ بار بار چھینک اور بہت بلغم نکلتا اور اسکے ساتھ
 قے۔ اور بلغم کی قے، سردی سے گلے میں گھر گھرا ہٹ۔
 ایلیم سیپا ۱ x ۴؛ بار بار زور کی چھینک۔ آنکھوں میں پانی بھرا رہتا۔
 ناک سے زیادہ مقدار میں پانی گرنا۔ (بار بار آپ سے آپ نتھنوں سے
 پانی ٹپکتا۔) جلد اکھڑ جانے کی طرح ہونٹوں میں سوزشی درد
 کیلی پانی گرم ۴۔ کام پکا ہوا۔ آواز بھی ہوئی۔ سوت یا
 دوری کی طرح سخت۔ بلغم نکلتا۔ اور گلے میں درد وغیرہ کے علامات۔

نسیٹرم میٹو۔ ۳۔ ناک سے کچا پانی گرنا۔ رطوبت سے بھری پھنسیاں۔
ککلیہ یا کاربا۔ ۳۔ ناک سے بلغم نکلنا۔ اور زخم۔

معمولی اصل۔ ۱۔ بخار رہنے پر ساگودانہ، باری، اراروٹ۔ وغیرہ
ہلکی غذا، پاؤروٹی۔ سوز بہ۔ نہانا۔ اُداس، یا سردی لگنا۔ بالکل منع
ہے۔ رات میں سونے کے وقت گرم پانی سے پیر دھو ڈالنے سے کسی کسی
کو فائدہ ہوتا ہے۔ گرم کپڑے پہن کر لیٹنے نکالنا اچھا اور بہتر ہے
سوزش پیتی، نزلہ بینی، اور زخم بینی کے علامات ملاحظہ ہوں۔

مزمن زکام۔ مزمن نزلہ

(CHRONIC CATARRH)

بار بار نزلہ ہونا؛ ناک کے راستے سے گرد کے ذرات وغیرہ کا داخل ہونا۔
مرض آتشک وغیرہ کے باعث منی کی خرابی سے نزلہ مزمن ہو جاتا ہے
مزمن نزلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) ناک کے نزلہ کا بڑھی ہوئی حالت (۲) نزلہ کی حالت خراب۔
ناک کے لعاب دار جھلی کی سوزش سے ناک کی نیس اور جھلیوں کے بڑھنے
کے ساتھ سانس کی تکلیف موجود رہنے پر مزمن نزلہ کی بڑھی ہوئی حالت
سمجھنا چاہیے۔ ناک سے بہت پتلا اخراج۔ ایک یا دو نچھنے بند۔
گاڑھا ڈوری کی طرح بلغم نکلا۔ گلے اور ناک سے رطوبت نکالنے کے لئے
لگاتار کھنکھارنا۔ سر میں درد؛ قوت سامعہ کا گھٹنا۔ اعصابی درد۔
وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

(۲) ناک کے لعاب دار جھلی کی مزمن سوزش سے ناک کی نیس
اور جھلیوں کی خرابی کے ساتھ ناک سے بدبو دار رطوبت نکلنے پر مزمن
نزلہ کی خراب حالت سمجھنا چاہیے۔

مذکورہ بالا بڑھی ہوئی حالت کے بعد اکثر یہ حالت ہوتی ہے۔ ناک خشک
ہو کر پیری جم جانا۔ بلغم کے ساتھ خون کی چھنیٹیں رہنا۔ ناک سے بدبو نکلا۔ قوت

سامعہ کی کمی یا بالکل زائل ہو جانا۔ اس حالت کے خاص علامات ہیں
اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید و کار آمد ہیں۔

پلسا ٹیلا ۴۔ ۳۰۔ بار بار حاد نزلہ کے بعد مزمن نزلہ۔ گاڑھا
زرد رنگ کا اخراج یا قوتِ ذائقہ یا مشانہ کاکم ہونا۔ بلغم میں کبھی کبھی بدبو ہونا۔
گرم کرہ میں یا شام کے وقت علامات کی زیادتی۔ اور کھلی جگہ میں کم سونا۔

کیلی سلف ۳۔ ۱۲۔ پلسا ٹیلا کے استعمال سے بیماری کم ہونے پر یا بلغم کی
گھڑ گھڑا ہٹ رہنے پر پلسا ٹیلا سے فائدہ نہ ہو تو اسکو دینا چاہیے۔

کیلی سلف ۳۔ ۱۲۔ پلسا ٹیلا کے استعمال سے فائدہ نہ ہو تو اسکو دینا چاہیے۔
سٹیکٹا ۳ x ۳۔ ناک بند ہو جانا۔ ناک کے اوپر سر میں درد۔ ناک

خشک یا پیٹری جمی ہوئی؛ خشک کھانسی (سانس لینے پر بڑھنا۔ بار بار
ناک صاف کرنا۔ لیکن رطوبت کا نہ نکلنا۔ خراب حالت کی دوا۔

لائیکوپوڈیم ۳۰۔ دوسری یا خراب حالت کی اچھی دوا ہے (رات میں
ناک بند ہو جانا۔ اور اس وجہ سے سانس منہ سے پھر لینا پڑے۔

کیلی بانی کروم ۳ x ۴۔ ۱۰۔ اس کا کام سٹیکٹا سے زیادہ ہوتا ہے۔
ناک سے گاڑھا۔ سخت ڈوری کی طرح اخراج خون۔

ناک کی جڑ میں بو محسوس ہونا۔ پیٹری جمنا۔ یا ناک میں زخم ہونا۔
ناک سے بدبو نکلنا۔ آتشک ہو یا نہ ہو۔

کیلی آلیوڈ ۱۰۔ ۲۰۔ (کیلی بانی کروم کی علامت میں)۔
(آتشک سے فساد سے یہ مرض ہو) سخت یا بسبزی مائل؛ سیاہ

رنگ کا یا زرد رنگ کا بدبو دار بلغم اور زخم۔ پیارہ (مرکری)
کے غلط استعمال سے علامات پیدا ہونے میں مفید ہے۔

آرم سیٹ ۴ x ۲۔ سفوف ۲۔ ۲۰۔
آتشک کی وجہ سے نزلہ میں، (ناک آہستہ آہستہ سڑنے میں)

ناک میں پیٹری جم جانا؛ یا زخم؛
ناک ہمیشہ بند رہنا۔ گاڑھا۔ بدبو دار اخراج؛ ناک کی ٹہری کا

سُڑتے جانا۔ مریض ہمیشہ تکلیف میں رہے۔ یا خود کشتی کرنے کی رغبت ہو،
 پارہ یا کالی آیوڈ کا غلط استعمال ہونے میں یہ زیادہ فائدہ کرتی ہے۔
 ہیمپرسلفر۔ ۳۔ ٹھنڈے پانی کے چھوٹے سے ناک ہو جانا۔ استسقا۔
 جریان۔ ۱۔ یا آتشک والے مریض کی کھانسی، کلکیر یا کارب۔ ۳۰؛ سلفر۔ ۳۰۔
 سورنیم۔ ۳؛ آرس آیوڈ۔ ۶؛ پانی ڈراسٹس۔ ۶۔ ٹائیٹرک ایسڈ۔ ۳۰۔
 فاسفورس۔ ۶۔ پیسیا۔ ۳۰؛ نکس و امیکا۔ ۳۰؛ مرک پیروٹ۔ ۴۰۔
 سفوف۔ سلکا۔ ۳۰؛ وغیرہ ادویات پینچ پینچ میں ضروری ہو سکتی ہیں۔
 (مذکورہ بالا نزلہ حاد کی ادویات ملاحظہ ہوں۔)

علاج معاون

کھلی ہوا میں گھومنا۔ اور ٹھنڈے پانی سے صبح آہستہ آہستہ نہلنے
 کی عادت ڈالنا۔ اس طرح جسم سردی برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا
 ہے۔ سردی لگنے میں آسانی کے جسم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔

نخرہ کی شدید سوجن

(ACUTE LARYNGITIS)

نخرہ کی لعابدار جھلی کی سوجن، اور لیسدار بلفم نکلنے کا ورم جنجرہ
 یا ایرنجاٹس ہی۔ گلے میں کٹ کٹ بولنا۔ اور جلن محسوس ہونا۔ سخت
 بلفم نکلنا۔ کتے کی آواز کی طرح خشک کھانسی۔ کچھ کالی کھانسی، کی طرح
 آواز بیچھی۔ بخار، پیاس، بھوک نہ لگنا۔ سانس کی تکلیف وغیرہ
 اس بیماری کے خاص علامات ہیں۔ سردی لگ جانا۔ پانی میں بھیگنا۔
 گلے میں دھول کے ذرات یا دھواں کا جانا۔ میلی جگہ میں رہنا۔
 روز سے تقریر کرنا۔ یا گانا۔ جس میں نخرہ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
 یکایک ہوا کی تبدیلی، ان اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔

مختصر علاج :- (۱) مرض کے شروع میں ایکون اسپنجیا، انٹیم ٹارٹ۔
 (۲) اشد مرض کی حالت میں بردائن، آیوڈ اسپنجیا، کیلی پانی، ہیمپرسلفر،

مرض کی زیادتی کمی کے موافق ۵ امانٹ سے لیکر ۳ گھنٹہ کے وقفہ سے یہ دوا دی جا سکتی ہے۔
چند مفید و کار آمد دواؤں کی علامت مندرجہ ذیل ہیں۔

ایکونائٹ X۲ - کھاک کھا کر کھانسی آنا۔ (ٹھنڈی خشک ہوا لگنے سے پیدا ہوا بخار۔ پریشانی، بے چینی، گلے میں درد۔ سانس رک جانا۔

بیلادونا ۳ - تیز بخار (مریض کے جسم پر ہاتھ رکھنے سے گویا ہاتھ جلا جاتا ہے)۔ ککڑ (کتا بھونکنے کی طرح) کھانسی۔ ادکھنا۔ تشنج (TWITCHING) چہرہ تھمایا اور سرخ۔ آنکھیں رکی۔ تپلی پھیلی یا سگری ہوئی۔ جسم کے ڈھکے ہوئے حصہ میں پسینہ نکلنا۔ گلے میں درد۔ ہڈیاں۔

برومائن X۱ - (تازہ تیار کر کے استعمال کرنا چاہئے) ہوا کی نالی

(خجرہ) میں کے بالائی حصہ پر مرض کا حملہ ہونے پر بچہ اپنا گلہ دبا کر پکڑ لیتا ہے۔
سینجیا X۳ - یا آیوڈین ۳ - خشک۔ سخت لکڑی کھانسی، آواز بیٹھی،
گلے میں کچھ اٹکا سا محسوس ہونا، سانس لینے میں تکلیف۔ آدھی رات کے پہلے
بیماری کا بڑھنا۔ کمزور بچوں کو آیوڈین - بجائے سنجیا، کے دینا چاہئے۔
کیلی بالی کروم X۳ - سفوف - گاڑھا لیسدار، دوری کی
طرح سخت، لیباریش۔ اور درد رنگ کا بلغم نکلنا۔

ہیسپر سلفور ۴ - کھانسی تر ہو جانے پر، لیکن گلے میں آواز خراب۔
کھانسنے میں گھم گھمراہٹ۔ خشک ٹھنڈی ہوا لگنے پر مرض
بڑھتا ہو۔ اور گرمی سے کم ہوتا ہو۔

وٹاسنفورس ۳ - آواز بیٹھنے کی اچھی دوا ہے۔

کاسیکم ۴ - آواز بیٹھی اور سیمتہ میں درد۔

آرسنک X۳ - بہت کمزوری، سرسامی، بخار کی علامات۔
علاج معاون

بہت گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اور اس کو خوب نچوڑ گلا سینکے
سے فائدہ ہوتا ہے۔ گرم کپڑے سے بدن ڈھکا کر کھنا چاہئے
بخار کی حالت میں ہلکی غذا اور کم بولسنا چاہئے۔

بڑی سگریٹ، حقہ وغیرہ، شراب پینا۔ بستر سے اٹھنا منع ہے۔
گرم پانی یا گرم دودھ پینا منع ہے۔

نرخرہ کی پُرانی سوچن

(CHRONIC LARYNGITIS)

حجرہ پر بار بار مرض کا حملہ کرنا۔ زور سے گانا۔ تقریر کرنا۔ نرخرہ سے
بہت کام لینا۔ گلے میں دھواں گرد کے ذرات وغیرہ کا اندر جانا۔
وغیرہ اسباب سے نرخرہ کی مزمن سوچن پیدا ہوتی ہے۔ گلا صاف کرنے کے لئے
مریض کو بار بار کھنکھارنا پڑتا ہے۔ یا بلغم نکالنا پڑتا ہے۔ آواز بیٹھی یا
غائب، نرخرہ سکرٹنے کی وجہ سے سانس میں تکلیف، مخصوص علامات ہیں۔

علاج

کاسٹیکم ۳-۶: آواز بیٹھی، خشک، کھانتے کھانتے مریض کو پیشاب
ہوجا۔ تقریر کرنے والوں کی حجرہ کی سوزش۔

آر جیٹیم مٹ ۴-X سفوف: خاصکر گوتوں کی بیماری میں زیادہ
مفید ہے۔ آر نکا ۳: نرخرہ سے زیادہ کام لینے (جیسے تقریر کرنا) سے پیدا ہوئی
بیماری میں؛ ایلیمون ۶۔ بوڑھوں کے مزمن درم حجرہ میں؛
سینیم ۶۔ بوڑھوں کی آواز بیٹھ جانے پر۔

ڈراسیرا ۱-۲X۶۔ بہت دیر تک خشک کھانسی۔ کھانتے کھانتے
دم رگ جانا۔ ایسا محسوس ہونا گویا گلے کو کسی نے چھیل دیا ہے۔ آواز
بھری ہوئی اور غیر طبعی، بولنے سے بھی مریض کے گلے میں تکلیف ہو۔
کیلی آیوڈ ۵-۱۰ (۵-۳۰): آتشک کے تیسرے درجہ میں اگر
درم نرخرہ ہو جائے۔ عا درم حجرہ؛ مرض کی دوائیں اور علاج معاون؛

برانکائیٹس

(BRONCHITIS)

شدید التهاب شعب، میں بڑی اور چھوٹی ہوا کی نالیوں کی لچا پدا

جھلی پر مرض کا حملہ ہوتا ہے۔ بہت بچوں اور بوڑھوں کو اس بیماری کے ہونے سے خرابی ہو سکتی ہے۔ دیر تک ٹرکپڑا پہننا۔ برساتی پانی میں بھیکنا سردی لگنا۔ پسینہ رُک جانا وغیرہ اسباب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات

شروع میں درد سر کا ہی؛ اسکے بعد ہلکا بخار، سینہ میں گرمی محسوس ہونا۔ آواز بیٹھ جانا۔ سانس کی تکلیف (معلوم ہو کہ کلیجہ جکڑ گیا ہے)۔ پہلے درجہ میں خشک کھانسی، بعدہ جھاک دار آخر میں گاڑھا زرد رنگ کا بلغم نکلنا۔ زبان میلی اور پیشاب وزن میں کم ہونا۔ دوسرے درجہ میں بہت سانس کی تکلیف۔ گلا گھر گھرا نا۔ (جسم کی حرارت ۴۰ درجہ تک) ٹھنڈا ایسا رسیدار پسینہ۔ دونوں گال تپتے یا سیلے۔ زبان خشک اور گھر درمی، پیشاب وزن میں کم اور ہاتھ و پیر ٹھنڈے۔ چارپانچ دنوں میں مرض کا گھٹ جانا اچھا ہے۔ ورنہ مرض بڑھ جاتا ہے۔ بوڑھوں کو یہ مرض اکثر مزمن ہی حالت میں ہوتا ہے۔

علامات بدنام:۔ سرد پسینہ سے تمام جسم تر رہتا ہے، گال ہونٹ بد رنگت نیلا ہونا۔ ہاتھ و پیر ٹھنڈے۔ گلا گھر گھرا نا۔ سانس رکنا۔ بہت سستی اور آخر میں بے ہوش ہو کر فوراً موت ہو جاتی ہے۔

مزمن :- التهاب شعب بہت کچھ ایک دوسری ہی بیماری ہے یہ مرض بڑھاپے کا ہے؛ برابر کھانسی، اور اسی وجہ سے زیادہ ہوا۔ یا بخارات (بھاپ) اٹھے ہو کر رگیں پھیل جاتی ہیں۔ ہوا کی تلی کا پھیلنا۔ سانس کی آمد و رفت کا چھوٹے ہوتے جانا۔ بہت کف نکلنا۔ بخار نہ رہنا وغیرہ اسکے مخصوص علامات ہیں۔

علاج کی غرض کے لئے مختصر اشارے مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) شدید شعاع میں ایکون۔ انٹم ٹارٹ۔ اپی کاک۔ برائیو۔ ناس۔ کیلی بائی۔
- (۲) مزمن حالت میں انٹم ٹارٹ۔ (زیادہ دھیلا بلغم۔ کیلی بائی، سخت) دُوری کی طرح بلغم بھوک (مواد کی طرح کھنا، امیون کارب۔ (برابر

کھانسی اور زرخرہ میں بال رکھا ہوا خسوس ہونا، کار بوج یا آرسس،
(کیار کی کمزوری) سلکا، فاس، سلف، ایسڈ، ٹیٹرک، کیکٹس،

زیادہ کف نکلنے پر کریازوٹ کی بھاپ، (تھوڑے کھولتے ہوئے پانی
میں تین چار بوند کریازوٹ ۱۰ - ڈالنا) بھارا لینے سے بلغم نکلنا بند ہوتا ہے
اور اس کے ساتھ ہی بدبو بھی بند ہو جاتی ہے۔

(۳) بچوں کے التهاب شعب میں، انٹیم ٹارٹ (زیادہ بلغم جمنے پر)
ایپیکاک - (تشخی کھانسی) - پکس - (ڈھیلی کھانسی) - ایکون - برابو -
فاس فوریکیم، نہایت مفید اور کارآمد ہیں۔

چند دیگر مندرجہ ذیل ادویات بھی اس مرض میں مفید ہیں۔

ایکونائٹ ۳۰x - کلچے اور گلے میں سرسری ہو کر تکلیف دہ کھانسی، اور
اسی وجہ سے سر اور کپٹی میں درد، مرض کے شروع میں یہ دوا دینے سے
ضرور فائدہ ہوتا ہے۔

بیسلاڈونا ۶ - (ایکون کے استعمال سے زیادہ فائدہ ہونے پر)

خشک کھانسی، بخار، سر میں درد، آنکھیں اور منہ سرخ، روشنی، اور
آواز میں بے برداشت نہ کر سکتا ہو،

انٹیم ٹارٹ ۶ - ۳۰ - کھانتے کھانتے سانس بند ہونے کا خوف،
ٹکڑے بلغم نکلنا، سانس سانس کی آواز، کمر پٹ اور سر میں درد۔

اور کلچے دیکھ کر، بچوں، اور بوڑھوں کا التهاب شعب، کلا گھر گھرانا،
لیکن بہت تھوڑا بلغم نکلتا ہے۔

برایونیٹ ۳۰x ۳۰ - گلے کی تلی، اور بڑی بڑی سانس کی لیموں پر

مرض کا حملہ ہو کر نہایت تکلیف دہ کھانسی، زرد رنگ کا ٹاڑھا اور خون
لا بلغم نکلنا، کھانتے کھانتے درد کی وجہ سے کلچے ہاتھ سے دبائینا۔

کیلی بانی کروم ۶ - ۱۲، زرخرہ اور خون سینہ کا دم، عروق

تعمین (چھوٹی چھوٹی آواز کی نالیان پر) حملہ ہو کر تکلیف دہ کھانسی،
بہت دیر تک کھانتے کھانتے گوند کی طرح سادہ یا میلا کف نکلنا۔

زرد رنگ کی، میسلی زبان۔ بھوک نہ لگنا۔

آرسنگ ۳۔ ۱۲۔ ۳۰۔ تھوڑا بلغم نکلنا۔ سونے میں سانس کی آمد و رفت میں دیر کی طرح تکلیف، کھانٹے کھانٹے رات میں نیند کھل جانا۔ کھانٹے کھانٹے کبھی پیلا بلغم نکلنا۔ بوڑھے اور کمزور اشخاص کے فرمن الہراب شعب (برانکائی ٹس میں) ٹپکسا ٹپکسا ۳۰۔ بہت زیادہ بلغم نکلنا۔ نئے یا گرم کمرہ میں، جانے سے کھانسی بڑھنا۔

کاربوووج ۶۔ ۱۲۔ ۳۰۔ مرض کے فرمن یا آخری حالت میں مریض کے ہاتھ پر صفٹے، بہت کمزوری، ہاتھ پیروں کے ناخن نیلے، آواز بیٹھی، زیادہ بلغم نکلنا۔ قاسفورس ۳۔ بچوں کے مرض برا نکوٹونیہ میں۔ چائٹا ۶۔ ۱۲۔ ۳۰۔

زیادہ مقدار میں اخراج بلغم اور اسی وجہ سے مریض کا کمزور ہو جانا۔ اسپیکاک ۳۔ لگے ۵ بلغم کی گھڑ گھڑاٹ، کاسٹیکم ۳۰۔ آواز بیٹھی۔ مرکسول ۶۔ تھوڑی سردی لگنے اور پسینہ نکلنے پر۔ آرسنگ آیوڈ ۳۰X۔ نمار، رات میں پسینہ، سانس کی تکلیف۔ مواد کی طرح بلغم نکلنا، بہت کمزور، دق کے علامات رہنے پر۔

سینگوینیریا ۳۰۔ نشیجی کھانسی خشک یا زیادہ مقدار میں بلغم نکلنا۔ سینہ میں بعد نکلنے یا جلن کر نیوالا درد، ناک میں نزلہ، وغیرہ علامات میں۔ بلغم نکلنا۔ سینہ میں بھونکنے یا جلن کر نیوالا درد، ناک میں نزلہ، وغیرہ علامات میں۔

ایون کارب ۳۔ بلغم نکلنے میں تکلیف

ہیمپرسلفر ۶۔ زیادہ مقدار میں زرد کف نکلنا اور آواز بیٹھی ہوئی۔

سلفر:- ٹائیٹرک ایڈ ۶۔ سینیجا ۳۰X۔ ایون کارب ۳۰X۔ سمی سی فیوگا ۵۔

کوئیم ۳۰۔ ہایوسامس ۳۰۔ وغیرہ ادویات کی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

عام اصول:- سونے کے وقت سر کے نیچے موٹا بچہ رکھنا مناسب اور بہتر ہے

سینہ پر سرسوں کی پکٹس لگانے سے کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ مریض کے کمزور ہو جانے پر

شیت کا شوربہ دیا جاسکتا ہے۔ اس یا سردی لگنا منع ہے۔

زمن نزلہ کا علاج معاون ملاحظہ ہو۔

نونیہ یا ورم پھیپھڑہ کا بیان ملاحظہ ہو۔

درد پسلی پلیوریسی

(Pleurisy)

اس مرض میں پھیپھڑہ کے بالائی حصے کے یا سینہ کے دیوار کے پاروں کی طرف کی ورم جھلی کے ساتھ بخار، لرزہ، خشک کھانسی اور رکھنا وقت پسلیوں میں تیز درد، وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ ایک مہینہ کے جراثیم ہی اس مرض کے خاص سبب ہیں۔ سردی لگنا۔ تبدیلی موسم یا ایک پسینہ رگنا۔ خراب صبح، مرض دق میں مبتلا رہنا۔ نشتر لگوانے یا سینہ میں چوٹ وغیرہ اسباب سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید و کارآمد ہیں۔

ایکونائٹ ۳۳-X۔ گرمی، پیاس، لرزہ، اور وجہ مفاصل سے پیدا ہوا، اور خوف سینہ، ایکون، تین چار خوراک کھانے سے اکثر بہت پسینہ نکلتا ہے۔ یہ بیماری کم ہو جاتی ہے، ایکونائٹ کے بعد برائی یونیا کی ضرورت پڑتی ہے۔ برائی اوٹیا ۳۲-۳۳۔ سینہ میں جلن، یا سوئی چھیننے کی طرح درد، یا چلکن کی طرح درد، ذرا حرکت کرنے یا سانس لیتے وقت درد کا بڑھنا۔ خشک کھانسی، زرد زبان، ذائقہ کڑوا۔ اور قبض۔

سمی سی فیکوگا ۴۰۔ خوف سینہ کے درد میں۔ آرسنک ۱۰-۲۰۔ آرنیکا۔ بے سلینم۔ ۲۰۰۔ وغیرہ اس مرض کی اچھی دوائیں ہیں۔ آرسنک آیوڈائیڈ ۳۳-X۔ بہت عرصہ میں مبتلا رہنے پر۔ سانس کی آمد و رفت کے وقت کھینچنے میں دباؤ محسوس ہونا۔ دم رگنا۔ جسم ٹھنڈا۔ بہت سستی۔ فاسفورس ۳۰۔ پھیپھڑے پر حملہ ہونا۔ کف کا رنگ مرچ کی طرح؛ سستی خاصہ کمزور اور دق پیدا ہوئے مادہ والوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

انٹیم ٹارٹ ۳۳-X۔ سفوف۔ کھانسی، گلے میں بلغم، ٹھنڈا ہونا۔ سینہ میں دباؤ محسوس ہونا۔ متلی، زیادہ کف نکلتا؛ کلیجہ دھڑکتا۔ دم رگنا؛ آیوڈین ۳۰۔ مریض کی بہت کمزوری میں، یا بہت دنوں تک بہت

رہنے میں آرسنک کے بدلہ آیوڈین دینا چاہیے۔
 آرٹیکا ۲۰۰ x ۳۰ چوٹ لگنے یا بہت دیر تک کثرت کرنے کے بعد یہ بیماری ہونا۔
 سلفر ۳۰۔ (مزمن مرض میں) درد سینہ کی تیزی کم ہونے کے بعد
 سانس کی آمد و رفت یا کف میں بد بگور ہونے میں یہ دوا بیچ بیچ میں استعمال
 کرنا چاہیے۔ ٹے نیکل بیڈ زیادہ مقدار میں آپ ہی آپ مواد نکلنے میں مفید و کار آمد ہو۔

علاج

مریض کو ٹھیک طور سے (بلا حرکت) آرام کرنا ضروری ہے۔ ٹھنڈا گرم
 سٹیکنا اور پلٹس یا ندھنا ضروری ہے۔ اور ارادوٹ، شورڈ، ٹھنڈا پانی
 وغیرہ ہلکی چیزیں دینی چاہئیں۔ خون نکلوانا وغیرہ ممنوع ہے۔
 (امراض پھیپھڑے کا ورم) کے بیان میں علاج معاون“ ملاحظہ ہو۔

(ASTHMA)

دمہ

کلچے کی بیماری کی وجہ سے سانس میں تکلیف ہونے پر ہی دمہ ہوتا ہے
 یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے پھیپھڑے کی ہوا کو رواں کرنے کے لئے نالیاں سب
 چھوٹے چھوٹے عضلہ سے گھری ہیں۔ ان عضلات میں تشنج یا اکڑن ہونے کی
 وجہ سے بھی سانس میں تکلیف ہو جاتی ہے اور گلا سائیں سائیں کرنے
 لگتا ہے۔ اس مرض میں سانس کی بہت تکلیف، گلا کا سائیں سائیں کرنا۔
 بچے پر دباؤ محسوس ہونا۔ چار پائی پر سونے یا بیٹھ جانے کی طاقت
 نہ رہنا۔ ہوا ملنے کی اُمید سے مریض کا دونوں کندھے اُٹھائے
 رکھنا۔ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

یہ بیماری اکثر رات کے آخری حصہ میں ہوتی ہے۔ کھانٹے کھانٹے بہت
 تکلیف سے بلغم گل جانے پر، دمہ کا تشنج کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اس تشنج کے
 ساتھ کسی کسی کا پیٹ پھوٹا، سرد، متلی وغیرہ علامات بھی نمودار ہوتے ہیں دمہ اکثر
 بد ہضمی یا وجع مفاصل موجود رہتا ہے۔ ناک کی کوئی بیماری رہنے پر بھی سانس میں تکلیف
 ہو جاتی ہے۔ والدین کو اکثر یہ بیماری رہتا۔ رات میں زیادہ بوجھ خراب خون۔ دل میں

کبھی بیماری کا رہنا۔ دماغی یا اعصابی تحریک ہوا کے ساتھ گردنے ذرات یا کوئی سانس کے ذریعہ جسم میں داخل ہونا وغیرہ اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دمہ کے مریض عرصہ تک زندہ رہتے ہیں۔ اس تکلیف میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔ (۱) مرض کے حملہ کے وقت ایکو نائٹ؛ ریڈ کس؛ اسپیکاک؛ کیو پریم؛ لوبلیا؛ ہائی ڈروسیانک ایسڈ سمی سی نیوگا۔ (۲) (فی خوراک ۵- قطرے) نیٹریم سلف؛ ایمل نائٹریٹ؛ مؤخر الذکر شدید حملے کی صورت میں سونگھانی چاہیئے (۲) امراض جلد کے دبا جانے سے مرض دمہ ہو تو زنک؛ گریفائٹس (۳) مزمن مرض دمہ میں؛ تے کم؛ ایم؛ کیلی ہائیڈرو آئیڈیکم؛ نکس و امیکا۔ آر جنٹیم نائٹ؛ پلیم۔ کاکبوس۔ (۴) بچوں کے دمہ میں؛ اسپیکاک؛ سمبوس؛ آجکس۔ مفید ہیں۔ اکثر ادویات کے علامات۔ کسی اور دوا کو کام میں لانے کے پہلے بلانا۔ اور ٹیلیس۔ ۲۳-X استعمال کرنا چاہیئے۔ شری پت ایشور چندر دیا ساگر نے اسی دوا کو کھلا کر بہت مریضوں کو اچھا کیا ہے۔ مریض طبریا کو یہ دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ اس سے فائدہ نہونے پر دوسری دوائیں علامات کے مطابق دیجا سکتی ہیں۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ ۲۳-X۔ حاد میں یہ دوا فائدہ کر سکتی ہیں۔ اسپیکاک ۱۰-X؛ سینہ میں دباؤ محسوس ہونا۔ بار بار۔ سانس پھولنا۔ گھر گھر یا سائیں سائیں کی آواز، تمام جسم میں ٹھنڈک، تمام جسم۔ (خاص کر چہرہ) زرد؛ بے چینی؛ قے کی طرف رجحان؛ بار بار تکلیف دہ کھانسی؛ زہ منت؛ ۳۰ منت کا وقفہ دیکر استعمال کرنا چاہیئے۔ کاسٹیکم ۳۰-۱۰۰- صبح (خاص کر برسات یا کھرنہ رہنے پر) آواز بیٹھی ہوئی اور دمہ کی ترقی، سرد پانی پینے کے بعد کھانسی کا زور کم ہو جانا معلوم ہو کہ کھجے کی ہڈی کے نیچے گویا بلغم جمع ہے۔ درد کم۔ آر شک ۲۳-X-۱۲-۳۰- پھیپھڑے میں اجتماع خون کی وجہ سے سانس میں تکلیف، گلے کا سائیں سائیں کرنا۔ سونے یا حرکت کرنے سے بڑھنا۔

سینہ میں جلن اور سرد پسینہ۔ رات میں ۱۲ بجے کے بعد سانس کا بڑھنا۔ بڑے اور کمزور آدمیوں کے دمہ میں ۴۔ دمہ کے ساتھ کوئی دل کی بیماری یا آلہ تنفس کی بیماری۔ اپیکاک سے فائدہ نہ ہونے پر یا کچھ کم فائدہ ہونے سے آر سے نکم دیا جاتا ہے۔ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔

لوبلیا ۱۰۔ ۳۰۔ (مرصن کے شروع ہوتے ہی کھلا دینے سے سانس کی تکلیف ترقی نہیں کرتی۔ پیٹ سے سینہ تک کمزوری محسوس ہونا۔ مستی یا تھ، معدہ میں سخت چیزاڑی محسوس ہونا۔ تشنج کے ساتھ دمہ۔ دم رکنا۔ سنی گا ۱۰۔ اپیکاک، آرسنک۔ لوبلیا۔ فائدہ نہ ہونے پر، ڈاکٹر نیش نے یہی دوا ۱۰۔ فی خوراک ۵۔ ۶۔ قطرے بہت تیز دمہ کے مریضوں کو دیکر اچھا کر دیا ہے۔ سنی گا کے ڈائلوشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علاج امراض تنفس مرتبہ ڈاکٹر نیشن ملاحظہ ہو۔

ہملوگروں نے مندرجہ ذیل علامات میں اسکو بہت فائدہ مند پایا ہے۔ کھانسی پہلے خشک اور اس کے بعد کھٹ، اس کے بعد سانس سائیں کی آواز۔ اور سینہ میں دباؤ محسوس ہونا، یا اکڑنا۔ بہت کھٹ جمع رہنے کے سبب لگاتار تکلیف دہ کھانسی، اور سانس کا مرض پیدا ہو جانا۔

سینہ میں گھڑ گھڑا ہٹ ہونا، آواز بھیٹ ہوئی، آرام کرنے یا گھومنے سے علامات میں زیا دتی ہونا۔ اور پسینہ نکلنے اور سر جھکانے سے علامات میں کمی آنا۔ ایکون ۱۰۔ ۳۰۔ دمہ کا تشنج شروع ہوتے ہی گھڑا ہٹ، سانس لینے میں تکلیف، دل کا فعل سست۔ تشنجی دمہ، کلیجے میں دباؤ محسوس ہونا، کلیجہ دھڑکنا۔ سانس کی تکلیف وغیرہ علامات میں ایکون ۱۰۔ اکثر جادو کی طرح کام کرتا ہے۔

کو پریم میٹائیکم ۶۔ اعصابی دمہ میں) یا بے ہوشی زیادہ ہونے پر تشنج کے بعد ہی تھے۔

کیلی بائیڈرائڈیکم ۱۰۔ ۳۰۔ صابن کے جھاگ کی طرح کھٹ نکلتا۔ بار بار چھینک آنا۔ ناک سے پیلا بلغم نکلتا۔ اور سانس میں تکلیف۔

بالخصوص پارہ کے بیجا استعمال سے پیدا ہوا ہو؛ اور مریض وجہ مفاصل یا آتشک کے لئے مفید ہے۔ نکس و امیکا ۳۰۸۔ معده کی خرابی سے پیدا ہوا مرد نکائی شس کے ساتھ دمتہ کی شاید سب سے اچھی دوا ہے۔

زبان گہرے یا پیلے رنگ کی۔ بلغم آلود؛ بد ہضمی؛ قبض یا پیٹ پھولنا مثلی، کھانے پینے میں ضد؛ زیادہ پریشانی سینہ کی بڑی کے نیچے درد؛ زیادہ کف نکل کر دم کا تشنج کم ہو جاتا ہے۔

ورارٹم ورائٹڈ ۳۔ چہرہ پر سرخ پسینہ؛ سانس میں تشنج؛ تھپی یا مثلی؛ کان، ناک، پیر ٹھنڈے؛ اینٹھن اور سستی۔ سلف ۴۔ نقرس امراض جلد اور دوسری خرابی سے پیدا ہوئے مریض دمتہ میں (دوسری دواؤں کے ساتھ) بیج بیج میں ایک خوراک سلف دینے سے ان دواؤں کا فعل اچھی طرح نمودار ہوتا ہے۔ نیٹرم سلف ۴۔ سفوف۔ ان مریضان کے دمہ میں جو مریض جریان یا لیبریا میں مبتلا ہوں۔ مرطوب جگہ میں رہنے سے دمتہ (پانی کے مادہ کی زیادتی کے لئے یہ زیادہ مفید ہے۔ کیلی کارب ۶۔ بیلاڈونا ۱۰۔ امیراگریٹیا ۳۔ ڈراسرا ۳۔ پیر سلف ۶۔ ایکس ۶۔ انٹیم مارٹ ۴۔ سمبکس ۱۔ لائیکوپلورڈیم ۱۱۔ سنبویا ۳۔ وغیرہ کی بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

بنسیلینم، یا ٹیوبرکیولینم ۳۔ ۲۰۰۔ ہفتہ میں ایک خوراک استعمال کرنے سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ (خاص کر برا نکائی شس میں ملا ہوا دمتہ) عام اصول:- ثقیل اور دیر ہضم غذا ممنوع ہے۔ شام سے پہلے ہی دوسرے وقت کی غذا۔ دھارا میں نہانا۔ گھومنا۔ کھلی اور صاف ہوا میں رہنا۔ گرم پانی پینا۔ اور کف رائل کرنے والی چیزوں کا کھانا فائدہ مند ہے۔ ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے ایک

ڈاکٹر ڈیوی صاحب کہتے ہیں کہ بیلاڈونا ۱۰ کچھ زیادہ مقدار میں دینے سے دمتہ کا تشنج کم ہو جاتا ہے۔ بیلاڈونا سے فائدہ نہ ہونے پر ایڈری نین دینا چاہیے۔

ڈاکٹر نے حال ہی میں کہا ہے کہ ایک مریض کے جسم میں آؤ جھو جانے سے بھی تحریک ہو جاتی تھی۔ تو کھانا چھوڑتے ہی وہ اچھا ہو گیا۔ شبنم یا بہت صبح ہی بستر سے اٹھ بیٹھنا اچھا نہیں۔ دوران مرض میں دھتورے کے (STRAMOIVILUM) (CIGARETTES) پٹرٹ کا دھواں پینا مفید ہے۔ لیکن عرصہ تک یہ سگریٹ پینا نہ چاہیے۔ ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ آپیکاک ۱۰-۱۵ قطرے روزی میں رکھ کر سونگھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھٹکری (ALUM) کا سفوف یا ۱۵ اگرین زبان پر رکھ دینے سے شاید دمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی آزمائش کرنی چاہیے۔ ایکون یا تارپین کا تیل یا گندھک یا حقوڑا نلک گرم پانی میں ڈال کر سونگھنا مفید ہے۔ ایک طشتہ ہی میں کسی پرت بلا ٹنگ پیر (سوختہ کاغذ) بچھا کر اس پر حقوڑا سو رہ رکھ کر بلا ٹنگ کاغذ جلا کر دھواں سونگھنا مریض کو بہت فائدہ کرتا ہے۔ لیکن خبردار رہو۔ گھر کی کھڑکیاں اور دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ تاکہ ہوا کی آمد و رفت بند نہ ہو مریض اگر اپنی طاقت بھر سانس روکے تو دمہ کا تشنج کم ہو جاتا ہے دھتورے کے مریض کو چھوٹے ٹانگ پور کی آب دھوا مفید ہے۔ لیکن اگر جگر کی خرابی بھی ہو تو سمندر کے کنارے رہنا اچھا ہے۔ کسی کو ترجیح دجیسے چرا بونجی میں رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو خشک جگہ میں جیسے مدھو پور، بیجنا تھ گریڈ پیر، گجرات، جو جگہ جس کے لئے مفید ہو اسکو وہاں رہنا چاہیے۔

نمونیا - ورم پھیپھڑا (PNEUMONIA)

پھیپھڑے رنج کی مداخلت میں ورم ہو جائے۔ یا اس میں کوئی مرض پیدا ہو جائے تو اسکو پھیپھڑے کا ورم نمونیا کہتے ہیں۔ پھیپھڑے کی ہوا کی نالی پر مرض کا حملہ یا ورم ہو تو ترانکائیٹس یا التهاب شعب اور پھیپھڑے کے بالائی حصہ کے چاروں طرف کی جھلی کا ورم پلیمورل سی یا ذات الجنب کے نام سے منسوب ہیں۔ کبھی کبھی پھیپھڑے کے ورم کے ساتھ پھیپھڑے کی جھلی کا ورم ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا نام پلیمورونمونیا ہوتا ہے۔ اس مرض میں ایک طرف یا دونوں طرف کے پھیپھڑے میں ورم ہو سکتا

ہے ایک طرف کا (سہا بردائیں طرف کا) پھیپھڑا ماؤف ہو تو اسکو ذات الصدہ
 یکطرفہ (SINGLE) اور دونوں طرف کے پھیپھڑے ماؤف ہوں تو ان کو
 ذات الصدہ دو طرفہ (DOUBLE) کہتے ہیں۔ معمولی بخار یا بے چینی کے علاوہ
 مریض شروع میں کسی طرف تکلیف نہیں محسوس کرتا۔ اس کے بعد کندھے یا سینہ
 کی بڑی اس کے نیچے درد، تیز بخار، خشک کھانسی، تیز سانس، کمزور یا سوت کی
 نبض، ناک اور آنکھیں خشک یا بلغم ندارد۔ تھوڑا اور سرخ پیشاب وغیرہ
 علامات نمودار ہوتے ہیں۔ سانس میں بے حد بدبو ہونے پر، دخاص کر بعد سے
 اور کمزور آدمیوں کو سمجھنا چاہیے کہ پھیپھڑے کا سسٹرنا

(GANGRENE) شروع ہو گیا ہے۔ اس مرض میں ترتیب وار تین
 درجے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے (۱) آناس یا خون کے رک جلنے (ENGORGEMENT)
 کا درجہ۔ (۲) مادہ رطوبت کے تراوش پانے (EXUDATION) کا درجہ
 (۳) انحطاط یا تحلیل (RESOLUTION) کا درجہ

(شروع میں یا درم کا درجہ) پھیپھڑے میں خون جمع ہو کرہ جاڑا لگ کر
 بخار آتا ہے جسم کی حرارت ۱۰۴ سے ۱۰۶ تک۔ سانس کی آمد و رفت ۳۰
 سے ۳۵ مرتبہ اور نبض کی چال ۱۲۰ سے ۱۳۰ مرتبہ ہو سکتی ہے۔ اول بخار
 (۱) اس کے ساتھ کبھی اینٹھن یا کھچاؤٹ پیدا ہو کر تھوڑی تھوڑی کھانسی
 کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جما ہوا کف نکلتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ
 شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ شروع ہونے سے پہلے زنگ کی طرح یا سرخی
 کی طرح کے زنگ کا یا زرد، سخت، گاڑھا بلغم نکلتا ہے۔

کھانستے وقت سینہ کا سکڑنا، سر میں درد، کھانے سے نفرت۔ سانس کی
 آمد و رفت میں تکلیف، نبض پُر اور اچھلتی ہوئی رہتی ہے۔

مذکورہ بالا پہلے درجہ کے قیام کا وقت کئی گھنٹہ سے لیکر دو تین دنوں
 تک رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ شروع ہونے پر پھیپھڑے سخت
 ہو جاتا ہے۔ اور درد کم ہو جاتا ہے۔ کھانسنے میں اتنی تکلیف نہیں
 ہوتی ہے۔ اور بلغم پستلا ہو کر نکلنے لگتا ہے۔ اس طرح دو سے چار

روز تک دوسرا درجہ رہنے کے بعد تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔ سفاکی طرف
لوٹے ہوئے میں بخار اور پھیپھڑا کا درد کم ہو جاتا ہے۔ کھانسی آنا اور
بلغم نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بیماری سخت ہو جاتی ہے تو دوسرے
درجہ کے بعد ہی پھیپھڑے میں مواد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کھانسی کے ساتھ
بہت مواد نکلتا ہے۔ اس کے بعد نبض ضعیف، سرخ اور سانس کی
رفتار بڑھ کر مریض کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ اور موت آ جاتی ہے۔
کبھی کبھی کمزوری کی وجہ سے مریض منہ سے مواد نہیں نکال سکتا ہے۔

اس مرض کی جانچ کرنے کے لئے اسٹےٹھکوپ (سینہ کی جانچ کا آلہ)
کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ سینہ جانچ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مرض کے پہلے
درجہ میں ادلی کڑی آواز سن پڑتی ہے۔ بعد رگڑنے کی طرح کی آواز
معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے درجہ میں جب پھیپھڑا سخت ہو جاتا ہے تب
کوئی آواز نہیں آتی۔ تیسرے درجہ میں جب پھیپھڑے میں مواد پیدا
ہوتا ہے تب ڈھب ڈھب کی آواز سن پڑتی ہے۔ دونوں طرف کے
پھیپھڑے ماؤف ہونے سے سمجھنا چاہیے کہ مرض سخت ہو گیا ہے۔

اسباب:- نیوکس نامی ایک قسم کا جرم خاصہ کہ اس بیماری کا سبب
ہے۔ تبدیلی موسم، پسینہ رگنا، جسم کی کمزوری، بخار وغیرہ بیماریوں میں
پھیپھڑے کا کمزور ہونا، شہنم یا سردی لگنا وغیرہ دوسرے اسباب ہیں۔
اس مرض میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

(۱) مرض کے شروع میں پہلے ایکون اور اس کے بعد فاسفورس استعمال کرنے
سے معمولی قابل شفا مرض میں اکثر کسی دوسری دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔

(۲) اس مرض کے ساتھ پھیپھڑے کے غلاف پر مرض کا حملہ ہونے میں براہیوٹیا۔ فاس۔

(۳) اس مرض کے ساتھ برانکائیٹس ہو، اتوانٹھ مارٹ۔ فاس۔

(۴) اس بیماری کے ساتھ دوسرے علامات میں اچیلی ڈونیم (جگر کی خرابی میں)
آرس یا نیٹرک ایسڈ۔ (لوہے یا کمزور جسم والوں کے لئے)

فیر فاس (ہلکا بخار۔ خاصہ بچوں کو) آیوڈ، (مریضان کنٹھ مالا کے لئے)

سلف دیہت ۶ جسہ تک مرض میں مبتلا رہتے ہیں، آرمس یا بیٹیا (سرسامی علامت میں) کارلوج، آرمس، یا لیکے؛ (دیوڈار سانس یا سڑنے کی علامت میں) کیلکٹس۔ (سینہ میں اجتماع خون) ڈرے ڈر۔ (محرکہ دماغی یا سراسامی بخار) آرنکا۔ چوٹ یا بہت محنت سے پیدا ہوئی بیماری میں، لایکو۔

(زور کا درد یا نمونیہ کے بعد تیرا نکائی ٹس) (التهاب شعبہ)

اکثر ادویات کی علامات

ایکونائٹ ۶۸۳۔ مرض کے شروع حالت میں بخار، سردی، بہت سستی۔ بے چینی، دھڑکنے والی دھڑکن، پیچ میں درد، تھوڑی کھانسی، سہ پہر کو بیماری کی ترقی۔

فاسفورس ۶۔ ۳۔ متواتر تکلیف دہ کھانسی، سینہ میں تیز درد۔ زرد یا سبز رنگ کا یا خون ملا اخراج۔ بلغم، بنف، سرلیج کے رگڑنے کی طرح آواز، پھیپھڑے کے آنا۔ بچوں کے براہ نکو نیو مویا میں۔

ہیرسلفر ۶۔ بلغم یا موائے دھونے میں (مرض نمونیہ میں)۔

برائی اونی ۶۔ ۳۔ بار بار خشک کھانسی، لیکن کف تھوڑا نکلتا۔ سینہ میں سوئی چیمونے یا دبا کر پکڑنے کی طرح درد۔ سانس لینے کے بعد درد کا بڑھنا۔ ہایوسیا مس ۳۔ کھانسی اور تکلیف دہ خواب۔

کیوپرم ۶۔ فالج ہونے کے خوف میں۔ کارلوج، سانس، مریض کا رنگ سبز اور ہاتھ پیر سرد رہنے میں آیوڈ ۳؛ ہر گھنٹہ پر استعمال کرنے سے پھیپھڑے میں بلغم سخت ہونے نہیں پاتا۔ ایون کارب ۳۔ اونگھائی زیادہ ہو۔ بے سہلی، نم۔ ۳۔ منتخب دوا کے ساتھ ہفتہ میں ایک بار استعمال کرنا چاہیے۔ مرض دق کی طرح پھیپھڑے کا ورم۔ خون آنا۔

ایکالیفا انڈیکا ۳۔ چکیلا سرخ خون کا نکلتا۔ تیز کھانسی؛ بے میلس ۱۱۔ سیاہ؛ گارٹھا خون نکلتا۔

چائنا یا ایڈ فاس ۳۔ خون کے نکل جانے یا دوسرے اخراج کی وجہ سے کمزوری ملی خویم ۱۱۔ سرخ پھینہ دار خون نکلتا۔

ورائٹم ورائٹڈ ۱۲۔ (پہلے درجہ میں جب پھیپھڑے میں خون جمع

ہوتا ہو۔ اسبندہ میں گرمی، درد اور بوجھ محسوس ہونا۔ جاڑا۔ بار بار تکلیف دہ
زور کی سانس؛ اور خشک کھانسی؛ بھض پر؛ صلب؛ اچھلتی ہوئی دیہاں
ملک کر انگلی سے دبا کر کھنے پر بھی بند نہ ہوتی ہو۔

انٹیم ٹارٹ ۱۲x سانس کی نلی میں درم۔ ٹکے میں سرسٹری کے ساتھ کھانسی؛
اور سائیں سائیں آواز۔ بغیر تکلیف کے بہت کف نکلتا بھض کی چال بڑھنا۔
لیکن جسم کی گرمی کم۔ زیادہ ٹھنڈا پسینہ نکلتا۔ بہت الجھن اور بے چینی
چہرہ زرد یا سیاہ۔ سر میں الجھا دھون؛

جلس ۱۲x ۶ دیش طرف کے پھیپھڑے میں ورم، اور ساتھ ہی جگر میں
درد؛ پستلا زرد رنگ کا گرہ دار پائخانہ اور سانس میں تکلیف۔

سلفر؛ ۳۰ پھیپھڑے کے درجہ اول کے ورم میں یا مواد پیدا ہونے سے پہلے؛
لائیکو پوڈیم ۲-۳۰ مرض کے تیسرے درجہ میں جب مواد پیدا ہو۔

ایوڈیم ۶-۱۰ کیلی میوڑ چیلی ڈونیم ۳-۱۲ سفوف۔ آر سنک ۳-
سینی گا ۱-۳۰ سینگو نیر یا ۱۰x ادویات کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔

ورم پھیپھڑے میں سمر سامی حالت

لائیکو پوڈیم ۱۲-۱۰ (ٹرکھانسی یا متواتر آبنوالی کھانسی) آر سنک ۳-۱۲

بخار؛ سستی؛ ہڈیاں؛ گہری نیند یا غشی؛ زبان خشک (رسٹاکس بہت بچینی؛
ایسا محسوس ہوتا کہ گویا کھانستے کھانستے مریض کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔

زبان کا اگلا حصہ نیلا۔ بہت اونگھائی آنا۔ وغیرہ۔

عام اصول: سینہ اور پیٹھ کو روئی سے ڈھکا رکھنا چاہیے۔

پولنس کی ضرورت نہیں۔ کھڑکی؛ دروازے بند کر کے یا کوٹھڑی میں آگ

ڈاکٹر جمیر صاحب کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی میں کپڑا بھگو کر اسکو بخور لینے کے بعد ماؤف
حصہ میں باندھنے اور ہر باجھ منٹ پر بدل دینے کے در سینہ؛ سانس کی تکلیف جسم کی
گرمی اور بھض کی تیزی کم ہو جاتی ہے۔ ایسی کی پٹس سینہ اور پیٹھ میں اچھی طرح لگانے اور
بار بار بدلنے پر کوئی کوئی بھومیو پیٹھک ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں۔

جلا کر کوٹھڑی کی گرمی، بیقاعدہ نہ رکھی جائے۔ اور نہ بڑھائی جائے۔ اس سے نقصان کا خوف رہتا ہے۔ گھر میں ہوا آتی رہے۔ لیکن مریض کے جسم میں ٹھنڈی ہوا نہ لگے۔ دیگر زیادہ کپڑے کا بوجھ بھی مریض پر نہ ڈال دیا جائے، مریض کو آرام سے رکھنا ضروری ہے۔ ساگو، باری، آرد وٹ دودھ، مونگ یا مسور کی دال کا سوربہ وغیرہ غذا حالت کے مطابق۔

کھانسی (COUGH)

کھانسی دوسری بیماری کی علامت ہے۔ گلے کی نالی کی خرابی، معدہ کے فعل میں نقص، ورم پھیپھڑہ، جگر کی خرابی، نزلہ وغیرہ امراض کے ساتھ کھانسی اکثر موجود رہتی ہے۔ کھانسی خاص کر دو قسم کی ہوتی ہے۔ تیز (ٹھیلی) اور خشک (سخت یا سوکھی) مرض تپ دق، بخار اور سینہ میں درد کے ساتھ جسم کو زائل کر دینا کھانسی موجود رہتی ہے۔ وہ رات میں بڑھتی ہے۔ اور ساتھ ہی سانس کی تکلیف موجود رہتی ہے۔

مرض نمونیہ میں اینٹ کے سفوف کے رنگ کی تھوڑی رو بہت کے ساتھ کھانسی رہتی ہے۔ اخراج خون میں چمکیلے خون کے ساتھ کھانسی اور تھوڑی کھانسی میں، گھول، گھول آواز کرنے سے کھانسی سانی دیتی ہے۔ اگرچہ کھانسی دوسرے مرض کی علامت ہے تو بھی عرصہ تک کھانسی رہنے پر مزید رجہ ذیل دوائیں کھانے پر بھی بالکل اچھی نہ ہونے پر سمجھنا چاہیے کہ مریض کی قوت حیات میں کوئی نقص ہے۔ اس کے دور کرنے کیلئے کسی قابل ہو میو پیٹھک کی مدد لینا چاہیے۔

علاج

ایکونائٹ ۳x۴۔ خشک سخت اور شدید کھانسی۔ اس کے ساتھ ہی بے چینی، درد سر، چہرہ سرخ، پیاسا، گلا خشک، اور جلن کے ساتھ تھوڑا پیشاب، قبض، وغیرہ علامات میں چیت سونے سے کھانسی کا دبا کر وٹ سونے سے بڑھنا۔ کھانستے وقت سینے میں بھونکنے کا سادرد۔ خشک، ٹھنڈی ہوا گھٹنے سے کھانسی کا بڑھنا۔

ایپیکاک ۳۳۔ تشنجی یا سانس رکتنے والی کھانسی، ہوا کی نالی میں سرسراہٹ، یا زخم کے ساتھ سائیں سائیں کی آواز یا بہت زیادہ کف، جمع ہو کر کھڑکھڑاہٹ کھانسنے کے وقت ناف میں درد، متلی یا تے، ہو پ، کھانسی کے پہلے درجہ میں سنا ۳۳۔ خشک کھانسی، کبھی کبھی بلغم نکلتا، ناک میں جلن، گرمی وجہ سے چونک پڑنا سی پیام ۲۔ دن رات لگا ہوا پسینہ نکلتا۔ کف نہ نکال سکنے کی وجہ سے نگی جانا سینہ میں کف جمع ہو نگی وجہ سے کھانسی، کلکیر یا کارب ۶۔ رات میں سونے کے وقت خشک کھانسی، لیکسس ۶۔ نیند کھانسنے پر کھانسی کی زیادتی۔

سینکو نپریا۔ نائٹریکیم ۶۔ ناک سے بلغم نکلتا۔ (سر سرائنا)۔ لگاتار۔ کھانسی، جلیسم ۳۔ آواز بیٹھی اور اس کے ساتھ تیز کھانسی اور اس کے ساتھ ہی تکلیف، اور درد سینہ۔ (ورم کی پہلی حالت میں)۔

بیلڈونا ۶۴۔ خشک کھانسی، کھانسی کھانسنے کے وقت تشنج، کھانسنے کھانسنے دم رک جانا سردی لگنے پر پیچھے پڑنے کی پرانی کھانسی کچھ تر ہو جاتی ہے اور کف کے عکڑے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ گلے میں سرسراہٹ، آواز کی نالی میں ورم، نبض تیز، اور صلب، آنکھیں جبکلی، چہرہ سرخ، درد سر، دماغ میں جھنجھکی زیادتی، کبھی کبھی اچھی کبھی کھسی کھانسی، رات میں کھانسی کی زیادتی، ٹھنڈی ہوا میں آرام محسوس ہونا۔ درد سینہ، سانس کی آمد و رفت ملکی۔

الینڈر نائٹریکیم ۳۰۔ ۳۰۔ مقوی دیر پھرنے والی خشک تکلیف دہ بہت عرصہ کی پرانی کھانسی، کف نہ نکلتا۔ سینہ کی بڑھی کے نیچے درد۔ قیض۔ (دمن کھانسی) انٹیم ٹارٹ ۳۰۔ ۳۰۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ خشک کھانسی، گلا گھر گھر اگر بدقت استلا کف نکلتا۔ کھانے کے وقت کھانسنے کھانسنے، غذا تے ہو جانا۔ کھانسنے کے وقت حوائی آنا۔

برائی او نیا ۳۳۔ ۳۰۔ خشک سخت کھانسی (دن میں بڑھنا) ہلکی کھانسی، زکامی رطوبت یا زرد کف نکلتا۔ تے، یا متلی کھانسنے کے وقت سر میں درد۔ سینہ اور نعل میں نوچنے یا سوتی پچھونے کی

طرح در دکھانستے وقت تمام جسم کا بیتا۔ صبح و شام اور ٹھنڈی ہوا میں کھانسی بڑھنا خشک کھانسی اکھانستے کھانستے کبھی بلغم پتلا ہو جاتا ہے اور خون کے چھینٹوں کے ساتھ کچھ کف بھی نکلتا ہے یا کھانے پینے سے کھانسی کا بڑھنا گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ پر جانے سے کھانسی کا بڑھنا۔ اس مرض کی خاص علامت ہے۔ سفر ۳۰۔ ۳۱۔ مزمن کھانسی آرام نہ ہونے والی خشک کھانسی کے ساتھ سینہ کا حکڑ جانا، متلی تر کھانسی کے ساتھ دن میں سفید یا مائل کف نکلنا۔ اور رات میں خشک کھانسی اور اسکے ساتھ درد سر یا خون کی قے ہونا۔

ریوٹکس ۶۔ لگاتار خشک کھانسی، اکھانسنے کے وقت تشنج ہونے پر ٹھنڈی ہوا میں یا رات میں مرض کی ترقی۔ دن میں دس بارہ بجے مرض کا بڑھنا۔ سر سے پیر تک ڈھک لینے سے آرام محسوس ہونا۔

ٹکٹا ۶۔ ۱۲۔ برابر خشک کھانسی، عموماً کھانستے وقت کسی طرح کی تکلیف نہ رہنا۔ ہونیکا (کمر کھانسی کی طرح تشنج،) ہونیکا کھانسی کی بھی ایک اچھی دوا ہے۔ رات میں مریض کے تھکے ہوئے پر مرض کا بڑھنا۔

مینٹلیم اسٹیکم ۳۰۔ ہونے سے ہی کھانسی کم ہو جانا۔ اواز بیٹھی (مزمن مرض میں) ڈراسیراس ۳۰۔ اعصابی یا تشنجی کھانسی، رات میں یا سونے پر بڑھنا۔ قے یا متلی کف میں خون کا داغ معلوم ہونا۔

ٹینڈ کھلنے پر پسینہ نکلنا۔ (امراض ہو پ کھانسی میں ایکونائٹ کے بعد اس کو استعمال کرنا چاہیے) ایلیم سٹیوا ۳۰۔ مزمن کھانسی، بلغم نکلنا۔

ککس کیٹائی ۶۔ صاف موت کی طرح بلغم تیز کھانسی مرک وائی دس ۳۰۔ سفوف، تنگ کرنے والی تیز کھانسی، اکھانستے کھانستے ایسا محسوس ہو کہ گویا گلا دبا رہا ہے۔ یا زخم ہو گیا ہے۔ ناک

میں زخم، پسینہ، مرک سول، (پرائی تر کھانسی) رات میں بڑھنا، چکنا اور تریا ڈھک، لکھنا، مینتھا پر مٹا ۳۰، خشک کھانسی، ڈھوپ یا ٹھنڈی ہوا لگنے، یا بات کرتے یا گرنے پر کھانسی کی زیادتی،

۳۔ نائٹریک ایسڈ ۳۔ قبض کے ساتھ تیز بخار
 کوریلیم ۳۰۔ ۳۰۔ اعصابی یا سیسٹریا دوائے مریضوں کی کھانسی؛
 مگنیسیا آکسائیڈ ۴x۴۔ سفوف؛ اگر گرم پانی کے ساتھ تشنجی کھانسی کیساتھ تیز درد۔
 کیلی سلف ۶۔ زرد رنگ، بلیغم نکلتا۔
 نیٹریم میور ۳۰۔ صاف پانی کی طرح یا ایسا در کف نکلتا۔
 نیٹریم فاس ۶۔ مرض تیزا بیت کے علامت کے ساتھ کھانسی؛
 نیٹریم سلف ۶۔ صفراوی مرض کی علامت کے ساتھ کھانسی؛
 کازل ووج ۶۰۔ ۶۰۔ چھوٹی سردی لگنے پر کھانسی؛ آواز بیٹھی، یا بند۔
 آرنگام ۳۰۔ تھوڑی دیر بیٹھنے والی کھانسی کھانسی۔ کھانستے کھانستے کل
 جسم کا کانپنا۔ کھانستے کے ساتھ منجمد خون نکلتا۔ سینہ کے اطراف میں سوئی جھپٹے
 کی طرح درد۔ آرستیکٹ ۳x۳۰۔ سانس روکنے والی کھانسی چھانی کا
 سکڑنا بے چینی؛ پیاس؛ تشنجی کھانسی رات میں شروع ہو کر نیند نہیں
 آنے دیتی۔ اور آخر میں بہت ہی تھوڑا کف نکلتا ہے۔
 کاسٹیکم ۳۰۔ ۳۰۔ خشک؛ گھر گھر اسٹ کی کھانسی۔ کھانستے کھانستے
 پیشاب کا نکل آنا۔ آواز بیٹھی۔ رات میں بستر کی گرمی سے کھانسی بڑھنا۔
 ٹھنڈے پانی سے کھانسی بند نہ ہونا؛ کھانستے کھانستے گلے تک کف آنا
 لیکن مریض کو کف نکلنے کی طاقت نہ رہنا۔
 کو نیم ۶۔ ۳۰۔ گلے میں سرسراہٹ ہو کر خشک کھانسی؛ سونے بیٹھنے یا
 ہنسنے یا رات کیوقت کھانسی کی زیادتی۔ دن میں کھانسی کی کمی؛
 سینجیا ۲x۶۔ خشک کتے کی آواز کی طرح یا سیسٹری کی طرح کھانسی؛
 سونے بیٹھنے یا ہنسنے یا رات کیوقت دم بند ہو جانا گلے میں سرسراہٹ آواز بیٹھی
 ہیرسلف ۶۔ ۳۰۔ بدھضمی کے ساتھ عرصہ کی کھانسی بیٹھی پر آواز کیساتھ
 تکلیف دہ کھانسی؛ سردی لگنے سے کھانسی کی زیادتی؛ گلے میں کچھ اٹکا سا محسوس
 ہونا۔ اور اسی وجہ سے پانی نکلنے میں تکلیف۔
 ہایوسیا ۶۔ بعض تشنجی؛ خشک کھانسی؛ رات میں یا سونے پر

کھانسی کی زیادتی اور اٹھنے پر کئی بجے بوڑھے یا ریٹیریا کے مریضوں کے لئے مفید ہے) اگیشیا ۶۔ ہسٹریا یا اختناق الرحم والی عورتوں کی کھانسی، کھانسی کی وجہ سے نیند نہ آنا۔ گلے کی نلی کی حرکت، کھانسنے پر گلے کی ستر ستر اسٹ بڑھ جانا کیمو خلا ۶۔ بچوں کے دانت نکلنے وقت کھانسی، گلاسائیں سائیں کرنا بچہ کا چڑا چڑا مزاج کیسلی بالی کروم ۶۔ کھانسی سخت یا دورانی کی طرح (کبھی کبھی خون آلودہ) کف نکلنا۔ سینہ میں سائیں سائیں کرنا۔ یا ہسٹرس کی آواز۔ سانس میں تکلیف۔ کھانسی کے بعد دوران سر، نیند کھلنے پر یا غذا کے بعد کھانسی کی زیادتی۔

نکس و امیکا ۶۔ ۳۰۔ کھانستے وقت معدہ میں درد اور دوسرے گلے کی نالی میں جلن۔ انتھی دار کف نکلنا بہت صبح بعد غذا حرکت کرنے یا زور سے سانس لینے پر، کھانسی کا بڑھنا۔ کھانسی کی وجہ سے نیند میں خلل، رخصت آدھی رات میں کھانسی شروع ہونا۔

فاسفورس ۶۔ گلے کا کھس کھس کرنا خشک پھیسٹہ کادق والی خشک کھانسی، آواز بیٹھی ہوئی۔ سینہ میں درد۔ لیٹا اور انتھی دار مواد آلودہ، کف نکلنا۔ بوسے کے چور یا سرخ رنگ کا بلغم نکلنا، لیٹنے، بولنے، ہنسنے، یا حرکت کرنے یا گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ میں جانے پر کھانسی کی زیادتی۔

پلساٹیل ۶۔ ۳۰۔ بلغم جمع ہونے کی وجہ سے سانس میں تکلیف، گلا گھر گھرانا۔ دن میں زرد رنگ کا کھڑا بلغم نکلنا۔ رات میں اور سوتے وقت خشک کھانسی، یا ہری کھلی ہوا میں کھانسی کی زیادتی۔

نزہ، برانکاٹس، دمہ، نمونیا وغیرہ امراض کا بیان دیکھنا چاہیے۔
کوریلینیم و برم ۶۔ بروم ۶۔ ایوں کارب ۳۰۔ ایلیم سیپا ۶۔ ایوڈیم ۳۰۔
لوبیلیا مدرٹیک، سینگا ۱۰۔ دنی خوراک ۵ قطرے، اسٹیم ۶۔ وغیرہ
وغیرہ دوائیں بیچ بیچ میں ضروری ہو سکتی ہیں۔

علاج معاون :- باری یا گوند کا پانی یا کبھی کبھی تھوڑا ٹھنڈا پانی پینا چاہیے موسم کے موافق کپڑا پہنا چاہیے۔ ٹھنڈا تر اور ایسی

جگہ جہاں ہجوم ہو؛ ترک کر دینا چاہیے۔
 حفظ ماقدم :- کھلی ہوا میں گھومنا اور کثرت کرنا صبح ہوا خوری اور
 ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا۔ یہ پُرانی کھانسی روکنے کے اچھے طریقے ہیں۔
 گلا بیٹھ جانا۔ آواز بیٹھ جانا

(HOARSENESS & APHONIA)

دتران الصوتیان (VOCAL CHORDS) کے پاس کے عضلات کی مدد
 سے ہم لوگ آواز نکال سکتے ہیں۔ معمولاً ان کا تھوڑی دیر کے لئے یا مستقل
 مفلوج ہونے کا نام آواز بیٹھ جانا ہے۔ "ورم نرخرہ" و "دق سرطان" آتشک
 وغیرہ کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے۔

ٹھنڈک لگنا۔ نزلہ، وغیرہ اسباب سے نرخرہ میں جو کمزوری پیدا
 ہوتی ہے اس کا نام گلا رکنا یا بیٹھ جانا ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹیریا، پیچ
 کر بولنا، گانا، تقریر وغیرہ کرنا اسباب سے گلا بیٹھ جانا یا آواز بیٹھ جانا مرض
 ہوتا ہے؛ روکھی یا کڑی، آواز، گلے میں سرسراہٹ، اور خستگی۔
 کبھی کبھی گلے میں زخم، خشک، کھس کھس، کھانسی، سانس میں تکلیف
 وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

(۱) صرف آواز بیٹھ جانے میں فاسٹولکا۔ (یکبارگی گلا بیٹھ جانے میں مزمن
 مرض میں) ہیسپرلسفر، گلا سائیں سائیں یا گھر گھرانا۔ فاسفورس (ان دتران
 الصوتیان کے فاج میں؛ کاربوونج۔ (مرض مزمن میں)
 (۲) گلا بیٹھ جانے کے ساتھ سینہ یا سر میں نزلہ؛ ایکون۔ برائیونیا۔ مرک کار۔
 کاسٹیکم؛ ڈلکامارا؛ فاسفورس۔ پیونجیا؛

(۳) اگوئیوں، یا مقروں کے بہت زیادہ نرخرہ سے کام لینے کی وجہ سے آواز
 بیٹھ جانے پر آرنیکا۔ کاسٹیکم؛ فانی ٹورکا۔ بیلڈونا۔ کیلی بانی۔ برائٹا کارب۔
 نزلہ کی وجہ سے گلا بیٹھ جانے پر کاسٹیکم؛ اچھی دوا ہے۔ نرخرہ کے
 عضلات کے مفلوج ہونے سے گلا بیٹھ جانا۔ اکزٹک الیڈس۔ فاسفورس۔ یا سلکا۔

گلا بیٹھ جانے اور معمولی آواز بیٹھ جانے میں کاسٹیکم ۶۔ (گلا خشک)
 اگلے حصہ میں درد تکلیف سے بلغم نکلنا۔ (گویتوں اور مقررہوں کے گلا بیٹھ
 جانے میں) ۱۰۔ مینگنم ۶۔ (دماغ گلا بیٹھا؛ بلغم پتلانہ ہو) کاربووج ۶۔ کھانسی
 سینہ میں جلن، بدبو دار بلغم نکلنا۔ پھیپھڑے سے خون نکلنا بونے میں یا شام
 کے وقت یا غذا کے بعد مرض کی زیادتی۔ کیلی بائی ۶۔ سفوف ۳۰۔ (جلد جلد
 کھانسی، بہت درد؛ لیسدار؛ سخت یا ڈوری کی طرح بلغم نکلنا۔

شام کے وقت یا جسم سے کپڑا اتارنے پر آواز کے بیٹھ جانے میں زیادتی)
 ہیرسلفر ۶۔ (زخروہ سے بہت بلغم نکلنے کے ساتھ آواز بیٹھنا۔ کبھی ہلکی اور
 کبھی سخت کھانسی؛ سانس کی تکلیف صبح یا ٹھنڈی ہوا لگنے پر؛ کھانسی
 کی زیادتی) زکام کے ساتھ آواز بیٹھی ہو۔ یا بچہ کف نہ نکال سکتا ہو؛
 اور اس وجہ سے مردے کی طرح پڑا ہو، تو بوند بوند ٹھنڈا پانی پلانے سے اسکی
 بدحواسی دور ہو جاتی ہے۔ انٹم کروڈ؛ ڈھوپ یا گرمی لگنے کے بعد گلا بیٹھ جانے
 میں آرنگا ۶۔ زخروہ سے بہت کام لینا۔ جیسے زور سے گانا۔ تقریر کرنا۔ یا باتیں
 کرنے کی وجہ سے گلا بچھ جانے پر) آیوڈیم ۶۔ یا سفورس ۶۔ (کمزوری کی وجہ سے
 گلا رکنے پر) جلس ۳۳۔ عورتوں کے حیض ہونے کے وقت آواز بیٹھ جانے میں)۔
 انٹیشیا فاس ۳۳۔ نکس ماسکیٹا ۲۲۔ یا پلسا ٹیلا ۶۔ (گلا بچھنا۔ مرض
 ہسٹیریا سے ہوا ہو)۔ بیلادونا ۳۰۔ (سر میں سردی لگنا۔ یا گلے کے ورم
 میں آواز بیٹھی ہو) آرام ٹرانفالکم ۳۰۔ زخروہ کا درد؛ گلے میں زخم کے
 ساتھ آواز بیٹھی ہو)۔

علاج معاون

کھلی ہوا میں روز ٹہلنا یا کثرت کرنا۔ ٹھنڈے پانی میں صبح نہانا۔ یا ٹھنڈے
 پانی سے جسم پوچھنا۔ ہلکی غذا؛ گوشت نہ کھانا زیادہ مفید ہے۔ برطر کے برابر مہالہ
 منہ میں رکھنا چاہیے۔ گل جانے پر بھی ایک ٹکڑا رکھنا چاہیے۔ ایک کھٹوہل کرنے
 سے شدید آواز بیٹھی۔ اکثر آرام ہو جاتی ہے۔

زوال قوت گویائی

(APHASIA)

دل کی بات نہ کہہ سکتا۔ اسکو زوال قوت گویائی کہتے ہیں۔ دماغ کے بیرونی حصہ کے مرض یا چوٹ سے (CORTICAL LESION) یہ حالت ہوتی ہے۔
 جنو لوڈ کم ۶x۳۔ آواز بند ہونے کی اچھی دوا ہے۔ بہرا پن کی وجہ سے آواز بند ہو تو نائیکو لوڈیم ۳۰۔ بہت کوشش کرنے پر ایک ادویات نکل سکے۔
 سٹرامونیم ۳۔ جلیس ۳۔ کیلی بروم ۳۰۔ ۱ اور انا کارڈیم ۳۰۔ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ پارہ کے غلط استعمال سے قوت گویائی کے زوال میں آرم ۶۔ بیانا میٹرک ایڈ ۶۔

(STOMATITIS)

II۔ امراض آلہ بھضمی

اس مرض میں منہ کے ڈھکنے والی سرخ، سوچی اور آماس میں درد۔ یا خرم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس سے مواد نکلنے لگتا ہے۔ سانس میں بدبو۔ زبان سُرخ اور سوچی ہوئی۔ دانت کے مسوڑھے اور تالو کی سوچن، اس مرض کی مخصوص علامات ہیں۔

معدے کے فعل کی خرابی، خسرہ، پھوڑے کے بخار کے بعد منہ میں خوب جلتی ہوئی چیز کے جانے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
 دانت صاف نہ رکھنا پارہ کا غلط استعمال، زیادہ مقدار میں چونا یا شکر کھانا۔ متومی غذا کی کمی۔ صحت قائم نہ رکھنے والی جگہ میں نہ رہنا۔ خون کی خرابی وغیرہ اسباب سے یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید اور کارآمد ہیں۔

مرکوریس ۶۔ مسوڑھوں سے خون گرنا۔ منہ میں زخم۔ کیلی کلورال ۱۰۔ سفوف۔ بدبو دار سانس کی آمد و رفت۔ منہ، گلا، زبان میں زخم۔

کاربوونج ۶۔ تک یا پارہ کا غلط استعمال۔ مسوڑھے میں بدبو ہونا۔ یا خون گرنا۔ آرسنک ۳۰۔ زخم میں جلن ہونا۔ بہت کمزوری محسوس ہونا۔ بخار۔
 نائیکو لوڈیم ۶۔ یا ہیمپرسلفر ۶۔ پارہ کی وجہ سے منہ میں زخم۔
 پوڈیس ۶x۶۔ سلفر ۳۰۔ سورنیم ۲۰۰۔ ہلی پورس ۶۔ کریا زوٹ ۶۔

نیز گرم میوہ، مرکوریس کاربہ، وغیرہ ادویات علامت کے مطابق دینی پڑتی ہیں۔
علاج معاون: نمک، مرچ، کھٹی، گھی سے بچی ہوئی تیسل کی چیریں
 زیادہ مٹھائی کھانا ممنوع ہے۔ لیون اس مرض میں بہت مفید ہے۔

کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح منہ دھو ڈالنا چاہیے۔ کیلی کارب X۱ سفوف۔
 یا شہاگ گرم پانی میں گھول کر غرارہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

سائس میں بدبو (FETID BREATH)

معدہ کی خرابی، اچھی طرح پرویش نہ ہونے کی وجہ سے، فر فوزا، پلینگ،
 حرقت ابطی، خسر، چیچک، پھیپھڑے، سڑنا، مسوڑھوں کا زخم، دانت کے
 سوراخ میں یا اس کے پاس میں مواد ہونا، جوڑوں کی کہنہ بیماری، کھانے
 کے بعد اچھی طرح منہ نہ دھو ڈالنا وغیرہ اسباب سے سائس آنے جانے میں
 بدبو ہو جاتی ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

آرنیکا ۳۔ اسکی اچھی دوا ہے۔ (خاص کر جب یہ معلوم ہو کہ کس وجہ سے
 بدبو ہوتی ہے)۔ کاربوج X۶ سفوف۔ سڑے دانت، مسوڑھے کی بیماری
 یا زیادہ مقدار میں پارہ استعمال کرنے کی وجہ سے بدبو۔ ہر روز تین بار
 دو ہفتہ تک استعمال کرنا چاہیے۔ اسکے بعد ہیرکلفز یا نائیکٹرک ایسڈ ۳۔
 کے استعمال سے مرض جڑ سے آرام ہو جاتا ہے۔

نکس دامیکا۔ پلاٹیلہ۔ بدبھمی سے پیدا ہوئی بدبو

پٹرولیم ۶۔ سائس میں پیاز کی طرح بدبو

مرک والی ۵ X۶ سفوف، آرام ۶۔ پانی جلیا ۳۔ سلفر ۳۔ وغیرہ
 دوائیں بھی گاہے گاہے ضروری ہو سکتی ہیں۔ مسوڑھوں میں مواد پیدا
 ہونے کی وجہ سے بدبو ہو تو سلکا ۶۔ یا فاسفورس ۳۔ استعمال کرنا
 چاہیے۔ فائیٹس ۵۔ ایک ڈرام۔ (چار آؤنس پانی) پوش دانت کے
 مسوڑھوں میں لگانا مفید و کارآمد ہے۔

علاج معاون: کھوڑا کھانے کے بعد منہ دھو ڈالنا صاف پانی
 پینا۔ کھلی ہوا کا استعمال۔ باقاعدہ نہانا (PERFUMED)

معطر کار بولک ایسڈ پانی کے ساتھ ملا کر اس سے منہ دھو ڈالنا چاہیے تاکہ بدبو آنا بند ہو جائے۔

(GUMBOIL)

منہ کا زخم

یہ چھوٹا پھوڑا دانت کے سوراخ (SOCKET) میں شروع ہو کر مسوڑھے یا ننگے کے اندر سے پھٹ جاتا کرتا ہے۔ بوسیدہ دانت کی تکلیف (IRRITATION) یا ٹھنڈک لگنے کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دانت میں درد، گرمی کی تیکن، سوجن، اور مواد پڑنا پھوڑے کا پھٹ جانا۔ تب سادہ وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

مسوڑھا پھٹ جانے سے یہ تکلیف کم ہوتی ہے۔

اس میں مسدود جاذب ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

مرکب والی دس ۳x۴x۴ سیفوف کم از کم دو ہفتہ استعمال کرنا چاہیے۔

یہ اس مرض کی بہت اچھی دوا ہے۔ برابر دردن زیادہ تھوک نکلنا مسوڑھا سوجنا۔ اور اس میں ٹنگ۔ بیلڈوٹا ۳x۳۔ (دو تین خوراکی) سر میں تیکن درد، منہ متایا۔ آواز درد، روشنی برداشت نہ ہونا۔

فاسفورس ۳۔ نیچے کے جیڑے کے دانتوں کا زوال، اسی وجہ سے مسوڑھوں کا زخم سیلفر ۳۔ مسوڑھوں کا کھنہ زخم۔

ہیپ سیلفر ۴۔ مواد پیدا ہونے کے وقت (یعنی جب سوجن، ملائم رہتی ہے۔ اور تیکن ہوتی ہے۔ پیٹ کو خشک کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سلاک ۴۔ پھوڑا پھٹ جانے کے بعد۔

گوہر خوب گرم کرنا گرم حالت میں بھی (یعنی جس قدر مریض برداشت کر سکے) تکلیف دہ مسوڑھوں میں لگا رکھنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ ضرورت محسوس کرنے پر پلٹس لگانا۔ یا مسوڑھے میں نشتر لگانا۔ اور انت نکلو ڈالنا بھی مناسب ہے۔

(APHTHAE OR THRUSH)

منہ کا زخم

منہ صاف نہ رکھنا۔ سور، مضمی، قبض، یارے کا استعمال،

بہشتی آتشک وغیرہ اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔

بوریکس ۶۔ اور مرکوریس۔ اس مرض کی خاصی دوا میں ہیں۔

کاربودج ۶۔ بارہ وغیرہ کے اسباب استعمال سے منہ کا زخم۔

نایٹرک ایسڈ ۶۔ آتشک سے پیدا ہونے پر نیٹرم نیور ۶۔ آرسنک ۶۔

ایٹم ٹارٹ ۶۔ سلفر ۳ وغیرہ ادویات بھی گاہے گاہے ضروری ہوتی ہیں۔

”منہ کی سوجن اور مرض زبان کا بیان ملاحظہ ہو، خاص شہدا اور پتلی ایکھ کا گڑھ انگلی میں لگا کر بچوں کے منہ کے زخم میں لگا دینا چاہیے۔

(SPRUE)

پیرا لے دست

یہ ایک کہنہ بیماری ہے۔ مالک ہندوستان! سنگھ دیپ! چین!

جاپان وغیرہ میں یہ مرض پھیلتا ہے۔ منہ سے معقد تک تمام جگہ غذا کی نالی کا ورم، زبان یا گھٹے میں درد، زبان اور مسوڑھے میں زخم، اسہال، اور جگر کا کمزور ہونا۔ ان علامات کے رہنے پر دور البطن، کہلاتا ہے مردوں کی بہ نسبت عورتوں کو۔ اور ہندوستانیوں کی بہ نسبت یورڈینیوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔

زبان اور مسوڑھے میں زخم۔ بدھنی، پیتلے دست۔ (دن کے اول حصہ میں بار بار پانی کی طرح زردی مائل، یا کینچڑ کی طرح۔ یا لیسدار دست، دست اکثر تیرش بودار ہوتے ہیں۔ جبکہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زبان سرخ ہوتی ہے۔ اور درد ہوتا ہے۔

قوت ذائقہ شامہ کا زوال ہوتا ہے۔ کبھی گرمی بڑھ جاتا۔ وغیرہ اس مرض کے علامات سابقہ ہیں۔ اسکے بعد کمی خون، بہت پسینہ نکلنا۔ اور سستی وغیرہ علامات پیدا ہو کر مریض مر جاتا ہے۔

کبھی کبھی کئی برس تک یہ بیماری چلا کرتی ہے۔

علاج:۔ سلفر، آرس، بوریکس، اور فاسفورس عمدہ دوا میں

علامات کے مطابق دینا چاہیے۔ مریض کے شروع حالت میں مریض کو بستر سے نہ اٹھانا چاہیے۔ پیٹ ڈھکا رکھنا ضروری ہے۔ منہ کے

زخم کے لئے پھٹکری کا سفوف یا بورک ایسڈ کا لوشن خارج استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مرض کے شروع میں مریض کو صرف دودھ دینا چاہیئے اگر دودھ برداشت نہ ہو تو کچے گوشت کا عرق (RAW MEAT JUICE) دینے کی چند لوگ رائے دیتے ہیں۔ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔

گوشت خورہ

(CANKER OF THE MOUTH)

کم سن بچوں کے جی میں سل کا مادہ موجود رہتا ہے۔ یا ان مریضوں کے جو مناسب غذا نہیں پاتے۔ منہ میں سٹریا یا گلاز خم ہوتا ہے۔ مسوڑھے میں سفید سوراخ ہوتے ہیں؛ یا مسوڑھے دانتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دانت گر جانا چاہتے ہیں؛ سانس میں بدبو۔ ہونٹھ سٹرخ؛ زبان یہاں تک کہ چہرہ کا گلنے لگتا۔ حقوک میں بدبو۔ ماؤف جبکہ سے پانی نکلنا۔ اس مرض کی خاص علامات ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

مرک کار ۶-۱۳-۶۶۔ سفوف ہر گھنٹہ پر استعمال کرنا چاہیئے۔ اور ایسڈ میو۔ (۱۲-۶۶-۱۲) چار ڈرام گلیسرین میں ملا کر (کے ذریعہ سے دو گھنٹہ کا وقفہ دیکر منہ دھو ڈالنا چاہیئے۔ اس مرض کی بہت اچھی دوا ہے۔ اگر مرک کار سے فائدہ نہ ہو تو آرسنک ۱۳-۶۶ استعمال کرنا چاہیئے۔ پارہ کے نامناسب استعمال سے پیدا ہوا سٹریا زخم ہونے پر کار لو ووج ۶-۱۲ یا ایسڈ ٹائیٹرک ایسڈ ۱۳-۶۶ دینا پڑتا ہے۔ کیلی کلور کا لوشن بھی فائدہ کرتا ہے۔ کاڈیو رائسٹل بھی کبھی کبھی دیا جاسکتا ہے۔ (منہ کا زخم کا بیان ملاحظہ ہو۔)

دانت کا درد (TOOTHACHE)

تبدیلی موسم، بد ہضمی، حمل کی حالت میں سردی لگنا۔ وجع مفصل صحت خراب ہونا۔ ان سب اسباب سے دانت میں درد ہوتا ہے۔ علاج:- اکثر ہر قسم درد دندان میں شروع میں پلانیٹ کو ① مسوڑھے میں لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈی میں دانت کا درد ٹھنڈے پانی سے درد کم ہوتا۔ ایک طرف کے درد میں ایکو نائٹ مسوڑھے۔

سانس میں بدبو قبض اور بوسیدہ دانتوں میں درد کربازوٹ۔ (حاملہ کے دانتوں میں درد۔ کربازوٹ x۶۔ قائدہ کرتا ہے) دانت کے مسوڑھوں میں جبھونے کی طرح درد۔ یا تپکن کے ساتھ کچھ دانتوں کے ماؤف ہونے میں اور اس کے ادھر ادھر ہونے پر بیلڈونا سردی سے پیدا ہونے درد دندان میں دانت کی جڑ نہیں سڑتی، مُتھ میں کوئی چیز داخل ہونے پر دبا رکھنے کی طرح درد۔ اور بہت جلد یہ درد کم ہو جاتا ہے۔

بستر کی گرمی یا کوئی گرم چیز کھانے سے بھی تیسرے پہر یہ مرض بڑھ جاتیگی وجہ سے اس علامت میں پلساٹیلہ ۳۔ ٹھیک شام کے وقت دانتوں میں درد اور زبان پر گاڑھا سادہ میل جتنا انٹم ۶۔ دانت لمبا معلوم ہو؛ دانت پر دانت رکھنے، یا ٹھنڈا پانی لگنے سے کن کنانا؛ رات میں سر کے کنارے تک درد کا بڑھنا۔ سینکے سے دبنے کی علامت میں آرسنک ۶۔ عصبی درد۔ دندان میں دانت اٹھا ہوا معلوم ہونا۔ دانت کی جڑ اور گال سوجنا۔ گرم چیز کھانے پینے یا بستر کی گرمی سے درد بڑھنا کیوٹا ۶۔ قائدہ کرتا ہے۔ دانت کی جڑ میں درد۔ اور اخراج خون؛ مُتھ خشک؛ لیکن پیاس نثار۔ چبانے کے وقت درد معلوم ہونے کی علامت میں کاربووج ۶۔ کیڑے سے پیدا ہوا دانت کا درد اور حاملہ کے دانت کے درد میں اور دوسرے دوسرے دانت کے درد میں مرکوریس ۶۔ چہرہ کے چاروں طرف لوچنے یا بھونکنے کی طرح کے درد۔ کان تک پھیلے بہت لارینا۔ رات میں درد بڑھنے کے علامات میں؛ مرکوریس ۳۔ سفوف استعمال کرنا چاہیے۔

دانت میں ہوا لگنے ہی سے درد کا بڑھنا۔ دانت بڑا معلوم ہونا۔ بائیں جانب درد زیادہ کھانے کے وقت دانت ٹھنڈے معلوم ہونے کی علامت میں سلفر ۶۔ پارہ کے استعمال سے پیدا ہونے درد میں بہت لار بہنے کے ساتھ مسوڑھے سے خون نکلنے پر نائٹریک ایسڈ ۶۔ بوسیدہ دانت میں بہت درد اور اس کے ساتھ ہی دوسرے

دوسرے دانتوں میں درد ہونا۔ ٹھنڈا پانی چھونے سے درد کا بڑھنا۔
وغیرہ علامتوں میں سیاتی جلیا ۳۔

ٹھنڈے پانی سے درد کم ہونے پر، کانیا ۳ x۔ دانت سیاہ یا سیاہ
لکیریں پڑیں۔ اور ٹیڑھے دانت کی جڑ میں ناسور یا سوجن جیٹھ میں درد
دندان: نوچنے یا چبانے کی طرح دانت میں درد ہونے پر، کوئی چیز چھیننے کی
طرح درد۔ (درد کان تک محسوس ہوتا ہو) گالوں میں بھی تپکن کی طرح
درد۔ دانت کی جڑ سوجی، اور سفید۔ ٹھنڈی چیز کھانے، پینے سے درد
بڑھنا۔ اسٹے فی سیگر یا ۳۔ دانت کا طبقہ (پرٹ (ENAMEL) میل سے
بھرا ہونے پر: انکلیئر یا فلوریکا ۱۲ x۔ سفوف۔

دانت اکھاڑنے کے بعد نقلی دانت لگانے کی وجہ سے دانت میں درد
ہونے پر آرٹیکا ۳ یا سمفاٹم یا کیلینڈولا ۱۰۔ ٹھنڈا پانی یا ہوا لگنے کی وجہ
سے درد میں کلکیر یا کارب ۶۔ دانت میں زخم اور دانت بڑھے ہوئے
معلوم ہونے پر رسٹاکس ۳: کافی یا شراب پینے کی وجہ سے دانت میں
درد ہونے میں: نکس و امیکا ۱۰۔ بہت زور سے درد ہو۔ ریا خراب
صحت کی وجہ سے دانتوں میں درد۔ چائنا ۳۔

دانت لائبے اور اوپر اٹھے معلوم ہونے پر: اور حقہ پینے کے بعد
درد بڑھنے پر: برا یونیا ۳۔ خاموش بیٹھے رہنے پر درد بڑھنا۔ گنیشیا کارب
۶۔ نکس ماسکاٹا ۶۔ ہائی اوسیا مس ۶۔ ہیر پرفورم گنیشیا فاس ۳ x۔ سفوف۔
(گرم پانی کے ساتھ) فاسفورس ۶۔ ایکسٹن ۶۔ سلکا ۳۰۔ ڈرکامار ۱۔ بیج بیج
میں ضروری ہو سکتی ہیں۔ بسر د ہوا لگ کر دانت درد ہونے پر: ایکون
۳ x۔ کیو ملا ۶۔ بیلا ڈونا۔ برسانی ہوا لگ کر دانت درد ہونے پر:
ڈرکامار ۶۔ مرکورس ۳۔ نکس ماسکاٹا ۳ x۔

وجع مفاصلی :- درد دندان میں برا یونیا ۳۰۔ ایکون ۳ x۔
کیو ملا ۶۔ سسی سی فیوگا ۶۔ نہایت مفید و کارآمد ہے۔
بدبھٹی کی وجہ سے درد دندان۔ نکس و امیکا ۶۔

پلساٹیللا ۶۱۔ برا : ۳۔ مرکبوریس ۳۔ آرسنک ۴۔ اہم ۶۔
 دانت میمر سورخ ہونے پر : دانت کو سیدھ ہونے کی وجہ سے دانت
 میں درد : کرکریوزورل ۶۔ مرکبوریس ۳۔ انٹم کروڈ ۶۔ سلسکا ۳۰۔ کیمو ملا ۶۔
 یو فور بیا ۳۳۔ اعصابی درد دندان میں کیمو ملا ۶۔ آرسنک ۳۰۔ لپٹے گو ۱۰۔
 سردی لگ کر درد بڑھنے میں : ایکونائٹ ۳۳۔ آرسنک ۳۰۔
 روڈنڈران ۳۳۔ گرم چیزوں کے کھانے سے زیادتی کیمو ملا ۶۔
 برا یو نیا ۳۳۔ انٹم کروڈ ۶۔
 سینکے سے کم ہو جانے پر : گنیت میا فاس ۳۳۔ سفوف -

عام اصول

دانت ٹھیک رکھنے کے خیال سے اکثر لوگ طرح طرح کے منجن : تمباکو کا
 سفوف : زردہ : اور چرٹ کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے
 نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے : پائے : کھریا : پان : یا پھٹکری کے سفوف سے
 دانت ملنے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ دانت اگر اوپر اٹھ آوے تو اس کو
 نکلوادینا ہی اچھا ہے۔ کافی مٹھائی : یا تمباکو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ ملتے ہوئے
 دانت میں غند اجانے پر سینک میں روئی لگا کر اسے نکال ڈالنا چاہیے۔
 درد والے دانت میں روئی کلوروفارم یا کرکریازوٹ میں تر کر کے اور
 اسپرٹ کیفر یا محلل گوگل (DILUTE MYRRH) مسوڑھے میں ملنے سے
 تھوڑی دیر کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے۔ دانت کے شدید درد میں امرود
 کے پتے کو جوش دیکر اس پانی سے گلی کرنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ خوب سرد
 اور خوب گرم چیز کھانا۔ دانت کے لئے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر فنج حرائڈ
 کہتے ہیں کہ پیر کا انگوٹھا چٹکانے سے اسی وقت دانت کا درد اچھا ہو جاتا ہے۔
 انڈین ڈبیل ریکارڈ، اپریل ۱۹۶۲ء دیکھئے :-

امراض زبان

(DISEASE OF THE TONGUE)

عموماً افسردہ کی حالت محسوس ہونے پر بھی زبان ایک علیحدہ

عضو ہے اسلئے ہاضمہ کے فعل میں خرابی نہ ہونے پر بھی اس میں بہت قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

(Glossitis)

سوزش زبان

زبان سرخ سوچی۔ اور درد ہو۔ اسکو ورم زبان، یا سوزش زبان کہتے ہیں۔ اس میں زبان منہ سے باہر نکل آتی ہے زیادہ رال آگئی ہے۔ کھانے، نگلنے، اور بولنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور سانس بند ہونے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ جو ریشم ہی اس بیماری کے خاص اسباب ہیں۔ سردی، کمزوری، زبان میں زخم، یا چوڑے زیادہ پارہ کھانا اس بیماری کے دوسرے اسباب ہیں۔

علاج

مرک دائی و س ۳x۴؛ سفوف۔ اس مرض کی اچھی دوا ہے۔ اگر پارہ کا غلط استعمال نہ ہوا ہو (اے پس ۳x۳۔ زبان زیادہ سوچی ہو) پائے کے غیر مناسب استعمال سے زبان کے مرض میں نائٹریک ایسڈ ۳-۴۔ اور ۴-۶۔ ہیرسلفو۔ یا کاربو و ج ۶-۷۔ آرنیکا ۳x۴۔ (زبان میں سوراخ ہو جائے یا چوڑے لگنے پر)۔

(ULCERS)

زخم زبان

زبان پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہونے پر وہ سرخ ہو جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے۔ اور درد ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی پھٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

علاج

مرک بن ۲x۴۔ سفوف؛ اس مرض کی بہترین اور کارآمد دوا ہے۔ اگر پارہ کا غلط استعمال نہ ہوا ہو (آرس ۶۔ یا ہائی ڈرائسٹس ۳x۴ بھی گامھے گا) ضرورت پڑتی ہے زیادہ مقدار کے استعمال سے زبان میں چھالے پڑ جائیں تو نائٹریک ایسڈ ۲-۳۔ یا ہیرسلفو ۶-۱۰۔ دینا چاہیے۔

شیشے کے بڑے گھاس میں پانی بھر کر اس میں پانچ چھ بوند محلول نائٹریک ایسڈ یا ہائی ڈرائسٹس، پانچ چھ قطرے ڈال کر اس سے روز تین چار مرتبہ کلی کرنا چاہیے۔

زبان کی اور چند بیماریاں :- زبان کے خراب بھوڑے میں،

کیلی سائٹس ۳؛ زبان میں طق، بازبان کٹی یا خشک معلوم ہونے پر ایلیوسن ۳۔
 زبان بہت سرخ ہونے پر؛ اور زبان پر دانت کا داغ دکھائی دینے پر؛
 ہائی ڈرائٹس ۱۰۔ ۳۰۔ زبان خوب خشک ہونے اور پھٹ جانے پر؛ اس
 دن ۳؛ ورم زبان میں۔ اور بہت گرم چیز کھانے اور پینے کی وجہ سے زبان
 میں سوزش ہونے پر؛ کنٹھرس ۳۔ زبان میں چھالے پڑنے اور جلن ہونے
 پر؛ نیٹرم میور ۴۔ زبان اکڑ جانے پر؛ کاسٹیکم ۶۔ زبان میں آماس یا کڑا پن
 ہونا۔ اور حرکت نہ کر سکرنا وغیرہ علامات میں ڈکمار ۳۔ زبان سن معلوم ہونا۔
 اور بول نہ سکرنا جلیسم ۲۔ مرض آتشک کی وجہ سے زبان کی بیماری میں فلورک ایسڈ
 ۳۔ زبان پر چھوٹے چھوٹے سوراخ کی طرح دکھائی دینے پر؛ آرج نائی ۶۔ زبان کے
 نیچے بھنسیاں ہونے پر؛ لائیکو پوڈیم ۱۲۔ ۳۰۔ مواد ہونے پر؛ یاسٹرن شروع ہونے
 پر؛ ہیپرسلفز۔ ان تھراسی نم ۶۔ نائٹرک ایسڈ ۶۔

علاج معاون

گھی اور عرق پان گرم کر کے زبان پر مالش کرنے سے زبان کا زخم اچھا
 ہو جاتا ہے۔ کلکتہ میڈیکل کالج کے سابق پروفیسر ڈاکٹر گڈوچیکرورتی؛ اسی
 ترکیب سے ہتوں کو اچھا کرتے ہیں۔ انھیں بروئی ذات کی ایک عورت
 سے یہ ترکیب پہلے پہل معلوم ہوئی تھی۔ کھانے میں تکلیف ہونے پر؛ دودھ،
 سو جی کی کھیر؛ کھچڑی وغیرہ دی جاسکتی ہے۔ لیکن بخار رہنے پر؛ ساگو، بارلی؛
 وغیرہ ہلکی چیزیں دینی چاہئیں۔

حناق مطلق۔ اور ورم مطلق

(QUINCY AND SOR THROAT)

سردی کی وجہ سے گلے میں درد ہونے کی وجہ پر؛ آواز بند۔ گانا۔ بولنا
 تقریر کرنا۔ بیٹھی ہوئی آواز کی حالت میں چیخنا۔ آتشک کا زخم۔ وغیرہ
 اسباب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں منہ کے اندر دلی حصہ کا
 ورم۔ کو بڑھا ہوا۔ اور لوزتان آماس کر جاتے ہیں۔ اسکے بعد

نگلے کے اندر لعابدار بھلی میں زخم ہو جاتا ہے۔ اور گلا سُر سُراتا ہے۔ خراشیں
مریض بار بار کف نکالنے کی کوشش کرتا ہے کوئی چیز نہیں گل سکتا ہے۔
سانس لینے اور چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔

علاج

نگلے کے درد شدید میں بہت گرمی؛ نگلے میں درد؛ گلا سُر سُر؛ آنکھیں چاٹیلی؛
چہرہ سُر سُر؛ ستر میں درد وغیرہ علامات میں بیلا ڈونا ۳x۳۔ سوزش کے ساتھ
زخم؛ سانس کے ساتھ زخم؛ سانس رک جانے کے علامات ہونے پر۔
مرک کارب ۳-۶۔ نگلے میں معمولی درد اور آماس؛ کچھ نیلگوں، سُر سُر زخم؛
لارگر نایا سانس میں بدبو وغیرہ علامات میں مرک کارب ۳-۳۔ تیز بخار کے ساتھ
نگلے میں زخم؛ ایکو نائٹ ۳x۳۔ نیند کھلنے کے وقت گلا خشک محسوس ہونا
گھوٹا نگلے کے وقت نگلے میں کوئی سہی چیز اٹکی محسوس ہونا۔
نگلے میں بگینی، یا سُر سُر زنگ کی دکھائی دینا نگلے کی بونا قابل برداشت؛ نگلے کے
باہر تھوڑی سوچن کے علامات میں لیکسس ۶۔

کو ا بڑھ جانے پر کلکیر یا فاس ۶x۶۔ سفوف ۳-۳۔ اور کیلی میور ۳-۳۔ سفوف
۳-۳۔ گھوٹا نگلے کے وقت نگلے میں درد؛ ورم تالو؛ زخم سے مواد نکلنے
کے علامات میں د مزن حالت میں) برائٹا کارب۔ بلند آواز سے تھیرما
گانے کی وجہ سے نگلے میں زخم ہونے پر آرنیکا ۳x۳ نگلے کے مزن زخم میں کلکیر یا
فاس ۱۲x سفوف کبھی کبھی آرسنک ۶-۶۔ ایلیمو منا ۶-۶۔ فانی ٹوٹکا ۰-۳
د نگلے کے اندر نیلا رنگ اور سوچا ہوا)۔ ٹوٹکا مارا ۶-۶۔
کاسٹیکم ۶-۶۔ ہیپر سلف ۶-۶۔

د نگلے کے زخم پکنے کی علامت میں)۔ ٹائٹریک ایڈ ۶-۶۔ (نگلے میں چھٹنے
کے ایسا درد)۔ سلف ۳-۳۔ رٹاکس ۶-۶۔ مرک آلوڈ ۶-۶۔ سفوف -
ہائی ڈراسٹس ۳x۳۔ آر جینٹم نائٹریکیم ۶-۶۔ بھی دیئے جاسکتے ہیں۔
سردی لگنا۔ یا فلاہین وغیرہ اگر کم کپڑے سے ہمیشہ گلا بند رکھنا یا
زیادہ بولنا منع ہے۔ غذا میں ہلکی چیزیں کھانی چاہئیں مچھلی

گوشت نہ کھانا ہی اچھا ہے؛ داڑھی، مونچھ بڑھائے رہنا اچھا ہے۔
 ورم نوز تین (TONSILLITIS)

نوز تین۔ (یعنی تانوں کی دونوں یا ایک جانب کی بادام کی طرح کی
 گلیاں؛ سرخ، گرم ہونا اور سوجن کا نام ورم نوز تین ہے۔ سوزش
 کی حالت میں بخار، درد سر، سانس میں تکلیف، نکلنے میں تکلیف، منہ
 سے زیادہ تھوک نکلنا، جسم میں درد، آوارہ بیٹھی وغیرہ علامات موجود
 رہتے ہیں۔ اچھی طرح علاج نہ ہونے پر ماؤف جگہ میں زخم ہو جاتا ہے۔
 اس کے بعد یہ زخم پھٹ کر مواد نکلنے پر یہ بیماری مزمن ہو جاتی ہے۔

حالت گمنہ میں زبان کی جڑ وانی گلی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نکلنے کی
 طاقت نہیں رہ جاتی۔ اور کوئی ایک جانب ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

علاج

(شدید حالت میں) داہنے جانب کی زبان کی جڑ کا سرخ ہونا۔
 اور آماں کرنا۔ بیلاڈونا ۳۰۔ اس سے فائدہ نہ ہو تو مرکب ریس ۳۰؛
 گلا؛ صوطا اور زبان کا آماں کرنا۔ لارگرنا۔ نکلنے میں تکلیف؛ بدبو دار
 سانس؛ منہ میں جھالے؛ زیادہ پسینہ نکلنے کی علامت میں مرکب بن البواسید
 مواد پڑنے کو ہو تو پیرسلفر ۶۰؛ بائیں جانب زبان کی جانب زبان کی جڑ کا سرخ
 اور سوجی؛ بائیں طرف سے جلن شروع ہو کر دائیں طرف پھیل جائے۔
 لائیکو ۱۰۰۔ ۳۰۔ تالیو بڑھنے پر کلکیر یا آیوڈ، ۳۰۔ سفوف۔ رحناق مطلق،
 اور ورم گلو کا بیان ملاحظہ کیجئے۔)

(مزمن حالت میں مندرجہ ذیل علاج ہونا چاہیے۔)

برائٹ کارب ۶۔ ایک اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ خاص کر آماں،
 زیادہ ہونے پر۔ معمولی سردی لگنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

ٹائسل مٹورم؛ ان میں سوئی چھنے جیسا درد من پانی یا دودھ ہی نکل سکے گلی میں
 جیسے ڈاک لگی ہوئی۔ ہے کھانا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی تکلیف ہو جیسے گلا گھٹا رہا،
 برائٹامیور ۶؛ یا مرکب آیوڈ۔ نکلنے میں تکلیف۔ نکلنے میں ایسا معلوم

کنائے کا حصہ سرخ، ورم سینہ، پیٹ پھولنا، پیاس، ہاتھ و پیروں میں جلن قبض۔
پیشاب سرخ، وزن میں تھوڑا ہونا وغیرہ علامات۔

تلی، جگر، آلات، پیشاب کی بیماری کی وجہ سے معده کا ورم ہو سکتا ہے۔
بہت کھانے پینے بد معنی، یا زہریلی چیزیں پیٹ میں جا بیگی وجہ سے یہ بیماری ظہور کرتی ہے۔

علاج

(شدید یا فرمن ورم معده میں) آتشک ۲۲۔ سفوف ۳۰، ۳۰۔

درد میں بہت جلن ہو۔ (گو یا آگ میں جلا جاتا ہے)۔

پیاس، بھوک نثار، قے یا متلی، کھانے پینے کے بعد ہی قے،
نبض تیز ہونا۔ وغیرہ علامات میں۔ پانی کے ساتھ آرسنک استعمال کرنے
پر بھی اگر قے ہو جائے تو آرسنک ۲۲ ۳۰۔ سفوف (بغیر پانی کے)۔
استعمال کرنے پر فوراً تعجب خیز فائدہ ہوتا ہے۔ (ڈاکٹر ان ہیومن۔ بیرٹ
فرٹگین، وغیرہ معالج اس مرض کی ایک ہی دوا سمجھتے ہیں)۔

بائیڈر اسٹس ۳۰ ۳۰۔ یہ مرض کی بہت اچھی دوا ہے۔

قے، یا اسہال ہونے پر آپیکاک ۳۰۔ آپیکاک سے قے بند ہو کر اسہال
موجود رہنے پر کیس دینا چاہیے۔ برابر ڈکار آتی رہے تو کاربون ۳۰ سفوف
یا گلس دامیکا ۳۰۔ دینا چاہیے۔ یکایک بیماری کا سخت حملہ ہونے پر کیمفر ۱۰
کا استعمال نہایت مفید و کار آمد ہے۔

زبان میل آلودہ قے یا کھائی ہوئی چیز کی بو ڈکار آنا، انٹم کر وڈ
معده کے آماس کی وجہ سے برابر تکلیف معلوم ہونے پر مرک کار ۶۔

پانی کے علاوہ تمام چیزوں کا ذائقہ کڑوا۔ پیاس، معده میں درد۔
اور سردی رہنے پر ایکونائٹ ۳۰۔ چائے سے پیدا ہوئے مرض میں تھوڑا سا
۳۰ معده میں کمزوری اور اس کا خالی محسوس ہونا صفرا خون، اور
بلغم کے ساتھ کھائی ہوئی چیز کی ڈکار آنا وغیرہ علامات، فاسفورس۔

۶۔ بیلادونا ۶۔ کینتھرس ۶ کیمفر ۱۰ ہائی یوسیا ۶۔ آر سے نکم ابیم۔
۳۰ ۳۰۔ بسمتھ ۶۔ تلی فوگیم ۶۔ مرکبوریس محول ۶۔ برائی او نیا ۳۰۔

سلفر۔ مزمن مرض میں علامات کے مطابق دینا چاہیے۔
 معده میں زخم ہونے پر آر سے نکمہ اسٹس کیل بائی کروم ۶ گریز وٹ
 ۱۲۔ ۱۲ کی ڈرائسٹس ۶x۲۔ مرض سوء ہضمی ملاحظہ ہو۔
 کوئی زہریلی چیز کھانے پر اگر ورم معده ہو تو اس زہریلی چیز کا شریاق
 (ANTIDOTE) استعمال کرنے سے مرض جڑ سے جاتا رہتا ہے۔
 مزمن بیماری میں صبح ٹھنڈا پانی پینا مفید ہے۔
معده کا مزمن زخم

(CHRONIC ULCER OF STOMACH)

بھیٹ کے سچ میں اور معده میں تیز درد، اور جلن۔ دکھانے پینے کے بعد
 ہی درد کا بڑھنا، منہ میں ہمیشہ پانی بھر آنا۔ کھائی ہوئی غذا تے کرنا۔
 رد کیھنے میں کافی کے سٹوف کی طرح۔) نبض ضعیف، کمی خون، اور
 (عورتوں کی) حیض کی خرابی وغیرہ۔ «مزمن حالت زخم معده» کی مخصوص
 علامات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آنٹوں کو ڈھکے رہنے والی جھٹکی کا ورم یا تے الدم
 علامات ہونے پر مرض خراب سمجھا جاتا ہے۔
 مریض کو قابل ہو کر پیتھک معالج کے سیر کرنا چاہیے۔

علاج

گریز وٹ، آر سے نکمہ اسٹس کیل بائی کروم، اور آر ج نائی :
 (علامات کے مطابق) اس مرض کی مخصوص دوائیں ہیں۔ تے الدم، ہونے پر مرق تے الدم،
 دتے میں خون آنا جس کا بیان اس کے بعد ہے۔ ملاحظہ کرنا چاہیے۔
 برابر برف کا ٹکڑا چوسنا، یا برف کا پانی پینے سے درد اور تے، بند
 ہو سکتی ہے۔ جلد ہضم ہونے والی چیزیں کھانا۔ سوڈا وائٹر کے ساتھ دودھ
 آر وٹ، وغیرہ ہلکی غذا۔ اور ضرورت ہونے پر فاقہ بتانا چاہیے۔
 تمباکو کھانا نقصان دہ ہے۔

(HAEMATEMESIS)

خون کی تے

دھوپ میں گھومنا، بہت کسرت، بہت غصہ ہونا، زیادہ جماع،

حیض ہونے کی وجہ سے خون کی تہ ہوتی ہے، کھار، رنگ، اور ترش
 (کھٹی چیزیں) اور مرتج و غیرہ تیز قسم کی چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے
 اور خون خراب ہونے پر ہی وہی صفراء ہی خراب خون، آنکھ، کان،
 ناک، یا منہ سے یعنی اوپر کے راستہ سے اور ذکر فرج یا مقعد وغیرہ
 نیچے کے راستہ سے یا بالائی، اور زیرین دونوں راستوں سے نکلا کرتا ہے۔
 عموماً تہ کے ساتھ منہ سے خون زیادہ نکلتے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تکلیف
 عموماً تپ دق میں آتی ہے۔

خون کی تہ ہونے سے پہلے معدہ میں درد اور بوجھ محسوس ہوتا۔ بدھمی،
 متلی، ذائقہ نکلیں، کمزور، گہری سانس، سستی، سر میں جھنجھناہٹ، وغیرہ
 علامات پیدا ہوتے ہیں تہ کے ذریعہ جو جریان خون معدہ سے ہوتا ہے۔
 اس کا رنگ یا مقدار ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا۔

پھیپھڑے سے جریان خون اور معدہ سے جریان خون میں فرق ہے
 معدہ کے خون میں خون کا رنگ کچھ کالا۔ اور بغیر پھین کے کھائی غذا۔
 کبھی خون) ہر از کے ساتھ نکلتا ہے۔ اور تہ کے پہلے معدہ میں درد، یا
 متلی رہتی ہے۔ پھیپھڑے سے خون نکلنے پر۔ خون چمکیلا، سرخ، اور
 لیسدار، بلغم ملا رہتا ہے۔ ہر از کے ساتھ خون نہیں رہتا۔ خون نکلنے کے
 پہلے سانس کی تکلیف، اور درد سینہ موجود رہتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید و کارآمد ہیں۔
 ایکونائٹ ۳۰، جن لوگوں میں خون کی زیادتی ہو، ان کا چہرہ سرخ،
 نبض بڑا، دل دھڑکنا، گھبراہٹ، بخار، یا ایک معدہ میں درد ہو کر خون
 کی تہ ہو، سرخ رنگ کی خون کی تہ۔

ملی فولیم ۱۰-۱۱۔ آسانی سے چمکیلا سرخ رنگ کے خون کی تہ ہونا
 بالخصوص اس وقت مفید ہے جبکہ حیض یا لو اسیر میں خون کا اخراج
 دہ گیا ہو۔ اپریکا ۳۰-۶۰ مثلی یا تہ کے ساتھ چمکیلا سرخ رنگ کا
 خون نکلنا۔ حقوڑی دیر پھرنے والی بار بار کھانسی، ذائقہ نکلیں، زبان تر۔

کمزوری اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہی اس مرض کی انمول دوا ہے۔
 ۵۱۔ امینٹ کے وقف سے دوا استعمال کرنی چاہیے۔
 آرٹیکاٹ ۳x۳۔ ۳۔ گرہ اور خون کی تھوٹا اور کھانے پینے سے بڑھنا۔
 زیادہ محنت یا چوٹ کی وجہ سے خون اخراج ہونا۔

آرٹیکاٹ البم ۳x۳۔ سانس کی آمد و رفت میں تکلیف۔ چہرہ نکلین، دل
 دھڑکنا۔ جسم میں جلن، نہ بجھنے والی پیاس، نبض صغیر اور صریح۔
 چائنا ۳۰۔ ۳۰۔ بہت زیادہ خون کی تھوٹ ہو کر مریض سے کمزور ہونے پر،
 اور ہاتھ پیر ٹھنڈے، اور نبض ضعیف ہونے پر بے ہوشی کی علامات میں
 فاسفورس ۴ سیکیل ۲x۳۔ ۳۔ کروکس ۲x۲۔ بیلادونا ۶۔ فیرم فاس ۶۔ (کھانسی
 یا تھوک کے ساتھ خون آنا۔ کلیجہ دھڑکنا۔ اور بے ہوشی کی علامت میں)۔
 کاربوونج ۶۔ ۳۰۔ (جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہونے کی حالت میں) اور صفرا
 یا خون کا تھوٹ ہونے پر، اور نکس و امیکا ۶۔ کبھی کبھی ضروری ہو سکتا ہے۔

اصول

پورے طور سے آرام۔ جسم کے کپڑے ڈھیلے کر دینا۔ دونوں پیر کچھ
 اونچے رکھ کر کھاٹ پر سونا۔ برف کے ٹکڑے چوسنا، یا برف کا پانی پینا۔
 اور پیٹ پر برف رکھنا یا برف کی پوٹلی پیٹ پر رکھنا مناسب ہے۔
 خون کی تھوٹ نہ ہونے تک ساگو۔ باری۔ آراروٹ یا تھوڑا ڈودھ
 پلانا چاہیے۔ اگر ہنسی آجائے تو ڈر کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر
 بے ہوش ہو جانے پر خون کی تھوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن بے ہوشی بہت
 دیر تک رہنے پر شمیمین بشراب کے ساتھ ملا کر اس کو ٹھنڈا کر کے
 مریض کو پلانے سے مریض کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ اور تھوٹ
 ہونا بند ہو جاتا ہے۔

بد ہضمی ضعف معدہ

(DYSPEPSIA OR INDIGESTION)

اضمہ کے فعل کی خرابی ہی سور ہضمی یا تخمہ ہے۔ بھوک نہ لگنا

(بھوک کا ہو کا۔) نفع شکم: قبض ہونا۔ یا تیلے دست ہونا۔ ڈکار آنا۔ متلی یا تے سینہ یا گلے میں جلن: پیٹ میں بوجھ: منہ سے پانی نکلنا۔ بعد غذا پیٹ میں درد: سانس میں بدبو: کلیجہ دھڑکنا۔ درد سر وغیرہ اس مرض کے مخصوص علامات ہیں۔ اس مرض کے بعد وجع مفاصل۔ بہت زیادہ پیشاب آنا۔ وغیرہ بہت تیز بیماری ہو سکتی ہیں۔ مگر درست رکھنے کیلئے کھانے پینے، آرام وغیرہ کی جانب زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔

اسباب: گھنی یا تیل میں پکائی ہوئی چیزیں: بے وقت کھانا کھانے کی چیزیں بغیر خوب چبائے ہوئے نگل جانا۔ عرصہ تک مختلف قسم کی ادویات استعمال کرنا۔ بہت تمباکو: چائے یا شراب پینا۔ بہت زیادہ جسمانی یا دماغی محنت: یا بالکل نئی محنت نہ کرنا۔ بصر صحت والے میں رہنا۔ ٹھنڈی ہوا لگنا۔ ہمیشہ اچار: اور کھٹی چیزیں کھانا۔ کمر میں کپڑا خوب کس کر پینا۔ جسم میں کافی خون نہ رہنا۔ دل ہمیشہ مڑجھا یا رہنا۔ ہر وقت فکر مند رہنا۔ عصبی بیماریاں، یا وجع مفاصل رہنا۔ جن لوگوں کی طبیعت سوراکی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ ان کو اکثر بد ہضمی میں مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ ان کو جب کوئی جلدی بیماری ہوتی ہے تب بد ہضمی کم ہو جاتی، اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید و کارآمد ہیں۔

۱۱) شدید ضعف معدہ میں

نکس و امیکا۔ آر سے نکم الیم: ہر ایونیا: بسمتھ: رات میں ہمیشہ زیادہ تکلیف۔ تشنج (پلسا ٹیلا) ثقیل چیزیں، یا روغنیں چیزیں کھانے کے بعد، سو، ہضمی، آڑ میں تے یا متلی یا تیلے دست کیساتھ سر میں درد کو بوسنتھ (ترش پھل کھانسیکی وجہ سے بد ہضمی)

۱۲) مزمن ضعف معدہ میں

نکس و امیکا۔ آر سے نکم الیم: ہر ایونیا۔ کار بو وج: پلسا ٹیلا۔ سلفر۔ کلکیر یا کارب۔ ہیرسلفر۔ مرک: کیلی بائی: آر زکا۔ حقو جا۔ (خاص کر چائے پینے کے بعد، بد ہضمی ہونے پر: انظم کر دڈیلا سکوپو ڈیم، مفید ہے۔)

(۱۳) سردی لگنے کی وجہ سے بد ہضمی میں نکس و امیکا (کار و بار

کی نگرہات میں جاگنے کی وجہ سے بدبھنی میں، انگنیشیا، غم تزد دیا تکلیف کی وجہ سے پیدا ہوئے امراض میں حسب ذیل علامات مفید و کارآمد ہیں۔

(۵) کمزوری :- (جیسے آب خون کا زوال ہونا، اسہال سے پیدا ہوئے ضعف معدہ میں) (چائنا، الیٹھاس)؛ غیرم فاسفوریکم وغیرہ۔
چند خاص دواؤں کے علامات

نکس و امیکا x ۳۰ :- بعد غذا کے معدہ میں بوجھ اور درد محسوس ہونا۔
کلیجہ میں جلن، قلع شکم، کھٹی ٹکار آنا بار بار غذا یا پت کی تے،
منہ کا مزہ کڑوا یا کھٹا، غذا کھانے کے بعد نیند نہ آنا اور سستی؛
صبح سہر ہونا، یا سر میں جکڑ آنا، بار بار پاخانہ جانے کی حاجت، لیکن پاخانہ نہ ہونا۔
چہرہ پر زردی مانگ، زخا صکر تبکا کو کھانے، یا شراب پینے، اور بہت قسم
کی گرم دوا میں استعمال کرنے کی وجہ سے ضعف معدہ ہو تو نکس و امیکا
x بہت فائدہ کرتا ہے۔

نیٹرم میور x ۱۲ :- سفوف، ۳۰؛ آلو؛ میدہ؛ وغیرہ، اجزاء یہ نشائیہ کی
چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ضعف معدہ میں مندرجہ ذیل علامات میں یہ
دوا خوب فائدہ کرتی ہے۔ منہ سے فائدہ نکلتا، ذائقہ کڑوا، سینہ میں جلن
سردی محسوس ہونا، بعد غذا کھانے کے دل میں دھڑکن، خون کی کمی، تنگ
کھانے کی رغبت، قبض، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے زیادہ جہاں کے
خواب نتائج کے علامات ہیں۔

میلیساٹیل x ۳۰ :- سینہ میں جلن، سر میں چکڑ، زبان خشک، اور
کھردری، بار بار پتلا اور آٹوں آلودہ دست، منہ کا ذائقہ نمکین؛
کڑوا یا کھٹا، چارٹا الگنا، خاص کر مرغن غذا کھانے کی وجہ سے ضعف
معدہ، پھل آٹا، آکسکیم، یا برف کی قلعی کھانے کی وجہ سے ضعف
معدہ، نازک مزاج والی عورتوں کو جن دھات کی خرابی رہتی
ہے۔ یہ دوا نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

اپیمر ناسیکریا x ۳۰ :- کھانے کے بعد ہی معدہ میں تیز درد، قبض،

لوڑھوں کے ضعف معدہ کے مرض میں اور بُرائی بدہضمی میں مفید ہے۔
 اناکارڈیم ۳۔ غذا کے بعد ہی مرلیض کو کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔
 لیکن تھوڑے ہی دیر بعد درد شروع ہو جاتا ہے۔

ہائڈرائسٹن ۳x زرد۔ خشک، زبان چہرہ پر دھکتے۔ پیٹ چیکاہو،
 یعنی چھاتی اور پیٹ برابر ہو۔ تو یہ دو مفید کام کرتی ہے۔
 نیٹرم فامس ۳۰x سفوف، امراض ترشی، دکھش ڈکار و قے۔

آرسنک ۳x معدہ میں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہو۔ زیادہ گرم پانی
 پینے سے بند ہو۔ برف کھانے پر ضعف معدہ ہو۔ بار بار پیاس لگے۔

برائونیا ۶۔ کھانا کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ محسوس ہو۔ ایسا معلوم
 ہو۔ تو یا معدہ میں ایک پتھر بندھا ہوا ہے، قبض، یا بخانہ سخت، خشک،
 جھلسا ہوا، جلی ہو کی اینٹ جھلونے کی طرح۔ سر میں چکر، سر بھاری معدہ
 میں نوچنے کا سادرد، ذائقہ کڑوا۔ اور صفراوی تھی یا متلی موسم گرما میں
 اسہال ہو (خاص کر جبکہ آرسنک البم کے بیجا استعمال سے ضعف معدہ ہو
 ہو)۔ مزاج چڑچڑا یا غصہ ور ہو تو برائی او بنیا نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

لائسکوپوڈیم ۶-۲۰۰۔ پیٹ کے نچلے حصے میں ابھارہ آئے، نافردریضوں
 کا ضعف معدہ غذا کے ہضم ہونے کے وقت بہت نیند، اور جاگنے کے
 بعد سستی۔ پیٹ میں ریاح اکٹھا ہونے کی وجہ سے نفخ شکم، قبض، فراق
 ہونا، کھٹی ڈکار۔ بائیں جانب کی آنتوں کا کانپنا۔ کمزوری۔ یا بڑھنے لکھنے
 کی زیادتی سے آتی ہو۔ بدہضمی، غصہ کی طاقت کم ہو جانا۔ یا ہضمی رطوبت کی
 کمی کی وجہ سے ضعف معدہ میں خصوصیت سے مفید و کارآمد ہے۔

کاربوووج ۳x سفوف ۳۰۔ پیٹ کے اوپر کا حصہ پھولنا، سینہ میں جلن،
 اسہال، سر بھاری اور کمزوری۔ مزمن ضعف معدہ یا لوڑھوں کے ضعف
 معدہ میں، یہ دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ منہ سے بار بار سیٹھا پانی نکلنا۔
 یا کڑوا۔ اور کبھی چھپا۔ یا سٹریا بدبو دار، ڈکار آنا۔ یا کبھی قبض،
 اور کبھی پتلے دست آنا۔ کھانے اور صرف مٹھا پی کر رہنے (خافہ کرنے)

سے فائدہ ہوتا ہے۔ پاؤں گھٹنے تک سرد۔ پنکھا کرنا چاہیے۔ کھلی کھڑکی کے پاس بیٹھنا پسند کرے۔

ہائیدرائسٹس ۱۔ ۳۰: معدہ پر بھاری محسوس ہونا۔ سر میں درد۔ (خاص کر جذباتیں) کھٹی ڈکار: سانس کی تکلیف۔ دل دھڑکنا:

سیپیا ۶۔ مرض ضعف معدہ (خاص کر رحم کی خرابی رہنے پر متعدد میں) بوجھ کھٹا یا کڑوا ذائقہ۔ ترشی۔ اچار وغیرہ کھانے کی رغبت۔ جسم میللا زرد، انٹم کرڈ ۶۔ قوت اضمہ کی کمی یا کھانے سے نفرت۔ معدہ میں بوجھ محسوس ہونا۔ متلی۔ یا صفر۔ یا بلغم کی تھک کرنا۔ مقلد کے راستہ سے بدبودار ریاخ خارج ہونا۔ غذا کی بو ڈکار میں آنا۔ قبض یا پتلے دست آنا (بالترتیب) چہرہ پر پھنسیاں یا ناک کے اندر اور ہونٹوں میں زخم۔ تمام زبان پر گہرا میل جا ہوا۔

فاسفورس ۳۰۔ مزمن ضعف معدہ میں کھٹی ڈکار یا ترش قے، زیادہ بھوک، نفخ، شکم، زبان پر میل جا۔ پیٹ میں جلن محسوس ہونا۔ پانی پینے پر کم ہونا۔ لیکن جیسے ہی پانی معدے میں جا کر گرم ہوتا ہے۔ قے ہو جاتی ہے۔

چائنا ۳۰x۲۰۰۔ مرصہ تک شراب بخوری کے باعث مزمن ضعف معدہ ہو۔ جب استقارہ سوزش جگر وغیرہ علامات ظاہر ہوں۔ ضعف معدہ پیدا ہوتا ہے۔ کونین کے ناجائز استعمال کے علامات میں:

مرک سول ۳۰x۔ سفوف ۶۔ یا اکتیارسی موسا ۶۔ ضعف معدہ تک چائے پینے کی وجہ سے ہو۔ منہ میں لار کا بہ کثرت آنا۔

پلمبم ۶۔ ۲۰۰۔ سردی لگنے کی وجہ سے ضعف معدہ میں۔

آرجنٹیم نائیٹرٹ ۶۔ ۲۰۰۔ خون کی کمی ہو نیکی وجہ سے بدھمی ہو مینا: معدہ کے درد کے ساتھ ترشی اور برکی جانب ریاخ کا رجوع ہونا۔

مقوجا ۶۔ ۳۰ زیادہ مقدار میں چائے پینے سے جو علامات پیدا ہوں میں یہ دوا مفید و کارآمد ہے۔ اکثر ایرانی بدھمی میں مفید ثابت ہوا ہے۔

کیلی بائی کروم ۶۔ ضعف معدہ جو زیادہ بیز ایک قسم کی شراب۔

مکس ماسکاٹا ۲x۶۔ جلدی مرض کے دب جانے سے ضعف معدہ۔

پیر ۶-۱۲۔ مزمن ضعف معدہ؛ جب کوئی چیز سہم نہیں ہوتی کھٹائی یا اچار کھا نیکی رغبت؛ ضعف معدہ جو پارے کے غلط استعمال سے ہو؛
 سلفز:- ۳۔ ترش ڈکار آنا معدہ میں بوجھ محسوس ہونا غذا سے نفرت؛
 منہ کے اندر اور ہونٹوں پر زخم یا آماس؛ بار بار سواہی؛ قبض؛ بواسیر؛
 صبح سلفز ۱۴۔ اور شام کے وقت نکس و امیکا ۳۰۔ مزمن ضعف معدہ کے مریض کو کھلا کر بہت سے قابل ڈاکٹروں نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔
 کلکیریا کارب ۶-۱۲۔ ۳۰۔ کڑوی کھٹی ڈکار آتا ہو؛ کھانسی آہستہ آہستہ جسم کمزور؛ اور بلا ہوتے جانا۔ بہت زیادہ حیض کا اخراج؛ غذا کے بعد ہی کھائی ہوئی چیزوں کا ترش ہو جانا۔ کھٹی ڈکار یا کھٹی تھ؛ پلس استعمال کرنے کے بعد اگر تکلیف میں کمی واقع نہ ہوئی ہو تو یہ دوا فائدہ کرتی ہے۔ آیو دی ۶۔ پٹر ویم ۶۔ بیج۔ بیج میں ضروری ہے۔

مرض تیزابیت کی دوا میں دیکھئے۔

منہ سے پانی نکلنا۔ کاربودی ۱۱۔ ناکار ڈیم ۳۳۔ سفوف۔ برا یونیا ۶۔
 نکس و امیکا ۳۰۔ لائیکوپوڈی ایم ۱۲۔ اگاری کس۔ چائنا وغیرہ۔
 تھوک زائل ہونے پر، کلکیریا کارب؛ چائنا۔ فیرم فاسفوریکم لائیکوپوڈیم۔
 بید بھوک؛ چائنا۔ سائنا۔ نکس و امیکا۔ سلفز۔ لائیکوپوڈیم۔
 نفخ شکم۔ (قبض کے ساتھ پیٹ بھولنا؛ کاربودی؛ اسپہال کے ساتھ پیٹ بھولنا۔ چائنا۔ جبکہ مایر یا کے بعد تکلیف نمودار ہوئی ہو؛
 سینہ میں جلن۔ کلکیریا کارب ۶۔ کاربودی ۶۔ کینپس ۶۔ نکس و امیکا۔ پلس ۶۔
 بدبودار ڈکار آنا۔ کاربودی۔ سلفز ۳۰۔ لائیکوپوڈی ایم؛ چائنا۔
 مرض تیزابیت:- ایسڈ سلفیورک ۲x۳۰۔ کلکیریا کارب ۶-۳۰۔
 فاسفورس ۳۔ نیٹرم سلفیوریکم ۱۲x۳۳۔ سفوف ۳۰۔ روبینا ۳۰۔
 (بہت عرصہ تک استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔)
 ہچکی:- سلف ایسڈ (مرض تیزابیت کے ساتھ ہچکی، نکس و امیکا۔
 آرے نکم اہم؛ کالوفانکم؛ جلیسیم؛ کاربودی؛ پیٹ میں اچارے کے ساتھ؛

ٹھہرا اور انار میں، یا انناس کا عرق اچھی غذا ہے بسبب انگوڑا انار۔
پیدتا وغیرہ زود ہضم پھل کھانے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔
کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ناریل کا پانی یا ناریل کی نرم گری اس بیماری
میں زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ بڑانے چاول کا بھات یا چوڑا گرم پانی میں بھگو کر
دہی یا مٹھے کے ساتھ کھلانے سے اکثر خوب فائدہ ہوتا ہے۔

دودھ، دہی، اور کچے پیٹ کی ترکاری اس مرض میں مفید غذا ہے۔
مٹھنی ہوئی چیز اور چائے، کافی، کوکو، وغیرہ استعمال نہ کرنا چاہیے۔
غذا کے بیٹن یا پکھنٹ منٹ پہنے ایک پاؤ کے انداز بہت گرم پانی پینے
سے بھی کبھی کبھی ضعف مودہ اچھا ہو جاتا ہے۔

غذا کے وقت زیادہ پانی پینا منع ہے۔ کھانے کے دو تین گھنٹہ بعد
پانی پیا جاسکتا ہے۔ غلہ کی چیزیں اچھی دم نچت ہوئی چاہیے۔
زیادہ پانی کاربونیٹ آف سوڈا۔ یا جھرنے کا پانی یا زیادہ مقدار میں
سوڈا اور استعمال کرنا نامناسب ہے۔

برف الکیم زیادہ نقصان کرتا ہے۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر کا قول ہے
کہ کھانا کھانے کے بعد ہی بچوں کی طرح کھیلتے رہنے سے کھانا آسانی سے ہضم
ہو جاتا ہے۔ شہر پیرس میں مریضان ضعف مودہ پر بھی آرائش ہو رہی ہے۔
اجکل ۱۹۵۱ء میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کچا پیاز کھانے سے رطوبت مٹھنی
کی (GASTRIC JUICE) تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔
جرمنی کے شہر میونخ کے بہت مشہور و معروف ڈاکٹر

(WILBRAND'S REPORT OF EXPERIMENTS IN THE

MUENCHENER MEDIZISCHE WOCHENSCHRIFT) ملاحظہ ہو۔

سہ منٹ میں برابر پانی پینے میں کردین کی رائے ہے کہ مریض کو بھوک لگے تو تازہ مٹھا کھانا چاہیے
اور پیاس لگنے پر صرف مٹھا پینا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے نتیجہ امید افزا ہوتا ہے۔
مٹھے سے مٹھا یا کھٹا پانی پینے میں تازہ دودھ پینا منع ہے۔ کیونکہ دودھ ایسے
مریضوں کے مودے میں جم کر دہی ہو جاتا ہے۔ اور نقصان کرتا ہے۔

اس نے جن کو رطوبت ہضی زیادہ نکلتی ہے۔ ان کے لئے غذا کھانے سے کم سے کم آدھ گھنٹہ پہلے کچھ کچے پیاز کا عرق کھانے سے زیادہ فائدہ کرتا ہے۔
 رانی گنج: جھوٹا ناگپور، پرگنہ سستعل وغیرہ، جن جن جگہوں کی مٹی میں لوہا زیادہ ہو ان جگہوں میں جانا۔ جبکہ کی خرابی کی وجہ سے مریض ان ضعف معرہ کے لئے نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ ایسے مریضوں کے لئے کاشی، گیلا، سمندر کے کنارے کی جگہوں میں رہنا مفید ثابت ہوتا ہے۔

ضعف معرہ کی وجہ سے سر میں چکرانا۔ دوران سر
 (VERTIGO)

بد ہضی، یا خرابی معرہ کی وجہ سے سر میں تھوڑا تھوڑا چکر آ یا کرتا ہے۔ سر میں تیز چکر آنے پر یہ سمجھنا چاہیے کہ دل و دماغ یا گردہ وغیرہ کی بیماری اس میں شامل ہے۔ دماغ کے ساخت کی تبدیلی وغیرہ کی وجہ سے دوران سر ہو سکتا ہے۔

علاج مختصر

سور ہضی سے چکر آنے میں نکس و امیکا، پلس۔ برا یونیا ۵۰۔ اگاری کس، پلسا ٹیلا برا یونیا وغیرہ، مرض سور ہضی کی دوا ملاحظہ ہوں۔

بہت زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کی کمزوری کی وجہ سے دوران سر میں فاسفو ایڈ، چائنا، فاسفورس، زنک، مٹھیا لیکم، کالی فاسفوریکم، وغیرہ ادویات نہایت مفید و کارآمد ہیں۔

دماغ میں اجتماع خون کی وجہ سے دوران سر میں سیلا ڈونا، جلیس، بگونا، اپلا کاک وغیرہ دوائیں امراض نظام عصبی کے باب میں آدھاسیسی ملاحظہ ہو۔

منہ میں پانی بچ آنا۔
 (PYROSIS)

بد ہضی جبکہ معرہ کی سردی وغیرہ امراض کی وجہ سے منہ میں زیادہ پانی بھر آتا ہے۔ اور کھٹی اور میٹھی ڈکار آتی ہے۔ بہت سی بلالطانت کی غذا کھانے کی وجہ سے غریبوں کو یہ بیماری زیادہ ہوا کرتی ہے۔

کاربوونج، سوڈیم، سوڈیم، کھٹی ڈکار، نفخ، شکم، اسہال یا تھقلی، لاسیکو لوڈیم، (مزمن بیماری میں) نکس و امیکا، پلس، اگاری کس، پلسا ٹیلا،

x۳. برائی اور نیا x۳ پلس ۳. وغیرہ مرض سورہضی کی دوائیں ہیں۔
مرض تیز ہونے پر بھوک، پیاس، دور کرنے کے لئے مٹھا ہی دینا چاہیے۔
تازہ دودھ نقصان کرتا ہے۔

(APPETITE LOST)

بھوک نہ لگنا

دق یا مرض تیز ابت میں۔ (یا کسی پرانی بیماری کے ساتھ) کبھی کبھی بھوک بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے موقعہ پر جن ٹیانا۔ لیٹانا ۵۔ نصف قطرہ غذا سے نصف گھنٹہ پہلے استعمال کر اگر امید افزا فائدہ ہوتا ہے۔ جن ٹیانا سے اگر فائدہ نہ ہو تو ہائی ڈرائسٹس، انٹم کروڈنکس و امیکا پیرولس اسپائی؛ اگلے، یارس ٹکس کی آرمائش کرنی چاہئے۔

ہلکی چیزیں کھانے کو دینی چاہئے۔

معدہ کا پھیلنا

(DILATATION OF THE STOMACH)

بہت عرصہ تک جو ف معدہ کے بے قاعدہ بڑھنے یا پھیلنے کا نام انبساط معدہ ہے۔ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے معدہ کے نیچے کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح پیٹ بڑھ جاتا ہے۔

زیادہ قبض اور تیزابی تے؛ (تے میں جو چیز گرتی ہے وہ ربر کے رنگ کی اور گندگی۔ اس بیماری کی مخصوص علامت ہے مرض بہت کہنہ ہو جانے سے جسم کے دوسرے اعضاء بھی خراب ہو سکتے ہیں۔

ماہ جیٹھ ۱۳۳۱ فصل میں کلکتہ ہائی کورٹ کے سابق جج، اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر مشہور سر آتھوٹوش مکھویا دھیانے اسی مرض میں مبتلا ہو کر حلت فرمائی۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

نکس و امیکا x۳. ۳. سی پیاس. ۳. اور ہائی ڈرائسٹس ۵. ۱۳. اس مرض کی خاص دوائیں ہیں۔ غذا کی خرابی یا معدہ کی دیواروں کے کمزور ہو جانے پر نکس و امیکا استعمال کرنے سے کمزور عضلات مضبوط ہو جاتے ہیں (ایسے موقع پر کوئی کوئی معائنہ نکس و امیکا کے

عوض دسترگینیا ۳۔ سفوف کھلا کر بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے (۱)۔
 مریض کمزور، زرد، دبلا ہو، جگہ میں نقص ہو، ترش چیزیں کھانے کی رغبت
 ہو، ذائقہ کڑوا اور نکلین، بد ہضمی ہو، غذا یا صفر یا بلغم کی تہ ہو،
 بہت زیادہ اخراج حیس، یا مواد آلودہ سیلان الرحم، یا رحم کا باہر
 نکلنا۔ پیناب کارنگ بد رنگ ہو، معدہ کا زیر حصہ سخت اور اس پر زخم
 محسوس ہو، تیزابی ڈکار آتی ہو۔ اگر تہ ہو، زبان تر یا اس پر میل جا ہو، تھک
 پاکھانہ، جس میں آنوں ملی ہو، خون کی کمی ہو، معدہ میں خالی محسوس ہو، تپاک
 قلب ہو، پچلے پیٹ میں درد وغیرہ علامات میں ہائیڈراسٹس۔

آر میں ۶x۳۔ کریازوٹ ۱۲۔ ارخیم نائی ۳۰۔ برائی او نیا ۴x۶۔ کاربووج۔
 ۱۰۳۔ اور سلفر ۳۰۔ درمیاں میں علامات کے مطابق ضروری ہو سکتے ہیں۔

علاج معاون

عرق انجور بہت تھوڑا دودھ اور ہلکی غذا دینا چاہیے۔ غذائنتاستہ
 اور شکر کے قسم کی چیزیں کھانا۔ اور کھانے کے بعد ہی فوراً پانی پینا منع ہے۔ جو
 اشیاء محرکہ معدہ میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ ان سب کو نکال ڈالنا چاہیے۔ غذا
 کھانے سے نصف گھنٹہ پہلے ہائیڈراسٹس ۱۰ قطرے، ایک اونس پانی میں
 ملا کر اس سے معدہ دھو ڈالنے کی عمدہ ترکیب ہے۔

کچھ گرم پانی میں تھوڑا نمک یا (دبائی کاربونیٹ آف سوڈا) حل کر کے ربڑ
 کے ٹیڑھے (SIPHON) کی مدد سے مرض خود ہی اپنا معدہ اچھی طرح
 دھو سکتا ہے۔ کبھی کبھی نشتر بھی لگوانی پڑتی ہے۔

معدہ کا دبلا پن

(ATROPHY OF THE STOMACH)

معدہ کا فعل خراب ہو جانے پر (یعنی رطوبت ہضمی کی کمی ہو جانے پر) یہ بیماری
 پیدا ہوتی ہے۔ خون کی کمی یا مرض سلس البول کے ساتھ یہ بیماری بھی شامل
 ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں درد، بوجھ محسوس ہونا۔ اور ریاح جمع
 ہونا۔ ڈکار آنا۔ اور تہ ہونا وغیرہ کی بیماری کے مخصوص علامات ہیں۔

بکس دامیکا x۳۱۔ اس کی اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔
 غذا کھانے کے بعد ہی دس پندرہ قطرہ ہائی ڈروکلورک ایسڈ تھوٹے
 پانی میں ملا کر پینا چاہیے۔ مقوی غذا خوب چبا کر استعمال کرنا چاہیے۔
 تاکہ اس میں بہت رطوبت مل جائے۔

زخم معده

(ULCERATION OF THE STOMACH)

بہت عرصہ تک ضعف معده رہنے پر اکثر اس کے ساتھ معده کا زخم
 بھی رہتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں کو (جیسے دالی، درزی، یا جو عورتیں
 سخت محنت کرتی ہیں۔ اور اچھی غذا نہیں پاتیں۔ ان کو) یہ بیماری زیادہ ہوا
 کرتی ہے۔ زیادہ گرم چائے پینا۔ دق۔ کمی خون، بواسیر، حوض بند ہونا، حمل کی
 حالت وغیرہ اسباب سے معده میں زخم ہو کر تکلیف دیتا ہے۔ غذا کے کچھ ہی
 دیر بعد پیٹ میں جلن یا چبانے کی طرح درد، گرم چیز کھانے یا پینے کے بعد یا
 پیٹ کے دبانے کے بعد تکلیف کا بڑھنا۔ تھ، میں غذا گرنا (کبھی تھ میں
 خون یا بلغم گرنا) وغیرہ اس بیماری کے مخصوص علامات ہیں۔

ہائیڈراسٹس x۳۳، آر اس x۳۲، مرک کار x۳۱۔ ایسڈ سلف x۳۳۔
 فاسفورس ۱۰۰ اور پیٹشیا x۳۲۔ اس کی اعلیٰ دوائیں ہیں۔

(ضعف معده کی دوائیں ملاحظہ ہو۔)

معده کا سرطان

(CANCER IN THE STOMACH)

یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ معده میں سرطان ہوا ہے۔ ہائیڈراسٹس
 x۳۳۔ کنڈرٹیگو ۳۰۔ یا آر سے نکم x۳۳۔ دینا چاہیے۔
 اس بات کے طے ہو جانے پر کہ سرطان ہوا ہے۔ اس کتاب کے مقصد۔
 سرطان، اور مہلک سرطان، میں دوائیں ملاحظہ ہوں۔

(ACIDITY) تیزابیت

یہ مرض خاص کر مندرجہ بالا ضعف معده (بے معده) میں نکم

کاتیزاب (HYDROCHLORIC ACID) زیادہ مقدار میں پھلنے پر ہم لوگ مرض تیزابیت کہتے ہیں۔ پیٹ گرم معلوم ہونا۔ غذا کے ایک دو گھنٹہ بعد پیٹ میں درد۔ منہ میں پانی بھر آنا۔ یا کھٹی ڈکار آنا۔ ذائقہ ترش طاقت ٹھگھٹنا۔ کلیجہ میں جلن، تھوہ، قبض یا اسہال، درد سر، پیاس وغیرہ اس کے مخصوص علامات ہیں۔

مریضان ضعف معده۔ سر بھروسہ۔ یا جو زیادہ متبا کو پیستے ہیں۔ یا جو رنج اور تکلیف میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کو یہ بیماری بہتہ ہوا کرتی ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید اور کارآمد ہیں۔

ڈاکٹر ہیون فرماتے ہیں۔ کلکیر یا کارب ۶۔ ۳۰۔ اس کی بہترین دوا ہے۔ سلفیورک ایسڈ ۲ x ۳۰۔ کلیجہ میں جلن۔ ترش ڈکار۔ کھٹی تھوہ، جسم سے کھٹی بو، کانے رنگ کا دست۔ بچہ کی دہنی تین مرض تیزابیت میں اس کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

روبنیا ۳ در حد تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی مرض تیزابیت کی اچھی دوا ہے۔ دست و تھوہ، ڈکار و پسینہ ترش تھوہ، سبزی مائل، ڈکار کا ذائقہ کڑوا۔ پیٹ میں جلن، خاصکرات میں پاخانہ کی ذور سے حاجت ہونے پر بھی قبض، نفخ، تشکم، سر میں درد، نیٹرم فاس ۳ x ۱۲۔ سفوف کھٹی ڈکار، کھٹی تھوہ معده میں درد۔

اور ریاح اور برکی جانب رجوع ہونا۔ ڈکار کرنے پر آرام محسوس ہونے کی علامات میں، آرنج نائی ۶۔ مرض تیزابیت میں (خاصکرتھوہ ڈکار اور بھوک کا نہ ہونا، ہونے پر) فاسفورس ۳۰۔ ترش ڈکار یا پانی آنا۔ علامات میں (خاصکرتھوہ) صفوں کے مرض تیزابیت میں، کلکیر یا کارب ۶۔

پیٹ پھولنے پر کاربووج ۶۔ غذا کے بعد ہی (خاصکرتھوہ) غذا یا شکر کھانے کے بعد کھائی ہوئی غذا کھٹی ہو جانے پر کلکیر یا کارب ۶۔

پیٹ میں اجتماع ریاح۔ قبض، بار بار پیشاب وغیرہ علامات میں لائیگو ۱۲۔ پیٹ میں کچھ نہ معلوم ہونے پر منینگیم یا گنیٹشیا فاس ۶۔ مرض مزمن میں خاصکرتھوہ اسہال، تھوہ، یا قبض، سر میں جلن وغیرہ علامات میں سلفورس ۳۔

مرضِ حاد کی شدت میں کچھ بھی کھانا مناسب نہیں ہے بشیرین، تیزابی کھٹی، غذا، انشاستہ دار، مرغن غذا، ہمیشہ ترک کر دینا چاہیے۔
غذا کے دو گھنٹہ بعد میوں کا عرق پینا اچھا ہے۔ چونے کا پانی یا سوڈا پانی کا ربو نیٹ زیادہ مقدار میں (۵-۱۰ گزین) روزانہ کھانے سے مرض اکثر آرام نہ ہو کر دائمی ہو جاتا ہے مرض صاف معدہ اور در تیزابی ملاحظہ ہو۔

متلی اور قے (VOMITING (NAUSEA)

بہت وجوہات سے قے ہو سکتی ہے۔ قوتِ ہاضمہ کی کمی زیادہ غذا کھانا، جسمانی کمزوری، نظامِ اعصابی کے امراض جگر اور رحم کے امراض، کرم سے خرابی، حمل کی حالت میں زیادہ پانی پینا، یا کشتی، گاڑی وغیرہ میں چلنے سے قے ہو جایا کرتی ہے، امراضِ دماغ میں (جیسے مری) قے ہونا۔ یا متلی رہنا اچھی علامت نہیں ہے، سہریا۔ یا حالتِ حمل میں قے ہونا۔ اندیشہ خیز بات نہیں ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

ایپاک ۳۔ قے معدہ سے ہو، برابر متلی۔ پانی کی طرح لارہنا۔ معدہ خالی محسوس ہونا۔ سبز یا سیاہ بلغم آلودہ قے، تریش قے، غذا کی قے،

روبینا ۳، ۶۔ متلی زیادہ کھٹی اور پستلی چیزیں قے کرنا۔

آرس ۳۰ x ۳۔ زخیم معدہ کی وجہ سے قے اور ساتھ ہی ساتھ معدہ اور شکم میں گرمی، یا جلن معلوم ہونا۔ بد بھنی کی وجہ سے سینہ میں جلن (غذا کے بعد) قے، پستلے دست۔ ٹھہر ٹھہر کر قے کرنے کی رغبت، اور اسی وجہ سے کمزوری کا ہونا۔

انٹیم کروڈ ۶۔ معدہ میں بخاری پن، میلی زبان، کھانے سے نفرت یا متلی،

اپیومارینیا ۳۔ زور کی متلی کے علاوہ یکایک قے ہوتے رہنے پر،

شرابی اور افیونی کی قے میں یہ زیادہ فائدہ کرتی ہے۔

آرس ورس ۶۔ کھٹی یا کڑوی قے، یا غذا قے کرنا۔ سر میں درد، ٹکار

آنے کی علامات میں تریش، اور صفراوی قے کرنے میں،

کریوزوٹ ۶۔ پھیپھڑے کا زائل ہونا۔ جگر یا مثانہ کی تکلیف،

کی وجہ سے تے میں : حالت حمل میں تے : صرف البکائی آنا : صبح متلی : ہسٹیریا کی وجہ سے تے جاری رہنا : بچے کا رات بھر بے چین رہنا : اور رونا :
سیکیل ۳۰ : (مزمین مرض تے میں : ترش بلغم : تے ہونے کے ساتھ
ہی بدبودار ڈکار : امٹ : پیاس :

فاسفورس ۳۰-۶ : بھٹنڈی حالت میں غذا پیٹ میں رہتی ہے : لیکن
پیٹ میں گرم ہوتے ہی تے ہو جاتی ہے :

زنکم ٹیالیکم : متلی کے بغیر فوراً تے : اور جسم کمزور ہو جانا :

پیشانی میں چوٹ کی وجہ سے تے ہونے میں آرٹیکا : گارٹی : بالکی :
نا وجہ زمین گھومنے سے تے ہونے میں کاکولس : پٹرویم : کیلی فاس ۱۲x
سفوف : یا نیٹرم فاس ۱۲x : سفوف : جگدار سرخ رنگ کی تے :

اپیکاک ۳x : ملی فویم ۱x : سیاہ خون کی تے : ہیملٹس ۱x : صفرا کی تے :
آئرس ڈائرس ۳- پوڈوفالک ۶- ہرا یونیا ۳- بامرک سول ۶- شرابیوں کی تے
میں : متلی اور تے کے : ہی آرام : انٹیم ٹارٹ ۶- دودھ پینے کے بعد ہی
تے : یا بچوں کے دودھ پاتے میں ایتھیر ۱- ۳- ۶- بھٹنڈا پانی پینے کے بعد
اس کا پیٹ میں گرم ہوتے ہی تے : فاسفورس ۳۰-۶ :

غنا : : پرانے چاول کا بھات : کھیل : (دھماں کالا دا) کا ماٹہ سا گودا :
بارلی : آرا روٹ : مونگ : جو : ناریل : پختہ بیل : اور کشمش :

حفظ صحت کے لئے عام اصول جن کی پاسداری مفید ہے :

کوئی نہ ہر بلا چیز پیٹ میں جا کر تے ہونے پر جس طرح ہوسکے اس زہر کو
فوراً پیٹ سے لگانے کی ترکیب کرنی چاہیے : مدہ یا کسی دوسری عضو کی تریک
کی وجہ سے تے ہونے پر گرم پانی پینے سے خوب فائدہ ہوتا ہے : برف کے
چھوٹے ٹکڑے چوسنے سے فائدہ ہوتا ہے : سوڈا واٹر : اور دودھ برابر
مقدار میں خوب ملا کر بار بار پینے سے : تے بند ہو جاتی ہے :

قوت اضمہ کی کمی کی وجہ سے تے میں ناریل خام اچھا ہوتا ہے :

(مرض ضعف : مدہ : تیزابیت : خون کی تے : دق اور زچہ کا بخار :

وغیرہ کی دوائیں ملاحظہ کیجئے :-

سمندری بیماری (SEA SICKNESS)

جب سمندری میں کچھ گروا بڑا (جڑائی) ہوتی ہے تو سمندری سفر کر نیوالوں میں سے کسی کسی کو سخت متلی اور تے ہوتی ہے۔ مریض سر اوجھائی نہیں کر سکتا۔ بیٹھنے یا اٹھنے پر تے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بستر پر بیٹھتے ہی تے بند ہو جاتی ہے اسکو سمندری بیماری یا مرض البحر کہتے ہیں۔ یہ بیماری سب کو نہیں ہوتی؛ یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ جن کا مزاج عصبی بیماری کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ادبھی پہلی لہروں میں؛ ناؤ میں؛ سفر کرنے کے وقت یا کسی طرح کی گاڑی کی سواری میں اسی طرح کی تے ہوا کرتی ہے۔ عموماً اس طرح کی تے کے ساتھ سر میں چکر۔ متلی اور اُپرکائی۔

جسمانی سخت تکلیف؛ پیٹ خالی محسوس ہونا۔ درد سر وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ جن آدمیوں کا دل کمزور ہوتا ہے۔ نبض سریع رہتی ہے۔ معمولی باتوں میں کلیجہ دھڑکنے لگتا ہے۔ انھیں لوگوں کو یہ بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس بیماری سے مریض کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہے۔ لیکن عموماً یہ مہلک نہیں ہوتی۔

اس مرض کے مریض کو سفر کرتے وقت بستر پر مل کر کھنا چاہیے۔ اور جلد ہضم ہونے والی صرف پتلی غذا دینے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ زیادہ کھانے سے یہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مرض کم ہونے پر پانی، معمولی غذا کھانی جاسکتی ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

کالکوس ۱۰۔ ۳۔ بستر سے سر اٹھانے ہی متلی اور تے؛ سر میں چکر۔ پیٹ میں اینٹھن محسوس ہونے کی علامات میں پہاڑ پر چڑھنے سے تے آنا۔ انٹیم ٹارٹ ۱۰۔ ۳۔ یکایک پیٹ میں دباؤ محسوس ہونا۔ تے۔ اس کے بعد شدید حالت؛ ادنگھ اور بکثرت پسینہ آنا زبان پر سفید پل کی تہ۔ اسے پومارفس ۱۰۔ ۴۔ کان میں زرد کی آواز؛ یکایک؛

زیادہ تھمتلی؛ سر میں چکر کی وجہ سے تھمتے ہونے میں بالخصوص کارآمد ہے۔
 نکس دامیکا ۶۔ صغراہ کی زیادتی، کھٹتی تھ۔ پیٹ میں دباؤ محسوس ہونا
 کان میں گنگن آواز۔

سٹے فی سیگر یا ۶۔ ۳۔ سر میں چکر۔ تباکو؛ اور چیزوں کی زبردست خواہش
 اور ایسا محسوس ہوگا یا معدہ ٹپک پڑا ہے اور ایسا محسوس ہوگا اگر کسی چیز کو بچڑھ لیا تو گر پڑے گا۔
 تھریڈیم ۳۔ ۶۔ پانی پینے؛ سفر کرنے کے وقت پانی کی طرف دیکھنے؛
 کچھ بند کر لینے اور تھمتے کی علامت میں بالخصوص مفید و کارآمد ہے۔

سینی کیولا ۳۔ ۶۔ پانی پینے یا سفر کرنے کے وقت اور ٹھنڈا پانی
 پینے پر کم ہونا اور گرم مکان میں زیادہ ہونا۔ اسی لئے جہاز کے ڈک پر رہنے
 کی خواہش۔ اوپر کی طرف دیکھنے پر متلی کی زیادتی۔
 سرد چیز کھانے کی خواہش۔

ان کے علاوہ سلفر، سلیکا، پٹریم، ہایوسیا مس، بوڈشا، اگنے، سلیم
 می پیا۔ وغیرہ ادویات بھی علامات کے مطابق فائدہ کرتی ہیں۔
 سمندری بیماری میں گرم فلائین (فلائن)، کایک ٹکڑا پیٹ پر پیٹ رکھنے
 پڑے۔ جس سے پیٹ کے آلات میں جھٹکانہ لگے بہت آرام ملتا ہے۔

معدہ میں درد تشنج

(GASTRODYNIA OR PAIN IN THE STOMACH)

بعد غذا معدہ میں ناخن سے خراش ڈالنے کی طرح یا چپکا کر بچڑھنے
 کی طرح خواہش کرنے کی طرح درد کھانے کی چیز پیٹ میں جاتے ہی درد
 بڑھنا۔ کڑوی یا ترش ڈکار؛ تھمتے کے ساتھ غذا گرنے پر درد؛ میں کمی ہونا
 وغیرہ علامات اس مرض میں نمودار ہوتے ہیں۔

بدبھمی میں برابر علامات دکھائی دیتے ہیں۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں
 نکس دامیکا ۳۔ ۳۰ (بہت تشنجی درد) آرینیکا ۳۰ (کزاز)۔

بسمتھ ۳۰- (پیٹ میں دباؤ کے ساتھ سر میں درد) آر سے نمک ۳۰ x ۳۰-
 (کھانے پینے کے بعد درد اور تھکے) برا یو نیا ۳۰- (وجع مفاصلی مریض کے
 پیٹ میں درد) فیرم فاس ۶- (خون کی کمی) چیلی ڈو نی ایم ۲۰- یا رو بنیا
 ۳۰- کھانے پینے کے بعد درد کا بند ہو جانا) آر جنیم نائی ۶- (غذا کے
 بعد ہی درد بند ہونا) اور اس کے ساتھ ہی معدہ میں زخم ہونا) بار پیرس
 ڈر منچر ۳۰- ڈاکٹر اسکوریا ۱۰- کاربو دیج ۶- گریفائٹس ۶- ۲۰۰- کی بھی
 علامات کے مطابق کبھی کبھی ضرورت ہو سکتی ہے۔
 بہت گرم پانی میں فلائین بھگو کر اور نچوڑ کر پیٹ سینکے سے فائدہ ہوتا ہے۔
صفراوی درد

(BILIOUS HEADACHE)

بدبھنی سے درد سر ہونے کا نام صفراوی درد سر ہے۔ زبان میل۔ سانس میں
 بدبو، معدہ میں درد، متلی، پیٹ میں خرابی وغیرہ اس مرض کے مخصوص علامات ہیں۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔
 برا یو نیا ۳۰- (صفراوی تھے کے ساتھ درد سر، ٹکس ماسکٹا ۲۰-
 (درد سر اور چہرہ پر دھ) کیموٹا، ٹکس و امیکٹا، اپیکاک، پلسا ٹیلا، مرک سول
 انٹم کروڈ، وغیرہ دوائیں پیچ پیچ میں ضروری ہوتی ہیں۔
غذا کا زہر

(FOOD POISONING)

غذا کا زہر غذا کے اجزاء سے زہر پھیل جانا، بہت قسم کا ہو سکتا
 ہے۔ (زہریلے نباتات اور جانوروں کا دودھ وغیرہ کھانے کی وجہ سے یا
 تانبے یا ایلومینم کے برتن وغیرہ میں کھانا پکانا۔ اور ان برتنوں میں لپکائی
 ہوئی چیزیں کھانا وغیرہ بہت اسباب سے یہ زہر پھیل سکتا ہے) کبھی کبھی
 ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے ساتھ ہی موت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تھکے
 پٹے دست وغیرہ ہو کر موت ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ زہر آہستہ
 آہستہ پیدا ہو کر موت کا باعث ہو سکتا ہے۔

غذا کے ساتھ عموماً پوشیدہ دق، ٹائیفائیڈ، کرم وغیرہ کے جراثیم جسم میں داخل ہو کر مرض کو پھیلانے میں اکثر اوقات بڑی بڑی پار کریں۔
ہوسٹل: یعنی طلباء کے رہنے کی جگہ، اور خوشی کے جلسوں میں غذا کی چیزوں میں اس زہر کے پھیل جانے کے سبب جو کوئی کھاتا ہے وہی مر جاتا ہے۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت باورچی کی غفلت سے یا اس کو دکھائی نہ دینے کی وجہ سے زہریلی چیزیں؛ یا جاندار شے غذا کے ساتھ مل کر غذا کو زہریلا بنا دیتی ہے۔ ایسی جگہ اکثر و بیشتر بہت لوگ مر جا یا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سب آدمیوں پر یکساں اثر نہیں ہوتا۔ اسکے علاوہ اگر وہ زہر فوراً قاتل مقدار میں نہ ہوا ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے لئے جو قاتل ہے۔ اس کو دوسرا شخص آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ اس پر اس زہر کا کوئی فعل نہیں ہوتا۔

تانبے کے برتن میں کھانا پکانے یا کھٹی چیز رکھنے پر یا گرم تر چیز تانبے یا پیتل کے برتن میں رکھنے پر تانبے کا اثر؛ یا زہر اس چیز میں مل جاتا ہے اس سے تھپ، سیدہ دست، تشنج، وغیرہ تانبے کے زہر کے علامات نمودار ہوتے ہیں۔ اچھل ایلوینیم کے برتن، بازاروں میں سستی قیمت پر مل رہے ہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کون سا زہر ہے۔
اس کی سستی قیمت اور چمک دیکھ کر امیر و غریب سبھی ایلوینیم کے برتن میں کھانا بنانے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بدبھڑی، تیزابیت، صفراوی اور معدہ، اعصابی کمزوری وغیرہ مرض ہو جاتے ہیں۔ اور تصورِ خیال نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور عمر بھر تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں۔

ہندوستان میں کھانا پکانے کے کام میں مہروں کا طریقہ دنیا میں تقلید کے قابل ہے۔ باورچی خانہ کے تمام برتن وغیرہ ہر مرتبہ کھانا پکانے کے پہلے اور بعد ملے جاتے ہیں۔ اس سے صفائی تو رہتی ہی ہے

ساتھ ہی ساتھ کھانا بھی صاف پکتا ہے۔ اور مرض کے جلد اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جہاں روز برتن ملنے کی آسائی نہ ہو۔ وہاں مٹی کے نئے برتنوں کو کام میں لانا مناسب ہے۔

اکثر غذا کے زہر کی علامات وغیرہ ظاہر ہوں تو نزدیک کے کسی پیشیار (معالج) ڈاکٹر کو فوراً بلانا چاہیے۔ معالج کے آنے سے پہلے ہی مریض کو کبتر پر لٹا دینا چاہیے۔ اور رقیق چیز (مقوی مفید) کھلانا اور سوڈا وغیرہ پلانا چاہیے۔ مریض اگر قریب المرگ ہو تو جسم پر گرم سینک کرنا چاہیے۔ اور جلد یا مقعد کے راستے سے نمک ملے ہوئے پانی کی پککاری یا ڈوش اور ادویات محرکہ وغیرہ کا استعمال کرایا جاسکتا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ مہلہ میں زہریلی چیز ہے تو فوراً مقوی دوا (تقلانے والی دوا) کھلا کرتے کرانا چاہیے۔

جس زہر سے زہر کا اثر پھیل گیا ہو اس کی تریاق دوا دینا چاہیے کارلو وج: یا کروجن: کاربو انیلکس: نکس و امیکا۔ ایلومنا۔ وغیرہ ہو موبیٹھک دوائیں علاج کے مطابق استعمال کرانے پر خاص فائدہ کی صورت دکھائی دیتی ہے۔

(ENTERITIS)

ورم آنت

معدہ کے نیچے آنت یا نلی ہی (تصویر نمبر ۲) ملاحظہ ہو۔) آنتوں کے دو حصہ ہیں (۱) چھوٹی آنت (SMALL INTESTINE) تقریباً ۱۴ فٹ لمبی۔ (۲) بڑی آنت (LARGE INTESTINE) تقریباً ۵ فٹ لمبی) چھوٹی آنت کی بہ نسبت زیادہ موٹی اور چھوٹی آنت کو گھیرے ہوئے ہے (مفصل حالت کے لئے ہماری کتاب موسومہ نروید پر تجھے دیکھنا چاہئے) بڑی اور چھوٹی دونوں ہی آنتوں میں ورم آسکتا ہے۔

چھوٹی آنت کا ورم

(INFLAMMATION OF THE SMALL INTESTINES)

چھوٹی آنت متورم ہونے پر شروع میں لرزہ کے ساتھ بخار۔ پیٹ میں
 رخا صکرناف کے چاروں طرف لگاتار تیز درد اور دباو سے اس درد کا
 بڑھنا۔ آہستہ آہستہ درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مریض بل نہیں سکتا۔
 اور دردی وجہ سے مریض چیت لیٹ کر گھٹنے سمیٹ کر اپنے پیٹ پر رکھنے
 کی کوشش کرتا ہے۔ کھانے سے نفرت، قبض، متلی، نفخ، شکم، پیٹ میں
 قراقرز، کبھی کبھی تپہ دست، وغیرہ علامات میں دکھائی دیتے ہیں۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

بخار اور درم کم کرنے کے لئے ایکون ۳-۴۔ بخار، درم، سردی، چہرہ، صرخ
 درد سر اور پتلا دست۔ کے علامات میں بیلادونا۔ ۳۔ ناف کے چاروں
 طرف جلن کی طرح درد۔ بہت کمزور رہی اور سستی۔ کھانے پینے کے بعد
 تھ دست، پانی کی طرح یا خون آلودہ لگاتار تیز پیاساں۔ لیکن تھوڑا
 پانی پینے سے ہی تھوڑی دیر کے لئے آلودہ ہونا۔ آرسنک ۳-۴۔ بہت
 زور کرنے پر خون اور آنوں ملا دست میں مرکب کار چھوٹی آنت میں
 درد کے ساتھ بخار۔ اجابت کی حاجت۔ زیادہ نفخ
 شکم، ناف کے چاروں طرف سکڑنے کی طرح درد۔ کل پیٹ میں
 درد۔ متلی، گالوسٹھ ۴۔

چھوٹی آنت میں یکساں درد کے ساتھ (یا مختلف اطباء اور مختلف
 دستوں کے ساتھ) اسہال، صبح مرض کی زیادتی تمام جسم درد، نفخ، شکم
 میں پوڈونا، لم ۴۔ اجابت کی حاجت۔ اجابت ہونے کے بعد درد
 کم ہونا۔ پیٹ میں ریاح اکٹھا ہونا۔ اور اجابت میں رنگ دوسری
 قسم کا۔ موسم گرما کے اسہال میں پلس ۳۔ اسہال کے ساتھ تھ
 یا متلی، اپیکاک ۳-۴ پلس پہلے یا بعد استعمال کرنا چاہیے۔

بار بار دست ہونا۔ پیٹ میں درد، سردی محسوس ہونا۔ سر میں پسینہ
 وراثم الب ۶۔ پتلا دست، آنوں آلودہ، اور بہت ٹھنڈک۔
 کلیر یا کارب ۶ (صکریوں کی بیماری میں) تیز درد۔

پائیر وین ۳۰۔ کی آزمائش کرنی چاہیے۔ میگنیشیا فاس $\times 2$ سفوف۔
گرم پانی کے ساتھ (دینے پر کم ہو سکتا ہے) اسہال اور معدہ کے درد کی
دوائیں دیکھئے۔

سٹری یا ذہریلی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے پیدا ہوئے علامات میں اس مرض
کے ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے فرق معلوم کرنے کیلئے ہماری کتاب موریہ ہیضہ اور طاعون ملاحظہ ہو۔
عام اصول: گرم پانی سے سینکنا۔ مرض کے جلے کے وقت ساگو۔ بارلی۔
اور آرا روٹ وغیرہ ہلکی چیسریں دینی چاہیے۔

بڑی آنت کا ورم (MUCOUS COLITIS)

بڑی آنت کا درد زیادہ عرصہ تک رہنے پر آئوں یا بلغم نکلتا ہے
یہ مرض آسانی سے اچھا نہیں ہوتا۔ مائی ڈرائسٹس $\times 1$ ۔ (معدہ میں
درد، یا تشنج، پیٹ میں خالی محسوس ہونا۔ ذائقہ کڑوا۔ مرک: آرس۔
کوہلی وغیرہ اس کی عمدہ اور بہترین دوائیں ہیں۔
بڑی آنت کے متورم اور زخمی ہونے کا نام پیمپس ہے۔ پیمپس
کا بیان ملاحظہ ہو۔)

ورم باریطون: دیوار ہائے شکم کو، ستر کرنیوالی اور

اغشاء شکم کو ملفوف کرنے والی باریک جھلی کا ورم

(PERITONEUM)

پیٹ کا نچلا اور آنت کا اندرونی حصہ جس جھلی سے ڈھکے ہوئے ہیں۔
اس جھلی کو باریطون (PERITONEUM) کہتے ہیں۔ اس جھلی کے ورم
کو ورم باریطون کہتے ہیں۔ بچوں کے ناف کے ورم ہونے پر، ورم باریطون،
ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سردی لگنا ستر (SURGICAL OPERATION)
چھوٹ لگنا۔ خون کے زہر کا فعل (PYAEMIA SEPTICAEMIA) معدہ
کی آنتوں کا سوراخ سے جاڑا لگ کر (PERFORATION) بخار ہونا۔ پیٹ

بھولنا۔ تے یا بھکی پیٹ میں اجتماع ریاہ کی وجہ سے ڈکار آتا۔ قبضہ
یا ٹھانہ پیشاب بند ہونا۔ مرلین کا چپ ہو کر سونا۔ نبض صغیر سرخ کی طرح
ہونا وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں

ایکونائٹ ۳۳-x (مرض کے شروع میں بہت فائدہ کرتا ہے) بیلادونا
۳۳-x تیز بخار، نبض پُر۔ سر یا سینہ میں اجتماع خون، نفخ، شکم اور رقاقر
بولنا۔ پیشاب بند، صفراوی تے کرنا وغیرہ علامات میں مفید ہے۔

درجہ انتہائے مرض کی حالت میں کاربووج ۳۰۔ پیٹ کی خرابی کے
ساتھ ہی مشانہ میں زور کرنے پر کیتھرس ۳۔ گہری سستی متواتر تے پیٹ میں جلن۔

قولنج درد۔ ٹونٹ الیسنہ وغیرہ علامات میں آرسنک ۳۔ مرک ۶۱-x
مرک کار ۶۔ کوچی ۶۔ اوپیم ۶۔ ہلکس و امیکا ۳۔ کالوسنتھ ۶۔ سلفر ۳۰۔
لائیکو ۳۳-x سفوف۔ پیٹ میں اجتماع ریاہ۔ برابو نیا ۳۔ وراٹرم البم ۶۔
یاٹری بنتھنا ۶۔ وغیرہ ادویات بھی بیج بیج میں ضروری ہو سکتی ہیں۔
زیادہ نفخ شکم ہونے پر گرم پانی سے سنیکٹا یا السی کی پلٹس کے ساتھ
چار پانچ قطرے روغن تارین۔ پیٹ پر لگانے سے اچھا نتیجہ ملے گا۔
ہے شدید حالت میں ہلکے غذا دینی چاہیے۔

مرض کے مزمن حالت میں مرکوریس ڈل سس ۳۳-x۔ سفوف۔ یلائیکو ۶-x۔
سفوف استعمال کرنا چاہیے۔ اسہال رہنے پر اسہال کی دوائی ملاحظہ
ہوں۔ مرض ادق میں آرس ۳۳-x۔ سلفر ۳۰۔ کلیر یا کارب ۶-x۔
ماؤف جگہ پر اکوڈیم ۱۰۔ لگانا چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر فشر بھی لگوا جاسکتا ہے۔
درد قولنج (COLIC)

درد قولنج بہت قسم کا ہوتا ہے۔ ان میں بڑی آمت کے عضد سکڑنے سے
جو درد ہوتا ہے۔ اس کو قولنجی معدہ یا آنتوں کا قولنج کہتے ہیں۔

درد قولنج میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں اکثر بخار نہیں رہتا۔ درد
اور تے (مثل اور ہنے) پر اسکو صفراوی قولنج کہتے ہیں۔ نفخ شکم، اور درد
رہنے پر اسکو ریاحی قولنج کہتے ہیں۔ پیٹ رفاص کرانف کے اجاروں

طرف میں اینٹھنے یا کھینچنے کی طرح درد، دبانے سے درد میں کمی ہونا قبض
 بار بار، جو بٹ کر حاجت، مگر حاجت صاف نہ ہو۔ ریاخ خارج ہونا۔
 ابکائی یا تھکے، پرٹ میں سختی اور ڈکار آنا وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔
 ثقیل یا ارضیا پر محرکہ کھانا، شبینم یا سردی لگنا۔ برف وغیرہ سرد چیزوں کا بزدلی
 استعمال، پسینہ نہ لگنا، گرم قبض وغیرہ اسباب سے یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔
 (قولنج کلوی۔ قولنج سیسہ، قولنج صفراوی، پیمش، قولنج حیض وغیرہ کا
 مفصل حال اس کتاب کے مناسب موقع پر ملاحظہ ہو۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

کالوسنتھ ۶-۳۰ ناف کے چاروں طرف ناقابل برداشت کھینچنے یا کترنے
 یا اینٹھنے کی طرح درد۔ زیادہ درد کی وجہ سے مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ اور
 آگے کی طرف دوہرا ہو کر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور ہاتھ سے ناف دبانے کیلئے
 کوشاں رہتا ہے۔ دبانے سے درد تھوڑی دیر کے لئے کم ہو جانا اور ضرب دینے
 پر پہلے کی طرح درد ہونا۔ کبھی کبھی پیٹ پھولنا۔ چہرہ سیاہ، بہت نفخ شکم،
 ڈکار آنا۔ ریاخ خارج ہونا۔ اور قبض رہنے پر۔ اس کے ساتھ
 لائیکوپوڈیم ۳۰۔ (یکے بعد دیگرے) کے استعمال کرنے کا کوئی کوئی مشورہ
 دیتے ہیں، بکس و امیکا ۶-۳۰، نفخ شکم کے ساتھ تیز تشنج، اور اسی
 وجہ سے قولنج، ساتھ ہی گردہ میں کترنے کی طرح درد، اور قبض۔
 کمیونٹا ۱۲-۱۱ ناف کے چاروں طرف کھینچنے، یا سکڑنے کی طرح درد،
 فیض یا پتلا دست، پیٹ پھولنا۔ رات میں اور گرمی میں درد کی زیادتی۔
 آرس وارس ۳۰۔ بہت زیادہ نفخ شکم۔ پیٹ کے بالائی حصہ، بلبل
 صفراوی تھے، زیادہ اینٹھنے۔ مذکورہ بلاتینوں ادویات سے اگر نائدہ نہ
 ہو تو اس کے استعمال سے اکثر فائدہ ہوتا۔

میگنٹیا فاس ۳۳- سفوف، گرم پانی کے ساتھ کھانا، اگر کمیونٹا سے
 فائدہ نہ ہو۔ ڈائیس کوریا ۱۰- اول ناف کے درمیان دردمشروع ہو کر آہستہ
 آہستہ تمام پیٹ میں، ابدہ تمام جسم میں یہاں تک کہ انگلی تک

میں پھیل جاتا ہے۔ اس درد کے ساتھ نفخ شکم ہونا۔ زبان پر میل جمع ہونے میں درد کی زیادتی پسیدھے کھڑے رہنے پر، اور پیچھے کی طرف ٹیڑھے ہونے پر درد میں کمی۔ غذا تے کرنے کے بعد یکایک تو بخمی درد اور حالت خل میں صفراوی قویٰ بن جاتے ہیں۔

ور اٹرم البم ۶۔ شب میں اور بعد غذا نفخ شکم پیٹ میں گڑا گڑا نا۔ تمام پیڑوں میں درد منہ میں پانی بھرا نا۔ منہ اور ہاتھ پیر ٹھنڈے۔ تشنج ۱۔ اویم ۶۔ ایکونائٹ ۱۰ پلسیم ۶۔ (مخت قبض میں) بار بیرس والگیرس ۱۰۔ ۶۔ کبھی کبھی استعمال میں آتا ہے۔ عورتوں کو حالت حمل میں نفخ شکم کے ساتھ درد قویٰ بنج میں کاکوس ۶۔ ثقیل چیزوں کے کھانے کے بعد درد۔ قویٰ بنج میں پلس ۶۔ یا کالوسنتھ ۶۔ اس کے ساتھ قبض ۱۔ اور نفخ شکم میں پلساٹیل ۶۔ یا لاسیکوپوڈیم ۳۰۔ ہیٹریا کی وجہ سے قویٰ بنج میں اگنیشیا ۶۔ کرم سے پیدا ہوئے قویٰ بنج میں (کرم کا بیان ملاحظہ ہو)۔

غذا اور پرہیز

ہلکی غذا۔ (جیسے ساگو، باری، گرم دودھ، عرض دب جانے میں پرانے چاول کا بھات، جھوٹی پھل کا شوربہ، پروں، موچا، اولی، پیٹ گرم کپڑے سے ڈھکا رکھنا۔ اور دونوں پروں کو سردی سے بچانا ضروری ہے۔

ضرورت پڑنے پر گرم پانی کی بچکاری سے پاخانہ ہو جاتا ہے

(LEAD COLIC)

قویٰ بنج

کسی طرح سیمہ جسم میں داخل ہونے سے آنتوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ اسی کا نام قویٰ بنج سیمہ ہے جو سیمہ کا کام کرتے ہیں۔ یا بہت عرصہ تک سیمہ کے برتن میں کھاتے پیتے ہیں یا چھاپہ خانہ میں کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے دانت کی جڑ سیٹ کے رنگ جیسی ہو جاتی ہے۔ قبض، قے، اور پیٹ میں تیز درد۔ وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ (یہ دیا رنگ) کے برتن میں سوئیچنی، ناسر، یا شراب رکھ کر اسکو استعمال کرنا۔ سیمہ کی پینل سیمہ کی کنگھی، یا پانی کا نل سیمہ کا بنا ہوا وغیرہ کے استعمال سے

میں کچھ نہ کچھ قویخ سیدہ ہو کر رہتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید و کار آمد ہیں۔

ایم ۱۱۔ ہر پندرہ منٹ کے وقفہ سے دینے سے درد رفع ہو جاتا ہے۔
اس سے فائدہ نہ ہو تو ایلیوم ۳۰، ۳۰ ہر گھنٹہ دینا چاہیے۔ اگر اس سے بھی
فائدہ نہ ہو تو پلاٹینا ۶، سیلاڈوٹا ۱۱-۱۲، پوڈوفالٹیم ۳۰ اور ایسڈ سلف ۶، پنج پنج
میں دیا جاسکتا ہے۔ زیادہ دودھ پینا اور گرم پانی کی چھکاری لینا مفید ہے۔

حفظ المقدم

کلکتہ یا کسی دوسرے بڑے شہروں میں جہاں کل دشین اکا پانی روزانہ
استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خاندان میں کسی کو کمی خون، درد عصبی، ہاتھ
میں کمزوری، یا مسوڑھے میں نیلگوں لکیریں وغیرہ علامات محسوس ہونے
پر سمجھنا چاہیے کہ سیدہ کے غلط استعمال (یعنی پانی کی دشین کے خرابی
سے) یہ مرض ہوا ہے۔ ایسے موقع پر مکان کے دوسرے لوگوں کو اس سے علیحدہ
رکھنے کا پورا پورا بندوبست کرنا چاہیے۔

صفراوی پتھری یا پت پتھری

(GALLSTONE OR BILIARY CALCULUS)

پتہ یا صفرا کی پتھری (GALL BLADDER) یا صفرا کی نالی

(BILIARY DUCTS) کھانے پینے کی خرابی سے پیدا ہو کر پتھر کے ذرات
(GRAVEL OR STONE) کی شکل میں تبدیل ہو جاتے تو اس کو صفرا کی
پتھری کہتے ہیں۔ بالو کے ذرات (GRAVEL) کبوتر کے انڈے
یا مٹر برابر جھوٹا بڑا، منجھولا، گول، سادہ، کالا، خاکی یا سبز، ایک یا
زیادہ پتھری کے مریض میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دس فی صدی آدمیوں کو یہ

ایلیومنا انہیں ہے۔ کئی بنگلہ کے علاج کی کتابوں میں ایلیومنا
لکھا ہے۔ شاید یہ جھاپہ کی غلطی ہے۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ ایلیومنا اور ایلیوم
ایک دوا ہے۔ بلکہ علیحدہ علیحدہ دوائیں ہیں۔

بیماری ہوتی ہے۔ اور ان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ پیٹ میں تھوڑا بہت درد ہونا۔ اس مرض کی خاص علامت ہے۔ اس کے علاوہ بہت لوگوں کو زندگی بھر پتھری رہنے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی۔

پتھری جب تک پتہ میں رہی رہتی ہے۔ اس وقت تک مرض کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کبھی کبھی پیٹ میں درد معلوم ہوتا ہے لیکن جب یہ پتھری پتہ سے نکل کر صفرا کی نالی میں آجاتی ہے تو آہستہ آہستہ یا زور سے پیٹ میں ایک قسم کا ناقابل برداشت درد پیدا ہو کر بالکل ہی پریشان کر دیتا ہے۔ اس خوفناک درد کا نام صفراوی قولنج (BILIARY COLIC) ہے۔ یہ قولنج کا درد دائیں جانب سے شروع ہو کر چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ (خاص کر دائیں کندھے۔ اور پیٹھ تک) اور درد کے ساتھ اکثر تھکے۔ سر دھیسے۔ نبض کمزور۔ ضعف شدید (COLLAPSE) سانس کی تکلیف، غشی، وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ درد کئی گھنٹہ سے کئی ہفتہ تک ٹھہر سکتا ہے۔ اور پھر دفعتاً ہو جاتا ہے۔ یعنی پتھری بارہ انگشتہ آنت کے اندر (DUODENUM) آجانے پر جلد تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت براہ کو ڈھونڈنے سے پتھر کے ذرات اٹھ لگنے سے سمجھا جائیے کہ پتھری نکل گئی ہے۔

فرق درمیان صفرا کی پتھری کا قولنج اور گردہ کی پتھری کا قولنج صفرا کی پتھری کے قولنج میں تے نہیں ہوتا۔ لیکن سنگ گردہ کے قولنج میں پیشاب کی نالی سے خصیہ تک یہ درد پھیل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بار بار پیشاب کرنے کی حاجت۔ پیشاب کے ساتھ خون اور پتھری موجود رہتی ہے۔ صفراوی پتھری میں قولنج کا درد پیدا ہونے ہی ماؤف جگہ پر خوب سینک دینے سے اور گرم روغن زیتون (OLIVE OIL) استعمال کرنے سے درد بند ہو جاتا ہے۔

اس مرض کا علاج مندرجہ ذیل طور پر ہونا چاہیے۔

۱۱) فولنجی درد جلد رفع ہو (۲) براہ کے ساتھ پتھری جسم سے باہر

نکل جائے اور پتہ میں پتھری پھرنے بننے پاوے۔ ان دونوں باتوں پر غور کر کے دوا اور غذا کا بندوبست کرنا چاہیے۔

دوران درد تو بخ میں :- صفرا کی پتھری کے علاج میں مشہور سینڈس اور انگلینڈ کے قابل ڈاکٹر ہوج صفرا کی پتھری کی تکلیف رفع کرنے کے لئے کلکیر یا کارب دیسکر بھی ناکامیاب نہیں ہوئے۔ کلکیر یا کارب ۳۰۔۲۰۰۔۲۔ صفرا سے پیدا ہوئے درد تو بخ میں دفع کرنے کی بہت اچھی دوا ہے۔ ہر بندہ منٹ پر دوا دینی چاہیے۔ تین گھنٹہ استعمال کرنے کے بعد اگر درد بند نہ ہو تو بارہ بیرس ۱۰۰ بیتس کے وقفہ سے دینا چاہیے۔

کارڈس میریٹس ۱۰۰۔ (۵۔۱۰ قطرے ۳ گھنٹہ کے وقفہ سے روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ جگر میں خاصکر اس کی بائیں فیصد۔) (ٹیکہ ۱ یا تو پتھر ۱) (LEFT LOBE) میں درد رہنے پر آرینیکا ۳۰۔ دینا چاہیے۔

شدید حالت میں علامات کچھ کم ہو جائیں اور تشخ موجود ہو تو چاہنا ۱۰۔ رغن کی شدت کے وقت تو بخ میں درد کا پیدا ہونا۔ کیونکہ متحصیس ۱۰۔ ہائیڈرائٹس ۱۰۔ (دنی خوراک ایک قطرہ سے ۱۰ قطرہ تک) ڈائیکوریا ۱۰۔ چلی ڈونیم ۲۰۔ جلسی میم ۱۰۔ ہیلاڈونا ۳۰۔ اور آرسنک ۳۰۔ ۳۰۔ وغیرہ ادویات بند ہونے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

میگنیٹیا فاس ۳۰۔ (دگرم پانی میں اندرونی اور بیرونی استعمال کرنا چاہیے۔ اس طریقہ علاج سے سینڈس ملس وغیرہ ڈاکٹروں نے اندر حال کی طرح فائدہ پایا ہے۔ اور اس کی بڑی تعریف کی ہے۔

امریکہ کے سویاں نے صفراوی پتھری کے تو بخ میں کولسٹرینیم ۲۰۔ کا استعمال کر کے جو تعجب خیز نمرہ پایا ہے۔ اسکو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے ہیں۔ اور تعجب کا اظہار کر چکے ہیں۔

(ملاحظہ ہوا مین کے نو سوڈرائڈ لیشن ۱۰۹۱ء)

اگر طاقت نہ ملے تو نیچے کی طاقت کی دوا دی جاسکتی ہے۔
 انگلینڈ کے مشہور ڈاکٹر بارنٹ نے مرعہ صفراوی پتھری کے مختلف
 حالتوں میں ۳x۳ سفوف استعمال کرا کر بہت مریضوں کو صومو پتھک ساجوں
 نے صفا بخشی ہے۔ ایکونائٹ، مرک سول، چائنا۔ (ملیر یا بخار کے ساتھ)
 نکس و امیکا۔ فاسفورس، وغیرہ دوائیں موقع پر کام دیتی ہیں۔

علاج معاون:- بلکی زرد و ہضم چیزیں کھانا۔ پاؤروٹی (نان پاؤ)
 آگ میں سینک کر خوب گرم پانی میں ڈال کر شکر کے ساتھ کھلانا چاہیے
 بھونا ہوا سیب (ROASTED) ٹھنڈا پانی پینا۔ جتنی خواہش روز
 کھلی ہو میں ٹھنڈا۔ (خاص کر گھوٹ پر) وغیرہ فائدہ کرتا ہے۔ درد سے
 بہت کمزور ہو جانے پر مریض کو خوب گرم پانی پلانا۔ گرم پانی کے ٹپ میں
 بیٹھنا۔ اور مقعد میں آلہ کے ذریعہ بوند بوند گرم پانی کی دھار

(RECTAL IRRIGATION) برابر پیو جانا چاہیے۔ اور دائیں پہلو میں گرم
 پلٹس لگانا وغیرہ ترکیبوں سے بہت درد کم ہو جاتا ہے۔

ایسی ترکیبوں سے درد فوراً اچھی طرح آرام ہو جانے پر اور پتھری پوری
 طرح نکل جانے پر ایسی ترکیب کرنا چاہیے جس سے پتھری پیدا نہ ہو۔
 حسب ذیل باتوں پر عمل کرنے سے پھر پتھری نہیں ہوتی۔
 دوبارہ حملہ روکنے کے لئے

چائنا۔ بہت اچھی دوا ہے۔ مندرجہ ذیل طریقہ سے مشہور و معروف ڈاکٹر
 تھیر نے بیس برس سے زیادہ زمانہ میں جتنے مریضوں کا علاج کیا۔ سبھی
 شفا یاب ہوئے۔ چائنا x۶ چھ گولیوں کی خوراک (۶ گولیاں) دوا دینی چاہیے۔

جب تک دس خوراک نہ ختم ہوں اسکے بعد علی الترتیب تین روز کا نافذ دیکر
 اور چار روز، اور پانچ روز کا وقفہ دیکر دوا دینا چاہیے۔ یہ عمل اس وقت
 تک جاری رہنا چاہیے جب تک ایک کا وقفہ دیکر ایک خوراک نہ ہو
 جائے۔ بہت سے مشہور ڈاکٹروں نے دیکھا ہے کہ مندرجہ بالا
 طریقہ پر عمل کرنے سے اول پتھری جلد نکل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد

پتہ میں پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ (یعنی مرض جرطہ سے جاتا رہتا ہے) ڈاکٹر ایبٹس، چیلی ڈونیم، اور ڈاکٹر بیرجس کی کارڈ آف میڈیسن کام میں لانا بتاتے ہیں اس سے بھی مریض کو دوبارہ پتھری نہیں ہوتی۔

غذا اور پیرہیز: وقت سے کھانا پینا۔ بول و براز کرنا۔ اور نہانا۔ دھونا۔ مقررہ مناسب جسمانی اکثریت؛ ہوا خوری اور کھاری پانی۔ (AIRLINE WATER) بہت زیادہ پینا وغیرہ، اصول صحت پر عمل کرنا۔ اور مناسب طریقہ سے ہو میو پیٹھک دوا میں استعمال کرنے سے مرض جلد ہی جرطہ سے آرام ہو جاتا ہے۔ غذا جن میں شکر (SUGAR) چربی (FAT) یا نشاستہ (STARCH) اور چونا (LIME) کے اجزاء ہوں۔ حتیٰ امکان نہ کھانا چاہیے۔ اور گوشت والی چیزیں؛ مچھلی سوڈا بائی کا (BICARBONATE OF SODA) مریض ان کو نقصان کرتا ہے۔ گرم چشمہ کا پانی استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

یہ بتانا بیکار ہے کہ مرض تک درد قویٰ سے تکلیف ہونے پر اگر مریض کے صفرا کی تھیلی رپت میں مواد بڑ جائے۔ پھوڑا (ABSCCESS) سرطان (CANCER) وغیرہ خوفناک علامات نمودار ہوں تو ہوشیار ڈاکٹروں سے فوراً مشورہ لگوا دینا چاہیے۔

(سنگ گردہ کا بیان ملاحظہ ہو۔)

قبض (CONSTIPATION)

قبض بہت وجوہات سے ہو سکتا۔ یہ اکثر امراض کی علامت بھی ہے۔ کسی قسم کی جسمانی محنت نہ کر کے گھر میں بیٹھے رہنا، شب بیداری۔ تیز کافی یا چائے۔ اور دوسری نشیلی چیزیں کھانا۔ رنج و تکلیف۔ یا خوف ہونا اگر بڑا نا۔ مرض جبکہ بڑھا پا۔ غیر مفید چیزیں کھانا وغیرہ بہت سے اسباب کی وجہ سے قبض ہوتا ہے۔ قبض ہونے پر جا ہوا براز آنتوں میں سٹرا کرتا ہے۔ اور اس سٹرا ہوئے براز کا بہت ہی خفیف حلقہ، خون، گوشت میں ملی کر فضلہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اس طرح جسم کو بہت

نقصان پہنچاتا ہے۔ غذا کے جو سرے جس طرح خون اور عضلہ بنتا ہے۔
اسی طرح سرے فضلہ سے بھی خون عضلہ مضبوط ہوتا ہے۔

قبض ہونے میں اکثر درد سر، بخار، کھانے سے نفرت، طبیعت پر مردہ
وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت عرصہ تک قبض رہنے پر لو اسیر
وجع مفاصل، وغیرہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ثابت ہوئی ہیں۔

ڈاکٹر سینڈس مس کی رائے کے مطابق برا یونیا۔ گریفائٹس۔ اوپیم۔
اور نکس و امیکا کی اچھی دوائیں ہیں۔

ہم لوگ بھی ان کی اس رائے کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔

گریفائٹس ۶۔ (دو مرتبہ روزانہ کئی ماہ تک استعمال کرنا چاہیے)۔
براز سخت اور ٹکٹے میں تکلیف۔ پلمبم ۶۔ قبض کے ساتھ قولنجی درد۔ نیٹرم میور
۱۲x۔ سفوف ۲۰۰۔ اسکی عمدہ دوا ہے۔

متواتر اجابت کی حاجت۔ لیکن پیٹ صاف نہ ہونا۔ بڑا لینڈ سخت تکلیف
سے نکلنا۔ عموماً پتلا پاخانہ سر بھاری۔ پیڑ و میں دباؤ۔ اور غلہ سے نفرت
علامات میں نکس و امیکا ۳۰۔ (جن کو زیادہ بڑھنا پڑتا ہے) جو سست
رہتے ہیں۔ جو گھروں میں کالہوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ جو بھڑکی بات
میں تنک جاتے ہیں۔ اور جن کو قبض اور پیٹ کی خرابی رہتی ہے۔ ان کیلئے
نکس و امیکا مفید ہے۔ ستر ستر اہٹ تحسوس ہو۔ سرد درد۔ در دجگر
خشک کرٹوا اور بڑا لینڈ۔ وجع مفاصل سے قبض، حالت حل میں، اور

موسم گرما میں قبض، اور بچوں کے قبض میں برا یونیا ۶۔ ۳۰۔ نکس و امیکا
اور برا یونیا کے علامات میں فرق یہ ہے کہ برابر پاخانہ کی حاجت کیساتھ
قبض میں نکس و امیکا۔ اور قبض بغیر حاجت کے ہو تو برا یونیا فائدہ کرتا
ہے (سر بھاری، چکر۔ کچھ عرصہ تک متواتر پیٹ صاف نہ رہنا۔
سخت لینڈ، معمولی غفلت، چہرہ سرخ، پیشاب وزن میں
تھوڑا۔ اوپیم ۳۰۔ (لوڑھے، امن پسند دعوئی قزاق والوں کو، اوپیم ۳۰۔

زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ قبض یا بڑی تکلیف سے خشک پاخانہ ہو،
نفخ شکم ہو، پیٹ میں آواز ہو، غذا کے بعد ہی پیڑوں میں نفخ، پیٹ میں
گرمی محسوس ہو، مسجھ میں پانی بھرتا ہو، ڈکار آتی ہو تو لائیکوپوڈیم۔ ۳۔

بہت سخت قبض۔ بہت دنوں تک اجابت کی حاجت نہ ہو تو آلہبو من۔ ۳۔
پاخانہ نمی حاجت۔ لیکن پاخانہ کی کوشش کرتے ہی وہ بند ہو جائے تو

ان کارڈیم ۳۔ ۶۔ لمبا اور خوب پتلا لینیڈ نکلنے پر فاسفورس ۳۔ ۱۔ ۳۔
تیز خشک کھانسی کے ساتھ قبض میں مائٹریک ایڈ۔ ۳۔ قبض کے ساتھ بواسیر
میں اکالمن سو نیا۔ ۳۔ ریچی درد سر یا گھومنے کی وجہ سے قبض ہونے پر ملٹین پاخانہ
لیکن مشکل سے نکلتا ہے۔ پلٹیا۔ ۴۔ ۳۔ یورٹوں کو بہت دنوں تک قبض ہو، تو

ٹوبیکم۔ ۳۔ (سرروز ایک مرتبہ) مبرز میں درد، رحم کی خرابی یا حاملہ عورتوں کو
قبض ہو تو سیپا۔ ۳۔ حیض والی عورتوں کے قبض میں پاخانہ تھوڑا نکل کر پھر

مبرز (RECTUM) میں چلا جاتا ہو تو سلکا۔ ۳۔ پیڑ و اور مبرز میں بوجھ
اور گرمی محسوس ہونا۔ مبرز میں کٹ کٹ کرنا۔ اور جلن پاخانہ ہونے کے کچھ

دیر بعد مبرز میں تکلیف محسوس ہونا۔ مبرز قبض میں بار بار پاخانہ کی حاجت
لیکن صاف نہ ہونا۔ بواسیر ہو، سلف۔ ۳۔ ۲۰۰۔ بار بار دست آور

دوائیں کھانے سے قبض ہو، تو ہائیڈراسس ۳ (خاص کر ضعف معدہ
والوں کے لئے) سلکا مار فیا۔ (یعنی سمندر کنارے کے بالوں کے ذرات) ۳ x ۲۔

سفوف عرصہ تک استعمال کرنے سے قبض ہو جاتا ہے۔
بارہ بایو کیمک دوائیں بھی علامات کے مطابق فائدہ کرتی ہیں

سلف۔ ۳۔ ایڈنائیٹریک ۳۔ ۴۔ نیٹرم میو۔ ۳۔ پوڈوفالٹیم، سسی پیا،
ورے ایل، کاربووج، ہائیڈراسس، (مچولی قبض میں) ایلوز، بواسیر کے

ساتھ قبض میں، ایلیم، خشک سخت پاخانہ میں لائیکوپوڈیم، نفخ شکم کے ساتھ
میں، ابراہیم نیا۔ (درد سر کے ساتھ) انہ بالکل نہ ہونا، نکس و امیکا۔

اجابت کی حاجت ہونے پر بھی بالکل ہی پاخانہ ہونا۔ پلیم۔ (قبض کے
ساتھ پیٹ میں قولنجی درد)۔ اوپیم۔ (قبض کے ساتھ اونگھ)۔

علاج معاون

قبض ہونے پر بار بار جلاب لینا اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے عادت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر جلاب کے پاخانہ نہیں ہوتا۔ ہومیو پیتھک دوا کھانے سے اگر پاخانہ نہ ہو تو ۱۲۔ آؤنس گرم پانی میں ایک ڈرام گلیسرین ملا کر مہرز کے اندر بچکاری دینے سے گرہ گرہ براز نکل جاتا ہے۔ چار پالی سے اٹھتے ہی روزانہ ٹھنڈا پانی پینا۔ اور روز ٹھنڈے پانی سے نہانا مفید ہے۔ وقت مقررہ پر کھانا۔ پاخانہ جانبدن میں زیادہ ٹھنڈا پانی پینا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرنا اچھا ہے۔ انکوری منقہ سبب کشش کاغذی میون؛ کیلا پختہ؛ پیتا سیل۔ چکل کا لٹھ سے پیسا اٹھا شہید دودھ؛ مکھن۔ کلائیون۔ گورخام؛ اور زمین قند (سورن) فائدہ مند ہے۔

وقت مقررہ پر کھانا؛ سونا۔ اور کسرت کرنا فائدہ کرتا ہے۔ ٹرٹرا۔ اسٹیفول ہینگ؛ ناریل کا پانی۔ سوڈا اور وٹیرہ روزانہ استعمال کرنے سے کبھی کبھی فائدہ کرتا ہے۔ اولیو آیل (روغن زیتون) صحت بخش غذا اور قبض کشا ہے۔ اس کے استعمال سے جو نقصان ہو جاتا ہے اس سے وہ نہیں ہوتا۔ جلاب کے بعد قبض تیز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بیرنگ نے کہا ہے کہ قبض والے مریض زیادہ عرصہ تک جیتے ہیں اگر وہ دست آور دوا کھا کر جان ب دیں خشک گوئی، یا جلاب میں تری نہیں ہے۔ اسلئے زبردستی پاخانہ لانے سے مریض کے جسم سے تری نکل جاتی ہے۔ بار بار بہت عرصہ تک اس طرح جلاب دینے سے قبض براہد کر اچھی طرح مریض کے جسم میں جم جاتا ہے (امراض بدبھنی ملاحظہ ہو۔)

التهاب زائده۔ ورم زائد

(APPENDICITIS)

معدہ کی زائد دوسری بند رہتی ہے۔ یعنی ایک طرف کی تلی

لہ ہمارے ناظرین جو بغیر جلاب کے نہ رہ سکتے ہوں۔ ان کو بہت ضرورت ہے کہ یہ دیکھ لیں۔ بلا ضرر جلاب لینا چاہیے (بقیہ ۵۵۱ پر ملاحظہ ہو۔)

سے کھانے کی چیزیں اس میں داخل ہو کر نکل نہیں سکتی کیونکہ بھلنے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے) اسلئے زائد میں کسی چیز کے داخل ہونے سے ایک قسم کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسی ورم کا نام (APPENDICITIS) ورم زائدہ ہے۔ ورم ہونے پر مریض درد سے گھبرا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس تکلیف سے موت ہو سکتی ہے۔ اسلئے نشتر لگانے والے ڈاکٹر ورم کے وقت اس میں نشتر لگاتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔

ڈاکٹر تو یاک کی ہی رائے ہے بیسیٹی کی بیسیویں صدی کے شروع میں اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ لیکن درحقیقت اتنے عرصہ تک یہ مرض ٹفلانیز یا پیری ٹفلانیز کہلاتا تھا۔ غذا آسانی سے ہضم نہ ہونے پر، خاص کر وجع مفاصل یا نقرس والے مریضوں کو) اکثر یہ بیماری ہو ا کرتی ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب درد (اکثر مریض کو کئی ہفتہ تک یہ درد محسوس نہیں ہوتا) اس کے بعد اس درد کا آہستہ آہستہ بڑھنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بخار اور معدے کے فعل کی خرابی سے تکلیف اس مرض میں شروع کی علامت ہے۔ اس حالت میں اگر ورم اچھا نہیں ہوا ہو تو جسم کے دوسرے حصے بھی مایوس ہو کر مریض کے موت کے باعث ہوتے ہیں۔ اس مرض کا نام سننے ہی لوگ، نا اُمید

(بقیہ صفحہ ۵۵۱) زنگی ہڑ بھری بسنا۔ سولف اور کشش دہرا ایک ایک تولہ رات کو ایک پاؤ پانی میں بھگو کر صبح گرم کر کے چھان لین۔ اور پی ڈالیں۔ اس سے مدد صاف ہو جاتا ہے۔ اگر انوں بھلنے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تو تھوڑا گرم پانی۔ یا گرم دودھ پینے سے درد بند ہو جائے گا۔ دو تین دست ہو جانے پر مونگ کی دال چاول کھانا۔ اس کے بعد ناریل کا پانی پینا۔ اور پینا کھانا چاہئے۔ جو انوں کو پاؤ بھر لڑکوں کو آدھ پاؤ۔ بچوں کو چھٹانک بھر۔ باقی برص سے کم عمر والوں کو سمجھ کر دینا چاہئے۔

بلہ انسان کے زیرین حصہ کا دایاں حصہ گرم ٹاپا ہے۔ اسی کا نام (VERMIFORM APPENDIX) یا گرم نازائدہ ہے (تصویر نمبر ۱۰۱) ملاحظہ ہو۔

ہو کر نشتر لگوانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن شروع ہی میں ہومیو پیتھک طریقہ سے علاج کرنے پر نشتر لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس مرض کی علامتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

سر میں زور کا درد؛ آنکھوں میں پردہ نشی کا بالکل برداشت نہ ہونا۔
(کبھی کبھی متواتر زبان میل کبھی کبھی قبض نہیں رہتا۔) ریاخ خارج ہونا۔
پیرموڑے رہنا۔ پیرموڈ میں تیز درد؛ حرارت جسم ۱۰۰۔۱۰۱۔ ڈگری تک
کبھی کبھی عسکراور تلی بھی بڑھتی ہے۔

اس مرض میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

ایکونائٹ x۳ (بخار زیادہ رہنے پر) بیلاڈونا x۳ (سر میں درد؛
چہرہ سرخ، تپکن؛ وغیرہ سر کی خرابی کے علامات میں) براوینا۔ (سولی چبھنے
کی طرح اور جلنے کی طرح درد؛ حرکت کرنے سے درد کا زیادتی۔ قبض
پیشہ مردگی اور ٹاکس ۶۔ حرکت کرنے سے درد کا کم ہونا) مرک کال ۷۔ (جسم
زرد؛ زبان زرد۔ نفع شکم لیکسس ۳۰۔ اس کی بہت اچھی دوا ہے۔

خاص کردار میں جانب پیٹ میں کترنے کی طرح درد اور کمر میں کپڑے کا
نہ رکھ سکتا۔ معمولی بخار کے ساتھ تھوے۔ لیکن درد سولی چبھنے کی طرح اور
جلن پیدا کرنے والا ہوتا؛ (خاص کر ٹیکہ لگوانے کے بعد یا غورتوں کے
ورم زائدہ ہونے پر) لیکسس کے بجائے اے پیس ۳۰؛ زیادہ فائدہ
کرتا ہے۔ لیکن اگر لیکسس یا اے پیس سے فائدہ نہ ہو تو آرس ۳۰ دینا
ضروری ہے۔ موت کا خوف؛ پریشانی؛ زبان سرخ۔ پانی پینے کی متواتر
خواہش لیکن تھوڑا پانی پینے سے سیریا بہتر بدل کر کروٹ بدلنا۔ (بے چینی سے)
بہت سستی کے علامات میں آرسنک x۳۰۔ تشنج میں گینٹیا فاس

x۲۔ سفوف؛ گرم پانی کے ساتھ دس بندرہ منٹ بکھ وقفہ سے استعمال
کرنے سے درد موقوف ہو جاتا ہے۔ مواد پڑ جانے کی علامت میں ہیپہر فرف۔ دینا چاہیے۔

ڈاکر ہیل اور سینڈس لمس نے بیلاڈونا x۳۰ اور مرک سول x۳۰۔
نصف گھنٹہ باری باری دیکر کئی گھنٹہ میں ہی فائدہ کرتا ہے۔

دراثر ۳۔ کالوسنتھ ۶ سلفر ۳ وغیرہ مفید ہیں۔
علاج معاون: بوتل میں خوب گرم پانی کر کے پیٹ کو سینکنا۔ بہت گرم پانی بار بار پینا۔ ضرورت ہونے پر گرم پانی کی بھکاری دینا۔ مرض کی شدید حالت میں صرف بارلی کا پانی پلانا چاہیے۔ ایلوپتھک ڈاکٹر اس مرض کو جتنا خوفناک نہیں سمجھتے ہیں کبھی کبھی نشتر لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

پیٹ پھولنا (TYMPANITIS)

یہ بیماری ہمیشہ بخار، ہیضہ، سرسامی بخار وغیرہ کی علامت ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

ایسا فلیڈ ۱۔ ۳۔ مرض اسٹیریا میں پیٹ پھولنے پر گھنٹہ پر دینا چاہیے۔
ٹرنیتھن ۳۔ بخار یا ورم کی وجہ سے پیٹ پھولنا۔ (خوف گرم پانی میں فلائین جو کر کے اور بخوڑ کر اوپر چند قطرے روغن تارپین میں پیٹ سینکنا چاہیے۔
یہ عمل ہر گھنٹہ کرنا چاہیے۔ پیٹ پھولنے کی یہ علامہ دوا ہے۔

ریفنس ۶۔ پیٹ سخت اور پھولا ہوا۔ اوپر اور نیچے سے ریاخ نہ خارج ہو سکتا۔ ڈاکٹر ڈنہم (DUN HAM) کی رائے ہے کہ کالوسنتھ ۶۔ چائنا ۳۔ ہائیوسیا مس ۳۔ لائیکوپوڈیم ۳۔ آرس ۶۔ آرسنک ابیم ۳۔ کاربووج ۶۔ ۳۰۔ نکس دایکام ۶۔ کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔

اگر پیٹ میں براز جمع ہونے کی وجہ سے پیٹ پھولتا ہوا۔ تو گرم پانی۔ اور روغن زیتون (OLIVE OIL) کا مل کرنا چاہیے۔
اس سلسلہ میں سرسامی بخار، ہیضہ، پیٹ میں اجتماع ریاخ، اسہال وغیرہ امراض کی مزید واقفیت کے لئے دوا اس دیکھئے۔

بارشکم نفع (FLATULENCE)

یہ دوسرے مرض کی علامت ہے۔ کلیجہ میں جلن، سانس کی تکلیف، کلیجہ دھڑکنا۔ پیٹ پھولنا۔ ڈاکٹر آنا۔ پیٹ میں گرد گڑا ہوا، ریاخ خارج ہونا۔ بار بار پیشاب۔ یا قطرہ قطرہ پیشاب ہونا۔ اس مرض کی خاص علامت ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

کار بوج :- ۳ x سفوف ۶۔ پیٹ میں (خاص کر بالائی پیٹ میں) ریا ج جمع ہونا۔ سانس میں تکلیف؛ یا کلیجہ میں جلن؛ پتے دست؛۔
 لائیکوپوڈیم :- ۶۔ پیٹرو میں ریا ج ہونا اور قبض۔
 کار بولک ایٹ :- ۶۔ پیٹ پھولنے کے ساتھ ڈکارا نا۔
 ایکس :- ۶۔ ڈکارا نا سے آرام محسوس ہونا۔
 کیموٹا :- ۶۔ اجتماع ریا ج۔ ڈکارا نا سے آرام محسوس ہونا۔
 نکس و امیکا :- ۳۔ کڑوی یا کھٹی ڈکارا نا کلیجہ پر بوج محسوس ہونا قبض، سلفور :-
 نکس ماسکالا :- ۳۔ رے نے نس :- ۶۔ ٹریتھنا :- ۳۔ آر جیم نائی :- ۶۔ کلکیر یا آیوڈ :- ۶۔
 سفوف سلیکا :- ۶۔ سائنا :- ۳ x برا یونیا :- ۶۔ آرسنک :- ۳۔ کالن سونیا :- ۳۔
 وغیرہ دواؤں کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔
 (پیٹ پھولنا ملاحظہ ہو۔)

بالائی حصہ پیٹ میں ریا ج جمع ہونا نکس و امیکا۔ پلسا ٹیلا۔ کار بوج
 زیریں حصہ پیٹ میں ریا ج جمع ہونا۔ لائیکوپوڈیم۔ سافٹیڈا :- ۱۔ چائنا۔
 اسہال (DIARRHOEA)

بغیر زور کے دکنٹھنے جو پتے دست آتے ہیں۔ اسکو اسہال کہتے ہیں۔
 عموماً چار قسم کا اسہال دکھائی دیتا ہے۔
 ۱) دیر بہم غذا کھانے کی وجہ سے رگندہ بانی پینے سے ادویات محرک
 کھانے سے پیدا ہوئی سوزش کی وجہ سے اسہال۔
 ۲) ہاضمہ تھے فعل میں خرابی ہونے کی وجہ سے غیر منہضم غذا نکلتی ہے۔
 ۳) گرم جسم میں ٹھنڈا پانی پینا۔ یا برف وغیرہ پینا۔ یا ٹھنڈی ہوا میں
 جا کر یکایک پسینہ روک دینا اور اس وجہ سے ورم ہونے کی وجہ
 سے اسہال۔

۴) موٹیم گرم کا اسہال۔ اسہال اور ہیضہ کا فرق :- « ہیضہ کے
 بیان میں لکھا ہے۔ اسہال میں پیٹ میں اینٹھن۔ اور کونٹھنا نہیں
 رہتا۔ لیکن معدہ میں یہ دونوں علامات موجود رہتے ہیں۔

ریو میکس ۳۔ صبح کے وقت بتلا دست؛ خاکی رنگ کا پتلا دست۔
دست زیادہ۔ صبح مریض کی آنکھ کھلتے ہی ٹوٹا لیکر پاخانہ دوڑتا۔
ایکونائٹ ۳۳۔ جارے کی سردی۔ (یعنی خشک سرد ہوا) لگنے کی وجہ سے
اسہال؛ پہاڑی جگہ پر اسہال۔ جسم میں سرسراہٹ۔ بخار؛ پیاسا؛
جلس ۱۱۔ ایکونائٹ کے علامات کے ساتھ درد سر میں۔

کیومولا ۴۔ سبز رنگ کا پانی کی طرح۔ گرم یا بدبودار دست؛ صفراوی تھے؛
پیٹ میں اینٹھن؛ درد سر؛ بچوں کے دانت نکلنے کے زمانہ کے اسہال میں بچہ ہیشہ
روتا ہوا؛ اور گود میں گھومنا چاہتا ہو۔ دستوں میں گرہ۔ پانی کی طرح سبز یا خاکی رنگ
کا دست؛ سڑے انڈے کی طرح بدبو۔

پلسا ٹیلا ۳۱۔ ۳۰۔ مختلف قسم کے دست؛ مختلف رنگ کے صحنہ کا فرہ کر دوا۔
تھے؛ یا متلی؛ ڈکار آنا۔ دیر ہضم یا مرنن غذا کھانے کے بعد اسہال؛ پیٹ میں
اجتماع دماغ؛ کھانے کے بعد غذا کا ذائقہ موسم گرما کے اسہال میں آنوں ملا۔
یا بلغم آلودہ دست؛ شب میں مرض کی زیادتی۔
انیم کروڈ ۶؛ زبان پر سفید میل کی تہہ؛ ڈکار آنا۔ متلی؛ کھانے سے نفرت؛
پانی کی طرح دست۔ صفرا ملا دست؛

اپیکاک ۳۳۔ ۴۔ تھے؛ یا متلی۔ بدبو دار براز۔ خون آلودہ براز۔ موسم گرما کا
اسہال درد کے ساتھ؛ بچوں کا زرد یا زردی فائل سبز رنگ کا دست؛ تھے؛
کے ساتھ اسہال۔ (پلسا ٹیلا کے بعد یا پہلے فائدہ کرتا ہے)۔
اولیندر ۳۱۔ ۳۰۔ (مرزین اسہال میں) بد ہضمی کا پاخانہ
زنجی بار ۶۔ خراب پانی پینے کی وجہ سے اسہال میں۔

نکس و امیکا ۳۱۔ ۳۰۔ زیادہ کھانے، شرب بیداری یا شراب نوشی کی
وجہ سے اسہال میں جبکہ حاجت جائزہ رفع ہو جاتی ہو؛

تھو جاتا ۳۱۔ ۳۰۔ پتلا زرد؛ پانی کی طرح دست؛ خون آلودہ۔ چربی
یا تیل کی طرح دست؛ گرہ کرڈا کر زور سے دست ہونا۔ ٹیکہ لگانے کی
خرابی سے دست؛ سوزا کی مادہ رہنے سے دست؛ مرض اسہال؛ ذات

کی جڑ کا کھوکھلی۔ لیکر بالائی حصہ ٹھیک بریض جلد جلد دُلا ہوتا جاتا ہے۔
 چائنا ۱۲- ۳ کھانے کے بعد رات میں یا صبح درد کے ساتھ یا بغیر تکلیف
 کے کچھ سرخی یا غیر منہضم غذا کا دست اور کمزوری اور اس کے
 ساتھ پیٹ میں ایٹھن بہت زیادہ پتلا دست زور سے نکلنا۔ پھل
 کھانے کی وجہ سے دست کا ہونا۔

کو لچیک ۳ x بشد ید اسہال میں تیز متلی اور سستی۔

خدا کے گو سے آرٹنگ ۳ x ۳۰ قبل پاخانہ ہونے کے چینی، پیٹ
 میں یا پیرو میں درد۔ پاخانہ کے وقت جسم بے چین۔ یا ابرکائی، کراہنا۔
 پاخانہ کے وقت مہرز جن۔ کلیجہ دھڑکنا۔ بدبودار ٹیلا تھوڑا دست
 پاخانہ کے بعد دست گردینے والی کمزوری۔ تیز پیاس۔ کھانے پینے
 کے بعد قے، بار بار خون آلودہ یا پتلا دست۔ زیادہ پسینہ، سستی۔
 بے چینی، مزمن اسہال، پھل، برف، آئس کریم، سٹرا گوشت، چھلی،
 باسی ترکاری، باسی کھیر وغیرہ کھانے کی وجہ سے اسہال۔

ڈلکار ۶۱- شبنم یا سرد تر ہوا سے یا سردی سے اسہال۔

رات میں صفراوی اسہال۔ بفتح شکم کے ساتھ سہ پیر میں دست۔
 مختلف رنگ کے دست۔ پتلا دست کاٹھنوا ٹکڑا براز دست، قے،
 ساتھ مقعد میں جلن۔ موسم بارش میں اسہال۔

آئرس ورسسی کیو لری ۶- جس اسہال کے علامات ہیضہ کے علامات
 سے ملتے ہیں۔ پیٹ میں تیز درد۔ مقعد میں جلن۔ قے یا متلی، صفراوی
 دست، سر میں درد۔ ہلا ارادہ پاخانہ ہو جانا وغیرہ علامات
 کے ساتھ اسہال موسم گرما۔ اور سرما میں لڑکوں کے اسہال
 اور ان کے ہیضہ صفراوی ہیں۔

مرک کار ۳- خون آلودہ یا صفراوی دست، پیٹ میں درد۔
 آٹوں آلودہ دست کے ساتھ کو منتھنا۔ پاخانہ ہونے کے بعد کو منتھنا
 بند نہ ہونا۔ ٹیلا یا زرد دست سستی وغیرہ۔

مرکبوریس والوس ۶۔ کوغٹھنا اور درد۔ مریض پاخانہ سے اٹھنا چاہتا ہو۔
کیونکہ سمجھتا ہے کہ پاخانہ اور ہوگا تو خلاصہ ہو جائے گا۔ خون آلودہ۔ یا بلا
خون کے صفراوی دست۔ شدید مردہ کے ساتھ خون گرنا۔

مرکبوریس سول ۶۰۔ ۳۰۔ آنوں یا خون آلودہ یا صفراوی دست۔
پاخانہ ہونے کے پہلے پیٹ میں درد۔ پاخانہ ہونے کے بعد اس درد کا ہونا۔
ٹھیلالہ زرد رنگ کا دست۔ بار بار پتلے دست۔ دو تہہ (سکوڑ لینے) سے درد
بند ہو جانا۔ پیٹ خالی رہنے پر مریض زیادہ نہ کھا سکے۔

برایو نیا ۶۔ ۳۰۔ موسم گرما کا اسہال۔ سرد پانی پینے کی وجہ سے اسہال۔
میٹھنے پر متلی یا بے ہوشی۔ زیادہ گرمی کے بعد یکا یک سرد ہوا لگنے سے اسہال۔
زیادہ پانی پینے کی خواہش۔ دست بدبودار۔

وراٹرم الیم ۶۔ ۳۰۔ پانی پینے کی طرح یا چاول کے دھوؤں (دھج) کی
طرح۔ زیادہ دست، آواز کے ساتھ یا بڑی تیزی سے براز، بلا ارادہ براز نکل جانا
پیٹ میں ایٹھن، پیر میں ایٹھن، تنقبض ساقط، سرد پسینہ (خاص کر سر میں)
تیز پیاس، تپ، تمام جسم سرد، تیزی سے غشی۔

پوڈوفائلم ۶۔ بچوں کے آنت نکلنے کے زمانہ میں اسہال۔ مختلف رنگوں
کا زیادہ دست۔ خون آنوں، خون ملا دست، کھانے یا پینے کے بعد ہی اجابت
کی حاجت۔ اور پیرو کا خالی محسوس ہونا۔ بغیر درد کے اسہال، صبح مرض
کی زیادتی، صفراوی مزاج والوں کو زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

فاسفورس ۶۔ ۳۰۔ نفخ شکم، اور ترشش ڈکار کے ساتھ (مرض)
اسہال، کمزوری، ہیضہ کے بعد اسہال۔

پتلے دست کے ساتھ چربی کے ٹکڑے۔ یا ساگو دانہ کی طرح دانہ دانہ ہرا
نکلتا۔ مرض دق کی کمزوری وغیرہ علامات میں۔

کلیریا کارب ۶۔ ۳۰۔ کمزوری اور لاغری، چمیرہ پر خون کی کمی،
کبھی مندا سے نفرت۔ یا کبھی زیادہ بھوک۔ تینہ ابیت سے پیدا
ہوئے مرض اسہال، پتلا، چکنا، دست۔ بچوں کا اسہال (خاص کر جن

بچوں کے سر میں پسینہ نکلتا ہے۔ بچوں کا جسم سرد مریضان کنٹھ والا کے اسہال میں۔
ایلو منٹا ۳۰x۳۰۔ زرد رنگ کا بدبو دار دست۔ حاجت ہوتے ہی پاخانہ
نکل جاتا۔ پاخانہ کے پہلے۔ (اور بعد) متانہ میں درد۔ صبح اسہال میں، براز کے
ساتھ ریاح خارج ہونا۔ اجابت کے وقت مریض سمجھتا ہے کہ پیٹ میں کل
چیزیں گویا نکل پڑیں گی۔ اور پاخانہ رد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
بو دسٹا ۳۔ عورتوں کو حیض کے پہلے یا پیچھے اسہال۔

پیٹشیا ۳۰x۳۰ یا پائروجن ۳۰؛ نالی وغیرہ کے آبخرات کے وجہ سے اسہال
ایڈناس ۳۰x۳۰۔ بغیر درد کے پتلا سفید۔ بلارادہ نکلنے والا اور سست
کرنے والا اسہال، اور بعد دست کے کمزور می نہ محسوس ہونا۔

ٹرم بیڈم ۳۰۔ کھانے پینے کے تھوڑی سی دیر بعد پیٹ میں درد؛ اور
کراہنا؛ بدبو دار دست؛ کبھی کبھی خون آلودہ۔ پیٹرویم ۳۰۔ بند گوبی کی ترکاری
کھانے سے اسہال؛ صرف دن میں اسہال ہو؛

میگنیشیا کارب ۶۔ ترش بو دار؛ مثلی؛ سویا کی طرح سبز دست؛
نیوفرلوشیا ۳۰x۳۰۔ صبح نہ بکے سے، بکے تک اسہال ترش ہو۔ زرد
رنگ کے پانی کی طرح پتلا دست۔ پیٹ میں ریاح جمع ہونا۔ اجابت کے
بعد مقعد میں جلن۔

کالوسنتھ ۳۰۔ پیٹ میں یا ناف کے چاروں طرف کانٹے کی طرح، یا ٹکرانے کی
طرح درد؛ درد سے مریض گویا دو ہرا ہو جاتا ہے۔ غذا کھانے پر درد کی زیادتی
اور دست؛ کبھی زیادہ ہونا۔ پاخانہ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے درد کم ہو جانا۔
پھر درد پہلے کی طرح۔ (پہلے پانی کی طرح) پھر صفراوی۔ وقتاً فوقتاً خون آلودہ
اسہال؛ دبانے یا جھٹکنے سے درد میں کمی؛

فیرم ٹیالیکم ۳۰۰x۴۰۔ بہت عرصہ تک اسہال میں مبتلا رہنا۔ مریض کے
بہت کمزور ہو جانے پر؛ اور بہت کو نتھن سے بغیر منہضم دست ہوا کرتا
ہے۔ کمی خون۔ سلفر ۱۲؛ ۳۰؛ زیادہ زرد یا پیلے سفید رنگ کا
دست؛ بغیر درد کے دست؛ بدبھنی کا دست۔ صبح مرض کی زیادتی۔

مرض ضعف مدہ۔ زمین اسہال میں) مقعد میں زخم ہونے پر اور مریض
اسی وقت یا خانہ کے لئے بھاتا ہے۔

کیفین۔ (ایک خوراک جو تھائی گرین) بار بار دست ہونے کی وجہ سے
مریض کے دل کا فعل بند ہو۔۔۔ کے اندیشہ پر۔ درحقیقت کیفین دل کو
تحریک کرنے والی ایک اچھی دوا ہے۔

گنیشیا فاس ۱۲ x سفوف۔ رسی نس ۶۔ آتھوزا ۶۔ کلکیر یا کارب ۶۔ بیکس ۶۔
لے پس ۶۔ کاربوون ۳۰۔ اور ساٹنا ۳۰ x ۲۰۰ کی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔
دیر ہضم چیزوں کے کھانے سے اسہال میں۔۔۔ پلسا ٹیلا ۶۔ بیکس دامیکا ۶۔
انٹم کروڈ ۶۔ اپیکاک ۶۔ نہایت مفید و کارآمد ہیں۔

خواب پانی پینے یا کھٹل کھانے سے اسہال میں۔۔۔ کیموٹا۔ آرس۔ بیٹشیا۔
برف کھانے یا برف کا پانی پینے یا آرس کریم کھانے کے بعد ہاضمہ میں نقص۔
د یعنی پیٹ بھوننا۔ تے وغیرہ آرس ۳۔ کاربوونج ۶۔

نایاک ہوا کی وجہ سے اسہال میں بیٹشیا ۳۔ یا آرسنک ۶۔
سر دی سے اسہال میں ۱۰۔ اسپرٹ کیمڈ۔ کیوٹاٹ ۳۳۔ برائیونیا۔
دن میں گرمی اور رات میں سردی ہونے کی وجہ سے اسہال۔ برائیونیا ۳۳۔ ۳۰۔
برسات میں سردی سے اسہال میں ڈنگار ۶۔ یا رستاگس ۶۔

بند گو بھی کھانے کی وجہ سے اسہال میں۔۔۔ پیٹرو لیم۔
دامنی جذبہ سے اسہال میں۔۔۔ گنیشیا ۶۔ کیموٹا ۱۲۔ وراٹرم ۶۔
دودھ پینے سے اسہال میں۔۔۔ آتھوزا ۶۔ کلکیر یا کارب ۶۔

مرغن چیزوں کے کھانے سے اسہال میں۔۔۔ پلسا ٹیلا
زمانہ دانت نکلنے کے اسہال میں۔ کیموٹا ۱۲۔ کلکیر یا کارب ۶۔
مرک کار ۶۔ کالوسنتھیا پاڈوٹاٹم۔۔۔ پلسا ڈونا۔ سلفر۔ آرس۔

خوف یا خوشی سے اسہال میں۔۔۔ گنیشیا ۶۔ اوپیم ۳۰۔
رنا کی وجہ سے اسہال میں۔۔۔ گنیشیا ۶۔

حالت حس یا بچہ بننے کے بعد اسہال میں۔۔۔ انٹم کروڈ ۶۔ چائنا ۶۔

پھل یا ترش چیزوں کے کھانے کی وجہ سے اسہال میں :- آرس : کالوسنتھ : چائنا :-
 آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے اسہال میں کیمفر : بہت سردی : ایکونائٹ
 (موسم سرما میں خشک ہوا لگنے کی وجہ سے) برائی او نیا : (گرمی کے بعد سردی
 لگنے کی وجہ سے) ڈلکارا : برساتی ہوا یا نمی کی وجہ سے : (قولنجی درد
 کے ساتھ) ادینا مفید و کارآمد ہے ۔

موسم گرما کے اسہال میں : چائنا : ۶۔ (معمولی اسہال میں) اورے ایلب :
 (اسہال کے ساتھ تشنج) آئرس ۔ (تقے کے ساتھ درد دسٹ) آئرس : گھری
 (سستی) ایسٹ فاس ۔ (موسم گرما یا سرما میں) اسہال اگر متعدد ہوں
 کو لچکیم ۔ پوڈوفائلم : پلس : برائیو نیا ۔

کمزوروں یا بزرگوں کے اسہال میں :- فاسفورس : ۳۔ ایسٹ فاسفوریکم : ۳۔
 ایسٹ نائٹریک : ۶۔ انٹم کروڈ : ۶۔ وغیرہ :

مزن اسہال میں :- سلفر : ۳۔ کلکیریا کارب : ۳۔ لاسیکو : ۳۔ ایلو : ۳۔
 چائنا : ۳۔ ایسٹ فاس : ۶۔ آئرس : ۳۔ فاسفورس : ۳۔ آیوڈ : ۶۔
 ایسٹ نائٹریک : ۳۔ فیرم آیوڈ : ۳۔

ہیضہ کے ابتدائی اور استعداد درجے کی دوائیں ۔ اور پیکش
 کی دوائیں ملاحظہ ہوں ۔

کاقا باہر نکلنے پر : کالج نکلتا دیکھئے ۔ آج کل بچوں کے اسہال میں
 کوئٹن کا بنا ہوا آکسٹوائٹ سمندر کے پانی کا آنکاش کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے ۔
 اصول

شبنم یا سردی سے محفوظ رہنے کے لئے مریض کو کمرہ میں رکھنا چاہیئے ۔
 گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اچھی طرح جسم پر کچھ ڈالنا چاہیئے ۔
 مریض کا پیٹ ہمیشہ گرم کپڑے سے ڈھکا رکھنا چاہیئے ۔

علاج :- آروٹ ۔ گند بھاد دیا کاشورہ : باری میٹھا ۔ لیمون :
 سینگی یا ماگو : مچھا کاشورہ : اسکے بعد خوب پرانے چاول کا ساجات پیتلی
 چیزیں : زیادہ مندر میں کھا یا پھر ہے ۔ زیادہ کھانا اگر کسی بچی ہوئی

چیزیں کھانا۔ بار بار کھانا۔ بے وقت کھانا اور زیادہ مقدار میں ترش چیزیں کھانا منع ہے۔

پیش

(DYSENTERY)

بڑی آنتوں میں زخم کی وجہ سے سوزش کا نام پیش ہے۔
پیٹ میں درد؛ پاخانہ کے دقت کو متھنا۔ سفید آٹوں یا آٹوں کے ساتھ
پاخانہ میں خون آنا۔ اس کی مخصوص علامت ہے۔

مرض کے شروع میں سواہنی، تھو یا مثل۔ ناف کے چاروں طرف نیز
درد؛ پانی کی طرح پتلے دست، اور معمولی بخار آہستہ آہستہ تمام پیٹ
میں درد کراہنے کے ساتھ بار بار اجابت کی حاجت۔ خون آلودہ آٹوں؛
کا اخراج یا خون یا مچھل کے دھوئے ہوئے پانی کی طرح دست؛ ہوتا ہے۔
مرض ترقی کر جانے پر مریض کے جسم سے ایک قسم کی بدبو آنے لگتی ہے۔
چہرہ سرخ؛ بنف سسینہ و ضعیف، ہچکی بلارادہ پاخانہ ہو جانا؛ ہاتھ
پیر سرد؛ جسم کی حرارت ۱۰۰ سے ۱۰۱۔ ڈگری۔ زبان سرخ اور چکدار۔
حکم میں پھوڑا ہونا۔ سرسامی بخار کی علامت پیدا ہونا۔ آنتوں
کی ڈھکنے والی جھلی کا ورم۔ ہڈیاں وغیرہ علامت نمودار ہوتے ہیں۔
اگر بیماری ترقی پر یا مہلک نہ ہوئی ہو تو دست اور پیٹ میں درد؛
اور کو متھنا آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ ہرگز میں فرق معلوم
ہوتا ہے اور مریض کو آرام ہونے لگتا ہے

اس مرض کے فرمن یا اسپہال کا راستہ اختیار کرنے پر مریض بہت
کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دن میں تین چار بار دست ہوا کرتا ہے پیش کیساتھ
اگر ملیر یا بخار رہے۔ یا جگر میں پھوڑا ہو تو حالت مہلک سمجھنا چاہیے۔
حیرانیم ہی اس بیماری کی پیدائش کے خاص اسباب ہیں۔

کھانے پینے کی بیقاعدگی۔ خوب سرد یا گرمی لگنا۔ خراب پانی پینا وغیرہ
اسباب سے جسم کمزور ہو جاتا ہے تو حیرانیم آسانی سے جسم پر حملہ کر سکتے ہیں مریض
کے جسم یا بول و براہ سے جو اخراجات نکلتے ہیں اسی سے اس قسم کے حیرانیم

اگر اس بیماری کے باعث ہوتے ہیں۔ کھانسیوں کے ذریعہ یہ بیماری پھیلتی ہے۔
ڈاکٹر شینگانیز ڈاکٹر ولسلر وغیرہ اس زمانے کے شخصیں مرض کے عاملوں نے
جسٹوستان اور دوسرے گرم ممالک کی پیمپس کو دو قسم کا بتایا ہے۔

(۱) امیبا (AMOEBA) (سے پیدا ہوئی پیمپس)

(ب) بیسیس (BACILLUS) (سے پیدا ہوئی پیمپس)

(۱) امیبا جراثیم سے پیدا ہوئی پیمپس (AMOEBOID DYSENTERY)
دست میں امیبا نامی چھوٹے چھوٹے جراثیم نمودار ہونے پر اور اسی وجہ سے بڑی
آنت میں سوزش، اور بہت زیادہ زخم ہونے پر اسکو امیبا سے ہوئی پیمپس کہتے
ہیں۔ درد اور کراہنے کے ساتھ یکا یک مرعہ کا حملہ بار بار بلغم اور تھوڑا خون ملا
دست ہونا معمولی بخار یا بالکل بخار نہ رہنا ملاغزی اور نہایت کستی، بڑھ کر زبان
سرخ اور چھیلی دکھائی دیتی ہے۔ بہت زیادہ اخراج خون جگر میں درد کبھی بخار
اور پسینہ کے ساتھ جگر میں پھوٹا ہونا۔ اس مرض کے مخصوص علامات ہیں۔ نہایت
زیادہ کستی یا زیادہ خون اخراج ہونا۔ یا بہت زیادہ ڈکار آنا یا آنتوں کے
جھلکی وغیرہ کا ورم ہو جانے سے مرعہ بہت جلد مر جاتا ہے۔

علاج

بستر سے نہ اٹھنا۔ پتلی چیریا کھانا جیسے آرد وٹا، کجری کا دودھ، عرق
دانار، بہت گرم پانی میں (ایک دو بوند تارپین کا تیل ڈال کر) فلابیں بھگو دیکھوڑ
کر پیٹ کو سینکے سے بہت زیادہ ناندہ ہوتا ہے۔

(۲) بیسیس (دانت کی طرح جراثیم سے پیدا ہوئی پیمپس)

(BACILLARY DYSENTERY) خون میں ایک قسم کے جراثیم موجود رہنے
پر اور بڑی آنت کے ورم اور اس میں بہت گہرا زخم ہونے سے سمجھنا چاہیے
کہ بیسیس قسم کی پیمپس ہوئی ہے۔

جراثیم میں داخل ہونے کے ہم گھنٹہ بعد بھی اگر کوئی سلامت نہ معلوم ہو۔
پیٹ میں درد۔ ہلکا بخار۔ آنتوں ملا یا خون آلودہ دست پھر جسم کی حیرت اور
درد شکم کی زیادتی، زبان پر میل جا رہنا۔ بہت زیادہ کمزوری۔ ہڈیاں

وغیرہ علامات پیدا ہو کر تین ہی چار روز میں مریض کو موت کے منہ میں پہونچا دیتے ہیں، کبھی کبھی مریض تین چار ہفتہ تک زندہ رہتا ہے۔ اس قسم کے پیمیش میں شاید ہی آنتوں کی جھلکی کا ورم یا جگر میں پھوڑا ہوتا ہے۔

علاج

مرک کار ۳x۶x۶۔ اس قسم کی پیمیش کی خاص دوا ہے۔ پیرٹ میں بہت کترنے کی طرح درد بہت کراہنا یا تیزی ہونا۔ بار بار آنتوں سے دست۔ پاخانہ ہونے کے بعد بھی تکلیف کم نہ ہونا۔ مریض کو پاخانہ میں بیٹھے رہنے کی حاجت۔ پیرٹ اب مٹوٹا ہونا۔ آدھی رات کے بعد بڑی آنت کے کل آلات کی تکلیفات وغیرہ کا بڑھ جانا اس دوا کی علامت ہے۔ شدید بیمار ہی میں حسب ذیل دوا میں بھی دی جاتی ہیں۔ آر سنک ۳x۶ دست زیادہ تر پانی کی طرح بد بو دار، جلن کی طرح درد، بیٹشیا ۱۰x۳۰۔ (بخار کیساتھ نہایت درجہ کی سستی) کاربووج ۶x۳۔ جسم برف کی طرح سرد یا حالت ردی (ڈال سکوریا) ۳۔ (زیادہ درد اور کراہنا) فاسفورس ۳x۶۔ ۳۔ (بلا تکلیف دست) اوریکا ۳۔ ۶۔ (دین رکھتے ہی مریض تکلیف سے پریشان ہو جاتا ہے) ان دونوں قسموں کے علاوہ ایک قسم کی پیمیش اور بھی ہے جو کچھ پیمیش خناق و بانی (یعنی بڑی آنتوں کے استری جھلکی کی (DIPHTHERITIC) پیمیش کہتے ہیں۔

علاج مختصر

معمولی حملہ میں :- (جیسے زیادہ مقدار میں سبز رنگ کی آنتوں کا نکلنا) مرکوریس ڈس ۴x۱۲۔ گرم مالک کی پیمیش میں (خاص کر زیادہ کو نتھنے کے ساتھ زیادہ دست ہونے پر) مرکوریس کار ۳x۳۰۔ خاص دوا ہے۔ کینتھرس ۳x۶ یا آر سے کم ۳x۶ کی بھی گاہے گاہے ضرورت پڑتی ہے۔ کو نتھنے میں :- بیلا ڈونا ۶x۶۔ یو۔ یا ٹکس و امیکا ۳۰۔ پیرٹ میں ناقابل برداشت درد۔ ایک ۲x۲۔ کالوسٹھ انکینیا فاس ۱x۶x۶۔ سفوف گرم پانی کے ساتھ یا کیو پیم ۱x۶ آر سے ۶x۶ سفوف :- اخراج خونی میں :- آر ٹک ۳x۶۔ ایک ۳x۶۔ ہی میلس ۱x۶۔ یا

ایڈاسٹس x۳۔ میریا کے ساتھ بچپن میں۔ سڈن ۱۰۔ یا چینی نم سلف
x۳ x۳؛ سفوف۔ ایڈسٹو نیا ۱۰۔

میریا بخار کے ساتھ بچپن

کمی خون مریض بد بعضی (جس سے پریش میں دودھ بہضم بھی نہ ہوتا ہو) ایک
بوڑھی عورت کو ایڈسٹو نیا ۱۰۔ کھلا کر تین ہفتہ میں آرام کیا گیا ہے۔

مرض میں مرض صورت میں

سلف ۳۔ یا نائٹرک ایڈ ۶۔ اور فی خوراک دو تین قطرے کاڈلیور آئیل (روغن
پھلی) مریض کو دینا چاہیے مرض کہنہ ہونے پر۔ ویکسینم پائلس ۱۰ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ثابت ہوئی ہیں۔

ایکو نائٹ x۳ x۳۰ بخار درد شکم خون آلودہ آنکھیں! پیاس! بے چینی!
کاربووج ۶۔ بہت بدبو دار ریاح! نفخ شکم زیادہ ڈکار! گرمائے ہوئے
اگر برف پینے کی وجہ سے بچپن ہونا۔ پیرٹھنڈ سے ہو جانا۔

پیشاب میں بدبو یا پیشاب بند! دست وغیرہ غیر منہضم سڑی غذا کی طرح
بدبو دار۔ بنف بہت کمزور۔ یہاں تک کہ کھائی میں بنف کا پتہ ہی نہیں لگتا۔
(شدید مرض میں معمولی دوا نہیں دئی جاتی)۔

بہمی میلس x۱۔ گاڑھے یا سیاہی مائل خون کے ساتھ زیادہ براز نکلنے
کی علامت ہیں۔

مرکیوریس۔ یہ بچپن کی بہت اچھی دوا ہے۔

مختلف قسم کا مرکیوریس اس مرض کے مختلف حالتوں بہت زیادہ فائدہ
کرتا ہے۔ خون کے ساتھ آنکھیں گرم نا۔ کونستھن رہنا یا اجابت ہو جانے کے بعد بھی
مریض خیال کرتا ہے کہ ابھی اور پاخانہ ہو گا۔

مٹھ میں بکثرت لعاب آنا۔ مرکیوریس کی مخصوص علامت ہے۔

بہت زیادہ مقدار میں یہ علامت موجود ہونے میں، مرکیوریس کار x۳ x۳۰۔
علامت تھوڑی ہونے میں مرک والی وس x۶۔ سفوف (نہ ہو تو مرک سال ۶۔ ۱۰ بہت
تھوڑی مقدار میں! ان سب علامات میں مرک ڈالسمس x۶۔ سفوف دینا چاہیے۔

مرضِ پیمیش میں؛ مرک کار۔ (۳۰-۶۳۳) اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ صرف خون۔
یا خون آلودہ آنوں؛ بہت زور لگا کر بار بار براز نکالنے کی حاجت۔

پاخانہ ہونے کے پیدا اور بعد میں تیز درد۔ مثلاً نہ میں جلن کے ساتھ بڑی دقت
سے تھوڑا پیشاب؛ کبھی کبھی بالکل ہی پیشاب نہیں ہوتا۔ مریض پر مڑ دینی چھا
جائے تو یہ دوا دینی چاہیے۔ حاجت ہونے کے بعد اس خیال سے پاخانہ میں
بیٹھے رہنا کہ ابھی اور پاخانہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی بار بار کو منتھنے میں؛ مرک کار
خوب فائدہ کرتا ہے۔ پاخانہ میں زیادہ خون ہوگا تو یہ دوا زیادہ فائدہ
کرے گی۔ اور مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔

اگر براز میں خون کم ہو کر بلغم کا حصہ زیادہ ہو یا آنتوں کے زیرین حصہ
میں مرض ہوا ہو، تو مرک والی دس ۶۳ سفوف۔ یا مرک سول ۶۔
اگر سبزی مائل آنوں؛ یا سرخی مائل پتیلے دست آتے ہوں۔ یا آنتوں کا بالائی
حصہ ماؤف ہوا ہو، تو مرک دس ۶۳ سفوف استعمال کرنا چاہیے۔

گرم پیڈیم ۶۔ ۱۴؛ کھانے پینے کے بعد ہی زور کا درد شکم؛ اور کو منتھنے
سے علامات کی زیادتی۔ جب گرمی اجتماعِ خون؛ ربر کے رنگ کا خون ملا پتلا دست؛
اور اس کے ساتھ کو منتھنا۔ مرک۔ استعمال کرنے کے بعد یہ فائدہ کرتا ہے۔

نکس و امیکا ۳۳-۳۰۔ پاخانہ کے وقت یا اس کے پہلے بہت کو منتھنا؛ لیکن
پاخانہ ہو جانے کے بعد کو منتھنے وغیرہ کی تکلیف کا بند ہو جانا۔ خون کے ساتھ
آنوں کی گرمی نہیں نکلتا۔ کئی بار ہونے پر بھی وزن میں کم ہونا۔ بعد پاخانہ ہونیکے ایسا
جھکوس ہونا کہ ابھی پیٹ میں غلیظ موجود ہے۔

فرق در میان امر کیوریس اور نکس و امیکا میں؛ مؤخر الذکر میں پاخانہ
ہونے کے بعد کو منتھنے کی تکلیف موجود رہتی ہے۔

میکنیشیا فاس ۶۳۱-۶۳۰ سفوف؛ گرم پانی کے ساتھ

پیٹ میں بہت درد؛ براز کی نالی میں تکلیف؛ اینٹھن۔

اسے سٹونیا ۳۰۳-۳۰۳۔ پیرا بنجار کے ساتھ پیمیش؛ خون کی کمی؛

بیلڈ ونا ۶۳۰-۶۳۰ نفخ شکم۔ متواتر کو منتھنے کے ساتھ تھوڑا دست؛ براز

کی نالی میں جلن۔ ایسا معلوم ہو کہ برا ز کی نالی اور مثانہ باہر نیچے کی طرف نکلا پڑتا ہے۔ آنکھیں چمکیں، چہرہ سرخ، اور بڑیاں، پاخانہ ہو جانے کے بعد زیادہ کونٹھنے کی حاجت، بچوں کی ہمیش میں یہ دوا زیادہ کارآمد ہے۔
 یوڈوفالٹم ۶-۳۰۔ خون آلودہ دست، خون کی لکیر پڑی ہوئی۔ آنٹوں کا پاخانہ، قوبنجی درد، (پیٹ میں) کا پیچ باہر نکلتا، متلی، سبز آنٹوں، یا خون آلودہ دست، بچوں کے اسہال میں نہایت مفید دوا کا نام ہے۔

کالوسنتھ ۳-۶۔ نفخ، سکم، پیٹ میں اینٹھن یا تشنج، بالخصوص جبکہ پیٹ کو دبا کر پکڑنے (بالکل دوسرا ہو جانا) سے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے زبان پر سفید تہ، خون آلودہ چمکی آنٹوں اور متلی، لیکن تے نہ ہونا۔

ایلو ۶۔ مہلا اور گرم اخراج خون۔ بہت کونٹھنا۔ کمر میں درد۔ ران میں بوجھ، ناف کے چاروں طرف کترنے کی طرح درد، منٹھ خشک، پیاس۔ پیڑو کا پھولنا۔ پیچ پیچ میں پاخانہ ہونے کے وقت بے ہوشی، دماغ میں ہمیشگی یہ اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔

کلیریا کارب ۶-۳۰۔ سبز رنگ کا دست، یا سفیدی یا زردی، مائل یا سر میں پسینہ۔ پیر کے تلوے برف کی طرح ٹھنڈے۔ پیر کی پنڈلی میں اینٹھن۔ مہر میں تکلیف؛

ایکاک ۳x۶۔ گھاس کی طرح سبز رنگ کا یا گڑ کی طرح سیاہی مائل لیسڈ آر دست، درد شکم۔ کونٹھنے کے ساتھ ہی ساتھ شروع میں لیسڈ آر و بدبودار خون کا دست، بعدہ خون آلودہ آنٹوں نکلتا۔ متواتر تے اور متلی، بہت شرمندگی۔

غام پھل یا ترشن چیزوں کو کھانے کی وجہ سے ہمیش ہو جائے۔

کاسٹیکم ۶۔ بہت کونٹھنے کے ساتھ شکر و اٹکھا خون ملا آنٹوں۔ نکلتا مقعد کا بلنا۔ اور بہت تکلیف۔ نفخ شکم؛

میکساٹیل ۳-۳۰۔ صرف آنٹوں ملا دست، پیڑو میں درد، مہر میں چیزیں کھانے کی وجہ سے ہمیش، رات میں مرض کی زیادتی؛

آرسنک ۶۔ جسم میں جلن؛ پیاس؛ مریض میں بے رونقی؛ سیاہی مائل؛ بدبو دار دست؛ تیز پیاس؛ تھوڑا تھوڑا پانی جلدی جلد کی پینا موت کا خوف؛
 کمبو جیا ۶۔ بدبو دار پتلا دست۔ کھانے پینے کے بعد مرض کی زیادتی۔ پیٹ
 و بار کھنے کے درد میں کمی؛ پیٹ میں اینٹھن کے ساتھ یکا یک دست کی تیزی پسینا
 فاسفورس ۶۔ سبز رنگ کا گرہ دار یا خون آلودہ دست کسی طرح کا درد
 نہ رہنا۔ صبح یا بائیں کروٹ سونے پر مرض کی زیادتی؛ ٹھنڈی پتلی چیز پینے کی خواہش
 ساگو دانہ کی طرح دست۔

لائیکوپوڈیم ۳۔ پچپش میں نفع ہونے کی علامت میں؛

پٹیشیا x ۱۔ پچپش کی نہایت خراب حالت میں مریض اگر بالکل ہی سست ہو جا۔
 کینتھر سس ۱۳۔ مرض بہت سخت اور متعدی ہو؛ تکلیف سے پیشاب نکلتا
 ہو؛ پیشاب کرنے کے بعد بہت جلن؛ گوشت دھوے ہوئے پانی کی طرح
 دست؛ پیٹ میں تیز درد؛ نفع شکم؛ پیاس؛ لیکن پانی پینے کی خواہش
 نہ ہونا۔ ہر طرف کی طرح ٹھنڈا جسم۔

کیپیکم ۳۰ x ۶۔ بار بار سیاہ خون۔ اور آٹوں آلودہ دست؛ بہت کونٹھنا۔
 اور پیشاب کے وقت جلن۔ نفع شکم؛

کاپیکم ۳۳ x ۶۔ بھادوں یا کنوار کے مہینہ کی پچپش میں؛ کراہنا۔ کونٹھنا
 پیٹ میں تشنج۔ پیر کی پنڈلی میں اینٹھن؛ پیٹ میں تکلیف؛
 آر نکا ۳۳ x ۶۔ سرخ خون زیادہ نکلتا۔ اور کونٹھنا۔

رٹاکس ۳۔ رات کے وقت بے خبری میں برا زنگل جانا۔

پیٹ میں کترنے کی طرح درد؛ ہمیشہ پاخانہ کی حاجت؛ مزمن پچپش میں؛
 (خاص کر خرابی کی حالت میں) رٹاکس ۳۔ سب سے اچھی دوا ہے۔

سلفر ۶۔ ۱۰۔ پاخانہ ہونیکے بعد کونٹھنا بند ہونے پر۔ اور آٹوں خون نہ

ہو۔ آٹوں کے اوپر موت کی طرح خون کی لکیریں ہونا۔

مرض بہت سخت ہونے پر یا کسی مذکورہ بالا دوا سے فائدہ نہ ہونے پر

سلفر ۳۔ (مزمن پچپش کی ایک اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔

ٹائٹریک لیڈ ۶۔ پُرانی پیچش میں (خاصکر پیٹ کے بیچ میں زخم ہونے اور پیپ نکلنے پر)۔ سبز یا خون آلودہ آنکوں ملا دست یا سٹراپ بوندار دست۔ اجابت کے وقت کو منھنا۔ اور اجازت ہو جانے کے کمزوری محسوس ہونا۔ آتشک کے مریض کے جو بہت زیادہ پارہ سے تیار کی ہوئی دوائیں کھا چکے ہیں۔ ان کو ٹائٹریک لیڈ بہت زیادہ مفید ہے۔

ونکیس نیم مائی ٹس۔ مدر پنچر۔ (فی خوراک ۸-۱۲ قطرے صبح و شام۔ حاد و مزمن دونوں قسم کے مرض میں فائدہ کرتا ہے۔

اس دوا کے استعمال سے آنتیں سڑتی (ASEPTIC) نہیں ہیں اور جذب کرنے کا فعل (ABSORPTION) اور مرض کا پھیلنا (مرض کی دباؤ)

صورت بند ہو جاتی ہے۔ ۱۰ پیس ۳۔ ایلیومن ۶۔ چائنا ۶۔ برائی اڈینا ۳۔ ہائی ڈرائسٹس اور لیکسور ۶۔ پیم ۶۔ ورائٹم البم ۶۔ زکرم ۶۔ وغیرہ دوائیں بیج بیج میں لائی جاسکتی ہیں۔

مرض انسہال کی ادویات ملاحظہ ہوں۔ کاغذ نکلنے پر کاغذ نکلتا دیکھئے

عند او غیرہ

مریض کا کمرہ اور بستر ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور دست و پے دھو رکھنا چاہیے۔ اس مرض میں مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ ہلکے ہلکی اور مقوی دوا دینا چاہیے۔ (تھول کڑی اور یا تھون کئی) کا شور زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

بیچش میں اگر بلیس یا اور کمی خون کی علامت ہوں تو کلمے کا ٹاساگ کا شور بہت فائدہ کرتا ہے، اس کے کھانے سے خون کے سرخ ذرات بڑھ جاتے ہیں۔ اور پیش و بلیس یا رفع ہو جایا کرتا ہے۔

کیر و خام بگھاڑا۔ اراروٹ۔ محف۔ کھوی کا مار۔ سنگی یا مار گھلی

چھ۔ تھان کئی۔ ساگ کا پتہ پھوڑ کر عرق نکال کر اس میں ایک ٹکڑا لوہے کا آگ میں سرخ کر کے ڈال دیں۔ اور تھوڑی دیر رہنے دیں۔ بعد ازاں

کر پینے سے بہت فائدہ کرتا ہے

یا گند بھاد دیا کا شوربہ باری خام، بیل کا پکا ہوا حصہ۔ تھوڑا عرق بہدانا
بکری کا دودھ، اور (بخار کم رہنے پر) جاول کا مارڈ دینا چاہئے۔
لیمون ٹرش، انگور، ادھی وغیرہ کھٹی (Acid) چیزیں دینا حاد بخش
میں منع ہے۔ لیکن مرض مزمن ہو جانے پر، خوب پُرانی اٹلی ایک انگل اور
مصری ایک ٹکڑا رات کے وقت پانی میں بھگو کر دوسرے روز صبح رکٹی
ہفتہ تک استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

کل پیٹ فلائین سے ڈھکا رکھنا چاہئے۔ جب تک یہ مرض بالکل اچھا
نہ ہو جائے اس وقت تک بستر سے اٹھنا نہ چاہئے۔

گر ٹیڈیہ، جھوٹا ناگپور، یا جن مقامات کی مٹی میں لوہا یا ابرق زیادہ ہو،
وہاں مریض بخش کو نہ رہنا چاہئے۔ (مزمن بیماری میں) غذا کے بعد ہی ایک
دو قطرے کا ڈیور آئیل استعمال کرنا بہتر ہے۔ اور مریض کے دبلے ہو جانے پر،
یہ روغن پیٹ پر ملنا اچھا ہے۔ اگر ہو میو پیٹھک دولٹنے کی گنجائش نہ ہو،
اور مریض کی آفت باہر نکل پڑے، یا خانہ کے ساتھ بہت خون گرتا ہو تو
ایک ڈرام پالی کے ساتھ کنڈری کے پتہ کا عرق استعمال کرنا چاہئے۔
زخم معده

ULCER OF THE STOMACH

معده اور سینہ کی ہڈی کے ٹھیک نیچے جلن کی طرح درد۔ اور بعد
غذا درد کی ترقی، تپ ہونے کے بعد درد بند ہو جانا۔ اس مرض
کے مخصوص علامات ہیں۔ اگر چپ لیٹنے سے درد کم ہو جاوے تو سمجھنا چاہیے
کہ معده کے سامنے کی طرف کے حصہ میں زخم ہوا ہے اگر پیٹ سونے سے درد کم ہو تو سمجھنا چاہیے
کہ پیچھے کی طرف زخم ہوا ہے غلیظ جمع ہونا۔ حیض کی خرابی، کمی خون، خون کمی
تپ وغیرہ علامات اس بیماری میں ہوا کرتے ہیں۔ زیادہ عورتوں ہی کو یہ بیماری
ہوا کرتی ہے۔ آج تک اس مرض کا ٹھیک سبب معلوم نہ ہو سکا۔

علاج

بورنیم نائٹرکیم HNO_3 سفوف (چھ گھنٹے کے وقفہ سے

دو گرین فی خوراک) اس کی خاص دوا ہے۔ (خاصکر معدہ کے زیرین حصہ میں زخم ہونے پر) کیلی بائی X۳۔ سفوف (دو گرین کی ایک خوراک ۶۔ گھنٹہ کے وقفہ سے) جل جلنے کے بعد زخم میں یا معدہ کے سامنے کے حصہ میں زخم ہونے پر آر جینٹن نائٹرک ۴۔ آرس ۳۔ کرپوزوٹ ۶۔ ہائیڈراکس ۳۔ ایکس ۶۔ اگر تھو گیل ۱۔ ابے ٹم۔ صرف ایک مرتبہ ایک خوراک کھلائی جائے۔

پیچ پیچ میں ضروری ہو سکتی ہے۔ غذا وغیرہ۔۔ دودھ، مٹھا۔ بہت تھوڑا برف اور سودا اور کبھی کبھی پیچ پیچ میں ٹیسروپائنم سلف X۲۔ فی خوراک ۲ گرین استعمال کرنا چاہیے تبیا کو استعمال بالکل ترک کر دینا چاہیے۔ اور پوری طرح آرام کرنا چاہیے۔

ہچکی

(HICCOUGH) (DIAPHRAGM)

پیٹ اور کلیجہ کے حجاب عاجز (DIAPHRAGM) کے سانس کی نالی کے دروازے (GLOTTIS) (ترمار میں ذرا اوپر کٹخ کے ساتھ ساتھ لینے میں ایک آواز پیدا ہونے کا نام ہچکی ہے۔ یہ ہمیشہ کسی تیز بیماری کی خوفناک علامت ہے۔ معدہ کی بیماری یا کسی دوسرے سبب سے یکایک سینہ اور پیٹ کے حجاب عاجز سکڑ جاتی ہے۔ اس طرح سکڑنے کی وجہ سے ہوا، زور سے پھیپھڑے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے زرخہ کے منہ پر ہچکی پیدا ہو جاتی ہے۔ معدہ کی خرابی سے ہچکی، ہسٹیریا کی ہچکی یا بچوں کی ہچکی، اندیشہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی سخت بیماری میں برابر ہچکی آنے پر نبض ساقط ہو جاتی ہے۔ اور مرنے کی موت واقع ہو سکتی ہے۔

علاج

تمام قسم کی ہچکیوں میں سنگ ۱۱ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے اگر فائدہ نہ ہو تو نکس دامیکا ۳۔ (حنا عسکر اگر کھانے کے پہلے ہچکی آتی ہو۔ یا ساکلی من ۳۔ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کیوریم ۶۔ یا کیوریم آر سے کم ۶۔ ہچکی کی بڑی اچھی دوا ہے، (خاصکر سانس میں تکلیف آئے، ڈکارڈ

آنا۔ پانی پینے کے بعد چپکی بند ہونا۔ کایکوس ۶۔ ہچکی یا ڈکار آنا۔ اور چھنے کی طرح درد ہونا۔ کھلنے پینے یا بیڑی سکر پیٹ وغیرہ پینے کے بعد ہچکی آتی ہو تو اگیشیا ۳۔ متواتر تیز ہچکی (خاص کر بلیمر یا مریض کو) نیم گرم میوہ ۶۔ شہج اور زردی کی آواز کے ساتھ ہچکی آنے پر ساکیوٹا ۳۔ حرکت کرنے کے بعد ہچکی ہونے پر کاربووج ۴۔ زبان یکبارگی باہر نکل آوے اور پھر سکر کر اندر چلی جاوے تو سمجھنا چاہیے کہ جسمانی اعضاء علی الترتیب ہکرتے اور دھیلے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ڈاکٹر سال زرنے لاسکو پوڈیم ۳۔ استعمال کر اگر بہت فائدہ پایا ہے۔

ڈاکٹر سرکار ہیضہ کی ہچکی میں مندرجہ ذیل کی ادویات کو مفید و کارآمد بتاتے ہیں۔

بیلادونا۔ ساکیوٹا۔ ہایوسیمس، کاربووج، ڈیجیٹس۔ ایگنس۔ پلسٹیللا۔ اسٹافس اگر یا۔ اگر یا، فاسفورس۔ اگیشیا۔ سلفر۔ یہ سب ادویات حسب علامات استعمال کرانی چاہئیں۔

ڈاکٹر سال زرنے لاسکو پوڈیم۔ کیو پریم۔ ٹے نم، ساکیوٹا۔ بیلادونا۔ کس امیکا۔ علامات کے مطابق کام میں لانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ سب دوائیں مددکنج ۵۔ یا ۳۔ قوت کی کام میں لائی جاسکتی ہیں۔ مفصل حالات کے لئے ہماری کتاب موسومہ ہیضہ، طاعون، تریبان اردو، ملاحظہ ہو۔

علاج

ٹوٹے کی دوا سے بھی کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ تار کے پھل کا گودا یا کچے ناریل کا پانی، تال کے بیج کے اندر کا گودا وغیرہ کھلانے سے بھی گالے ماس فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ مریض کو ہلکی غذا دینی چاہیے۔

اگر معدہ کی خرابی سے بہت دنوں، ہفتوں یا مہینوں، تک ہچکی آتی رہے۔ اس وقت اگر ٹن یا درد معلوم ہو تو کمر میں ایک مضبوط بندھن (بندج) باندھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑا دودھ یا پانی پلا دینے سے بچوں کی ہچکی آسانی سے بند ہو جاتی ہے۔

اس مرض پر مقلد کی دریدیں سوچ اور بڑھ جاتی ہیں۔ ان بڑھی ہوئی دریدوں کو 'مستہ' کہتے ہیں 'مستہ' دیکھنے میں مٹہر برابر ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایک 'مستہ' دکھائی دیتا ہے۔ تو بھی کئی 'مستے' آپس میں جڑ سے انگوڑ کے شکل کے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ 'مستے' مبرز کے باہر ہوں تو ان کو باہری 'مستے' کہتے ہیں۔ اور اگر اندر ہوں تو اندرونی 'مستے' کہتے ہیں۔ یہ سب 'مستے' پھٹ جاتے ہیں۔ اور ان سے خون نکلتا ہے (خونی بوا سیر) ایک قسم کا 'مستہ' اور بھی ہوتا ہے۔ جس سے خون نہیں نکلتا؛ اس کو بادی بوا سیر کہتے ہیں مبرز کے پاس جلن۔ کانٹا چھبنے کی طرح درد۔ قبض، بار بار اجابت کی حاجت وغیرہ اس مرض کے علامات ہیں۔ بار بار جلاب لینا۔ گھوڑے کی سواری کرنا۔ غذایہ مشروبات محرم کھانا پینا۔ شراب پینا۔ شب بیداری، کھلی اور مسالہ دار چیزیں زیادہ کھانا پینا۔ یا بغیر محنت کے دن کاٹنا۔ پیٹ میں زیادہ ریا ج جمع ہونا۔ حالت حمل میں پیٹ کس کر باندھنا۔ یا تنگ کپڑا پہننا۔ قبض جگر کے امراض، اجابت کے وقت یا پیشاب کرتے وقت کو نہنا۔ ٹھنڈے پتھر تر گھاس، یا خوب ملائم چیز پر برابر بیٹھے رہنا وغیرہ اسباب یہ مرض ہوتا ہے۔ یہ نسبت یا برسات میں یہ بیماری زیادہ پکھلتی ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مندرجہ ذیل حالتوں میں مفید ہیں۔

- (۱) محنت نہ کرنے یا زیادہ عیش سے پیدا ہوئی بوا سیر میں نکس و امیکا سلفر پوڈو۔
- (۲) قبض کی وجہ سے بوا سیر ہو تو اسکیو، نکس و اسلف، کولن سونیا۔ کاربودخ۔
- (۳) حالت حمل کی بوا سیر میں کولن سونیا۔ نکس و ایلو۔

- (۴) خونی بوا سیر میں۔ انکوناٹ (زیادہ خون گرنے پر) سلفر ہیما میل (سیاہ خون) اسکیولا، ایلو، چائنا (بہت خون گرنے پر استعمال کرنا چاہیے)۔
- (۵) بادی بوا سیر۔ ایکون۔ (زیادہ درد) کیپس (جلن اور کبھی) نکس و امیکا سلفر۔
- (۶) سفید آٹوں نکلنے والی بوا سیر میں۔ مرک۔ (پانی نکلنے کی علامت میں) ایکون (سفید آٹوں نکلتی ہو) مرک و ا۔ اگر ساتھ خون بھی آتا ہو تو مفید ہے۔

(۷) بوا سیررگ جلتے پر، سلفر پکس، نکس و امیکا۔ اسکیوس۔ ایسڈ ٹائٹرک۔
 (۸) مزمن بوا سیر میں: سلف، آرس۔ (لاغر مریضوں کے لئے فیم (وقت مٹی میں) ٹائٹرک ایسڈ، ہیر سلفر، اسکیوس، کاسٹیکم وغیرہ مفید ہیں۔
 چند مخصوص ادویات کے علامات

نکس و امیکا X۱۔ ۳۰۔ وقتاً فوقتاً اسہال، اجابت کے وقت مسہ باہر نکل آتا۔ درد کمر۔ پیشاب ہوتے وقت تکلیف۔ زیادہ دیر تک غور کرنے کھانے کے بعد مرض کی زیادتی (جو کسی قسم کی محنت نہیں کرتے۔ بلکہ زیادہ بگی اور مسالہ دار چیزیں کھاتے ہیں) یا زیادہ شراب پیتے ہیں ان کے لئے نکس و زیادہ مفید ہے۔ قبض، اجابت کی حاجت۔ لیکن کوشش کرنے پر بھی پاخانہ بالکل نہ ہو۔ سلفر ۳۰، بوا سیر کی (خاص کر مزمن بوا سیر کی ایک اچھی دوا ہے۔

بہت قبض، چھوٹے چھوٹے سدریں، خوب لپٹا ہوا براز (خون ہوا یا ہو)۔ مبرز جلن اور چھین، بار بار پاخانہ کی حاجت۔ لیکن پاخانہ بالکل نہ ہو۔ کمزور، پتلے دست، خون آلودہ۔

رات کو سوتے وقت نکس و امیکا ۳۰۔ اور صبح سلفر ۳۰ کے استعمال سے بہت قابل ڈاکٹر بوا سیر آرام ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔
 لیکس ۶، ۳۰۔ یا سپیا ۳۰، مسہ پیاز کی طرح یا مسہ مکمل کر مقعد میں ٹوپی کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔

اسکیوس ۳، کھانا اور اسکیوس کا مرہم لگانا۔ حقوڑا خون نکلتا۔ مبرز پشت اور کمر میں درد، قبض، مریض کو ایسا محسوس ہو کہ گویا مبرز میں کانٹا ٹکا ہوا ہے۔ اس کے باعث ساری سیدھی آنت میں درد ہوتا۔ وغیرہ۔
 ایکونائٹ X۳۔ اندرونی استعمال اور یا کون کا ہی غسل یا کوشن لگانا۔
 بخار کے ساتھ بے چینی، تیز درد، گرمی محسوس ہونا۔ پلیم۔ یا خون نکلتا۔

آرس X۳ ۶۔ گرم معلوم ہونا۔ ایسا محسوس ہونا کہ گویا بوا سیر سے گرم سوئی نکل رہی ہے۔ پشت میں تیز درد، مسہ کا باہر نکلتا۔ کمزوری یا سستی۔
 کولن سونیا X۲۔ قبض کے ساتھ بوا سیر کولن سونیا سے اگر قائدہ نہ ہو تو

ایلویمیم ۶: دینا چاہیے (خاص کر اس حالت میں جبکہ کئی کئی دن تک پاخانہ کی حاجت نہ ہو۔) انٹم کروڈر۔ انڈے کی سفیدی کی طرح بلغم نکلتا۔

ریت ۳: بہت کھجلی ہو اور جب پاخانہ جانے کے بعد گھٹنوں ہی پاخانے کے راستے میں ناقابل برداشت درد ہو کرتا ہو۔

گریفاٹیس ۶: سده سده بہت بڑا اینڈر۔ باہر نکلتے وقت تکلیف۔
 ہمی میلس ۳: ۱: مسہ سے بہت زیادہ خون نکلتے پڑے اگر مسہ باہر ہو تو نصف پانی میں ۲۰ قطرے ہمی میلس ۵: ملا کر اور اس میں صاف کپڑا بھگو کر مسہ پر باندھنے سے خون نکلتا بند ہو جاتا ہے۔ غونی بوا سیر کیلئے اکسیر حکم رکھتی ہے
 ایلومنا ۶: بوا سیر کے ساتھ اسہال درد۔ جس میں بہت جلن ہو اور زیادہ کو متھنے کے بعد وزن میں پیسے رنگ کا خون نکلتا اور پستلا دست۔
 بیلاڈونا ۶: کیپ سکیم ۳: مرکبوریس ۳: نائٹرک ایسڈ ۶: فاسفورس ۶: سلکا ۶: بار بیرس ۳: ۱: ڈائیکوریا ۵: اور بیرس ۳: ۳: علامات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔

مرض کی شروع حالت میں مسہ کے درد میں۔ ایکون ۶: ۱: جگر میں خون کی زیادتی اور برائے کچر کی طرح پوڈو ۶: یا سلفر ۳: حالت حمل میں قبض کے ساتھ مسہ سے خون نکلتے پڑے اس میں درد ہو۔
 کولن سونیا ۶: اسہال بوا سیر میں۔ ایلو ۶:

بادی بوا سیر میں: شروع میں زیادہ درد میں ایکون ۳: جلن اور
 ٹیکن میں کیپ سکیم ۶: اور مزمن حالت میں نکس و امیکا ۳۰: (۳۰) کے وقت اور سلفر ۳: صبح کے وقت استعمال کرنا مفید ہے۔
 بوا سیر سے آنسوؤں نکلتے پڑے: ایکون ۶: مرکبوریس ۳: (مزمن بوا سیر میں) مریض کے بہت کمزور اور لاغر ہو جانے پر آرس ۳: فیرم فاسفوریکم ۳: کاربوج، ایسڈ فاس ۶: چائن ۶: مفید و کارآمد ہیں۔
 تھو جا ۳: نائٹرک ایسڈ ۳: فاسفورس ۶: کاسیکم ۳: میوریاک ایسڈ ۳: ۱: وغیرہ دوائیں سی بھی گاہے ضرورت پڑتی ہے۔

عند او غیرہ

بھونی یا سینکے محرک چیزیں :- دھوپ یا آگ کی تپش، شراب، مچھلی، گوشت، دہی، مرج، سرخ یا سیاہ وغیرہ کھانا ممنوع ہے۔ ٹیڑھے ہو کر بیٹھنا، گھوڑے کی سواری کرنا۔ پشیاپ یا پاخانہ روکنا۔ جماع کرنا۔ خشک چیزیں کھانا، فاقہ کرنا۔ اور بالکل ہی محنت نہ کرنا۔ یا زیادہ محنت کرنا۔ بہت نرم روٹی یا پیر کے بستر پر سونا۔ یا بہت دیر تک کھڑے رہنا نقصان دہ ہے۔ پشیا زمین، قند، تازہ مکھن، سستی، پستہ بادام، ناشپاتی، سیب، پُرانے چاول کا بھات، مٹھا، دودھ، (خاص کر بکری کا دودھ) مہری اور مکھن کے ساتھ بغیر چھلکے کا تیل (نہ لے تو بھگو یا ہوا پینا) روز صبح کھانے سے (قبل یا چنانچہ ایک دن پہلے ہی رات کو بھگو دینا چاہیے۔ قبض دور ہو جاتا ہے۔ اسی یا سرسوں کی گزرم پلٹس مقعد میں روزانہ چار پانچ بار لگانے سے بواسیر کا درد کم ہو جاتا ہے (پانی کے بدلے اگر دھی میں سرسوں کی پلٹس تیار کی جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے) ایک چھٹانک کے ساتھ ۵ بوند ہیمامیلس بدرستہ ملا کر پی کر کر کے بیرونی مسہ پر باندھنے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ رات میں سوتے وقت اور صبح اٹھنے پر ایک گلاس گرم پانی پینا فائدہ کرتا ہے۔ سرد پانی یا نیلگرم پانی سے بادی بواسیر کے مسہ کو دھو ڈالتے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ بھٹا پانی پینے کے بعد ایک گھنٹہ لیٹے رہنے سے خونی مسہ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ چار پانی پر مریض کو سیدھا لیٹانا چاہیے۔ اگر بواسیر میں زیادہ تکلیف ہو تو گرم پانی کے آبجرات پر کرسی رکھ کر اس پر مریض کو بیٹھانا چاہیے۔ کبھی کبھی نشتر لگوانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیمی میلس، اسکپولس، رٹینا اور کولین سونیا۔ ان چاروں دواؤں کا مدد ریکٹر ایک ساتھ ملا کر ایک تہی بھگو کر میرز میں داخل کرنا چاہیے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، چھوٹا ناگیوڈ، گریڈ، سید وغیرہ جن مقامات میں مٹی میں زیادہ ہے۔ وہ ایسے مریضوں کے لئے فائدہ کی جگہ نہیں ہے۔ پوری، بالیشور، بال پر وغیرہ سمندر کنارے کے مقامات فائدہ مند ہیں۔

زیادہ ہونے پر بھی کھوڑی مقدار میں سخت پاخانہ ہوتا۔

فیرم فاس ۶۔ بچوں کے لئے مفید و کارآمد ہے۔ جبکہ دست آتے ہوں۔
ایسٹامینور۔ ٹینا۔ آرکا۔ فاسفورس (خاصکر بچوں کی کایخ باہر نکلنے پر)۔
گلیریا کاربہ سپیا، آرس براونیا۔ اسکیولن۔ وغیرہ کی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔

علاج معاون

کو تھنا منع ہے۔ بچوں کو کھڑے ہو کر بغیر کو بھٹکنے کے اجابت رفع کرنا چاہیے۔
ہلکی لیکن مقوی غذا دینی چاہیے۔ آنت باہر نکل آنے پر اسے خوب کھنڈے
پانی سے کر کے اندر داخل کر دینا چاہیے۔ کایخ اپنی جگہ داخل ہو جائے
تو کپڑے کی ایک گولی مقدر رکھ کر دوسرے کپڑے سے اسکو کس کر باندھ دینا
چاہیے۔ تین حصہ حیل کو چمکے پتے کا عرق اور ایک حصہ اسپرٹ کے ساتھ
گاسے ماسے مرض کو کھلا دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

دوسری دواؤں اور پرہیزی غذا کے لئے بواسیر، کرم، بحیش، قیض اور
بدنظمی وغیرہ امراض ملاحظہ ہوں۔

(HERNIA)

آنت اترنا۔ فستق

پیٹ کے اندر کی کچھ آنتیں۔ کبج ران میں ناف کے جوف میں یا فوطہ میں داخل
ہونے کا نام، آنت اترنا یا فستق ہے۔

بوجھ اٹھانا یا چوٹ لگنا، قبض، زور سے ہنسنے، رونا، چھینکنا، کھانسی،
یا بالاسری، بچانا، گھوڑے کی زیادہ سواری کرنا، برابر گھومنا، محنت کرنا، پاخانہ
پیشاب کے وقت، یا ولادت کے وقت بہت کو تھنا۔ پیٹ کے عضلہ پر دباؤ
پڑنا وغیرہ اسباب سے آنت اتر آتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہٹا دینے یا دبا
دینے پر آنت اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے آنت پیٹ میں نہ
جائے تو درد بخار، قے، ہچکی، نفخ شکم وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں،
یا آہستہ آہستہ آنت سڑ کر موت کا باعث ہوتی ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

نکس و امیکا: x_{12} ؛ خاصکر بائیں طرف کی بیماری۔

اسکیولس X۲ - (درد دائیں جانب تک پھیلا ہو تو) لاسیکو پوڈیم۔ اسکی
 عمدہ دوا ہے۔ مگر عموماً ۲ طاقت میں مفید کام کرتی ہے۔
 پلیم ۶ - زیادہ قبض کے ساتھ آنت بڑھنے میں۔
 سلفیورک ایسڈ ۳ - آنت اترنے پر تے زیادہ ہوتی ہو۔
 فیکس ۳۰ - آنت سترنا شروع ہو۔ جب پیٹ میں اچھا رہ آتا ہو۔
 بیلادونا ۳ - ناف کے چاروں طرف ملنے کی طرح درد اور نفخہ شکم۔
 ایکنائٹ X۳ - آرس ۲ - کاربودج ۶ - کیوریم ۶ - درے ایلپ! بھی اسکی
 عمدہ دوا میں ہیں۔ بچوں کے آنت اترنے پر کس فامیکا ۳۰ - کلکیریا ۶ -
 (خاص کر موٹے تازے پتھر کو) سلکا ۶ - (خاص کر دہلے بچوں کو) بہت عمدہ
 دوا میں ہیں اگر ان ادویات سے فائدہ نہ ہو تو نشتر لگانا تو الے ہوشیار ڈاکٹر سے
 نشتر لگوانا چاہیئے، قبض بوجھ اٹھانے اور جلدی جلدی چلنے سے بچنا چاہیئے۔

علاج مساون

مریض کو حیت لٹا کر دونوں پیر او بچے کر کے بکڑے رہنے سے آنت
 خود بخود چڑھ جاتی ہے۔ درد دوائی جگہ کو گرم پانی سے سینک دینا چاہیے
 اور پیچ پیچ میں مریض کو مصری یا شکر کا شربت پلانا اچھا ہے۔
 اُترتی ہوئی آنت اندر چلنے کے بعد مریض کو کمر بند (بندس یا پی)
 باندھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔
 بچوں کی بیماری میں بچوں کا آنت اترنا لا خطہ ہو۔

(FISTULA IN ANO)

نواسیر
 مقعد یا مریض کے تیسج کے چاروں طرف ایک قسم کا زخم ہوتا ہے اسکو نواسیر
 کہتے ہیں۔ یہ ناسور ہوتا ہے۔ تپ دق کی آخری حالت میں اکثر زخم آسانی
 سے خشک نہیں ہوتا۔ اسی سبب ناسور یا نواسیر ہو جاتی ہے۔
 علاج :- پھنسیاں ہونے کے بعد سکن۔ مقعد شرج اور درد سہ
 کی علامت میں بیلادونا ۳ یا مرکب X۳ - پھنسیاں جو جگر مواد پڑنے کے آثار
 ہوں تو ہیرسلف ۳، سفوف۔ زخم سے زیادہ مواد بہتا ہو یا ناسور ہو تو

لکا۔ ۲۔ مرض تپ دق کے لئے سلینیم۔ ۳۔ (ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ) آنکھوں
یا ناک میں ناسور ہو تو فلورک ایسڈ۔ (مقعد میں ناسور ہونے پر لکا۔ ۶۔ یا
کلکیر یا فلوریکا ۸۱۲۔ سفوف، دو آؤنس پانی میں ایک ڈرام گلینڈیولا مدرٹس کچر
یا ہائیڈرک ایسڈ ۱۰۔ ملا کر ٹپی باندھنا چاہیے۔ یا پچکاری لگانا چاہیے۔
خاص خاص علامات میں کاسٹیم۔ ۱۔ چائنا۔ ۲۔ کلکیر یا کارب۔ ۳۔ نکس و امیکا۔ ۴۔
نائیٹرک ایسڈ۔ ۶۔ گریفائٹس۔ ۷۔ اسکیولس۔ ۳۔ رٹینا۔ ۳۔ کی ضرورت پڑتی ہے۔
ان سب کا حسب علامات استعمال کرنا چاہیے۔

علاج معاون:-۔ ماؤف جگہ پر سینگ دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جھلی یا گوشت
کھانا منع ہے۔ (مرض بواسیر کی غذا ملاحظہ ہو) مقوی غذا دینی چاہیے۔
(FISSURE-IN-AND) سمجھند

قبض کی وجہ سے پاخانہ ہوتے وقت کو تھننا یا زور دینے کی وجہ سے مقعد
کا عضلہ یا اس کے چاروں طرف کی بلغمی جھلی پھٹ جاتی ہے اسی وجہ سے
نکلنے وقت یا بعد میں بہت جلن ہوتی ہے۔ اور براز میں خون کی لکیریں معلوم
ہوتی ہیں اسی طرح شش۔ ۱۔ کا خاص سبب مقعد میں زخم ہو جانا ہی ہے
اس طرح پھٹنے کے وقت مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مریض
بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسی تکلیف تین چار گھنٹہ اور رہ سکتی ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کار آمد ہیں:-
گریفائٹس۔ ۶۔ پھٹنے کی طرح درد، بلغم کے ساتھ مقوڑا سخت پاخانہ نکلنا۔
نائیٹرک ایسڈ۔ ۶۔ ۳۔ پاخانہ ہوتے وقت اور بعد کو تیز کرنے کی طرح درد۔
جو گھنٹوں ہی جاری ہے۔ قبض اور سخت پاخانہ ہوتا۔
اسکیولس۔ ۳۔ مقعد میں سوزشی درد اور خشک اور سدھ ملا۔ زیادہ
دست ہونا۔ رفع حاجت کے بعد شدید جسمانی کمزوری۔

رٹینا۔ ۳۔ پاخانہ ہونے کے بعد بہت جلن معلوم ہونا۔ پہلے سے زیادہ جیسے
وہاں آگ لگتی ہے۔ کترنے کی طرح درد۔ اسہال یا قبض۔
بہی میلیں۔ ۱۔ (خراج خون کی علامت میں) اور آرس۔ ۳ (خراج خون یا

درد نہ ہونا) کی بھی گاہے گاہے ضرورت پڑ سکتی ہے۔

علاج معاون

یاخانہ جانے کے پہلے مقعد میں کھنی یا تیل لگانے سے براز آسانی سے نکل آتا ہے۔ قبض میں خوب گرم پانی کی پچکاری لینا۔ ضرورت پر گلینڈیولا۔ یا بھی میلین۔ یا اسکولس کا مرہم لگانا۔ قبض کو دور کرنے والے پھل (جیسے پکا پیتا۔ کیلا پختہ۔ انگور۔ لیون۔ انناس۔ کشمش۔ وغیرہ کھانا چاہیے۔

(مرض بواسیر کی دوائیں وغیرہ ملاحظہ ہوں۔)

خارش مقعد اور خارش اعضاء تناسل بیرونی

(PRURITUS ANI AND PRURITUS-PUDENDI)

بواسیر کرم مض بند، یکا یک کسی جلدی بیماری یا اخراج کا رک جانا۔ براز جمع ہونا۔ افیون۔ کلورل کا برابر استعمال کرنا۔ جگر کی خرابی وغیرہ اسباب سے مقعد میں تسکین۔ سٹریٹھٹ اور کھجلی ہوتی ہے۔ ریڈیم برومائیڈ ۲۰۔ ہر ہفتہ میں ایک بار کھانا چاہیے۔ اس سے اگر فائدہ نہ ہو تو اصلی مرض (جیسے کرم پیدا ہوئی کھجلی میں سائنایاٹیو بر کریم) طے کر کے علاج کرنا چاہیے۔

سلفر لائیو پوڈیم۔ پیرولیم، آرسی نکم الیم اور میٹرم میوور X۱۲۔ سفوف مقعد کی عمدہ دوائیں ہیں۔ کلیڈیم ابراہ۔ کاربوونج، کوئن سوئیا۔ لائیو پوڈیم۔ وغیرہ ادویات، حسب علامات اعضاء تناسل کے بیرونی حصہ خارش کے لئے اچھی اور کارآمد دوائیں ہیں

اوٹیم، نکس و امیکا، مرک، اگنیش، ایڈنائٹرک، ایلیمینا، اٹم کرڈ، ایکسین۔ ادویات کی گاہے گاہے ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ بوریکس۔ کاربوونک الیڈ، مرکری، کلینڈیولا، اسکولس، یا بھی میلین، ڈرنکچر کے مرہم یا لوشن کے بیرونی استعمال سے کبھی کبھی خوب فائدہ ہوتا ہے۔

(WORMS)

پیٹ کے کیڑے

کرم شکم یا پیٹ کے کیڑے جسم کے اندر ملتے ہیں جن قسم کے کرم انسان کے جسم میں دکھائی دیتے ہیں۔

(۱) مثلاً چنے یا چرنے یا سوتی کپڑے (چھوٹے چھوٹے سوت کی طرح

سے باریک کرم (SMALL THREAD WORMS)

(۲) کچھوے گول (LONG ROUND WORMS)

(۳) کدو دانہ لمبے فیتے کی طرح (TAPE WORMS) * گا ہے ماہ

ناک یا کان کے سوراخ میں بھی کرم موجود رہتے ہیں۔

(۱) چنوتے یا لمبے کپڑے :- یہ کپڑے کثیر تعداد میں مقعد کے باس رہتے ہیں۔ کبھی پیشاب کی نالی یا قرح میں چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان مقامات میں کھجلی ہوتی ہے۔ جلن ہوتی ہے۔ اور منی نکلتی ہے

چنے کی معمولی علامات یہ ہیں :- ناک کا اگلا حصہ یا مقعد میں کھجلی۔ سانس آنے جلنے میں بدبو۔ پاخانہ ہونے میں بے حد تکلیف۔ مقعد میں برابر کھجلی ہونے کی وجہ سے نیند نہ آنا۔ نیند میں دانت پینا۔

پٹروں کی لمبائی چوتھائی انچ سے ایک انچ تک ہوتی ہے۔

(۲) کچھوے :- یہ چھوٹی آنت میں رہتے ہیں۔

دیکھنے میں سفید۔ کبھی معدہ سے منہ میں آکر تھکے ساتھ نکلتے ہیں۔ کبھی پاخانہ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ عام علامات پیٹ پھولنا۔ پیٹ میں بہت درد۔ دانت پینا۔ نیند میں یکایک چلچلٹنا۔ ناک کے اگلے حصہ میں اور مقعد میں خارش۔ پیٹ سخت اور گرم جسم دبلا اور چہرہ زرد۔ آنکھ کی پتلی پھیلنے آنکھوں آلودہ براز۔ کبھی بہت بھوک۔ کبھی غذا سے نفرت۔ سانس میں بدبو۔ بے ہوشی۔ کبھی تھکے کرنے کی حاجت۔ منہ میں برابر پانی بھر آنا۔ اس کی لمبائی ۳-۱۲ انچ ہے۔

(۳) کدو دانہ :- سفید چٹے، گرہ دار لمبائی۔ آدھا فٹ سے ۲۔

فٹ تک۔ یہ بھی چھوٹی آنت میں رہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں ایک سے زیادہ

نہ۔ ان تین اقسام کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے کرم آجکل خون میں پائے گئے ہیں۔

ان کے مفصل بیان کے لئے بیان کرم، دھون، ملاحظہ ہو۔

نہیں رہتا۔ براز کے ساتھ اس کا کچھ حصہ ٹکڑا نکلتا ہے۔

خام پھل، زیادہ پختہ کیلا، شری جھلی، زیادہ مٹھائی کھانا، گندی حانت میں رہنا۔ وغیرہ اسباب سے پیٹ میں کرم پیدا ہوتے ہیں۔ اسکے علاوہ کان یا ناک سے اخراج خون وغیرہ ہونیکی وجہ سے یوں لے میں اس پر کبھی جا کر انڈا دیتی ہے۔ یہ انڈا ٹوٹ کر کرم پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کا کیر انک یا کان کے سوراخ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور روزانہ دو یا اس سے زیادہ نکلا کر تلبے پکڑے نکلتے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کرم پیدا ہو گئے ہیں۔ بچوں کے دوسرے امراض کے ساتھ اکثر کرم بھی موجود رہتے ہیں۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔
 سائنا ۲x ۲۰۰۔ آنکھ کی بتلی پھیلی نیند میں یکایک پیچھا اٹھنا۔
 یہ ہوشی، یاقے، دلتی، چکی، ناک کا اگلا حصہ کھلانا، مقعد میں سپک پیٹ میں اینٹھن پشیا ب تھوڑا۔ اور دودھ کی طرح بھوک کی ہوک، سائنا یا نا۔ تمام اقسام کے کرم کی عمدہ دوا ہے۔ اس سے فائدہ نہ ہو تو سے نم ۶۔ ۲۰ استعمال کرنا چاہیے۔ اس دوا کے کھانے سے جسم میں کرم نہیں رہتے۔
 ناف کے آس پاس اینٹھن کے ساتھ شدید درد۔

یو کری ایم X- مقعد میں تیز جلن، اعصاب کی تحریک سے سر میں چکر آنا۔
 اور نیند نہ پڑنا۔ اگر لمبے کرم ہوں تو یو کریم فائدہ کرتا ہے۔
 سینٹونائن X- سفوف۔ ہر قسم کے کرم میں یہ مفید ہے۔ پیٹ کے درد۔
 کی علامت میں پیٹ میں بچنی، ناک رگڑنا یا کریدنا۔ پٹھوں میں اینٹھن۔
 سپانی جلیا X- چھوٹے کرم کی اچھی دوا ہے۔

سلفر ۳۔ کرم کی وجہ سے قونجی درمیں۔ اور دوسری دوا کھانے کی وجہ سے بیماری کچھ گھٹ جانے پر بالخصوص جبکہ میٹھا کھانے کی رغبت زیادہ ہو۔
 کدودانہ میں۔ فلکس ماس ۵۔ مرک کارم X- کیوریم اسٹیکم ۲ یا سینٹم۔
 سفوف کدودانہ اور کچھ سے دونوں طرح کے کرموں کو دور کرتا ہے۔
 کچھ سے لے۔ سائنا ۲x ۲۰۰۔ سینٹونائن X- سفوف۔

چنولنے کے لئے۔ سینٹونائن XI، سفوف یا ٹیوبر کریم XI۔

کان اور ناک کے کرم کے لئے تھوڑا پانی میں ساٹنا XI ۶۔ بہت تھوڑا سفوف ملا کر اس سے ناک یا کان میں پچکاری لینا چاہیے۔

کیچوئے (ROUND WORMS) کے لئے کینوپوڈیم تیل فی خوراک۔ اقطرے دو گھنٹہ کے وقفہ سے تین خوراک دینا چاہیے اتنے ہی فائدہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر ہیوز اور ٹسٹ کا بیان ہے کہ لائیکوپوڈیم ۳۰ (دو روز تک) اور ۱۲ (چار روز تک) اور اسپیکال ۶۔ سات روز تک۔

استعمال کرنے سے کرم غارت ہو جاتے ہیں۔ کرم سے بچوں کو کلکیر یا ۲۰، ڈاکٹر شد فرماتے ہیں کہ غلہ کی غذا کھانے سے پہلے یولا اوڈر میٹا ۶۔ اور سوتے وقت رات میں سے نم ۳، استعمال کرنے سے کرم کا فساد جو آنوں آلودہ دست کی شکل میں نمودار ہو، دور ہو جاتا ہے۔ بکس و امیکا بھی مفید ہے۔

اصول

ایک شیشہ، یا پتھر کے برتن میں خام سپیت کی لسی ایک چمچہ اور خالص شہید ایک چمچہ اچھی طرح ملا کر اس میں پانچ چھ چمچہ خوب گرم پانی ملا دینا چاہیے۔
(REFINED CASTOR OIL) دو گھنٹہ بعد خالص ریندی

لہ کچے پیسے کے پتے اور ڈنٹھل سے جو سفید گاڑھا دودھ کی طرح عرق نکلتا ہے۔ اسی کا نام پیتیا کی لسی ہے۔

کدو کے (CUCUTOITA PEPO OR PUMPKIN SEED)

بیج کا سفوف، کدو دانہ کی اچھی دوا ہے۔ یہ اس طرح بنتا ہے، کڑی لوکی کی بیج گرم پانی میں خوش دیکر اسکا پھلکا الگ کر دینا چاہیے۔ اسکے اندر کا گودا دوا کے کام میں آتا ہے۔ دواؤنس میں ایک آؤنس گودا نکلتا ہے۔ خوراک بالائی کے ساتھ ایک آؤنس گودا کھانا چاہیے۔ بارہ گھنٹہ مکافا کر کے دوسرے روز صبح یہ دوا کھائی جاتی ہے۔ اور دو گھنٹہ کے بعد خالص ریندی کا تیل استعمال کرنا چاہیے۔
(CASTOR OIL)

اور لیون کے عرق کے ساتھ تین روز تک استعمال کرنے سے کرم غارت ہو جاتے ہیں۔ کڑوی لوکی کے بیج کا سفوف (X) کھانے سے بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے۔
سببہ کی ترکاری صبح و شام کھانا بہت مفید ہے۔

ایک بوتل پانی میں کھوڑا انگ ملا کر روزانہ تین چار مرتبہ مبرز میں پچکاری لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

ہلکی، مقوی غذا کھانا چاہیے۔ میٹھی چیزیں، خام پھل، گندلا پانی، سڑی پھلی کھانا ممنوع ہے۔ ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔

کڑوی، نمکین اور تیل کی پکی ہوئی چیزیں مفید ہیں۔ سینہ صانک کے ساتھ کاغذی لیون کے دیش، بارہ پتے پس کر کھلانا فائدہ مند ہے۔

چند دوسرے امراض کرم

۱۔ کچھ باب میں مذکورہ کرم کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے کرم ہیں۔ جبے کرم خون وغیرہ؛ کرم خون بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس جگہ طفیلی (PARASITIC) کرم کی وجہ سے امراض کا حال لکھا ہے۔

۱۱۔ کرم خون کا مرض (۲) فیل پا (۳) نسج غارت کن کرم کا مرض، (۴) اتر مچھے کرم کا مرض (۵) چپٹے کرم کا مرض (۶) مکھی کا ٹٹنے کا مرض۔
کرم خون کا مرض (FILARIASIS)

اس مرض کا خاص سبب ایک قسم کا کرم فلیریا نام کا ہے۔ یہ دوسرے کے جسم میں مضبوط اور دیکھنے میں لانا پتلے سوت کی طرح رہتا ہے۔ سوت کی طرح بیتلا یہ کرم چار ہفتہ تک لانا پتلے اچھ تک موٹا ہو سکتا ہے۔ مرض کے خون یا لار (رطوبت) میں یہ کرم موجود رہتا ہے۔

اس قسم کے جراثیم مچھر کے ذریعہ تندرست جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جن کو یہ مرض ہوتا ہے ان کا خون جو کرم مچھر کے کاٹنے سے اس کے اندر تندرست جسم میں پہنچتے ہیں۔ اور اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔

اس مرض میں کوئی خاص خرابی نہیں ہوتی۔ کسی کی گلٹیاں بڑھی ہوئی خاکرہ دونوں پیروں کی جیسے گود دینا، کسی کا پیشاب کا دودھ کی

طرح اور کسی کے فوط میں درم ہوتا ہے یہ تکلیف عموماً اناوس یا پورٹاشی کے اس پاس پھیلتی ہے۔

علاج

دوا کھانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ضرورت ہو تو نشتر لگوانا پڑتا ہے۔ اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ چمچر کاٹنے پائیں۔ جب یہ بیماری پھیلتی معلوم ہو وہاں گرم پانی پینا چاہیے۔

(۲) فیل پا (ELEPHANTIASIS)

مذکورہ بالا باب میں کرم خون ہی گرم مالک میں مرض فیل پا کا خاص سبب ہے جن مالک میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی۔ وہاں دوسرے اسباب سے (جیسے سوزش، سرخادہ، اکوتہ، عرق جاذبہ کارکنہ) سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کرم خون مرض کی دوسری حالت میں ہمیشہ یہ بیماری ہوتی ہے۔ جسم کے ماؤف حصہ کی (جیسے فوط وغیرہ) نسج بے ڈھنگے طور سے بڑھ جاتے ہیں۔ عرق دمویہ، پٹھے، عصب، یا ہڈیوں کی جگہ بڑھ جاتی ہیں۔ ابلہ پیدا ہو جاتا اور اس سے دودھ پانی کی طرح رطوبت نکلنا۔ اکوتہ، جلد پر مواد بھرا زخم ہونا اور بخار وغیرہ اس بیماری کی مخصوص علامات ہیں۔

ہائیسٹرڈ کو ٹائل مدرٹسکچر ۱-۱۰۔ اس کی بہترین دوا ہے۔ اگر ہائیسٹرڈ کو ٹائل سے فائدہ نہ ہو تو اناکارڈیم ۱-۳ استعمال کرنا چاہیے۔ اناکارڈیم سے بھی اگر فائدہ نہ ہو تو نشتر لگوانا ضروری ہو سکتا ہے۔ زخم اکوتہ اور بخار وغیرہ دیکھ بانے کے لئے ان امراض کے بیان میں جو دوائیاں ہیں ان میں سے انتخاب کرنا چاہیے۔

(۳) نسج کا غارت کن کرم کا مرض

(DACONTIASIS)

ایک قسم کے کرم خون موسومہ (DRACUNCULUS MED)NEUSIS سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان اور افریقہ میں یہ مرض نمودار ہوا تھا۔ غالباً نر اور مادہ کرم کسی طرح پیٹ میں داخل ہو جانے سے

وہ کرم حاملہ ہوتی ہے۔ اور نہ کرم مر جاتا ہے۔ اور انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ مادہ کرم آنتوں میں سوراخ کر کے جلد کریدتے کریدتے کھٹنے اور تلوے کی طرف بڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹا زخم ہوتا ہے اور اسما زخم سے اس کے بچے نکلا کرتے ہیں۔ جب وہ بچے نکل جاتے ہیں تو مادہ کرم خود بخود نکل جاتی ہے۔

علاج :- ٹیوکریم اور ہینگ کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مریو ریس کا جکشن بھی کرموں کو ہلاک کرتا ہے۔ زخم پر پانی ڈالتے ہیں سے کرم نکل جاتے ہیں۔ گاڑے گاڑے وہ آپ ہی آپ نکلتی ہے۔ اس وقت ایک بار کانٹا سے اس طرح گھا کر نکال ڈالنا چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر جسم میں نہ رہ جائے۔ ورنہ مہلک شکل اختیار کر لے گا۔

(Wook worm)

(۴) ٹیڑھے کرم کا مرض

باشندگان ہندوستان یا دوسرے گرم ممالک کے چھوٹی آنتوں میں سوت کی طرح ایک قسم کے چھوٹے کرم ہوتے ہیں۔ اور ان کی نرم جلد کو اندر ہی اندر کھاتے ہیں۔ اس طفیلی (PARASITE) کرم کی لمبائی نصف انچ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور موٹائی بال کے برابر۔ ان کے سر میں ریک کی شکل کے ٹیڑھے ٹیڑھے دو دانت ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو ہک

(Hook) اور مس کہتے ہیں۔ جلد خاص کر پیروں کی انگلیوں میں، اور تلوے کی جلد میں سوراخ کر کے یا غذا میں مل کر کسی طرح یہ کیڑا جسم میں داخل ہو کر دانتوں سے چھوٹی آنت کا بالائی حصہ پکڑ لیتا ہے۔ اور چونک کی طرح انسان کا خون چوستا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مرض کے کل مریضوں کو ٹیڑھے کرم کا مرض یا ہک اور مس ہوا کرتا ہے۔ انہی فیصدی یہ مرض ہوا کرتا ہے۔

خون کی کمی کا برابر بڑھنا۔ (جیسے ڈبلا پن) چہرہ زرد۔ قوت ہضم کی کمی! تھکاوٹ محسوس ہونا۔ آنکھوں کی روشنی کم ہونا! دل دھڑکنا۔ نفخ شکم، تلی اور جگر کا بڑھنا۔ ہاتھ پیر میں پھوٹا

اور کھل ہونا۔ بچوں کے جسم کا نسودنا حسب تناسب نہ ہو گا۔ اس مرض کا مخصوص علامت ہے۔ خوردبین سے دیکھنے پر کسی کسی آدمی کے براز میں اس شیرے کروں کے انڈے دکھائی دیتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرض ہو گیا ہے۔
علاج

تھائی مول (THYMOLE) اس مرض میں بہت مفید ہے۔ دوا کھانے سے ایک روز پہلے کوئی ثقیل چیز نہ کھلانا چاہیے۔ (ضرورت ہو تو فاقہ بھن کرانا چاہیے) صبح پہلے چھ بجے اور پھر آٹھ بجے رات کے وقت ایک خوراک۔ (مریض کے عمر اور حالت مرض کی کمی اور زیادتی کے موافق) تھائی مول سے ۳-۴ گریں تک استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دس بجے کے وقت کیسٹر آئیل اسپم سا بہرہ لایا کوئی دوسری دست آور دوا کھلا کر جلاب دینا چاہیے۔ دوسرے ہفتہ میں اسی طرح سے علاج کرنا چاہیے۔ کمزور مریض کو تھوڑی مقدار میں تھائی مول زیادہ دنوں تک کھلانا چاہیے۔ تھائی مول کے عوض فلکس اس کام میں لایا جاسکتا ہے۔ چٹو پوڈیم (CHENO PODIUM) انیتھل یٹیکم مدرٹیکر ۱۰ دس قطرے کی ایک خوراک؛ دو گھنٹہ کے وقفہ سے تین خوراک صرف ایک روز استعمال کرنے سے ہی اکثر اُمید سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ م

۱۰ کسی طریقے سے انڈے یا ان سے پیدا ہوئے کیڑے ہلکے جاسکتے ہیں۔ جیسے میدان کی کسی مقامی جگہ میں پاخانہ جا کر اسکو جلا دینا (۲) گاؤں کے کچھ دور دورے ڈونٹ گہرا گڑھا کھود کر اس میں برازدفن کر دینا چاہیے۔ (۳) کچے اینٹ اور چونے سے بنے پانی سے بھرے گڑھے میں اس طرح براز چھ ماہ تک رکھا کر اس میں کھنڈ لگے (۴) سنگے پیرہ چلنا اور احتیاط رکھنا چاہیے کہ مٹی کا پانی پیرہی نہ لگنے پائے۔ (۵) کیڑا بڑا ہونے پر وہ پانی میں بھر رہ سکتا ہے۔ اور ترنا نہیں جانتا۔ اس سے مٹی میں ملا رہتا ہے اس لئے گندہ پانی پینا منع ہے۔ ان طریقوں پر خیال رکھنے سے کرم جسم میں نہیں داخل ہوتا۔ (دندوستان کے میڈیکل سروس کے ڈائریکٹر جنرل (بقیہ جیت پر)

اس طرح :- جسم سے بک ورم نکل جانے پر کئی خون : اور امراض کرم کی دوائیں جیسے چائنا، فیرم ایڈفاس، اسٹینم، سائٹا، سپائی جلیا، یٹو کریم وغیرہ علامات کے مطابق پھر مرتبہ تک استعمال کرنا چاہیئے۔

(BILHARZIA SIS)

(۵) جیسے کرم کا مرض

ایک قسم کے کرم خون موسومہ کی (BILHARZIA HAMATOBIA)

وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ عرب، فارس، مغربی سن، وستان اور مصر وغیرہ مالک اس کی تفریح گاہ ہیں۔ جلد، منہ کا جوف، پیشاب کی نالی یا کسی دوسرے طریقہ سے جسم انسان میں داخل ہو جاتا ہے۔ شاید پینے کے پانی کے ساتھ ان کے انڈے مریض کے جسم میں داخل ہو کر مہرز مثانہ وغیرہ پر نما کرتے ہیں۔ مثلاً : پر مریض کا حملہ ہونے پر مثانہ میں درد، ورم، اخراج خون سوزش مثانہ، مثانہ کی پتھری (مہرز کے اسباب ہونے پر) کو سختی آنیوں نکالنا، مقعد میں جلن وغیرہ اس مرض کے مخصوص علامات ہیں۔

علاج :- مہرز میں مریض ہونے پر ہائیڈراسٹس x؛ روٹا x؛ مایکٹانائی x۔
چیونیا ۳۔ مفید ہیں۔ مثانہ پر مریض ہونے پر کناس سیٹ ۱۰۔ ہی میلیس ۱۰۔
کینتھرس ۳۔ ٹری بنتھ x۳۔ اوسمیٹھ ۱۰۔ نینرویک ایڈ ۳۔ وغیرہ کی آزمائش کرنا چاہیئے؛ اکثر مقامات پر نشتر لگوانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

(IGGER.)

مکھی کا ٹٹنے کا مرض

اس قسم کی جنگلی مکھی موسومہ (FULEX PENETRANS) کے کاٹنے سے یہ مرض کہلاتا ہے۔ اس مرض میں خاص کردو لڑاں پیروں پر مریض کا حملہ ہوتا ہے۔ اگر مکھی جلد میں سوراخ کر دے یا گڑھا کر دے تو وہاں پانی یا

(بقیہ صفحہ ۵۸۸ کا) بمحکمہ ثنائی ملاحظہ ہو۔

۱۹۳۰ء میں ٹیڑھے کبڑے کا مرض دفع کرنے کے لئے ڈاکٹر لیفین کو سرکار ہند نے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے چار ہزار مریضوں کو یہی جنوبی ڈیم کھلا کر اچھا کیا تھا۔
انکی رائے میں یہ تھائی مول زیادہ مفید ہے۔ لاپتہ کتاب موسومہ "چٹونے۔"

بھری پھنسیاں ہوتی ہیں اور ان میں جلن ہوتی ہے۔

علاج

سوئی سے کیڑے باہر نکال دینا چاہیے۔ اور یہ کیڑا پھر جسم میں سرایت نہ کرے اسلئے جو ضروری وغنیات (ESSENTIAL OILS) کام میں لانا چاہیے ہوائی کرم۔ اڑنے والا کرم (FLYING WORM) رط کے راکیوں کے پتلے دست کے ساتھ وقتاً فوقتاً ایک قسم کا اڑنے والا کیڑا انگلتا ہے، اسی کا نام ہوائی کرم ہے، کسی کسی آم کو کاٹنے کے ساتھ ہی جس طرح اس میں سے ایک قسم کا کیڑا اڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا کیڑا کسی کسی رط کے کو پاخانہ ہوتے ہی اس میں سے اڑ جاتا ہے۔ ضلع فرید پور کے برہم گنج۔ کلم روہا وغیرہ مقامات میں آم کی فصل کے وقت (یعنی جیسٹھ۔ اسارٹھ ماہ میں) دست کے ساتھ ایک کیڑا دکھائی دیتا ہے۔

ہومیو پیتھک معالج آر سنک! چائنا۔ کلکیریا کارب، نکس و امیکا، سلفر، پوڈوفالکلم، فاسفورس، وغیرہ دوائیں علامات کے مطابق دے کر بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مختلف قسم کے کرم، اور ٹیڑھے، تریچھے کرم نئے مرض کی دوائیں ملاحظہ ہوں۔

سوزش جگر۔ ورم جگر (HEPATITIS)

مزمن ملیریا بخار، بارہ کوئین کا غلط استعمال، زیادہ شراب پینا۔ گرم مقام میں رہنا۔ وغیرہ اسباب سے جگر میں خون جمع ہو کر ورم ہوتا ہے۔ اس ورم کے مزمن ہونے پر جگر بگڑ جاتا ہے۔ اور سخت ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ پیٹ کے دائیں جانب پھیل جاتا ہے۔ مریض کے مادہ درجہ میں شروع میں تب، لرزہ، کے ساتھ بخار آتا ہے۔ اس کے بعد جگر کے اوپر درز، درد سر، اور ذائقہ خراب، زبان پر میل جما، بھوک نداشت، کیچڑ کی طرح میل، یا سفید زست۔ دائیں کندھے میں تھکڑا تھوڑا درد۔ اور دائیں کوکھ میں بوجھ محسوس ہونا۔ وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ شروع کی حالت میں اجتہاد خون بند ہونے پر دوسرے علامات بھی

کم ہو جاتے ہیں۔ اگر اجتماع خون زود رہو سکے تو کل علامات آہستہ آہستہ تیز ہو جاتے ہیں۔ جیسے دائیں کندھے میں تیز درد؛ زود سے سانس نکالنے یا بامیں کروٹ سونے یا کھانسنے سے درد کی زیادتی۔ تھکے یا متلی؛ پیشاب زر قبض یا پستے دست آنا وغیرہ علامات نمودار ہو کر جگر اور کبھی بڑھ جاتا ہے۔ مرض جب شفا کی جانب رخ کرتا ہے۔ تب یہ علامات کم ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو آہستہ آہستہ سردی والرزہ کے ساتھ رات میں تیز بخار ہو کر جگر میں ایک چھوٹا سا چھوڑا ایک کمریض مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جگر چھوٹا ہو جاتا ہے اور بانی حقتہ جسم میں استقامت ہو کر مریض مر جاتا ہے۔

جگر کے اجتماع خون کے ساتھ کبھی کبھی اس کے فعل میں خرابی اور اخراج خون رک جاتا ہے۔ ہندوستان میں اکثر جگہ گرم کی خرابی کی وجہ سے بھی جگر میں ایک قسم کی آبی رسولی (HYDATID DISEASE) ہوتے دیکھا گیا ہے اکثر مقامات کے قابل ڈاکٹروں کی رائے سے چیلی ڈونیم ۵۰ (خوارک ایک سے پانچ قطرے) دو مرتبہ استعمال کرنا۔ یہ تمام قسم کی امراض جگر کی بہت اچھی دوا ہے۔ جگر اور تلی کے بڑھنے؛ اور درد میں؛ کارڈس میری آئس ۵۰ پانچ قطرے روزانہ صبح اور شام کے وقت استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ جگر میں سرطان، کنیسر ہونے پر گلیس ٹریٹمنٹ ۳۰ سفوف فائدہ کرتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

۱۰ جگر کا بڑھنا؛ مرک؛ نائیرٹک ایسڈ؛ ایگاری کس۔ فاس؛ چائنا؛ تپ دق۔ ملیر یا دیگرہ کے بعد جگر بڑھنے پر؛

۱۲ خطہ جگر میں درد؛ ایکونائٹ (سرد؛ خشک ہوا گھٹنے کی وجہ سے جگہ سخت؛ یا اس میں درد ہونے پر) برالیو نیا۔ اجلی کھینچنے یا ڈنک مارے کی طرح درد؛ یا وجہ مفاصل کی طرح درد۔ مرک سبڈ می۔

۱۳ صفرا کی زیادتی کی علامت میں برالیو نیا (صفرا یا بلغم کی تھکے) بکس و امیکا۔ دھوک اشیا یا زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے یا امراض بواسیر کے ساتھ اسلفر (قبض) مرک۔ (سفید دست) ایکونائٹ (سردی

سے زیادتی صفر میں (کیونکہ دفعہ کی وجہ سے) آئرس! رتنے کی وجہ سے
 درد سر، لائیکو ہیپر سلفر، پلپس۔ پوڈو چیلی ڈوئی ایم۔ پیراکس!
 ۴۱، اسہال جو صفر کی وجہ سے ہو، پوڈو فانیلم۔ (ذائقہ کر ۱۰-۱ اور
 پیشاب سیاہ، آئرس ورس کیو بر۔ (موسم سرما میں) تھے آدست، چائنا (موسم گرم
 تھے معمولی اسہال میں) کیو ملا۔ عورتوں اور بچوں کے اسہال میں مفید ہے۔
 ۵، پیٹ میں استسقا ہونے پر کروٹن، آئرس، ایڈناٹیک۔

چند خاص ادویات کے علامات

ایکونائٹ ۱-۶۔ (جگر کے درم حاد میں)۔ جاڑا اور لرزہ کے ساتھ
 بخار جگر میں درد، یرقان کا اندیشہ۔ یکایک سرد ہوا گٹنے کے بعد آئی تکلیف میں مفید
 نکس و امیکا ۳۰ x ۱۔ زیادہ غذا۔ محرک کے کھانے پینے یا شراب پینے
 سے پیدا ہونے جگر کے فرمن ورم میں، قبض اور غذا کے ساتھ درد مکی
 زیادتی۔ گرم دودھ، گرم دوا کھانے کے بعد جگر کا ورم۔ نکس و امیکا کے
 استعمال کے بعد اکثر لائیکو پوڈیم کی ضرورت پڑتی ہے۔

چائنا ۴۰ x ۳۰۔ بہت دلوں تک بخار میں مبتلا ہونے سے خون کی کمی، تلی
 بڑھنا۔ جگر اور سخت ہونا۔ کمزوری، زیادہ مقدار میں ایلو پتھی، امر کر میا کے
 استعمال کی وجہ سے امراض جگر میں بالخصوص کارآمد ہے۔

مرک دائمی دس ۳۰ x ۴۔ جگر کے ورم حاد میں، یا مزمن ورم کی وجہ
 سے جگر بڑھ جانے پر، جگر میں آماس، سختی، رخت جگر میں دباؤ کی
 وجہ سے درد، کسی وجہ سے مرین دایس کروٹ نہ لیٹ سکتا ہو۔ زرد
 آنکھیں، بھوک کی کمی، سفید رنگ کا سخت براز، صفراوی دست، منہ بذاائقہ!
 سانس میں تکلیف، سردی کے بعد زیادہ لیسڈ اسپینہ لیکن پارہ کے
 عطا استعمال سے پیدا شدہ جگر کی بیماری میں (خاص کر بیلا دست
 ہونے پر) ہیپر سلفر ۶۔ استعمال کرنا چاہیے۔

چیلی ڈوئی ۳۰ x ۳۰۔ جگر میں تیز درد، جو دایس کندھے یا دائیں
 کندھے کی ہڈی تک پہنچے، زرد رنگ کا پتلا دست، یا سفید رنگ کا

سخت پاخانہ؛ تمام جسم کا رنگ زرد پڑ جائے؛ زرد رنگ کا گاڑھا پٹاب،
جگر کی مزمن بیماری میں زبان پر گاڑھی زرد رنگ کی تہہ قیض، جگر کی گانٹھ
کا سخت ہو جانا جسم میں خون کی کمی وغیرہ۔

کیلی کارب ۳۰: ۱۔ جگر میں سوئی چھنے کی طرح درد۔ یرقان، استقار،
کمر میں ران تک؛ دھاکر دائیں جانب درد؛ ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے سوئی
چھنے کی طرح درد؛ پیٹ پھولنا۔ ریاخ خارج نہ ہونا جگر کی پرانی سختی اور دکھن؛
لیکس ۶۔ جگر میں درد؛ کمر میں کیڑا تک نہ برداشت ہو؛ پیڑ ویا ریاخ؛
اور درد، محسوس ہو کہ مقعد سے ناف تک کوئی کھینچ رہا ہے۔ شراہوں
کے درم جگر میں۔

سلکا ۳۰: ۱۔ پیٹ سخت اور ریاخ سے پر؛ قونجی یا کترنے کی درد۔
ہاتھ زرد ناخن نیلے جگر میں پھوڑا؛ پیٹ میں گڑگڑاہٹ اور بیرونی
حرارت سے راحت ملے۔

تھائی رائیڈن ۳۰: جگر میں پھوڑے کے ساتھ سرکھو منا اور متلی؛ جگر
میں جلن بائیں پیٹ میں درد؛ دھاکر تلی کے اوپر میٹھا کھانکی زبردست خواہش
فیرم پکرک ۶۔ صفراوی کمروری میں کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد؛
مریکا ۳۰: بچوں کی یرقان یا جگر کی خرابی میں نیند نہ آنا۔

نیٹرم میور ۳۰: جگر میں سوئی چھنے یا چٹکی کاٹنے یا دبا رکھنے کی طرح درد
نفش کم کبھی کبھی پیٹ گڑگڑانا اور اس کے ساتھ ہی بخار؛
نیٹرم سلف ۳۰: چھوٹے یا حرکت کرنے؛ زور سے کھانسنے، اور سانس لینے
پر جگر میں درد محسوس ہونا۔ کیڑا نہ پہننے پر ناف کے چاروں طرف درد محسوس
ہونا۔ کھانا کھانے پر درد کم ہو جانا۔

ڈاکٹر شو سلی کی رائے سے ہر قسم کے امراض جگر میں بہت مفید ہے۔
پوڈوفائلیم ۳۰: ۱۔ جگر کے حاد ورم میں قبض رہنے پر ۳۰۔ طاقت کی
مزمن ورم میں ۲۰۔ طاقت کی جگر مرطا اور اسکے ساتھ صفراء کی تہ ہونا
صفراء ملا پتہ دست؛ اجابت کے وقت کاپنج باہر نکل آتی ہو؛

ذائقہ کر دیا۔ پیشاب سیاہ۔ چہرہ میلہ سر کے اگلے حصہ میں درد۔ (خاص کر سر کے اگلے حصہ میں تیز درد)۔ زبانے سے درد میں افادہ ہوا۔
 فاسفورس ۳۰:۳۰ جگر بڑا اور سخت ہو کر پھر آہستہ آہستہ گھٹ کر
 چھوٹا ہو جانے پر اور آخر میں مرض اسمہال ہونے پر مرض استسقاء۔
 مرض یرقان ہو۔

بریس ۱۰:۱۰ جگر میں اجتماع خون ہو کر پیشاب کی نالی۔ ران کمزور اور پیٹھ میں
 درد یا بالخصوص اگر بوا سیر و حیض یا آلات بول کی خرابی بھی ساتھ ہو تو مفید ہے۔
 برالیو نیا ۳۰:۶۰ جگر بڑا اور سخت۔ سولی چھیننے کی طرح یا جلن کا ایسا
 درد دبا کر پڑنے پر اس درد کا بڑھنا۔ قبض۔ آجابت کی حاجت نہیں ہوتی
 دوران سر۔ دائیں کندھے میں درد۔ آنکھ اور جسم کی جلد زرد۔ جگر کے
 حاد ورم میں مرکبوریس کے ساتھ کے بعد دیگرے استعمال کر کے کسی کسی
 معالج کو اس کے مفید ہونے کا تجربہ ہوا ہے۔

لائیکو ۱۲:۳۰۔ ریاح کی وجہ سے نفع۔ شکم اور قبض۔ ہیٹ دباؤ کی طرح
 درد اور سانس لینے سے درد کی زیادتی۔ دائیں بطن اور پشت میں درد۔
 لمپ ٹنڈرا ۱۰:۶۰ زبان زرد۔ صغرا کی تھ۔ بہت سیاہ اور سڑا
 بدبو دار دست۔ الکتر کی طرح اور بدبو دار دست۔ جگر میں ناقابل برداشت
 درد۔ یہ درد پیٹھ کی ریٹھ تک پھیلا ہوا۔ یرقان کے ساتھ سیاہ رنگ
 کا دست۔ معدہ کی بیماریاں۔ استسقاء بالخصوص جگر کی وہ خرابی جو
 ملیریا بخسار کے بعد ظاہر ہوتی ہو۔

آرس ۳۰:۳۰ جگر بڑا۔ استسقاء۔ پیشاب تھوڑا۔ قوت زلیت کا گھٹنا
 پیاس مزمن مرض جگر جلن پیدا کر نوالا درد۔ تھ۔ پاخانہ ہونے کے بعد ہی عشت ہو جانا۔
 سیبا ۳۰:۳۰ رحم اور مثانہ کے فعل کی خرابی کے ساتھ جگر کا مزمن ورم۔
 کمزوری۔ قوت ہاضمہ کمزور۔ اور نفرس استسقاء
 ہیمیرسلف ۳۰:۳۰ سفوف۔ سانس لینے کھانسنے یا حرکت کرنے سے درد کی
 زیادتی۔ یہ درد دیکھنے تک بڑھ جاتا ہے۔ بوا سیر کی بیماری کے ساتھ

جگر میں اجتماع خون سے پیدا ہوا فرمن ورم؛ بارہ کے غلط استعمال سے پیدا ہوا؛ مرض جگر ہونے پر کارڈیاکسٹس۔ (نی خوراک ایک سے ۵ قطرے تک) جگر کے ساتھ مرض طحال تے یا متلی کبھی گردہ میں تکلیف یا درید کی سوجن؛ آرام نائٹرک ایسڈ؛ ہائیڈراسٹس؛ لوہیاری انس۔ آرئی تھو؛ گیلیم، وغیرہ ادویات بھی گامے سے حسب علامات کارآمد ہیں۔

اصول:- جگر پر گائے کے چھوٹے بچے کا گوشت گرم کر کے سینکنا چاہیے۔ بخار ہو تو ساگودا نہ، بارلی؛ آرد وٹ وغیرہ بلکہ غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہر قسم کا گوشت، مچھلی؛ مرغن غذا کھانا ممنوع ہے؛ مرض جگر میں آرام کرنا پوری بالیشوری؛ وغیرہ سمندر کے کنارے مقامات میں رہنا مفید ہے۔

یرقان (JAUNDICE)

جگر کا فعل خراب ہونے کی وجہ سے صفرا اچھی طرح خشک نہ ہو کر خون میں رہ جاتا ہے۔ اس سے مرض یرقان پیدا ہوتا ہے۔ عیاشی؛ محنت نہ کرنا۔ دماغی جذبات یا صفراوی مرض پتھری میں مبتلا ہونا۔ زیادہ مقدار میں کوئین کیلول؛ ربارب، وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس مرض میں مریض کے جسم کی جلد، آنکھ کا، کوہیہ؛ ناخن کی جڑ؛ اور پیشاب زرد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض جلدھرادر جس چیز کو دیکھتا ہے؛ وہی اس کو زرد معلوم ہوتی ہے۔ اور بستر پر پسنہ؛ لگنے سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے؛ قبض یا اسہال پیٹ میں درد۔ ذائقہ کڑا؛ کیچڑ کی طرح یا سفید رنگ کا دست۔ نبض سرتج یا بطی؛ اور ضعیف ہونا۔ تے، سہجکی۔ صستی وغیرہ علامات اس بیماری میں کمزور رہتے ہیں؛ مرض سخت ہونے پر اکثر مرض کی موت ہو جاتی ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

(۱) حاد یرقان میں؛ ایکونائٹ؛ کیولڈا۔ مرک؛ نکس و امیکا۔ اور ہائیڈراسٹس (۲) نی خوراک ۵ قطرے (۳) مرض یرقان میں؛ جیلی ڈو نیم؛ چائنا؛ بوڈوفائلم؛ فاسفورس؛ ڈچ۔ ایسڈ نائٹرک۔

(۳) صفراوی پتھری سے نقصان میں :- ایکونائٹ - کلکیر یا کارب سو - یا بار بیرس - بیلا ڈونا وغیرہ امراض صفراوی پتھری کی دوا میں استعمال کرنا مناسب ہیں۔ اور پتھری نکلنے وقت پیٹ میں جس جگہ درد ہو وہاں بہت گرم پانی کی پٹی باندھنی چاہئے۔ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔

چند ادویات کی مخصوص علامات :- ۱۔ مرض یرقان کے ساتھ درم کی حالت

میں اور جگر میں تیز درد میں :- ایکونائٹ ۳x۴ - قبض - پیشاب زرد بستر پر

زرد داغ لگنا - نبض ضعیف اور لین - تمام جسم زرد - علامات میں مرک ۱x۶،

ایکونائٹ استعمال کرنے کے بعد مرک فائدہ کرتا ہے۔ پیریا سے پیدا

شدہ یرقان میں :- صفرا غلا پتلا دست - نوبتی یرقان - صفراوی یا پتھری - بیلا

اور زرد چہرہ - جگر میں کٹا چھنے کی طرح درد - ذائقہ کڑوا - غذا سے نفرت -

بہت کمزوری کے علامات میں چائنا ۳x۶ - پورے طور سے یرقان -

نیند نہ آنا - کندھے کے ہڈیوں میں درد - ریاخ خارج نہ ہونا - عضلات

میں درد وغیرہ علامات میں مرک ۱x۳۰ - یرقان کے ساتھ قبض - جگر

میں درد - غذا امت و بہت محروم کے کھانے پینے یا محنت نہ کرنی وجہ سے

مرض ہونے پر ٹیکس دامیکا ۱x۳۰ - دایس فرف دبا سکے سونے میں جگر کی جگہ پر

تیز درد - میں برالو نیا سو - یرقان کے ساتھ جگر میں اور دایس کندھے میں درد،

اور اکڑن - زبان صاف یا گہرے سرخ رنگ کی - ذائقہ کڑوا - زرد رنگ کے

دست میں چیلی ڈونیم ۱x۲۰ - جسم کی جلد اور آنکھیں بھوری، زرد رنگ

کیا، ہمیشہ بہت ٹھیلے زرد رنگ کا دست - سیاہی مائل بھورا پیشاب -

آواز بیٹھی - کھانسی اور ناامیدی وغیرہ تیز علامات میں فاسفورس سو - ۴ -

سرسامی یا مہلک علامات میں :- شدید یرقان کے بعد مدد مہی ہونے پر، پارہ

کے غلط استعمال کی وجہ سے یرقان ہونے پر کمزوری - ڈبلا پن - بخار کے بعد

خراب قسم کا یرقان ہونے پر آر اس ۲x۳ - داکٹر بارنٹ نے استعمال -

دغا ہکر مزمن حالت میں - کمر کے بہت فائدہ دیکھا ہے۔ خوف یا غصہ کی وجہ

سے یرقان یا بچہ کے پیدا ہونے پر یرقان ہونے میں کیمو ملا ۶ - خون

خواب ہو کر یرقان ہونے پر اگر وٹیلین ۳۔۳۔۳ میں یرقان میں آیو ڈ ۳۔۳۔۴۔
(دبھی ٹیلین ۳۔۳) پو ڈو فاکلم ۱۰۔۱۰۔۱۰ ہائیڈراسس ۵۔۵۔۵۔ لیپ ٹنڈر ۱۰۔۱۰۔
ایڈ فاس ۳۰۔۳۰۔۳۰ وٹیلین ۲۰۔۲۰۔۲۰ دو ایس علامات کے مطابق بیج بیج میں
استعمال کی جاسکتی ہیں۔ ڈاکٹر سو سٹار اور اس کے پیرو ہر طرح کے یرقان میں
نیزم سلف ۱۲۔۱۲۔۱۲ سفوف استعمال کر اگر فائدہ نہ ہوتا ہے ہیں۔

مختصر غذا :- ڈبل روٹی سنیکل ہوئی بسیب بھنا ہوا (ROASTED)
 خوب ٹھنڈا پانی پینا۔ پختے ہوئے دودھ کا پانی پینا۔ خوب گرم میں فالین بھگو کر
 ماؤف جگہ پر سنیکنا چاہیے۔ آب و ہوا بدلنا۔ گھوڑی کی سواری فائدہ مند ہے۔
 غذا پر پوری نظر رکھنی چاہیے۔ بخار ہونے پر سالودا نہ باری۔ آر۔ روٹ۔
 بخار نہ ہونے پر پرا نا چا دل؛ شور بہ نیز گوشت کا دینا چاہیے۔ چھلی دودھ،
 گھی اور مٹھائی ممنوع ہے۔ (پختہ پھل خصوصاً کھانا مفید ہے)

(ENLARGED SPLEEN) لی کا بڑھ جانا

جسم میں غیر پاک زہر اثر کر نیکی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ بخار میں، حبا ڈا کی حالت میں اجتماع خون ہونے پر وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسکے علاوہ امران دل۔ موقوفی حیض، پاکالہ بنار، لوبو اسیر کا خون رک جانا، پر تلی بڑھ جاتی ہے۔ تلی بڑھنے پر تمام جسم میں خون کمی اور زردی ہو جاتی ہے۔ اور قوت ہاضمہ کی کمی، قبض و اسہال، اور کمزوری وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ تلی آہستہ آہستہ بڑھ کر پیت کے بائیں جانب پھیل جاتی ہے۔ اور اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پیچھر کا ٹکڑا دکھا ہوا ہے۔ جس سے سخت ہونے پر اسہال یا پیچش ہوتی ہے۔ بھوک نہیں رہتی۔ دانت کے سوراخ پھول جاتے ہیں۔ اور اس سے خون نکلتا ہے۔ اور آخر میں مریض استسقاء ہو کر مرتا ہے۔

7. 11. 18

میر یا بخار کے ساتھ تھکا سکتے ہیں۔ دوسرے پر پہلے بخار ہی کا علاج کرنا چاہیے۔ ہر قسم کے مرض طحال میں ڈاکٹر یا دھندلے سپیشلسٹوں استعمال کرانے کا صراحہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری دوا کام میں لانے کے

پہلے سیدنا نقیصہؓ پانچ بوند فی خوراک استعمال کرنے پر کوئی فائدہ نہ ہوتا علامت
 نئے مطابق دوسری دوائیں کام میں لانی چاہئیں۔ حاد ورم طحال میں ایکونائٹ x۳
 تلی کے اوپر ڈنک مار نیکی طرح درد ہو یا اینٹھن۔ دہلنے سے یہ درد بڑھتا ہو
 اور خون کی تے ہوتی ہو تو آرینیکا ۶۔ پیٹ کے بائیں حصہ میں دبار کھنے یا سوئی چھنے
 کی طرح تیز درد۔ تلی بڑی اور سخت بائیں کروٹ سو سکتا۔ کمزوری اور چہرہ
 سیاہی مائل جسم ہمیشہ گرم رہنے کی علامت میں آرسنک ۲۰۔ ۳۰۔ بہت عرصہ
 تک کالا آزار یا زہریلے بخار میں مبتلا رہنے سے تلی آہستہ آہستہ بڑی
 ہونے پر اور ساتھ ہی ساتھ مریض کے زیادہ کمزور ہو جانے پر چائنا ۳۰۔ ۳۰۔
 گامھے مائے تلی میں جلیک اٹھنے کی طرح درد ہونے پر کاربو x۳۔ یا میٹرم میو
 ۳۰۔ جبکہ اور تلی کے بڑھے اور درد میں کارڈس میس یا نس ۱۰۔ ۵ قطرے صبح و
 شام استعمال کرنا فائدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نکس و امیکا ۳۰۔
 پوڈوفالک ۶۔ مریکوریس آلوڈ ۳۰۔ سفوف ۱۰۔ فاسفورس ۶۔ ایسڈ ٹائیٹرک
 ۶۔ لیپ ٹائٹرک ۳۰۔ فیرم ۶۔ ایگریکس ۳۔ کیلی بروم x۳ سفوف بھی
 ضرورت پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اگر تلی بڑی اور سخت معلوم ہو تو (جب بخار نہ ہو یا بخار کم ہو جائے۔
 اس وقت پیپٹا خام کی بوتلی نکلتی ہے۔ ایک دو بوند شکر (یا دودھ
 کی شکر کے ساتھ کھانے سے مریض کو خوب فائدہ ہوتا ہے۔
 طحال اور جگر کا بڑھنا مع کمی خون کے

(SPENO — MEGALY)

تلی مرض کی پہلی علامت ہے اس کے بعد تلی کا بڑھنا۔ خون کی کمی۔ خون کا
 اخراج ہونا۔ اور آخر میں جگر کا بڑھنا۔ یرقان اور استسقا ہو جاتا ہے
 اس کا سبب ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے لیکن مدیر یا آتشک کی وجہ سے مادہ
 خراب ہونے پر یہ مرض آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ مرض ہمیشہ مزمن حالت میں
 دکھائی دیتا ہے۔ براہی ہوئی تلی اس کی پہلی علامت ہے۔ کسی طرح کا ڈر
 نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی گلٹی نہیں آتا اس کوئی ہے لیکن بعد جسم میں خون کم

ہو جاتا ہے۔ خون کی قے ہونا۔ اور اس وجہ سے جگر بڑھ جاتا ہے۔ یرقان اور
سودہ کا استقار ہو جاتا ہے۔

علاج

کارڈ میں میریانس بدر شجر اور سیانوفنس ۲۲۔ اس مرض کی بہت
اچھی دوا ہے۔ اخراج خون ہونے پر فاسفورس ۳-۶۔ یا کروٹیلز ۲-۴۔
دینا چاہیے ضرورت ہونے پر نشتر لگا کر تلی کٹوا دینا چاہیے۔

(۱۲) امراض گردہ - ورم گردہ

(NEPHRITIS OR BRIGHT'S DISEASE)

(ALBUMINURIA)

بول زلالی

مذکورہ بالا ورم گردہ کی خاص مرض حالت میں پیشاب کے ساتھ خون کے
سفید ذرات (ALBUMEN) بچھکنے کا نام بول زلالی ہے۔ بخار، پیاس،
متلی بار بار پیشاب کرنے کی حاجت، پیشاب میں زیادہ مقدار میں خون
کے سفید ذرات رہنا۔ اقد اور پیر و چہرہ کی سورج و غیرہ اس بیماری کی پہلی علامت
ہے۔ اس کے بعد درمیش ڈکارا آنا، کمی خون، استقار، دمانا یا دل پر مرض کا حار ہونا۔
وغیرہ علامات پیدا ہوتے ہیں۔ اور مریض مر جاتا ہے۔ بخار، ورم سیلان الرحم،
انت بد بھنی، ایسی غذا کھانا جس میں خون کے سفید ذرات زیادہ ملے ہوتے ہیں۔
(جیسے انڈا) مرد پانی سے دیر تک نہنا، میرہ امراض کے پیدا ہونے کے اسباب ہیں۔

علاج

ایکونائٹ ۳۳ شروع مرض میں، ایسڈ فاس ۲۲ x ۳۔ یا ہیلونیس ۳۳ x ۳۔
عصبی تحریک (لائیکو پوڈیم ۶ یا بڑی میٹھ ۳۔) (پیشاب کے امراض میں) ۱۷
پوسائٹم ۱۱۔ استقار وغیرہ علامات میں (۱۱) آر سی ۳۳ x ۳۰۔

بچہ خون کے سفید حصہ کو خون کے سفید ذرات کہتے ہیں۔ یہ سفید ذرات خون دینے
میں انڈے سفید حصہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم کا ایک خاص جزو نہ لگتی ہے۔

دستی بے چینی، گھبراہٹ، پیاس، جسم سرد، لیکن اندر جلن معلوم ہونا اور مذکورہ بالا درم گروہ کی کل دو اینٹیں، اسے پس، آرج نالی، اُرم کنٹھ، ایکے۔ سلف، وغیرہ بھی اکثر کام میں آتی ہیں۔ یہ مرض نہایت ہی سخت ہے اس لئے علاج کا بوجھ کسی قابل ہو، پیچھے ڈاکٹر کے سپرد کرنا چاہیے۔

علاج معاون:- ڈاکٹر شمر نے صرف دو دھ دینے کی صلاح دیتے ہیں! اکثر جب کسی قسم کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا تب دودھ پلانے سے فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ نلک کم کھانا اچھا ہے۔ چھلی، گوشت، یا تھوڑا غذا اور مشروبات مصنوع ہے۔ ادنی گرم پٹر اپہنا چاہیے۔ نہانے وقت جسم کو تولیا سے رگڑنا چاہیے۔ اور کھلی ہوا میں گھومنا مفید ہے۔

ورم نائزہ (URETHRITIS)

پیشاب نکالنے والی سلائی (CATHETER) ڈالنا یا پتھری نکالنا وغیرہ اسباب سے مجری البول (پیشاب کی نالی) (URETHRA) چوٹ گرنے سے نائزہ کے درد کے ساتھ زخم اور پیشاب کے وقت تیز جلن کے ساتھ خون و پیپ نکلا کرتا ہے اس اورم کا نام ورم نائزہ ہے۔

علاج:- آد نکال دیکھا اور آرا کا اس کے نیالی کے ساتھ میں پٹی بھگو کر باندھنا بخار کے ساتھ جلن محسوس ہونے پر ایکو نائٹ ۱۰-۱۲۔

نار کے ساتھ تپکن، بیلا ڈونا ۶x۲۔ پیشاب کے وقت تیز درد وغیرہ علامات میں کینٹھرس ۴۔ جاس ۴ کی کھلی ٹکڑے ماصے ضرورت پڑتی ہے۔ علامات کے مطابق دوسری دواؤں پر بھی نگاہ رکھیں۔

یہ بیماری آسانی سے اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن روزانہ کا زمر پھیلنے کا وجہ۔ سے جو ورم نائزہ ہوتا ہے وہ سخت ہے۔

مرحمت جریان کے باب میں اورم کا بیان ملاحظہ ہو۔

درد گردہ (NEPHRALGIA)

گردہ اور مثانہ میں اسندت کے درد کا نام۔ درد گردہ ہے جب کوئی پتھری گردہ سے مثانہ میں جاتے ہوئے طاب گردہ اور مثانہ

کی درمیانی نالی سے گذرتی ہے تو سخت درد ہوتا ہے۔ کینتھرس ۶x۲۔ اور
 کینابلس سٹیوا۔ ۱x۔ استعمال کرانے اور گرم پانی بوتل میں بھر کر پیٹ سینک
 دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بہت علامات اور علاج کے لئے اس کتاب کے
 سنگ ریزہ و پیشاب کے باب میں سنگ گردہ، افسردہ، شاذ کا بیان ملاحظہ ہو۔
 پیشاب کی نالی کا سکڑنا

(STRICTURE)

شروع میں تھوڑا پیشاب اور بعد میں بالکل ہی نہ کر سکنے کا نام
 پیشاب کی نالی (URETHRA) کا سکڑنا ہے۔ یہ سکڑنا دو قسم کا ہوتا
 ہے۔ (SPASMODIC) اور عضو (ORGANIC) سکڑنا۔
 (MUSCLES) خواہش نہ ہونے بھی
 سکڑنے لگیں تو اس کا نام تشنجی سکڑنا ہے۔ اور عضوی سکڑنا میں بھلیاں
 (MUCOUS MEMBRANES) اتنی پستلی اور سخت اور سوت کی
 طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان سے پیشاب نہیں نکل سکتا۔

علاج

تشنجی سکڑنا: شروع میں اسپرٹ کیمفر ۵-۲ قطرہ فی خوراک پانچ سات منٹ
 کے وقفہ سے استعمال کرنا چاہیئے۔ بخار کے ساتھ تشنج (ایکونائٹ ۲x۳)۔ مرض خرم
 ہو جانے پر نکس و امیکا ۳-۲-۱۔ بہت زیادہ پانی میں نہانا فائدہ مند ہے۔
 (اور اگر پیشاب کرانے کے لئے سلائی کی ضرورت پڑے تو سلائی دینے کے نصف گھنٹہ پیشتر
 ایکونائٹ ۳x۳- ایک خوراک کھانا۔ اور سلائی دینے کے بعد آرٹیکا ۳x۳- استعمال
 کرنا اور ریسون کے مقام (PERINAEUM) یعنی مقعد اور آلہ تناسل
 کے بیچ کے مقام میں گرم پانی سے سینک دینا فائدہ مند ہے۔
 عضوی سکڑنا:۔ مرض کے شروع میں کلیٹس ۵-۳- اس کے بعد
 فاسفورس ۳۔ ڈلکے ۶۔ کینتھرس ۲x۳- سلکا ۴۔ تھو سسیئم ۳x۳-
 پروٹسی سپائی ۳: ۱-۱-۳۔ ایکونائٹ ۳x۳- اسپرٹ کیمفر، بل ۶-
 ٹیرب۔ ایڈرفاس۔ آیوڈ۔ آرس، چائنا وغیرہ دواؤں کی ضرورت

پڑ سکتی ہے۔ امراض تقطیر البول اور سوزاک عام کے بیان میں نائرہ کی سکرین ملاحظہ ہو۔

خونی پیشاب

(HAEMATURIA.)

گر پرنے، چوٹ لگنے، سردی لگنے، سوزاک، پتھری، دق یا کینسر وغیرہ یا کسی دوسری سخت بیماری میں خونی پیشاب ہوتا ہے۔

علاج:- ٹیز پتھنا ۳۔ خون آلودہ پیشاب کی بہت اچھی دوا ہے۔
گر پرنے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے خونی پیشاب ہوئے پرنے اور نکالنے کا ۳x۳۔ گردہ میں درد کے ساتھ خونی پیشاب ہونے پر ہیمی سیس ۲x۲۔ سردی لگ کر خونی پیشاب ہونے پر ایکونائٹ ۱x۲x۳۔ خونی پیشاب میں اگر کوئی چیز تہہ نشیں ہو او سیس کم ۳۔ ۳۰۔ اگر خونی پیشاب کی وجہ ٹھیک سمجھ میں نہ آئے یا کسی دوا سے خونی پیشاب بند نہ ہو تو پتھر ۱۰۔ یا تھلس پی ور سا ۱۰۔ یا نیشیو ۱۰۔ یا ملی فولیم ۱۰۔ یا آرٹیکل ہائیڈرو جینی سیٹم، بہت مفید اور کارآمد ہے۔
علاج:- مریض کا چٹا پھرنا بالکل موقوف کر دینا چاہیے۔ غذا محض منع ہے۔
میگلم بانی جو جسم بوجھ ڈالنا چاہیے۔ دودھ وغیرہ بھی غذا دینی چاہیے۔

احتباس بول، پیشاب کا رک جانا، عسر البول، پیشاب بند ہونا۔

(RETENTION AND SUPPRESSION OF URINE)

مثانہ (BLADDER) میں پیشاب جمع ہو کر کسی وجہ سے نہیں نکل سکتا۔

اسی کو احتباس البول، (پیشاب کا رک جانا) (RETENTION OF URINE)

کہتے ہیں۔ اور گردہ (KIDNEYS) میں پیشاب نہ جمع ہونے کو عسر البول۔

(پیشاب بند ہو جانا) (SUPPRESSION OF URINE) کہتے ہیں۔ احتباس

بول میں پٹر پھول جاتا ہے۔ اور عسر البول میں پٹر نہیں پھولتا۔ پیشاب میں زہریلی

چیزیں خون کے ساتھ بلکہ عسر البول کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں مایوسی،

غفلت، تکلیف، بے ہوشی وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ بخار کی خرابی،

ہیضہ وغیرہ اکثر خوں ناک امراض کے ساتھ عسر البول کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

سوزاک میں بیکامک مواد نکلتا بند ہو جاتا ہے۔

اور گردہ کی سورش یا مثانہ کا فالج یا کسی قسم کی چوٹ کی وجہ سے عسر البول ہوتا ہے۔
 علاج عسر البول :- مثانہ میں سورش رہنے پر :- (مرض کی شروع حالت میں
 ایکونائٹ X۱ - ۳ - یا ٹری نیتھنا ۳ - سردی سے پیشاب رکھنے پر ایکونائٹ X۲ -
 غفلت میں آنکھیں یا پتلیاں - اور پچھلے جلنے کے ساتھ پیشاب رکھنے پر اوسیم ۶ -
 ۲ - ہسٹریا سے پیدا ہونے اور مرض پیشاب میں اگنیشیا ۱ - یا اوسیم ۶ - ہیفی کی بیماری
 میں پیشاب رکھنے پر ٹری نیتھنا ۳ - یا کیفیرس ۳ - یا کیلی بائی ۶ -
 علاج احتباس البول :- جلن اور تکلیف کے ساتھ یا ایک پیشاب رکھنے پر
 اسپرٹ کیتھر ۱۰ - نور ای پیدا ہوئے - سچے کو اقباس البول ہونے پر درس
 پندرہ منٹ کا وقفہ دیر اسپرٹ کیتھر کی شیشی اسکے ناک کے پاس رکھنی چاہیے -
 مثانہ میں فالج کی وجہ سے بخیزی میں قطرہ قطرہ پیشاب کرنے پر نکس و انیکا ۲ -
 یا کاسیکم ۶ - ہسٹریا - یا اختناق الرحم مرضہ کا پیشاب رکھنے پر نکس و انیکا -
 X۲ - یا اگنیشیا ۳ - یا جلس ۲ - گردہ کی کلیاں بڑھنے کی وجہ سے احتباس البول
 ہونے پر پلسا میل ۲ - یا براٹس کارب ۶ - مرض کی شروع حالت میں کچھ لوگ
 ایکونائٹ X۱ - ۳ - اور جلسی میم X۲ - (یا ایکونائٹ X۲ - اور کیفیرس ۶ -)
 یکے بعد دیگرے دے کر فائدہ بتاتے ہیں -

علاج معاون

دودھ ایک حصہ دو یا چار حصہ پانی کے ساتھ ملا کر یا آرا روٹ پتلے پانی میں
 بنا کر کاغذی لیون عروق کے ساتھ نمک یا مصری کھلانے سے اکثر آسانی سے
 پیشاب ہو جاتا ہے - خام ناریل کا پانی بھی فائدہ کرتا ہے -
 گرم پانی کے ٹب میں مریض کو کمر تک ڈبا کر بیٹھا فائدہ مند ہے -
 پانی میں قلمی شورہ حل کر کے ایک کپڑے کی پیٹی اس میں بھگو کر پیٹ کے اوپر
 باندھنے سے کبھی کبھی پیشاب ہو جاتا ہے - ام اول کا ساگ پیکر ذرا گرم کر کے
 ناف کے پار و لطف لپ کر دینے سے تھوری دیر میں پیشاب ہو جاتا ہے -

(URAEEMIA)

ذہر پیشاب چڑھنا

گردہ کے ذریعہ جو کل خراب چیزیں حالت صحت میں جسم سے نکلا کرتی ہیں -

وہ باہر نکل کر خون میں ہی رہ جاتے پراحتباس البول اور اس کے ساتھ خرابی خون کے اکثر علامات ہو جاتے ہیں؛ اسی کا نام (URAEimia) سمیت بول ہے۔ یہ علامت آہستہ آہستہ یا یکبارگی ظاہر ہوتی ہے جیسے کمی پیشاب، استسقاء، تھو متلی، درد سر، سر میں چکر، نیند کی تیزی، ہڈیاں، کبھی کبھی نیریشج (SPASM) کسی کسی کو ہڈیاں کے ساتھ سات خواب غفلت (STUPOR) اور قوما، بے ہوشی کی نیند وغیرہ ہوتا ہے۔ مریض کے جسم اور رستے سے پیشاب کی ایک قسم کی بو آتی ہے۔ پیشاب یا تو بہت محوڑ ہوتا ہے۔ یا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ چہرہ میلایا میوم کی طرح لکھائی دیتا ہے۔ نبض کی رفتار تیز، جسم کی حرارت پہلے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جلد ہی طبعی حرارت (۹۸-۱۰۰) سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ (باب احتباس البول اور عسر البول ملاحظہ ہو۔)

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

آیوڈین ۱؛ ڈاکٹر لارڈ لاکا رائے ہے کہ امراض پیشاب کی حسدابی سے قے میں آیوڈین ۱؛ فی خوراک نصف قطرہ استعمال کرنا چاہیے۔
 ٹرمی بنتھنا ۳X؛ احتباس البول کی خاص دوا ہے۔ (ایک مریض کو چار روز تک پیشاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن ڈاکٹر بالڈیم نے ٹری بنتھنا دیا۔ جس سے پیشاب ہو گیا۔) اگر ٹری بنتھنا سے فائدہ نہ ہو تو مرک کار، آرس، کینتھرین، یا کیلی بائی کروم کی آزمائش کرنی چاہیے۔
 کیویرم ایسٹیکم ۲؛ بے ہوشی کی طرح نیند (قوما) (COMA) کی بہت اچھی دوا ہے ہر میندرہ منٹ پر استعمال کرانے سے اگر تین چار گھنٹہ تک مریض کو فائدہ نہ ہو تو اوپیم ۳X۔ پندرہ منٹ کے بعد دینا چاہیے؛
 اوپیم سے فائدہ نہ ہو تو آرنکایورٹین ملر سچز فی خوراک ۵ قطرے ہر چار گھنٹہ پر استعمال کرنا چاہیے۔

ایون کارب رنجی طاقت کی ٹریٹروسیانک ایسڈ ۳۔ کریازوٹ ۳۔
 پلیم ۶۔ وغیرہ ادویات کی گلے ماحض ضرورت پڑتی ہے۔

علاج معاون

آبخرات۔ غسل کرنا (VAPOUR BATH) بھپارہ لینا مفید ہے مرض کے حملہ کے بعد کچھ عرصہ تک صرف تپتی چیزیں (خامسکروددھ) پینا چاہئے۔ مفصل حالات اور علاج کے لئے ہمارے کتاب ہیضہ و طاعون ملاحظہ کیجئے۔

ورم مثانہ

(CYSTITIS)

مثانہ میں درد، اگرٹن یا پوچھ محسوس ہونا۔ تمام جسم میں سردی محسوس ہونا۔ مثانہ میں پیشاب جمع ہونا۔ اور کونھتھنے پر بڑی دقت سے نکلنا۔

پیشاب میں بلیغم یا خون ملا رہنا۔ اس مرض کے مخصوص علامات ہیں۔ مرض پھڑپھڑانا ہونے پر، درد کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی مقدار اس کے ساتھ بلیغم کی مقدار اور گاڑھا پن بڑھ جاتا ہے۔ اس مرض میں درد اوپر کی جانب کمزور پھیل جاتا ہے۔ اور درم گروہ میں مدد دینے کی جانب کمزور سے مثانہ تک پھیل جاتا ہے۔

سردی لگنا۔ تری چوٹ لگنا۔ حالب کا سکرٹنا۔ سوزاک یا پتھری۔ یا غدہ ندی کی بیماری۔ پیشاب نکلنے کی سلائی (CATHETER) وغیرہ آلات کا مثانہ میں داخل کرنے کے اسباب ورم مثانہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج

حاد اور مزمن دونوں حالتوں میں کینتھر س۔ ۳-۱۰۰۔ بہترین اور کارآمد دوا ہے۔

خشک اور سرد ہوا لگ کر ورم ہونے پر ایکونائٹ XI۔ ۳۔ سردی کی وجہ سے ڈلکالا ۳۔ اعصابی تحریک کی زیادتی میں، بیلادونا ۳-۴۔ پتھری یا مثانہ میں مرض ہونیک وجہ سے بہت مواد نکلنے پر، براو ۱۰۰۔ (فی خوراک ۱۵ سے ۲۰۔ قطرے۔)

مرض مزمن میں چافلا ۱۰۰۔ (فی خوراک ۵-۶۔ قطرے) کینتھر س ۳؛ اس حالت کی بہترین دوا ہے۔ پیشاب کی تیزی ناقابل برداشت ہونیک وجہ سے رات میں بہتر پیشاب ہونے پر پلٹاٹیل ۲-۳۔ اگر پیشاب میں گھوٹے کے پیشاب کی طرح بدبو ہو تو نینروٹیک ایسڈ بیلادونا ۲۰۔ کنائس ٹائیوا۔ XI۔ کیلی آئیوڈائیڈ ۱۰۰۔ ۳۰۔ ۲۰۔ ۱۰۔ ۵۔ ۳۔

وغیرہ دواؤں کی بھی اکثر ضرورت پڑتی ہے

علاج معاون

گرم پانی سے نہانا یا فلالین پانی میں ہلکو کر پیڑ و بر سینکا اچھا ہے مریض کو چت سونا چاہیے۔ کمزنگ گرم پانی میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑے نیگرم پانی میں بورک ایسڈ (دش پندرہ گرین) ملا کر آہستہ آہستہ دھوڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مچھلی، گوشت، شراب وغیرہ ممنوع ہے۔ شکر یا مسمیٰ کا شربت پینے سے پیشاب صاف ہوتا ہے۔ ہلکی غذا دینی چاہیے۔

کثرت البول۔ اور البول۔ ذیابیطس کا ذب

(POLYURIA OR DIURESIS OR DIABETES

IN SIPIDUS)

پیشاب کی مقدار کی زیادتی کو کثرت البول یا ذیابیطس کا ذب کہتے ہیں۔ شکر یا ذیابیطس میں پیشاب کی زیادتی کے ساتھ پیشاب میں شکر رہتی ہے۔ یہاں تک کثرت البول کا علاج لکھا جاتا ہے۔

زیادہ پستی چیزیں کھانا۔ برسات، بڑھاپا، کمزوری کی خرابی، ہسٹیریا، منہ کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے پیشاب میں پانی کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بار بار پیشاب ہوتا ہے۔

علاج

اسکیولا ۲x۔ دن رات میں زیادہ مقدار بغیر شکر کا پیشاب پانی کی طرح ہونا کثرت البول کی بہترین دوا ہے۔ پیشاب کی حاجت، بار بار مگر مقدار کم۔ کیلی کارب ۶۔ رات میں بار بار پیشاب ہونا۔ اور اسکی تیزی ہونا۔ لیکن بہت دیر تک بیٹھنے رہنے پر درد، مٹانے پر دباؤ دینے سے پیشاب کا اثرنا۔ کارس باڈ ۶۔ پانی پینے کے بعد ہی پیشاب کرنے کی حاجت کا احساس۔ آگنیشاس ۳۔ کافی پینے کے بعد پیشاب۔ ہسٹیریا۔ احتقاق الرحم والی عورتوں کو پانی کی طرح بہت پیشاب ہونا۔ غم و تفکرات کا اثر۔

کاسیکم ۶۔ بڑھوں کے زیادہ اور بار بار پیشاب (خاص کر رات کے وقت میں) ایڈفاس ۲x۳۔ بار بار بہت زیادہ پانی کی طرح پیشاب

لات میں بار بار پیشاب کرنا۔ پیشاب کی زنگت دودھ جیسی سفید۔ فوری حاجت
ایٹک الیڈ ۳۔ نکس و امیکا ۳۔ سائنا ۳۔ پپے ٹوریم۔ مرض زیاہیطیس
شکری کی دواؤں کی گلے ماضے ضرورت ہوتی ہے۔

علاج معاون :- زیادہ تیلی کف پیدا کرنے والی چیزیں یا زیادہ
چاول کھانا منع ہے۔ عام اصول تندرستی کی حفاظت کرنی چاہیے۔
پیشاب کا بے اختیار ہونا۔ (ENURESIS)

شانہ کے مفلوج ہونے سے پیشاب روکنے کی طاقت بھڑی یا بالکل زائل ہو جاتی
ہے۔ پیشاب گتے پر کسی طرح روکا نہیں جاسکتا۔ اس کے بعد قطرہ قطرہ پیشاب ہوا کرتا ہے
شانہ میں پیشاب جمع رہتا ہے لیکن ہوتا ہے قطرہ قطرہ۔ اسی کا نام سلس
ابول ہے۔ چوٹ، پتھر۔ ولادت کے وقت کی تکلیف۔ سوزاک یا گرم کی وجہ سے
یہ بیماری ہوتی ہے۔ پتھر سوتے سوتے بچری سے پیشاب کر دیتا ہے۔

علاج

پیشاب کی تیزی بالکل نہ روک سکتے پر فرم فاس ۱۲۔
سکڑنے والے عضلہ کی کمزوری کی وجہ سے احتیاط نہ رہنے پر بھی پیشاب ہو جاتا۔
بیلادونا ۶۔ (ڈاکٹر میڈس سلس کی رائے کے مطابق یہ ہمیشہ اس مرض میں
استعمال کیا جاتا ہے) نیند کے شروع میں بستر پر پیشاب ہونے میں کاشیک ۶۔
بوڑھوں کی بیماری میں کو نیم ۳۔

بلو دار پیشاب ہونے پر سپا ۱۲۔ پتھر، بوڑھوں کی بیماری میں کنٹیرم ۶۔
شانہ کے غدہ ندی کے بڑھنے میں، یا شانہ میں پتھری ہونے کی وجہ بچوں اور بوڑھوں
کو خود بخود پیشاب نکل جانا۔ ماسم ۶۔ اختناق الرحم والی عورتوں کو بے ہوشی کے وقت
خود بخود پیشاب نکل جانے پر آگنیشیا ۶۔ گرم کی وجہ سے ہونے پر، (خاص کر
بچوں کو سائنا ۳۔ یا سپا ۶۔ یارس ارو مسکا ۵) (فی خداک ۵ قطرے)۔
جریان کی وجہ سے آپ ہی آپ پیشاب ہو جاتا ہو۔ ایڈ فاس ۳۔ ۲۔
ارتی رن ۳۔ بیلادونا ۶۔ نکس و امیکا ۳۔ مرک سول ۶۔

علاج معاون :- مریض کی غذا مقوی ہونی چاہیے۔ تیلی چیزیں

خوب زیادہ یا کم کھانا نقصان دہ ہے۔ سونے کے کم سے کم تین گھنٹے پہلے پانی نہ پینا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مشانہ میں تحریک نہ ہو۔ ترش اور نمکیں چیزیں کھانا منع ہے۔ رات میں بیچ بیچ میں پیشاب کرنا اچھا ہے۔ دن میں جب تک پیشاب روکا جاسکے تب تک نہیں کرنا چاہیے۔ گدی پر کا سونا۔ بہت زیادہ کھانا بہت مناسب نہیں ہے۔ اس مرض میں چت سونا اچھا نہیں ہے۔ سرد پانی سے غسل کرنا مفید ہے۔

پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا (STRANGURY)

یہ مرض نہایت تکلیف دہ ہے۔ بار بار پیشاب معلوم ہوتا۔ لیکن بدقت قطرہ قطرہ پیشاب ہوتا۔ یا بالکل ہی پیشاب نہ ہونا اور پیشاب کے وقت مشانہ میں بہت جلن کی تکلیف اس کی علامت ہے۔ سوزاک، پتھری، رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، درم گروہ، نفرس، احتقان الرم کرم وغیرہ کے ساتھ قطرہ البول پیدا ہوتا ہے۔ مرض شدید میں پیشاب طبعی یا غیر طبعی ہو سکتا ہے لیکن بیماری خرمین ہونے پر پیشاب کے ساتھ دایا بلغم نکلا کرتا ہے۔ بچوں کے کرم کی وجہ سے اکثر مشانہ میں جلن ہوتی ہے۔

علاج۔ جلن اور تکلیف کے ساتھ یکایک قطیرہ البول ہونے پر دو چار بوند اسپرٹ کیمفر، شکر یا تباشیر کے ساتھ دس پندرہ منٹ کے وقفے سے دینا چاہیے۔ زیادہ کینفرس دوا کے استعمال سے پیشاب میں تکلیف ہونے پر۔

اسپرٹ کیمفر، تکلیف سے پیشاب ہونے پر۔ بیلادونا ۲۰-۳۰ (بچہ عورتوں کے راجی مرض میں) بار بار پیشاب کرنے کی خواہش کرتے کی طرح نائٹ ابل برداشت درد، پیشاب کرتے وقت جلن اور پیڑوں میں درد۔ کینفرس ۳-۴ عورتوں کے پیشاب کی تکلیف میں کوپے ۱۰-۳۰۔ درد مکر کے ساتھ قطیرہ البول میں ٹری بوتھناس۔ شنج والے قطیرہ البول میں نکس و امیکا ۳۰-۴۰۔

دن میں مرض کی زیادتی۔ فیرم فاس ۴۔ مشانہ میں آلات تناسل میں یا ہاتھ بیروں میں سوجن ہونے پر۔ اور پیشاب ہوتے وقت بہت جلن ہونے پر۔ لے پس۔ ۴۔ شبنم یا خشک ہوا لگ کر قطیرہ البول ہونے پر ایکون ۳-۴۔

ملا رکھیں رہنے سے یا رسات میں تقطیر البول ہونے پر ڈکھلا کر اسٹون۔ ۳۔
 دوم ولے تقطیر البول میں کینتھرکس ۳۔ (مردوں کے لئے) کوپے ۱۲۔ ۲۔ اور
 یوپے ٹوری ایم ۱۲۔ صرف (عورتوں کے لئے) عصی تقطیر البول میں بیلا ڈونا
 ۱۱۔ اے پس ۳۔ کیپیکیم ۴۔ بیلیم ۱۔ گرم پانی سے سینکنا۔ اور دودھ
 اور پانی برابر ملا کر پلانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

پتھری (STONE OR CALCULUS)

شانہ، پتر، ورید، (VEINS) لوزتان (TONSIL) وغیرہ جسم
 کی بہت جگہوں میں کئی اسباب پتھری (سنگ ریزہ پیدا ہو جاتی ہے۔
 التهاب لوزتان (TONSILITIS) ورید کی پتھری (PHLEBOLITE)
 وغیرہ امراض جراحی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے انکا علاج اس کتاب میں
 نہیں لکھا گیا ہے۔ صفراوی پتھری کے بارے میں اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔
 یہاں اب پیشاب کی پتھری کے بارے میں لکھا جائے گا۔

سنگ ریزہ۔ پیشاب

(URINARY CALCULUS)

عام حالت سے ہمارے جسم سے ایسی چیزیں باہر نکلا کرتی ہیں۔ جن کی
 جسم کی پرورش کے لئے ضرورت نہیں ہوتی لیکن باضم یا پرورش کے فصل میں
 خرابی ہونے سے اس کا ضد ہوتا ہے۔ اس وقت ایک صاف شیشی میں تھوڑی
 دیر تک پیشاب رکھنے سے گرانیدل کے سفوف یا بالو کے ذرات کی طرح اس
 کے نیچے جم جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ مرض سنگ ریزہ پیشاب ہو گیا ہے۔
 اُس وقت بہت ہی بالو (SAND) کے ذرات کے برابر یا سب سے
 کے داد کی طرح پتھری کے ذرات کی طرح یا سیم کے بیج کی جیسے پتھر کے ٹکڑے
 (STONE) چھوٹی بڑی منھولی بہت قسم کی پتھری گردہ (KIDNEYS)
 یا شانہ (BLADDER) میں ہوتی ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں میں
 اور ننگال کی نسبت، غرب کے باشندوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔
 (1) سنگ ریزہ (STONE IN KIDNEYS OR KIDNEY CALCULUS)

درد گردہ، جوف گردہ میں پتھری (PELVIS OF THE KIDNEYS) پیدا ہو کر بہت دنوں تک رہ سکتی ہے۔ ایسی حالت میں مریض کو تکلیف نہیں ہوتی، شاید کمر میں آہستہ آہستہ درد (DULL PAIN) پیشاب کے ساتھ کبھی کبھی مواد اور خون دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہی پتھری جب گردے سے حالب (URETER) میں آ جاتی ہے تب کمر سے غوطوں تک ایک قسم کا درد پیدا ہو کر مریض کو پریشان کر دیتا ہے اسی کو (RENAL COLIC) درد گردہ کہتے ہیں۔ گاہے گاہے یہ درد بچے کی طرف (بیر کی اٹری تک) اور اوپر (پشت یا سینہ) تک پھیل جاتا ہے اور اسکے ساتھ لرزہ و تپ، پسینہ شدید (COLLAPSE) غوطہ سکر جاتا ہے یا اور کواٹھ جاتا ہے۔ پیشاب میں تکلیف قطرہ قطرہ گرنا ہے۔ یا بالکل بند ہو جاتا ہے یا پیشاب کی خرابی سے تشخیص کے علامات موجود رہتے ہیں خود بخود یا شتر کی مدد سے پتھری نکل جاتے پر مریض کو آرام ہونے لگتا ہے۔ اس درد کی خاں علامت یہ ہے کہ یکایک درد پیدا ہو جاتا ہے اور یکایک بند ہو جاتا ہے اس مرض کے ہونے پر ورم اینڈکس اور صفراوی درد کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ورم اینڈکس میں بخار ہوتا ہے اور صفراوی درد میں یرقان موجود رہتا ہے۔ لیکن درد مشانہ میں بخار اور یرقان نہیں رہتا۔

(۲) سنگ مشانہ (CYSTIC CALCULUS OR CALCULI VESICAL OR

STONE IN THE BLADDER

مشانہ (BLADDER) میں پتھری خود بخود پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی گردہ میں پتھری پیدا ہو کر مشانہ میں چلی جاتی ہے مشانہ میں بار معلوم ہو۔ مشانہ کی گردن میں حالب (URETHRA) میرز آلات تناسل، زکورا، اناث وغیرہ میں درد، پیشاب بند یا تکلیف سے پیشاب بند ہونا یا پیشاب میں پتھرت ہو کر بیٹھنے سے اور چوڑا، بخار کھنے سے پتھری ادھر ادھر گھومتی محسوس ہونا اور اس کے ساتھ پیشاب وغیرہ اس مرض میں تشخیص کے لئے بے خطا

علامات میں (۱) دردِ مشانہ۔ پتھری نکلنے کا علاج۔ گرم اور پیرور گرم پانی سے سینکنا (HOT FOMENTATION) اور گرم پانی پینا اور پیرس ۵۔ فی خوراک ۵ قطرے ہر پندرہ منٹ پر استعمال کرتے سے اکثر شرب تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آٹھ مرتبہ دوا کھانے سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسی دوا کی طاقت کام میں لانا چاہیے۔ کلکیر یا کارب۔ ہر پندرہ منٹ استعمال کرانے سے تعجب خیز فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لٹل کی تقریر پیرس کا انگریس منعقدہ سال ۱۸۹۷ء اس لئے اونچی طاقت کا کلکیر یا کارب۔ صفراوی درد اور مشانہ کی عمدہ دوا ہے۔ بے حد تکلیف سے مریض یخ کی طرح بے چین ہو۔ یا دونوں ہاتھ لٹا ہوا اور دردناک آواز سے چیخا اور خوں خور کرتا ہو۔ یا پیشاب کا رنگ سرخ ہو اور اسکو کچھ دیر تک رکھنے سے اینٹ کے سفوف کی طرح اس کے نیچے درد تہہ نشیں ہو جاتا ہو تو اسے نیم کنیم X۲۔ ۲۰۔ (نہ ٹوکسی کے تپہ کا عرق۔ ہر پندرہ منٹ پر دینا چاہیے۔)

انگنٹا امیڈس ۵۔ فی خوراک ۲۰ قطرے چھوٹی پتھری نکلنے کے وقت استعمال کرنے سے ڈاکٹر بلن سین وغیرہ کو بہت فائدہ معلوم ہوا ہے۔ انگنٹا فاس X۲۔ سفوف خوب گرم پانی کے ساتھ اندرونی استعمال اور خارجاً کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیشاب کے بعد ہی درد شروع ملنے پر سار سا پیرلا۔ ۲۰۔ ہر پندرہ منٹ پر استعمال کرنا چاہیے۔ آٹھن کی طرح درد سے جسم میں تشنج ہونے سے بہت تکلیف سے ایک لمحہ چین نہ رہ سکے اور بے چین ہونے کے علامات میں ڈاکٹر کوریا ۵ ہر پندرہ منٹ پر دینا چاہیے اور اگر ان ادویات سے فائدہ نہ ہو تو پیرلوا بریوا ۵۔ فی خوراک ۲۰ قطرے دواؤں گرم مقطر پانی کے ساتھ ہر نصف گھنٹہ پر دینا چاہیے۔

حب ذیل علامات میں پیرلوا بریوا زیادہ مفید ہے۔ پیشاب کی تیزی رہنے پر بھی بڑی دقت سے پیشاب نکلنا۔ مریض کو ایسا محسوس ہونا گویا مشانہ بھرا ہوا ہے۔ مشانہ میں کبھی بیٹھ یا تیز درد تکلیف سے مریض کا چیخنا اور روننا۔ تقطیر البول۔ پیشاب میں بالوں کے ذرات یا سفوف۔ اینٹ کی طرح چیمبر معلوم ہونا۔

تھیس بی دار ساپسورس ۵۔ دس پندرہ قطرے فی خوراک کئی مرتبہ استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

(ب) سنگ گردہ کا علاج:۔ یہ تک ہونے پر کہ سنگ گردہ ہوا، (یاد رہے کہ یہ ہونے کے بعد ہی) حب ذیل ادویات کے استعمال سے خوب فائدہ ہوتا ہے۔ لاسک ۶۔ ۲۰۰۔ پیشاب میں اگر سرخ یا لہو کے ذرات کی تہ جم جائے اس سے فائدہ نہ ہو تو اگر نیکایورس ۵۔ فی خوراک ۵ قطرے۔ یا

کیکس کیکٹائی ۵۔ فی خوراک ۵ قطرے دینا چاہیے۔ ایڈ فاسس

x۲۔ اگر پیشاب میں سفید رنگ کا مادہ (PHOSPHATE) بڑی میں گریفاٹس ۶۔ ۳۰۔ پیشاب کچھ دیر تک رکھنے پر اگر سفید اور کھٹی بدبو دار چیز نیچے بیٹھ جائے، کم سلف x۳۔ ۱۔ اگر ایسٹ کے سفوف کی طرح سرخ بھورے رنگ کی طرح زرد۔ داتہ کی طرح درد تہ نشیں ہو۔

باریرس بلیکرس ۵۔ مجری بول میں درد اور پیشاب میں پہلے سفید اور بعدہ سرخ، لہی کی طرح جھنے پر سیاہ ۶۔ ۳۰۔ پیشاب کے بعد لہو دار سفید رنگ کی چیز کچھ سرخ تہ نشیں ہو، سار سا پرٹلا ۶۔ ۳۰۔ پیشاب کرتے ہی گندلا ہو جائے، ٹائٹرس ریور ایڈ x۲۔ یا ادکس لک ایڈ ۳۔ ۱۲۔

پیشاب میں کسیم اوکسی لیٹ (OXALATE OF LIME DEPOSIT)

جیسے پرنکورہ بالا ادویات کم سے کم ہر روز چار یا پانچ مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ میلاڈوٹا x۳۔ ۳۔ اوپیم x۲۔ ۳۔ نکس دا میکا x۱۔ ۳۔ سلکا ۶۔ ۳۰۔ کی بھی اکثر قدرت پڑتی ہے۔ (ج) سنگ متانہ کا علاج:۔ یتھم کاربونکم x۳۔ سفوف۔

۲۰۔ چار مرتبہ استعمال کرنے سے چھوٹی پتھری لگ جاتی ہے۔ پیرا (۱)

اور (ب) کی دوائیاں علامات کے مطابق استعمال کرانے سے اکثر

فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن لیٹھو آرٹ (LITHORITE) وغیرہ نشتر کے ذریعہ

سے اچھے ڈاکٹروں سے پتھری نکلوانا ہی اچھا ہے۔ لیکن ریز کی مدد سے

جسم میں پتھری دکھائی دے سکتی ہے۔

(د) ریگ پیشاب (GRAVEL) کی خاص دوائیاں ہیں۔ ایپا جی اگری پکس

(SPIGERA REPENS) فی خوراک دس قطرے دن میں ۶ مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ ایودا اُرسائی (UVA URSI) لاسیکو پوڈیم - فاس - روٹا - سارسا - چائنا - زنک -

(س) سنگ پیشاب کی بہترین دوائیں :- ایوسائٹم - انڈرا - یورا - اُرسائی - سیپا - آرنیکا - چینی تم، سلف - آئی پوسیا - لاسیکو - (ص) سنگ مثانہ کی بہترین دوائیں - سیپا - سارسا پرلا - کلکیریا کارب - کاربونی ایم - (ص) نشتر کے بعد بخار اور درد بند ہونے کے لئے آرنیکا - کلینڈیولا - بیلاڈونا - مکس وایکا - کیولا - چائنا - کیوپرم، اور ورائیڈ وغیرہ مفید ہیں۔

حسب ذیل دوائیں عمر کے مطابق ہر روز اس مرض میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایکون، ایڈاؤ کے لکٹ - ایڈ فاس - یاریرس، مکس وایکا - لاسیکو - کنالین - کینتھر، ٹیرم کارب - پوڈوفالکلم، مرک، اوسی میم۔

(ط) علاج حفظاً و تقدماً :- گردہ میں پتھری پیدا ہونے کے لئے یا پیدا ہوئی پتھری کو گلا دینے کے لئے حسب ذیل طریقے کام میں لانا چاہیے۔ کبھی کبھی لاسیکو پوڈیم - ۲۰۰ -

استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ ریگ (GRAVEL) نکلنے پر اور ایشٹ لینے میں درد رہنے پر بار بیرس XI - روزانہ چار مرتبہ استعمال کرنا چاہیے لیکن جن کو نفرس ہو یا جن کی رگوں میں یورک ایسڈ زیادہ جمع ہوتا ہو ان کو آرنیکا یورس، ۵ - (فی خوراک ۵ قطرے ہر گھنٹہ پر دینا چاہیے۔ مقطر پانی پینا بہت فائدہ مند ہے۔ چونا اور پتھری ایک ہی چیز ہے۔ اس لئے

پان کے ساتھ چونا کھانا منع ہے۔ یو، پی، کے اکثر مقامات میں چاول وغیرہ کے بہت پتھر کے ذرات رہتے ہیں۔ یہ مرض کو نقصان دہ ہے۔ اس لئے اسکو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ کنوئیں کا پانی جس کنوئیں میں چونہ (LIME)

کا حصہ زیادہ رہتا ہے اسکو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ مچھلی، گوشت اور تیلی

چیزیں نقصان دہ ہیں کھانے کا سوڈا (DICARBONATE OF SODA)

روزانہ استعمال کرنا منع ہے۔ کچھ لوگ گائے کا تازہ دودھ استعمال کرنے کا

مشورہ دیتے ہیں (DISTILLED WATER) مقطر پانی نہ مل سکتا ہو تو صاف

کھٹنڈ اپانی زیادہ مقدار میں اس کے عوض پینا چاہیے۔

خالی پیٹ رہنا اچھا نہیں ہے۔ تاکہ پیٹ میں ریاچ جمع نہ ہو۔
مرض صفراوی پتھری کی غذا ملاحظہ ہو۔

۱۳۔ امراض آلات تناسل (احتلام) (EMISSIONS)

بہت کمزوری یا زیادہ طاقتور ہونے پر جو لوگ پرہیز سے زندگی بسر کرتے ہوں ان کو بھی وقتاً احتلام ہو جاتا ہے۔

علاج :- کمزور ہونے کی وجہ سے احتلام ہونے پر ایسڈ فاس ۱-۶۔
چائنا ۳۔ کیلی فاس ۶-X۔ سفوف، زیادہ طاقت ہونے کی وجہ سے احتلام
ہونے پر کیلی بروم ۴-X۔ پیکرک ایسڈ ۲-X۔ سفوف یا کو نیم ۶۔ کھڑ جانا۔
بُری صحبت۔ نمک۔ ناول پڑھنا۔ اور غذا سے محرکہ منع ہے۔

جسریانِ منی (SPERM TORRHOEA)

خواہش نہ ہونے پر بھی رقت منی کو جریان منی، کہتے ہیں۔ (خوابیں
یا بلا شہوت) منی نکل جانے پر سمجھنا چاہئے کہ منی پتلی ہو گئی ہے۔
عموماً مشقت زنی، زیادہ جماع یا سوزاک وغیرہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
کرم بوا سیر، ہمیشہ کھوڑے کی سواری کرنا وغیرہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا
ہے۔ یادداشت کی کمی۔ جسم و دماغ کی سستی، درد سر۔ شرمندگی۔
ضعف ہاضمہ، تپاک قلب، دوران سر۔ کمی خون وغیرہ اس مرض کے
مخصوص علامات ہیں۔ اسی سے نامردی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔
اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

اگنیس کیکیٹس ۶۔ جسم و دماغ کی سستی، طبیعت اچاٹ۔ کمزوری۔ آلات
تناسل کی کمزوری۔ اور خواہش جماع کی زیادتی۔ زرد رنگ کے مادے کا اخراج۔
بیلیس پرینس، مدرٹشکچر۔ ۵۔ (روزانہ ۵ قطرے فی خوراک)۔

✽۔ امراض آلات تناسل کا مفصل بیان جاننے کے لئے ہماری کتاب مہوہ
جنسی بیماریاں، ملاحظہ ہوں۔

بہت اچھی دوا ہے۔ خاص کر مشمت زنی سے پیدا ہوئے مرض میں مفید و کار آمد ہے

برائٹا کارب ۶۔ رات کے وقت احتلام کی بہترین دوا ہے۔

مٹو جامد رنکچر ۱۰ (فی خوراک ۵ قطرے) زیادہ رقت منی کی بہترین دوا ہے۔

ایسڈ فاس ۳۳x۲۰۔ زیادہ جماع یا مشمت زنی کی وجہ سے یادداشت کا کم ہونا۔

چائٹا ۴۔ ۳۰۔ اکثر آلات تناسل میں غیر طبعی تحریک؛ کان میں غوں غوں کی

آواز چہرہ سُرخ؛ دوران سر۔ کثرت مُباشرت کے بُرے اثرات میں مفید ہے۔

فاسفورس ۶۔ ۳۰۔ جماع کے وقت بہت جلد انزال اور کمزور ہونا۔ قوت

جماع کی کمی دھڑکن۔ بہت زیادہ رقت منی اور مشمت زنی کی وجہ سے تندی بالکل نہ ہونا۔

کینتھر س۔ سوزاک کی وجہ سے رقت منی۔ پیشاب کے ساتھ قطرہ قطرہ منی نکلنا

اور جلن ہونا۔ جماع کی از حد خواہش ہونا۔

نہایت تکلیف دہ استادگی کے ساتھ جریان۔

کلکیر یا کارب۔ جماع کی از حد خواہش؛ لیکن نازہ میں بغیر سختی کے منی نکل

جانا۔ گل جسم میں درد؛ اور کمزوری۔

مشت زنی سے پیدا ہوئے رقت منی میں۔ کینتھر س۔ (مردوں کے لئے)

اور پلٹینا ۶ (عورتوں کے لئے) کرم کی وجہ سے رقت منی میں سائٹا ۳x۲۰۔ ۲۰۰۔

پلٹینا ۶۔ نکس و امیکا ۶۔ ۳۰۔ آرم مٹ ۳x۳۰۔ سفوف۔ ۲۰۰۔ گریفائٹس ۳۰۔

سلفر ۳۰۔ ۲۰۰۔ جلس ۳۰۔ سٹانی سگریٹ ۶۔ برائٹا کارب ۶۔ اگنیشیا ۶

آر جنٹیم ۶۔ یوفو ۳۰۔ سلیئم ۳۰۔ کلیڈیم ۳۰۔ پیکر ایسڈ ۳۰۔ گلکے فاس ۳۲x۔

لیکس ۲۰۰۔ لائیکو پوڈیم ۲۰۰۔ کونیم ۳۰۔ نیٹرم ۳۰۔ کی بھی ضرورت پڑتی

ہے۔ آلات تناسل کے دوسرے امراض کی ادویات ملاحظہ ہوں۔

اصول ۱۔ صرف دوا کھانے سے مرض دور نہیں ہوتا۔ اچھی صحبت۔ بہترین دوا

کا استعمال۔ صبح و شام ٹہلنا غیر محرکہ غذا اور مشروبات کھانا و پینا۔ اچھی باتیں کرنا۔

ہمیشہ مذہبی کتابیں پڑھنا۔ پیشاب کرنے کے بعد آلات تناسل کو ہمیشہ دھو ڈالنا چاہیئے ورنہ

فصل کرنا چاہیئے۔ غذا مشروبات و محرکہ کھانا پینا۔ صحبت بد، تنہا رہنا۔ تھوڑا جانا۔

ناک و ناول پڑھنا۔ مشمت زنی وغیرہ، ہمیشہ کے لئے ترک کر دینا چاہیئے شادی

اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دوا ہی نہیں ہے۔ لیکن مرض حاد میں فیرم بیکریکیم ۳۲-۳۰ استعمال کرنے سے بڑھنا رک جاتا ہے۔

مزمن مرض میں سوئی ڈیجکو ۳۳- یا آرج نائٹریکیم ۳۳ مفید ہے (SURGION) جراح کی مدد کی کمی بھی اکثر ضرورت پڑتی ہے۔ آگے کے باب میں مرض ورم، غدہ ندی میں سابل سیرولٹیا دوا دیکھنا چاہیے۔

ورم غدہ ندی (PROSTATITIS)

مردوں کے مثانہ کی چاروں طرف ایک سخت گٹھی ہے۔ اسی کو غدہ ندی (PROSTATE) کہتے ہیں مرض سوزاک کی وجہ سے اس گٹھی میں ورم ہونے پر اس کو ورم غدہ ندی کہتے ہیں۔ مقعد میں انگلی ڈالنے پر اگر غدہ ندی سوجھی، گرم ہو، درد محسوس ہو تو سمجھنا چاہیے کہ ورم ہوا ہے۔ مقام سیون (PERINEUM) میں جھری بول میں اور ذکر کی جڑ میں بہت درد محسوس ہونا پاخانہ، پیشاب بند ہو جانا۔ اس مرض کی خاص رہنما علامت ہے۔

علاج

ورم کے درجہ حاد میں پلسا ٹیلا ۳۰۔ اور مرکوریس سال ۶۔ مفید دوا کا آدہ ہے مزمن ورم میں کیلی آیوڈ ۱۰۔ ایک گرین۔ فی خوراک کچھ عرصہ تک استعمال کرنا چاہیے۔ مرض زیادہ مزمن ہونے پر پلس ۶۔ نائٹریک ایسڈ ۳۰۔ تھو جا ۶۔ یا سابل سیرولٹیا مدرٹنیکر ۱۰۔ (سلائی اندر داخل کئے بغیر جن کو پیشاب نہیں آتا ان کے لئے انی خوراک ۵ قطرے دینا چاہیے۔)

مواد پیدا ہو جانے پر (شدید حالت میں) مرک سال ۶۔ سلفر ۱۰۔ اور مزمن حالت میں سلفر ۳۰۔ یا نائٹریک ایسڈ ۳۰۔ آرنیکا ۳۳-۔ چوٹ کی وجہ سے چوٹ میں) ٹرنے ٹولا ۶۔ (حلق کی وجہ سے ورم میں) ایسڈ فاس ۳۳-۔ (جلانے کے بعد ورم میں) سنکنا اور مرلیض کو آرام دینا مناسب ہے۔

ورم فوطہ (SCROTITIS)

جس کیسہ جلد میں مرد کے دونوں اٹیشین ہیں اسی کا نام کیس الانیشین ہے۔ (SCROTUM) ورم ہونے پر کیس الانیشین سوجا کالا اور باہر

سے اس میں زخم معلوم ہوتا ہے۔ بگاڑے ماسے مریض کو جاڑے سے نجات دیتا ہے۔
 زبان سُرخ اور سیاہی مائل۔ ہڈیاں سٹری (MORTIFICATION) سٹرن وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔

علاج

کیس الائیٹسین، سو جا۔ کر ۱۰۔ اور ڈنک مارنے کی طرح درد میں یا گرمی
 برداشت نہ ہونے پر اسے پس مل ۶x۳ سٹرن کے علامات ہونے پر یا سٹرن
 کی حالت میں ہو یا اس ایلب ۴x۴ (قریب ایک ماہ کے استعمال کرنا چاہیے مریض بالکل اچھا ہو جائیگا
 ورم انیشین اور تسخ (بڑھنا) (ORCHITIS)

سوزاک آتشک وغیرہ کی وجہ سے فوطہ اور اس کے اوپر کی جھلی میں ورم
 ہو جاتا ہے۔ ورم کے وقت پانی دیالٹی کی طرح کی چیز نکلتا ہے۔ آہستہ آہستہ
 انیشین آگے کر جاتا ہے۔ اور خوب بڑا اور سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی۔ اور فوطہ پک جاتا ہے۔
 (یعنی اس میں مواد پیدا ہو جاتا ہے۔)

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

ساد ورم میں سپیس ۳x۳ ایکونائٹ (بخاریں) بیلاڈوناد آماس یا سُرخ ہو کر
 معلوم ہو) ہمی میس ۲x۲ (ہلکا بخار۔ تسخ۔ تفکرات) استعمال کرنا اور
 ہمی میس ۴ (پندرہ گن پانی کے ساتھ) لوشن بنا کر دگانے سے
 فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔

مزن ورم میں :- اسپنجیا ۲x۲ (سوجن اور سونی چھنے کی طرح درد)۔
 کلیمپٹس ۳-۶ (سوزاک کی وجہ سے) مرک بن آیوڈ ۲x۲ (آتشک کی
 وجہ سے) کو نیم ۳۔ رنامردی آرام مٹ ۴x۴ سفوف ۲۰۰۔ عصبی درد
 آر نکا ۶۔ سپیا ۳۰۔ سلفر ۳۰۔ سلا ۶۔ پیر ۳۰۔ مرکورس ۳۰۔ کی بیج بیج میں
 ضرورت پڑتی ہے۔ جب ضرورت دوسری دواؤں پر بھی نگاہ رکھیں۔
 اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہ فوطہ ٹٹک نہ پڑے اسلئے سنگوٹ کا استعمال
 کرنا چاہیے۔ انیشین اٹھا رکھنے سے ورم کم ہو جاتا ہے۔

نامردی

(IMPOTENCH)

مردوں کی جماع کی قابلیت کم ہونا۔ یا بالکل زائل ہونے کو۔ نامردی کہتے ہیں۔ اس میں نسل پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ جلق بہت زیادہ جماع وغیرہ اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

سبال، اسیردلیٹاھ۔ دنی خوراک ۵ سے دس قطرے تک کمزوری کی وجہ سے جماع کی طاقت نہ رہنے پر۔

حاد مرض میں :- اگنس کیکٹس x ۶ : ۳ مرض مزمن ہونے پر لائیو۔ ۳۰۔

ایڈفاس x ۲۔ (بہت زیادہ جماع ہونے کی وجہ سے) اناکارڈیم ۶۔ جلق یا عیاشی کی وجہ سے صحت خراب ہونے پر مرض نامردی ہونے کا خیال غلط ہو۔

اگنس کیکٹس x ۲ مرض خفیف ہونے پر (خاص کر مرض کی شروع میں

اناکارڈیم ۴۔ ۲۰۔ ۱۰ جوان جلق یا عیاشی کی وجہ سے صحت خراب

ہونے پر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نامرد ہو گئے ہیں۔ اور اس لئے شادی کرنا نہیں چاہتے۔ ان کے لئے یہ دوا بہت اچھی ہے۔

ایڈفاس ۱۔ ۳۔ بہت زیادہ جماع کی وجہ سے یہ مرض ہو۔

لائیو پوڈیم ۳۰۔ ۲۰۰۔ مزمن مرض ہونے میں خصوصیت کیساتھ مفید ہے۔

آرنیکا ۳۔ یا پلٹی بریکم x ۱۔ دپوٹ وغیرہ لگنے سے یہ بیماری ہونے پر۔

ملکس دامیکا ۳۰۔ کوئیم ۳۔ کوہرم ایسٹیکم x ۶ سفوف۔ ایڈفاس ۶۔ ۳۰۔

سینیم ۶۔ جلس x ۱۔ ۳۰۔ کلکیریا کارب ۳۰۔ فاسفورس ۲۰۰۔

سلفر ۶۔ ۲۰۰۔ وہ دوائیں گناہ سے مایوس ضروری ہوتی ہیں۔ اگر یہ کل دوائیں بیکار ثابت ہوں تو بیوفن ۳۰۔ کی آزمائش کرنی چاہیے۔

اصول :- خیالات پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ دودھ گھنی، مکھن، بیٹر

وغیرہ مقوی غذا کھانا چاہیے۔ ادویات (APHRODISIACS)

حرک باہ کھانا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اخباری اشتہارات کے چکر میں نہ گرنے کو بہت لوگ اپنی صحت ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھتے ہیں۔

آلات تناسل کے دوسرے امراض

ضیق غلفہ۔ اُنزو۔ (گھونگھٹ کا تنگ ہونا) (PHIMOSIS) یا سپاری کو ڈھکنے والا چمڑا نہ کھل سکتا۔ ضیق غلفہ پھٹ (FISSURES) جانے پر، ہونے پر، رٹا کس ۶۔ (جلد کھجلا نے پر) کٹا بس ۳۔ (آکاس سٹرخ رنگ اور گرم ہونے پر) مرض سوزاک عام میں اُنزو یا ضیق غلبہ دیکھئے۔

اٹا اُنزو :- (PARAPHIMOSIS) یا سپاری کو ڈھکنے والا چمڑا۔ سپاری کو نہ ڈھک سکے۔ کالوسنتھ ۶۔ سوزاک عام میں، اٹا اُنزو، ملاحظہ ہو۔

ورم حشفہ (سپاری کی سوجن) (BALANITIS) یا سپاری کے بلغمی جھتی کا ورم اور مواد نکلنا۔ ماسٹرک ایڈ ۶۔ ذکر کی جلد کھجلا نے پر۔ (جلن ہونے پر، یا اوپر پھنسیا ہونے پر، یا پٹری پر پڑ جانے پر) پلاسٹلا ۶۔ دچرٹ کے نیچے زرد رنگ کا پانی یا مواد نکلتے پر، تھو جا ۳۔ (بلغمی پھنسیا ہونے پر گرم پانی اور صابن سے متورم جگہ کو ہمیشہ دھو کر صاف رکھنا چاہیئے۔) (سوزاک عام میں ورم حشفہ ملاحظہ ہو۔)

جملق (MASTURBATION) یعنی ہاتھ کسی دوسرے غیر طبعی طریقہ سے انزال منی کرنا۔ کینتھرس ۶x۱۔ (مردوں کے لئے) پلٹینا ۶ (عورتوں کے لئے) آرگینم میزورنیا ۳۔ غذا کے تھوڑی دیر پہلے استعمال کرنے سے یہ بڑی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ رٹ کے اور رٹکیاں یہ گناہ نہ کریں۔ اس پر ولی کو ہمیشہ نظر رکھنا چاہیئے۔ صاف ستھارہ بنا۔ صاف ہوا کا استعمال کرنا وغیرہ اھول صحت کی پابندی کرنا چاہیئے۔ مشقت زنی کی عادت ترک کرنے کے بعد اعتدال ہو سکتا ہے۔ محنت برابر کرنا اور دل کو پاک صاف رکھنا چاہیئے۔ مشقت زنی کی وجہ سے مرض میں :- فامفورس ۶۔ ۲۔ سلفر ۱۲۔ اور ایڈ فاس ۱۔ ۳۰۔ دوائیں نہایت مفید و کارآمد ہیں۔

جملق جماع (CONJUGAL ONANISM) افزائش نسل کو روکنے کی خواہش سے اجماع کے وقت ذکر پر غلاف (PROTECTOR) چڑھا لینا یا جماع کے وقت انزال کے کچھ بیشتر نکال لینا وغیرہ کو جملق جماع کہتے ہیں۔

اس سے جسم کی تندرستی اور دل کی خوشی بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ ایک معالج کا بیان ہے کہ اس کا توجہ مشت زنی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ فاسفورس ۳۰۔ ۳۰۔ مناسب غذا آدھ دھوا کی تبدیلی اور کم از کم ایک ہفتہ کے وقفہ سے اچھی طرح جماع مناسب ہے۔

مفصل حالات اور علاج کے لئے کم از کم ہماری کتاب موسومہ جنسی بیماریاں طبع ثانی کا بیان جلتی ملاحظہ فرمائیے۔

زیادہ خواہش جماع :- پلٹینا ۶۔ ۲۰۰۔ (عورتوں کے لئے ہیکرک ایڈ ۶۔ مردوں کے لئے)

آلات تناسل کی کمزوری اور جماع کی از حد خواہش :- ایڈ فاس ۱۔ ۶۔ جلس ۱۔ ۳۰۔ (ذکر کی لاغری میں) ایون کارب ۳۰۔ گریفٹس ۶۔
 دھوڑوں کو جماع کی خواہش نہ ہونے پر (طبعی کمزوری یا زیادہ قضیب کی حرکت سے مردوں کا قضیب بالکل کمزور یا بیکار ہو جانے پر سبال سپرولٹیا ۵۔
 دنی ٹوراک ۵ سے، قطرے تک) روزانہ ۲ مرتبہ استعمال کرنے سے اکثر بہت فائدہ ہوتا ہے۔
 تھوڑی کمزوری میں کیملک کارب ۶؛ بالکل ناقابل ہونے پر جلس ۵۔
 خاصکر ذکر بالکل کمزور ہونے یا قوت ایستادگی نہ ہونے پر۔

دوسری دواؤں کے لئے ہماری کتاب موسومہ جنسی بیماریاں دیکھنا چاہیے۔
 زیادہ جماع کی وجہ سے ناقابل ہونے پر لائیکو پوڈیم ۳۰۔ ایڈ نائٹرک ۶۔ ۳۰۔
 دلائیکو سے فائدہ نہ ہونے پر انکس کیکش ۱۱ نامردی کا باب دیکھئے۔
 سوزاک اور آتشک وغیرہ امراض کا حال اور علاج کے لئے مندرجہ ذیل باب امراض زہریہ ملاحظہ فرمائیے۔

امراض زہریہ۔ امراض خبیثہ

(VENEREL DISEASES)

آتشک سوزاک۔ آلات تناسل کی خرابی سے پیدا ہونی جاریاں ہیں اسی سے ان کو امراض زہریہ خبیثہ کہتے ہیں۔ یہ مرض متعدی ہے۔ امراض زہریہ کے متعلق عام فہم باتیں اور ان کا علاج مندرجہ ذیل ہے۔

(مفصل حالات کے لئے مقصد اب) سور الزاجی اور اس کا دفعیہ ملاحظہ ہو۔

آتشک گرمی (SYPHILIS)

جس کو آتشک ہو اس کے ساتھ جانا کرنے کے بعد تندرست انسان کے آلت تناسل میں زخم (CHANCER) پیدا ہونا اس بیماری کی خاص علامت ہے زخم اگر بڑا ہو تو اسکو باد فرنگ یا آتشک حقیقی (HARD CHANCER) کہتے ہیں زخم ہونے پر اسکو آتشک مجازی (SOFT-CHANCER) کہتے ہیں۔ آتشک حقیقی میں خون خراب ہو جاتا ہے یعنی سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور آتشک مجازی میں جسم خراب نہیں ہوتا۔ پہلے ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ آتشک حقیقی اور آتشک مجازی ایک مرض کی دو شکلیں ہیں۔ لیکن اب بغیر کسی شک و شبہ کے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دوسری بیماری ہے۔ یقیناً دونوں مختلف قسم کے متعدی زہر (VIRUS) یا جراثیم (BACILLUS) سے پیدا ہیں۔ پہلے مرض آتشک اس میں نہ تھا۔ شاید یورپین نے یہ مرض اس ملک میں پھیلا یا ہے اسی سے اس کا دوسرا نام مرض فرنگ ہے۔

(۱) آتشک حقیقی

ٹریپونما پالیدم یا اسپائروکیٹیا پالیڈا (TREPONEMA PALLIDUM) (ORSPIROCHAETA PALLIDA) کے جراثیم آتشک حقیقی کے خاص اسباب ہیں۔ یہ جراثیم یا متعدی زہر کسی طرح تندرست جسم میں داخل ہونے پر مرض پیدا ہوتا ہے۔ آتشک حقیقی جس کو ہو اس کے ساتھ جماعت کرنا اور

یہ مرض گرمی کہلاتا ہے۔ قریب ۳۰ برس پیشتر سندھ کے باشندے بھاؤ مرض نامی مشہور کتاب بھاؤ پرکاش میں مرض فرنگ کے بارہ میں لکھا ہے کہ فرنگیوں کو یہ بیماری اکثر ہوا کرتی ہے۔ اس لئے مانگوں نے اس کو مرض فرنگ کہا ہے۔ اور سر ڈاکٹر جولیہ جینڈر رائے نے کتاب موسومہ HISTORY OF THE HINDU (CHEMISTRY) میں بھی مرض فرنگ کا بیان لکھا ہے۔

خواب زخم کا چھونا اور رطوبت لگنا، مریض کے کپڑے اور انگوچھا، کاغذ، حق
 گھاس، استرا وغیرہ چیزیں کام میں لانا۔ لاپرواہی سے مریض کی تیمارداری۔ یا
 خدمت کرنا وغیرہ بہت طریقوں سے یہ زہر تندرست جسم کے کسی پتیلے یا کٹے
 ہوئے چمڑے سے یا بلغنی جھلی کے راستہ سے اس جسم میں داخل ہو جاتا ہے
 مجامعت سے پہلے اگر ماں باپ میں یہ مرض ہو تو اولاد میں بھی آسکتا ہے
 تندرست جلد کے کسی پتلے یا کٹے ہوئے حصہ میں یا بلغنی جھلی میں یہ زہر لگ
 کر جب خون میں مل جاتا ہے تو وہاں زخم ہو جاتا ہے۔ یہ زخم سب سے پہلے
 آلات تناسل میں ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ہونٹ، ہاتھ کی انگلی وغیرہ دوسرے
 حصہ جسم میں بھی یہ زخم پہلے نمودار ہوتا ہے۔ عموماً عورت اور مردوں میں اسے
 کسی ایک کو بھی زخم ہونے سے جراثیم کے بعد زخم قریب تین ہفتوں میں
 یہ زہر مرد سے عورت اور عورت سے مرد کے آنہ مجامعت میں آتا ہے۔
 شروع میں ایک سرخ، سخت، بلا درد کے ایک پھنسی پیدا ہوتی ہے۔
 اس کے بعد آنہ مجامعت سے زہر جسم کے دوسرے ہفتوں (سہ ہونٹ، زبان،
 انگلی، پستان کی گھنٹی، ناف، ران، مقعد وغیرہ) میں پھیل جاتا ہے۔
 یہ خوفناک مرض تمام جسم کو خراب کر ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو
 "آتشک عام" کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام، گرمی، مرض نرنگ یا سفلس
 ہے۔ آتشک عام میں سب سے پہلے اس جگہ جہاں زہر چھو گیا ہوا، پھر خون
 میں اور آخر میں جسم کی رگوں میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ آتشک عام کا
 زہر پھیل جانے پر عرصہ تک یا تمام زندگی اس کا خراب شرہ چکھنا پڑتا ہے
 اس لئے اس کا علاج ہوشیاری اور خبرداری سے کرنا چاہیے۔

آتشک کا زہر جسم میں پیوست ہونے کے وقت سے جب تک زخم نمودار
 نہ ہو تب تک اس کو مرض آتشک کا زمانہ حضانت (INCUBATION STAGE)
 کہتے ہیں اس زمانے کا وقت کم از کم سے نوے عموماً ۲۰ دن ہے، اس
 زمانہ میں مریض کے جسم پر کوئی علامت نہیں دکھائی دیتا ہے۔ زمانہ حضانت
 کے آخر میں یہ مرض ایک بعد دیگرے تین درجوں میں نمودار ہوتا ہے۔

(۱) درجہ ابتدائی (PRIMARY STAGE) زیر پھیلنے کے تین ہفتہ بعد ماؤف جبکہ کھجلا نے لگتی ہے (کبھی کبھی سخت) معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہاں مٹر کی طرح سخت، بغیر مواد کے ایک گول زخم ہو جاتا ہے۔ اس زخم کے چاروں طرف کا کنارہ اُٹھرا اور سخت؛ بیج کا حصہ گہرا ہوتا ہے۔ اور زخم کے نزدیک کے پٹھے کی کلشیاں آہستہ آہستہ بڑھنے اور سخت ہونے لگتی ہیں۔ (یعنی باگھی اور بد پیدا ہو جاتی ہے) ایک ڈیڑھ ماہ بعد زخم آہستہ آہستہ آرام ہونے لگتا ہے۔ بد بھی کچھ کچھ بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن کچھ بڑھنے کی علامت موجود رہتی ہے۔ مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے اگر آرمیجمنت کچھ سڑ کر گر جائے تو سمجھنا چاہئے کہ حالت نازک ہے۔ جب تک تمام زخم اور بد موجود رہے۔ اس وقت تک ابتدائی زمانہ رہتا ہے اس زمانہ ابتدائی کا وقت دو ہفتہ سے چھ ماہ تک ہے۔

(۲) درجہ ثانوی (SECONDARY STAGE) مذکورہ بالا ابتدائی زمانہ میں زخم پیدا ہونے کے تین چار ماہ بعد مریض کو بخار؛ کمزوری؛ اور درد سر؛ کئی خون؛ زخم؛ گلا۔ بلغمی جھلی میں زخم؛ امراض جلدی؛ زیادہ درم بالوں کا جھڑنا۔ جوڑوں اور ہڈیوں میں درد وغیرہ علامات نمودار ہو سکتے ہیں۔ زمانہ ثانوی میں مریض کا تمام خون خراب اور زہریلا ہو جاتا ہے۔ زمانہ ثانوی کا وقت ایک سے پچاس سال تک رہے۔

(۳) درجہ ثانی (تیسرا درجہ) (TERTIARY STAGE) دو تین سال میں درجہ ثانوی کی علامت اچھی طرح آرام نہ ہو جانے پر یا مریض کچھ اور اچھا رہنے کے بعد آہستہ آہستہ درجہ ثانی (تیسرے درجہ) میں آ جاتا ہے۔ اس حالت میں جسم کے نشج؛ رطوبت؛ خون؛ ہڈی اور گوشت اندرونی کل عضو ماؤف ہو کر غارت ہونے لگتے ہیں۔ منہ؛ غذا کی نالی جلد وغیرہ میں زخم ہو جانا اور مواد جمع ہونا۔ گوشت؛ ہڈیاں؛ دل وغیرہ خاص طور سے ماؤف ہو جاتے ہیں۔ ہڈیوں کے اوپر کی جھلی؛ قوطہ؛ دماغ؛ جگر وغیرہ میں اُبھار (GUMMATA) پیدا ہونا اس درجہ ثانی

کے مخصوص علامات ہیں۔ اس درجہ کا زمانہ نامعلوم ہے۔
 (دوسری اور تیسری حالت میں مختلف طریق پر علامات نمودار ہوتے ہیں)
 ان کا حال ایک چھوٹی سی کتاب میں بیان کرنا ناممکن۔ مفصل حال اور علاج کیلئے
 ہماری کتاب "جنسی بیماریاں؟ اور دوا پالیسی" (ملاحظہ ہو)۔ مریض آتشک کی تکلیف
 غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک۔ (یعنی رات میں بڑھ جاتی ہے)۔

علاج

اگر یہ کہا جائے کہ بارہ اور مرکزی ضرورت کے مطابق اس مرض کی بہترین
 دوا ہے تو نامناسب نہ ہوگا۔ بلکہ آتشک کے درجہ ابستدانی اور درجہ
 ثانوی میں صرف مرکب سول ہی اصول کے مطابق استعمال کرنے سے مرض
 کم ہونے لگتا ہے۔ پہلے آتشک کے زخم میں اور درجہ ثانوی کے گلے
 ہوئے زخم اور مواد بھرے پھوڑے میں یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ زخم نمودار
 ہوتے ہی مرکب سول کا استعمال شروع کرنے سے بد اکثر نہیں بچتی۔

اگر آتشک سخت قسم کی ہو تو مرکب سول کے عوض مریض کو ابستدانی اور
 ثانوی درجہ میں مرکب پروٹو آیوڈ ۲۰۰ x استعمال کرنا چاہیے۔ مرض کے
 تیسرے درجہ میں کیسی آیوڈ ۱۰۰ (دنی خوراک ۵ گریں) ۳۰ دوا ہے۔
 کم سے کم دو سال تک علاج ہونے سے مرض آرام ہو جاتا ہے۔ مریض کے
 ابستدانی ثانوی کل حالتوں میں بیج بیج میں (یعنی دو تین ماہ بعد، سفلیئم
 ۳۰۔ ایک ایک خوراک استعمال کرنا چاہیے سفلیئم کے دو روز بعد
 اور دو روز پہلے کوئی دوسری دوا نہ کھانی چاہیے۔

مذکورہ دوا کو مدد دینے کے لئے مندرجہ ذیل ادویات (موقعہ موقعہ
 پر ضروری ہونے سے) استعمال کرائی جاتی ہیں:- بد کے بڑھنے پر فائٹولکاس
 پھنپیاں جن میں مواد یا چکتے ہوں۔ گریفائٹس ۴۔ تانبے کے رنگ
 کے چکتے میں سائز ۶۔ بہت مواد جمع ہونے پر سکا ۶۔ زخم
 پیدا کرنے والا اخراج یا جلن کے درد میں آرسنک ۶۔ گلٹیاں ماؤف
 ہونے پر ناک میں زخم ہونے پر یا ناک کا گلنا شروع ہونے پر آرم ٹیبا لیم ۶۔

مرض کے مزمن حالت زخم خبیث یا بہت زیادہ پارہ کا ناجائز استعمال کرنے پر ایسڈ ٹائٹریک ۶۔ مستہ یا تھوڑی ہونے پر تھوچا ۶۔ بہت زیادہ مقدار میں پارہ (مرکری) استعمال اور آتشک کے زہر کے مل جانے سے پیدا ہونے مریض کے جسم کے علامات۔ جیسے بڑیاں، مسوڑھا وغیرہ ماؤف ہونے پر۔ اسلفور ۳۰۔ رات میں بڑیوں میں زیادہ درد ہو تو زیریم ۶۔ آنکھوں کی بیماری میں سنا برس ۳۰ x سیفوف۔ وجع مفاصل میں کیلی آلوڈ ملر منجیر ۳۰۔

علاج معاون

نیم کی پتی کو اُبال کر اسکے پانی سے زخم دھونا اور اس پر گیندہ کی پتی کا عرق یا کیلینڈولا ۱۰۔ خارجا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بد بک جائے تو تین چار گھنٹہ کے وقفہ سے اس پر اسی کی پوٹس باندھنا چاہیے۔ رات میں جاگنا۔ پھلی، گوشت، دہی یا میٹھا کھانا شراب پینا۔ یا کوئی اور نشہ آور شے کھانا یا پینا۔ تمباکو کھانا وغیرہ ممنوع ہے۔ عند امتقوی لیکن ہلکی ہوئی چاہیے۔ بخار نہ ہونے پر روزانہ گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ مریض کو دانت ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔

زندگی میں کسی طرح بخراکیم تہ کے آتشک عام نہیں ہوتا (مقصد لب ملاحظہ ہو) آتشک مولود می۔ آتشک موروثی۔ آتشک پیدا نشی

(HEREDITARY SYPHILIS)

آتشک کسوبہ کی نسبت موروثی آتشک زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بچہ کے ڈیڑھ دو ماہ بعد ولادت یا اس کے اندر ہی بچہ کے چوتھے پیٹ ہتھیلی اور پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ (آتشک کے دوسرے درجہ میں جلدی بیماری نمودار ہوتی ہے ہانک میٹھ جاتی ہے اور جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ علاج :- حاملہ کے لئے مرک سول ۶ اور بچہ کے لئے پیدا ہونے ہی مرک سول مفید ہے۔ زخم کو روز گرم پانی سے دھونا چاہیے۔

(آتشک عام اور پیدا نشی آتشک کے متعلق قابل معلوم ہونے کی باتیں اور علاج کے لئے مقصد لب، سورا المزاجی اور اس کا دفعیہ ملاحظہ ہو۔)

زخم آتشک مجازی (CHANCROID)

جراثیم ڈاکریز (DUCREY'S BACILLUS) تشنگ زخم کا خاص باعث ہے۔ جراثیم آتشک تندرست آدمی کے جسم میں محض مریض کی صحبت یا چھونے کی وجہ سے داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس مرض کو زخم آتشک مجازی کہتے ہیں اس مرض کا زہر جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ صرف ذکر پر زخم ہوتا ہے۔ کل جسم خراب نہیں ہوتا۔ اسلئے آتشک حقیقی کی طرح یہ خطرناک نہیں ہوتا ہے۔ اور جلد اچھا ہو جاتا ہے۔

اس میں صحبت کے بعد تین روز کے اندر ہی اندر ذکر پر زخم ظاہر ہوتا ہے زخم ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ بظاہر معمولی زخم رہتا ہے۔ نرم پیر درد اس سے بھی مواد نکلتا ہے۔ کبھی کبھی سڑنے لگتا ہے۔

زخم کا کنارہ اور بخار ہوتا ہے۔ بیج کا حصہ کم گہرا اور نیچے کا حصہ آہنیج کی طرح نرم و سوراخ دار۔ اس مرض کے ہونے کے تین ہفتہ بعد، بد نکلتی ہے۔ یہ بد بڑی ہوتی ہے۔ اور اس میں مواد ہوتا ہے۔ لیکن آتشک حقیقی میں بد کی زیادہ گلٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور ان میں پیپ نہیں پڑتی۔ عموماً آتشک مجازی دو ماہ میں اچھی ہو جاتی ہے لیکن ٹھیک طور سے علاج نہ ہونے سے اگر آنت سڑنے لگے اور گلی کر گر جائے تو مریض مر سکتا ہے۔ اسلئے ہوشیاری سے علاج کرنا چاہیے۔

علاج :- مرک سول ۲۰۰، سفوف ۶ کے استعمال سے اس مرض کا زخم اہل دند اچھا ہوتا ہے۔ اگر سول سے فائدہ نہ ہو تو نائٹرک ایسڈ ۳-۶ دینا چاہیے۔ زخم اگر سڑنے لگے تو آرسنک ۳۰۰ استعمال مفید دکار ثابت ہوا ہے۔ علاج معادن :- آتشک حقیقی کے بیان میں علاج معادن اور مقصد 'ب' ملاحظہ ہو۔ اس مرض کے تین قسم کے زخم متہ سڑے ہوئے زخم کی علامات کے بیان کے لئے ہماری کتاب سیمو سومر جندریہ لوگ (سیجتر۔ مندی ایڈیشن ملاحظہ ہو)۔

سوزاک (GONORRHOEA)

مریض سوزاک کے ساتھ جماع کرنے کے بعد تندرست آدمی کے مجری بول یا پیشاب میں جلن ہونا اور وہاں سے پیپ کا اخراج ہونا۔ سوزاک کی خاص علامت ہے۔ کئی ہفتہ بعد اگر مریض سوزاک کو مستہ، کمی خون، وغیرہ تمام خراب کرنے والے علامات ظاہر ہوں تو اسکو سوزاک عام کہتے ہیں۔ اور اگر مستہ کمی خون وغیرہ تمام جسم کو خراب کرنے والے علامات نمودار ہوں اور علیحدہ علیحدہ زہر سے پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) سوزاک عام

جراثیم گنوکاکس (GONOCOCCUS) سوزاک عام کا خاص سبب ہے۔ یہ جراثیم یا متعدی زہر (VIRUS) کسی طرح تندرست انسان کے جسم میں داخل ہونے سے بیماری ہوتی ہے۔ مریض سوزاک عام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زہریلی رطوبت کا چھوٹنا۔ مریض کی خدمت یا علاج کرنا وغیرہ بہت اسباب سے یہ زہر تندرست جسم میں داخل کر سکتا ہے۔ ولادت سے پہلے والدین کو یہ مرض ہونے پر یہ زہر تندرست شخص کے مجری بول کے ذریعہ اندر جاتا ہے۔ اور پہلے وہاں کے بلغمی جھلی میں داخل ہوتی ہے۔ اسکے بعد وہاں سے رطوبت نکلنے لگتی ہے جسے مریض سوزاک کے ساتھ جماع کرتے وقت یہ بیماری مرد کے مجری بول پر حملہ کرتی ہے۔ اسکے بعد وہ مجری بول سے براہ راست، منہ، آنکھیں وغیرہ دوسرے حصوں پر بھی پھیل جاتی ہے۔ اور جس مرد کو سوزاک ہو اس کے ساتھ جماع کے وقت عورت کے مجری بول اور آلات تناسل پر بھی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے۔ مردوں کے مجری بول کے نسبت عورتوں کا مجری بول چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لئے عورتوں کو سوزاک اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا ہے۔

سوزاک کا زہر مردوں کے تندرست جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک دو دن میں مجری بول کا بیرونی منہ (MEATUS URINARIUS) کھجلا یا کرتا ہے۔ اور سرخ ہو جاتا ہے۔ اور وہاں سے سفید رطوبت اخراج پایا کرتی ہے۔ اور دو تین روز بعد ذکر سوخ جایا کرتا ہے۔ پیشاب کے وقت تیز جلن اور تیز درد پیدا ہوتا ہے۔ اور دودھ کی طرح یا خون آلودہ زیادہ مقدار میں زرد یا سبز گاڑھی رطوبت یا پیپ نکلا کرتی ہے، پٹھے، ران، فوطہ،

وغیرہ اگڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو کہ گھٹا ہے۔ اور ذکر کچھ سخت ہو جاتا ہے اور دوسرے مقامات بھی ماؤف ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں (یعنی دو تین ہفتہ بعد) رطوبت علی الترتیب پتلی، بلغم اور پیپ آلودہ، یا پتلی سبز نائل ہوا کرتی ہے۔ اور جلن کم ہو جاتی ہے جب تک سفیدی مائل رطوبت نکلتی ہے تب تک سوزاک کا ابتدائی زمانہ (قیام کا وقت ہمیشہ دو تین روز) جب تک گاڑھی پیپ نکلتی ہو تب تک مرض کا زمانہ شدید حادثہ (اس کا زمانہ قیام معلوم غالباً تین چار ہفتہ) ہے۔ زمانہ فرمن کا دوسرا نام قرعہ (GLEET) ہے۔ تند رست عورت کے جسم میں سوزاک کا نہ ہر پھیلنے سے فرج سوچی، سرخ

اور پردہ ہوتی ہے۔ اور اس سے رطوبت اخراج پاتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ اور پھر کل آلات تناسل پر حملہ ہوتا ہے۔ اسکے بعد جلن، اور تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اور بیماری شفا کی طرف رخ کرتی ہے۔ ہر مریض کو مناسب دوا کا استعمال کرنے کے علاوہ سوزاک کا ہر جسم سے پوری طرح نکل جاتا ہے اگر علاج غلط نہ ہو تو اخراج ہمیشہ سات آٹھ ہفتہ میں بند ہو جاتا ہے۔ اور معلوم ہونے لگتا ہے کہ بیماری آرام ہو رہی ہے۔ لیکن تصور اسی نقص ہونے سے سوزاک کے بڑے نتائج معلوم ہونے لگتے ہیں۔ (جیسے ذکر کی سختی، ٹیڑھا ہونا، ورم حشفہ، اختناق الغلفہ، ورم فوطہ۔

ورم فرج، خونی پیشاب، بدن پر مشہ، ورم چشم، بد، وجع مفاصل عرصہ تک قرعہ کا قیام اور اس سے پیدا ہوا مجرمی بول کا سکڑنا۔ پیشاب رکنا۔ وغیرہ۔ سوزاک اور اس کے بعد کے امراض کا علاج مندرجہ ذیل ہے۔ (مفصل حالات کے لئے ہمارے کتاب موسومہ جنسی بیماریاں اردو ایڈیشن ملاحظہ ہو)

مریض سوزاک کی تکلیف

طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک دن میں بڑھتی ہے۔

علاج

زمانہ ابتدائی میں سیسیا، ۳۔ زمانہ شدید حادثہ میں ایجو نائٹ ۳۰ x۔ (ورم کی ابتدائی حالت میں بخار ہونے پر) اور کنالہس سٹالوا ۱۰۰۔ ایکون کھانیسے

درم کم ہو جاتا ہے۔ ربار بار پیشاب، مواد آنا، خونی پیشاب، تیز جلن وغیرہ علامات میں
زنانہ مزمن میں: - حقو جا ۶۔ ۳۔ نا ٹیکرک ایٹڈ ۳۔ ۳۔ (خاصکر
پہلے مرگرمی یا پارہ استعمال کرایا جائے۔)

عورتوں کے سوزاک میں: - کوپو ۳۳۔ ۱۔ اور سیپیا ۳۔ مفید ہے۔
ڈاکٹر ای جونس، فرماتے ہیں کہ جسم سے سوزاک کا زہر پوری طرح نکلنے
کے لئے بہت عرصہ تک حقو جا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں
کہ بیماری کی حالت کے مطابق خواہ کوئی دوا کھائی جائے۔ لیکن روز رات میں
سونے کے پہلے حقو جا ۳۔ دس قطرے استعمال کرنا چاہئے۔ اس طریقہ سے زہر
سوزاک جسم سے بالکل نکل جاتا ہے۔ (ہوسپوری کارڈر فروری ۱۹۲۳ء) کیلئے
ہندرجہ بالا ادویات سے ہمیشہ بیماری اچھی ہونے لگتی ہے بعد
کے امراض کے لئے اور دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔

درم حشفہ: - علامت (یعنی) بیماری پر بیماری ہو کر اس کے بلغمی جھلی میں
درم ہونے پر: - اور زیادہ مواد نکلنے پر: - مرگ سول ۶۔ استعمال کرنا۔ اور
سیاری کو صاف کر کے کلینڈریولا ۱۰۔ (دس قطرے ایک آؤنس پانی میں)
لوشن سے سیاری کو تر رکھنا چاہئے۔

ضمیق الغلفہ ہونے یعنی ذکر کے انگلے حصہ کی جلد نہ کھل سکنے پر: -
مرگ سول ۶۔ گواٹیکم ۲۔ کا استعمال کرنا۔ اور ہی میس ۱۰۔ (دو بوند ایک
آؤنس پانی کے لوشن سے نانزہ تر رکھنا چاہئے۔
اختلاف الغلفہ ہونے پر (یعنی ذکر کے انگلے حصہ کی جلد سے نہ ڈھک
سکنے پر) مرگ سول ۶۔ استعمال کرنا اور ہائی پریم ۱۰۔ (دو قطرے ایک
آؤنس پانی کے لوشن سے سیاری کو تر رکھنا چاہئے۔

۲۔ ذکر کے انگلے حصہ کی جلد بہت سوجنے اور متورم ہونے کی وجہ سے اس کا ٹھنڈ
ہو جاتا ہے۔ اسی سے مواد اچھ طرح نہیں نکل پاتا اور جلد اچھی طرح کھولی اور بند
نہیں نہیں کی جاسکتی۔ دوا سے اگر فائدہ نہ ہو تو سرجن کی رائے لی جانی چاہئے۔

ور غدرہ مذی ملاحظہ ہو

ورم فوطہ میں : فائٹولک ۳۔ کلیٹیس ۳۔ اے پس۔ آر سے نکم اہم وغیرہ
ورم فرج میں : کارب (پس) ۶۔ ہیٹاڈونا۔ ایکونائٹ اور سلفر۔

خونی پیشاب میں : کینتھر ۳۔ (اس کتاب کی آلات بول کے بیماری کا باب
خونی پیشاب ملاحظہ ہو) ہائیڈس۔ ٹرائیٹھنا وغیرہ بھی مفید ہیں۔

وجع مفاصل : تھوجا ۳۰۔ فائٹولک ۳ (سوزاک سے پیدا ہونے والے مفاصل

کی بہترین دوا ہے) آپاسٹیل ۶۔ رطوبت رک جانے کی وجہ سے پیدا ہونے
والے مفاصل میں) براؤنیا ۳۔ آر جینٹیم ٹائیٹریکیم ۶۔ ٹائیٹریک ایسڈ ۶۔ ۳۰۔

قرحہ : یعنی درجہ سوئم کا اخراج بہت طرہ تک رہنے پر تھوجا ۳۰۔

ٹائیٹریک ایسڈ ۶۔ ہائیڈراسش ۱۰۔ دس گنے پانی میں ملا کر اس سے پیکاری
سینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اخراج رطوبت کی اور دواؤں کیلئے سوزاک مقامی ملاحظہ ہو۔

مجری بول کے سکڑنے میں : (یعنی مجری بول کے سکڑنے کی حالت میں

پیشاب ہوتے وقت شروع میں پیشاب خلاصہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد

بالکل نہیں ہوتا) کینتھر ۳۰۔ ۳۰ استعمال کرنا اور گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے۔

ضرورت ہونے پر کیتھٹریٹر (CATHETER) پیشاب کرنا پڑتا ہے

اس کے بعد آر نکا ۳۰ استعمال کرنا چاہیے۔ (مجری بول کا سکڑنا ملاحظہ ہو)

علاج معاون

مریض کو ٹٹانے سے بالائی حصہ کچھ اوپر رکھنا چاہیے اور صاف ستھرا

رکھنا چاہیے۔ گوشت۔ مچھلی۔ ترشی اور سنڈا اور مٹھا کو بیوڈا اور طریقہ

گھوٹا یا سائیکل کی سواری زیادہ محنت کرنا منع ہے۔ خواہش کے مطابق

پانی پینا۔ دودھ۔ اور مہری کا شربت ایسوں کا طرہ فائدہ کرتا ہے۔

ضرورت پر سنگوٹ استعمال کرنا چاہیے۔

سوزاک عام کا نہ ہو۔ اور آتشک عام کا نہ ہو ایک مرتبہ صبح میں

پھیل جانے پر سو میو پنیک طریقہ کی منتخب دوا کے استعمال کے بغیر آسانی سے نہیں

نکلتا اس لئے زندگی میں کسی کسی کو دوسرے مرتبہ آتشک یا سوزاک نہیں ہوتا بقدر ملاحظہ ہو۔

مقامی سوزاک

ایک قسم کا متعدی زہر (VIRUS) اس بیماری کا خاص سبب ہے۔ یہ زہر تندہت جسم میں داخل ہونے پر وہ جسم کی ایک جگہ (یعنی آلات بول) پر حملہ کرتا ہے۔ تمام جسم خراب یا زہریلا نہیں کر پاتا۔ اسی سے اسکو سوزاک مقامی کہتے ہیں۔ سوزاک مقامی اور سوزاک عام دونوں میں پھیلتا۔ حملہ کرنا ورم، بلغم اکودہ مواد ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے دونوں مرضوں کا فرق بتانا آسان نہیں۔ لیکن کئی ہفتہ ہو جانے پر اگر ذکر کے چاروں طرف گوبھی کے پھول کی طرح گوشت کا لوتھڑا (دمتہ) اور کئی خون سے کل جسم خراب ہونے کی علامت نظر ہو تو خیال کر لینا چاہیے کہ مریض کو سوزاک مقامی ہو گیا ہے۔ اچھی طرح علاج ہونے پر کئی ماہ میں مقامی سوزاک کا زہر جسم سے دور ہوتا ہے مگر اس ملک میں سوزاک کے مریض زیادہ تر سوزاک مقامی میں مبتلا ہوتے ہیں۔

علاج

پیٹرولینیم۔ فی خوراک پانچ چھ قطرے کئی روز تک استعمال کرنے سے مرض بالکل جاتا کرتا ہے۔ اگر اس سے اچھا نہ ہو تو اخراج کے قسم کا خیال رکھ کر علاج کرنا چاہیے؛ جیسے خون کے اخراج میں کینتھرین ۲۰-۳۰ دور صبح کی طرح اخراج میں کوپیوا ۳۰-۴۰ پانی کی لیڈارا اخراج میں کنابلس سٹائیوا ۱-۲۔

سہ دونوں قسم کے مرض سوزاک میں اور ورم مجری بول ایک ہی قسم کا بلغم پیپ کا اخراج ہوتا ہے اس کے علاوہ گرم، سخت زنی؛ زیادہ جھانڈ وغیرہ اسباب سے بھی اخراج ہوا کرتا ہے۔ اسلئے اس طرح کا اخراج دیکھتے ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ سوزاک ہو گیا ہے۔

سہ اس کتاب کے شدید اور مزمن مرض کے علامات کے مطابق ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ مقامی سوزاک ایک نیا مرض ہے۔ کیونکہ اس میں درجہ ابتدائی درجہ شدید اور درجہ مزمن اور بے علی الترتیب ہوا کرتے ہیں۔ اور سوزاک عام۔ ایک زندگی کا مرض اسلئے ہے کہ اس میں اول اور دوم درجہ موجود رہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ نہیں ہوتا۔ (مقصد اب، سوال المراجعی: اور اس کا علاج ملاحظہ ہو۔)

بلغھی اخراج میں کیسپ سکیم ۳۔ مواد کے اخراج میں نیئر میٹور ۴۔ زرد اخراج میں ہیر سلفر ۵۔ بنر رنگ کے اخراج میں تھو جا ۶۔ گلابی رنگ یا خون سفید ذرات کے اخراج میں پٹر و سلنیم ۷۔ بدبودار اخراج میں کاربوئی ۸۔

ایلو پتھیک کے غلط استعمال سے تندرستی خراب ہو جانے پر، امراض ادویات کی دواؤں میں انتخاب کر کے مریض کو دوا دینا چاہیے۔

علاج معاون:۔ سوزاک عام کے بیان میں علاج معاون ملاحظہ ہو۔

(BUBO)

بد۔ باگھی۔ خیر جیل

رض سوزاک یا آتشک سے پیدا ہوئی پٹھ کی گلیٹیاں (یا گلیٹ) متورم (یعنی سوچی) اور پُر درد، سرخ، گرم، اور سخت ہونے کا نام بد ہے۔ اس کے بعد بد میں پیپ جمع ہو کر پک جاتی ہے اس وقت اکثر سردی لگ کر بخار آتا ہے۔

علاج:۔ معمولی بد (یعنی سوزاک) یا آتشک کے زہر سے پیدا ہوئی بد کے لئے مرکب سول ۳-۴۔ نہایت بہترین دوا ہے۔

اگر مریض عرصہ تک مرکزی یا پارہ استعمال کر چکا ہو تو نائٹریک ایسڈ دینا چاہیے ایسے علاج سے اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو ۵۔ ۶ گھنٹہ کے بعد کاربو انیلین ۶؛ یا بیڈی آگا ۶۔ استعمال کرنے پر اگر مواد نہیں پڑتا یا پولٹس کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن بد پڑ جانے پر بد کو بھٹانے کی کوشش نہ کرو (اس میں پولٹس باندھ کر پکا ڈالنا اور شکات دوا دینا چاہیے) پیپ شروع ہو جانے پر بھی کاربو انیلین ۶؛ یا بیڈی آگا۔ استعمال کرنا چاہیے اور کلینڈیولا ۱۰۔ (ایک حصہ اور پانی ۸ حصہ) لوشن کا خارجی استعمال کرنا چاہیے۔

آتشک کے ساتھ پیدا ہوئی بد میں بھی مرکب سول استعمال کرنا چاہیے۔ بد میں اگر گلنے والا زخم ہو جائے تو کیلی آیلڈ ۱۰۔ (فی خوراک ۵ گرین دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا اور زخم گرم پانی سے اچھی طرح صاف کر کے اس پر آپڈوفارم کا سفوف چھڑک دینا چاہیے۔

حب ذیل ادویات کے استعمال کرنے کی اکثر ضرورت پڑتی ہے۔

ہیر ۶۔ ۷۔ ۸۔ بد کا پک جانا یا اس میں مواد پڑنا (جھقوں سے

ہونے میں یا مُردنی چھانے میں) کا قیام ۶۔ نیند نہ آنے کی بہت اچھی دوا ہے۔
 سسی سی فیوگا ۳۰۔ ۳۰۔ کراڑ یا درد کی وجہ سے نیند نہ آنا، بلیس ۶۔ رات کے شروع
 حصہ میں نیند نہ آنا، نکس دامیکا (رات کے وقت آخری حصہ میں نیند نہ آنا)
 بغیر نالی کے گلیٹ کے امراض

(DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS)

جسم کے جو عضو کسی چیز کو نکال یا سکڑ سکتے ہیں۔ ان کو غدہ دہانہ اخراج کہتے
 ہیں۔ جسم میں تمام جگہ گلیٹیاں موجود ہیں، جیسے پسینہ نکالنے والی مالی یا جگر وغیرہ
 (ہماری کتاب موسومہ نرو ہیہ پر پچے دیکھئے)

ان سب گلیٹوں کے علاوہ جسم کے اندر اور بھی بہت سی گلیٹیاں موجود ہیں جنکا
 اخراج یا رطوبت ان اخراج دہانہ کی نالی اور بُد یا شرایین کے ساتھ ملکر صاف
 صاف بالکل خون کے سوتے سے مل گیا ہے۔ اسلئے انھیں (INTERNAL)
 اندرونی رطوبت لے جانے والی گلیٹیاں کہا جاسکتا ہے غدہ تراسیہ (THYROID)
 شانہ کے اوپر کی گلیٹ (ADRENAL) غدہ نخامیہ (PITUITARY)
 وغیرہ گلیٹیاں بھی ان میں شمار کی جاتی ہیں اور جگر بلیہ، خصیۃ الرحم، انیشین،
 اندرونی اور بیرونی دونوں کام کرنے والی ہیں (اندرونی اور بیرونی سیال کو لجاتی ہیں)۔
 انسان کے جسم پر مذکورہ بالا گلیٹوں کے اندرونی سیال یا اخراج کا بہت بُرا
 اثر ہے، اکثر تمام امراض ایک یا زیادہ گلیٹوں کے فعل کی زیادتی یا فعل کی خرابی
 سے پیدا ہوتے ہیں، آگے ترتیب وار ان سب کا حال لکھا جاتا ہے۔
 گھیکٹا (GOITAE)

گلے کی گلیٹ بڑھ کر بہت کہنہ ہو جانے پر اس کو گھیکٹا کہتے ہیں۔ اس میں بخار
 یا ورم کوئی بھی علامت نہیں ظاہر ہوتی۔ گلیٹ زیادہ بڑھ جانے پر نگلے یا نفس
 میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مرض مردوں کی نسبت عورتوں میں
 (خاصکر جوانی آنے کے وقت) زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس کا سبب ابھی تک
 معلوم نہیں ہوا۔ لیکن اتنا کہا جاسکتا ہے کہ پینے کی چیزوں میں کسی معدنی
 چیز کی کمی یا کوئی بہت ہی چھوٹے لطیف جرم کا رہنا یا چوڑے کا حصہ

زیادہ رہتا۔ ان اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آگے کے باب میں میان کیا ہوا آنکھ کے ڈھیلے کا باہر اُبھار۔ مدہ غوتر۔ (گھٹکا) مرض کی طرح اس میں گلے کی گلی کے فصل کی زیادتی نہیں ظاہر ہوتی۔ گھٹکا کا بڑھنا۔ اور اس سے پانی نکلتا کم ہوتا۔ کھانسی، تکلیف، تنفس، پھنسیاں وغیرہ اس مرض کی مخصوص اور رہتا علامات ہیں۔

علاج

اکثر بغیر کسی دوا کے گلے سے یہ بیماری آرام ہو جاتی ہے۔
شدید اور نرم گھٹکھ میں آیوڈیم $X-4$ کا استعمال کرنا اور $X-4$ کا خارجی استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔
۱۔ پس الیم کیلی آیوڈ۔ سپنجیا ۳۔ (خاص کر بہت پُرانے گھٹکھ میں) لایکو ۱۲۔
۲۔ وغیرہ ادویات مفید ہیں اگر کھانسی والی دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو ان میں سے $X-RA$ کا استعمال، اور بڑے بڑے اُبھار ہونے پر مدد لیتی پڑتی ہے۔
گھٹکھ کے ساتھ آنکھ کے ڈھیلے کا باہر نکل آنا۔

(EXOPHTHALMIC GOITRE)

اس بیماری میں گلے کی گلی کے فصل کی زیادتی دکھائی دیتی ہے۔
فاندان میں کسی کو یہ بیماری ہو جانے سے اس کا چڑچڑاپن، آلات جسم کی خرابی، نظام اعصابی کا نقص وغیرہ علامات ہو کر گھر کے تمام اشخاص پر حملہ کر سکتا ہے اس کی ابتدا آسانی سے معلوم نہیں کی جاسکتی۔ آہستہ آہستہ علامات ذیل ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جیسے نبض کی رفتار ۱۳۰-۱۶۰۔ تپاک قلب، چہرہ پر سرخی، احمرار، جلد پر سرخی۔ دھبے (ERYTHEMA) پڑنا۔ گلے کی گلی کا بڑھنا (سوجن سخت اور قیام دیر تک) آنکھوں کی تیلی گویا باہر نکل پڑتی ہے۔ اور آنکھوں کی پلک گویا پیچھے کی طرف کھینچی جاتی ہے ہاتھ وغیرہ کا کانینا، لاغری، کمی خون، متلی، کبھی کبھی بخار یا اسہال اور

لہ ڈاکٹر سیفٹس انس آیوڈ $X-4$ کو اس بیماری کی تیرویدوز دوا سمجھتے ہیں۔

کبھی بلغمی آماس۔ (آگے کا باب دیکھئے۔)

علاج: کئی ماہ تک مریض اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ تب بغیر کسی علاج کے ہی یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ شدید بیماری میں پیل۔ لاسیکو۔ گلوٹاکن۔ اور سے لیس؛ آرج اور فرمن میں سنبھیا۔ سپائی جلیا (کلیجہ میں درد، اور تپاک کی علامات میں)۔ نظرم میورس۔ ۲۔ ۲۔ سلفر۔ ۲۔ سپیا۔ ۳۔ وغیرہ علامات کا استعمال کرنا مفید ہے۔ (اگر کوئی دوا فائدہ نہ کرے تو گلی کا تھوڑا حصہ نیکلو ادینا یا آئیس رے (X-RAY) کا استعمال مناسب ہے۔ غذا کے محرکہ کھانا؛ پینا منع ہے۔ زود ہضم غذا؛ برا من بغیر کسی فکر کے زندگی بسر کرنا وغیرہ۔ اصول صحت کی پابندی کرنا چاہیے۔)

(1) جنون۔ پاگل پن۔ دوا کی

(CRETENISM)

اور

(ب) غده ترسیہ (MYXEDEMA)

غده ترسیہ کے مناسب فعل نہ کرنے کا سبب آجکل معلوم نہیں ہوا۔ تھوڑی عمر میں غده ترسیہ کا فعل رک جائے تو ہم لوگ اسکو غده ترسیہ کے ساتھ جنون، اور جسم کی خرابی کہتے ہیں۔ اور زیادہ عمر میں اس کا فعل رک جانے کو غده ترسیہ کہتے ہیں۔

(1) غده ترسیہ کے ساتھ دوا انگلی اور خرابی جسم وغیرہ اگر یہ بیماری پیدائشی ہو تو گلی ہو تی ہی نہیں۔ یا اگر ہوتی بھی ہے تو بخار وغیرہ بیماریوں کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے۔

کسی ملک میں اگر غده ترسیہ پھیل جائے تو وہاں کے باشندے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی جگہ صرف گلی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کا فعل بالکل نہیں ہوتا۔ اگر یہ بیماری پیدائشی ہو تو سچ کی دماغی ترقی نہیں ہوتی۔

اس کے اعصاب کمزور رہتے ہیں۔ جسم کی جلد خشک، چہرہ بد نما بلکین سو جھ جاتی ہیں، تمام جسم میں آماس، کھوپڑی کے نیچے کاجوڑ کھلا رہتا ہے۔ عضلات تپلا۔ دوا انگلی وغیرہ کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

بخار یا غدہ ترسیہ کے بعد یہ مرض ہونے پر موٹے تارے پچہ کا جسم اور دل آہستہ آہستہ بہت کمزور و مجہول اور عقل کند ہو جاتی ہے۔

(ب) بلغمی استقار

شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ صرت زیادہ عمر میں یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عورتوں کے زمانہ حیض یا حمل کی کسی بیماری سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

ہمیشہ مرض گھیسک کے آخری دور میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تمام جسم کا آماس۔ لیکن انگلی دہلنے سے سوجی ہوئی جگہ دب نہیں جاتی۔

جسم کی جلد خشک اور پسینہ کا نہ رہنا۔ بال کا گر جانا۔ استقلال جسم کی طبعی گرمی (۹۸.۶) سے بھی کم ہونا۔ بہت سردی محسوس ہونا۔ یادداشت کا کم ہو جانا۔ عقل خراب ہونا۔ غلط عقیدہ وغیرہ، دماغ کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تپ دق میں کمزوری، گلے کی گلی کا بڑھنا وغیرہ زائل کرنے والے امراض کے علامات آہستہ آہستہ پیدا ہوتے ہیں، اور علاج مناسب نہ ہونے سے مریض بہت عرصہ تک بتلا رہنے کے بعد موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ پہلے مقصد میں گھیسک کے ساتھ آنکھ کے ڈھیلے کا باہر نکلنا۔ مرض کی آخری حالت میں یہ بیماری ہوتی ہے۔

علاج

گلے کی گلی سے جو سبال یا رطوبت نکلتی ہے۔ اس کاڑکنا ہی ان دونوں امراض کا سبب ہے اس لئے سبال کو جاری رکھنے کے لئے ہتھ اندن ۳-X (فی خوراک ۵ گرین روزانہ تین مرتبہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ دونوں بیماریوں کی اس خاص دوا کے ساتھ آرسنک (بہت سردی لگنا، بے چینی، جلد خشک ہونے کی علامت میں) کیلک کاربائیڈ برکیوئیم (مرض دق کی علامت نمودار ہونے پر، وغیرہ دوا میں کبھی کبھی ضروری ہو سکتی ہیں۔ جسم ہلکا اور گرم کپڑے پہننا۔ مریض کے لئے بہت زیادہ مفید دکارآمد ہے۔

چہرہ اور ہاتھ پیروں کے نساخ کا غیر طریقہ سے بڑھنا

(ACROMEGALY)

سر کے پچھلے حصہ میں غدہ تخامیہ (PILUITARY GLAND) ہے۔ یہ گلیٹ دو حصوں میں منقسم ہے۔ اندرونی اور بیرونی حصہ، اندرونی حصہ سے جو طوبت نکلتی ہے وہ جسم کو سڈول بنانے میں دردی ہے۔ اسلئے رنگائی کے لئے یہ بہت ضروری ہے۔ بیرونی گلیٹ کی رطوبت انسانی جسم میں اقسام چربی اور شکر پیدا کرتی ہے اس گلیٹ کا جوہر استعمال کرنے سے جسم کے خون کا دباؤ تیزی سے بڑھتا ہے۔

اس گلیٹ کی رطوبت زیادہ مقدار میں نکلنے پر پوری عمر والے اشخاص کی سخت ڈھریاں غیر طبعی طور سے بڑھ جاتی ہیں۔ اسی کو یہ مرض ہونا کہتے ہیں۔ چہرہ اور ہاتھ پیروں کی ڈھریاں بہت بڑی دکھائی دیتی ہیں۔

سر میں درد۔ (خاص کر آگے سر میں، چربی کا بڑھنا۔ جسم کی حرارت (۹۸.۲) سے بھی کم، نبض لطیف، دماغی علامات کی زیادتی۔ مٹھائی کھلنے کی رغبت، (کبھی کبھی گھسیکا وغیرہ امراض اس بیماری کے مخصوص علامات ہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گلیٹ کے پچھلے حصہ کی رطوبت۔ رطوبت نخاعیہ کے ساتھ ملتی ہیں۔ (CEREBRO SPINAL FLUID) اس لئے کسی وجہ سے اس کے تراوش میں نقص ہونے سے بلغم کی زیادتی کی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج :- اس گلیٹ کے جوہر سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لئے تھائی رائیڈین استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہکالاوہ۔ (اوپنچی طاقت میں) فاسفورس ۳۔۴۔۵ وغیرہ دوائیں مفید اور کارآمد ہو سکتی ہیں۔

ابتدائی تلی کا بڑھ جانا

(PRIMARY SPLENO MEGALY)

اسد مکھن گھی، چربی، تیل وغیرہ از قسم چربی ہیں، شکر، چاول، میدہ، باری۔ آلو۔ ساگ۔ سبزی وغیرہ از قسم نشاستہ ہیں۔ ان دونوں قسم کی غذا سے ہمارے جسم میں اصلی طاقت اور قوت آتی ہے۔ (زیادہ تشریح کے لئے ہماری کتاب تروہنیہ پر یکے علا خط ہو۔)

تلی کا مرض خود بخود پیدا ہو کر چلا جاتا ہے۔ لیکن یا وغیرہ کسی دوسری بیماری کی علامت ہے۔ پہلے تلی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد خون کی کمی، خون کا اخراج، یا خون کی قے وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں اور آخر میں جگر کا بڑھنا۔ یرقان، استسقاء شکم ہو کر مریض بہت عرصہ تک بیمار پڑا رہتا ہے۔ اس کا کوئی سبب اب تک معلوم نہیں ہوا۔ لیکن لیکن یا یا آشک کے مریض کو یہ بیماری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں نہ تو کوئی گلٹی سوچتی ہے اور نہ کسی قسم کا درد ہی ہوتا ہے۔

علاج

کارڈس میریٹس ۵۔ اور سیٹانو تفس ۲۔ کا استعمال کرنا مفید ہے۔ اور یہ اس کی خاص ادویات ہیں۔

فاسفورس ۳۔ کرڈیل ۳۔ اخراج خون وغیرہ میں فائدہ کرتا ہے اگر کھانے کی دوا سے کوئی فائدہ نہ ہو تو انگلیٹ کے ڈاکٹر (بہار ڈاکٹر) کے ساتھ لاٹ صاحب کے بھائی اور ڈاکٹر میگ گاؤں کی یہ رائے ہے کہ تجربہ کار ہوشیار سرجن سے تلی کو کٹوا دینا چاہیے۔

(ADDISON'S DISEASES)

امراض ایڈیسن

ہر ایک گردہ کے بالائی حصہ میں ایک ایک گلی موجود ہے۔ ان پر جب مرض مسل و دق کا حمل ہوتا ہے۔ تب یہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ مرض بہت کم ہوتا ہے۔ بہت کمزوری دل کا فعل مجھول، قے، ہلکا سا یاہ، تانبے کے رنگ کی قے، بھوک نہ لگنا۔ پتے دست آنا۔ وغیرہ اس کے مخصوص علامات ہیں۔

علاج

اڈری ٹیلر XI ۳۔ میٹرم میٹور پہلے استعمال کرتا چاہیے۔ اس سے اگر فائدہ نہ ہو تو آرکسٹک، کارج ٹائی، سلاک ۳۔ وغیرہ ادویات کی آزمائش کرنی چاہیے۔

مرض دق کے علامات ظاہر ہوتے ہیں جیسی لیم۔ ۲۔ یا ٹیویر کیو لیم۔ ورن دینا چاہیے۔

امراض غدہ تیموسیہ

(DISEASES OF THE THYMUS GLAND)

سینہ کی ہڈی کے پاس کی گلی کی گڑبڑ میں (THYMUS GLAND) کہتے ہیں۔ یہ لڑکپن میں موجود رہتی ہے اور جوانی میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے فعل کا پورا حال معلوم نہیں ہوا۔ لیکن آلات تناسل کے گلیٹوں کی ترقی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس مرض سے بچکا ایک موت ہو جاتی ہے۔ نیکچین کی بیماری ہے اور یہ بچپن میں ہوتی ہے۔

اس بیماری کے ہونے پر بچہ پہلے موٹا ہوا کرتا ہے اور اسکے تالو میں دونوں طرف حلق کی گلیٹیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس بیماری کے نرم جلد والے لڑکوں میں لڑکیوں کا خاصہ آجاتا ہے۔ بال اور آلات تناسل کی گلیٹیاں جیسی چاہئیں ویسی نہیں بڑھتی۔

اس مرض میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔
کلیک کارب، فاسفورس، یوریکو لیتیم۔ یون (بچوں کے لئے) اس مرض کی بہترین دوا ہے۔ ان ادویات سے اگر فائدہ نہ ہو تو (X-RAY) کی آزمائش کرنی چاہئے۔ تازہ ساگ، سبزی، اور پھل اچھی غذا ہے۔ شکر وغیرہ میٹھی چیزیں۔ اور آلو، میدہ، سوئی وغیرہ جن میں نشاستہ (STARCH) ہوتا ہے۔ کھانا ترک کر دینا چاہئے۔

دونوں شاخوں کا تشخیز یا گزار (TETANY)

گلے کے گلیٹوں کے علاوہ اور بھی گلیٹوں کے جوڑ ہیں۔ ان کو زیادہ تر غدہ ترسیہ (PARATHYROID) کہا جاتا ہے۔ جسم میں چوڑے کے حصہ پر ان کا قبضہ ہے۔ ان گلیٹوں کے جوڑوں پر حمل ہونے پر نظام عضلات اعصابی (NERVE MUSCULAR SYSTEM) زیادہ متحرک ہو کر دونوں شاخوں میں تشخیز اور گزار ہو جاتا ہے۔

جراثیم مرض سے جسم میں پھیلنے کی وجہ سے یہ مرض متعدی ہو جاتا ہے۔ جوانوں کو یہ بیماری ہونے پر معدہ اور آنتوں میں خرابی ہو جاتی ہے۔

بچے جب اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی ہڈیاں خراب ہو جاتی ہیں۔
(امراض اطفال کی ہڈیوں کی خرابیوں کا بیان ملاحظہ ہو۔)

اچھی طرح پرورش نہ ہونے کے علامات کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے۔
(ورم حنجرہ خناق وغیرہ کا باب ملاحظہ ہو۔)

علامات :- جسم کے عضو میں تشنج، سینہ پر بازو پیڑھے رکھنا۔
انگوٹھا، ہتھیلی میں لگنا۔ اور ہاتھ کی دوسری انگلیاں اپنے جوڑوں کی طرف
جھک جاتی ہیں؛ اور دونوں پیر پھیل جاتے ہیں۔ ہاتھ و پیر اور تلوے
وانگلیاں، پیڑھے، منہ، حنجرہ وغیرہ عضلہ کے سکڑنے کے ساتھ درد
نہاں، علامات دو، پانچ روز سے کئی مہنتوں تک دکھائی دیتے ہیں اس
مرض میں عرصہ تک مبتلا رہنے پر آنکھوں میں جالا پڑ سکتا ہے۔ بچے
اس بیماری میں مبتلا ہونے پر اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔

علاج :- مرض کے حملہ کے وقت سرد پانی ڈالنا۔ ٹھنڈے یا بہت گرم
پانی سے اسپنج (SPONGE) سے جسم پوچھنا اور تیزی کے وقت
فکس و امیکا، بیلا ڈونا۔ استعمال کرنا چاہیئے۔ تشنج کم ہونے پر (یاد دہ بارہ
حملہ ہونے کے پہلے) کلکیر یا کارب ۴۔ ۲۰۰ استعمال کرنا چاہیئے۔

امراض جلدیہ (SKIN DISEASES)

عموماً لوگوں کا (یہاں تک کہ محالجوں کا بھی) یہ خیال ہے کہ جلد یا کھال
جسم کا صرف پردہ ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ کیونکہ جسم یا جسم کے ریزوں کا
پردہ ہی نہیں ہے۔ دل اور معدہ وغیرہ کی طرح۔ یہ بھی جانوروں کے جسم کی
ایک علیحدہ خاص چیز ہے۔ اس لئے جلد پر کوئی بیماری ہونے پر اسکو مرہم
وغیرہ خارجی علاج سے اچھا کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہیئے۔

درحقیقت جلدی امراض کسی اندرونی عضو کی بیماری کا پتہ دیتے
ہیں۔ اس لئے ان کو آرام کرنے کے لئے دوا اندرونی ہی کھانا مناسب ہے۔
ان جلدی ایک دوا امراض جسم پر میل وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں
لہذا کو صابن لگا کر دُور کرنا چاہیئے۔ — لیکن ہمیشہ زنگ آنٹ

منٹ، سلفر سوپ، گلارڈ سبولوجن، کلینڈیولا، سریٹ ویلین، وغیرہ کے ساتھ تیار کی ہوئی دوا میں لگانے پر اگرچہ جلد کا اوپر کا حصہ آرام معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت بیماری اچھی نہیں ہوتی، بیرونی مرض بالکل جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح بیماری جسم میں داخل ہو کر دل پر حملہ کر سکتی ہے۔ بیرونی استعمال سے جلدی مرض اس طرح جسم میں داخل کرنے سے بہت جگہ نہایت نقصان ہوا ہے، کبھی کبھی موت تک ہو جاتی ہے۔

مخصوص مقامات کا علاج

تھو جا ۲۔ نیکہ لگوانے کے بعد اگر کوئی جلدی بیماری ظاہر ہو تو نہایت اچھی دوا ہے۔ بے سی ٹی نم، (۲۰۰) دق یا کنٹھ مالکے مادہ والوں کے جلدی امراض میں) بیلینس پرنیس X۳۰۔ نم ہوا لگنے یا یکبارگی گرمی کے بعد سردی لگنے کی وجہ سے جلدی مرض ہونے پر شدید عصبیت۔ چھوٹا برداشت نہ ہونا

ڈنکارا ۶۔ سرد جگہ میں رہنے سے (یا برسات میں) جلدی بیماری ہونے پر۔

آرنیکا ۳۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے (یا گرم جانے کے بعد) جلدی مرض میں۔

پانی پر یکم ۱۔ ۳۔ نسج پر چوٹ لگنے کے بعد جلدی مرض ہونے پر۔

ڈیلیکس ۴۔ تمام جسم کھجلا تا ہو۔ لیکن جسم پر کوئی پھوڑا۔ پھینسی نہ ہو۔

کاربولک ایسڈ۔ جسم پر پانی سے پڑ پھنسیاں۔ بہت کھجلی۔ (کھجلائے پر کھجلی

کم ہو جائے۔ لیکن موجود رہے) کھجلائے سے پھنسیوں سے پانی نکلے۔

مزیریم ۳۔ (روزانہ ایک خوراک اگر نما (ECZEMA) وغیرہ

جلدی امراض جو کہ موسم سرما میں ہوں لیکن موسم گرما میں غائب ہو جاتے ہوں۔

سچیا ۱۔ ڈاکٹر پرسی (DR. PERCY) فرماتے ہیں کہ روزانہ

(فی خوراک ۵ قطرے) تین مرتبہ استعمال کرنے پر چاہے جو جلدی مرض ہو ضرور اچھا ہو جاتا ہے۔

کسی کسی معالج کا بیان ہے کہ پیاز کھانے سے بیماری جلد رفع ہو جاتی ہے

کھردری جلد پر وے نیگہ لگاتے جلد ملائم ہوتی ہے۔

اچھی طرح تبا تھ دھو کر لیمن کا عرق لگانے سے ہاتھ ملائم اور سفید ہوتا ہے

اور ناخن خوب صورت معلوم ہوتے ہیں۔

(ABCESS, BOILS, ULCER)

پھوڑا، دُنبِل، زخم۔

(BOILS) جلد کے زیریں حصہ میں اور دُنبِل میں (ABCESS) پھوڑا کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ پھوڑا چھوٹا اور دُنبِل بڑا ہوتا ہے۔

(ABCESS)

پھوڑا

کسی خاص محدود جگہ کی جلد کے اندر مواد پیدا ہونے کا نام پھوڑا ہے۔ ہڈی کے گوشت کے نیچ میں اور پستان و جگہ وغیرہ جسم کے اعضاء میں یہ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سردی لگے یا چوٹ وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

ورم ہڈی کے بعد بھی کبھی پھوڑا (پُرانی شکل میں) ظاہر ہوتا ہے شروع میں بیمار کی جگہ میں ورم۔ (درد، سرخ، آماس اور گرمی) اور سحار بعد اُس مادّ جگہ میں مواد پڑتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مواد نہیں ہوتا۔ (یعنی خشک ہو جاتا ہے) یا تکلیف دہ ماسور میں تبدیل ہو جاتا ہے

علاج

- (۱) مواد پیدا ہونے پہ، ایکون، بل، مرک، سلفر وغیرہ مفید ہیں۔
- (۲) مواد پیدا ہونے وقت ہیر، سلفر، سلکا، آرستہ نکم، اہم، سلفر۔
- (۳) مواد پیدا ہونے کے بعد سلفر، کیمک کارب، چائنا، ایسٹھاس، ہیر، سلفر اور سلکا۔
- (۴) پستان پر پھوڑا ہونے پر باب امراض زنانہ میں پستان کا پھوڑا (تلاظہ ہو)

چند ادویات کے مخصوص علامات

(مواد پیدا ہونے کے پہلے)۔ بہت درد، معمولی سوچ، سرخی گرمی، علامات میں بیلا ڈونا x۲۔ لیکن زیادہ آماس ہونے اور رنگ مارنے کی طرح درد ہونے پر لے پس ۳۔ لیکن اگر بیلا ڈونا یا اے پس کسی سے بھی ورم کم نہ ہو تو مرک سول ۶۔ دینا چاہیے۔ پولس کے عوض خوب گرم کینڈیولا (دس گنا پانی کے ساتھ) لوشن کا خارجی استعمال کرنا چاہیے۔

(مواد پیدا ہونے کے بعد) ہیر، سلفر ۶۔ لیکن پتلا اور پانی کی طرح مواد خارج ہوئے پر، اور زخم جلد اچھا نہ ہونے پر سلکا ۶۔ ۳۰۔ مذکورہ بالا طریقہ سے کینڈیولا کا لوشن لگانے سے پھوڑا اکثر ٹپک جاتا ہے۔ اور مواد

نکلنے لگتا ہے۔ پھوڑا پھوٹ جانے پر یا شتر لگانے کے بعد کیلک سلف x۶۔ سفوف
فی خوراک ۵ گرین استعمال کرنا چاہیے۔ اور کیلنڈیو کے مرہم کا خارجی استعمال کرنا
چاہیے۔ پُرکے پھوڑے میں بہت عرصہ تک مواد نکلا کر تک یہ سلکا ۳۔ ۲۰۰؛
نا سورا ہونے پر فلورک ایسڈ ۶۔ دانت کی جڑ میں پھوڑا ہونے پر مرک ٹائی ۳۔
اور مقعد پر ہونے میں سلکا ۳۔ خون خراب ہونے کے علامات میں پائوروجن
۳۰۔ آرٹنک؛ آرٹکا اور چائنا کی بھی گامے ملے ضرورت پڑتی ہے۔

علاج معاون

شروع میں ہلکی غذا۔ بعدہ مقوی غذا۔ لیکن زرد ہنضم غذا دینی چاہیے۔
مواد پیدا ہونے کے پہلے اور بعد گرم کیلنڈیو لکے کوشن سے دھونے کی
بابت اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ پھوڑا دھونے کے لئے باریک پیلا کپڑا اس
کوشن میں بھگو کر جتنا اس پھوڑے کے سوراخ میں جا سکے داخل کر دینا
چاہیے۔ اسکے بعد کوشن میں دوسرا کپڑا تر کر کے باندھ دینا چاہیے۔
اگر کیلنڈیو لاندے تو تخم بانگائیم کی گپٹس کام میں لائی جاسکتی ہے۔

(Boils)

دُنبیل

جلد پر آماس کے ساتھ اگر درد اور گرمی محسوس ہو تو اسکو دُنبیل کہتے
ہیں۔ اس میں ہمیشہ فوک نکلا کرتی ہے۔ پھوڑے کی طرح اس میں پہلے درم۔
اور اس کے مواد بیڑ جاتا ہے۔ اور ان میں ٹھہر جاتا ہے۔
پھوڑے کے اندرونی حصہ کو جویج میں رہتا ہے اسکو کیل کہتے ہیں کیل
مواد کے ساتھ نکل جانے پر تکلیف کم ہو جاتی ہے۔
خوب خراب یا جسم کمزور ہو جانے پر چھوٹے چھوٹے پھوڑے رہتے ہیں۔
کوئی پھوڑا بغیر کے ہوئے ہی بیڑ جاتا ہے جس پھوڑے میں پیدا ہوتے
ہی تپکن اور سختی ہوئے وہ پھوڑا اکثر یک جاتا ہے۔

علاج :- مواد پیدا ہونے کے پہلے دُنبیل کی جگہ سو جی اور سرخ ہوتی ہے
اور تپکن کی طرح درد ہوتا ہے۔ اور جلیں محسوس ہوتی ہے۔ بیلاڈونا x۱۔
پھوڑے میں مواد پڑنے کے وقت مرک سول ۶۔ پھوڑا پکے والا ہوئے

لوٹ جگہ میں جلن ہو، ساتھ ہی کمزوری محسوس ہوتی ہو تو آرسنگ x۳-۳۔
 ڈنیل کو بٹھانے کی ضرورت ہونے پر ہیسپر سلفر ۶-۲۰۰۔ لیکن اگر پکانا ہو تو
 ہیسپر سلفر x۳-۳۔ سفوف۔ (جسم میں پارہ کی خرابی ہونے سے زیادہ فائدہ کرتا ہے۔
 مواد زیادہ نکلنے یا ڈنیل پڑنا ہو جانے پر سلکا ۴۰۔

چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہونے پر آرسنگ کا ۳۔ یا ربار ڈنیل ہو تو سلفر ۳۰۔ برابر
 تکلیف دہ پھوڑا ہوتا ہو اور کوئی فائدہ نہ کرتی ہو تو آگینا ۵۰۔ (نئی خوراک
 ۵ قطرے روزانہ ایک یا دو خوراک) ڈنیل سر کیا ہو اور بدبو نکلتی ہو تو دس حصہ
 گرم پانی کے ساتھ ایک حصہ کیلنڈریولا ۵۰۔ ملا کر گھاؤ کی جگہ دھو ڈالنا چاہیے۔

کسی قسم کا زہر ملا کوئی پھوڑا ہونے پر ہائی پیریکیم ۲۰۰۔ استعمال کرنا چاہیے۔
 اور سینک دینا چاہیے۔ اس سے اکثر ہر قسم کے پھوڑے بہت جلد اچھے ہو جاتے
 ہیں۔ گذشتہ جنگ عظیم کے وقت جنگ کے میدان میں جہاں کپتان گارڈن
 کاخیمہ تھا وہاں ۱۹۱۸ء کے اگست ماہ میں سپاہیوں کو پھوڑا ہونا شروع
 ہو گیا تھا۔ وہاں پہلے ایلو پیتھک طریقہ سے علاج کیا گیا۔ اس کے بعد ہائی پیریکیم
 ۲۰۰۔ استعمال کیا۔ اور پھوڑے کو نیکا۔ اس طریقہ سے سب اچھے ہو گئے۔
 کبھی کبھی کسی مریض کو پھوڑا ہر جگہ پڑا ایک پھوڑا پیدا ہو جاتا ہے۔
 کبھی زلکے کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

مفصل حال کے لئے ملاحظہ ہو۔ ہومیو پیتھک ڈرائڈ ۱۹۱۶ء

علاج معاون :- مذکورہ بالا پھوڑے کے بیان میں علاج معاون ملاحظہ ہو۔

زخم (ULCER)

کمزوری یا ملائم جلد پر مواد پکنا ہونا وہاں سے مواد نکلنے کا نام زخم ہے۔
 جوٹ لگنا۔ کچل جانا۔ جل جانا۔ وغیرہ بیرونی اسباب سے جلد پھٹ
 جانے پر، یا آتشک وغیرہ سور مزاجی کی وجہ سے یا زیادہ مقدار میں پارہ

۱۔ اگر مذکورہ بالا ادویات سے فائدہ نہ ہو تو زہریلے پھوڑے یا خونی
 بخار میں سے دوا منتخب کرنا چاہیے۔

وغیرہ کھانے سے جسم کا خون خراب ہو جاتا ہے۔ اور زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس زخم سے کبھی پانی کی طرح کبھی گاڑھا بد بو دار مواد نکلتا ہے کبھی زخم خشک اور لیغہ درد کے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زخم میں ناسور ہو جاتا ہے یا چاروں طرف پھیل کر سخت تکلیف دہ اور مشکل سے آرام ہونے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زخم سے خون نکلتا ہے اور گوشت سڑ جاتا ہے۔

علاج :- زخم سے خون گرنا۔ آگ سے جلنے کی طرح جلن، زخم کے گرد کی جگہ سخت ہو جانا، گرم ہونا۔ اور تھوڑا خون آلودہ مواد یا سیاہانگہ کا مواد نکلنا وغیرہ علامات میں آرسنک ۶۔۔ ۳۰۔

معدہ کی یلغی جھلی میں زخم ہونے پر خالص ردغن زیون فی خوراک ۲۔ ڈرام، دن میں ۳ مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ کنٹہ مالا سے پیدا ہوئے زخم میں سلفر ۳۰۔ یا کلکیر یا کارب ۳۰۔ سوزشی سُرُخ زخم میں، بیلادونا ۳۰۔

معمولی زخم میں آہستہ آہستہ مواد ہونے پر سلکا ۳۰۔ پیپ بند کرنے کیلئے ہیرسلفر ۳۰۔ (پارہ سے نقصان ہونے میں یہ اور زیادہ فائدہ کرتا ہے) آتشک میں پیدا ہوئے زخم میں مرکبوریس ۶۔ یا ایڈٹائیٹرک ۶۔ بہنے والے زخم میں، مرک سول ۶۔ زخم کہنے میں کسی دوسری دوا کے استعمال کرنے سے فائدہ نہ ہونے پر سلفر ۳۰۔ (پُرانا زخم ملاحظہ ہو) زخم اگر سڑنا شروع ہو گیا ہو، تو کلینڈیولا ۱۰۔ ایک آرٹس نصف سیر پانی میں ملا کر اسی پانی میں صاف کپڑا بھگو کر زخم پر پٹی باندھنے سے سڑنا بند ہو جاتا ہے۔

پُرانا زخم (ناسور)

علاج :- سلفر ۳۰۔ استعمال کرنے کے بعد پُرانے ناسور کا علاج شروع کرنا چاہیے زخم سے آسانی سے پانی گرنا۔ آگ سے جلنے کی طرح بہت درد اور زخم کے گرد کی جگہ سخت ہو جانے کی علامت میں آرسنک ۳۰۔ بد بو دار گاڑھے مواد کے اخراج میں کھجلی یا ڈنک مارنے کی طرح درد۔

بد گوشت والے سوب زخم میں گر انیس ۶۔ جسم میں کئی جگہ سڑا زخم اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پھسناں۔ اور زخم سے بد بو دار مواد

ہتھ کے علامات میں لکے سرس ۶۔ زخم میں شیخ اور اس آسانی سے
خون نکلتا ہو۔ رات میں تکلیف بڑھتا ہو، مواد جم کر پیٹری پڑنا۔ اور
اور اس کے نیچے بہت مواد اکٹھا ہو جاتا۔ علامات میں میزیریم ۳۔ ۳۰۔
عضلات خمی کمزوری کی وجہ سے پیر کے زخم میں ہائیڈر ایس ۲۔
کھجلی، تپک، یا کتہ نے کی طرح درد، زخم کے چاروں طرف ہاتھ لگانے سے
آسانی سے خون نکلتا۔ اور اس خون میں شدید بندوبد ہونا۔ ایسے علامات
میں سلیفورک ایسڈ ۶۔ (یہاں تک کہ سٹریٹ والا زخم اگر بڑی تک پیوچ گیا
ہو تو اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے) پارہ کے غلط استعمال سے پڑنے والے زخم
وہ زخم میں لائیو پوڈیم ۱۲۔ یا الیڈائیٹریک ۶۔ گہرے زخم۔ کتارہ اونچا۔
زخم سرخ ذرا بھی چھونے سے درد بڑھتا۔ اور اکثر زخم سے خون گزرتا۔
ایسے علامات میں مرک سول ۶۔ فاسفورس ۳۔ کیلی بانی۔ پیونیا ۳۰۔ ہامیلٹن
۳۔ کیلی آؤڈ، کاربو۔ کروٹیل۔ کیلک فلور ۱۲۔ سفوف۔ سلکا ۳۰۔ اور
ہیپر سلف ۱۰۔ کن بھی گاھے ماہ ضرورت پڑتی ہے۔

علاج معاون

مچھلی، گوشت، کھٹائی۔ کھٹی چیزیں کھانا منع ہے۔

سوچی (دھوا) کی روٹی، دودھ، علبوا۔ دال، شوربہ وغیرہ مفید ہیں۔
زخم کو ہمیشہ دھو کر رکھنا چاہیے۔ زخم پر پی ڈرا گرم پانی سے بھگو کر رکھنا چاہیے۔
اور خشک کپڑے سے پونچھ ڈالتا چاہیے۔
زخم دھو ڈالنے کے بعد ۱۔ بوند کیلنڈیو لاک۔ ڈرام۔ یا دو تولہ پانی میں
ملا کر اس میں کپڑا بھگو کر زخم کی جگہ پر پی باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(PIMPLE)

پھنسیاں

سخت توکدار علیحدہ علیحدہ سرخ اور بہت اونچا نہ ہو، ایسے اُبھار
کو پھنسی کہتے ہیں۔ لیکن یہ خون لے جانے والی گلی اور بالوں کے اندر دنی جھڑ

۶۔ ہائیڈر اسٹس کے گوش سے زخم دھونے سے جلد اچھا ہوتا ہے۔

کا پڑانا نرم ہے۔ شدید بیماری میں کاربوج ۶۔ مزمن میں ریڈیم بروم ۳۰۔
ہفتہ میں ایک مرتبہ؛ ایک خوراک یا کیلی بروم ۳۰۔ یا سلفر ۳۰۔ پھنسی
چمکدار سرخ ہو تو کاربوج اینی ۶۔ یا ہائیڈروکومال ۳۰۔ (دوروں کے
رحم کی خرابی سے پیدا ہونے والی) رس ۳۰۔ یا ریڈیم بروم ۳۰۔ ہفتہ میں
ایک خوراک یا آرسن آؤڈ ۳۰۔ ناقابل شفا بیماری میں غذا کے بعد استعمال
پھنسی والی جگہ میں سلفر ۱۰۔ (ایک حصہ پانی آٹھ حصہ لوشن بنا کر استعمال کرنا
چاہیے) نہایت مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔

زرد پھنسیاں (IMPETIGO)

نصف چند ماں کی طرح (کچھ زرد مواد بھری پھنسیاں، پہلے علیحدہ علیحدہ
بعد مل جاتی ہیں) ناک، کان، سر، چہرہ؛ یا دوسرے دوسرے عضو میں
نکلنے کو زرد پھنسیاں کہتے ہیں۔ گاڑھا زرد؛ بدبودار مواد نکلنا۔ اور پیٹری
جم جانا۔ پھنسی والی جگہ کے نیچے کی جلد ملائم اور سرخ ہونا۔ وغیرہ
اس مرض کے علامات ہیں۔ یہ ایک چھوت کی بیماری ہے۔ جیسی چاہیے جیسی
غذا نہ ملنا اور جلد کی سوزش اس مرض کے اسباب ثانوی ہیں۔

علاج :- شدید بیماری میں ۱۰ ایولا ٹرائی ۳۰۔ کھانا اور صاف پانی سے
دھو کر نہایت مفید ہے۔ بیماری مزمن میں انٹیم ٹارٹ ۳۰ کھانا اور کاڈیوٹائیل
(روغن مچھل) اور مقوی غذا مفید ہے۔ سائیکوٹا بہت جلن (کروٹن ٹنگ ۶۔
دڈنگ مارنے کی طرح کھلن) کیلک میوٹا ۳۰ سر میں پیٹری دار پھنسیاں (آرسن
انٹیم کروڈ؛ کیلی بائی؛ میزیریم۔ وغیرہ) دوائیں کھانے اور کاربوج ایکٹ کا
مرہم لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ (مرض اکوتہ ملاحظہ ہو)۔

سوزش (IRRITATION)

جسم میں چیونٹی، میحور، کوڑے، کھٹل، شہد کی مکھی کے کاٹنے سے جلن پیدا
ہوتی ہے۔ میڈم ۱۰۔ دھن جنیں قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر لگا نا ہائیلین
۵۔ یا اسپرٹ کیفریا اے لپس ۳۰۔ ملنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر
دوا دل سکے تو چونے کا پانی پیاز میں پسکر اس جگہ پر لگانے سے جلن کم ہو

جاتی ہے سونے کے پلے ہاتھ میں صابن لگا کر مجھروں کے محلہ سے نقصان نہیں ہونا
 عمر: رگ یا پٹھے کی گلٹی (GANGLION)

اس مرض میں ایک یا زیادہ پٹھے کو باندھنے والی رگوں کے ضعیفہ آس
 کے ساتھ کمزوری معلوم ہوتی ہے لیکن کچھ درد نہیں معلوم ہوتا۔ روٹا ۲-۳۔
 یا ایڈنڈونیک۔ ۴۔ (پندرہ گزین)۔ ریکیٹی فائڈ اسپرٹ ۳۔ ڈرام +
 صاف پانی آونس، کالوشن، صبح و شام ماؤف جبکہ پر لگانا چاہیے۔

جمہرہ۔ زہریلا زخم

(ANTHRAX OR MALIGNANT PUSTULE)

یہ نئی اور چھوٹا دار بیماری ہے۔ ایک قسم کے (BACILLUS ANTHRACIS)
 کیڑے یا زہر اس مرض کے خاص سبب ہیں۔ کئی ہزار برس پہلے یہ مرض پیدا
 ہوا ہے۔ بکری، گائے، بھینس، وغیرہ جانوروں کے جسم میں یہ بیماری
 شروع ہوتی ہے۔ جب یہ زہر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تب تمام
 جسم کھیلانے لگتا ہے۔ اور پچیس گھنٹہ کے اندر زہریلی جگہ کیڑے کاٹنے کی
 طرح اور سوج جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی پانی سے پر پھنسیوں کی طرح
 ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ پھنسی گل جاتی ہے تو زخم ہو جاتا ہے۔

اگر مرض سخت ہو تو بخار، تپ، پسینہ، اسہال وغیرہ نمودار ہوتے
 ہیں۔ مرض خوفناک ہو جانے پر مریض ٹھنڈا (مثل برف) ہو کر مر جاتا ہے۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

سیکیل ۳۔ ماؤف جبکہ کامرٹا (GANGARENE) شروع ہوئے برا
 سردی سے کم ہونا۔ اور گرمی سے زیادہ ہونا۔

ہائی پریم ۲۰۰۔ اس دوا کے کھانے اور زخم پر سینکنے سے زخم اکثر
 آرام ہونے لگتا ہے۔ شروع میں بھی دوا کھانا چاہیے۔ ایک دو روز کھانے
 سے اگر فائدہ معلوم نہ ہو تو علامات کے مطابق دوسری دوا کھانا چاہیے۔

انتھراکس ۳۰۔ خون خراب ہو کر جسم میں بہت جلن معلوم ہونے پر۔
 ایکس ۴۔ پھنسیاں نیلی، یا کالی ہونے پر، گرم سینہ بکثرت ہو۔

میلنڈر نیم۔ ۳۔ اسہال، سیاہی مائل، پھنسیاں دیکھنے پر چمپک کے دانے کی طرح درد۔ خشک دانے۔ جس میں بہت طارش ہوا کرے۔

ہیلاڈونا ۳۔ آرسنک ۳۔ دوسرا می بخار (TYPHOID) کے علامات میں ۱۔ پس ۳۔ کاربودن ۶۔ پیپرلفر ۶۔ وغیرہ ادویات درمیان میں ضروری ہو سکتی ہیں۔ (غفونی بخار کی دوا دیکھئے۔)

جاپان وغیرہ غیر مالک سے آئے ہوئے بال بھاڑنے یا دانت صاف کرنے کے برش کو پیسے گرم پانی اور صابن یا کپڑا ڈھونے والا سوڈا یا فرمان۔
دو آڈنس۔ نصف پرائنٹ پانی سے دھونا چاہیے۔ آجکل کلکتہ یا ہندوستان کے اکثر شہروں میں جا پانی برتنوں کا استعمال کر کے بہت نادان عجبائوں نے اس مرض کو پھیلا کر بہت لوگوں کی (DIRECTOR OF INFORMATION) جان لی ہے۔ (سرکار ہند کا مشہر کیا ہوا نوٹس ماہ اگست ۱۹۲۰ء ملاحظہ ہو۔)

مہاسہ (PUBERTY BOILS)

شباب میں صحت کے نقائص اور موسم کی خرابی کی وجہ سے نوجوانوں کے جسم کی گلٹیاں سو ج کر زیادہ تر چہرہ، رخسارے، ناک اور گلے میں پھنسیاں یا چھوٹے چھوٹے کیلڈر بھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو مہاسہ کہتے ہیں۔
بوریکس ۳x مسفوف؛ کھانا اور سہاگو کی خاک زیتون کے تیل میں ملا کر مہاسہ پر لگانا۔ یا ناک یا دلوں ہونٹوں کے مہاسہ میں یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

کلکیر یا کارب ۶؛ ایسڈ نائی ۶۔ (خاص کر عورتوں کے لئے) گریفائٹس ۶۔ سلفیورک ایسڈ ۳۔ وغیرہ دوائیں علامات کے مطابق فائدہ کرتی ہیں۔
(بھوڑا ڈنبل اور زخم وغیرہ کی دوائیں دیکھئے۔)

کاربنکل سرطان۔ آڈیٹم۔ ہزار چشمہ (CARBUNOLE)

یہ ایک قسم کا بڑا چیشاگوں؛ زہریلا بھوڑا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے۔ ایک قسم کا جرم اس مرض کا خاص سبب ہے۔
پھوڑا خاص کر گردن اور پشت پر ہوا کرتا ہے۔ پشت پر ہونے سے اس کا نام بھوڑا پشت ہے۔ اور مریض ذیابیطس یا جن کے پیشاب میں خون کے سفید

دا لے نکلے ہیں ان کو یہ بھوڑا ہو جائے تو امید زیت بہت کم ہوتی ہے
گردن کے نیچے کے حصہ یا کمر میں بھی یہ بھوڑا ہو اکر تا ہے۔ اس میں معمولی
بھوڑے کی طرح اور ان سوراخوں سے پتلے جھاگ کی طرح مواد نکلتا ہے۔
پہلے یہ تھوڑی جگہ گھیرتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھیلنا جاتا ہے۔ یہ بھوڑا
شروع میں سرخ اور اس کے بعد سیاہی مائل ہوتا ہے۔ ہمیشہ دو تین ہفتہ
بعد جہاں بھوڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے نیچے کا گہرا حصہ تک سر جاتا ہے۔

بخار: درد سر: جلن: کمزوری: بے خوابی: غذا سے نفرت وغیرہ علامات
مخودار ہوتے ہیں مٹوا چائیش یا زیادہ عموماً کو یہ بھوڑا ہو اکر تا ہے۔

حفظ ماقدم:۔۔۔ درم کی حالت میں۔ یعنی مواد پڑنے کے پہلے (بیلڈونا
x۱۔ سلاک x۳۔ بخوف کھانا۔ یا پہلے اسپرٹ کی مقدار اور بعد ازاں روغن زیتون
لگانے سے) بھوڑے کا درد کم ہو جاتا ہے۔

مرض کے پہلے ہی انتھر اسیم ۳۰۔ ہر تین گھنٹہ پر کھلانے سے مرض بڑھ
نہیں سکتا۔ اور دوسری دوا دیے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اس سے فائدہ
نہ ہو تو مندرجہ ذیل ادویات علامات کے مطابق دینا چاہیے۔

بھوڑے والی جگہ سو جی: سرخ۔ اور سرخ ڈنک مارنے کی طرح درد۔ کے
علامات میں اسے پس ۳۔ بھوڑا اگر بڑھنے یا سڑنے لگے تو آرسنک x۳۔ ۳۰۔
بھوڑے والی جگہ جبکہ ار: سرخ۔ چبھونے کی طرح درد۔ ا۔ ٹیٹھنے یا چلکنے
کی طرح درد۔ اچھی طرح شینڈ نہ آنا۔ ان علامات میں بیلڈونا x۳۔ دمواد
پیدا ہونے کے پہلے درم والی حالت میں بار بار بیلڈونا دینا اچھا ہے۔

جلن والے درد کے ساتھ خون بہتا ہو یا مواد بدلہ دار نکلتا ہو۔ کمزوری بڑھتی
جانی ہو تو کاربوونج ۴۔ ۳۰۔ تیز درد اور جلن کے ساتھ بدلہ دار مواد نکلتا۔
اور پچھلے نسج کا مڑنا۔ سنکا ۳۰۔ یا بیکس ۶۰۔ ٹیرن ٹیولا۔ کیو ونس ۳۰
تکلیف دور کرنے کی بہت اچھی دوا ہے۔

گرم پانی میں فلائین ڈاکٹر سینکے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میدہ یا السی کی
پولش باندھنے سے بھوڑے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ کلینڈریولا کا مرہم

بڑھا چھو جانے یا بھڑکے کاٹنے سے بدن میں جس طرح لال لال چکے پڑ جاتے ہیں، یا بدن میں کھجلی معلوم ہونے لگتی ہے پتی میں بھی ٹھیک اسی طرح داغ پڑتا ہے۔ اس کو پتی نکلنا کہتے ہیں۔ یہ بیماری میں یکبارگی پیدا ہو کر کئی حصوں میں ہی یا کئی دنوں تک رہ کر اچھی ہو جاتی ہے۔ مرض پُرانا ہونے پر مریض تکلیف پاتا ہے۔ جسم کی تمام جگہ سوج جاتی ہے۔ اور پیدا ہو جاتی ہے ورم کی جگہ گرم رہتی ہے۔ یہی پتی کی خاص علامات ہیں۔ چنکر ٹی ٹھلی یا کیسٹر ۱۔ یا اٹھیل چیزوں کے کھانے سے یا تبص یا سردی لگنے کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ (اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

(۱) نئی پتی میں:۔ اے پس آرٹیکا یورٹس۔ کلورنیم X۲۔ سفوف۔

(۲) پُرانے مرض میں:۔ جی بی نم سلف (یا بار بار حملہ ہونے پر) آرٹیکا اے پس، سلف، کلورنیم X۲۔ سفوف۔ کلکس یا فاس فوریکم ۲۰۰۔ طاقت کی صرف ایک خوراک کافی ہے (۳) سردی لگنے سے پیدا ہوئی پتی میں:۔ ایکونائٹ (سردی کے دنوں کی ہوا یا سوکھی سردی لگنے کی وجہ سے ڈکھارا دگلی یا بوساٹی ہوا لگنے کی وجہ سے) (۴) معدے کی گر بڑی سے پیدا ہوئی پتی میں:۔ انٹ کر وٹ، نکس و امیکا۔ ٹیس (۵) دیگر امراض کے ساتھ ایکونائٹ (بخاری علامات میں، کلورنیم X۲۔ سفوف (بستر کی گرمی کی وجہ سے) بر ایو نیا د ایکدم سے پتی دب جانے سے) اگنس یا انا کارڈیم، دماغی پریشانی کی وجہ سے پیدا ہوئی بیماریوں (کافیہ) منیدر آنے کی بیماری کے ساتھ) بر ایو نیا۔ رٹاکس۔ یاسمی سی میو گا۔ (وجع مفاصل والے) رلنمی مریضوں کے لئے (کو لمپیکم) (ٹھٹھا دی وجع مفاصل کے لئے) اسپیکاک۔ یا آرٹس (درہ کے مریضوں کے لئے) (ٹیس یا ہائیڈراسٹس) (بجہ ذاتی کی خرابی کی وجہ سے)

کئی دوائیوں کے خاص علامات، جلن، بخار، پیاس اور لال رنگ کی کھجلی ہونے پر، ایکونائٹ X۳۔ پھینسوں کا نچلا حصہ، سرخ اور بیج کا حصہ، سفیر یا جلن۔ ڈنک مارنے کی طرح درد یا بہت کھٹانا۔ یا سر سرانا۔

آماس، ہونے کی علامتوں میں آرٹیکا یورٹس x۲۔ یا اے پس x۳۔ آرٹیکا یورٹس، اور اے پس میں فرق یہ ہے کہ چلتے بیکامک پچھلے جانے سے آتے اور دست اور ہڈیاں ہو جائیں تو آرٹیکا اور پھنسیوں میں بہت سوچیں، اور دنگ مارنے کی طرح تیز درد ہونے لگے پس، اگر آرمیکا اور اے پس سے فائدہ نہ ہو تو کلورل ہائیڈرے x۳۔ معدہ کی غڑ بڑی کی وجہ سے بیماری پیدا ہونے لگے۔ انٹیم کرڈ، فکس و امیکا۔ یا ایکسٹیل، بیکٹرا چنگڑی چھلی کھانے کی وجہ سے یا پانی میں بھینکے کی وجہ سے بیماری پیدا ہونے پر ڈساکس، ۳۔ ۳۰، جگر کی خرابی کے ساتھ پتی میں ڈیکھارا۔ فلیوے ٹیلیس ۳۔ سردی لگ کر (خاص کر موسم برسات میں ڈیکھارا ۶۔ بیماری کی پرانی حالت میں اے پس آرٹس بلفر، کوئی آرٹس، اسی کس فلیوے ۳۰، ۳۰۔ نیٹرم نیوڈان تمام دواؤں کے ۶۔ ڈائیوٹیشن سے کام ہو سکتا ہے، اگر یہ تمام دوا میں بیکار ثابت ہو جائیں تو اسکو کم چیک x۳۔ سفوف استعمال کرنا چاہیے۔

علاج معاون

پانی میں بھینکنا، شبنم یا دی لگنا، چنگڑی چھلی یا بیکٹرا یا ایسی ثقیل چیزیں جن سے معدہ خراب ہو جائے نہ کھانا چاہیے گرم پانی میں نہانا، ہلکی غذا کھانا۔ (لیون کاٹے کر مقام مادیف پر رگڑنا چاہیے)۔ فائدہ مند ہے۔

جراحی

یہ جلدی بیماری ہے۔ اس میں جسم کھلتا ہے اور جسم کا رنگ بدل کر ایک قسم کی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمام جسم (خاص کر معدہ اور آلات تناسل) میں بہت کھجلی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کھجلاتے کھجلاتے خون نکلنے لگتا ہے۔ نیند نہ آتا وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔ بڑا بڑا پرائی بیماری میں میں بتلا رہنا، قوت زہیت کی کمی اور صاف ستھرا نہ رہنا، ثقیل غذا کھانا۔ بہت گرمی یا سردی لگنا وغیرہ اسباب سے یہ بیماری ہو

علاج

ریڈیم برومیٹم ۳۰ (ہفتہ میں صرف ایک خوراک) اسکی بہترین اور کامیاب دوا ہے۔ نئی بیماری میں ایکوٹائٹ x۳۔ زخار کے ساتھ کھجلی اور

۳۰۔ (بہت کھجلی، جلد خشک، شام کے وقت اور بستر پر سونے سے بیماری بڑھنا) مرض مزمن میں آرس ۳۰۔ ۳۰۔ جلن پیدا کرنے والا اخراج۔ کمزوری اور پانی کی طرح رطوبت نکلا۔ اگنیشیا ۳۰۔ (جسم کھیلانے کے بعد محقر کاٹنے کی طرح جلد آماں کرنا) ڈبلی کس فیکو پائٹرم؛ کاسٹیکم۔ (مقعد کھیلانا) مرک سول۔ آرس۔ مسزیری ایم اے پوسائٹم۔ کاربووج وغیرہ دوا میں ضروری ہیں۔
علاج معاون۔ روزانہ ٹھنڈے یا گرم پانی سے نہانا۔ جسم دھونا۔ صحت بخش غذا کھانا۔ کھلی ہوا میں گھومنا۔ اچار وغیرہ کھانا اور مرہم وغیرہ نہ لگانا اچھا ہے۔ ضرورت پڑنے پر مزیم (ایک حصہ پانی، دس حصہ) کاٹوں لگایا جاسکتا ہے۔ جسم جتنا کم کھلایا جائے اتنا ہی اچھا ہے

(STROPHULUS)

سُرخ یا سفید دانہ بچوں کے عام جیم (خامسکریہ، مسوڑھوں، گردن، دونوں بازو میں الہین کی نوک کی طرح سُرخ یا سفید پھٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ ظاہراً پتی کی طرح ہوتی ہے۔ کیو ملا ۶۔ اسکی اچھی اور کامیاب دوا ہے۔ اے پی ۱۲۔ انٹم کروڈ ۶؛ (بد مضمی کے ساتھ زبان سفید تہہ نشیں) کلکیر یا کارب (فرمن تیرامب کے ساتھ) سلفر ۳۰۔ رسٹاکس ۳ وغیرہ ادویات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مناسب غذا اور کپڑے روز ٹھنڈے پانی یا نیم گرم پانی سے نہانا۔ کھلی ہوا میں گھومنا۔ اور پھٹیوں پر سبھی مٹی کا سفوف چھڑکنا مفید و کارآمد ہے۔
کھجلی۔ خارش۔ جرب

(SCABIES AND IT CHING OF THE SKIN)

جراثیم سے ایک قسم کی کھجلی ہوتی ہے۔ کلائی؛ انگلی وغیرہ مقامات میں پتلی اور ملائم جلد کے نیچے یہ سب جراثیم رہتے ہیں۔ اسلے پہلے انگلیوں کے گادہ میں تر کھجلی ہوا کرتی ہے۔ میلا۔ کچھلا رہنا اس بیماری کا سبب بناوٹی ہے۔
علاج۔ کھجلی کو تیم کی پتی کے گرم پانی سے (دھو کر اس پر نیم کاتیل لگانے سے فائدہ ہوتا ہے اور سلفر ۲۰۔ کبھی کبھی کھانین سے پھٹیاں جلد اچھی ہو جاتی ہیں۔ پینے کے کپڑے اور بستر صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔

فیکو پاٹرم ۲-۳۔ جسم میں اتنی کھجلی ہو کہ مریض باہر نکل ہو جائے۔
 مزیریم ۳۰۔ جسم کے کسی خاص مقام میں زیادہ کھجلی ہونے کی وجہ سے
 اس مقام کو مریض کھلاتا کھلاتا خون نکال دیتا ہو، ایسی حالت میں مریض کو
 فائدہ ہوتا ہے۔ ڈلی کس ۳۔ جسم کا کوئی حصہ۔ خاص کر پشت (دیوار اور کوئی دوسری
 سخت چیز پر زور سے دگڑنے سے مریض کو آرام معلوم ہوتا ہے۔
 سیسما۔ کلکیر یا کارب، آر سے نمک البم۔ ہلیئر سلفر۔ ٹکس و امیکا مرکبوں کا۔
 سورائٹم، لائیکو پوڈیم، کرڈن کاٹیکم، اسٹانی سگریا۔ وغیرہ۔
 ۳۰۔ طاقت کھجلی میں مفید اور کارآمد ہیں۔

کوئی کوئی گندھک کا مرہم۔ (سلفر آئنٹ منٹ) لگایا کرتے ہیں۔ ہم
 لوگ اس کو اچھا خیال نہیں کرتے۔ علامات کے مطابق (سلفر استعمال کرتے
 بڑے مرض بالکل اچھا ہو سکتا ہے۔ گرم پانی میں تھوڑا عمدہ گندھک ڈال کر
 اسی پانی سے نہانا۔ اور بستر اور کپڑوں کو اس میں دھو ڈالنے سے کھجلی کو
 جلد آرام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بیماری آرام ہونے کے بعد جسم میں چھوٹی
 چھوٹی کھجلیاں خسرہ کی طرح نکل آتی ہیں۔ اس سے ڈرنے کی کوئی بات
 نہیں ہے، کیونکہ یہ خسرہ نہیں ہے۔ آپ ہی آپ اچھا ہو جاتا ہے۔

بخمڑا

یہ اکثر پیر ہی میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی کھجلی یا اکڑیا ہے۔
 رسٹاکس ۶۔ سلکا ۳۔ سیسما ۳۰۔ ۱۔ متھری سلینم ۳۰۔ اے پس ۶، نیرٹم میور۔
 ۳۰۔ مرکبوریس ۳۰۔ لیکے ۳۰۔ ۶۔ گریفائٹس ۳۰۔ وغیرہ اس مرض کی
 مخصوص ادویات ہیں۔ قدم کپتے سے زخم کی جگہ کو باندھ دینا چاہیے۔
 (خسرہ۔ اکوٹ، امراض طفلان میں) (اکوٹ، وغیرہ ملاحظہ ہو)۔

۶۔ کچے دودھ کے ساتھ نیم کی پتی، نیم کی پتال اور نجی ہلدی پس کر
 صاف سرسور کاتیل (زائیل) یا زیتوں کاتیل (CLIVE OIL) ڈال کر
 اُبالنے سے نیم کاتیل تیار ہوتا ہے۔

(ECZEMA)

اکوتہ - اگزیم

درم جلد میں بیدار پانی نکلنے پر اس کو اکوتہ یا اگزیم کہتے ہیں۔ شروع میں جلن پیدا کرنے والی پھنسیاں ظاہر ہوتی ہیں اسکے بعد دوسرے پھنسیاں کھجلاتے کھجلاتے زخم ہو جاتا ہے۔ زخم سے صاف پانی کی طرح یارر دموا کی طرح رطوبت نکلتی ہے زیادہ کھجلائے پر گلے ماسے خون نکلنے لگتا ہے۔ یہ مرض تمام جسم میں ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر کان میں، بغل میں، اور سر میں ہوا کرتا ہے جو لوگ (PSORA) سورا میں مبتلا رہتے ہیں؛ یا جن کے جسم کا خون زہریلا ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ سوڈا، صابن، چونہ، وغیرہ ہمیشہ کام میں لانا۔ پہننے کے کپڑے سے جسم میں رگڑ لگتا۔ مناسب غذا یا ماں کا دودھ خراب ہو جانا۔ اصول صحت کی یا بندی نہ کرنا۔ زیادہ محنت کرنا وغیرہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے اس لئے مریض کا مزاج بغیر سمجھے بوجھے یروانی دوا لگا کر بیماری اچھی کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔

علاج:- خفیف یا شدید مقامی یا جسم کے اکوتہ میں اس دوا (نہ لے تو رسٹاکس ۳) دینا چاہیے۔ اس دینے پر کبھی کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے اس وقت دوسری دوا نہ دینا چاہیے۔ بلکہ رسٹاکس ۲۔ ۲۔۱۔ یا اس وں ۶۔ ۳۰ دینا چاہیے۔ چہرہ یا آلات تناسل میں اکوتہ جس میں کھجلی بہت زیادہ ہو، کر وٹن ۳۔ سر کے اکوتہ میں اوں اینڈر ۶۔ یا کیل میوور ۶۔ فوط کے اکوتہ میں ہیسپر سلفر ۶۔ سردوں کی داڑھی میں ہو، تو سائیکوٹا دروزا ۳۔ ہتھیلی پر، کان کے کچھ۔ ہاتھ کی انگلیوں میں ٹپروں اور کہنیوں میں ہو تو گریفائٹس ۶۔ ہتھیلی کے پچھلے حصہ میں ہو تو بودسٹا ۶۔ چہرہ آلات تناسل میں یا مقعد میں برابر کھجلی یا پُر درد اکوتہ میں اٹم کر دڈ ۶۔ خشک گرم یا سرخ رنگ کے اکوتہ میں ایلیمینا ۶۔ آرسنک ۶؛ سوزشی اکوتہ میں ڈنک مارے کی طرح اور کھجلی بہت ہو۔ یورٹکالوٹ ۶۔ زرد رنگ کی پیٹری جیتی ہو تو کلیر یا کارب ۶۔ ۳۰۔

مزمن مرض اکوتہ میں خشک اور گرم اور سرخ رنگ کا وجع مفاصل۔
ایلیو مینا۔ ۳۔ جس کو اکوتہ میں رطوبت اخراج ہوتی ہو، مرک کار۔ ۳، پھٹے،
خون کی طرح اکوتہ میں جس میں تھوڑا تھوڑا اخراج ہوتا ہو۔ پیرو لیم۔ ۶۔ اکوتہ
میں جس کی رطوبت چپکتی ہو، گریفائی ٹس۔ ۳۔ جو اکوتہ کسی طرح اچھاتا ہوتا ہو
اس میں ہیرسلفر یا سکو کم جیک ۳-X۔ استعمال کرنا چاہیئے۔ کاربووج۔ ۶۔ سیسپا۔ ۶۔ دنگا
مانا۔ لائیو پوڈیم۔ ۳۔ ریٹیم بروم۔ ۶۔ کرسوفینک ایسڈ۔ ۲۔ وایولا ٹریائی۔ ۱۔
علاج معاون :- زیادہ کھلانا برا ہے۔ اس لئے زخم کی جگہ ہمیشہ کپڑے

سے باندھ رکھنا چاہیئے۔ دودھ اور تازہ ترکاری اور ساگ کھانا چاہیئے۔ مٹھائی
تھیلی، گوشت، اور دیر بھضم ہونے والی چیزیں کھانا منع ہے، زخم کی
جگہ ہمیشہ صاف رکھنی چاہیئے۔ امراض طفلان کے باب میں مرض اکوتہ،
ملاحظہ ہو، روغن زیتون کرسوفینک ایسڈ۔ ۳۔ استعمال کرنا نقصان دہ نہیں
ہے۔ (LUYTES PINUS OINTMENT) بالوکیک ہریم

ماون مقام پر لگاتے سے بہت کچھ فائدہ ہوا ہے۔ اور کسی طرح کا آئندہ
نقصان بھی نہیں ہوا۔ آزمائش کرنی چاہیئے۔

کینسر۔ راج پھوٹا (CANCER)

اس بیسویں صدی میں مرض سرطان بہت ترقی پ رہے (بیماری کھانے
کی وجہ سے ہندوستان اور سنگلدیپ کی عورتوں کے منہ میں یہ مرض سرطان
ہو جایا کرتا ہے) ڈاکٹر سر اے پی گلڈ کا بیان ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس
بیماری سے دس فیصدی آدمیوں کی موت ہے۔

امراض ابھار کے باب خفیف اور مہلک (MALIGNANT) دو قسموں
کا ابھار بتایا گیا ہے۔ اس آخری قسم کے ابھار کا نام ہے، 'سرطان' یا
کینسر یعنی اکثروری (CHONIC IN FLAMMATORY CHANGES)

تبدیلی کی وجہ سے جسم کے کسی بھی تسج میں یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ مرض سرطان
گاڑے ماہے آہستہ آہستہ اور گاڑے ماہے یکایک تیزی سے ظاہر ہو جاتا ہے
اس بیماری میں کبھی ناقابل برداشت درد معلوم ہوتا ہے اور کبھی کبھی درد

یا لگتی ہیں نہیں ہوتا۔ مگر جو سرطان درد طبع کا ہوتا ہے۔

(۱) ورم خبیث یا کارسینوما۔ مٹھ پستان یا بلغمی جھلی اور عضلاتی جھلی کے بالائی پتلی جلد میں (۲) آڈیٹھ یا سرکوما (یعنی عضلاتی ابھار) ہوتا ہے۔ جلنا۔ یا بڑھتی ٹوٹنے وغیرہ جوٹوں کی وجہ سے کارسینا ہونے پر اس کو آڈیٹھ یا سرکوما کہتے ہیں یہ آڈیٹھ (عضلاتی ابھار) ظاہر حمل کے لمحے کرنے والی بیج کی طرح (ATUMOR MADEUP OF A SUBSTANCE LIKE THE EMBRYONIC CONNECTIVE TISSUE)

ہوتی ہے۔ آڈیٹھ اکثر مہلک ہو جاتا ہے۔

دماغی تحریک :- جیسے غم، کاروبار میں نقصان، فکر وغیرہ، یا جسمانی تحریک، جیسے تباکو پینے کے لٹا، مٹی کی چلم (استعمال کرنا) دانت کا اٹکا جھد زبان میں برابر لگنا۔ اور اس سے زخم ہو جانا۔ ایکس رے یا ریڈیم کی کرن یا مٹی کا تیل وغیرہ ہمیشہ جسم پر لگانا۔ جو رتوں کی پستان کا بہت دیر تک بڑھ کر رکھنا۔ حیض نہ رہنے پر یا اس کے بعد یکایک کسی اندرونی عضو سے خون نکلنا۔ وغیرہ اسباب سے جسم کے ان مقامات میں آڈیٹھ ہوتا ہے۔ معدہ میں مزمن زخم، غذا کی نلی یا بڑی آنتوں میں مرض کے جراثیم کا موجود رہنا۔ سخت چوٹ کی وجہ سے جسم کا خراب ہونا۔ درد سر۔ مزمن عصبی درد میں جلد ہی بیماری یا وجع مفاصل میں عرصہ تک مبتلا رہنا۔ وغیرہ اسباب سے خون خراب ہو کر مرض آڈیٹھ ہوا کرتا ہے؛ کبھی کبھی تو بیماری لگنا بعد نسل چلتی ہے۔ اس لئے مرض کا اچھی طرح علاج نہ ہونے پر نشتر لگوانے کے بعد یا بیٹھ جانے پر دیا ہوا مرض آڈیٹھ کی جگہ یا جسم کے کسی دوسرے مقام پر دوبارہ حملہ کرتا ہے۔

بغیر دوا کھائے کبھی کبھی آڈیٹھ خود بخود (یعنی قوت دافع مرض کی وجہ سے) اچھا ہو جاتا ہے۔ جو ہوا یا شبہ ہونے پر کہ مرض آڈیٹھ ہوا ہے۔ فوراً اسکے لئے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ دھت پر ہو میو پتھیک دوا کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوا سے فائدہ نہ ہو تو اگیس ریڈیم کرن کو کام

میں لانا چاہئے۔ یا نشتر لگوانا چاہئے

علاج :- آر۔س۔ (۱) فی قوت کی خاصکر جلن والے آڈیٹھ میں ہائیڈراسٹس
 ۴، ۳۰ - (خارجی، اور اندرونی استعمال) گلیٹی یا رحم میں آڈیٹھ ہونے
 پر۔ کاربوائین ۳۸۱، سفوف۔ آڈیٹھ میں اخراج ہو، آرم مٹ ۴۲ -
 سفوف ۶ - ٹی کے آڈیٹھ میں اکونائٹ، ریڈکس ۴ - فی قطرہ
 نصف خوراک سے تین قطرے استعمال کرنا چاہئے۔ جب تک کہ بیمار کو
 نیند نہ آجائے۔ آڈیٹھ سے پیدا ہوئی بے حد تکلیف کی یہ بے خطا دوا ہے
 لیسپس الیس ۲۲ - نہایت جلن کے ساتھ زیادہ اخراج (خاصکر رحم کے
 آڈیٹھ میں) کارشی نوہن ۳۰ - ۲۰۰ - (ہفتہ میں صرف ایکار کھانا چاہئے
 ایکس ۳۰ - ۲۰۰ (سخت تکلیف میں ہفتہ میں) ایک مرتبہ کھانا
 چاہئے۔ ریڈیم بروم ۳۰ - ۲۰۰ (ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ استعمال
 کرنا چاہئے) اور سلینیم ۳۰ - ۲۰۰ (ہفتہ میں ایک مرتبہ
 استعمال کرنا چاہئے) اور ہائیڈراسٹس ۴۳ - یہ سب مرض آڈیٹھ
 کی بہت عمدہ دوائیں ہیں۔ حسب ذیل ادویات کی بھی گاہے گاہے
 ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیلاڈونا؛ فاسفورس۔ کینڈیوزنگا -
 ایڈکارب، روٹا ۴؛ فاسٹو ۲ - آیوڈو کیلی، بروم، گیلیم، یارائن، ۴ -
 (دودھ کے ساتھ ۳ - ۴ قطرے روزانہ تین مرتبہ) سکیل، کریڈوٹ۔ ہائیڈروکوتائل -
 ایشیاٹیکا، سلفر، بنگوئیریا ۱۰ - آر۔س۔ آیوڈو ۴۳ - (پانی کے ساتھ نہ کھانا
 چاہئے) آرم آیوڈو ۴۳ - کیلک آیوڈو ۳ - سٹھاسٹم ۴ - یو فوریا ۶ - آئینشیا ۴ -
 (خوراک ۵ - ۲۰ - قطرے ہلکے سبب ۶ (گہرا) سُرخ؛ یا نیلا؛ یا خاکے۔

✽ (XRAY) ۳۰ کے استعمال سے اکثر مرض آڈیٹھ آرام ہوئے ہیں کم سے کم

بہت تکلیف فوراً جاتی رہی۔ (DR. J. CASE CONVENTION OF THE

AMERICAN RONTGEN RAY SOCIETY)

میں حال ہی میں جو کچھ کہا ہے ہماری اس بات کی بہت تائید ہوتی ہے۔

رنگ کا آڈیٹھ ۶-۳۰۔ (چوٹ کی وجہ سے آڈیٹھ میں۔ یا سینہ میں مرنے
آڈیٹھ ہو) کیلی سائی نیٹم، ۳۔ (زبان کے آڈیٹھ میں) سکاوا ہونا نئے
پلیٹینا۔ سفلی نم۔ (مرض آڈیٹھ کے علاج مشہور ڈاکٹر (ELLWOOD)
ایل وود نے حسب ذیل اعضاء کے گیارہ کنیسر بالکل اچھے کئے ہیں۔

(۱) تالو کا آڈیٹھ؛ فرم یک ۳x۔ ہائیڈراسٹس ①۔

(۲) رحم کی گردن کا آڈیٹھ؛ آرسن؛ آیوڈ ۳x۔ مپس ۳x۔ (۱۱) راس
زنان کے باب میں رحم کا رسولی۔ رحم کا آڈیٹھ۔ (لاحظہ ہو)۔

(۳) غذا کی نالی کا اور حلق کا آڈیٹھ؛ فرم یک ۳x کھنکھو جیا ۱۱x۔ ہیر پلر ۶۔

(۴) ٹری آنت کے آخری حصہ کا (RECTUM) ہائیڈراسٹس

۱x۔ سال دیا ①۔ ہفتہ کے آخر میں استعمال کرنا چاہیے۔

۵۔ قولون کا (COLON) آڈیٹھ۔ ہائیڈراسٹس ۶x کراس ①۔ ہفتہ

کے آخر میں کھانا چاہیے۔ اور نامور کے لئے سلکا مدرٹیک مفید و کارآمد ہیں۔

(۶) دائیں پستان کا دم نیٹ۔ آرسن؛ آیوڈ ۳x اور ہائیڈراسٹس ۱۱x۔

بکے بعد دیگرے (۷) جگر میں آڈیٹھ کے ساتھ استھائے شکم، آرسن؛ آیوڈ ۳x۔

ہائیڈراسٹس ①۔ (۸) ران کی بڑی میں آڈیٹھ۔ سلکا ۲۰۔

(۹) بائیں ران کی بڑی میں آڈیٹھ۔ سلکا ۶۔

(۱۰) ران کے آڈیٹھ میں۔ ٹیرم میور۔ ۲ طاقت پر استعمال کرنا چاہیے۔

(۱۱) سینہ کی بڑی گھٹی کے آڈیٹھ میں چار مرتبہ نشتر گولنے کے بعد مرنے

نا امید ہو کر ہو میو تھیک علاج کرائے آیا۔ اس وقت سلکا ۲۰۰ استعمال

کرنے سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ علاج معاون

زخم کے آڈیٹھ میں بدبو کم کرنے کے لئے کاربولک ایسڈ کا سفوف۔ یا

آئیڈر فارم کا سفوف لگانا یا کوئلہ کی ٹپکس استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کوپر

ڈاکٹر کا مرہم لگانے کی صلاح دیتے ہیں۔ دودھ۔ نمک؛ مرچ، سرخ،

چائے۔ کافی، شراب، گوشت، جھلی؛ انڈا۔ ماش؛ ہیم دال، مسور

دغیرہ کھانا ممنوع ہے، گوشت کے عوض پیر کھایا جاتا ہے۔ تازے پھل

زیادہ مقدار میں کھائے جاسکتے ہیں۔ کھلی ہوا میں تھوڑا گھومنا اچھا ہے
پستان میں آڈیٹھ ہونے پر ہاتھ کو زیادہ حرکت نہیں دینا چاہیے۔
اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مریض کو بد ہضمی نہ ہو جائے۔ غذا کے
پہلے اور بعد تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ تفصیل کے لئے

(BURFORD 'CANCER-CLARKE'S TUMOUR'S COOPER'S CANCER
ROYAL'S PRACTICE' ۵۵۳-۴۵۰-۴۹۵-۲۵۹ صفحات CATCELL'S
PRACTICE 1-A-RUDDOCK'S VADE MECUM EDITION 1923
۲۲۸-۲۲۱ صفحات BURNETT'S CURABILITY OF TUMOURS)

وغیرہ کتابیں دیکھنا چاہیے۔

بفتا پھیپاس۔ سر کی بھوسہ (LICHEN)

کسی جلدی ورم کا کھنی پھنیوں کی طرح ظاہر ہونا بفا کہلاتا ہے اندھوری
کی طرح سرخ پھنیاں تمام جسم میں۔ (ہاتھ، پیڑ، منہ اور گردن میں) نکلتا۔
کھجلا نا، جلد کی خشکی اور بھری ہونا اور آخر پھنیاں چوٹی کی طرح سوکھ کر
پتلی جلد سفید ہو جانا۔ اس مرض کی خاص علامت ہیں، اکثر چورن، برف نان پا۔
نیچے والے راج مزدور۔ سوڈا اور صابن کا ہمیشہ کام کرنے والے یا جو ہمیشہ
ٹھیک وقت پر کھانا نہیں کھاتے اور گرم مٹا کتے باشندے یا گرمی کے دلوں میں
میں بھی جو زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ہمیشہ انہی کو یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔

علاج :- سلفر ۳۰۔ (شدید بیماری میں) انٹم کروڈ۔ (معدہ کی خرابی)۔
کے ساتھ مرض میں) اے پس ۳۰۔ بالیڈم ۶۔ (اندھوری کی پھنیوں میں
کاٹا چھبے کی طرح درز۔ آر اس ۳۰ X ۳۰۔ پُرانی بیماری میں) میٹری۔ اس
فاٹوگراف، نیٹرم میں، روزانہ گرم یا ٹھنڈے پانی سے نہانا اور جسم کو پچھ
ڈالنا، غذا محسوس نہ کھانا پینا ممنوع ہے۔

صحت کے عام اصول کی پابندی کرنا لازمی اور ضروری ہے

(WHITLOW)

ناخن کی جڑ کی سوزش۔ لبھری

ناخن خوب چھوٹا کٹوانے، چوٹ لگنے یا جل جانے یا کسی نہ ہر ملی چیز کے

خون میں جلنے سے انگلی کے آگے جلن، سوچن ہوتی ہے اور پھر بک جاتی ہے۔
 اسی کا نام بُسہری ہے مرض بڑھ جانے پر موت تک ہو سکتی ہے۔
 علاج :- بُسہری کے علامات نمودار ہوتے ہی تک گرم پانی میں
 حل کر کے اس میں انگلی ڈبلے رکھنا چاہیئے۔ اور سلکا ۳۰-۳۵ کا استعمال
 کرنا چاہیئے۔ مرض کی شدہ حالت میں جب درد بڑھ ہی تک پھیل جائے
 اس وقت سلکا ۳۰-۳۵ اور گرم پانی کا سینک، بخار کے ساتھ
 ہو تو سلکا اور بیلادونا ۶ رباری باری سے) کچھ لوگ دیا کرتے ہیں انگلی
 کا اگلا حصہ آماس کر کے کچھ سیاہ ہو جائے اور جلن اور درد ہو تو آرسنک
 ۶۔ لیکن نیلا ہو تو لیکس ۶۔ (مرض کے شروع حالت میں) تیز درد ہو تو
 مرک سول ۶۔ ہیرسلفر ۶۔ اسٹرامونیم ۶۔ ایمون کارب ۵۔ یا بورک لسٹ ۶۔
 انیکھر اس ۳۰۔ آسے پس ۳۔ گر نیفٹس ۶۔ شگونیہ یا ۳۰-۳۵۔ براونیہ ۶۔ کاسٹیکم ۶۔
 لیسٹیم ۳۔ وغیرہ دواؤں کی بھی ضرورت ہے۔ نائٹریک الیڈ
 ڈائسکوریا ۱۰۔ یا فاسفورس ۱۰۔ مائوٹ جگہ پر لگانے سے درد کم ہو جاتا ہے۔
 چھوٹے بیگن میں یا کاغذی لیون میں سوراخ کر کے انگلی پر ٹوٹی کی طرح پہنا
 دینے سے بھی تکلیف کم ہو جاتی ہے اس سے بھی آرام نہ ہو تو نیم کی گرم
 پولٹس سے باندھنا چاہیئے؛ مگر اس طرح باندھ رکھنا چاہیئے کہ
 جس سے حرکت کرنے پر نیچے کی طرف نہ جھک جائے۔ مواد پر جانے پر
 مہرجن کی مدد لینا چاہیئے اور جب تک زخم اچھا نہ ہو اس وقت تک
 کیلینڈریل لاکشن سے دھونا چاہیئے، اس سے بچہ فائدہ ہوتا ہے۔
 جذام - کورہ - (LEPROSY)

یہ ایک پرانی متعدی (چھپوت دار) بیماری (BACILLUS LAPRAE)
 خاص کر ایک جراثیم ہے جو جھلی جلد یا یعنی جھلی کے راستہ سے جسم میں داخل
 ہو جاتا ہے تو وہ دہان یا تو گلیٹیاں پیدا کر دیتا ہے جسم میں جس جگہ اس قسم
 کی خرابی ہو تو سمجھ لینا چاہیئے کہ اس جگہ جذام ہو گا۔
 مریض کے مستقل کپڑے کے ذریعہ (کبھی کبھی دھویوں کے ذریعہ)

سے یہ جرثومہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ ۱۹۶۱ء میں ڈاکٹر
میں سین نے اس جرثومہ کا پتہ لگایا تھا۔ اکثر مرنے والی قوم کے آدمیوں کو یہ بیماری ہو
جایا کرتی ہے، والدین میں یہ بیماری ہونے پر ان کی اولاد میں بھی یہ بیماری پھیل
سکتی ہے یا نہیں، یہ آج تک نہیں دریافت ہو سکا ہے۔
آجکل کے معالج خدام کی دوسری بات ہے۔

- (۱) جذام وزنی یا ابھار دار کوڑھ (TUBERCULAR LAPROASY) اس قسم
کے جذام میں شروع میں سرخ رنگ کی پتی جگہ جگہ جس میں سخت درد ہوتا ہے
سرخ رنگ کی پھنسیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان دانتوں کا منہ کھل
جاتا ہے۔ اور دانتاں گہرا زخم ہو جاتا ہے۔ پلوں، بھوؤں وغیرہ
کے بال اور ہاتھ پیر کی انگلیاں، ناک کی لمبی پھٹی وغیرہ عضو سڑ کر گرے لگتے
ہیں۔ اور کبھی کبھی پیچھے میں زخم ہو کر درم ہو جاتا ہے اور مرنے مر جاتا ہے۔
(۲) جذام و مخدر یا بے حسی کا کوڑھ (ANASTHETIC LEPROBY) اس
مرض میں کل اعضاء پر حملہ ہوتا ہے اور جسم میں درد زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد وہاں
کی جسم مڑا رہ جاتی ہے، جس کی طاقت چلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے پھپھو لے
ہو جاتے ہیں اور عضلہ کمزور ہو کر فالج ہو جاتا ہے، جذام کا نتیجہ بد ہے۔
یہ آٹھ سے پندرہ برس تک رہتا ہے۔

علاج۔ جذام سے بنی ہوئی ادویات کے بارے میں بہت احتیاط
باتیں سنی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر روکوٹسکی ۵ پانچ قطرے ۶ قطرے تک (جلد موٹی)
سینہ، پھیلی اور گلوے میں بے حد غارش (آرٹھروڈیٹس) - سفوف
ز ابھار میں آماس، ہاتھ و پیر کی انگلیوں کا لگی لگی کرنا۔ پیڑھے دلتے یا ابھار۔
کاشا چھنے کی طرح درد۔ بیلا ڈونا ۳-۴۔ رشید یحیٰی ابھار کے ساتھ سرخ رنگ
(جلد) سپیا ۶۔ (جلد خاکی یا زرد رنگ) آرٹھروڈیٹس، ایم ۳-۴۔ (زخم میں درد
زیادہ ہو، یا درد ہو) - ایکس ۶-۷۔ (گہرے زخم کی عظمت میں) - سلفر ۳-۴۔
۲۰۰۔ (بہت زور کا ناغہ دیگر ایک خوراک استعمال کرنا چاہیے) - موکیڈیا ۲-۳۔

(جلد سفید رنگ کی ہو) کروٹیلین ۳۔ بہت عرصہ تک استعمال کرنے سے فائدہ محسوس ہو سکتا ہے اور سی لاگو ۵۔ اکھلنے سے فائدہ ہوتا ہے۔
 پیرارا (PYRARA) / ۴۔ ۳۰۔ کھلا کر اولی ویرانے (DR. OLEVERA)
 ایک مریض کو اچھا کرتا ہے علاج معاون: مریض کو ہمیشہ صاف ستھرا اور الگ رکھنا چاہیے پھلی اور گوشت کھانا بالکل منع ہے مقوی غذا دینا ضروری ہے۔
چمبل۔ ایرس (PSORIASIS)

اس مرض میں جسم کے کسی جگہ کی جلد سرخ ہو کر سوج جاتی ہے اور سفید خشک اور سخت کھال نکل آتی ہے۔ ریڈیم۔ بروم۔ ۳۔ ہفتہ میں صرف ایک بار استعمال کرنا چاہیے۔ سلفر۔ ۳۔ یا آرٹک۔ ۳۔ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ مرض مزمن ہوئے پر یو یو ریو لینیم۔ ۲۰۔ استعمال کرنا چاہیے۔ ناسفو ۶۔ ٹکیریا ۶۔ سیبا۔ ۳۔ نائٹرک ایسڈ ۶۔ سائی کیوٹا ۳۔ گریفٹاٹس ۶۔ بھو جیا، ۳۔ کرائی سو فٹنگ ایسڈ اور روسی کی دوا وغیرہ علامات کی مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔

(ELEPHANTIASIS)

فیل پا

ہائیڈروکوٹائکس ۶X۱ اور اناکارڈی ایم اور ٹیل ۶X۱۔ اسکی خاص دوا ہے۔
 (فیل پا ملاحظہ ہو۔)

روسی۔ پیس۔ پھیاس۔ (PITYRIASIS)

سر یا جسم کی جلد کی پتلی بھوس کی طرح کھال کو روسی۔ یا مُردہ کھال کہتے ہیں جلد کے اوپر سے یہ مُردہ کھال سفید بھوس کی طرح نکل جاتی ہے، روسی نکل جاتے وقت ماؤت جگہ کھجلائی ہے۔ کبھی کبھی سرخ یا گرم ہو جاتی ہے۔

آرس ۳X۳، کا استعمال سب سے عمدہ دوا ہے اگر آرس سے فائدہ نہ ہو تو لائیو ۲۔ یا گریفٹاٹس ۶۔ یا سیبا۔ ۳۔ اور ریڈیم بروم (ہفتہ میں ایک مرتبہ) فائدہ کرتا ہے۔ بیسی لینیم۔ ۲۰۔ (ہفتہ میں ایک مرتبہ استعمال کرنا چاہیے) کرائی سو فٹنگ ایسڈ ۳X۳۔ فلورک ایسڈ ۳۔ میز ریجیم ۳۔ کی بھی اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے۔
 ماؤت جگہ بین یا کھل لگا کر گرم پانی سے روزانہ دھو کر لانا چاہیے۔
 روزانہ ہٹانا فائدہ کرتا ہے۔

گوکھرو - اسٹن - گھٹہ (CORN)

سخت جوتے کے دبائے (یا سوراخ) سے پیر کی انگلی میں گھٹہ پڑ جاتا ہے۔ شدید اور تکلیف دہ گھٹہ میں فیرم پیکر ک ۳۰۔ جلن یا زخم والے گھٹہ میں نائٹرک ایسڈ ۳۰۔ ہائیڈرواسٹس تیل، ہائیڈروکس ۱۰۔ ۱۔ حصہ روغن زیتون (آٹھ حصہ کے ساتھ ملا کر) سونے سے پہلے تین چار روز رات میں گھٹہ پر لگانا چاہیے۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ نقصان الخلقۃ میں ہمیشہ گھٹہ، پڑنے پر سلفر ۳، کلکریا کارب ۳، لائیو ۱۲، سپیا ۶۔ چوڑے تلے کا جوتا پہننا۔ اور کیلنڈر یا لاسکس سے روئی ترک کر کے گھٹہ پر لگانا چاہیے۔ ورے وری ۱۰ گھٹہ پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

گھٹہ کو گرم پانی میں تر کر کے کچھ نرم ہونے دیں اور تب آرٹیکا ۱۰۔ دس قطرے ایک آؤنس گلیسرین ایک آؤنس پانی کا لوشن تیار کر کے تر کرنا مفید ہے۔

سر میں درد

یہ بھی ایک متعدی مرض ہے۔ سر کے بال منڈوا کر صابن اور گرم پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ اسکے بعد تارین کا تیل لگا کر دھو ڈالنا چاہیے۔
داد خشک ہونے کے بعد اس میں روز صبح آؤٹین ۱۰۔ لگانا چاہیے اور شام کو دھو ڈالنا چاہیے۔ اس طرح علاج کرنے پر اگر جلد بڑھ جائے تو اس علاج کو کچھ روز کے لئے موقوف کر دینا چاہیے۔
سلفر ۳، کلکریا کارب ۶-۱۲۔ استعمال کرنا مفید ہے۔

سوزش جسم

جنم میں جلن یا گرمی ہوتا۔ عموماً بخار وغیرہ امراض کی علامت ہے۔ کسی بیماری میں جسم گرم ہونے پر ان امراض کی دوائیں جن کا ذکر اس کتاب میں آیا ہے، دیکھنا چاہیے۔ بیرونی گرمی جسم یا جلن ہونے پر، آرسنک، براؤنیا۔
کاربوج، کاسٹیک، نکس و امیکا۔ فاسفورس؛ فاسفورک ایسڈ، رٹاکس، اسٹرامینیم سلفر۔
اندرونی گرمی یا جلن جسم میں:- ایکوناٹ، آرس، بیلاڈونا، براؤنیا، نکس و امیکا، فاسفورس، ساڈلا۔ سنی نے گا۔ سپیا۔ سلفر وغیرہ

مندرجہ بالا آرویات ۳۔ ۲۔ کی قوت کا استعمال کی جاسکتی ہیں۔ جلن دور کرنے والی چیز مخصوص طور پر ان کے علامات حسب ذیل ہیں۔

سلف: ۳۰۔ ۲۰۔ تمام جسم میں بڑا تھ پیر، منہ، ناک، زبان، آنکھ، وغیرہ) گویا آگ جل رہی ہے اور سوزش ہو رہی ہے۔ کوئی بیماری زمین حالت ہو۔ اور ایسی جلن محسوس ہو تو یہ دوا بہتر ہے۔ آر سنک ۳۰ X ۳۔ کوئی شدید بیماری ہو، جس میں تمام جسم میں جلن ہو تو یہ خاص دوا ہے اس جلن کی ایک خاص علامات یہ بھی ہے کہ جسم میں خواہ کتنی ہی جلن ہو۔ مگر مریض کپڑا اتارنا نہیں چاہتا ہے۔ یا آگ اور دھوپ میں بیٹھا چاہتا ہے۔ زخم پھوٹا بخار وغیرہ میں جب مریض بالکل سُست ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کو اسی طرح کی جلن محسوس ہوتی ہے۔ سکیل ۳۰ X ۳۔ آگ کی چنگاری سے گویا تمام جسم چلا جاتا ہے؛ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ (لیکن دوسرے لوگ جب اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں؛ تب ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے اتنے پر بھی مریض جسم سے کپڑا اتارتا نہیں چاہتا۔) اور وہ ہمیشہ نکھا جھلنے کو کہتا ہے۔ ہیفتہ اور سڑنے والی بیماری میں یہ علامت نمودار ہو ا کرتی ہے۔

فاسفیدس ۱۔ سلف کی طرح جسم میں جلن (خاصہ ذی میں) معلوم ہوتا۔

ایکونائٹ ۶ X ۱۔ شدید سوزشی بیمار۔ (وغیرہ کے شروع کی حالت میں جب بچپی کے ساتھ جلن ہو؛ جب تکلیف کا ایک سہہ رہا لگنے سے آئی ہو؛

ایس ۱۳ X ۲۰۔ درد ناک بارنے کی طرح اور کسی عضو میں سُرخی اور جلن ہو؛

اگاری کس ۳۰۔ ۲۰۔ جسم کے اکثر مقامات میں کھجلی اور سُرخی کے ساتھ جلن۔

بیلارڈونا ۱۰ X ۲۰۔ جسم میں گرمی کے ساتھ کسی عضو میں سوزش (سوجن اور سُرخی) سوزش کی جگہ چھونے سے ایسا معلوم ہو کہ گویا آگ نکل رہی ہے۔

کینتھرکس ۳۰ X ۶۔ گلا، پیٹ، مقعد، اور آلات بول میں جلن۔ خاصہ

بیشاب کے ساتھ) کیپسکیم ۳۰ X ۶۔ کینتھرکس کی طرح جلن (جیسے کسی نے تمام جسم میں مرچ لگا دی ہے۔ برائی الونیا ۳۰۔ ۳۰۔ صفراوی مزاج والوں کے ہاتھ، پیر، وغیرہ میں جلن معلوم ہوتا۔

پیر کی انگلی میں گھٹے۔۔۔ فریم پیکر ۳۔ (نئے گھٹے میں) جلن یا مواد ہونے پر
ٹائٹریک ایسڈ۔ ہائی راسٹس۔ ایک ایک ڈرام روغن یا زیتون ایک آونس
میں ملا کر رات کو سوتے وقت لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

داد۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ بلینیم، ۲۔ ۲۰۰۔ استعمال کرنا چاہیے۔ سر کی
جلد پر داد یا گھنے بالوں سے دھکے دوسرے حصہ کی داد میں کرائی سو فین ایسڈ
۴۔ گرین (ایک آونس روغن زیتون کے ساتھ ملا کر) پھر کوئی دوسری دوا
کی ضرورت نہیں پڑتی، طلی ریلوم ۶۔ کا استعمال بھی اس کی بہت اچھی دوا ہے۔
اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو نیٹریم سلفر۔ ۲۔ ۵۰۰۔ ایک ماہ میں ایک مرتبہ استعمال
کرنا چاہیے۔ ہیر سلفر، فاسفورس۔ ایسڈ ٹائٹریک۔ رسٹاکس، سیسیا، گریفٹس
سلفر، کلیڈیم۔ سنگوئم (خاص کر عورتوں کے لئے) مرکب کاروغیرہ بھی فائدہ کرتی
ہیں۔ (مذکورہ بالا ادویات ۶۔ ۳۰۔ طاقت کی استعمال کرنا چاہیے۔
(کھال اُدھڑنا ملاحظہ ہو۔)

عضو جلدیہ کے علامات اور ادویات

تیز کھجلی، آہستہ آہستہ کھجلائے سے کھجلی موقوف ہو اور زور سے رگڑنے پر کھجلی
بڑھتی ہو۔ دودھ پلانے والیوں کے بھٹنی میں زخم، کروٹن۔
پھنسیاں جن میں بہت کھجلی ہو، اناکارڈیم، سوزش پھنسی، نیم خچہ، تپی، اکوتہ۔
نیٹریم میور۔ پھنسی خون بھری اور نہ بکتی ہو۔ آرم۔ غیر تندرست جلد، پانی بھری پھنسیاں،
پھوٹے پھونے سے تکلیف ہو، ہیر سلفر، کھجلی میں جلن اور تشنج کے ساتھ تپی، کوپے وا۔
بالائی عضو میں جگہ جگہ علیحدہ علیحدہ پھنسیاں کھجلائی ہوں اور بعد میں جلن ہو،
سیسیا۔ کان کے پیچھے تر پھنسیاں، تمام جسم میں گھٹی پھنسیاں، پھنسیاں، رس بھری،
یاسینگ کی طرح سخت پیڑی جینا۔ اور چھونے سے خون نکلنا۔ انٹم کروڈ۔
ہتھیلی بھٹی، اور پیڑی جی، جس جلدی مرض کی پھنسیاں، علیحدہ علیحدہ آگ کی
طرح سُرخ ہوں، تر اکوتہ، جو پکا ہوا نہ ہو۔ موسم سرما میں بڑھنا۔ پٹرولیم۔
مواد بھرا، میلاد بہر یا زخم، پشت کا زخم، کاربووج۔
سیکنی رنگ کا کالا داغ پڑنا، ایلنٹھس۔

سکڑی جلد جس میں پھنسیاں ہوں، مزمن پھیلنے والا اور بڑا زخم، چلیاؤ دیم۔
بال خشک، رنگہی کے جھاڑنے سے ملائم نہ ہوں، سب لپس میں ملے ہوں یا الگ الگ
ہوں، بورکس، سائی لی شیا، کلیر یا کارب، سلفر وغیرہ مفید و کارآمد ہیں۔

گہری جلدی درم، بہت کھجلی، مواد آنا، رٹاسکس، ہیر سلفر، وغیرہ۔
جلد خراب، آسانی سے مواد ہو، تر، اور تالوسریس کی طرح نئیدار، گریٹھاٹس۔
جلد میں بہت کھجلی، جلن کے ساتھ، جلد کھجلاتی ہو، اور دہاں مواد پڑتا ہو،
خون نکلے، کریوزوٹ، سلفر، سورائی نم، کلیر یا کارب وغیرہ مفید و کارآمد ہیں۔
جلد سخت میلی، مریض جسم دھونانہ چاہیے، رو میں کے سوراخ کالے۔

سر کے ساتھ کوئی جلدی، سلفر، آر جنٹیم میا، لیکم۔ سائی لی شیا۔ وغیرہ۔
جلد کالی، سکڑی رنگ برنگی، چھونے سے درد، بیگنی رنگ کی چھوٹی
چھوٹی پھنسیاں، چھوٹے چھوٹے تکلیف دہ پھوڑے، اس میں آہستہ آہستہ
مواد پیدا ہو، زخم کی جگہ کھلی رکھنے سے جلد میں جلن ہو، سیکل، سائی لی شیا، سلفر۔
جلد مختلف رنگ کے مزمن، تکلیف دہ زخم، شق ہو کر خون نکلے، لیکس،
جلد جری بھری، مکھن کی طرح، ٹیٹرم میور، جلد جت گیری، نیلی یا نیلگوں، کیورم،
جلد کھجلاتی ہو، جلن ہوتی ہو۔ کھجلائے سے چھوٹی پھنسیاں اور چھالوں کی
زیادتی، ہیر میں۔ جلد سے کسی وجہ سے مواد بہنے پر سلکا۔
جلد سرخ، کھجلاتی، اگاریس ۳۔

جلد ٹھنڈی درد۔ پھوڑا، اور زخم پشت، کچھ بیگنی رنگ کے داغ
کروٹیلکس، ۶۔ جلد خشک جس میں روسی ہو، آرسنک ۳۔

جلد خشک، گرم اور بخار، ایکونارٹ ۳۳۔
جلد خشک گرم، کھجلی، زخم ہو (چھانے پڑے ہوں) معمولی چوٹ سے بھی
پانی بھری پھنسیاں نکلتا، ہاتھ کی انگلیوں کی انگوں کی جلد کھل جانے پر سوزش
ہوتی ہے۔ پستان میں جلن ہوتی ہو، اور پھٹے ہوں، سلفر۔
جلد سفید اور سفید کی طرح ہونے پر لے پس جلد میں متہ بہت ہو، تھو ۱۲۔
جلد پر پتی، پانی بھرے دانے، چھنے کی طرح جلن، آرٹیکا بورنس ۱۱۔

مستے ایک پر ایک ہوا کریں۔ فیرم پک ۳-X- جلد پر پھورے رنگ کے داغ ہوں، تو پھنسیاں ہوں، ۱۰-۱۲ پر چلتے چلتے رنگ کے داغ، پسپا۔ ۲- جلد میں کانٹا چھنے کی طرح درد ہونے پر۔ برا یونید، جلد پر لیسار و طوبیت بھری پھنسیاں، اکوتہ، زخم کا داغ، جس میں درد ہو، اگر نفاش۔ جلد پر قرعہ پھنسیاں پانی دار، اکوتہ، جن میں جن، کھجلی ہو۔ رطاس۔ جلد پر پھنسیاں، بریرس و گے رس۔

جلد کا گوشت پھیلا۔ زخم کا شل چھنے کی طرح درد۔ نارٹرک ایسڈ۔ جلد پر سرخ دانے بہت کھلی، میزیریم ۳- جلد کے خلیے جھٹے میں سرسری۔ ہونے پر، سیکل۔ پھنسیاں کھجلائی ہوں اور دانے بگی رنگ، کے ہوں ایسڈ میوڑا۔ چھوٹی پھنسیاں جن میں جلن ہو اور کھجلائی ہوں اور پھوڑے ہوں۔ جسم پر سیاہ اور نیلی پھنسیاں آرنگا۔ پھوڑے اور ان میں جلن۔ درد اور لپٹ کا پھوڑا ہو۔ فائٹو لکٹا، سوزشی اور پُر درد چھپک کی طرح مواد بھرنے والے گہرا زخم، اور کنارے سے سوراخ دار ہوں، کیلی بائی۔

بدبو دار دانوں کے ساتھ گہری سخت مواد بھری پیٹری، اکوتہ۔ تری۔ بہت کھجلا ہٹ، پیلے رنگ کا زخم جس پر پیٹری جچی ہو۔ دھوئے وقت خون نکلتا ہو۔ میزیریم۔ ہڈی کے پاس کا زخم۔ اس میں سے تیلی پیپ نکلتی ہو، اسافٹید۔ ہڈی سکڑنے کی کھانک کی طرح مہ جس سے آسانی سے خون نکلتا ہو۔ متعدد پھے، بغل، وغیرہ مقامات کی کھال اڑھرتی ہو، کاسٹیک۔

بڑے زخم کے چاروں طرف پھیٹے چھوٹے زخم ہونے پر، فاسفورس۔ جلد میں چھلنے کی طرح (BLISTEK LIKE) ماسک، پھیلی میں) پھوڑا ہونے پر رنین و گیس، پھوڑا، ڈنیل، انگل، انگل بیڑا اور کسی سو جن کے ساتھ سنج۔ نیلے ہوں، یا جلن اور درد ہو، ٹیرن ٹیولا کیولنس۔

مار کھانے کے بعد سیاہ داغ مٹنے کے لئے لیڈم۔

جبرہ پر پھنسیاں، پیپ بھرے داغ، چھوٹے سے سوخی کی طرح درد۔ تر فانی ہوا چھی طرح نہ نکلا ہوں، کھجلائے سے بڑھنا پھنسیوں میں پانی بھرا ہو۔ زخم، گہرا۔

بھورے اور پیلے رنگ کی پٹری اُترنا۔ کھلانے سے خون نکلتا۔ ڈلکا مارا۔

جلد رطوبت بھری پھنسیوں سے ڈھکی ہو، کالی، یا خون بھری پھنسیاں۔

بہت جلدیں اور کھجلی، (سے نین کیوں) اکوتہ، لیون کے رنگ کا سخت سفیدی مائل تر۔ بالائی ہونٹ، اور ٹھڈی میں روسی۔ سیاہی مٹا،

جسم نیلا اور برت کی طرح ٹھنڈا۔ کاربودج، سر کی جلد میں کھجلی ہر کے پچھلے حصہ اور ہاتھ میں اکوتہ۔ کلیمٹس، لیدار پینہ، پیپ بھری پھنسیاں دھیرے دھیرے مواد پڑنا۔ نیلیوں، سرخ، انٹم ٹارٹ۔

سوکھی گرم اور سرخ جلد، بیلا ڈونا۔ خشک بے حد کھجلی اور کھجلاتے کھجلاتے خون مکمل آنا، ایوونا۔ تمام جسم کھجلاتا ہو۔ رات میں بستر کی گرمی سے مرض میں ترقی ہو، مرکیولس۔ تمام جسم میں تیز کھجلی۔ سفید غلاظت۔ ڈلی کس۔ تمام جسم میں بھورے رنگ کے دانے۔ مسہ اور زخم، جسم میں کلنٹے چبھنے کا ایسا درد، ذرا بھی چھوئے سے خون نکلتا، ایڈنا ٹیٹرک۔

تمام جسم میں سیاہ داغ، بیٹشیا، تمام جسم میں گتجان، سرخ پھنسیاں۔ ایون کارب، صاف خشک جلد، کالچیکم، ہاتھ اور مالات تناسل میں مٹے کی طرح گوشت، امراض زہریہ کی وجہ سے گوشت کے ٹوٹنے، چھتے کی طرح گوشت کا ٹوٹنا یا دانے جس کے ذرا سا چھوئے سے خون نکلے۔ تھو جا۔ پھوڑا یا آس، جس میں ڈنگ مارنے کی طرح درد سو استسقاء۔ بغیر پیاس کے۔ اے پس۔

(DISEASES OF THE NAILS) امراض ناخنوں

- ناخن کٹانے کے وقت یک بیک ٹوٹ جاتے پر یا مڑ جاتے پر سسکا ۶۔
- ناخن نائل ہو جائے، یا اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے۔ تھو جا۔ ایوونا ۶۔
- اگر ناخن پھٹ جاتے ہوں آرس ۶۔ ناخن موٹا ہو جائے۔ گرہیا ٹس ۶۔
- یا انٹم ۶۔ ناخن کے پاروں طرف گھاؤ ہو۔ ناسٹورس ۳۔ درم کیسہ۔ ناخن سسکا ۶۔ کانڈروڈ استعمال اور کھینڈ لولا ۵۔ (۱۲) قطرے سے ۶ قطرے پانی ملا کر، کا خارجی استعمال کرتا چاہیے۔ جھٹکا یا گر پڑنے کی وجہ سے ناخن میں

تکلیف ہو؛ آرٹیکا ۳۔ کانڈرونی استعمال اور آرٹیکا ۴۔ (دس گنے پانی میں)
 ملا کر باہر لگانا چاہیے؛ جو تہ پہننے کی وجہ سے پیر کے ناخن انگلی کے سر کے
 کونے میں گھس جائیں اور ناخن کے گرد کا ملائم حصہ سوچ جائے یا درد ہو؛
 یا اس میں مواد پڑ جائے تو نائٹریک ایسڈ (MAGNES AUSTRALIS)
 یا میگنس آسٹرلین کا داخلی استعمال اور ہائیڈراسٹس ۴۔ (ایک حصہ +
 روغن زیتون آٹھ حصہ) ملا کر خارجی استعمال کرنا چاہیے۔ یا ورائٹم ورائٹ
 ۴۔ کالیپ کرنا فائدہ کرتا ہے۔ اس میں بھی اگر فائدہ نہ ہو تو نشتر لگوانے کا
 بندوبست کرنا چاہیے۔ نشتر لگوانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

ورم کیسہ ناخن (ONYCHIA)

اس بیماری میں ناخن کے اندرونی حصہ میں ورم آجاتا ہے سلسکا ۶۔
 کھانا اور کلیڈیولا ۴۔ یا بورک ایسڈ تھوڑے پانی میں ملا کر لگانا چاہیے۔
 تشنہ الظفر۔ ناخن کا بڑھ کر گوشت میں چھبنا

(INGROWING OF NAIL)

اس بیماری میں ناخن کی جڑ، پاس کے گوشت میں گھس کر یا پھیل کر
 تکلیف پیدا کر دیتی ہے نائٹریک ایسڈ ۶۔ داخلی اور ہائیڈراسٹس ۴ (ایک
 حصہ + ویسکین آٹھ گنا) کے مرہم کا باہری استعمال کرنا چاہیے۔ نشتر لگوانے کی
 ضرورت پڑنے پر ناخن میں روئین روزنک گلیسرین لگانا چاہیے۔

۱۶۔ زیادہ موٹاپا (OBESITY OR CORPULENCE)

جلد کے نیچے اور جسم میں زیادہ چربی معلوم ہو تو اسکو مرض فیری ہی زائڈ۔ یا
 زیادہ موٹاپا کی بیماری کہتے ہیں۔ سائنس میں تکلیف؛ تھوڑی ہی محنت
 میں ہانپنا۔ خون کا دورہ ٹھیک نہ ہونا وغیرہ علامات کی وجہ سے
 مریض کا جسم اور طبیعت تباہ رہتی ہے۔

جوانی اور بڑھاپے میں ہی ہمیشہ یہ موٹاپے کا مرض ظاہر ہوتا ہے
 مردوں کی نسبت عورتوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے والدین کو یہ
 بیماری ہونے پر اولاد کو بھی بیماری ہو سکتی ہے زیادہ مقدار میں کھن یا اسی

قسم کی چیز کھانا بہت زیادہ کھانا پینا بغیر کسی فکر کے گھر کے کام کا چلنا۔ کوئی جسمانی یا دماغی محنت نہ کرنا وغیرہ اسباب سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔
علاج: - گریفائٹس X۳ - دو ہفتہ سے زائد کھانے سے کچھ فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ عورتوں کی بیماری میں یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

فائٹولکاکا بھل (PHYTOLACCA BERRY POKEBERRY) ایک گرین کی ٹہکی (یا ایک قطرہ کی ٹہکی) ایک ماہ تک دو مرتبہ روز برابر استعمال کرنا اگر بہت سے ڈاکٹروں کو فائدہ معلوم ہے اس سے فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر کلاک ترتیب وار (۱) ایون برون X۳ - (ب) کلیریا کارب ۳-۶ (ج) کلیریا آرس - فی خوراک دو گرین آٹھ گھنٹہ کے وقفے سے کھلانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
 ڈاکٹر کاؤ پر تھوٹ کو کسی دوا سے فائدہ ہوتے نظر نہیں آتا۔ تب انہوں نے علامات کی مطابق مندرجہ ذیل ادویات دینے کا مشورہ دیا ہے۔
 اگار یکس X۳ - انیم کروڈ X۶ - آرسنک X۳ - برائٹا کارب X۶ - گریفائٹس X۶ - لائیکوپوڈیم X۶ - مرک سول - X۳ - اورسلفر X۶ -

علاج معاون: - نشاستہ اور شکر والی چیزیں جیسے آلو، شکر قند، مکھن، چینی، بالائی، گھی اور مٹھائی والی غذا اور بیر پورٹ وغیرہ شراب، ماش، روٹی، وغیرہ چربی، بڑھانے والی چیزوں کا کھانا ترک کر دینا چاہیے۔
 مکھن نکالا ہوا دودھ، آگ میں سینکی گرم روٹی، سخت بسکٹ، چھلی تیل میں نہ تلی ہو۔ (گوشت جس میں چربی نہ ہو) تازہ پھل (جس میں شکر کا جزو نہ ہو) انڈے کا عرق، لیمون، چائے، کافی، سیب، کیلا، شکرہ وغیرہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔ غذا کھانے سے کم سے کم دو لبر پانی پینا چاہیے۔ تھوڑی محنت

۲۔ پیرا نائس لوچین کلکتھی (DOLICHOS) مونگ، مسور، مٹھا۔ بیگن کی پکڑی، الاچی، گرم پانی کے ساتھ شہد، لاوا۔ سرسوں، باقل، کاتیل تیز یا رد کھنی چیزیں۔
 چنگڑی چھلی، جسم میں عطر لگانا۔ وغیرہ ادویات آلود ویدک طریقہ سے نہایت مفید و کارآمد ہیں۔

گھومنا۔ سائیکل چڑھنا۔ سیر بھی سے چڑھنا۔ ترنا۔ پہاڑ پر چڑھنا وغیرہ۔ سمجھو
 تخت والی کسرت کرنا چاہیے۔ یہ نہایت مفید و کار آمد ہے۔
 ۱۷۔ زمانہ بڑھایا اور اس کے پہلے کے دونوں زمانے

(CONSULT THE ARTICLE "OLD AGE IN MAN" IN THE
 INDIAN MEDICAL RECORDS FOR JANUARY 1923 PP. 12)

انسان کی زندگی تین حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔

(۱) ابتدائی زمانہ (۲) درمیانی زمانہ (۳) زمانہ زوال۔

(۱) پیدائش سے ۲۵ برس کی عمر تک کو زمانہ ابتدائی کہتے ہیں۔ اسی وقت
 خاص کر جسم کے جملہ اعضاء اور زندگی کی دوسری قوت قاعلیہ کی ترقی ہوتی رہتی
 ہے۔ میلاد ونا، گلکیر یا کاربائیڈ، سلک، کیموسلا۔ گلکیر یا فاسفوریک، انٹیم کروڈ،
 نیٹرم فاس، اڈیم، سپجیا، وغیرہ اس وقت کی خاص دوائیں ہیں۔

(۲) ۲۵ سے ۴۵ برس کی زندگی کی درمیانی حالت ہے اس حالت
 میں عموماً اوسط وزنی کے افراد غریب اپنے اپنے بال بچوں کی پرورش کے لئے

خوب محنت کرتے ہیں۔ امراء اور کاہلی الوجود لہو لعب اور عیش میں زندگی بسر
 کرتے ہیں۔ اور عورتیں اولاد پیدا کرتی اور گھر کا کاروبار کرتی ہیں۔
 نیکس و امیکا، ٹیکس، اسپیا، فاسفورس، لیکس، بائیوسیا، مس،
 سبکس، رسٹاکس، انٹینٹیا، نائٹریک ایسڈ، گریفائٹس، ایسڈ فاس،
 سفلیٹیم، پلیم وغیرہ اس وقت کی خاص دوائیں ہیں۔

(۳) کم سے کم ۴۵ برس کی عمر سے ہی جسمانی زوال کی علامت ظاہر ہوتی
 ہے۔ جیسے قوت باصرہ اور قوت سامعہ (قوت شنوائی) کا کم ہونا، ٹڈیوں
 میں نقص۔ گوشت کا ڈھیلا ہونا۔ کمزوری اور ڈھیلا پن۔ دل کی کمزوری
 کی وجہ سے جسمانی حرارت کا کم ہوتے جانا۔ اور ہاتھ پیر ٹھنڈا معلوم ہونا۔
 لگوں میں چونے کا حصہ زیادہ مقدار میں جمع ہونا وغیرہ اسباب سے خون
 کے دوران میں اور باضمہ کے فعل میں نقص اور ریرھ کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونا۔
 دماغی قوت متعجب (سوچنے کی طاقت) کا پست ہونا وغیرہ۔ علامات ظاہر

ظاہر ہوتے ہیں۔ تدبیری واقعات اور تاریخ پر غور کرنے سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سفید دارضی موشچھ والے متقدمین کو مذکورہ بالا ذوال کے علامات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خاندانی، ان کو جلد ہی عالم جاؤ دانی کو رحلت کرنے کی ترکیب کر گئے۔ یہاں تک کہ بہت قویں ان کو ہضم کرنے کے لئے اپنے عزیز واقارب کو بھی ختم کرنے کا کام جوش و خروش سے پورا کرتی تھیں جو ہو، آہستہ آہستہ یہ رواج اٹھ گیا ہے۔ لائیکو (خاصکر عورتوں کے لئے) اسٹائل کاربوچ، فیٹرم میٹور، ایمون کارب، یورک ایسٹیکس، ماسکٹا (مضہ ہضمی میں) کو نیم فلورک ایسٹ (خاصکر عورتوں کے لئے) گیمو جیا (بہت زیادہ پانی کی طرح دست ہونے پر)۔ سلفر، ایو، سیکیل، (بڑھاپے سے بالکل کمزور) مرک آئیوڈ، کلکیر یا کارب، سیارڈا وغیرہ دوائیں اس حالت میں بہت فائدہ کرتی ہیں۔ (امراض جنون میں دماغی قوت کی کمی ملاحظہ ہو۔)

بڑھاپے کا علاج معاون

عنداء۔ بڑھاپے میں دانت گر جانے پر چیا کر کھانا یا پیانہیں کھانا اسلئے نچتہ پھل، یا دودھ وغیرہ آسانی سے ہضم ہونے والی چیزیں کھانی چاہئیں۔ آرام۔ بڑھاپے میں آرام لینا بہت ضروری ہے، کثرت۔ یا زیادہ محنت کرے دست بڑھی ٹوٹ جاتی ہے۔

حسد ارت

موسم سرما میں جسم کی حرارت قائم رکھنے کے لئے کافی کپڑے پہننا بہت ضروری ہے (ضرورت پڑنے پر) کمرہ کے ایک کونہ میں تھوڑی آگ رکھنا مناسب ہے۔ جاڑ از زیادہ ہو تو دھوپ ٹکھنے کے ایک گھنٹہ بعد لیٹر سے اٹھنا چاہیئے۔

بھارے ناظرین کو سکر تعجب ہو گا کہ امریکہ کے کئی شہروں میں دوبارہ جوان ہونے کی صحت گاہ ۱۹۲۲ء سے کھلی ہوئی ہے وہاں دوبارہ جوان ہونے کے لئے بہت سے دوا مند مرد اور عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، کھلی صاف ہوا اور سورج کی روشنی میں رہیں کو رکھتے ہیں۔ اور ان کو ایک گھنٹی کا جو صر کھلا کر دوبارہ جوان کر دیتے ہیں۔

دو طریقہ سے موت آتی ہے۔

(۲) (SYNCOPE)

دل کا فعل بند ہونے پر

(ASPHYXIA)

(ب) آلات تنفس کا فعل رُک جانے پر

(۲) بیکایک اخراج خون، بے قاعدہ کھانا پینا۔ یا مناسب طریقہ سے جسم کی پرورش نہ ہونا وغیرہ اسباب سے دل کا فعل رُک جاتا ہے۔

علامات :- دُھندلا دیکھنا۔ آنکھوں کی پتلی کا پھیل جانا۔ سر میں جکڑ، کمزور نبض، چہرہ اور دونوں ہونٹ نیلے، ہاتھ پیر ٹھنڈے سرد پینے سانس میں تکلیف۔ تشنجی یا بے تشنجی، بے ہوشی کی حالت، زہر کھانا۔ یا دل کی کسی بیماری کی وجہ سے دل کا فعل رُک جانا۔ تیز اور کمزور نبض، ہاتھ پیر ٹھنڈے۔ تمام جسم میں لیسڈارپینہ۔ لیکن حواس نہ رہنا۔ وغیرہ۔

(ب) تیز تکلیف دہ کھانسی کی بیماری۔ آنکھ کا کوہ گویا باہر نکلا پڑتا ہے۔ چہرہ سو جا اور نیلا۔ گردن کے پیچھے کی رگیں پھولی اور اکثر اکڑن کے ساتھ بے ہوش ہو جانا۔ قوما (COMA) یعنی سانس کی تکلیف ہونے کے پہلے ہی بیہوش ہو جانا۔ سدہ دم وغیرہ آلات تنفس کا فعل بند ہو جانا اسکی مخصوص علامت ہے

جان نکل گئی یا نہیں معلوم کرنے کا طریقہ

منہ کے اس پاس آئینہ رکھنے سے اگر اس آئینہ میں حری یا زنگ معلوم ہو تو سمجھنا چاہئے کہ الہی موت نہیں ہوئی ہے؛ گوشت میں آپین یا سونی پھونے سے اگر سوراخ کی جگہ بھر جائے سمجھنا چاہئے کہ زندگی ہے۔ لیکن اگر وہ بند نہ ہو تو ضرور ہی موت ہو گئی ہے۔ یہ تو کہنا ہی بیکار ہے کہ کوئی دوا موت کو نہیں رو سکتی۔ لیکن آخر میں ان دونوں دواؤں کے استعمال سے فائدہ ہو سکتا ہے؛ پکس۔ ۳۔ موت کے وقت گھر گھر اسٹارٹ روکنے کے لئے پکس۔ ۳؛ بہت فائدہ کرتا ہے۔ ہوڈر ما۔ ۳۔ مژدہ کی طرح سب جسم ٹھنڈا ہوتا جاتا ہو یا طہ پیر بہت ٹھنڈے؛ کلیجہ صرف تصور اگر م معلوم ہوتا ہو۔ ہوڈر ما ہر ایڈس۔ ۲۔ زیادہ

قائدہ کرتا ہے۔ ہوڈر ما کے علامات میں: آخر وقت کی تمام جسم کی ٹھنڈک
غیر نمودار ہوتے ہیں۔ یہ سرد جسم کی حالت سردی سے پیدا ہوئی
ٹھنڈک نہیں ہے۔ لیکن آخر وقت کی ٹھنڈک ہے۔ ٹھنڈک جسم سے اوپر سے
نیچے اُترتی ہو یا نیچے سے اوپر جاتی ہو۔ (ANSHUTZ'S THE RAPEUTIC BY-
WAYS) ملاحظہ ہو

۱۶۔ امراض دماغی (MENTAL DISEASES)

ہمارے سب ناظرین جانتے ہیں کہ جسم اور دماغ کا بہت گہرا تعلق ہے۔
جسم میں کوئی بیماری ہونے سے دماغ بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے
بخار کی تیزی میں مریض کو ہڈیاں ہو جاتا ہے، ہنسن، رونا۔ اور بیہوشی وغیرہ علامات
پیدا ہو جاتی ہیں۔ گرنے کی وجہ سے سر میں چوٹ لگنے سے لڑکوں کی عقل خراب ہو
جاتی ہے، یا بیوقوف ہو جاتا ہے۔ اور دماغ خراب ہونے سے جسم بھی خراب
ہو جاتا ہے۔ جس ماں کا لڑکا مر جاتا ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے اور کاروباری
اپنی سب پونجی کھودینے سے کسٹرومرگ ہو یا مظلوم ہوتا ہے۔ کسی من چاہی
چیز کے نہ ملنے یا عشق میں ناکامیاب ہونے سے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے
اور ہمیشہ کے لئے جسم خراب ہو جاتا ہے۔

ہیمن مڈیکل کالج کے تشخیص امراض کے معلم ڈاکٹر راڈکا بیان ہے کہ دماغی
رجحان کی زیادتی (EXAGGERATION) یا (DEPRESSION) پست ہمتی
یا خرابی (PERVERTED) کی وجہ سے ماہی دماغی امراض ہوتے ہیں
ڈاکٹر جنس ڈل مار صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر ایک جسمانی امراض میں اسی کی طرح
دماغی خرابی بھی ہوتی ہے۔ جیسے شیطان طبیعت یا خود غرضی کو ہی درد عصبی ہوا
کرتا ہے۔ جھگڑا لوگوں کو بد نہضمی ہوا کرتی ہے

ماسد عشق میں ناکامیاب مرد اور عورتوں کو سرطان ہوا کرتا ہے۔ دوسروں
کی غلطیاں دیکھنے والوں کو وجع مفاصل یا انقرس ہوتا ہے۔ غصہ ور کو سکتہ ہوا
کرتا ہے۔ دوسروں کو لعنت و ملامت کرنے والوں کو دمہ ہوا کرتا ہے دوسروں
کو تنگ کرنے والوں کو سردی ہو کر رہتی ہے جو دوسروں کی بات نہیں سننا چاہتے۔

وہ بہرے ہو جاتے ہیں۔ امراض نظام عصبی کا دماغی امراض سے گہرا تعلق ہے
(امراض نظام عصبی ملاحظہ ہو۔)

جنون (INSANITY)

دماغ میں چوٹ یا زخم وغیرہ ہونے کی وجہ سے دماغ کی طبعی حالت میں
نقص ہو جاتا ہے۔ ایسی کا نام جنون ہے؛ تین دن آنا۔ سر میں درد، بلا ارادہ
ہاتھ پیر کی حرکت، بولنا یا بالکل خاموش رہنا۔ چہرہ اور آنکھوں کی حالت
بدلتی ہوئی؛ غلط دیکھنا اور غلط سنا۔ یا خرافات بکنا۔ بڑبڑانا۔ یادداشت
کی کمی۔ عقل کی خرابی۔ کسی کام میں جی نہ لگنا؛ غصہ، ڈر، خوشی، رنج، رفا۔
وغیرہ دماغی کیفیت کی زیادتی؛ قوت خواہش کو قابو میں نہ رکھ سکتا۔ خود
کشی کی خواہش عزیزوں کی بے عزتی وغیرہ اس بیماری کی مخصوص علامات ہیں۔
مرض جنون میں خاصکر تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) جیتخیل (ILLUSION)
(۲) توہمات کا ذہن (HALLUCINATION)
(۳) تصورات باطلہ (DELUSION)

بہت زیادہ محنت یا پریشانی؛ زیادہ کھانا پینا۔ یا آلات تناسل کو حرکت
کرنا۔ زیادہ شراب یا گانجا پینا۔ صحت کی خرابی، یا نا اُمیدی، مرگی وغیرہ اس بیماری
کے خاص اسباب ہیں۔ متقدم جنون ہوتا۔ مرض آشک ہوتا۔
آلات دماغ یا ستون کی بیماریاں۔ گہری چوٹ لگنا۔ عمر ۲۵ سے ۴۰ تک
جوانی کے لیکر شروع ہر چھلچھلک؛ نامناسب تعلیم ہمیشہ خوفناک واقعات کے

غلط دیکھنا یا باری چیزوں کو غلط خیال کرنا (AN ILLUSION, I.E., & MISTAKEN)

جیسے رستی کو سانپ خیال (PERCEPTION OF EXTERNAL OBJECTS)

کرنا۔ سایہ کو بھوت خیال کرنا۔ ریگستان میں پانی معلوم ہونا۔ ریل کی آواز کو بادل کی گرج

۲۰۰ - ۲ (RHODIUM)

(DXTURA ARBARIUM)

ہائڈرو ٹو بیٹیم؛ واپس پانا۔ وغیرہ تخیل کی خاص توذائیں ہیں۔

قصہ و کہانی کی کتا میں پڑھنا۔ اس مرض کے اسباب ثانوی ہیں۔
 بیماری کا ایک حملہ، جوانی کی عمر اور طاقوت و جسم۔ عقیدہ کا بدلنے
 رہنا۔ کھانے پینے کی خواہش، آنکھوں کی پستلی بے چین۔ صاف تھکے رہنا
 ہمیشہ مہنتی خوشی رہنا۔ جسم میں پھوڑے پھنسی، ہونا۔ اگر طنز اور
 فالج نہ ہونا۔ موٹاپے کی ترقی کے ساتھ پھرتی رہنا۔ یہ علامات نیک ہیں۔

توہمات کا ذریعہ جو چیز تھیں وہی معلوم ہوتا ہے۔
 AN HALLUCINATION I.E. THE
 PERCEPTION OF OBJECTS WHICH HAVE NO REALITY OR
 OF SENSATION-WATCH HAVE NO CORRESPONDING

EXTERNAL CAUSE۔
 جیسے رنگ کی مورتی دیکھنا، مردہ شخص کو دیکھنا یا تین کرنا۔
 دیوتاؤں کی باتیں سنانا۔ آواز نالی۔ کیناں انڈیکا۔ کاکوس، لاپس۔ اگنے۔ لکے۔ پٹرو۔
 بیلونیم، کیوریم، ایٹم، اٹارکس، اناکارڈیم، اناکاردیم، اسٹرا موشیم، کیلی بروم۔
 ایسٹھ، سلفر، زنک، میو۔ ایتھس۔ ورٹیم، نکس، گیس، ایڈفاس، ولیریا نا۔ وغیرہ
 اس بیماری میں مفید و کارآمد ہیں۔ جو تعصبات یا طے یعنی بہت عرصہ تک غلط دیکھنا۔
 یا جو چیز ہے وہ غلط دیکھنا۔ اور دل پر ان کا نقش جم جانا۔ ملاحظہ ہو۔

(A DELUSION I.E. WHEN AN ILLUSION OR HALLUCINATION
 GETTING ASTRONG POSSESSION OF THE MIND TENDS
 TO A PERSISTENT BELIEF IN THE CORRESPONDING
 OBJECT IT IS CALLED "DELUSION" A.C MITRA'S PSYCHOLOGY.

P. 374-

جیسے رقص کو ایسا محسوس ہوتا کہ گئے میں ڈوری ڈاکٹر شیطان اسکو خود کشی کیلئے آمادہ کرتا ہے۔
 زمین اور آسمان ملا ہوا۔ معلوم ہونا کہ لاپس انڈیکا (کوئی چیز اپنی شکل سے بڑی معلوم ہونا۔
 پلاٹینا۔ (کوئی چیز جتنی بڑی ہے۔ اس سے چھوٹی معلوم ہونا۔ تھیونڈا۔ کیلیک کارب
 اسٹے فاسکریا۔ آرم۔ آرس، رسٹاکس، سیکس، سلکا۔ اور متذکرہ امراض
 تخیل اور توہمات کا ذریعہ کی ادویات بھی اس میں دی جاسکتی ہیں۔

مرض کا آہستہ آہستہ حملہ پچاس برس یا اس سے زیادہ عمر میں یہ بیماری ہونا۔ کسی ایک معاملہ میں تخیل ہونا (خاص کر مریض کو ایسا معلوم ہو کہ گویا اسکو ہمیشہ تنگ کر رہا ہے) فذات سے نفرت (مریض کو زبردستی کھلانا پڑتا ہے) آنکھوں کی پتلی سکڑی ہوئی یا بلا حرکت رہنا۔ (یا ہل نہ سکتا) گندگی ہمیشہ مشت زنی کیا کرنا۔ نازک مزاجی، موٹاپہ، بڑھنے کے ساتھ ہمیشہ اُداس ہونا۔ اپنا بال نوچنا یا اپنے جسم پر چوٹ لگانا۔ اگرٹن یا فالج ہونا وغیرہ علامتیں۔ پہلے ڈاکٹر جنون کا علاج کرتے وقت مریض کو بہت تنگ کرتے اور اس کے ساتھ سخت سلوک کرتے تھے۔ عالمہ وفاضل ہنری مین ہی نے سب سے پہلے اُن سے رحم کا سلوک کیا۔ اور مریض کے ساتھ سخت سلوک کرنے کی تردید کی؛ دراصل مہاتما ہنری مین فرانسسی ڈاکٹر پائٹل (PINEL) اور ٹوک (TUKE) اور کونولی (CONOLLY) نے مریض جنون کے بکواس کے علاج میں سدھ کی دل و جان سے کوشش کی؛ مریض جنون کے علاج میں ہو میو پیٹھیک طریقہ دوسرے طریقوں سے کہیں بہتر ہے۔ ڈاکٹر ڈی سلڈن ٹال کوٹ کی منسا (MENTAL) (DISEASES AND THEIR TREATMENT) ملاحظہ ہو۔

جنون کی چار قسمیں ہیں (۱) وحشت (MANIA) (ب) مانیو لیا (MESENCHOLIA) (ج) بلادت (DEMENTIA) اور (د) شلل (PARESIS)

۱. وحشت جنون (MANIA)

جس جنون میں دماغی رجحان کی زیادتی اور جسمانی جذبات اچھی طرح معلوم ہوں۔ اسکو 'وحشت' کہتے ہیں۔ یہ فوراً نہیں ہوتا۔ بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ بدن ٹوٹنا۔ بھوک نہ لگنا۔ ممتہ سے بدبو۔ زبان پر میل تہشیں منعقد معقدہ، قبض، سر بھاری، محنت کرنے سے جی چڑانا۔ کسی کام میں جی نہ لگنا۔ وغیرہ علامات؛ پہلے تین ماہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد دماغی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کبھی منہسی اور کبھی رولانی؛ معمولی بات پر رنجیدہ ہونا۔ اپنے کو بڑا سمجھنا۔ ہدیایان؛ بہت جماع کی خواہش۔ کپڑے

یا بال نوجوا وغیرہ علامات پیدا ہو کر مریض آہستہ آہستہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے اچھی طرح سمجھنا کہ لئے وحشت کو علیحدہ علیحدہ حالتوں کے علامات مندرجہ ذیل ہیں (۱) حاد (ACUTE) جنون میں دماغی اور جسمانی بے چینی، تخیل، غلط عقیدہ اور خیالی باتوں پر غور کرنا اور باہری ٹھیک چیزوں کو غلط دیکھنا۔ بُری یا اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا۔ اور چال چلن تیز جذبات۔ کانٹا مارنا۔ نیند نہ آنا۔ وغیرہ حاد جنون کے حتمی علامات ہیں (اس حالت کے مریض اکثر اچھے ہو جاتے ہیں۔

(۲) حاد جنون مرسامی (ACUTE DETIRIOUS) بہت زیادہ جسمانی و دماغی بے چینی، تخیل یا خیالی چیزوں کا دیکھنا۔ جو ہمیشہ بدلتا رہتا ہو۔ زور سے بولنا۔ یا چیخنا۔ تیز جذبات۔ اپنے خاندان والوں سے محبت نہ رکھنا نیند نہ آنا۔ چہرہ سُرخ، بخار، نبض تیز، خشک زبان، سرسام کی طرح علامات وغیرہ۔ اس مرض میں ظاہر ہوتے ہیں، ان بیماری کے ہونے پر اکثر مریض مر جاتے ہیں (۳) قوت خواہشات میں نقص اور ضد کے ساتھ جنون (PARANOIA) مریض خیالات یا اُمید اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اسی کو بار بار کہتا ہے۔ یا کچھ زیادہ کہتا ہے۔ اپنے کو بہت بُرا سمجھتا ہے (یہاں تک کہ اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے لگتا ہے)۔ مریض کبھی خاموش اور کبھی غصہ میں آجاتا ہے۔ ایک ہی معاملہ میں تخیل میں رہنا (خاص کر مریض کو گویا ہمیشہ کوئی تکلیف دیتا رہتا ہے) ایسا خیال کرتے مریض آدمی کو قتل کر سکتا ہے۔ دوسرے کی خواہش پر شک (جیسے عورت مرد، ایک دوسرے کے چال چلن پر شک کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی حاد جنون کے بعد ہی دکھائی دیتی ہے۔

(۴) مزمن (CHRONIC) یہ ایک علیحدہ بیماری نہیں ہے۔ متذکرہ بالا شدید جنون کی حالت ثانی ہے۔ کسی طرح کا تصورات باطلہ (جیسے اپنے آپ کو راجہ سمجھنا) مریض کے دماغ میں ایسا عقیدہ جم جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب کام چلا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ بُرا ہے۔ ان چار قسم کے جنون کے علاوہ بچہ کی ولادت کے بعد ایک جنون (وقیم)

کی جنون ملاحظہ ہو) یا اعتناق الرحم، یا ہسٹیریا۔ حقیقتاً ہونے کے وقت بکنا۔ وغیرہ جنون ہو سکتے ہیں۔

(امراض زنانہ کے باب میں متذکرہ بالا امراض ملاحظہ ہو۔)

علاج :- بیلادونا۔ ہایوسیا مس۔ اسٹرا مونیم، فاسفورس کینس

ورے ایلیم۔ کنالیں انڈیکا اور سلفر، یہ آٹھ دوائیں وحشت میں مفید ہیں۔
امراض دماغی کے علاج میں ڈاکٹر بیٹل کٹ کی منتخب دوائیں علامات کے مطابق کم از کم تین یا چھ ماہ تک اصول سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جن جنون میں ڈاکٹر بیٹل کٹ اور ڈاکٹر لسن اپنی منتخب دوائیں بیمار جسم میں دوا کے علامات ظاہر ہونے پر ایک مرتبہ پوری خوراک۔

(جیسے ہایوسیا مس، ایک گرین) دینے کی صلاح دیتے ہیں، اسٹرا مونیم X۳ بہت زیادہ غصہ ور یا جنون کی علامت میں مفید ہیں۔

ڈرائیوالی نابود چیزیں دیکھنا (جیسے سانپ یا چوہے دیکھنا۔ بھوت کی باتیں سننا، خیالی آت سے بچنے کے لئے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنا بہت زیادہ عصب یا روشنی اور ساتھ ہی پاے کی خواہش بیلادونا۔ علامات کے علاوہ خود داری کے خیالات۔

بیلادونا X۳۔ (تیز زبان کے علامات میں دینا چاہیے۔ آنکھ پھیل

بلا کرکت، خوف، آنکھ نظر، پیچ پیچ میں غمت ہونا، حادثوں میں۔ جیسے

تیز زبان، بھٹی، تلاش، دماغی حالت کا جلد جلد تبدیل ہونا۔ پاس

کے آدمیوں کو مارنے یا کاٹنے کو روڑنا، گانا۔ سیٹی بجانا۔ اچھل کر چلنا۔

ناچنا، چہرہ مسرور، نفیض پر مسرور، ڈاکٹر ٹکلیٹ فرماتے ہیں

کہ ہر بھاری، اور آہستہ آہستہ سر میں درد معلوم ہونے پر بیلادونا X۳

X۲۰ دینا چاہیے اور سورامزاجی کی وجہ سے تیز ہونے پر بیلادونا X۳۰۔ دینا چاہیے۔

ہایوسیا مس ۱۔ ۲۔ بیلادونا کے ہدیہ کی نسبت خفیف ہدیہ

کے علامات میں مفید ہیں (خاص کر مرض حادی میں)۔ خفیف جنون۔ ہنسنے یا گانا

متذکرہ بالا مصنفین میں اگر بیلادونا سے فائدہ سے فائدہ نہ ہو تو ڈرائیوالی یا ہسٹیریا کی آزمائش کرنی چاہیے۔

کی زیادہ خواہش، بھولنے کے ساتھ تھوڑا ہندیان۔ بولنے کی بہت خواہش، کبھی کبھی خاموشی، بے شرمی، ننگے ہو جانا۔ یا مقام شرمگاہ دکھانا۔ مجامعت کی دیوانگی عضلات کے ساتھ سکرٹنے کی بے چینی، حدود دیوتاؤں سے صدق دل سے دعا مانگنا، گانا۔ وغیرہ مذہبی جنون (دوسری دواؤں کی نسبت نئے جنون میں یہ فائدہ کرتی ہے) ایک مضمون میں دیوانگی (MONOMANIA)

اسی کی بابت بات چیت کرنا۔ کسی دوسرے مضمون پر بات چیت کرنا۔ کتنا بس انڈیکا XI۔ تصورات باطلہ یا خیالی چیزیں دیکھنا۔ ایک سی حالت میں ہی رہنے سے یہ دونوں خیال بدلا کرتے ہوں، ہر کام میں زیادتی۔ وقت۔ اور فاصلہ (TIME AND SPACE) زیادہ معلوم ہوتا جیسے ایک منٹ کا وقت ایک سال کے برابر معلوم ہوتا ہے یا نزدیک کی چیز دور رکھی معلوم ہوتی ہو۔ سلفر ۲۰: ہیز من جنون میں متاثرہ کرتا ہے۔ سرگرم پیر

۱۰۔ اگر باؤسیا کے استعمال کرنے سے شرمگاہ دکھانا بے شرعی دور ہو، یا مجامعت کا جنون موجود رہے یا شام کو جس وقت دن اور رات ملتے ہیں۔ خیالی مشکلیں دکھائی دیں تو پہلے ادبھی طاقت کا فاسفورس دینا چاہیے۔ دو لاکھ فاسفورس فائدہ نہ تو کتنے فاس ۲۲۔ کا استعمال کرنا چاہیے۔ تیز ہندیان کے ساتھ حیف ہونیکے علامات میں کیو پریم ۳۰۔ جنون کے ساتھ ہر فیض کے جماع کی جنون کی علامت میں پلیٹینا ۳۰، بہت دماغی تکلیف کے ساتھ بے چینی ورے الیب ۶۔ رشت کے ساتھ بے چینی، تیز ہندیان، ایسا خیال کہ ناکہ اسکو کوئی زہر دیکر مار ڈالے گا وغیرہ علامات موجود رہنے پر وروی الیب ۱۰۔ فائدہ کرتا ہے۔ چوری کے جنون (یعنی چھپا کر دوسروں کی چیز لینے) چولنے کی بے حد خواہش (KELPTOMANIA) میں ٹرٹولا یا بیسٹیم ۲۰۔ فائدہ کرتا ہے (ایسا جنون مہذب یورپین عورتوں کو ہوا کرتا ہے) امراض رحم کی وجہ سے جنون ہونے پر اور اس کے ساتھ حد موجود رہنے پر ایسے پس ۲۔ کسی خاص مضمون میں دیوانگی۔ (ایک ہی کام میں پاگل پن) (MONOMANIA) بیسٹیم یا دیسیا ۱۰۔ ساگیوٹا۔ پلیٹینا۔ ٹرٹولا۔ نہایت مفید و کارآمد دوا میں ہیں۔

کھنڈے۔ اطائی جھگڑا پسند کرنا۔ ایک ہی چیز میں توہمات باطلہ ہونا۔ پراپچھا
کیرا۔ ریشم معلوم ہونا۔ نہ ہی جنون، غرور چیزوں میں بدبو معلوم ہونا۔ گندہ
رہنا۔

پہلے کے ایو پیج، بروڈر آف پوٹیشیم، کلورین، ہائیڈریٹ، افیون یا مارفیا وغیرہ
دوائیں اس مرض میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مریض کے جذبات کم موجلتے ہیں اور وہ
مردے کی طرح پڑا رہتا ہے۔ لیکن ان دواؤں کے کھانے کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔

مالنجولیا (MELANCHOLIA)

دماغی۔ بچینی اور تکلیف اس مرض کے خاص علامات ہیں۔ اس کے ساتھ
ہمیشہ جگر کی خرابی یا قوطہ کی بیماری یا (OXALURIA) یعنی پشاب میں کز الک
ایڈ یا (CALCIUM OXALATE) موجود رہتا ہے، وغیرہ علامات ظاہر
ہوتے ہیں (۱) سادہ (SIMPLE) مالنجولیا جس میں مالنجولیا میں دماغی
بچینی کے ساتھ توہمات باطلہ (DELUSION) یا جسمانی خرابی نہیں رہتی اسکو
سادہ مالنجولیا (SIMPLE) مالنجولیا کہتے ہیں۔ اس میں دماغی تکلیف
کے علاوہ کوئی دوسری علامت معلوم نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ اچھا ہے۔

(۲) حاد (ACUTE) مالنجولیا بہت عرصہ تک دماغی بے چینی
توہمات باطلہ (جیسے مریض سمجھتا ہے کہ اس کا گناہ بہت سخت ہے) اور
خیالی چیز دیکھنا۔ دماغی شک، رونا۔ نیند نہ آنا۔ بے چینی۔ ڈر، فکر، خود
کشی کی بھید خواہش، آنکھوں کی پتلی مسکڑی ہوئی۔ بھوک نہ لگنا۔ قبض
اس کے خاص علامات ہیں۔ اس کا نتیجہ اچھا ہے۔

(۲) مزمن (CHRONIC) مالنجولیا (حاد کے بعد کی حالت) ہمیشہ
دماغی بے چینی رہنا۔ توہمات باطلہ بچہ اور جا ہوا۔ اپنے کو بے سمجھتا ہو ضعف
معدہ، قبض، کوئی تکلیف نہ معلوم ہونا۔ خودکشی کی نہایت خواہش۔ ایک
خاص علامات ہیں۔ اس کا نتیجہ بد ہے۔

(۳) مدحواسی (STOPOR) گہری دماغی بچینی کے ساتھ تمام معاملات
میں رنجیدہ، تنگ نہ کیا جائے تو مریض اپنی جگہ سے حرکت کرنا نہیں چاہتا ہے

جسم سے کوئی کوشش نہ کرنا۔ ہمیشہ گندہ رہنا۔ منہ سے رال پکنا۔ ناک سے
 بلغم نکلتا۔ خودکشی کی خواہش۔ خون کا دوران کم۔ جسم کی حرارت مقررہ حرارت
 سے کم ہونا۔ اس کی خاص علامت ہے۔ یہ سب علامات خوفناک ہیں۔
علاج:۔ مانیخولیا کے ساتھ جگر کی حرابی میں نکس وایکا پلایاٹلا۔
 مرک۔ کارڈولیس؛ میریانامفید و کارآند ہے۔

مانیخولیا کے ساتھ رحم کی بیماری میں۔ اکیٹا ریس موسا رسی سفیوگا۔
 لیٹم ٹیک، اور پلینا۔ مفید و کارآند ہے۔

مانیخولیا کے ساتھ پیشاب میں اکزالک ایڈ (OXALURIA) آنے
 کی علامت میں اکزالک ایڈ نائٹر ویٹوریاٹک ایڈ فائدہ کرتا ہے۔
 ماد مانیخولیا میں اگنیشیا؛ نائٹر ویٹور؛ فائدہ کرتا ہے۔ خودکشی کی خواہش
 میں آرام اور خواہشات دور کرنے کی کوشش میں آرس کے استعمال کرتے سے
 فائدہ ہوتا ہے، مانیخولیا کے ساتھ بے ہوشی میں ہلی بورس، ادیم، وریٹرم پیٹیا
 دینا چاہیے۔ اگنیشیا؛ ۳۔ (ڈرنا) تکلیف یا ناامیدی سے پیدا ہوا
 ماد مانیخولیا کی یہ سب اچھی دوا ہے۔ مریض میں رونے کی طاقت نہ ہو
 لیکن تکلیف سے کلیجہ پھٹا جاتا ہو؛ حیض کے وقت مانیخولیا، غفلت
 تنہائی پسند، جلد غصہ ہو جانا۔ دماغی تکالیف کو دور کرنے کے لئے مریضہ
 خودکشی کرنا چاہیے۔ *

✽۔ لیکن اگر مریضہ بہت روتی ہو یا اس کا جسم بالکل ڈبلا پھلا یا خون کم ہو گیا
 ہو، غذا کے بعد یا رات میں سونے کے وقت اس کا دھڑکتا ہے تو اگنیشیا کے عوض
 ریٹرم میوڑ؛ ۳ دینا چاہیے۔ عصبی کمزوری، بے چینی، نیند نہ آنا۔ بہت مفکر
 رہنا، شک، جھد میں درد، یا بوجھ مملوم ہونا۔ رحم کے ساتھ خون کے علامات
 میں سسی سی فیوگا؛ جسم اور دماغ کی رنجیدگی، دماغی تکلیف؛ موت زندگی کا
 گھٹنا۔ جسم (خاص کر ہاتھ پیر) ٹھنڈے سر میں ٹھنڈا پسینہ ناامیدی کی علامت
 نورو شور سے رونا۔ علامات میں درد ایلیم ۳ فائدہ کرتا ہے (بقیہ صفحہ پر دیکھیے)۔

آرم ۶۔ ۲۰۰۔ خود کشی کی بڑی خواہش، خاسکر مردوں میں؛ مایخولیا کے ساتھ خرابی جگر یا فوط کی بیماری موجود رہنے پر) منہ سے رال ٹپکنا غروب آفتاب کے طلوع آفتاب تک (یعنی رات میں) مرض کی زیادتی۔
 آرسنک ۳۳-X-۳۔ دُبلایا جسم، بھوک ندارد، بے چینی، زبان خشک، سرخ اور کاپتی ہوئی۔ اپنی انگلی چیا۔ پلکوں کا نوچنا۔ چہرہ اور سر کی جلد نوچنا اور زخم کر دینا۔ وغیرہ طریقوں سے اپنے کو نقصان پہونچانا۔ مریض سمجھتا ہو کہ اس کی بیماری اچھی نہ ہو گی۔ گھبراہٹ بطنی خیال کرتا

(بقیہ نوٹ صفحہ ۶۸۷) کام تیز بخار کے ساتھ غفلت، مایخولیا میں پٹیا؛ آنکھائی اور قبض کے ساتھ مایخولیا ادیم ۶۔ ۳۰ سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر زیادہ قبض ہو تو آدیم کی جگہ پیم ایسٹیکم ۶ مفید ہے۔ آلات تناسل کی بیماری میں سے مجبور ہو کر بہت دیر بعد جماع کرنا) سے پیدا ہوئی بے چینی، خاموشی، تنہائی کی خواہش کی علامات میں کوئیم ۳۰، تیز بخار ہونے کے بعد یا جوانی کے شروع میں مایخولیا ہونے پر ملی بورس ۳۰ پریشانی کے ساتھ چڑچڑا مزاج کی علامت میں مرک سول ۶؛ دماغی سُستی رہتے پر بھی جسم میں بے چینی ایک عضو میں یا تمام جسم میں لرزہ (لکچی) یا اگر ٹن کے علامات میں ٹرنیولا ۶۔ ۳۰۔ ضعف معدہ، بے چینی مریض کا معمولی بات میں رونا۔ مذہبی جنون۔ دیوتا سے دُعا کرتا رہے یا روتا رہے اور دل میں سوچتا ہو کہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ قابلِ معافی نہیں ہے آئندہ کی باتیں سوچ کر گھبرانا۔ ڈر لوک۔ کھٹی ڈکار وغیرہ علامات پریشانی کے ساتھ رہے تو ٹیس ۶۔ ۳۰۔ چڑچڑا مزاج اور مایخولیا کے مریض کو دراصل کوئی بیماری نہ رہنا اور پھر بھی اپنے کو بیمار سمجھنا اور تندرست ہونے کی دلتا فکر کرنا۔ کوئی چیز زیادہ معلوم کرنا (جیسے تھوڑے ہی روشنی یا آواز مریض کو برداشت نہ ہوتا۔ اگر مریض سے کوئی بولنا چاہے تو وہ رنجیدہ اور دُکھی ہوتا ہے۔ بدبھی کے علامات میں نکس ۶ میکا ۶۔ ۳۰۔ بہت رنجیدگی کی علامت میں ایسڈ فاس ۲۰-X-۲۰ اور سپیا ۳۰۔ فائدہ کرتا ہے۔ مریض سمجھتا ہو کہ اس کا ہر قسم کا علم غائب ہو جائے گا۔ کلیر یا کارب ۳۰ دُبلایا لیکن بہت بھوک، بہت تہی، یادداشت کی کمی، لوگوں سے علیحدہ رہنے کی خواہش، اٹوڈ

ہو کہ اس نے کوئی ایسا بُرا کام کیا ہے۔ جس سے سب ہی اس کی بُرائی کر رہے ہیں۔ پلٹنا ۳-X-۲۰۔ عورتوں کی مایخو یا میں زیادہ فائدہ کرتا ہے (خودکشی کی خواہش، بد معاشی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تمام چیزیں یا آدمی چھوٹے معلوم ہونا۔ جماع کا جنون۔ ولادت کے بعد زیادہ فکر کرنا۔)

(باب امراض زنان میں مرض جنون ملاحظہ فرمائیے۔)

(DEMENTIA)

(ج) توہمات باطلہ

جس مرض جنون میں عقل کا فعل کچھ کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے اسکو توہمات باطلہ کہتے ہیں۔ یہ چھ قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) حاد (۲) شراب سے پیدا ہو (۳) مشت زنی کی وجہ سے (۴) بڑھاپے کی وجہ سے (۵) عقوی اور (۶) ثانی۔

(۱) توہمات باطلہ حاد کے شروع کی حالت (ACUTE)

مرض مایخو یا کی بدحواسی (STUPOR) اور توہمات باطلہ کی شدت کا فرق سمجھنا مشکل ہے؛ ۱۵ برس سے ۳۰ برس تک اس کا حملہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ بہ نسبت مردوں کے عورتوں کو یہ بیماری زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یکایک حملہ، یوقونی، گندہ رہنا۔ خاموش رہنا۔ بھولنا۔ مشین کی طرح چلنا، چہرہ سو جا۔ اور اُترا ہوا۔ وغیرہ۔ اس بیماری کے علامات ہیں دماغی طاقت ایک دم کمزور ہو جانے سے دماغی تفکرات، دماغی خیالات کا ایک ہی طرح (MONOTONOUS) ہونے پر یہ بیماری ہوتی ہے۔ جیسا کہ بہت عرصہ تک مشین کے کارخانے یا طاح جہاز جو ایک ہی طریقہ کے کام میں کل زندگی ختم کرتے ہیں۔ انھیں کو خالص کر یہ بیماری ہوتی ہے۔ فاسفورس ایسڈ اور ان اکاڑڈیم اس کا خاص دوا ہے۔

(۲) شراب پینے سے پیدا ہوا (ALCOHOLIC) توہمات

باطلہ (بہت دنوں تک جو بہت زیادہ شراب پیتے ہیں۔ انھیں کو یہ بیماری ہوا کرتی ہے) یا درازت کا تیزی سے کم ہو جانا۔ یہاں تک کہ اپنا نام تک بھول جاتا، تو بہت خواہشات میں کمی۔ اپنے جسم اور کپڑے کا بالکل

خیال نہیں رکھنا۔ غصہ کرنا۔ جسمانی حسارت طبعی (۹۸/۴) سے بھی کم معده کا ورم وغیرہ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

(۳) مشت زنی سے پیدا ہوا احمق پن (MASTURBATION)

نوجوان مرد اور عورتوں کو ہی یہ بیماری ہوتی ہے۔ یادداشت بالکل نرہتا۔ دماغی کمزوری، مدد درجہ کی مایوسی۔ شکستگی باندھ کر دیکھنا۔ سر جھکا کر بیٹھنا۔ ہاتھ پیر کھنڈے اور تر، خرابی چال چلن وغیرہ اس مرض کے علامات ہیں۔ فاسفورک ایسڈ ان کارڈیم اور کوئیم وغیرہ اس بیماری میں فائدہ کرتی ہیں۔

(۴) بڑھاپے سے پیدا ہوا مایوسی (SENILE) عموماً ساٹھ برس کی عمر کے بعد یہ بیماری ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ مرض کا حملہ یادداشت کا زائل ہو جاتا۔ (خاص کر حال کے واقعات) غصہ و بے چینی، ڈھلے یقین بہت زیادہ غرور تو بہات باطلہ (DELLISION) خیالی چیزیں دیکھنا (HALLUCINATION) ایسا ڈھنگ کہ جس سے معلوم ہو کہ عقل خراب ہو گئی ہے۔ یہ ہی علامات اس مرض میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے

برائے کارب کوئیم، کروٹلس، ایسڈ فاس۔ کلیر یا کارب۔ انا کارڈیم اسکی خاص دوائیں ہیں (۵) عضوی (ORGANIC) مایوسی۔ (رکتہ اور دماغ میں رکتہ)

وغیرہ ہونے سے یہ بیماری کم ہو جاتی ہے) ڈرادر شک ہونا، یادداشت کمزور ہونا۔ دیکھنے اور سننے میں دہم ہونا۔ نصف جسم کا فالج، تشنج، (CONVULSION) اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

(۶) ثانوی مایوسی (SECONDARY) ہر قسم کے جنون کے بعد کی حالت ہے) دماغی کمزوری کم و بیش، قوتِ حوابشات اور یادداشت کمزوری یا عقل اور دماغ کے فعل کا زائل ہو جانا۔ اس مرض کے خاص علامات ہیں۔ بلی بولس۔ اور زکیم اس کی بہترین دوا ہے۔

علاج :- ایسڈ فاس ۶۴-۱۰۰ اپنے ارد گرد کی چیزوں اور انسان کے متعلق لاپرواہ ہو۔ یادداشت کی کمزوری۔ فوراً روکا۔ کمزوری اور دبلا پن مشت زنی کی وجہ سے پیدا ہو مایوسی

ہونا۔ دماغی فکر اور خیالات یکساں۔ اناکار ڈیم ۶: یادداشت کی کمی ہمیشہ قسم کھانا۔ سچتہ توہمات کی وجہ سے احمق ہیں۔
 کوٹیم ۶۔ مایخو لیا کے ساتھ مشت زنی، یادداشت کی کمزوری، خاندان اور کاروبار کے متعلق مایوسی، سونے سے دھواں سڑ، ہلی بورس ۳۳x۔ مایخو لیا کے بعد ہی عقل خراب ہونا (ہلی بورس سے فائدہ نہ ہو تو زکیم ۶۔ دینا چاہیے۔ کروٹلیس ۳۔ رونے کی شکل، قوت حسی اور قوت حافظہ کا کم ہونا اور برداشت کی طاقت غائب۔ بھاگنے کی کوشش۔ بکو اس اور رنجیدہ رہنا۔
 سلیم ٹنگ ۶۔ غفلت، برابر رونے کی خواہش، ہمدردی سے بیماری کی زیادتی، کوسنا، مارنا اور خراب باتوں کے سوچنے کی تیز خواہش، بلا مقصد کام کرنا۔ سب کاموں میں جلد بازی، نجات سے ناامید، مرض کا خیال ہو کہ اسکو کوئی عضوی بیماری ہو گئی ہے۔ جولا علاج ہے۔
 کلکیر یا کارب ۶۔ ۲۰۰۔ مایخو لیا اتنا زیادہ ہو کہ اسکو کسی بات میں اس کا خیال نہ جے۔ سوچ نہ سکے۔ آسانی سے رو دئے سر گھومنا اور بھاری پن۔
 کلکیر یا فاس ۶x۔ سفوف۔ مزاج چڑچڑا۔ موجودہ واقعات بھی یاد نہ رہیں۔ اس پاس کے آدمیوں کو کبھی پہچان نہ سکے یا واقعات سمجھ نہ سکے گھر میں موجود ہو، لیکن کہہ نہ سکیں گے۔ تھوڑی عمر والے اور بڑے پہلے بچوں کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے ایسا کر سکیں ۶۔ معمولی یا پوشیدہ مایخو لیا۔

(۲) مجنونوں کا عام شلل، یا فالج

(GENERAL PARALYSIS OF THE INSANE)

یہ مرض جنون کے دماغ اور اس کے چھٹی کانفرن میں مرض ہے اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ فالج ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت عورتوں کے مردوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ گرتا۔ یا جوٹ لگنا وغیرہ تکان، سردی گرمی وغیرہ اس مرض کے اسباب سابقہ ہیں، فالج کے علامات بعد میں معلوم ہوتے ہیں۔
 علامات اسباب سابقہ: زبان کا پتیا یا آواز نکلتا اپنے کاروبار

اور حنا مذا ان والوں سے مایوسی :- اپنے لئے ہوئے کام کا یا آزمندہ کامیابی کی امید یا ناممکن کام کرتے کا غرور۔ تخیلات (خاص کر بہت زیادہ دولت لئے کے متعلق) دماغی جذبات (جیسے تجربہ خیالی بات سوچنا۔ خیالات وغیرہ کی زیادتی، چال چلن خراب، گندہ رہنا آنکھوں کی پستی قائم یا بے قاعدہ گھومتی رہنا۔

علامات اسباب ثانوی :- فالج کے ساتھ دماغی کمزوری مرض مرگی کے علامات ظاہر ہونا۔ یا کسی اور وقت کا فالج، ہونٹ سے بولے جانے والے (بائٹ، پ) حروف بولنے کی قابلیت کبھی کبھی بول نہ سکتا۔
علامات اسباب ثلاثی :- چلنے کی طاقت نہ رہنا۔ بد بردار۔ یا صاف نہ بولنا۔ دماغی طاقت کا زائل ہونا۔ جسم کے ایک عضلہ یا کئی عضلات کا سُن ہو جانا۔ لیکن بے ہوش نہ ہونا۔ جسم کے ایک عضلہ یا کئی عضلات کا سُن ہو جانا۔ لیکن بے ہوش نہ ہونا۔ دیکھنے میں غلط چیز دکھائی دینا اور نیلے کپڑے پہننا وغیرہ۔

کسی کسی مریض کو فالج (ایک مقام کا یا نصف جسم کا) ہوتا ہے۔ اور زبان بند ہو جاتی ہے اسکے علاوہ کسی کو دوران سر اور مرگی یا سکتہ ہو جاتا۔
علاج

ڈاکٹر ہیوز پہلی حالت میں بہت عرصہ تک بیلا ڈوتا۔ وینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مرض کچھ ترقی کر لے پر جب دماغی علامات کی زیادہ طاقت ہو تو کنائیں انڈیکا کے استعمال کی صلاح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹیل کیٹ اس مرض کے علاج میں ناامید ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر برنس نے پیسم ۲۴ - اور زکیم ۳۰ استعمال کر کر ایک مریض کو شفا دی ہے۔ 'مناسوتا'۔ یونیورسٹی کے ہو میو پیٹھک کالج کے دماغی امراض کے معلم ڈاکٹر ای پی، ولیم سن ایم ڈی۔ حسب ذیل ادویات کا تجربہ کر کے فائدہ اٹھایا ہے۔ انگارکس ۳۰، ۳۰۔ بہت بولنا۔ گانا زیادہ نظم تیار کرنا اور عقیدہ کا کاذبہ کا اتنا غرور نہ ہونا کہ کسی بات کے پوچھنے پر جواب دینے کی فرہست نہ ہونا بلکہ معاملات میں مایوسی۔ عضلات (خاص کر چہرے کے عضلہ) کا سترنا

نیت نہ آنا۔ آرنکاس X- فائر العقل، مایوسی، تخیلات میں اتنا فرق ہونا کہ بہت کہ بات چیت ختم نہیں کی جاتی۔ شک اور ڈر، کمزوری سے یکجہی + سنی سنفیوگا ۱۰، بے چین رہنا، تنہائی کی خواہش، بٹانے کے خیال سے سوال کا جواب دینا، آنکھ اور منہ کے عضلات کا نپٹنا۔ کنائیں انڈیکا X۳۔ جہل باتیں کرنا۔ دماغی جذبات کی زیادتی۔

بلکواس، مریض خیالی چیزیں دیکھنے کو بہت کہتا رہے۔ مریض کی عادت اچھی ہو۔ وقت اور فیصلہ کے متعلق زیادہ بات چیت کرتا ہو۔ آواز زیادہ روشنی برداشت نہ ہو، وراثہ وراثہ X۱۔ بے چین خشکی۔ آنکھوں میں چٹکا چومند ہو جانا۔ فائر العقل، خیالی چیزیں دیکھنا۔ مریض کا خیال ہو کہ اس کو زہر دے کر مار ڈالے گا۔ سر میں انجماد خون۔

ہر قسم کے جنون کا علاج معاون۔ جہاں تک ہو سکے مریض کو اچھی حالت میں رکھنا چاہیے۔ کاروبار بند رکھنا۔ دماغی و جسمانی آرام۔ نہانا۔ جسم کی مالش، بجلی لگوانا مفید ہے۔ مریض اگر یہ بولتا ہو تو تیسار داروں کو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ مریض سے ہمیشہ رحم کا سلوک کرنا چاہیے۔ اصولاً صحت کی پابندی کرنا چاہیے۔ ہلکی زود ہضم غذا دودھ۔ شوربا (اس میں کچھ نمک ملا کر) کچا انڈا وغیرہ اچھی غذا ہے۔ خفیف محنت کرنا۔

(HYPOCHONDRIASIS)

وہم مرآتی

حقیقت میں کسی جسمانی بیماری کے موجود نہ ہونے پر بھی ایسا خیال ہو جانا کہ کم کو کوئی خوفناک بیماری ہوئی ہے اور اسی فکر میں برابر بے چین رہنے کا نام وہم مرآتی ہے۔ دراصل یہ ایک دماغی مرض ہے۔ جسمانی مرض نہیں ہے۔ مریض اپنی تندرستی کے متعلق ہمیشہ فکر مند رہتا ہے اس فکر اور بے چینی کے ساتھ بد ہضمی یا پیٹ کی بیماری لگی رہتی ہے بلکہ معتدین اس کو پیٹ کی بیماری (HYPOCHONDRIASIS) کہا کرتے تھے

بہت عرصہ تک اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد کوئی کوئی مذکورہ بالا مرض میں شامل سمجھتے ہیں۔ والدین کے خاندان میں یہ ہونا بجا معیت سے

درد درہنہ یا جماعت کی زیادتی کی وجہ سے نامردی یا رقت منی نہ ہونا۔
 عیاشی، کابل کی طرح دن کاٹنا۔ تخیلات کو بہت زیادہ کام میں لانا۔
 وغیرہ اسباب سے بیماری ہوا کرتی ہے۔ عموماً شباب یا حیض یا اخراج
 نہ ہونے کی وجہ سے یا کاروبار چھوڑ دینے یا بیوہ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ
 یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور اسکے علامات پہلے کچھ روز بند رہ کر
 یکایک پھر شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بند ہو جاتے ہیں، دل کی بیماری
 نہ رہنے پر بھی کلیجہ دھڑکتا۔ بے ہوش ہو جانا۔ سوچنا۔ پیٹ کی خرابی۔
 اپنے جسم کے متعلق بہت فکر، خودکشی یا دوسروں کو مار ڈالنے کی
 خواہش، درد سر، دوران سر۔ نیند نہ آنا۔ بختہ مالخولیا۔ پیٹ میں آس۔
 بھوک نہ لگنا۔ ڈکار آنا۔ قبض۔ دہلاہن، کی خون وغیرہ علامات ظاہر
 ہونا۔ اسکے بعد استسقاء، اخراج خون، اسہال وغیرہ علامات پیدا ہو کر موت
 آجاتی ہے۔ علامات متذکرہ بالا آہستہ آہستہ ظاہر ہو کر زندگی بھر مرضی کے شیم
 میں موجود رہتے ہیں۔ کسی کو یہ علامات آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں اور

(DR. TESSIER)

بند ہو جاتے ہیں اور پھر ہو جاتے ہیں

علاج :- ڈاکٹر ہیوز ہارٹ میں اور بیر مندرجہ ذیل نو ادویات
 کو اس مرض میں مفید سمجھتے ہیں۔ نکس و امیکا، سلفر۔ اسٹافی سیگرا۔
 نیٹریم میوور۔ کونیم۔ اسٹیم، اگنیشیا۔ آر سنک۔ مرک سول، نکس و امیکا۔
 سلفر۔ سلفر دینہیمی کے علامات میں) اسٹافی سیگرا۔ عرصہ تک تکلیف۔
 نیٹریم میوور (مادہ کی خرابی اور قبض ہو۔)

کونیم :- (بہت عرصہ تک جماع نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری ہونے پر
 اسٹیم :- پیٹ میں بہت درد حرکت سے درد شکم کا بڑھنا،
 اگنیشیا :- دماغی تکلیف کے شدت کی حالت میں تھوڑا۔ ہڈیان ہو۔
 آر سنک الیم، اور مرک سول۔ بہت زیادہ جلیج ہو۔

نکس و امیکا ۳x۶۔ قبض کے ساتھ معدہ کی خرابی میں کام کرنے کی طبیعت
 نہ ہونا۔ گاہے گاہے۔ دماغی حالت خراب، کبھی کبھی تیزی، نیند

نہ آتا۔ دوران سر اور سانس میں تکلیف؛ جسمانی کمزوری (قالج کی طرح) آرم میوور X۲- سفوف :- پریشانی سب کاموں میں جلد بازی، نا اُمیدی۔ رونا۔ چلانا۔ خودکشی کی خواہش، درد سر (بے ہوشی نیند زہنا) آتشک دلدے مریض کے وہم مرانی میں یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔

سمی سیفیو کا X - رقت منی سے پیدا ہوئی بیماری میں۔
بالو سیامس۔ (س)، وہم مرانی سے پیدا ہوئے ایک بات کا جنون۔ (جیسے مریض کو آتشک مانہ ہونے پر ہی وہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے لئے دن رات فکر کرتا ہے۔

کلکریا کارب، ۳۰۔ ۲۰۔ صبح و شام ایک ایک خوراک (مریض خیال کرتا ہے کہ اس کی قوت جس جاتی رہی۔ ڈرنا، دماغی سکون کی کمی، تھکاوٹ معلوم ہونا۔ بے ہوش کرنے والا۔ درد سر، کھینچنے کرنا۔ درحقیقت کلکری میں درد نہ رہتا ہے بلکہ مریض خیال کرتا ہے کہ درد ہے۔ سیٹیم، ۶۔ درد سر کے ساتھ سر گھومنا۔ لیکن نیچے کا جسم ٹھنڈا۔ ہمیشہ قے، درد شکم، تشنج، ناقابل برداشت پریشانی۔ گھومنے سے پیٹ کا درد کم ہوتا۔ لیکن قطوری گھومنے سے مریض تھک جاتا ہو اور آرام کرنا چاہتا ہو۔ لیکن بیٹھتے ہی پھر درد ہونے لگتا ہو۔

اسٹانی سیکریا ۶۔ (ڈاکٹر جون فرماتے ہیں کہ اس بیماری کے کل علامات اس دوا میں ملتے ہیں اور اسی سے اچھے ہو جاتے ہیں، کل علامات میں مایوسی رقت منی، نامردی۔ سلفر بہت زیادہ دماغی پریشانی۔ اپنے کام کاچ تندرستی یا نجات کے متعلق ہمیشہ فکر بے چینی؛ استقلال نہ ہونا۔ اپنے کو ہمیشہ بیمار سمجھنا ہے۔ دنا کارڈیم وری یا نا۔ تحریک اور عصبی کمزوری میں۔ ٹیرم فاسس، چائنا، انارکارڈیم، گرے ٹیولا۔ ٹیکے سبس، ماسکس پیسیا۔ فاسفورس، پلیٹیا۔ ٹیرن ٹیولا۔ ٹپس، ارج ٹائی مرک کی بھی دیمان میں ضرورت پڑتی ہے۔

معاون علاج

گھوننا۔ ملک کی سیاسی قدرت بڑھنے پر (یعنی کو متنا یا علیحدہ رکھنا)

ہمارا رہنا ہے کچھ پہلے عمت اکسرت (خاص کر چھوٹی عمر والوں کے لئے) مریض کو وقتاً فوقتاً سمجھنا چاہئے کہ اس کی بیماری خیالی ہے۔ اہل نہیں ہے۔ جب تاہم، نقلی طریقوں سے مریض کو سلائے کی کوشش کرنا وغیرہ معاون طریقے کام میں لانا چاہئے۔ نظام عصبی کے باب میں دہم مراقی ملاحظہ ہو۔

(DELIRIUM TREMENS)

نشہ کا جنون

جس دماغی مرض میں بہت عرصہ تک شراب پینے کی وجہ سے ہڈیاں نیند نہ آتا۔ اور خاصکر تھیل کا ذیہ دکھائی دے۔ اسی کو جنون سکری۔ یا نشہ کا جنون کہتے ہیں۔ دماغ میں شراب کا زہر پھیل جانا ہی اس بیماری کی جڑ ہے۔ شرابی کی شراب یکایک بند کر دینا۔ جسم کو مقوی بنانے کا ٹھیک بندوبست نہ ہونا۔ دماغی جذبات بڑھے ہوئے جسم میں کوئی بیماری دیکھیں گے کا ورم۔ اسہال، مواد پڑنا۔ کمی خون، رات میں گھومتا۔ چوٹ (جیسے بڑی ٹوٹنا وغیرہ اس کے اسباب محرم ہیں)۔

اس بیماری کے علامات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ معدہ کی خرابی (یعنی، متلی، کھوک کی کمی) نیند نہ آنا۔ غلط دیکھنا، اور گھٹنے پر خوت ناک خواب دیکھنا۔ نیند سے چونکنا۔ پیشاب بند ہونا۔ سوچنے کی طاقت کا کم ہونا۔ یا بالکل غائب ہونا۔ سستی، زبان خشک، بے ہوشی، اگرٹن، ہڈیاں، تمام جسم کا تشنج، اکثر دل کا فعل بند ہو کر موت کا باعث ہوتا ہے۔

علاج :- ڈاکٹر ہیوز فرماتے ہیں کہ اس مرض کا علاج کرتے وقت ڈاکٹر لوگ بیماری آرام، کمرے کے عوض زیادہ تر مریضوں کی جان لے لیتے ہیں، اول درم گھٹانیاوالی دوائیں پھر افیون وغیرہ نیند لانیوالی دوائیں اور اس کے بعد مقوی غذا، ریکریوٹیک ڈاکٹر اس بیماری کا علاج کیا کرتے ہیں۔ اس لئے ہومیو پیتھک معالج کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے۔

(۱) دماغ کی خرابی (۲) معدہ کی خرابی، ان دونوں امورات پر غور کر کے دوا دینی چاہیے۔ ہائیوسیا مس X- (خفیف ہڈیاں) بیلاڈونا (ہائیوسیا کی نسبت تیز ہڈیاں) اسٹرامونیم۔ (بہت تیز ہڈیاں) یتیرن دواں متذکر

بالا علامات کو دبانے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ انٹ مارٹ بہت سرد پسینہ پھینکے گا ورم۔ بلغمی اور مودہ کی خرابی اور آرسنک۔ (مودہ کا ورم نہ بچنی۔ لہر زہ) یہ دوائیں متذکرہ بالا علامات کو دبانے کے لئے مفید ہیں۔ پہلے درجہ کی منتخب دوائیں رات میں اور دوسرے درجہ کی دن میں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ارنیمین ڈاکٹر ویمسن اور اسپنشن ڈاکٹر اولی دے کہتے ہیں کہ ہایوسیا مس، بیلادونا۔ اسٹرامونیم کی نسبت کنابس انڈیکا زیادہ تر مفید ہے۔ مرض کی ابتدا میں مودہ کی خرابی کے علامات میں نکس و امیکا کا X- اور اس کے بعد زنگم اور فاسفورس فائدہ کرتا ہے۔

ہایوسیا مس، ہانڈر و برومٹ $3 \times 4 \times 5$ سفوف (ہر چار گھنٹہ پر) بالکل ہی مفید نہ آنے میں مفید و کارآمد ہے۔

اسٹک نائن نائیٹریٹ $2 \times$ دل کا فعل کمزور اور دوسرے قسم کا پسینہ کمزور۔ ہائی ڈرائسٹس۔ فی خوراک ۳ قطرے (مودہ کے ورم کی پرانی حالت میں کیلی آلودڈ۔ ۳۰۔ مرض آتشک کا زہریلیں میں موجود رہنے پر۔

اوپیم 3×4 ۔ پرانے شرابیوں کی بیماری کی بہترین دوا ہے۔ ورم کے ساتھ آنکھیں نقل اور ڈری ہوئی۔ یا مودہ کی طرح بے ہوشی، ناک کی گہری آواز کے ساتھ سانس کا ٹکنا۔ مرض مرگی کی طرح کے علامات

سلفیورک ایسڈ۔ مودہ کی خرابی اور جبکہ کی پرانی بیماری (مودہ کمزور اور ٹھنڈا ہوتا۔ شراب پینے کی بے حد خواہش۔ بہت بڑی تیز، ابرت رہنا۔ کھٹی ڈکار۔ سانس، کھٹتی تھ، دبلا پن اور سردی نکس و امیکا استعمال کر کے بہت روز بعد یہ فائدہ کرتا ہے۔

آرسنک $3 \times$ بے چین رہنا۔ مودہ کی خرابی۔ پیشاب بند ہونا۔

ہایوسیا مس۔ خفیف بدیان۔ بکواس۔ بلا مطلب کے کبنا نان کے لئے دل، بول زلالی کمی وجہ سے گردہ اور پھیپھڑے کیلئے پیچ پیچ میں پھیپھڑے کا امتحان کرنا چاہئے۔

علاج معاون :- مارفیا۔ کلوریل، بروناٹ ہرگز مریض کو نہ دیا

جائے۔ ایک پیار تیز کالی کافی پلائی جاسکتی ہے۔ شراب بالکل موقوف کر دینا چاہیے۔ مریض کو ایسے کمرہ میں رکھنا چاہئے جہاں آواز نہ پہونچتی ہو۔ مقوی اشیاء (سرخ یا سیاہ مریض) جیسے دودھ، انڈا، تین چار گھنٹہ بند کھلانا چاہئے۔ غسل کرنا مناسب ہے۔ بعدہ کی جلن کے لئے خوب گرم پانی یا سوڈا واٹر کے ساتھ برف کے ٹکڑے ڈال کر پلانا چاہئے۔ پیشاب بند ہونے پر گرم پانی سے سینکنا چاہئے۔

چند دماغی علامات اور ان کی دوا میں

جسم ٹوٹا ہوا اور مایوسی۔ جلس۔ بہت لے چینی اور موت کا خوف۔ سیکیل بہت غلوں غلوں کرنا۔ بیلڈوٹا۔ ساکیوٹا۔ زیادہ محسوس کرنا۔ بوجیس کافیہ انگیشیا و صیان نہ دینا۔ کنابس انڈیکا۔

تکلیف یا جمود۔ یعنی جسمانی اور دماغی فعل کا کچھ دیر بند رہنا۔ اوپیم۔ ان کارڈیم۔ ایڈپرک۔ کلکیر یا فاس۔

بیقرار دل۔ آرم۔ براٹھا کارب چڑچڑاہٹ اور بے وقوفی۔ پلاٹینم۔ کیموٹا۔ خودکشی کی رغبت۔ آرم مٹ۔ آرم میور۔ آرمج نائی۔ کیلک۔ نکس و امیکا۔

عشق کے بارے میں بہت بات کرنے کے علامات میں:-

اسٹانی سیگرا یا حمد۔ ہایوسیا مس۔ یکے سس۔ اپیس۔

تکلیف۔ ایکونائٹ۔ آرم۔ فاسفورس۔ سلفر

مایوسی۔ لٹنا۔ ایڈ فاس۔ سیپیا۔ کاربورج۔

جنون۔ آرم۔ بیلڈوٹا۔ الی یوسیا مس۔ اسٹراٹو۔ لانگو۔ ورے و زنگم۔

جنوں یکا یک ہونے پر۔ ورے الہم۔ کنابس۔ انڈیکا۔ ہایوسیا مس۔

جنوں زچہ کا دوج مفاصل۔ بیلڈوٹا۔ کنابس۔ انڈیکا۔ سی سفیوگا۔ ہایو۔ اسٹراٹو۔

جنوں۔ ایک خاص بات میں۔ کنابس۔ انڈیکا۔ ہایوسیا مس۔ ساکیوٹا۔

جنوں مجامعت کینتھرس۔ پلٹینا۔ ہایوسیا مس۔ ایڈپرک۔ فاسفورس۔

جنوں مذہبی۔ ہایوسیا مس۔ سلفر۔ ورے ایلپ۔ یکے سس۔ آرسنک

جنوں ہونے کا ڈر۔ ایکونائٹ۔ سی سفیوگا۔ پلمبر۔

بد معاشی۔ پلاٹینا۔ سلفر۔ لائگو۔ ورے ایلپ۔

بات ذکر نا خاموش رہنا۔ ایسڈ فاس۔ سلفر۔ پلس ورے ایلپ
غصہ سے پیدا ہوا مرض دہاں تک کہ یرقان ہونے پر کیو ملا۔
خام خیالی مزاج۔ کیو ملا۔ اسٹانی۔

چڑچڑا مزاج۔ آرام۔ سائنا۔ سلفر۔ ایلیمینا۔ سٹے فس اگر یا۔

بدلہ لینے کی طبیعت۔ آرج نائی۔ نکس برک۔ ہایوسیا مس۔ یکے سس۔
جھگڑا لو یا غیر مہذب۔ ہایوسیا مس۔ جھگڑا مزاج۔ سلفر۔ پلس و امیکا۔ آگنیشیا۔
تکلیف کے ساتھ آنسو بھری آنکھیں۔ پلس۔ لیم۔ سیپیا
گانے بجانے سے تھو جا۔

رات بھر رونے میں۔ انڈگو۔

استقلال کی کمی۔ انا کارڈی ایم۔ ہلی یورس۔ ایسڈ فاس۔

اپنی زندگی کو لعنت ملامت کرنا۔ آرام۔ انٹم کروڈ۔ چائنا۔ فاس۔ تھو جا۔
نا امیدی۔ آرج نائی۔ آرام۔ سورا ئی نم۔

نا امیدی، بیماری، آرام ہونے کے متعلق۔ راس۔ سورا ئی نم۔ کیلک۔

ہڈیان۔ تیز ہڈیان۔ جسے کاٹنے دوڑنا۔ جسم پر بھوک دینا۔ شور و نل کرنا۔
یا عشق کے متعلق بکواس۔ ایکے۔ ہایوسیا مس (بکواس یا زور سے چیخنا۔

بہت تیز یا غصہ بھرا ہڈیان۔ اسٹرمونیم۔ ورے ایلپ۔ ٹیمیشیا۔ زنگم۔

جلد باز۔ جلد جلد کام کرنا ناقابل برداشت ہڈیان۔ ایسڈ سلف۔ بکواس۔

بیلاڈونا۔ اسٹرمونیم۔ یکے سس۔

نفرت کرنے والا۔ کیو پریم۔

خوب نمود کرنا۔ ایکو نائٹ آرج۔ وراٹرم ایم۔ سلفر۔ یکے سس۔ رشا کس

پلمیم۔ نیٹرم میور۔ پلٹینا۔ کلکریا کارب۔

پریشانی سمجھ کی زیادتی۔ عقل میں گھبراہٹ۔ باگل پن کے علامات۔ آگنیشیا۔

قوت حافظہ کی کمی۔ براٹا کارب۔ ایسڈ فاس۔

خوف۔ ایکو نائٹ۔ آرج نائی۔ آرس۔ آگن۔ سوراٹم۔

- خوف اندھیرے میں۔ اسٹرا مونیم۔ درے ایلپ۔
 جنوں ہونے کا۔ ایکون۔ سیسی سفیوگا۔ لیم ٹمک۔
 اکیلے جانے میں۔ آرج لائگو۔ فاسفورس۔
 موت کا۔ ایکونائٹ۔ آرس۔ پلاٹینم۔
 بھڑ میں جانے سے۔ ایکونائٹ۔ پلاٹینا۔
 اڈے گرنے سے پہلے۔ ایلپس۔
 آسانی سے بزدل۔ آرج نائی، بوریکس۔
 کی وجہ سے کوئی بیماری ہو۔ ایکونائٹ۔ اوپی۔ لیکن اگر ڈر کی وجہ سے کوئی
 عصبی بیماری ہو تو (جیسے مرگی۔ ارتعاش) (درعشہ) تو گنیشیا دینا چاہئے۔
 توہمات باطلہ۔
 نامکن ناقابل تسخیر۔ کنابس انڈیکا۔
 گویا کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہو تو جاری ہو۔ ایکون کاربو۔ ٹرن ٹیولا۔
 چوہے پیننگے وغیرہ کے متعلق۔ اسٹھوزا۔ سیسی سفیوگا۔ میڈورنیم۔
 کتے کے متعلق۔ کملک۔ اسٹرا مونیم۔ بیلڈونا۔ (سیاہ کتا)
 کیڑے مکوڑے کے متعلق۔ آرج۔ بیلڈونا۔ اسٹرا مونیم۔
 جلد بازی کا۔ اسٹرا مونیم۔ بیلڈونا۔ ایوسیا مس۔
 بابت جاندار چیزوں کے۔ بیلڈونا۔ ایوسیا مس۔ اسٹرا مونیم۔ اوپیم تھو جا۔
 بابت کیڑے وغیرہ کے (جیسے ٹکڑا۔ خواہ صورت معلوم ہو) سلفز۔
 بستر پر مریض کے ساتھ گویا سویا ہے۔ بیٹیشیا۔ پلس۔
 سیاہ بلی کے متعلق۔ بیلڈونا۔ اسٹرا مونیم۔ آرس۔ او۔
 کام کاج کی جلدی بازی کے متعلق۔ فاسفورس۔
 بھوت پریت کے متعلق۔ بیلڈونا۔ اسٹرا مونیم۔ آرس۔ اوپیم۔ کاربو وچ۔
 گویا پاگل ہو جائے گا۔ لیم ٹمک۔ سیسی سفیوگا۔
 گویا ہر قسم کی بیماری ہو جائے گی۔ آرم میور۔
 گویا اب مرض اچھا نہ ہوگا۔ آرج نائی۔

تو بہات بالہ۔ مریض کا جسم گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ہڈیاں۔ مچھلی۔
 ” مریض آنکھ بند کرنے پر بھی گویا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کیلک
 ” کوئی مریض، بے عزتی کر رہا ہے۔ آرج نائی۔
 ” مریض کو کوئی تکلیف دے رہا ہے۔ چائنا۔
 ” گویا مریض مر گیا ہے۔ اسٹرا مو نیم۔
 ” مریض کا جسم گویا شیشہ کا بنا ہے۔ تھو جا۔
 ” شراب پینے کی وجہ سے دماغی علامات نکس و امیکا۔ اسٹرا مو نیم۔ ہیلڈونا
 ” ہڈیاں لہکے ساتھ بستر نوچنا۔

دل کی بقراری۔ ایکونائٹ۔ آرج نائی۔ مرک سول۔ اسٹینم
 دل میں جوٹ لگنے کی بات۔ ایکونائٹ۔ اگنیشیا۔ ایسٹ فاس۔
 دماغی بیچینی۔ ایکون۔ آرج کمیو۔ کافیہ۔ ہایوسمی سی۔ اگنے۔ فاسفو۔ اسٹرا نیم۔
 بے ہوشی۔ آئی نینتھس۔ ایپس۔ ہلی بورس۔ ہایوسیا مس۔ ہایوسیا مس۔ زنگ میور۔
 ایسا معلوم ہونا کہ پاگل ہو رہا ہے۔ لیم۔ ہینا۔ کیتھرس۔ بہت تیز اور جوار کے
 متعلق جنوں مریض کے دودل۔ جیسے عقل نیک اور عقل بد دونوں پر قبضہ
 کئے ہیں۔ ایک کہتا ہے۔ یہ کام کرو۔ دوسرا کہتا ہے نہ کرو۔ اس علامت میں انکارڈیم۔
 لوگوں کے ساتھ رہنے کی خواہش۔ لائیکوپوڈیم۔

لوگوں کا ساتھ چھوڑنے کی خواہش۔ نیٹرم میور۔
 غم سے پیدا ہوا۔ خاص کر دماغی تکلیف دہا رکھنے کے بعد کوئی دماغی مرض
 ہونے پر اگنیشیا۔ لیکن بہت عرصہ تک رنج میں ڈوبے رہنے پر اور اسی وجہ سے
 جسم ماؤف ہونے پر ایسٹ فاس۔

بے ہوش ہونے پر کناس انڈیکا۔ ہایوسیا مس۔ زنگ میور۔ ہلی بورس
 دماغی تکلیف ہمیشہ بدلتے رہنے پر ایسا محسوس ہو کہ کوئی جاندار چیز میٹ
 میں گھوم رہا ہے۔ (اکروکس۔ ڈیجیٹلس) (تکلیف اور درد سے گھبرانے پر)
 شکی ہو سلفر۔ اسٹرا مو نیم۔ سیکیل۔ کناس۔ انڈیکا۔ ہایوسیا مس۔ نیلے سس۔
 شرمندگی۔ برائٹا۔ اسٹن۔ اسٹن فائی سیگہ یا۔

ایک خوراک سلفر ۳۰ دینا چاہئے۔ سلفر کے بعد کلکریا کارب ۶۔ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اگر پارہ اور سلفر دونوں کا غلط استعمال ہوا ہو تو بیلڈونا ۶۔ پلس ایلڈا ۶۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی اونچے طاقت کا مرکب ریس بھی دیا جاسکتا ہے۔ پارہ کے استعمال سے خراب خون ہو کر تمام جسم اگر خراب ہو گیا ہو تو ہیرس۔ ایسافٹڈ۔ آرم مٹ۔ چائنا۔ کیونینٹیس۔ آیوڈ۔ کیلی آیوڈ یا مزیم دیا جاتا ہے منہ کا اندرونی حصہ یا مسوڑھوں پر مرض کا حمل ہوا ہو یا بہت زیادہ رال گرتی ہو تو کاربووج۔ ڈلکار۔ ہیرسلفر۔ نائٹرک ایسڈ۔ اسٹے فی سیگریا۔ سلفر۔ چائنا۔ آیوڈ۔ نیٹرم میور۔

پارہ کے استعمال سے گلے میں زخم ہو تو بیلڈونا۔ کاربووج۔ ہیرسلفر۔ لیکس۔ اسٹے فی سیگریا۔ سلفر۔ آرم مٹ۔ لائیکو۔ نائٹرک ایسڈ۔ تھوجا۔ عصبی تحریک میں کاربووج۔ کیموٹا۔ ہیرسلفر۔ نائٹرک ایسڈ۔ پلس عصبی کمزوری میں چائنا۔ ہیرسلفر۔ لیکس۔ کاربووج۔ نائٹرک ایسڈ۔ یا تبدیلی موسم وغیرہ میں مذکورہ بالا علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ کاربووج۔ چائنا۔ پارہ استعمال کرنے سے وجع مفاصل ہو۔ کاربووج۔ چائنا۔ ڈلکار۔ گوئیکم۔ ہیرسلفر۔ لیکس۔ فاسفورک ایسڈ۔ پلس۔ سارسا پرلا۔ سلفر۔ آرنا۔ بیلڈونا۔ کیموٹا۔ کلکریا کارب۔ لائیکو پوڈیم۔

پارہ کے استعمال سے بڑی کے اندر درد۔ یا بڑی میں زخم۔ وغیرہ علامات میں۔ آرم مٹ۔ فاسفورک ایسڈ۔ ایسافٹڈ۔ کلکریا کارب۔ ڈلکار۔ لیکس۔ لائیکو پوڈیم۔ نائٹرک ایسڈ۔ سلکا۔ سلفر۔ جسم کی گلیٹیوں یا پٹھے کی علامت۔ آرم مٹ۔ کاربووج۔ ڈلکار۔ گریفائٹس۔ نائٹرک ایسڈ۔ سلکا وغیرہ۔

پارہ کے استعمال سے زخم ہونے میں آرم مٹ۔ بیلڈونا۔ کاربووج۔ گریفائٹس۔ ایکس۔ نائٹرک ایسڈ۔ سارسا پرلا۔ سلکا۔ سلفر۔ تھوجا۔ پارہ کی وجہ سے استسقا وغیرہ علامات میں چائنا۔ ڈلکار۔ ہلی بورس۔ سلفر۔ کل دوا میں ۶۔ ۳۰۔ طاقت کی دہنی چاہئے۔

۲۔ کونین

جس طرح پارہ کھانے سے اس کے زہریلے اثرات جسم سے جلدی نہیں نکلتا۔ وہی حالت کونین کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔

آرنیکا۔ آرنیکا، بیلارڈونا، کلکیریا۔ فیرم۔ اپیکاک۔ بیکس۔ مرکوریس۔
پیس۔ وریٹرم۔ وریٹڈ۔ کیپ سیکم۔ کاربوونج۔ سائنا۔ نیٹرم میوورسپیا۔ سلفر
وغیرہ کے استعمال سے جسم سے کونین کا زہر نکل سکتا ہے۔

اپنی کاک۔ کونین کے خراب نتیجہ کے دور کرنے کی یہ خاص دوا ہے۔ اس کے
بعد پس کھانا چاہئے۔ خاصکر حسب ذیل علامات میں کونین بخار یا ملیریا بخار
دب جانے کے بعد کان یا دانت میں درد سر بخاری جسم میں درد ہو۔

آرنیکا۔ وجع مفاصل، ہاتھ پیر میں بوجھ معلوم ہونا اور درد۔ حرکت کرنے
بات کرنے یا کان میں آواز جانے سے درد کا بڑھنا۔

آرنیکا۔ ہاتھ پیر میں زخم پیر میں سوجن خشک، کھانسی، اور سانس
میں تکلیف۔ بیلارڈونا۔ سر میں غیر طبعی طریقہ سے خون جمع ہونا۔ اور چہرہ گرم
سر۔ چہرہ اور دانت میں درد۔ مرکز کی کھانے سے یرقان نہ اچھا ہو تو بیلارڈونا
دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کلکیریا کارب۔ سر جکڑا ہوا کان میں درد۔ دانت میں
درد۔ تمام جسم میں درد۔ بخار دب جانے یا پس سے فائدہ نہ ہونے پر۔
سڈن۔ کونین یا چائنا کے غلط استعمال کی وجہ سے کان میں بھوں بھوں
آواز ہونا۔ یو کے پیٹس۔ کونین کے غلط استعمال سے سر جکڑا رہنا۔
کان میں بھوں بھوں آواز ہونا اور انفلوئنزا یا زکام ہونے کے پہلے
جسم خراب رہتا ہے۔ ویسا ہار ہنا۔

فیرم۔ پیر میں آماس۔ پیس۔ کان میں درد، دانت میں درد۔ سر میں درد۔
کونین کے بخار بند ہونے کے بعد عضویہ مخصوص میں درد۔

لیکس۔ کونین سے بخار دبا دینے کے بعد اور پیس سے فائدہ نہ ہونے پر
مرکوریس۔ جگر۔ خاصکر یرقان، یا مرض تلی میں۔

نیٹرم میوور۔ کونین کے غلط استعمال کی وجہ سے برابر بھکی آتی ہو۔ کونین سے

بخار یا ملیر یا دب جانے پر، ورائٹرم جسم سے پسینہ نکلتا ہوا اور سرد ہو۔
قبض یا اسہال، کونین سے بخار فوراً بند ہو جانے پر، آرٹیکا، آرس،
کلکیر یا بیلڈونا، کاربووج، سائنٹا، فیرم فاس، اپیکاک، ایکے سس،
مرکیورس، پلس، سلفر جب کونین دینے کے بعد بھی بخار رہے تو پہلے اپیکاک
بعد آرس، کاربووج، ایکے پلس، آرٹیکا، سائنٹا، یا ورائٹرم اور آخر میں کلکیر یا
مرکیورس، بیلڈونا اور سلفر دینا چاہیے۔

یہ سب دوا میں ۶-۳۰ طاقت کی دینی چاہیے۔

(۳) سنکھیا (ARSENIC)

سنکھیا استعمال کرنے سے زہر پھیل جائے تو پہلے (STOMACH PUMP) کے ذریعہ سرسوں کو پسکریا یا کتیرا رینڈی کا تیل یا کوئی دوسری تے کرانیوالی دوا کھا کر مودہ کو صاف کر دینا چاہیے یا اس کے بعد انڈے کا سفید حصہ یا براڈمی یا کوئی دوسری محرک دوا کھلانی چاہیے۔

خوفناک علامت دب جانے پر اپیکاک ۳۰، اسکے بعد چائنا ۳۰ یا کس
وامیکا ۱-۲ دینا چاہیے (زہر کھانا ملاحظہ ہو)۔

(۴) افیون (OPIUM) یا مارفیا

زیادہ مقدار میں افیون کھانے سے زہر پھیل جانے پر اسٹمک پمپ
(STOMACH PUMP) کے ذریعہ یا سرسوں پیس کر کھلا کرتے کرانا چاہیے
اسکے بعد بے ہوشی دور ہونے پر اپیکاک ۱-۲ جلد جلد دینا چاہیے۔
اگر اپیکاک کھلانے سے بھی کچھ فائدہ نہ ہو تو نکسوامیکا ۱-۲۔

مرکیورس ۳۰ یا بیلڈونا ۳۰ یا ایکٹک الیٹڈ ۳۰ دینا چاہیے۔ اپو مارفیا
نام کی دوا کبھی نہ کھلائی جائے۔ حادثات کے باب میں زہر کے مقدار میں افیون کچھ
روزانہ افیون کھانے والے اگر افیون چھوڑ دیں اور اس وجہ سے جسم
میں سستی مودہ ہو تو ایوانا سٹیا ۱-۲ یا پنج قطرے تین مرتبہ روزانہ استعمال
کرنا چاہیے۔ (اگر ۱۲) سے بھی فائدہ نہ ہو تو کمیو ملا ۶-۷ یا ۳۰۔ یا
کناس انڈیکا ۱-۲ دینا چاہیے

افیون یا مارفیا کھانے کی عادت ہو تو اس کو چھوڑنے کیلئے بھی ایوانا اچھی دوا ہے۔ روزانہ افیون کھانے والے کو نصف چھٹانک گرم پانی میں دس قطرے ایوانا۔ دن میں دو مرتبہ کھلانے اور افیون کی خوراک آہستہ آہستہ گھٹانے پر تکلیف نہیں ہوتی۔ افیون چھوڑنے کے بعد ہر کچھ دنوں تک ایوانا کھلاتے رہنا چاہیئے۔ خوب گرم یا ٹھنڈے پانی سے ہبانا فائدہ مند ہے۔

(۵) کوکین (COCAINISM)

یہ دکن امریکہ کے کوکونامی درخت کے پتے سے بنا ہوا ایک قسم کا نمک ہے۔ آج کل اس ملک میں کوکین خوب رواج پکڑ رہی ہے۔ شراب کی طرح یہ بھی محرک ہے اس سے جسم کی تمام تکان تو دور ہوتی ہے۔ لیکن مقدار نہ بڑھانے سے کوکین کھانے والوں کو سیری نہیں ہوتی۔ عرصہ تک اس کو کھاتے رہنے پر، بھوک نہ لگنا۔ چہرہ زرد۔ آنکھیں گڑھے میں دھنس، نیند نہ آنا۔ یادداشت کی کمی؛ ایسا محسوس ہونا کہ جسم پر کیڑا رہینگا ہے۔ دماغی طاقت کا گھٹنا۔ اخلاق سے گریزا۔ تخیلات یا غلط چیزیں دیکھنا برابر کوکین کھانے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں موت تک ہو سکتی ہے۔

علاج :- (بالکل رفتہ رفتہ نہیں) کوکین کھانا چھوڑ دینا چاہیئے۔ کوکین کے بعد سستی دور کرنے کے لئے کافی الکحول۔ ایمنونیا۔ آکسیجن وغیرہ محرک دوائیں فائدہ دیتی ہیں۔ اگر تشنگ ہو تو کلور و فارم دینا چاہیئے۔ اسٹرکینیا اور ڈیجیٹالیس کی بھی اکثر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر لورک کا بیان ہے کہ جاس اس کے زہر کو دور کرنے کی اچھی دوا ہے۔ جیس ۱-۳۰۔ ۳۰۔ کچھ دنوں تک استعمال کرنے سے اس کی خرابی دور ہو سکتی ہے (PELLE) کا بیان ہے کہ دست آور (PURGATIVE) دوا کھانے سے اس کا زہر جسم سے نکل جاتا ہے۔ مقوی اور زود ہضم غذا دینا چاہیئے۔

(۶) شراب کے بد اثرات (ALCOHOLISM)

روز پینے والوں کو اگر شراب چھوڑنے کے بعد شراب پینے کی بہت خواہش ہو تو چائنا۔ یا ایوانا۔ اسٹرےپنیٹکس کی خوراک ہفتے روزانہ

تین بار یا کالی کافی پلانا چاہیے۔ اس کے بعد نکس و امیکا x۱۔۳۔ سلفر ۲ دینا چاہیے
کشمش؛ منقہ؛ سنترہ؛ وغیرہ کھانا مفید ہے۔ بہت عرصہ تک
شراب پینے کی وجہ سے جنون ہو تو نشہ کا جنون؛ باب ملاحظہ ہو۔

(۷) شہد

اگر شہد زیادہ استعمال ہوا ہو تو پہلے اسپرٹ کیمر یا کافور سو نگھنا
چاہیے۔ گرم چائے یا کالی کافی پلانا چاہیے۔

(۸) تمباکو (TOBACCO)

زیادہ تمباکو کھانے سے آنکھیں؛ اعصاب؛ معدہ یا گلے کا درمیانی حصہ
اگر ماؤف ہو جائے تو تمباکو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور روز نکس و امیکا x۱۔۳؛ یا
اسپرٹ کیمر استعمال کرنا چاہیے۔ تمباکو کھانے سے اگر اچھی طرح دکھائی
نہ دے (یا رات میں روشنی دھندلی معلوم ہو) تو فاسفورس ۳۔ تمباکو کھانے
سے بد بھنی ہونے پر نکس و امیکا x۳۔ تپاک قلب ہو تو سپانی جلیا ۳۔
تمباکو نوشی کی وجہ سے گلے میں زخم ہونے پر کلکیر یا فاس سفوف ۳۔
تمباکو نوشی روکنے کے لئے چائنا ۳۔

(COFFEE)

(۹) کافی کے زہریلے اثرات

کافی پینے کی وجہ سے من بیماری میں کیو ملا ۶۔ نکس و امیکا ۳۔ اکنیشیا ۳۔
مرکوریس ۳۔ نکس و امیکا یا سلفر ۶۔ استعمال کرنا چاہیے۔

(TEA)

۱۰۱ چائے پینے کے زہریلے اثرات

زیادہ چائے پینے سے بہت دانوں تک چائے پیتے رہنے سے عموماً حسب
ذیل علامات دکھائی دیتے ہیں بہت بے چینی؛ عصبی کمزوری؛ ہاتھ کانپنا
درد سر؛ دوران سر۔ دل دھڑکنا وغیرہ چائے کے غلط استعمال سے
پیدا ہونے والی علامات کی فیسرم ۶۔ ایک اچھی دوا ہے پُرانے چائے

مغربی سامنس دانوں نے آزمائش کر کے یہ رائے قائم کی ہے کہ چائے
اور کافی میں ایک تیز الہی چیز ہے جسم میں اسی چیز کے داخل ہونے سے
وجع مفاصل ہونے کا بہت زیادہ خوف رہتا ہے۔

پینے والے کو اگر نیند نہ آوے، دل کی بیماری ہو، تپکن ہو، بد ہضمی وغیرہ
 ہو جائے تو تھیا ۳۳۔ پیر میں تشنج ہو۔ کھوڑی غذا ابھی برداشت نہ ہوتی ہو
 تو چائنا ۳۳۔ زیادہ مقدار میں چائے پینے کی وجہ سے نفخہ، شکم ہو۔ اور عصبی
 کمزوری ہو تو کھو جا۔ زیادہ چائے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے علامات دور
 کرنے کیلئے کھو جا ۳۰۔ ۲۰۰۔ ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔
 دوسری دوا میں سلینی ۶۔ کافیا ۶۔ بیکس ۶۔ وراٹرم کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔

(۱۱) برف۔ کلہی۔ یا آئس کریم وغیرہ

ان کے غلط استعمال سے ہاضمہ کے فعل میں نقص پڑتا ہے۔ اور پیٹ پھولتا
 ہے۔ اور تپتی ہوئی ہے۔ برف یا برف کا پانی پینے کے بعد کی بیماری میں
 کاربو و ج ۶۔ آئس کریم کے کھانے سے جو بیماری ہو، اس میں آرس ۶۔
 دھوپ میں گھونسنے، آگ کے سامنے رہنے دیا کسی دوسری وجہ سے جسم
 خوب گرم ہونے پر بہت لوگ برف یا برف کا پانی پیا کرتے ہیں۔ اس سے
 جسم پر (خاص کر چہرہ پر) ERUPTIONS) دانے نکل آیا کرتے ہیں۔
 بلیس پر دس اش، اچھی دوا ہے۔

چند دوسری دواؤں کا غلط استعمال ہونیکی حالت میں

- ۱۱) بروڈلڈ آف پوٹاس کے غلط استعمال ہونے میں۔ بیلونیس ۴۔
- ۱۲) کیمفر کے غلط استعمال میں کینتھ ۶۔ کافیا ۳۔ اوپیم ۳۔
- ۱۳) کلورل کے غلط استعمال میں کنابس ۴۔
- ۱۴) کلورل آف پوٹاش کے غلط استعمال میں۔ ہائیڈرائسٹس۔ مدرٹنیکر
- ۱۵) کاڈیور آئیل کے غلط استعمال سے ہیپر سلفر ۶۔ پدساٹیل ۲۰۰۔
- ۱۶) اچار پیٹنی کے غلط استعمال سے نکس وائیکا ۳۰۔ لائیو پوڈی ایم
- ۱۷) ڈبھی ٹیلس کے غلط استعمال سے نائٹریک ایسڈ ۶۔
- ۱۸) کل گرم دواؤں کے غلط استعمال سے نکس وائیکا ۳۰۔ ۳۔
- ۱۹) آرگٹ کے غلط استعمال سے، ہیپر ۶۔ ہائیڈرائسٹس ۴۔ فاس ۳۔
- ۱۰) آلوڈ کے غلط استعمال سے چائنا بیکس ۶۔ امیکا۔ سورائی نم۔ ۳۰۔

- (۱۱) لوہے سے بنی دوا کے غلط استعمال سے ہیر ۶ پلس ۳۔
- (۱۲) سیسہ (پلمبم) کے غلط استعمال سے اڈیم x_1 ؛ ایلیوم x_2 ؛ کیلی آئوڈ۔ مارٹنجر۔ ایسٹ سلف x_3 ۔ (قرینج سیسہ) دیکھئے۔
- (۱۳) آر جنٹم مٹ کے غلط استعمال سے نیٹرم میور۔ ۳۰ نکس و امیکا۔
- (۱۴) آر جنٹم نائیٹریٹ کے غلط استعمال سے نیٹرم میور۔ ۳۰۔ آرس ۳۰۔ آئیوڈ ۶۔
- مرک ۶۔ دودھ نمک۔ کالی میور یا ٹیکم ۲۰۰۔
- (۱۵) فاسفورس کے غلط استعمال سے بیکس ۶۔ سلفر۔ کیفیر۔
- (۱۶) نمک کے غلط استعمال سے نائیٹریٹ اسپرٹ۔ ڈل سس ۳۰۔ آرس ۳۰۔
- (۱۷) اسٹرامونیم (دھتورا) کے غلط استعمال سے ٹاکم ۳۰۔ نکس و امیکا۔
- (۱۸) اسٹرنٹین کے غلط استعمال سے؛ یو کلیٹس ۴۰۔ کیلی برزم ۴۰۔
- (۱۹) شکر کے غلط استعمال سے نیٹرم فاس x_4 ۔ سفوف۔ آر جنٹم ٹیالیکم۔
- (۲۰) چھوٹی عمر میں تبا کو نوئی کے علامات میں۔ آرج نائی ۲۔ آرس ۶۔ ورے ایلب ۶۔
- تبا کو دیکھئے؛ ڈی ایم۔ ایک ہزار طاقت کا ایک خوراک۔
- (۲۱) تاریخین کے غلط استعمال میں بیکس ۱۲۔
- (۲۲) ادویات نباتاتی (VEGETABLE DRUGS) کے غلط استعمال میں کیفیر ۴۰۔ نکس و امیکا x_1 ۔ ۳۰۔
- (۲۳) ور اثرم کے غلط استعمال میں کیفیر ۴۰۔ کافیا ۳۰۔ سلفر ۲۰۰۔
- (۲۴) کیلی آئیوڈ (SODIDE OF POTASH) کے غلط استعمال میں ہیر سلفر ۶۔ ۲۰۰۔
- (۲۵) بے ہوش کرنے والا (ANÆSTHETIC) دھواں سانس کیا فتح جسم میں جانے پر۔ ایٹک ایسڈ ۳۰۔ ہیر ۶۔ فاسفورس ۳۰۔ کھانا اور این نائی ۴۰۔ سو نگھنا۔
- (۲۶) گیس لکڑی کا ٹوٹا وغیرہ۔ دھوئیں کی خرابی ایون کارب ۳۰۔ آر لنکا ۳۰۔
- بووسٹا ۳۰۔ کاربووج۔ سلفر نکس و امیکا۔ ڈبی ٹلس۔
- (۲۷) نشیلی دوا سے نیند آکر در دم ہوتا ہوا۔ ایٹک در دم ہوتا ہوا۔
- ایٹک ایسڈ ۳۰۔ اسے پو مارفیا ۳۰۔ کتابیں انڈیکس ۴۰۔ ہیر سلفر ۴۰۔ کیفیر نکس و امیکا۔
- (۲۸) تانبے یا پیتل کے برتن میں کھانا بنا کر کھانے کے بعد جسم گرم معلوم ہو یا

(۲۸) زہر ہو جائے۔ ہیرس، بکس و امیکا۔ سلفر۔ پلساٹیل
(۲۹) سرمر کے (ANTIMONY) غلط استعمال سے پیدا ہوئے علامات میں
ہیرس ۳۔ مرک ۲۰۰۔ کیلک کارب ۳۰۔
(۳۰) کلوروفارم (CHLORO FORM) کے استعمال سے پیدا ہوئی علامت میں
ایمل نائٹرک، سونگھنا۔ کیفربکس و امیکا۔

(۳۱) استھیر کے غلط استعمال سے پیدا ہوئے علامات میں مریض کو آرام سے لٹانا
چاہیے۔ اور ایمل نائٹریٹ سونگھنا۔ اور کوئین۔ بل۔ اسٹراکناٹن کھلانا چاہیے۔
(مفصل حالات کے لئے مقصد دب، ملاحظہ ہو)

تیسرا باب

امراض زنان یا اناث

دیباچہ

عورتوں کی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے ناظرین کو عورتوں کے آلات تناسل
کے بارہ میں مندرجہ ذیل باتیں یاد رکھنا چاہئیں۔

۱۔ عورتوں کے پیٹرو میں مثانہ اور مہرنہ کے درمیانی جگہ کو رحم (UTERUS)
کہتے ہیں۔ رحم کو بچہ دانی بھی کہتے ہیں۔ یہ خالی تھیلی کی طرح چیز ہے۔ اس کی شکل
امرو دیا ناشپاتی کی طرح ہے۔ اسی رحم سے جوف میں حمل نوماہ تک رہتا ہے۔
یہ مربوط کی طرح بڑھتا اور سکڑتا ہے۔ اس کے اندر رٹ کا جب
بڑھتا ہے تو یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور رٹ کا پیدا ہو جانے کے بعد پھر اپنی اصلی
حالت میں آ جاتا ہے اس کے بالائی حصہ کو قعر رحم۔ (لینی رحم کی) (FUNDUM)
گہرائی کہتے ہیں۔ دیرین حصہ بہت پتلا ہوتا ہے۔ اس کو گردن رحم (CERVIX) کہتے
ہیں۔ گردن رحم میں ایک سوراخ ہے۔ اس کا نام دہانہ رحم (os) ہے۔ قریب
میں اپنی لمبی ایک فیڑ بھی سرنگ گردن رحم کے چاروں طرف جڑی ہے۔ اس کو
فرج (VAGINA) کہتے ہیں (۲) رحم کے دونوں طرف ایک ایک لمبے بادام کی
شکل کے دو عضو ہیں۔ ان کو خضیتہ الرحم (OVARIES) کہتے ہیں۔ ہر ایک خضیتہ الرحم

میں سرسوں کی طرح چھوٹے چھوٹے دیش میس بیضہ منی (عورتوں کے اندھے)
(OVUM) کہلاتے ہیں۔

(۳) قعر رحم میں دونوں طرف دونائیاں رتین ارنچ لمبی لگی ہیں جو پھیل کر
رحم کے ساتھ خصیتہ الرحم کو ملا دیتی ہیں۔ اسکو یوقان (FALLOPIAN TUBES)
یا بیضہ منی جانے والی نلیاں کہتے ہیں (تصویر نمبر ۱ ملاحظہ ہو)۔

حیض :- عورتوں کی جوانی میں جب حواس پختہ ہو جاتے ہیں اسوقت خصیتہ
الرحم سے انڈا نکلا کرتا ہے۔ اس وقت خصیتہ الرحم سے یوقان اور رحم میں زیادہ
خون پیدا ہو کر خون نکلتا ہے۔ اسی کو حیض یا ماہوار می کہتے ہیں جو وہ برس
سے پینتالیس برس کی عمر تک عورتوں کو اٹھائیس روز وقفہ دیکر ماہوار می
ہوا کرتا ہے ہمارے منہ میں جس طرح سرخ، نرم جلد ہے، ٹھیک اسی طرح سرخ
رنگ کی جلد رحم کے اندر بھی موجود رہتی ہے۔ قریب اٹھائیس دن میں رحم کی
اس جلد کی کھال بدل جایا کرتی ہے ہر دفعہ کھال بدلنے کے بعد عموماً چار روز
تک رحم سے خون نکلا کرتا ہے۔ اسی کو حیض (MENSTRUATION) کہتے ہیں دوران
حیض میں یا حیض ہونے کے کچھ پہلے ہومیوپیتھک دوا کا استعمال کرنا منع ہے۔

دوران حیض میں نہانا اور ہم بستر ہونا بھی منع ہے۔

استقرار حمل :- آجکل کے نئے مغربی عالم تشریح جسم فرماتے ہیں کہ خون کا جو ہر
ہی منی کی شکل میں بد جاتا ہے عورت کی منی جب خصیتہ الرحم میں رہتی ہے مرد
کی منی (SEMEN) اسی طرح خصیتہ الرحم (TESTES) میں رہتی ہے۔

بچہ اسی کا دوسرا نام عورتوں کا خنسیہ یا بیضہ ہے۔

سہ آیہ روید کے طریقہ سے کھائی ہوئی غذا اچھی طرح ہضم ہو جانے پر اس سے جو ہر
پیدا ہوتا ہے اسی کا نام سیال ہے اس سیال سے خون، خون سے گوشت، گوشت سے چربی
چربی سے ہڈی، ہڈی سے غنڈہ اور آخر سے منی پیدا ہوتی ہے مضبوط سیال ایک ماہ میں مرد کی
منی کی شکل میں عورتوں کو حیض (روسی کی شکل میں) بدل کرتے ہیں (آیہ روید سنگرہ ملاحظہ ہو)
منی روکنے (نہ نکلنے دینے) کا نام برہم چرن ہے۔

مرد کی منی (SEMEN) اسی طرح خصبہ (TESTES) میں رہتی ہے۔ مرد کے منی میں بہت باریک اور لمبا ایک قسم کا کیڑا رہتا ہے اسکو حیوانات منویہ کہتے ہیں (SPERMATOTHOA) اور نر توں کا پختہ، بیضہ منی اور مردوں کا طاقتور حیوانات منویہ ان دونوں کے ملنے سے حمل رہتا ہے۔ لیکن (کبھی کبھی) حیض کے دس پندرہ روز بعد بھی حمل قرار پاتا ہے عورت اور مرد کے جماعت کے آخری حالت میں مرد کے خصبہ سے نائزہ کے راستہ سے جو منی نکلتی ہے۔ اسی منی کا کیڑا اور توں کی فرج سے رحم میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ بوتان میں جا کر اگر خصبہ الرحم کے پختہ انداز سے مل گیا تو اسی وقت عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔

اس مایہ سے کس طرح نئی جان پیدا ہوتی ہے۔ ایک قطرہ سے کس طرح حمل میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حیوانات منویہ اور بیضہ منی دونوں مل کر قدرت کی آڑ میں چھپے رہ کر کس عظیم طاقت کی اثر سے ارجن، پلوین، بشکر، چاریہ اور پلیو، آریہ سپٹ اور نیوٹن کیسل اندر ڈارون، یا اہلیہ بانی اور کمار کی نائٹ اینگل کو بنا سکے۔ کیا تیز سے تیز عقل والے انسان کبھی اس اچھے ہوئے سوال کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ فتح کی خوشی سے پھولا ہوا اس بیسویں صدی کا علم ور انسان عقل، سمجھائی کی تلاش کرنے یا کیمیاوی آزمائش سے جان پیدا کرنے کی تلاش میں مہر و فدا ہے۔ لیکن ہم اس تمام کائنات کے پیدا کرنے والی ہر ذرہ و ہر گنگہ موجود رہنے والی قدرت ازی کی رو برو طور سے خوف، تعجب، اور خوشی سے بھری ہوئی محبت و لرزتے دل سے ہزار ہزار بار مرستیم خم کر کے مضمین مادہ میرا آتے ہیں۔ لیکن نور توں کی بیماری اس کے شفا کی ترکیب نکلتے ہیں۔

عورت کے امراض کو ذیل کے نو درجوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کی علامت اور علاج درج ذیل ہے (۱) حینگی کی بے قاعدگی (۲) رحم کا نقص (۳) امراض خصبہ الرحم (۴) فرج کی بیماری (۵) بائچھین (۶) امراض لیسان (۷) ستون ریڑھ کی بیماری (۸) دچی کی بڑی کا درد (۹) امراض حاملہ۔

۔۔۔ (مقصد: علم الکیمیا، ماحولیات)

۱۔ حیض کی بے قاعدگی

(DISORDERS OF MENSTRUATION)

امراض متعلقہ حیض میں مخصوص امراض کے حالات ترتیب وار مندرجہ ذیل ہیں (۱) شروع اخراج حیض دیری (ب) احتباس طمث (ج) حیض غیر منقسم یا حیض کی بے ترتیبی (د) عوض حیض یا قائم مقامی حیض (س) مقوڑا یا قلت طمث (س) اکثریت طمث (دھ) دشواری حیض (ط) سیلان رحم۔ (ع) سن یا س یا بندش حیض (ف) خلویا سر بیماری۔

امراض متعلقہ حیض میں حیض کے ختم ہونے کے بعد فوراً ہو میو پتھک دوا استعمال کر نیکا وقت ہے۔ خاص ہو تو یہ ترتیبی حیض کے بعد بھی دوا کھائی جاسکتی ہے۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ تمام قسم کے نقص حیض کی دوائیں اور سپا ہے۔ وچلس! کالی عورتوں کے لئے اور رسیپا! گوری اور خوبصورت عورتوں کے لئے۔ زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ خون حیض کی خرابی سے پیدا ہوئے علامات میں حیض کے وقت دوا کھانا مینع ہے۔ حیض ہو جانے کے بعد ہی دوا کھانے کا خاص وقت ہے۔ ضرورت پڑنے پر جب تک ماہواری نہ ہو! تب تک دوا دینی چاہیے۔

۱۱) شروع اخراج حیض میں دیری ہونا

(DELAYED MENSTRUATION)

اس ملک میں عورتوں کو جو تندرست ہوں ۱۲-۱۳ برس کی عمر میں حیض شروع ہو کر ۴-۵ برس کی عمر میں ہر مہینہ قاعدہ سے حیض ہوا کرتا ہے۔ کسی کسی لڑکی کو جوان ہو جانے پر حیض نہیں ہوتا۔ یا ایک مرتبہ ہو کر بند ہو جاتا ہے۔ بعضی گزری! بہت عرصہ تک کسی بیماری میں مبتلا رہنے کی وجہ سے جسم کا کمزور نہ ہو جانا۔ اور خون کی کمی کی وجہ سے یا دل نہ خراج کی غلافی جھلی نہ کھینچنے کی وجہ سے پہلا حیض دیر سے ہوتا ہے۔

علامات: سر بھاری اور درد۔ ناک کا مے مے (مقعد سے بھی

اور دیا۔ کی دتہ افوقنا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور کئی خون یاقی، کمی وجہ سے حیض بند ہو جانے پر اگر یہ بیماری آرام نہ ہوتی ہو تو منگنا زڈامی اسکا ٹنڈھ فی خوراک ایک گرین چار مرتبہ روزانہ کھانے سے خوب فائدہ ہو سکتا ہے۔
کمر تک گرم پانی میں بیٹھ کر ہنا نادودھ میں پانی ملا کر پینا گرم پانی میں فلائین بھگو کر سینکنا۔ ان سب ترکیبوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

(شروع حیض کی دیری ملاحظہ ہو۔)

(ج) غییر منتظم حیض - بے ترتیب حیض

(IRREGULAR MENSTRUATION)

حیض کا بھی وقت معین ہے۔ عورتوں کو ہر ۲۸ دن میں رحم کے راستہ سے کچھ سیاہی مائل سرخ رنگ کا پتلا اخراج ہوتا ہے۔ عموماً تین روز سے پانچ روز تک اخراج ہوتا رہتا ہے۔ اس خون کی مقدار ایک پاؤ سے ڈیڑھ پاؤ تک ہے۔ اس اصول میں خرابی ہونے سے علاج کرنا چاہیے۔ غیر منتظم حیض کے علامات :- دو تین ماہ حیض ہو کر یکا یک بند ہو جانا کبھی کبھی دو تین ماہ بند رہ کر یکا یک زیادہ مقدار میں اخراج ہوتا ہے کسی کسی کو دس بند رہ روز تک تھوڑا تھوڑا اخراج ہوتے رہنا۔

علاج

کو نیم ۳۰۔ اس مرض کی اچھی دوا ہے۔ بند ہونے پر سنٹیوہ - دو قطرے۔ ہمیشہ تین دفعہ روزانہ استعمال کرانے سے حیض کا بے ترتیب ہونا بند ہو کر ترتیب سے ہوتا ہے۔ پیس۔ یا چائنا - یکے بعد دیگرے کھلانے سے کسی کسی کو خواہا فائدہ ہوا ہے۔ جلدی جلدی اگر حیض مابری ہونے پر اگنیشیا۔ (پندرہ دنوں میں ہو جانے پر) ایلاڈونا۔ کلکریا کارب نیٹرم نیورڈ اپیکاک مفید ہیں۔ بہت دیر سے اور ار حیض ہونے پر کیمی کارب ایکے سس۔ پیس۔ سلف۔ اگر حیض کئی دنوں تک جاری رہے۔

کوئی ایم۔ اگنیشیا بگس دامیکا۔ پلٹیا۔ سلف۔ مفید ہیں۔

احتباس طمث۔ قلت طمث۔ اور شرت طمث۔ مرض کی دوائیں علامات

علاج معاون

سردی لگنا۔ یا سرد پانی میں نہانا۔ لکھنا۔ سست رہنا۔ ان سب باتوں کی مخالفت ہے۔ گرم مصالحہ یا محرک غذا ترک کر دینا چاہیے۔ گرم پانی کے ٹب میں کمر تک ڈبو رکھنا۔ پریٹ میں فلائین یا گرم کپڑا باندھنا اور معمولی صحت کے اصول کی پابندی کرنا مناسب ہے۔

(AMENORRHOEA)

بندش حیض

حیض شروع ہو کر کبھی کبھی بند ہو جاتا کرتا ہے۔ ہمیشہ سستی، خون کی کمی، جماع کی خرابی، حیض کے وقت برف زیادہ کھانا۔ سردی لگنا۔ پانی میں بھیگنا۔ زیادہ گھومنا۔ یکایک رنج، غصہ، تکلیف یا ڈر وغیرہ اسباب سے حیض رک جایا کرتا ہے۔

علاج: کسی کسی معالج کی رائے ہے کہ پلس کے ساتھ فیرم کے بعد دیگرے دینا۔ اس مرض کی اچھی دوا ہے۔ جوانی کے شروع میں جوان عورتوں کو داخل کر گورے رنگ کی، اگر حیض نہ ہوتا ہو تو پلس ۳-۴۔ (ایک ماہ یعنی جب تک حیض شروع نہ ہوا سر میں اجتماع خون کی وجہ سے سر گھومنا۔ آنکھوں میں اندھیرا آنا۔ آنکھوں کے کڑھے میں درد۔ رحم اور خصیتہ الرحم میں تیز درد۔ نڈیان کی علامت میں بیلڈونا ۳۰۔ ناک سے خون گرنا۔ سر گھومنا۔ سینہ اور پسلی میں سونی کی طرح درد۔ خشک کھانسی، معدہ میں درد۔ براہو نیا ۶۔ پیڑو کے تیز درد میں دمنٹ کرنے سے زیادتی، غیر مستقل۔ دھڑلواں ڈوکی دل۔ تنہائی پسندی کے علامات میں سپیا۔ سردی لگ کر خون رکنے پر، ایکو نائٹ۔ فائدہ نہ ہو تو پلس ۳۰۔ باقاعدہ دیتے ۸-۲۰ دن پر اگر حیض نہ ہو تو سلفر ۳۰۔ دماغی تکلیف کی بیماری میں اگنیشیا ۶۔ خون کی کمی کی وجہ سے حیض بند ہونے پر، کلکیریا کارب ۳۰۔ یا نیٹرم پور ۳۰۔ کمی خون اور اسہال کے ساتھ حیض بند ہونے پر، فیرم ۶۔ مرض حیض بند ہونے کے بعد اگر مریضہ مرض شکم سے چھٹپاتی ہو تو جیس ۶۔

سیمولا۔ اگنیشیا ۱۲x۲۔ سطوف دگرم پانی کے ساتھ کھانا، سسی سفیوگا ۳۰x۳۰۔ سائیکلین ۶۔ آر میں ۶۔ نیٹرم میور ۳۰۔ ہلونیس ۱x بیلڈونا ۳۰۔ وغیرہ

کے مطابق اس مرض میں بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔
(۷) عرض حیض۔ حیض قائم مقامی
 (VICARIOUS MENSTRUATION)

حیض بند ہونے یا تھوڑے ادرا رکی وجہ سے ناک یا مقعد کے راستہ سے خون نکلتا ہے۔ بلغم کے ساتھ خون نکلتے پر پھیپھڑہ سے اور صرف خون نکلتے پر مدہ سے نکلتا ہے۔

علاج ۱۔ ناک یا مقعد یا جسم کے کسی دوسرے راستہ سے خون نکلتا۔ خون کی تھ کرنا۔ پیٹ میں درد ہونا۔ سینہ میں درد۔ کھانسی کے (سیلان الرحم) ہو یا نہ ہو علامات میں بھی میس ۱۔ ناک سے خون نکلتے پر فیرم فاس ۶-۷ یا برائی ادینا ۶۔ چمک دار۔ سرخ رنگ کا خون؛ اخراج پا نا۔ اسپیکاک ۶۳-۶۴ کھانستے کھانستے اخراج خون۔ کمزوری۔ چہرہ میں خون کی کمی۔ اور اس کے ساتھ ہی دق کے دوسرے علامات ظاہر۔ سنشیو ۳۳-۳۴۔ ناک اور کان سے خون بہنا پرستان میں درد۔ جسم کا گرم معلوم ہونا۔ علامات میں پلس ۶۔ بہت کمزوری اور کمی خون کے ساتھ خون نکلتے پر فیرم ۶۔ مقعد سے خون نکلتے پر کال سوینا ۶۔ خون حیض کے عوض سفید پانی ہونے پر کیلک کارب۔ فیرم۔ چائنا۔ بوریکیس۔ تھین شیا۔ سلف؛ فاس۔

(۸) قلت طمث۔ تھوڑا ادرا حیض

(SCANTY MENSTRUATION)

زیادہ امراض میں مبتلا رہنے کے بعد کمی خون کی وجہ سے تھوڑا خون نکلتے پر خاص مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ جیسے سوزا المزاجی کی خرابی سے حیض کا خون تھوڑا نکلتے پر کلکیر یا فاس۔ سا نکلتے؛ کو نیم۔ نیٹرم میوڈ۔ مرک؛ فاس؛ پلس؛ سنشیو؛ سپیا سی سی۔ سلف۔ خون کی کمی؛ خون ہونے سے تھوڑا ادرا ہونے پر؛ آرج نائی۔ فیرم؛ نیٹرم میوڈ قبض یا جلدی امراض کے ساتھ قلت طمث ہونے پر؛ کال سو۔ گرافائی؛ نکس وائیک۔ رحم کی خرابی سے ادرا حیض کم ہونے پر؛ حسب ذیل دوائیں دی جاسکتی ہیں۔

علاج :- تھکاوٹ جسمانی اور دماغی تکلیف جلد زرد ٹھنڈی ہوا
 ناقابل برداشت تھی۔ درد سر اور کمی خون میں سیسپا ۳۰ (دبلی پتلی ریا ج
 والی عورتوں کو زیادہ مفید ہے) تھوڑا پانی کی طرح اور ار۔ تمام جسم زرد۔
 جاڑا معلوم ہونا اور ار حلیض کے پہلے اور اسکے دوران میں کمزور دیلیس ۶۔
 غذا اور ہوا کی کمی کی وجہ سے یا کسی طرح کا زائل کرنے والا مرض ہو جانے پر تھوڑا
 اور ار خون ہو تو فیرم ۶۔ وقت پر حلیض نہ ہونا۔ قبض۔ تمام جسم میں کھلی، خفیف
 بخار دیارہ رہ رہ کر جسم گرم ہو جانا۔ علامات میں سلفر ۲۔ بہت عرصہ کے بعد
 حلیض سے ہونا۔ اور حلیض کے پہلے فرج کھلانے میں گریفاٹس ۶۔ قبض کے ساتھ
 تھوڑا اخراج خون۔ اور مریضہ کے جسم کا رنگ ٹھیلہ ہونے پر نیٹرم میور ۱۲۔
 سفوف زیادہ دیر میں بہت تھوڑا سیاہ رنگ کا حلیض۔ گنے کا رب ۶۔
 قبض اور اسکے ساتھ ہی جسم میں اسپینہ ہونے پر فاسفورس ۶۔ پلاٹینا ۶۔
 کاربوونج ۶۔ سلفر ۶۔ ۳۰ کبھی کبھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ شروع حلیض
 دیر سے ہونا! مرض ملاحظہ ہو! بلکی مقوی غذا دینا چاہیے۔

(۴) حلیض بکثرت آنا (MENORRHAGIA)

- (۱) حلیض کے وقت دماغ کا بہت خون نکل جاتا ہے
- (۲) حلیض کے وقت مقررہ سے زیادہ زور تھک رہنے پر
- (۳) چار ہفتوں میں دو یا اس سے زیادہ ار حلیض ہونے پر اسے اکثر طمث کہتے ہیں۔ اسلئے یہ وقت مقررہ سے پہلے یا بعد ہی ہو سکتا ہے اور تھوڑے یا زیادہ دنوں تک رہ سکتا ہے سن یا اس کے وقت کسی کسی عورت کو کثرت طمث ہوا کرتا ہے۔ اکثر وجوہات سے زیادہ خون آیا کرتا ہے۔ ان میں رحم کی گردن میں خستہ الرحم میں احتمال خون وغیرہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ زیادہ جارج زیادہ مقدار میں مقوی غذا کھانا۔ زیادہ تفکرات یا بار بار استقرار حل ہونا بھی اسکے باب میں داخل ہو سکتا ہے۔ کاپلی بدن لوطنا۔ جمائی آنا۔ جسم میں درد سر بھاری اور سر میں درد۔ لیشت، کمر میں درد کھانے سے نفرت پیر کے تلوے ٹھنڈے۔ اور جاڑا معلوم ہونا۔ وغیرہ علامات بھی مرض میں نمودار ہوتے ہیں۔

بہت زیادہ خون نکل جائیکے وجہ سے چہرہ زرد، آنکھیں دھنسی، ہاتھ سر ٹھنڈے
کان بند، بنف اور نظر کمزور اور بے ہوشی وغیرہ علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

علاج

ہائیڈراسٹس x۱ اور ہائیڈراسٹناٹن x۳۰ شاید کثرت طمث کی
بہترین دوا ہے۔ ڈاکٹر وافر ڈن نے ہائیڈراسٹناٹن ۵۰ اور کثرت طمث کے
وقت اور x۳ حیض ختم ہونے کے وقت کھلا کر بہت زیادہ فائدہ پایا ہے۔
سہی میلس کے ساتھ چائنا کے بعد دیگرے استعمال کرنے سے بھی شاید کثرت طمث
جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ جلدی جلدی حیض آنا زیادہ مقدار میں ادرا اور اس کے ساتھ
درد شکم، اور متلی میں لہرکیں ۶ رات میں ناکافی اخراج آگنیشیا کارب ۶۔ سوزش
سیلان الرحمہ دوسری بیماری کے ساتھ آرمس ۳۰۰۰۔۳۔ جبانی کمزوری اور فعل رحم کی
خرابی کی وجہ سے بہت دنوں تک رہنے والا۔ زیادہ ادرا خون ہونے میں آرسنک ۶۔
سن یاس کے وقت حالت حل یا بعد ولادت اپشت اور پٹرو میں درد ہوا تو ٹیکس ۶
مثانہ کا ورم، نظر کمزور، خصیتہ الرحمہ میں درد۔ سرخ رنگت کا خون۔ سبائنا ۶۔
امبولٹ تازی مورلوں کے لئے سبائنا زیادہ مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں بلادر
پتلا اخراج خون، کبھی کبھی سیاہ رنگ کا کبھی چمکدار کبھی بدبو دار، اخراج خون
تھوڑی حرکت سے اخراج کی زیادتی۔ تمام جسم سرد۔ لیکن اندر گرمی فرج کے
منہ پر چنیوٹی چلنے کی طرح سرسراہٹ پیٹ میں اور فرج کی طرف دباؤ
کے ساتھ سیاہ اکثرہ کی طرح اخراج ہونے پر کروکس سٹیووائٹ ۳
آرام کے وقت چائنا ۶۔ اور لزبت کے وقت کروکس استعمال
کرنے سے زیادہ فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ محارڈ سے اکثرہ کی طرح
زیادہ مقدار میں اخراج اور فرج میں درد۔ ایسا معلوم ہوتا ہو گو یا رنگ
وغیرہ فرج کے باہر نکل جائے گی۔ جماع کی تیز خواہش۔ رحم میں ورم
اور ہمیشہ میند کے علامات۔ پلاٹینا ۶۔ کسی کسی کی رائے ہے کہ اس کے ساتھ
کروکس یکے بعد دیگرے استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خاص کر یہ دونوں
دوائیں مزمنا حالت میں فائدہ کرتی ہیں۔ حیض کے پہلے ولادت کی طرح

تیز درد کے ساتھ سخت دانہ دار اخراج خون۔ رور و کردار کی علامت میں
 کیمو ملا ۱۲۔ بغیر تکلیف کے زیادہ مقدار میں پستل یا کبھی گاڑھا سیاہ رنگ کا
 اخراج خون کی وجہ سے کمزوری۔ کان میں بھولی بھول کرنا۔ رحم کے منہ میں جلن
 ہر تیسرے روز علامات کی زیادتی میں چائنا ۶۔ خط ناف میں درد۔
 اور اس تکلیف کا رحم تک پھیل جانا۔ ہر وقت تے کر نیکی رغبت۔ سر
 گھومنا درد سر، چہرہ خشک اور ٹھنڈا چمک دار۔ سرخ رنگ کا اخراج
 خون ہونے پر، اپیکاک ۳۔ ۶۔ متذکرہ بالا علامات میں ولادت کے بعد
 دالے یکایک اخراج خون میں بھی زیادہ مفید و کارآمد ہے، مجری بول
 اور مقعد میں درد، رہ رہ کر زیادہ مقدار میں چمک دار سرخ رنگ کا اخراج
 خون (خاص کر بعد ولادت) ہونے پر مجری ۳x۳۔ چوٹ لگنے کی وجہ
 سے رحم سے زیادہ مقدار میں اخراج خون ہونے پر آرنیکا ۳x۳
 یا ہیپیس ۳x۳۔ فائدہ کرتا ہے۔ وقت مقررہ کے پہلے فرج میں
 کھجلی اور جلن کے ساتھ سیلان الرحم کی مرلیضہ کو زیادہ اخراج ہونے
 پر۔ اور سینہ میں درد ہونے پر کیلیک کارب ۶۔ (موٹی ٹو رتوں کے لئے)
 شراپین سے گہرا سرخ اخراج ہونے پر رالوں میں درد رہنے پر
 (خاص کر ایسی مرلیضہ کے لئے جس کو اخراج خون طبعاً زیادہ ہوتا ہو)
 طبیم ۶۔ خراب اخراج خون میں جب کسی طرح کم نہ ہو تو دارچینی کا تیل
 (oil of CINNAMON) ۵ قطرے ایک ڈرام دودھ کے ساتھ۔ فی
 خوراک کھانا چاہیے۔ کلکیر یا کارب ۶۔ ایلو ۳x۳ فیرم۔ مقلاسپی ۵۔
 (فی خوراک ۵ قطرے) اسکیل ۶۔ بیلادونا ۳۔ نائٹریک ایسڈ ۱۔ ۶۔
 امبرا ۳۔ سیلونیس ۱۔ اسٹے لیکو ۳۔ ہائڈراکٹس ۵۔ اور مرقانی کس! ریلی جی اوسا ۱۔
 (FICUS RELIGIOSA) وغیرہ دوائیں بیج بیج میں ضروری ہو سکتی ہیں۔
 حیض ختم ہونے کے وقت کا علاج:۔ زیادہ اخراج خون کی وجہ
 سے مرلیضہ کو بہت کمزوری ہو جانے پر، ٹیس، فیرم۔ چائنا، یا آرسنک! خون
 کے دوران میں خرابی اور بخار ہونے پر، ایکونائٹ۔ وجع مفاصل ہونے پر

سسی سفیوگا، اسپہال، آواز بیٹھ جانا اور کھانسی یا دق کے ابتدائی علامات میں ظاہر ہونے پر کلکیر یا کارب، دماغی تحریک، اجامہت کی تیز خواہش میں غاسفوس درمیان میں زیادہ خون نکلتا اور زنجیر کمزوری کے اور کوئی دوسری خرابی مریضہ میں نہ معلوم ہونے پر ٹریٹمنٹ یہ کل ادویہ ۶ ملاقات کی استعمال کرنا چاہئے۔

عام اصول :- بہت زیادہ جسمانی اور دماغی محنت منع ہے۔ اگر کوئی کمزور کرنے والی بیماری یا خلقی نقص ہو تو اور مریضہ طاقتور رہے تو مریضہ کو گرم پانی کے ٹب میں کمرنگ ڈبو کر دس پنزدہ منٹ رکھنے کے بعد خشک کپڑے سے بدن پونچھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہامیلنس ۴۰۔ دس گنا صاف پانی میں ملا کر اس میں پتلے کپڑے کے ٹکڑے کو یا اسپنج بھگو کر فرج میں ڈال کر رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ رحم سے اخراج خون، ملاحظہ ہو۔

(د) دشواری حیض - حیض درد کے ساتھ

(DYSMENORRHOEA)

اخراج خون کی خرابی کی وجہ سے پرد میں اور کمر میں ایک قسم کا تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔ اسکو دشواری حیض، کہتے ہیں۔ بایں خصیتہ الرحم میں تیز درد کے ساتھ تصوراً اخراج خون (دوران حیض) پیڑوں میں، ریڑھ میں، کمر میں یا تمام جسم میں تیز درد کمزوری، درد سر، دوران سر، شستی، ضعف معدہ، مستی یا تھکے وغیرہ علامات میں دشواری حیض ہوتی ہے۔ زیادہ جمع رحم اپنی جگہ سے ٹل جانا، اجتماع خون کی وجہ سے سوزش رحم اور سفید پانی نکلتا ہے۔ وغیرہ اسباب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ جن عورتوں کو وجع مفاصل یا ہسٹریا یا درد عصبی رہتا ہے ان کو اکثر حیض میں تکلیف ہوتی ہے۔ زنتھک سائلم۔ اور دانی برنم، اوپیوس، اس مرض کی بہترین ادویات ہے۔

علاج مختصر :- (۱) درمی یا اجتماع خون کے حیض کے درد میں ایکونائٹ، آرس، بیلادونا، ارڈکا، براونیا، کوئی ایم، ہیرسلفر، لائیگوبرک کار، مرک سول، پینس، یلیا، سیپیا۔ (۲) عصبی درد حیض میں کوکوبیموس، کافینہ، جلیس، بھی سیکیل، زنتھکس۔

(۳) تشنجی درد حیض میں، دانی برنم، اوپی، آرتی، آرس، کیمو، کیلک، آگنے، نکس، واناس، پینس۔

(۴) پیدا ہونے والی در دھیس۔ بوریس کی ملک کاربہ کو نیم۔ سہی میلس۔ تھو جا۔

اکثر ادویات کے علامات

سہی سی فیوگا ۳۔ ۶ حیض کے پہلے درد سر (حیض کے وقت) ولادت کی طرح درد۔ پیڑو اور پیٹھ میں درد۔ معدہ کے اوپر تیز درد۔ میلے رنگ کا تھوڑا اخراج؛ خون؛ یا جاع ہوا زیادہ مقدار میں اخراج خون ہونے کے علامات میں میلس ۳۔ ۳۰ کمر؛ پیڑو اور پیٹھ میں کترنے کی طرح درد؛ یا نوچنے کی طرح درد؛ ضعف معدہ؛ غذا سے نفرت؛ دوران؛ جاڑا لگنا۔ بیقاعدہ اخراج؛ اخراج کے وقت اسہال؛ حیض دیر سے ہونا۔ تھوڑا اخراج اور کبھی کبھی تھوڑی مقدار میں سیاہ یا سرخ رنگ کا جلا ہوا؛ اخراج وغیرہ کے علامات۔ دامن پسند عورتوں کے دشواری حیض کی یہ اچھی دوا ہے۔

بیلادونا ۶۔ ۳۔ ۳۔ رحم میں اور خصیتہ الرحم میں اجتماع خون کی وجہ سے پیدا ہونے والی دشواری حیض کے درد میں۔ جوف مثانہ میں زیادہ درد کے وقت ایسا معلوم ہو کہ گویا کوئی پیچھے سے پیٹ کی رگیں وغیرہ زور سے دھکا دیکر باہر نکال رہا ہے۔ اخراج خون کے روز پہلے درد پیدا ہو جانا۔ حیض کے وقت پاخانہ ہونے میں بہت تکلیف۔ پیٹ میں کترنے کی طرح درد۔ سر میں بہت اجتماع خون کے ساتھ درد؛ حیض؛ آنکھیں اور چہرہ سرخ؛ کپٹی میں تپکن وغیرہ علامات کے ساتھ دموی مزاج کی عورتوں کے لئے زیادہ مفید ہے۔

جلس ۳۳۔ رحم میں اجتماع خون کی وجہ سے تشنج؛ فرج میں اکڑان کی طرح درد۔ پہلے پیٹ میں درد شروع ہو کر آہستہ آہستہ کمر کے اور پشت کے بالائی حصہ تک پھیل جانا اور گردن کے پیچھے اینٹھن کی طرح درد۔ کبھی کبھی درد بند ہو جانا۔ اس وقت مریضہ کو نیند اور سستی بخار۔ ہنسنے پر؛ یہ اور بھی فائدہ کرتا ہے کسی کسی کی رائے ہے کہ اس کے ساتھ کالو فائلیم X کے بے دیگرے دینے سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

کیو ملا ۶۔ ۱۲۔ میلا سیاہ رنگ کا جے ہوئے خون کا اخراج؛ ولادت کے درد کی طرح درد؛ بار بار پیشاب کرنے کی حاجت۔ پیٹ میں درد؛ کمر سے

آگے کی طرف ٹہلنے کی طرح درد؛ ریاخ اور صفراجن میں زیادہ ہوں ان عورتوں کے دشواری حیض کی یہ اچھی دوا ہے۔

کائیوس ۶۔ پیٹ میں اینٹھن کی طرح درد۔ سینہ میں بار بار معلوم ہونا۔ تنفس میں تکلیف؛ رحم کا تشنج؛ بہت کم مقدار میں سیاہ خون نکلنا۔ یا سیلان الرحم دوسرے تیز درد؛ دوران سر؛ نفخ شکم؛ کبھی کبھی بے ہوشی اور تے کر نیکی حاجت؛ زنتھا کسائی لم (XANTHOXYLUM) ۳۱ x ۳۲ کائیوس وغیرہ دواؤں سے کچھ فائدہ ہونے یا بالکل نہ ہونے پر خاصکر پٹو سے لیکر پٹھے تک تیز درد؛ اور اسکے ساتھ زیادہ اخراج اور بخار موجود رہنے پر دشواری حیض، کی بہترین دوا ہے۔ انٹی فیصدی مرلیفہ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔

کولوفانکم ۱۱۔ سوئی چھیننے کی طرح درد؛ پٹو کے درد کا جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے۔ تشنج ملا دشواری حیض؛ پیٹ کے نچلے حصہ میں ولادت کی طرح درد؛ پیٹ یا والی عورتوں کو اخراج اور سیلان زیادہ ہونے کی علامت میں۔ وراٹرم الیم ۳۳ x ۶۔ پیٹ میں درد کے ساتھ متلی، اور سر، ہاتھ پیر و ناک وغیرہ ٹھنڈے۔ سر میں سرد پینہ۔ گہری سستی و بے ہوشی؛ کیککس۔ تیز دردیں مرلیفہ کا زور سے ردنا۔ گہری سستی۔

بوریتس ۲۲ x ۳۰۔ سفوف پیٹ میں دائیں جانب اینٹھن۔ یا بائیں طرف زیادہ درد۔ یہ درد کندھے تک جا کر خصیۃ الرحم تک پہنچتا ہو؛ رحم سے جھلی نکلنا۔ سیبا ۶۔ ۱۰۰۔ آنکھوں کے چاروں طرف سیاہ چمکتے کی طرح داغ پڑنا۔ زرد جسم؛ صبح مرض کی زیادتی۔ صفراء عی۔ عورتوں کی دشواری حیض میں یہ زیادہ مفید و کارآمد ہوا ہے۔

کالین سونیا ۱ x ۳۔ اخراج سے زیادہ ٹکڑے ٹکڑے جھلی کی طرح کوئی چیز نکلنا۔ اور اس کے ساتھ زور سے درد اور قبض؛

ہیلونی ایس۔ رحم میں شدت کا درد؛ زمان اور لپٹ میں متواتر درد۔ کالے سوت کی طرح اخراج ہونا۔

نکس و امیکا ۶۔ ۳۰۔ وقت نہ رہنے پر بھی اخراج؛ حبار معلوم ہونا۔

معدہ کی کمزوری۔ صبح قے یا متلی؛ سیکیل کار۔ ۶۔ (وقت مقررہ کے بہت پہلے)
 میلا بدبو دار اور دانہ دار اخراج؛ پٹرو میں تیز درد (ایسا معلوم ہونا گویا پیٹ
 کی سبب چیزیں فرج کے راستہ سے باہر نکل پڑیں گی۔ تمام جسم میں) خاص کر ہاتھ
 و پیر میں) سرد پسینہ؛ نبض کمزور؛ مثانہ اور مہر میں کترنے کی طرح درد۔ اخراج
 نہ ہونا۔ تیز درد، اور کمزوری معلوم ہونا وغیرہ۔

میگنیٹیا فاس $x 4 x 3$ ۔ سفوف۔ (اگر پانی کے ساتھ ہر دس منٹ پر
 استعمال کرنا چاہیے) معدہ اور رحم میں تشنجی درد۔ بعضی درد کی تکلیف
 سیکنے سے کم ہونا درد دور کرنے کی یہ اچھی دوا ہے۔

اے لیس: خفینہ الرحم میں تشنجی درد؛ ٹنگ مارنے کی طرح درد ہونے پر
 مرلیفہ چھٹی عاتی ہو۔ کچھ جننے کی طرح درد۔

دانی برنم ادپولس (۱)۔ ۳۔ (دوران حیض در دیکامیک پیدا ہو کر آٹھ
 دن تک کھٹے تک رہتا ہو۔ رحم میں تیز درد۔ اس کے بعد کل پریٹ میں در دکا پھیل
 جانا تشنجی و شراری بھی دیکھی دشتواری حیض کی بہت اچھی دوا ہے۔)
 مندرجہ ذیل (۴) خاتہ (۱) دواؤں کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔
 کروکس۔ ماسکس؛ اللیم۔ ہائینلا۔ برالیونیا۔ کپوریم۔ کو نیم۔ بھی میگس $x 3$ ۔ ٹائیٹل لید
 فاسفورس۔ فاسٹولک۔ کسانا۔ سیکلے۔ شے شیوا x ۔ سلفر۔ ۳۔ گر لیاٹس۔
 فیرم؛ ایکوناسٹ۔ ۳۔ وغیرہ مفید ثابت ہوئے ہیں۔

اصول:- حقوڑے اور راحیض کی وجہ سے درد ہونے پر گرم پانی کی
 سینگ دینے یا گرم پانی کی پوٹلی سے سینکے سے اور بجلی (ELECTRICITY)
 بند ہو جاتا ہے

اگر ہوسو بیتھ۔ دوا کی آسانی نہ ہو اور مرلیفہ درد سے چھٹاتی ہو تو سرخ
 کوں کی ڈنٹھیں (چار آنہ بھرو زن) اچھ کانی مرچ اور ایک پاؤڈنٹھل سے ساتھ
 پیسک پانی ملا (حیض کے وقت تین روز) صبح استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح
 دو تین حیض کے وقت استعمال کرانے سے یہ دشتواری بالکل آرام ہو
 جاتی ہے۔ رحم کے امراض اور خفینہ الرحم کی خرابیاں ملاحظہ ہوں۔

حیض کے اکثر علامات اور دوائیں

بہت زیادہ بے ترتیب اخراج۔ پیر ٹھنڈے یا گرم؛ کچی خون۔ غیر قطعی شے
یا غذا میں رغبت؛ دودھ کی طرح سیلان؛ رحم؛ کھانسی۔ کلکیر یا کارب۔ ۳۰۔
بہت زیادہ ادراہ حیض؛ کمزوری سیاہ ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے اور ار۔
بے قاعدہ سیاہ رنگ کا اخراج۔ ولادت کے وقت کا ایسا درد۔ پاخانہ
کی حاجت نکس و امیکا۔

بے قاعدہ بہت اخراج۔ بچہ جننے کی طرح درد (خاص کر صبح) نظیر مہیور۔
بہت چکدار اخراج خون۔ آسانی سے جم جانا۔ ساتھ ہی بہت تلی۔ اپیک۔
اخراج حیض کا چمک دار خون؛ تپکن میٹھولی ضرب سے بھی درد۔ بیلا دنا۔
حیض کے کچھ پہلے اور دوران حیض میں قبض۔ دونوں پیر ٹھنڈے۔ سلکا۔
حیض شروع ہونے کے وقت ہیضہ کی علامت ظاہر ہونے پر یا یون کارب
حیض شروع ہوتے ہی مریضہ کی دوسری تکلیفات دور ہو جائیں۔ لیکن
حیض بند ہوتے ہی وہ تکلیفات دوبارہ نمودار آویں نہ نکم۔
حیض کے وقت اپنے آپ کو اچھی حالت میں سمجھنا۔ نہ نکم۔
حیض خوب؛ زیادہ جلدی جلدی ہو؛ سیاہ جا ہوا۔ جسم مست۔
سردی لگنا۔ ایون کارب۔

حیض خوب جلد جلد ہو؛ زیادہ ادراہ۔ اخراج گرم؛ بیلا دنا۔
حیض کی وجہ سے مریضہ اتنی کمزور ہو جائے کہ اسکے اندر رہنے کی طاقت
نہ رہے۔ کاربوئیٹس۔

حیض کا رنگ اور خاصیت :- زلال کی طرح پسینہ از بطن سے پڑا ہوا۔ بوریس۔
کیلی کارب۔ بلیس۔ حقو جا۔ کیلی سلف۔
حیض کے ساتھ فرج کھولنا نا۔ امبرا کیلیک آلو۔ کیلیک کارب۔
چائنا کر یا زوش۔ مرک۔ سیپیا۔

دھویلا رنگ۔ بلیٹم ٹک۔ سیپیا۔ کر یو زوش۔ ٹائیٹراک ایسٹ۔
ٹالا۔ چائنا۔ ٹیٹا۔ سیپیا۔ پیکٹیو۔ سیس۔ سیپیا۔

حیض کا رنگ اور خاصیت :- لزبنتی حیض بلسلم کو نیم۔

چکنا یا غیر حرک فرسے نیس۔ سٹر کنیا۔ کیلک فاس۔
بوریکس، میلس، اسٹیم۔

حیض دیر سے ہونے یا بند ہونے پر؛ مقررہ اخراج؛ کیلی کارب، امید سے
جلد تر۔ کلکیر یا کارب؛

رُکا، ہسٹیریا، عصبی کمزوری، سنس شیوا x۔

رُکنے کی وجہ سے ناک سے خون گرنا۔ برایو نیا۔

جلد جلد ہوا اور عرصہ تک رہنے پر ہی پیٹ میں انٹشن، نکس و امیکا x۲۔

جلد جلد ہونے پر؛ زیادہ مقدار حیض کے پہلے جسم کے زیرین حصہ۔
میں یا معلوم ہو، نکس و امیکا۔

صرف دن میں، کاسٹک، ہی میلس۔

صرف صبح، سی پیا۔

صرف رات ہی میں، بووٹا۔

صرف صبح و شام۔ فلینڈریم

صبح زیادہ تر ہونے پر؛ گٹنے کارب۔

مونے سے رُک جانے پر؛ کیلکس، کاسٹیکم، لیلم ٹیک

خون زیادہ جلد جلد سیاہ منہج ہونا، پیر میں درد، رات میں بڑھنا
ایون میٹور؛ نہایت مفید و کارآمد ہے۔

ہونے کے کچھ روز پہلے دونوں پستان میں درد، سوچن، کو نیم۔

کے پہلے اور بعد بہت زیادہ اخراج خون، اس اخراج کا رنگ
حیض کے خون کی طرح نہ ہو، اسٹی لاگو۔

تکلیف سے خون نکلنے پر؛ پیڑ و کا درد، بچے جننے کی طرح تکلیف
پیٹ میں قولنجی درد ہونے پر؛ کیمو ملا۔

تکلیف سے خون نکلنا، امن لیسند اور ڈرپوک عورتوں کا اخراج۔
سیاہ رنگ و جا ہوا۔ ٹپلس۔

زخم یا بوجھ اور دشمنی، ورم فرج، ہلویس، دپانی کے ساتھ فی خوراک ۵۔
نظر سے استعمال کرنا چاہئے۔

زخم میں طاقت لانیوالی دواؤں میں یہ سب سے اچھی دوا ہے۔ حیض، سرخ رنگ
خوب جلد جلد ہو۔ جھٹی کی طرح اس کے ساتھ خصیتہ الرحم میں درد۔ گنیشیا فاس۔

حیض کا جانا ہوا۔ اس کے ساتھ جنون جامع۔ پلاٹینم۔

” سیاہ اخراج؛ ڈوری کی طرح گویا پیٹ میں کوئی کیڑا رنگ رہا ہے مگر کوس۔

” سیاہ بدبو دار اور قلیل۔ صرف حرکت سے ہی اخراج حیض ہو۔ لیلیم۔

” صرف رات میں (یا صبح ہی) اخراج خون ہونے پر، بو دسٹا۔

” جسم میں پھنسیاں ہونے کے بعد ہی حیض ہونا۔ ڈکمارا۔

” جسم زرد۔ ناک پر زرد داغ دیکھنے میں گھوڑے کی زین کی طرح

آنکھوں کے پاس کالا چکنائی طرح داغ، پیٹ میں تو بخیر درد۔ اخراج خون کچھ

کم و زیادہ۔ سیلان الرحم۔ بچہ جننے کی طرح پیڑوں میں درد۔

کالی یا سالوے رنگ کی عورت کو جب یہ بیماری ہو سیسیا۔

جلد میل۔ جیسے چربی لگی ہو۔ نیٹرم میوڈ

فرج کی بیماری کی وجہ سے رگوں میں سستی، زخم، بیلادونا۔

رحم کا بڑھنا۔ فریکسی نس امریکانہ دپانی خوراک ۵ قطرے تین مرتبہ

روزانہ استعمال کرنے سے اکثر نشتر لگوانے کی ضرورت دور (BURNETTS)

ہو گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے (ORGAN DISEASES OF WOMEN)

رحم کا نیچے لٹکنا۔ ورم فرج اور زخم میں نمفیا اوڈویٹا (NYMPHAEA)

کی شکل میں کام میں لانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے (GODRAIA-SUPPOSITORY)

سردی لگ کر رک جانے پر چلیس ۴۔

صرف دن میں حیض کا اخراج ہو۔ کاسٹیکم۔ لیلیم۔ ایکٹس

دن میں اور رات حیض ہو اور رات میں نہ ہو۔ لیکن رات میں سفید پانی نکلتا

ہو اور دن میں نہ نکلے۔ کاسٹیکم۔

حیض دو تین روز بند ہو کر پھر ہو۔ خون میلایانی کی طرح یا جانا ہوا۔ فیبرم۔

دو ہفتہ بعد حیض، ادرار زیادہ، حیض ایک ہفتہ یا زیادہ روز تک قیام کرے۔ ٹیلمیم۔ حرکت، سے حیض ہو یا گھومنے سے حیض بند ہو۔ لیلمیم گگ زیادہ گندلا، رٹاسکس۔

زیادہ مقدار میں سیاہ جما ہوا اخراج خون، ساتھ ہی نظر کی کمی یا بیوشی سائیکلیم۔ زیادہ سیلان الرحم، کپڑا تر ہو جائے اور پیرنگ ٹیک پڑے سفلیتم۔ زیادہ اخراج۔ سیاہ گندلا۔ کچھ دیر بند رہے پھر ہو۔ کرناؤ۔ زیادہ اخراج، سیاہ، دماغی پریشا، پشت میں درد، دونوں پستان میں کانٹا چھنے کی طرح درد، سسی سی فیوگا۔

ہر بار حیض کے وقت پیٹ بے خون کرنے پر ایون کارب۔ ہر بار براز کے ساتھ رحم سے اخراج خون، اس کے ساتھ ہی پیرو میں، گمر میں اور پیٹھ میں درد۔ آلود۔

سیلان الرحم۔ سٹرا بلو دار، گندلا۔ زخم کرنے والا کرناؤ وٹا۔ پچھ جھنے کی طرح درد، اور سیاہ رنگ کے بلغم کے ساتھ اخراج ہونے پر۔ اے پی۔

دفع متفصل کے ساتھ حیض میں خرابی ہونے سسی سی فیوگا۔ ۳۰۔ دیر سے حیض ہونا، لیکن اخراج تھوڑا۔ یکا یک بند ہو جانا۔ تکلیف ہو، سلفر۔ اسہال تے۔ اور تھندے پسینہ کے ساتھ قوی حیض برت کی طرح ٹھنڈا۔ درے الیب۔ وقت پر حیض ہونا۔ لیکن اخراج تھوڑے ہی دیر رہے اور خفیف، لیکے سسی۔

خون حیض بند ہونے پر جسم کی گرمی، یا رہ رہ کر جسم گرم ہو جائے۔ لیکے سسی خون زیادہ ہو، چمک دار، سرخ رنگ کا اخراج۔ ایکاک، ۳۰۔ رات کے وقت یا سیرنے پر حیض کا اخراج ہو۔ لیکن گھومتے پھرتے پر اخراج بند ہو جائے۔ میگنٹا کلاب۔ جلد جلد طبع حیض ہونا۔ خون حیض کی مقدار زیادہ ہو، اور بہت دیر تک ٹھہرے۔ چکر اور ہاتھ پیر سرد۔ کیلک کلاب

ہمیشہ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں آرام معلوم ہو۔ اے پس۔ XI۔
سیدھی آنت اور پیٹ تک آٹھن؛ کو لہجی حیض، کالو فاکم XI۔

حیض ٹھوڑا دیر سے ہو، احتیاس طمث حیض میں سرد پسینہ وغیرہ جسم کی
کل اطوبت چکن یا بحر کس، پس، تھوڑا خون سفید پانی خاصکر گوری عورتوں کا
سبز کس۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں حیض بند ہو جائے۔ پس۔ ۳۔
پانی میں نہلنے کی وجہ سے اخراج حیض بند ہونے پر، انجم کر دے۔

اخراج حیض اکثرہ کی طرح کاڑھا۔ سیاہ رنگ کا۔ رونے کے وقت
اخراج نہ ہونا (CONSTRICION) سکڑنا۔ نصیۃ الرحم میں بوجھ
معلوم ہونا۔ تپکن۔ کیکٹس۔

حیض ٹرنے یا دیر سے ہونے پر (تھاکر سردی لگ کر) پس۔ ۳۔
دل کے چاروں طرف قورخ کے ساتھ دشواری حیض، کو نیم۔

(ط) سفید پانی آنا۔ (LEUCORRHOEA)

رحم کے ٹھکنے والی حیض سے یہ قسم کے اندر سے اور رحم کے منہ سے کئی رنگوں کا
(جیسے سفید، زرد، نیلا۔ دودھ کی طرح گوشت دھونے پانی کی طرح، یا کالے
اکثرہ کی طرح اخراج ہوتا ہے۔ اسی کو سیلان الرحم کہتے ہیں۔ عموماً اخراج
سفید ہی ہو کر تا ہے۔ اس لئے اس کا عام نام؛ سفید پانی ہو گیا۔
کنٹھ مالاکے مادہ والی کم سن لڑکیوں کو بھی کبھی یہ بیماری ہو کرتی ہے۔
وقت پر علاج نہ ہوئے آہستہ آہستہ رحم سے زیادہ مقدار میں مواد
کی طرح اخراج ہونے لگتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فسرج کے اندر اور
منہ پر زخم ہوتا ہے۔

قبض۔ درد سر۔ نفخ شکم فعل باضمہ میں خرابی اور چہرہ پر خون کی کمی
وغیرہ علامات اس مرض میں موجود رہتے ہیں۔

سردی لگنا۔ کیرے رہنا۔ گند رہنا۔ محرک استیبار لگانا۔ پینا۔ جسم
کی خرابی، زیادہ جماعت، بیج بیج میں زیادہ اخراج خون۔ رحم میں
محرک شے رہنا قرج میں سرطان ہونے کی وجہ سے دم بار بار۔

حمل کی وجہ سے سیلان الرحم ہوتا ہے۔
 بلغمی مزاج والی کسٹھ مارواڑ عورتوں کو یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔
 اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

کلکیر یا کارب۔ ۳۔ ۲۔ (درد و حمل کی طرح اخراج) رحم میں جلن۔ کبھی؛
 درد؛ لڑکیوں اور کسٹھ مالک کے مادہ والی عورتوں کے سیلان میں یہ زیادہ مفید ہے
 مکیس۔ ۶۔ ہر قسم کے ورم میں مفید و کارآمد ہے۔ معمولی رنگ کا گائے کا
 خراج، حقیق کے پہلے اخراج زیادہ ہوتا (اس میں کبھی درد رہتا ہے۔ کبھی نہیں رہتا)
 سیپا۔ ۶۔ ۲۔ ۲۔ پچھ جھننے کی طرح درد؛ قبض تھوڑا۔ سبز رنگ کا بدبو
 دار اخراج۔ یا بدبو دار پانی کی طرح اخراج ہونا۔ کمزور اور ریاح والی
 عورتوں کے لئے زیادہ مفید و کارآمد ثابت ہوا ہے۔

ایسٹرائیٹک۔ ۶۔ اکثر مرض میں مبتلا رہنے کے بعد یا آتشک کے بعد۔
 ریاز زیادہ پارہ کھانے کے بعد سیلان الرحم ہونے پر یہ دوا بہت ہی مفید
 و کارآمد ہے۔ پہلے گاڑھا اخراج ہو کر پانچ چھ روز بعد تیلے پانی کی طرح
 یا گوشت کے دھوون کی طرح بدبو دار اخراج ہونے پڑا۔
 کریوزوٹ۔ ۶۔ حقیق کے چار یا پانچ روز بعد زرد رنگ کے گتے دھان کی
 طرح بدبو دار اخراج، رحم کے باہر آماس، ڈنک مارنے کی طرح جلن۔
 اور کبھی، ران میں پانی لگ کر زخم اور پتھ میں درد۔

بووسٹا۔ ۱۲۔ اندھے کی سفیدی کے رنگ مزمن سیلان الرحم، اور اس کے
 ساتھ ہی مریض اپنا سر بڑھا ہوا سمجھتی ہو۔

بوریکس۔ ۶۔ زلال کی طرح سیلان رحم۔ غیر طبعی گرم۔ سیلان رحم۔
 گریفائٹس۔ ۳۰۔ گندلا۔ تپلا۔ بہت زیادہ سیلان الرحم۔

پیشاب میں جلن۔ پیٹھ میں بہت کمزوری معلوم ہونا۔

ایلیومینا۔ ۳۰۔ جب کسی دوا سے فائدہ نہ ہو تو اسکو دینا چاہیے۔

سلفر۔ ۳۰۔ مزمن سیلان رحم؛ بہت عرصہ تک مبتلا رہنے والے۔

خوراک سلفر دینا چاہیے۔ سفید یا سبز رنگ کا اخراج ہونے پر ہرگز نہیں۔

سیپیا، کیلک کارب، چائنا اور نیٹرم میوہ۔

کرم کی وجہ سے پیدا ہونے والے سرطان رجم میں ساٹنا $x2 \dots 2$ ۔

بانی کی طرح تپتے اخراج میں ساٹنا اور فرم۔ پلس۔

تیز اور جلن والے اخراج میں، ایسڈ ٹائٹریک۔ پلس۔ کریازوٹ؛ آسٹک۔

گرم اخراج میں گریفاسٹس $x3$ ۔ ہائڈراسٹس $x3$ ۔

دودھ کی طرح اخراج میں سکا۔ کلکریا کارب، پلس، لائیکو اور فرم۔

خون آلودہ اخراج میں کریوزوٹ۔ لائیکو۔ اور چائنا۔

سبز رنگ کے اخراج میں کاربووج، سلفر۔ ۳۔ مرک کریو۔

ہلکی رنگ کے اخراج میں کالی بانی۔

اخراج میں بدبو، کاربووج کیلک کارب، سیپیا۔ پلس۔

گاڑھے اخراج میں سیپیا۔ مزیمریم۔ زنکم۔

صرفات کے وقت اخراج ہونے پر۔ امبراگریٹیا۔ ۳۔ کاسٹیکم۔

صرف دن کے وقت اخراج۔

صبح بستر سے اٹھتے ہی اخراج ہونے پر کاربووج۔ یہ کل دوا میں ۶۔

طاقت کی دینی چاہیے۔ بیج بیج میں دوا بند کر دینی چاہیے۔

مشہور نشتہ لگانے والے اور خستہ سالانہ الرحم کے علاج کے متعلق جو

کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے یعنی مواد کا اخراج۔ عموماً

نزدیکی مائل ہوتا ہے اور اس میں مواد کا حصہ زیادہ رہتا ہے۔

اس وجہ سے وہ گاڑھی بالائی کی طرح معلوم ہوتا ہے اور مجری بول، گردن رحم

ماؤٹ ہونے پر صاف ستھرا بلغم، گندلی چیز۔ (کبھی کبھی تھوڑا خون کے ساتھ

بل کر خون کی طرح، یا سوت کی شکل میں نکلتا ہے۔

پلس، سیپیا، الیٹرس، ہائڈراسٹس۔ کیلی بانی۔ کالی کلور، آیوڈین۔

کریوزوٹ دوائیں بھی مفید ہیں۔ کیلک فاس (بہت بچے والی عورتوں کو

مفید ہے) کیلک سلف (مواد آلودہ اخراج کی خصوصیت ہو) کیلی فاس۔

غذا کے پیا گرم پانی کے ساتھ کھانا (سیلان الرحم سے پیدا ہو گئی)
علامات کے موافق ہونے پر۔ (CUSHING'S LEUCORRHOEA)

واور (OSTROM'S LEUCORRHOEA) ملاحظہ ہو؛

اصول :- روز نہانا۔ آلات تناسل کو دن میں تین چار مرتبہ دھونا

اور کھلی ہوا میں گھومنا مناسب ہے۔ بچکاری (FEMALE SYRINGE)
کھنڈے پانی سے دھو ڈالنے سے فرج میں بدبو پیدا نہیں ہو سکتی

حورت کو بچکاری کا استعمال نہ کرنا چاہیے۔ ٹانگہ، ناول بڑھنا، پیٹ
میں جانا اور مجامعت ترک کر دینا چاہیے۔ ہلکی اور مقوی غذا کھانی چاہیے۔

سیلان الرحم کے اکثر علامات اور اسکی دو امین
سیلان الرحم۔ کمزوری کے ساتھ کھلی؛ کسی حصہ جسم میں لگنے سے
وہ بھی سفید ہو جائے کر یوزوٹ۔

سیلان الرحم، چکنا یا غیر محرک گاڑھا، دیکھنے میں اودھ یا بالائی
کی طرح؛ پلٹس، سیلان الرحم غیر محرک یا چکنا؛ خاکی رنگ گاڑھا سیاہ
زخم پیدا کرنے والا۔ سفید، سیلان الرحم، پانی کی طرح کپڑے میں
زرد داغ، پڑتا ہو۔ پچی سرسوں کی طرح جو۔ کر یوزوٹ۔
سیلان الرحم :- جلد جس پر زخم ہوں۔ اور کپڑے میں داغ پڑنا۔ آلود۔
” سیاہ۔ بدبو دار۔ سیکل۔

” حیض ہونے کے پہلے گاڑھا۔ اور سبزی مائل، کاربووج۔

” گہرا اور گاڑھا۔ پلٹس۔

” لیسار۔ کیلی بانی؛ یا سیدراٹس؛ ایلیم، کیلی میور۔

” کھلی، کیک کارب۔

” پانی کی طرح، ایمون کلارب گریفائش مرک کارب سیاہ

” پانی کی طرح جلن۔ ایمون کارب۔

” پانی کی طرح سرسیراٹس؛ نیٹرم میور

” پانی کی طرح زرد کسی حصہ میں لگنے سے سفید ہو جائے۔ ایلیم۔

ایلیومینا، فیرم، فی سفورس، مرک، سول؛
سیلان الرحم، انڈے کی سفیدی کی طرح، ناف کے چاروں طرف قولنجی درد۔

بعد پشیاب، فرج سے میل چکنا اخراج ہو۔ ایمون کارب۔

انڈے کی سفیدی کی طرح گویا گرم پانی نکل رہا ہے۔ بوریکس۔

دودھ کی طرح سفید زیادہ جلن کے ساتھ کھلی چھوٹی لڑکیوں کے

(خاص کر کنچھ مالا دالی مرضیہ کے لئے) سفید پانی آتے ہیں۔ کیلک کارب۔

نکالا ہوا تازہ گوشت کی طرح سبزی مائل (نہایت بدبودار۔

نائیٹرک ایسڈ)۔

زیادہ تر تیز کپڑے پر لگنے سے سخت اور سبز ہو جائے۔ لیکس۔

کوئی دوا کھلنے سے فائدہ نہ ہو تو ایلیومینا ۳۰ - ۲۰۰۔

بد رنگ، جسم میں لگنے سے سُرخ جائے۔ پستان میں سختی، جماع سے

نفرت، گریہا۔

سُرخ رنگ کا کیولس، چائنا۔

اجتماع خون، نئی بیماری میں بیلاڈونا ۳۔

خون کی طرح سُرخ (رہ رہ کر پیدا ہو) کترنے کی طرح درد۔

دائیں جانب سے بائیں جانب تک پھیل جاتا ہو، لاسیکو۔

سفید نشاستہ کی طرح چکنا۔ بغیر تکلیف کے بوریکس ۳۔

بلغھی بوریکس، لگنے کارب۔

بالائی کی طرح چھ دار، کالی عورت کے لئے سپیا ۳۔

کے ساتھ جسم کا اخراج کمزور ہو، نائز ۱۰۔ فی خود اک ۵ قطرے۔

(مرض سیلان الرحم کی یہ اچھی دوا ہے)۔

کے ساتھ پیٹھ اور کمر میں درد، گھومنا مشکل اور تکلیف دہ۔

اسیکولس۔

کے ساتھ بہت کمزوری، اور تکان معلوم ہوتا۔

ایسٹرس، فیری ٹورس۔

حیض کا موقوف ہونا

پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ عورتوں کو حیض ۳۰-۳۲ برس تک ہوتا رہتا ہے (جیسے اگر ۳۱ برس کی عمر میں کسی لڑکی کو حیض ہونا شروع ہوا تو اکثر ۳۴ برس کی عمر تک اس کو حیض ہوتا رہے گا)۔ عموماً ۴۰ برس کی عمر میں عورتوں کے آلات میں خون کم جمع ہونے لگتا ہے۔ اور ۴۵-۵۰ برس کی عمر میں ساقط ہونے لگتا ہے۔ اس حالت میں رحم کی شکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ فرج مسکڑ جاتی ہے۔ اور کمزوری کے علامات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح حیض خود بخود بند ہو جانے پر بھی پھر کوئی دوا دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

لیکن اگر آسانی سے یہ حالت پیدا ہو کر عصب کی تیزی (جیسے جسم گرم رہنا۔ یا بار بار گرم معلوم ہونا۔ درد سر، تلخہ دھڑکتا۔ ہیشیریا، متلی، قبض پیٹ میں ریاخ اکٹھی ہونا، زیادہ پسینہ ہونا۔ یا بہت زیادہ پیشاب ہونا وغیرہ علامات دکھائی دیں تو دوا دینی چاہیے۔ حیض بند ہونے کے کچھ ہی پہلے بعض عورتیں خوب تندرست اور طاقتور ہو جاتی ہیں۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کار آمد ہیں۔

لیکس ۶۔ (اس مرض کی خاص دوا ہے)۔ رہ رہ کر جسم گرم ہونا۔ بار بار گرم محسوس ہونا۔ سر میں جلن، تیند کے بعد علامات کا بڑھنا۔

سینگو نیریا ۳۲-X۔ یا ایل ناٹھریٹ ۳ (عصبی علامات میں۔ بالخصوص اگر لیکس ۶ سے فائدہ نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا چاہئے۔

اگر زیادہ پسینہ ہو، یا رال زیادہ نکلے تو جرنڈی ۳۲-X۔ زیادہ سرد درد۔

گلو نائن ۳۔ سر کی چند یا میں زیادہ جلن معلوم ہونا۔ چائنا ۶۔ فیرم ۶۔

معدہ خلو ہو تو ہائیڈروسیانک ایسڈ ۶ (مریضہ اگر طاقتور ہو تو ڈاکٹر لیڈم ہائیڈروایسڈ کے عوض ایکونائٹ ۳ دینے کی رائے دیتے ہیں)۔

کیلی کارب ۶۔ (صفا زیادہ ہو) بھوک کی کمی کے ساتھ بخار کی جھلک پڑ۔ سلفر ۳۔ آیشیا ۳۔ سمی سیو کا، ۳۔ ولیریا نہ نکلیا، بے خوابی، گھٹے میں

گولہ اترنا معلوم ہونا پس ۳۔ کلیر کارب ۳۔ وغیرہ دوا میں مفید و کار آمد ہیں۔
 سن یا س کے وقت کسی کسی عورت کو جنون ہو جاتا ہے بلکین ۳۔
 (خاص کر بے چینی، رونا۔ اور تنہا رہنے کی خواہش میں) ہیپوٹیس ۴۔ ۶۔ ۱۰۔
 (پریشانی، بے چینی، مریضہ کو ہمیشہ جگہ بدلے بغیر چین نہ پڑتی
 ہو) اس مرض کی اچھی اور کامیاب دوا میں ہیں۔ (مرض جنون تلاطم ہوا)

اصول

نیم گرم پانی میں نہانا، زود ہضم چیزیں کھانا۔ وقت پر سونا۔
 تھوڑی محنت کرنا۔ کھلی ہوا کھانا اچھا ہے۔ مرض بدلنے کے لئے عورتیں
 محرک یا نیند لانے والی دوا میں کھاتی ہیں۔ یہ بہت نقصان کرتی ہیں۔

(ف) سبز بھسی، خلوروزیسز بیماری (CHLOROSIS)

اس بیماری میں خون کے شرح دلنے کم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جسم کی جلد
 کھر یا کی طرح خشک، زرد۔ یا پگے کندھک کے رنگ کی ہو جاتی ہے۔ وقت مقررہ
 پر اکثر حیض نہیں ہوتا۔ جسم کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جاڑا لگتا۔ درد سر۔
 بلکین سوچیں، آنکھوں کے چاروں طرف سیاہ داغ نہ رہنا۔ بد ہضمی، قیئ
 چڑچڑاہٹ، کھانسنے سے نفرت وغیرہ علامات ہو جاتے ہیں۔ اخراج
 خون۔ جلق۔ حیض میں نقص مقررہ محنت جسمانی نہ کرنا، افکار سے مرض پیدا ہو
 جاتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔۔

فیرم ریڈ کیم ۲۰۔ سفوف :- یہ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ ایک
 گریں دو مرتبہ کھانا چاہیے۔ ہیز ویرج سون لکی وغیرہ معالج سب ہی اسکی تائید کرتے ہیں۔
 ڈاکٹر یچل فرماتے ہیں کہ فیرم ریڈ کیم ۲۰۔ اس مرض کی بہترین دوا ہے۔
 اس کے کھانسنے سے بہت سے مریض اچھے ہو جاتے ہیں۔

جسم کی جلد زرد۔ بد ہضمی، ہمیشہ جاڑا لگتا۔ گامے ماحہ گرم معلوم ہونا
 ایسا معلوم ہو کہ جسم سے گرمی کی لپٹ نکلتی ہے۔ درد سر۔ بہت خون یا احتیاس
 طست اس دوا کے استعمال کے لئے خاص علامات ہیں۔

گرفیٹس X۳۳- کئی خون خشک، جلد قبض، اخراج گرم، جسم موتا ہونا۔

کلکیر یا کارب ۳- ۳: جب بچپنی سے یہ مرض شروع ہوتا ہو، بارہ سولہ برس کی لڑکیوں کو یہ بیماری ہونے پر عصبی درد، سر میں پسینہ، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے، گرہ پڑھ، ہوئی، غزن سردی یا اسہال میں ریڑھ کمر و ڈھیر صی ہو جانے کی شروعات مرقیہ کے آہستہ آہستہ موٹے ہونے کی علامات میں مفید و کار آمد ہیں۔

کیو پی ۲- لوہے سے بنی (یا فیرم) دواؤں کا غلط استعمال گرم پانی سے زیادتی۔ فیرم میٹا لیکم: بہت کم زوری، مٹھ اور ہونٹھ زرد یا خاکی رنگ کے پائری مائل، دوران سر، کان میں بھوں بھوں کی آواز۔ کلیجہ دھڑکنے، تنفس میں تکلیف۔ معلوم ہو ۲- بہت جاڑا معلوم ہونا۔ احتیاس طلب۔

سیپا ۱۲- تیز، رجم میں درد۔ نفخ شکم، کئی خون یا احتیاس طلب یا بہت دنوں بعد حیض ہونا۔ زرد یا سبز رنگ کا سیلان الرحم، حیض بکری کی مینگنی کی طرح دست، زور کرنے پر بھی پاخانہ نہ ہو، صرف ریاخ خارج ہو۔

دلیسرانہ ۹- علامات عصبی یا ہسٹریا کے ساتھ یہ مرض آر جینٹیم ٹائیریکم ۶- ۶: درد شکم، کلیجہ دھڑکنے، بے ہوشی۔

ہیلونی ایں ۲۰- پیرک ایڈ، پشاپ (PHOSPHATES) میں فاسفیٹ کی زیادتی۔ آرسنک ۳- زیادہ مقدار میں اخراج خون یا استسقاء ہونے پر، یا لوہے سے تیار کی ہوئی دواؤں کے غلط استعمال سے پیدا ہوئے امراض یا مرقیہ کے کمزور ہونے پر۔

پلسا ٹیلا ۳۳X۶: حیض بالکل موقوف یا مقدار میں کم آنا سردی لگنے کی وجہ سے حیض بند ہو کر مر رہیہ اگر آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی ہو، ہمیشہ سردی معلوم ہونا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے، کلیجہ دھڑکنے، سیلان الرحم، دودھ کی طرح رونا، گرم مکان میں مرقیہ بالکل نہ سکتی ہو بھلی ہوا میں رہنے کی خواہش، ڈاکٹر جے، ایچ، آر، ایں، اس مرض میں مسکے پہلے پلس دیتے تھے۔

سلفن ۷- تالو، یا ہاتھ پیر کی ہتھیلی میں گرمی محسوس ہونا۔ قبض، رات میں بے عصبی۔ سیلان الرحم۔ بہت روز تک مرض میں مبتلا رہنے پر

نہ نرم میوے ۱۲ سیفوف ۳۰۔ پیٹ کے جون میں سردی معلوم ہوتا ہو۔ پیر میں
 بوجھ محسوس ہونا۔ استسقاء قبض، حیض بند، لیکن بیج بیج میں کپڑے پر داغ پڑنا۔
 پریشانی وغیرہ علامات میں مزمن ناقابل شفا حالت میں یہ فائدہ کرتا ہے۔
 پلٹینا ۶۔ فاسفورس ایسڈ ۶۔ لیمیم ۶۔ پٹرولیم ۳۰۔ کیلک فاس ۶ X ۲۰۔
 اور خون کی کمی، دق، مرض کی دوا میں بیج بیج میں ضروری ہو سکتی ہیں۔
اصول :- ٹھنڈے پانی میں (خاص کر سمندر کے پانی میں) نہانا صاف ہوا
 کھانا۔ دودھ پینا۔ دلیا (BRAN) ہاتھ سے پکی کے پیسے آٹے کی ہاتھ سے
 بنائی ہوئی روٹی کھانا۔ سورج کی روشنی میں گھومنا چاہیے۔

مریضہ کو سست بن کر وقت نہ کاٹنا چاہیے۔ کچھ انڈیا یا اسکی زردی
 چھوٹی مچھلی، ترکاری، آزرے بھل، دودھ۔ مٹھا اور زیادہ مقدار میں پانی
 پینا۔ اور کپڑے اتار کر تمام جسم میں دھوپ لگنے دینا اچھا ہے

(۲) راجم کی بیماریاں

(DISEASES OF THE UTERUS)

راجم کی بیماریوں میں کئی مخصوص بیماریاں ترتیب وار حسب ذیل ہیں۔
 (۱) درد راجم (ب) باؤ گولہ یا احتساق الرجم (ج) ورم راجم (د) راجم سے
 خراج خون (س) راجم میں اجتماع ریاخ یا آب خون (س) راجم میں رسولی
 (ص) راجم کا ٹکنا (ط) راجم کی دوسری بیماریاں۔

(HYSTERALGIA)

(۱) درد راجم

راجم میں درد معلوم ہونا۔ کل پیڑوں میں تسپکن۔ (یہ درد عصبی، حیض کے
 دوران میں حرکت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے) بھوک نہ لگنا۔ بے چینی
 مستی؛ نیند نہ آنا۔ معدہ کی خرابی، اس مرض کے خاص علامات ہیں۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید و کار آمد ہیں۔

سمی سی فیکو گا ۳ X ۳۰۔ اس بیماری کی خاص دوا ہے۔

آرنیکا ۶۔ حیض کے وقت زیادہ محنت کرنا۔ یا بچہ ہونے کے بعد زیادہ

چلنے پھرنے سے یہ بیماری ہونے سے اس بیماری میں مصلحہ کی خرابی اور درد رشتے پر، کیمولا، ایکس و امیکا، ۳۔ مریکس، ۶۔ مائیس، ۶۔ دینا چاہئے۔

(ب) باؤگولہ اختناق الرحم (HYSTERIA)

اعصاب۔ (خاص کر رحم کے سب اعضا کے درد کی وجہ سے یہ بے ہوشی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

علاج۔ باؤگولہ کا علاج ملاحظہ ہوئے ہوشی کی حالت میں مریضہ کا منہ اور ناک کا سوراخ بہت تھوڑی دیر تک اچھی طرح بند رکھیں۔ کچھ اونچے جگہ سے بند ہو جائے۔ اس دیر سے وہ ایک مرتبہ زور سے لمبی سانس لینے کے لئے مجبور ہوگی اور بے ہوشی فوراً دور ہو جائے گی۔

(ج) ورم رحم (METRITIS)

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ حاد اور مزمن۔

حاد ورم رحم :- ولادت کا خون یا اسقاط حمل کا خون خراب ہو جانے پر یہ حاد ورم ہوا کرتا ہے۔ اس بیماری میں ہمیشہ گردن رحم پر حملہ ہوتا ہے۔ بہت جلد لگنا۔ تیز بخار، پیڑ و میں درد۔ اس کے خاص علامات ہیں۔ یہ علامات ظاہر ہونے ہی درمیان وریسٹ ۳۔ دینا چاہئے۔ اس کے بعد ایکس و امیکا۔ ۳۔ کی بھی ضرورت (پڑتی ہے)۔ یا ٹوجن ۳۔ بیلادونا ۶۔ کو لوسٹھ ۶۔ رشاکس ۶۔ ایکس ۶۔ بیج میں مفید و کار آمد ہیں۔

یہ مرض سخت ہے۔ اس لئے قابل معالج پر بھروسہ رکھنا مناسب ہے۔ خون خراب ہونے پر کچھ خوف نہیں ہے۔ سردی لگنے کی وجہ سے ہو تو دو تین خوراک ایکونائٹ ۱۲، دینا چاہئے۔

مزمن ورم رحم

بعد ولادت کے رحم نہ سکڑنے پر نقلی طریقوں پر حمل نہ ہونے دینا۔ یا بہت عرصہ تک سینرکس میں مبتلا رہنے سے رحم آہستہ آہستہ سخت۔ پُر درد اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اسکو مزمن ورم رحم کہتے ہیں۔ پیٹ بھاری معلوم ہوتا۔ دشواری حیف۔ نزدیکی میں درد حیف۔

میں خرابی انجامعت میں درد، مقعد میں تیزی، وغیرہ اس بیماری کے خاص علامات ہیں۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

سیاناسین۔ صاف، سرخ جما ہوا۔ یا پتلا خون نکلنا۔

بیلادونا۔ خطہ رحم میں جلن اور دباؤ معلوم ہونا۔ گویا پیٹ کے سبب عضو وغیرہ باہر نکل پڑیں گے۔ ایسے علامات میں بیلادونا زیادہ مفید و کارآمد ہے۔

سیپام۔ پچھنے کا ایسا درد خون بہت تھوڑا نکلنا فرج کے باہر کھجلی۔

بانی ڈرائسٹس۔ رحم گردن، یا دباؤ رحم اور لڑکا ہونے کے رہتے میں زخم، گاڑھا اور زرد رنگ کا سفید پانی نکلنا۔

آر ام مسٹ۔ ۳۔ آر ام میو رینٹ ۳۔ سفوف پلین ۶۔ میو ریکس ۶۔ ٹیکس ۶۔ سسی سفیوگا ۶۔ سلفر ۳۔ علامات کے مطابق کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔

اصول: فرج کو دو تین مرتبہ ہمیشہ اچھی طرح دھونا چاہیے۔ رحم

کے منہ پر زخم رہنے، اس گنے پانی کے ساتھ ایک حقہ ہائیڈرائسٹس ۵۔

ملا کر دھو ڈالنا چاہیے۔ جب تک یہ بیماری اچھی نہ ہو جائے تب تک جماع

کرنا۔ یا اگر خوب کس کر کیرے پہننا مناسب نہیں ہے۔ روز دقت مقررہ پر نہانا

مقوی چیزیں کھانا اور مقررہ وقت پر محنت کرنا مناسب ہے۔

(د) رحم سے اخراج خون (METORRHAGIA)

حیض کے علاوہ دوسرے وقت اگر تھوڑا یا زیادہ خون جاتا ہو تو

’رحم‘ سے ’اخراج خون‘ کہتے ہیں۔ حیض کے خون سے اسکا کوئی تعلق

نہیں ہے۔ اس لئے حیض کے ساتھ یا اس کے پہلے یا بعد میں بھی یہ موجود رہ

سکتا ہے۔ اس میں زیادہ اور ار حیض کی طرح زیادہ یا تھوڑا خون بھی جاسکتا

ہے۔ رحم میں پھنسیاں، ولادت کے بعد خون نہ نکلنا۔ چوٹ لگنا وغیرہ

اسباب سے ایسا ہوتا ہے۔ سستی، بھوک نہ لگنا۔ بیٹھ جانے پر

اٹھ نہ سکتا وغیرہ اس کے خاص علامات ہیں۔

نکلا ہوا خون اگر لال رنگ، یا کالا بھی ہو سکتا ہے۔ سرخ رنگ ہونے پر۔

شرائین کا اخراج خون اور سیاہ یا بیگنی ہونے پر اسکو وریڈ کا اخراج خون سمجھنا چاہیے۔

علاج

ٹھہر ٹھہر کر درد کے ساتھ چمکدار خون میں، سیاہ ۳۳-X۔

بغیر درد کے سیاہ اخراج خون میں بھی میلس ۳۳-X۔ چوٹ کی وجہ سے بیماری ہونے پر آرٹیکا ۳۳-X۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یا اسقاط حمل کے بعد سکیل ۳۳۔ زیادہ چمکدار سرخ خون۔ پیٹرو میں بچہ جننے کی طرح درد۔ فاکس ریلی جیاسا۔ ۳۱-X سیاہ ڈھیلا ڈھالا خون گرنے کے ساتھ بہت زیادہ درد ہونے پر، کیو ملا۔ حیض ختم ہو جانے کے بعد ہی بہت روز تک زیادہ خون جانے کیلئے۔ روزنگامائی نر۔ ۳۰۔ بیماری لا علاج ہونے پر جب کسی دوا سے فائدہ نہ ہو تو کھسلا سی، دارسا پیکٹورس ۱۱-۳۲-X۔

مزمین بیماری میں سلفر ۳۰۔ سپیا ۳۰۔ آرج نائی ۶۔ ہاپوسیا مس ۶۔ لیکس ۶۔ اور کثرت طمث۔ بندش وغیرہ۔ بیماریوں کی دوائیں علامات کے مطابق اس بیماری میں دی جاتی ہیں۔

(س) اجتماع خون یا آب ریاخ

درم وغیرہ کی وجہ سے رحم میں ریاخ جمع ہوتی ہے۔ اور رحم میں دباؤ پڑنے سے وہی ریاخ پچھیں پچھیں آواز کے ساتھ باہر باہر نکل جاتی ہے اسی کو اجتماع ریاخ (PHYSOMETRA) کہتے ہیں۔ برومان ۳۰-۶۔ بیلا ڈونا ۳۳-X۔ ایسڈ فاس ۳۰۔ یا لائیگو ۱۲۔ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ رحم۔ اور زخم خشک ہونے سے کسی کسی عورت کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ رحم کا منہ بند ہو جانے پر رحم آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی دھمکنی والی جھلی سے پانی یا خون نکلتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے رحم میں اجتماع آب (HYDROMETRA) یا اجتماع خون (HEMATO-METRA) ہوا کرتا ہے۔ سپیا ۶۔ ۳۰۔ اجتماع آب میں کلکیر یا کارب ۶۔ کاربود ۲۰۔ اجتماع خون کی بہترین دوا آرد دوائیں ہیں۔

(UTERINE TUMOURS)

(س) رحم کی رسولی

کبھی کبھی رحم کے جسم پر یا رحم کے گھڑے میں کئی قسم کی پٹھیاں ہوجاتی ہیں۔ ان کی شکل مٹرنائش سے لے کر نصف من تک، اور یہ شمار میں ایک سے پچاس تک ہو سکتی ہیں کسی پھنسی سے خون اور مواد نکلتا ہے۔ اور کسی سے خون نہیں نکلتا۔ کبھی کبھی سفید پانی بھی موجود رہتا ہے اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو کر بائچھ پن تک ہو سکتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

کلکیر یا آیوڈو ۳۳ x سفوف۔ ایک گریں فی خوراک (دن میں چار بار کھانا چاہیے۔ ہر قسم کی پھنسیوں کی یہ اچھی دوا ہے۔ اس سے فائدہ نہ ہونے پر ٹیکس۔ ۳۔ کارسٹون۔ ۲۰۰۔ سٹاکا ۶ x۔ سفوف بیکیل ۱ x۔ بھلاپی۔ ۲ x۔ ہائیڈروکسیٹیم ۲ x۔ سفوف۔ وغیرہ دوائیں وقتاً فوقتاً ضروری ہوتی ہیں۔

(UTERINE CANCER)

سرطان رحم

یہ شک ہونے پر کہ رحم میں پھنسی ہوئی ہے تھو جا ۳-۶۔ دینا چاہیے۔ لیکن تشخیص ہوجانے پر ہائیڈروکسیٹیم اسٹس کوشن کا باہری استعمال اور ایک ہفتہ یا دو ہفتہ کے بعد کارسیٹوسیم ۳-۶۰۰ استعمال کرنا چاہیے۔

آرٹک آیوڈو ۶۰۰۔ رحم میں سرطان (CANCER) کی شروع حالت میں تھو جا ۳۰۰۔ اگر سرطان کی شروع کی حالت گزر گئی ہو۔ اور آرس آیوڈو سے فائدہ نہ ہو تو آتشک سے پیدا ہوئے سرطان میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔

روٹا ۴۰۔ دودھ کی شکر کے ساتھ صرف ایک خوراک دو ہفتہ بعد

ایپ ہوٹرنیم ۳۰۔ (زیادہ اخراج میں) وغیرہ دواؤں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے (مرض سرطان ملاحظہ ہو)۔
(ص) میلان رحم۔ رحم کا مل جانا۔

(DISPLACEMENT OF THE UTERUS)

بہت زیادہ محنت، بھاری چیزیں اٹھانا۔ بہت دیر تک اکڑو بیٹھنا یا خانہ ہوتے وقت کہ تھنا بجھ جینے کے بعد ہی اٹھ بیٹھنا۔ قبض۔ ہمیشہ جلاب

لینا۔ بہت محنت۔ بوا سیر، قے۔ کس کرکٹرے پہننا۔ اچھلنا۔ کودنا۔ اور
چوٹ وغیرہ اسباب رحم کبھی کبھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔ اسی کو نافت
مٹنا کہتے ہیں۔ یہ عموماً دو قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) اپنی جگہ سے ہٹ کر پیڑو میں رہنا۔

(۲) فرج کے بائرنکل آنا۔ ان دونوں طرف کے نافت ہٹنے کی بیماری میں رحم تو سامنے
کی طرف جھک جاتا ہے۔ یا پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے (یا اتر جاتا ہے)۔
پیڑو میں درد (رحم جگہ میں) پیشاب، یا غانہ میں تکلیف۔ سیلان الرحم
اخسراج خون یا لکی خون، بندش حیض، مائچہ پی، وغیرہ اس
بیماری کے علامات خاص ہیں۔

اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کار آمد ہیں

سیا ۱۲۔ اس بیماری کی بہت اچھی دوا ہے۔ آرم مٹ X۳۔
سفوف۔ کلکیر یا کارب X۱۲ سفوف۔ بیلا ڈونا X۳۔ سی سی فیو۔
فیرم آلود۔ X۳ سفوف، سیکیل ۶۔ کاسٹیکم۔ ۳۔ شیٹم ۶۔ علامات کے
مطابق ضروری ہو سکتی ہیں۔

بہت اترنا۔ چڑھنا اور گھومنا منع ہے۔ اسی ترکیب کرتی چاہیے۔ تاکہ
قبض دور ہو جائے اور پاخانہ آسانی سے ہو جائے۔

جن وجوہات سے یہ بیماری اچھی ہوتی ہے ان کو ترک کر دینا چاہئے ہر وقت
ہو میو پیٹھی دوا سے یہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہو میو پھیٹھک
دوا کے ساتھ مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کر کے بیماری دور کرتے ہیں۔

مریضہ کو نصف ٹیکر اسکی ران سینہ کی طرف اٹھا کر اپنی انگلی سے تھوڑا
دبا کر اپنی ہتھیلی سے دھکتے ہوئے رحم کو اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ اپنی جگہ پر جب
رحم پہنچ جاتا ہے تب چند دنوں تک سیری (PESSARY) پہننا مناسب ہے

PESSARY سیری ایک قسم کا آہ ہوتا ہے پہنے سے رحم اپنی جگہ سے نہیں مٹتا۔ اسے مقام ہی پر
رہتا ہے (HODGE'S PESSARY) یا (RING PESSARY)

(ط) رحم کے دوسرے علامات

- (۱) رحم میں درد، سسی مینیوگا X۳ اور میگنٹیا میوریا ٹیکا۔ ۶
- (۲) رحم میں آماس:- اکثر ہیٹ بیچ والی (خاصکر پورٹی) عورتوں کے رحم میں آماس آجاتا ہے۔ آرم میوریا X۶۔ سفوف یا سپیا۔ ۶
- (۳) رحم میں زیادہ اجتماع خون، بیلاڈونا ۳۔ سبائٹا X۳۔ وراٹرم وراسیڈ X۲۔ اور لیلیم ٹیک ۴۔ ۳۔
- (۴) رحم نکلتا: سپیا۔ (کچھ خون کے ساتھ) میوریکس یا پیرلوریا ۶۔
- (زیادہ حقیق) کلیریا کارب ۴۔ ۳ (مرمن بیماری میں زیادہ اخراج)
- آرم بٹ (مرمن مرض میں رحم سخت (INDURATED) ہو جانے پر)
- ہیلونی ایس۔ ۵۔ (کنزوری کے ساتھ یا بچھ پن اور سیلان الرحم) مرک بول ۶
- آیوڈ ۶۔ ہائیڈروکوٹامیل X۱۔ (۵) رحم ٹھنڈا (GANGRENE) آر ۶۔
- کاربوج ۴۔ ۳۔ سیکن ۳۔ ۳۔ یا کر یا رڈ ۶۔
- (۶) رحم سے اخراج خون، رحم، کا ادرار حقیق ملاحظہ ہو۔

(۷) امراض خبیثہ الرحم

(DISEASES OF THE OVARIES)

- خبیثہ الرحم کی بیماریوں میں چار مخصوص امراض کا بیان ترتیباً مسند ذیل ہے۔
- (۱) سوزش خبیثہ الرحم (ب) درم خبیثہ الرحم (ج) عصبی درد خبیثہ الرحم
 - (د) خبیثہ الرحم میں دلنے (س) خبیثہ الرحم کے دوسرے علامات۔

سوزش خبیثہ الرحم (OVARITIS)

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ حاد اور مزمن، جوٹ لٹا۔ تیز متلی حقیق کے وقت سردی لگتا یا جگمگت کی وجہ سے حقیق بند ہو جاتا وغیرہ۔ اسباب سوزش حاد۔ خبیثہ الرحم پیدا ہوتا ہے ان کے جوڑ کے کچھ اور۔ (پیٹ کے خوب اندر درد اور بڑا ہٹ! ریلے یا حرکت کرنے سے بڑھنا بخارا تھے! جماع کی خواہش وغیرہ اس مرض کے خاص علامت ہیں۔

لہٰذا اسی لئے اس ملک میں حالت میں روز نہانا اور جماع کرنا ممنوع ہے

علاج حاد سوزش

ایکونائی: ۳۰ x سردی لگنے کی وجہ سے حیض بند ہو کر سوزش پیشاب میں بہت تکلیف دے پس ۶۔ دائیں خصیۃ الرحم کی سوزش بڑھنا مارنے کی طرح درد۔ تھوڑا پیشاب۔ پیاس نادر؛ لیکے ۳۰ x بائیں جانب کی خصیۃ الرحم کی سوزش مواد۔ مقام رحم میں مواد؛ دباؤ برداشت نہ ہونا۔ یہاں تک کہ کپڑا لگنے سے تکلیف۔ دوسری دوائیں:۔ بیلڈونا ۳۰ x (خاص کر موئی چھنے کی طرح درد ہونے پر) مرک کار ۶؛ پلس ۶۔ یہی پلس ۶۔ کالو سنتھ ۶ فیروم فاس ۱۲ x۔ خوف وغیرہ ادویات علامات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔

علاج سوزش مزمن :-

کو نیم ۶۔ خصیۃ الرحم سخت (یعنی مواد نہ پڑے تک) تھوڑا خون حیض نکلتا۔ اور بانجھ پن۔ خصیۃ الرحم کی سختی۔ اگر کو نیم سے نہ اچھی ہو تو پلاٹینا ۶۔ گریفائٹس ۳۰۔ تھو جا ۶۔ (خاص کر بائیں خصیۃ الرحم کے سخت ہونے پر۔ آرام میور ۳۔ سفوف؛ یلیم ۶ کاکیر یا فاس ۶۔ یا سیمی سفیو ۳۰۔ دینا چاہیے۔ لیکس ۶۔ خصیۃ الرحم میں مواد پڑنا۔ ڈاکٹر ہیوز کی رائے سے صرف لیکس پر اس پھوڑے میں جس میں مواد بھرا ہو۔ بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہیوز کی رائے ہے کہ مواد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو مرک کار؛ مواد پیدا ہونے پر؛ ہیر اور سلکا اور مرغینہ بہت مواد نکلنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہو تو چائنا یا فاسفورک ایسڈ دینا بہتر اور مناسب ہے۔ یہ ادویات ۶۔ طاقت کی کام میں لائی جاسکتی ہیں۔

جریان کے ساتھ سوزش خصیۃ الرحم :-

نائیٹرک ایسڈ ۶۔ ۳۰۔ آرام مٹ ۳۰۰۔ ۲۰۰۔ پلس ۳۰۔ ۳۰۔ مرک سول ۶۔ اگر پہلے پارہ کام میں نہ لایا گیا ہو۔ تھو جا ۳۰۔ ۲۰۰۔

اصول :- آرام کرنا اور ہلکی غذا کھانا مناسب ہے۔ مجامعت منع ہے۔ خشک سینکے (DRY FOMENTATION) سے درد کی تکلیف کم ہوجاتی ہے۔ (ب) استسقا خصیۃ الرحم (OVARIAN DROPSY)

پانی کی طرح مواد بھرا آئاس۔ (استسقا) کبھی کبھی خصیتہ الرحم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو خصیتہ الرحم کا آئاس کہتے ہیں۔ مریضہ کے جسم میں بوجھ معلوم ہوتا۔ پیٹ میں آئاس بالکل ایسا معلوم ہوگا یا حل ہے، یا خاندہ۔ پیشاب، آئاس میں تکلیف، پستان میں دودھ، جمع ہونا وغیرہ علامات کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔
علاج :- اے پس ۳۔ اور آیوڈ ۶۔ اس کی خاص دوائیں ہیں۔

اے پس ۳۔ خصیتہ الرحم میں ڈنک مارنے کی طرح درد پیٹ پھولا۔ حقوڑا پیشاب۔ پیاس کی کمی وغیرہ علامات میں۔

آیوڈ ۳۰۔ دائیں خصیتہ الرحم سے رحم تک چبھونے کی طرح درد۔ ایسا معلوم ہونا۔ گویا نرج کے راستہ سے سب باہر نکل جائیگا۔ زخم پیدا کرنے والا سیلان الرحم، خصیتہ الرحم، اور دونوں پستان خشک۔

آرم میور نیٹرونیٹم ۳۰ x پلاٹینا ۳۰۔ کیلی بروم ۱۰ x۔ سفوف۔ آر سے نکم ۶۔ اور گریفائٹس ۶۔ ایکس ۴۔ سیکیل ۳۰۔ لائیکوپوڈیم ۶۰۔ زرنکم ٹیائیکم ۶۔ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔

(ج) درد عصبی خصیتہ الرحم (OVARALGIA)

یہ عصب سے پیدا ہونی تکلیف ہے۔ اس کا سبب خصیتہ الرحم کا ورم وغیرہ نہیں ہے۔ یکایک درد پیدا ہو کر چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ تے نفع، شکم، چکن قلب، پیشاب کم آنا، اس مرض کی خاص علامت ہے۔

علاج :- ناجا ۶۔ اس مرض کی اچھی دوا ہے۔ صرف اسی پر بھروسہ کر کے بہت سی مریضہ شفا یاب ہوئی ہیں۔ درد تو لچ کے حملہ کی حالت میں اظہر بیا ۳۰ x سفوف۔ اور نوبت نہ ہونے کے وقت زرنکم ۶ ویریا نہ ۳۰ x دے کر ڈاکٹر لڈلام نے بہت سے مریضوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔

اسٹے فی سیگریا ۶۔ دمائی تحریک سے پیدا ہونی بیماری میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھیک نہ مناسد ہو کر درد عصبی ہے یا سوزشی تو ہی ملیس ۲۰ x کاؤسنتھ ۶۔ میگنیشیا فاس ۳۰ x ۱۲ x سفوف (گرم پانی کے ساتھ) استعمال کرنی چاہیئے۔ (جاء اور دمائی تحریک منع ہے۔)

(OVARIAN TUMOURS) خصیتہ الرحم میں رسولی

خصیتہ الرحم میں کبھی کبھی پھوڑا ہوتا ہے۔ خصیتہ الرحم میں بے حد تکلیف۔ سیلان الرحم؛ بخار وغیرہ علامات ہونے میں پیٹ بڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی استسقا اور رحم اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے۔ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ مناسب وقت پر علاج نہ ہونے سے مریض مرجاتی ہے۔

بیلاڈونا ۳؛ آلوڈا ۱؛ اے پس ۲۰۔ کیلی بروم ۱۰۔ سیکیل ۱۔ کالوسنتھ ۳۔ یکے سبب

۳۔ آرم میور نیٹرونیٹم ۲۔ وغیرہ علامات کی مطابق دینا چاہیئے۔

(۱) خصیتہ الرحم کے دوسرے علامات

(۱) خصیتہ الرحم کا مقام سے ہٹ جانا۔ میوفو ۶۔ کو نیٹم ۶۔

(۲) خصیتہ الرحم میں سرطان (CANCER) آرس ۳x۶۔ کریازوٹ ۶۔ ایکس

۳۰۔ وغیرہ ادویات مفید و کارآمد ہے۔

(۳) خصیتہ الرحم میں سختی۔ (فرمن حالت میں آرم میور نیٹرونیٹم ۳x۶۔ سفوف۔ پلاٹینم ۳۰۰۔ گریفائٹس ۶۔ ۳۰۔) (کئی حیض کے ساتھ خصیتہ الرحم کی سختی)

(۴) خصیتہ الرحم کا موٹا ہو جانا (HYDATID) مرکب ۳۰۔ کینتھر (۶)۔

(۵) خصیتہ الرحم میں درد۔ سیسی سفیوگا ۳۰۔ (شروع جوانی میں خصیتہ الرحم میں

درد۔ نا جا ۳۰۔) (خراش لگنے کی طرح تیز درد) (سیسی میٹس ۳x۶) (خصیتہ الرحم میں

درد۔ آماں تشخ حیض کے وقت تکلیف بڑھنا۔ زیادہ اور ار حیض۔ حالت حمل

یا زیاں کینتھر ۳۰۔ جن کے ساتھ درد بلیٹم لگ۔ ۳۰۔) (خافہ کر بائیں خصیتہ الرحم

میں درد۔ رحم میں بچہ جننے کی طرح درد۔) (آلات تناسل کی تحریک)

مپس ۳۰۔ (کئی حیض کے ساتھ خصیتہ الرحم میں درد اور سوزش؛ پلیدیٹیم ۶۔

دائیں خصیتہ الرحم میں درد؛ دبانے سے کم ہونا، ایکس ۶) (خصیتہ الرحم میں

درد۔ رحم میں بچہ جننے کی طرح درد؛ رحم کا سفید کھلا معلوم ہونا) (اے پس؛

ڈنک مارنے کی طرح درد؛ کالوسنتھ ۳x۶) (خصیتہ الرحم کا قونی درد)۔

ہیپر ۶۔) (خصیتہ الرحم میں درد اور حس ہونا۔) (دائیں خصیتہ الرحم کے امراض میں،

بیلاڈونا ۳۔ کلکیر یا کاوب ۶۔ سیپا ۶۔ لاسیکو ۱۰۔ اے پس ۳۰۔

(۷) د بائیں خفصۃ الرحم کے امراض میں: بیکسس، بلیسٹیک، سیریکل کارب، سٹراٹومیا۔
 (۸) خفصۃ الرحم کے امراض میں: - کوئیم ۳-۷۔ (کسی حیض یا دیر سے حاملہ ہونے پر)۔
 پلاٹینم ۳-۷۔ (مزن مرض میں)۔ درم یا تحریک کے ساتھ زیادہ حیض ہونے میں)۔
 آر میور نیٹر ۳-۷۔ (مزن مرض میں خفصۃ الرحم سخت رہنے پر)۔

(۴) فرج کی بیماریاں

(DISEASE OF THE VAGIN)

فرج کی بیماریاں میں مندرجہ ذیل امراض کا بیان کیا جائے گا: (۱) فرج کی سوزش
 (ب) فرج کا تشنج (ج) فرج کا بند ہونا (د) فرج کا باہر نکل آنا
 (س) فرج میں خارش (ہ) فرج کے دوسرے امراض

(VAGINITIS)

فرج کی سوزش

فرج کا زینک سرخ، گرم، آماس، درد ہو کر مواد نکلتا ہو۔ اور اس کے
 ساتھ ہی اگر پیشاب ہونے کے وقت تکلیف رہتی ہو اور فرج میں کھجلی ہو تو
 سوزش فرج سمجھنا چاہیے۔ مرض سوزاک کا مواد نکلتا، زیادہ مجامعت،
 زنا بالجبر، ولادت کے وقت وقت چوٹ، خون خراب ہونا، فرج میں گرمی کا داخل
 ہونا، سردی لگنا وغیرہ اسباب سے فرج کی سوزش ہوتی ہے۔ اس مرض میں
 اکثر حیض بند ہوتا۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) حاد سوزش فرج

(۲) مزمن سوزش فرج

حاد سوزش: چارے کے ساتھ بخار، کمر دان، اور چوڑے میں بوجھ معلوم
 ہونا، اور درد، فرج سے ہلنم نکلتا، تغیر البیل وغیرہ

علامت: سردی سے سوزش ہونے پر ایکونائٹ ۳-۷۔ اس کے بعد
 مرکوریس ۳۔ فائدہ کرتا ہے سوزاک سے پیدا ہونے پر سیپا ۲-۱ اور
 چوٹ سے پیدا ہونے پر آرنکام۔ استعمال کرنا چاہیے۔ پیشاب کی تکلیف
 اگر زیادہ ہو تب نیٹر ۳-۷ دینا چاہیے۔

مرضیہ کو کسی حالت میں چار یا پنج روز تک بستر سے نہ اٹھنا چاہیے۔
 مزمن سوزش فرج میں: فرج کے اندر دینی بلغمی جھلی میں نیلگوں سرخ

رنگ کی کھجلی پر لدا ہوتی ہے۔ فرج کا ڈھیلا ہو جانا۔ اور اس سے سفید۔
پیل۔ مختلف رنگ کا زیادہ پانی نکلنا مزمن سوزش کے علامات ہیں۔

اس میں مسد جاذب اور دوائیات مفید و کارآمد ہیں۔

مرکبوریس ۳۔ اور سیپیا ۲۔ سفوف۔ ڈاکٹر جو سوکرائے ہے کہ مزمن
سوزش کی یہ دواؤں مخصوص دوائیں ہیں۔

بوریکس ۲۔ سفوف۔ بہت زیادہ مواد نکلنا۔

نائٹرک ایسڈ۔ مواد جلن۔ اور زخم ہونے پر یا پھنسیاں رہنے پر یا بارہ سے
زیادہ نقصان ہونے پر کلکیریا ۶۔ پلس ۶۔ کریوزوٹ ۶۔ اگنیشیا ۲۔ (سوزش
کے ساتھ ہسٹریا) اور سفوف ۳۔ بیج بیج میں ضروری ہوتے ہیں۔

(ب) فرج کا تشیخ (VAGINISMUS)

کسی کسی لوجوان عورت کی فرج رنگ و سنے کی وجہ سے اور اس کے ڈھکنے والی

(HYMEN) جھل میں قوت جس کی زیادتی (HYPERAESTHESIA)

ہونے پر چاروں طرف کے عضلات یکایک سکڑ جاتے ہیں اسی کو فرج کا
تشیخ یا سکڑیا کہتے ہیں۔ جماعت کے وقت مرد کا آہ تناسل فرج میں
جان نہیں سکتا۔ اور عضلات میں تشیخ پیدا ہو کر شدت کا درد ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ مریضہ اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے۔

شادی کے بعد بہت سی دلہنیں اسی لئے سسرال جانا نہیں چاہتیں۔
ان کے گھردلوں کو اس کا اصلی سبب معلوم کرنا چاہیے۔

سدا کا ۶۔ نکس دامیکا ۶۔ سیلا ڈونا ۶۔ اور اگنیشیا ۶۔ اس مرض کی
خاص دوائیں ہیں اگر جسم میں کسی طرح سیمہ کا زہر (LEAD POISON)
پہنچ گیا ہے تو پہلے ۶۔ دینا چاہئے۔

ایک طب میں مریضہ کو بٹھا کر کمر تک گرم پانی بھردیا جائے اور مریضہ
کچھ دیر تک بیٹھی رہے تو فائدہ ہوگا۔

مرض جب تک بالکل اچھا نہ ہو جائے اس وقت تک جماعت کی ممانعت ہے

(ج) فرج کا بند ہونا (IMPERFORATE HYMEN)

فرج کا منہ بند رہنا یا پردہ بکارت (HYMEN) سخت رہنا۔
یا اس میں سوراخ ہونے کا نام فرج کا بند ہونا ہے۔

۱۱: ہاں فرج کا اندرونی حصہ بند رہنے پر یا پردہ بکارت سخت رہنے پر۔
بھی اور رخصتی میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا۔ صرف فرج میں مرد آلات تناسل
داخل نہیں کر پاتا۔ اس لیے جب تک مرد کا ساتھ نہیں ہوتا۔ اس وقت تک
عورتوں کو اس بیماری کا پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ نہ ان کو کسی قسم کی تکلیف ہی محسوس
ہوتی ہے۔ انکی یا مرد کے آلات تناسل کے دباؤ سے یہ جھلی آسانی سے پھٹ جاتی
ہے۔ اگر آسانی سے نہ پھٹے تو نشتر لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

۱۲: اگر پردہ بکارت میں سوراخ نہ ہو تو اور رخصتی میں رگڑاؤ ہو جاتا ہے
اس کا وقت پر عمل کرنا مناسب ہے۔

(Probe) سنان سے سوراخ کر دینے پر اور رخصتی ہوئے لگتا ہے۔
لیکن جامعیت کے لئے متذکرہ بالا ترکیب کام میں لانی چاہیے۔

(د) خروج فرج (PROLAPSUS VAGINAE)

خروج رحم کے ساتھ کبھی کبھی فرج بھی نکل پڑتی ہے اس کو خروج فرج کہتے
ہیں مگر میں سخت پافانہ جمع ہونا یا مثلاً نہ میں آگاس ہونا یا تکلیف دہ
سیلان الرحم کے درجے بعد فرج باہر نکل پڑتی ہے۔

یہ عورتوں میں بوجھ معلوم ہونا اسکی خاص علامت ہے۔

اسٹیم ۶۔ اور کریا ۷۔ اس بیماری کی خاص دوائیں ہیں۔

سیپا ۳۔ (معد میں ایسا بوجھ محسوس ہونا کہ پیٹ کی سب چیزیں باہر
نکل پڑیں گی) آد کا ۳۔ رچوٹ یا جراثیم کی وجہ سے مرہن ہوں

مرک ۶۔ بیلا ڈوتا ۳۔ ایکس ۶۔ سلفر ۳۔ پس ۶۔ کی کبھی کبھی

ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب نہایت مفید اور کارآمد دوائیں ہیں

کچھ دیر تک ٹھیس لگا کر سوتا چاہیے۔ رات میں پندرہ منٹ بعد ستھوڑے
پانی میں بیٹھنے سے فرج آسانی سے اندر چلی جاتی ہے۔

(PRURITUS VULVAE) (دس) خارش فرج

جسم کمزور ہو جانے سے فرج کے بیرونی حصہ میں مختلف قسم کی پھنسیاں پیدا ہو کر بہت تکلیف دہ کھجلی ہو جاتی ہے۔ اسی کو خارشت کہتے ہیں۔
جلن پیدا کرنے والی ناقابل برداشت کھجلی اور پھنسیاں اگر کم معلوم ہوں۔
ہوا سیر: بے حد کھجلی، رات میں زیادتی، برقان، سفید دست وغیرہ
پانی بھری پھنسیاں، یٹرن شروع ہو۔

کلیڈیم ۶۔ مرکوریس ۶۔ نائیٹرک ایسڈ ۳۰۔ لائیو کو ۱۲۔ کاربو وچ ۳۔
نیٹرم میور ۳۰۔ بیکس ڈامیکا ۶۔ سیپیا ۱۲۔ پٹرولیم ۶۔

ماؤف مقام ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ کلیڈیولا ۱۰۔ ایک حصہ پانی دس گنا
دولوں کو ملا کر فرج کو در تین مرتبہ روزانہ دھو ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد
کلیڈیولا ۱۰ گیس کے ساتھ صاف روئی میں لت کر کے فرج میں رکھ دینا اچھا ہے۔
فرج میں کانٹے کی طرح بالی ہوں تو انہیں پہلے نکال کر تیب دو الگ کرنا چاہیے۔

(دس) فرج کے دوسرے امراض

(۱) فرج میں دانے: کاربواینی ۳۰۔ ۳۔ کاربو وچ ۶۔ ۳۰۔ آرٹنک ۶۔
کریازوٹ۔

(۲) فرج سے ریاح کا اخراج: برومیم ۳۰۔ ۳۰۔

(۳) فرج میں دانے دار رسولی ہونے پر براٹا کارب ۶۔ سلکا ۳۰۔

سیپیا ۶۔ سلفر ۳۰۔ یا کیلک کارب ۶۔

(۴) فرج کے پھوڑے سے خون ہونے پر: ٹیکٹس۔ ٹیکٹائی ۳۰۔

ناقابل برداشت درد۔ آرٹنک ۳۰۔ چوٹ یا جراثیمی وجہ سے اخراج خون۔
ٹیکس ۳۰۔ (اخراج ہمیشہ بدلتا رہے) فاسفورس ۶۔ ٹیکس ۶۔ کریازوٹ ۶۔

(۵) فرج کی سٹن۔ آلس ۶۔ بیلاڈونا ۳۰۔ ٹیکس ۶۔

(۶) فرج کی سختی۔ بیلاڈونا ۳۰۔ کوئیم ۶۔

(۷) فرج میں ناسور۔ سلفر ۳۰۔ کیلک کارب ۶۔ لائیو کو ۳۰۔ سلکا ۶۔

ہیپر سلفر۔ آرمٹ ۶۔ تھوچا ۳۰۔ سیپیا ۳۰۔ ٹیکس ۶۔

(۸) فرج کے ارد گرد بوجھ یاد باز محسوس ہونا اور اس کے ساتھ بہت درد اور تشنج۔ سلا کا ۶۔۳۰۔

(۹) مجامعت کے وقت فرج میں سخت تکلیف۔ اسٹانی سیگریا سو۔۳۰۔
 ۱۱۰ فرج میں زیادہ ہونا ایلیومینیا۔ ۳۔۲۰۰۔ (فرج میں بہت تشنج اور مختلف قسم کے آماس کی وجہ سے اس کا سکڑا رہنا) کا داخل استعمال اور بھی میلس ۵۔ (ایک ڈرام ایک آؤنس پانی کے ساتھ) کے لوشن میں ملائم کپڑوں کے ٹکڑوں کو بھگو کر رات میں سونے کے وقت فرج میں رکھ لینا۔ اور صبح نکال کر پھینک دینا مناسب ہے۔

(۵) بانجھ پن (STERILITY)

عورت میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت کا نہ ہونا ہی بانجھ پن کہلاتا ہے۔ عورتوں کے آلات تناسل میں (یعنی خصیتہ الرحم یا فرج میں) متذکرہ بالا بیماری ہونے سے لڑکا نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اچھی طرح علاج کیا جائے تو بیماری اچھی ہونے پر بچہ ہو سکتا ہے۔

کبھی کبھی مرد کی خرابی سے یا عورت کے آلات تناسل خوب مضبوط ہونے کی وجہ سے بانجھ ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر دو اکھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن متذکرہ بالا اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہ ہونے پر مندرجہ ذیل دوائیں استعمال کرنا چاہیے۔ کو نیم ۴۔ بانجھ پن دور کرنے کی بہت اچھی اور کامیاب دوا ہے (خاص کر خصیتہ الرحم کی کمزوری یا کمزوری کی وجہ سے بانجھ پن ہو) محقرہ اخون نکلنا اور دونوں پستان میں درد۔
 بوریکس ۶۔ جس میں بانجھ پن میں تیز سیلان الرحم بھی ہو۔

آیوڈ ۶۔ (سیٹان سکڑے رہنے پر) سیپا ۳۔ فاسفورس ۳۰۔
 آرم سو۔ نیٹرم میٹور ۳۰۔ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

اصول:۔ بہت دنوں کے ناغہ کے بعد جہاں کرنا چاہیے۔ اگر مرد کی خرابی کی وجہ سے بچہ نہ ہوتا ہو تو مرد کو بھی کو نیم ۳۔ یا آیوڈ ۶۔ استعمال کرنا چاہیے۔ (مرض نامردی ملاحظہ ہو)۔

(DISEASES OF THE BREAST) امراض پستان

(IPAL) درد پستان

حالت حمل یا سیلان الرحم کے سارے بھی اکثر دونوں پستان میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ درد وجع مفاصل کی وجہ سے یا اعصاب کی خرابی سے ہوتا ہے۔

گوینیم، ماہواری کے پہلے دونوں پستان میں درد۔ یا کم خون۔ حیض سنگینوئیر یا ۳۲- دائیں پستان میں اتنا درد کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے نہ سانس لی جائے۔ (کنواری غیر شاہی شدہ) بڑکیوں کے پستان میں (خاص کر بائیں پستان میں) بہت درد ہونے میں، سیسی سفیوگا ۳۳- حیض ہونے کے ایک ہفتہ پہلے سے پستان میں درد، اور زیادہ خون حیض ہونے پر کلکیر یا کارب ۶- ۲۰۰- پستان میں درد کیلئے تھوڑے اور ار حیض کی علامت میں پستان ۳۰-

پستان میں درد کے ساتھ سیلان الرحم میں سیانو نخس ۱۰- ۲۰۰- پستان میں زخم ہونے کو ہو، آرنگا ۳۳- زخم ہونے پر سلفر ۳۰- وجع مفاصل سے پیدا ہوئی بیماری میں، این کیوس ۲۰- بچہ جننے کے بعد امراض پستان، پستان میں تکلیف، ملاحظہ ہو۔

(ABSCESS) اب، پستان میں پھوڑا

بیلادونا ۳۳- (پھوڑا ہونے کی علامت میں) پستان سخت، سرخ پھرنے اور ان میں درد۔ مریا یو نیا ۳۳- بیلادونا کے علامات کی بنسب پستان زیادہ کڑے بہت تکلیف۔ فانی ٹولکا۔ اگر برائی اوئیا سے دودن تک فائدہ نہ ہو، فانی ٹولکا۔ دس گئے گرم پانی کے ساتھ (کا خارجی استعمال)۔

ہیپرسلفر ۶۶- مواد پیدا ہونے پر اسی کی پولش یا گرم کیبنڈیولا۔ دس قطرے ایک آؤنس پانی کے ساتھ (کا خارجی استعمال)۔

سلکا۔ ۳- پھوڑے کے بعد زخم (sinus) امراض پستان کی سوزش اور پستان کی گھنڈی میں زخم ملاحظہ ہو۔

(FUMOUR) پستان میں دانے یا رسولی

فانی ٹولکا ۳۔ مزمن رسولی کی اچھی دوا ہے
خارجی استعمال۔ فانی ٹولکا ایک حصہ دس گنے پانی سے ساتھ ملا کر
پستان پر پٹی تر کر کے باندھ دینا چاہیے۔

(CANCER) سرطان پستان

ہائڈراسٹس ۱۔ یہ سرطان کی ایک اچھی دوا ہے۔ ہائڈراسٹس ۵۔
ایک ڈرام چار آونس پانی میں ملا کر کے گوش خارجی استعمال کرنا چاہیے۔
آرسنک ۳۔ یا آرسنک آئیوڈ ۳۔ اس مرض کی یہ دوسری اچھی دوا ہے
کوئیم ۳۔ یا سالیکیوٹا ۳۔

اگر آرسنک کے دو ماہ تک استعمال کرنے سے بھی فائدہ نہ ہو۔

امراض ورم پستان، پھوڑا یا امراض ابھارے اور سرطان ملاحظہ ہو۔

(SPINAL IRRITATION) ورم ریڑھ

حسم دبلا ہو کر خاص کر ریڑھ کے مقام میں بہت درد ہوتا ہے۔ اسی کا نام
ورم ریڑھ ہے۔ اس مرض کی خاص علامت یہ ہے کہ درد کی جگہ کو دبائے سے
درد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔

آرنیکا ۳۔ چوٹ کی وجہ سے ورم۔ رسٹاکس ۶۔ پتی کے ساتھ درد۔
میمی سفیوگا ۶۔ رحم کی کسی بیماری کے ساتھ ورم۔

آرسنک ۶۔ عصبی درد کے ساتھ ورم
ٹائیوریم ۶۔ سیکیل ۶۔ پچرک ایسڈ ۲۰۔ ایگاریکس ۶۔ آرنیکا ۶۔ تھو جابا ۳۔
سلا ۳۔ وغیرہ کی بھی کبھی کبھی ضرورت ہو سکتی ہے۔

اصول: تھوڑے گرم پانی سے پیٹھ دھو ڈالنا چاہیے۔ اور کھلی ہوا
بھی بہت مفید ہے۔ حرام مغز کی تحریک ملاحظہ ہو۔

(COCCYCODYNIA) دچی کی ہڈی کا درد

دچی کی ہڈی کے عضلہ اور تشنج میں کبھی کبھی اعصابی (NEURALGIA)
درد کی طرح درد ہوتا۔ اسی کو دچی کا درد کہتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اور پیاخانہ
جانے میں درد ہوتا۔ اس مرض کی خاص علامت ہے۔ چوٹ وغیرہ کے

سبب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علاج :- چوٹ کی وجہ سے ہو تو آرٹھرائٹس ۶x۳ یا روتھا ۳x۳ فائدہ کرتا ہے اگر چوٹ کی وجہ سے درد نہ ہو تو فاسفورس ۶ یا لیکس ۶ استعمال کرنا چاہیے۔ میٹھے رہنے کے بعد اگر کھڑے ہونے پر درد ہو تو لیکس ۶۔ ۳۰۔ زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ حرام مغز کی بیماری کے باب میں رورم ہڈی دہی، ملاحظہ ہو۔ عورتوں کے امراض آلتھک و سوناک وغیرہ کے لئے ہماری کتاب موسومہ جنینداریہ کے روگ، ملاحظہ ہوں۔

حل! و ولادت (PREGNANCY LABOR)

عورتوں اور مردوں کے آلات تناسل کے ملاپ کی وجہ سے عورتوں کے حل میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ اولاد دس ماہ اور دس دن تک حل میں رہتی ہے اس کے بعد ماں پیدا کرتی ہے۔ معالج کے علاوہ عوام اس قدر جانتے ہیں کہ اس طرح دس ماہ تک میں رہ کر اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ بہت اولاد کے والدین کو بھی ان سے پوچھنے ہی پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر انھوں نے اتنی اولاد پیدا کی ہے۔ لیکن خداوند عالم کے ہجہ پیدا کرنے کی قدرت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا علم نہ ہونے پر اولاد پیدا کرنے میں کوئی نقص نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے متعلق علم نہ ہونے پر ایشور کے دنیا پیدا کرنے کی قدرت کا بہت بڑا بھیدا ان کو معلوم نہیں ہے۔

اس قدرتی راز کے متعلق علم ہونے پر قدرت کے پیدا کرنے کا راز سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور عبود کے سامنے خود بخود سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔

صرف اولاد پیدا کرنا ہی والدین کے فرض کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ اولاد پیدا کرنے کے قبل ہر ماں باپ کو اولاد پیدا کرنے کا راز اور اس کی پرورش کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ ذمہ دار شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اُن کی نادانیت کی وجہ سے ماں کے بے وقت جننے کی وجہ سے ماں ہلاک ہو یا اولاد کی موت ہو جائے۔ یا ایسی اولاد پیدا ہو جس کے عضو کم ہوں یا زیادہ تو اس کی

مضامین مختصراً بنانے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ یہ مشکل بات آسانی سے سمجھ میں نہ آدے گی۔ مرد کے آلات تناسل کا نام قضیب ہے۔ اور عورت کے آلات تناسل کا نام فرج ہے۔ مرد کے آلات تناسل کا مددگار ایک عضو ہے جس کا نام بیضہ یا فوطہ ہے۔ جس میں انڈے کی طرح کی چیز بھری رہتی ہے۔ اور تفصیل کی طرح ایک چمڑا لٹکا رہتا ہے۔ بیضہ میں مرد کے کیڑے رہتے ہیں۔ یہ کیڑے دُم دار اور منخرک ہوتے ہیں۔ دُم ہا کی وجہ سے ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیڑے عام طور سے آنکھ سے نہیں دکھائی دیتے۔ ٹیکر اس کو پناہی آلہ کی مدد سے فوراً کی نکل ہوئی منی کی جابج کرنے پر یہ منی کے کیڑے اور اس کی حرکت دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منی۔ با آب زلال (ALB, MEN) میں (جو بیدار سفید چیز ہوتی ہے) تیرتا رہتا ہے۔ عورت اور مرد کے مباحث کے بعد یہ منی بیضہ سے نکل کر قضیب کے راستہ سے فرج میں گرتی ہے۔ عورت کے فرج سے یہ اپنی حرکت کو اوجہ سے دہانہ رحم کے راستہ سے رحم میں اور بعداً ترتیب وار یوقان میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں سے عورت کے اندر سے مل جاتا ہے۔ ملنے کے بعد مرد کی منی کے کیڑے کی دم لوٹ جاتی ہے۔

جوانی آنے کے پہلے مرد کا قضیب اور بیضہ اچھی طرح طاقتور نہیں ہوتا۔ یا بیضہ میں منی یا مرد کے بیضہ میں پورے طور سے یعنی بیضہ کا طاقتور دانہ نہیں پیدا ہوتا۔ جوانی جیسے آتی جاتی ہے۔ ویسے ویسے منی اور منی کے کیڑے بیضہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مرد کے بیضہ میں بلا تعداد کیڑے رہتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جانتے کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جمع میں جتنی منی نکلتی ہے۔ اس میں یہ کیڑے دنیا کی آبادی کا ساتواں حصہ رہتے ہیں۔ لیکن مرد کا ایک ہی کیڑا عورت کے ایک ہی اندر سے مل سکتا ہے کیونکہ عورت کے ہر بار حیض ہونے کے ساتھ ہی ساتھ صرف ایک ہی اندر اپختہ ہو کر عورت کے خلیۃ الرحم سے نکلتا ہے۔

یہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے آلات تناسل کو فرج۔ کہتے ہیں مردوں میں خلیۃ کے نام کے جس طرح دو بیضہ ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں دو بیضہ ہوتے

ہیں۔ اس کو خصیتہ الرحم (Ovary) کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مردوں کے دونوں خصیتہ ایک جھڑے کی تھیلی میں قضیب کے نزدیک لگے رہتے ہیں لیکن عورتوں کے دونوں خصیتہ الرحم میں رحم کے دونوں طرف رہتے ہیں۔ یہ باہر سے دکھائی نہیں دیتے لیکن عورت کو اگر صبح کے وقت خالی پیٹ جت ٹٹا کر اُس کے بائیں جانب کھڑے ہوں۔ پیڑ کو دبا کر دکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ وہاں اندے کی طرح دو چیزیں ہیں۔ یہ کام بھی تجربہ کار آدمی کر سکتا ہے۔ عوام اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔

عورتوں کے خصیتہ الرحم کی بابت معلوم کرنا ہی بہت مشکل ہے۔

عورتوں میں رحم نام کا ایک عضو ہے۔ جو مردوں میں نہیں ہوتا۔ یہ فرج کے آخری حصہ کے ٹھیک اوپر کی طرف ہے۔ رحم دیکھنے میں بہت کچھ گہرا۔ گدو یا مرد کی شکل کا ہوتا ہے اس کا کچھ پتلا حصہ نیچے کی طرف اور موٹا حصہ اوپر کی طرف رہتا ہے اور کچھ سامنے کی طرف جھکا رہتا ہے۔ آخری سرا جھڑے پر رحم کی موجودگی کا بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ رحم پھیلنے اور سکڑنے والے عضلہ سے بنا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ کچھ کھوکھلا رہتا ہے اور باغی جھتی کے ذریعہ بڑھی سے اور ایک چھوٹے سوراخ کے راستہ سے فرج سے ملتا رہتا ہے۔

رحم کے بالائی حصہ یعنی جوڑے حصہ کو جسم رحم پتلا حصہ کو گردن رحم۔ اور جہاں یہ فرج سے ملتا رہتا ہے اُس کو دبانہ رحم کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سکڑنے اور پھیلنے والے عضلہ سے بنا ہے۔ اسلئے جیوں جیوں رحم بڑھتا جاتا ہے۔ تیوں تیوں اسکا کھن بسم بڑھتا جاتا ہے۔ اور میڈائش کے وقت سکڑنے کی طاقت کی وجہ سے سکڑ کر رحم سے بچے کے نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے۔ کہ دبانہ رحم کے راستہ سے ایک خوب چکنی سوئی بھی داخل نہیں کی جاسکتی۔ یا بڑی تکلیف سے وہ داخل کی جاسکتی ہے۔ وہی راستہ ہر مرتبہ حقیقی ہوئے کے ساتھ ہی ساتھ خون نکلنے، مردگی مٹی داخل کرنے کے لئے بہت کچھ پھیل جایا کرتا ہے۔ جیغی ہو جانے کے بعد یا مردگی مٹی داخل ہو جانے کے بعد دبانہ رحم سکڑ کر بند ہو جاتا ہے۔ ولادت کے وقت دبانہ رحم اور فرج دونوں پھلتے

ہیں۔ اور عضلہ رحم سکڑتا ہے۔ اسی عضلہ رحم سکڑنے کی وجہ سے بچہ کا سر آہستہ آہستہ بڑھنے والے دباؤ کی وجہ سے دہانہ رحم اور فرج کو پھیلاتا ہوا ولادت میں مدد دیتا ہے۔ اور قدرتی اصول کے مطابق فرج کا راستہ اور دہانہ رحم بہت کچھ پھیل جاتا ہے۔ عضلہ رحم کی طرح عضلہ فرج میں بھی سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ رحم اوپر کی طرف کٹا دہ اور نیچے کی طرف سکڑا۔ اس میں اپنی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ اسکے ٹھیک نیچے کے حصہ میں فرج رہنے کی وجہ سے اسکے نیچے کی طرف بھی کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اسی لئے پیڑ و سے دور رباطات (بندھن) چاروں طرف سے اسکو کھینچ رہتے ہیں۔ اور اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں۔ ان بندھنوں (رباطات) میں کوئی بیماریا ہونے سے رحم کے رباطات کی شکل چھوٹی یا بڑی ہو جاسکتی ہے۔ اسی وجہ سے رحم بھی اپنی جگہ سے سبٹ جاتا ہے۔ اور مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے کبھی کبھی اولاد ہونے میں روکاوٹ پڑتی ہے۔ اور کبھی کبھی فرج کے راستہ سے رحم بھی باہر نکل آتا ہے۔

رحم کے دونوں طرف دونیاں ہیں۔ یہ دونوں دنیاں دونوں طرف سے خصیتہ الرحم کے نچلے حصہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا آخری حصہ ترتیب وار پھیل کر بہت کچھ کردی پھول کی طرح ہو گیا ہے۔ ان دونوں نلیوں کے بیرونی حصہ میں دو گول رباطات (ROUND LIGAMENT) ہیں۔ ان ہی دونوں کے سہارے خصیتہ الرحم بنتا ہے۔ مرد کے کیسہ خصیتہ میں جس طرح بے شمار حیوان منویہ (مردوں کے منی کے کپڑے) رہتے ہیں۔ اور نکلی ہوئی منی کے ساتھ وہ باہر آتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے خصیتہ الرحم میں بھی بے شمار بیضہ منی (مردوں کے انڈے) رہتے ہیں۔ ان بیضہ منی کو گریٹین نامی نلکے کہتے ہیں۔ یا بیضہ منی۔ (عورت کی منی کے انڈے) ہر وقت باہر نہیں نکلتے۔ صرف حیض کے وقت نکلتے ہیں۔ لیکن بیضہ منی بے شمار نہیں نکلتے۔ صرف ایک خوب نکلتے بیضہ منی۔ خصیتہ الرحم کے بیرونی حصہ میں آتا ہے۔ اور خصیتہ الرحم کے ڈھکنے والی جھلی میں جاتا ہے۔

ادرار حیض

اب ادرار حیض کے بارے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عورتوں میں فرج۔
 خفیہ الرحم اور پستان زمانہ طفولیت میں کمزور رہتے ہیں۔ سرد ملکوں میں عموماً
 سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اور گرم ملکوں میں تیرہ چودہ سال کے سن میں بغل
 اور فرج کے مقام میں بال، پستان کا مضبوط ہونا۔ اور پیڑ کا اُبھارنا، گلے
 کی آواز بدلتا، خواہش شہوانیہ، علامات شباب کا نمونہ وغیرہ علامات کے ساتھ
 ادرار حیض شروع ہوتا ہے۔ یہ ۲۸ دن کے وقفہ سے ہوا کرتا ہے۔ یہ تین چار
 روز تک رہتا ہے۔ ملک ہندوستان میں بارہ برس سے شروع ہو کر ۳۰ یا ۴۰
 برس کے سن تک ہوا کرتا ہے۔ مختلف حالتوں کے لحاظ سے کبھی کبھی اس میں
 فرق بھی ہو جاتا ہے۔ ہر رتبہ استقرار حمل کے وقت ۹ سے ۱۰ ماہ تک اور ولادت
 کے ایک ماہ سے دو برس تک جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے۔ حیض بند رہتا ہے۔
 گاہے گاہے کسی کسی عورت کو حالت حمل میں بھی حیض ہوتا ہے۔ اس حیض میں
 جو خون نکلتا ہے اس سے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بلکہ اگر عورت حیض
 یا کسی دوسری بیماری میں مبتلا نہ ہو تو یہ بالکل طبعی حالت میں ہوتا ہے۔
 اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ حیض کے پہلے رحم میں اس وقت کے لئے
 خون بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حیض ہو جانے کے بعد خون کی زیادتی گھٹ جاتی
 ہے اور رحم میں اس قسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تاکہ وہ طے ہوئے مادہ اور
 نرہ بیضۃ المرنی (اور حیوان منریہ) آسانی سے مضبوط ہو سکیں۔ اسی لئے نئے
 مغیہ ڈھکنے والے عضلہ کا بنا دینا وغیرہ بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ جو ہوئے
 حیض کے خون میں اور معمولی خون میں فرق رہتا ہے۔ حیض کا خون معمولی خون کی
 طرح اتنا چکدار اور گاڑھا نہیں ہوتا۔ اور آسانی سے جتا بھی نہیں۔ جب
 تک ادرار حیض ہو کرتا ہے۔ اس وقت تک عورتوں کو قوت استقرار حمل
 رہتی ہے۔ پینتیس یا چالیس برس کا سن ہونے پر عموماً حیض بند ہو جاتا ہے۔
 ساتھ ہی ساتھ خواہش جماع اور قوت ولادت اور قوت استقرار حمل نازل ہو جاتی ہے۔
 ٹھیک حیض کے وقت خفیہ الرحم میں بھی خون کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور

بنتہ بیضۃ النبیؐ نصیبہ الرحم میں ہو کر عورتوں نصیبہ کی ڈھکنے والی جھلی میں
 کوھاتا ہے۔ رحم سے نصیبہ الرحم کے نزدیک والے مقام تک سستانی یا ردی بھول
 کی طرح داخل آئے ہیں جن کے بارے میں اوپر بیان کیا گیا ہے بیضۃ النبیؐ اس
 بحر سے بیضۃ النبیؐ یا نشاء محل میں بہو پھرتا ہے۔ اس نلی کا اندر دی حصہ بہت
 باریک یا قابل دید پیر ہے جو روئیں کی طرح سے ڈھکا ہے۔ دھان کی نسل پر
 ہوا لگنے سے جسطرح ہرید ہونے ہے۔ ان ردیوں میں بھی اسی طرح ہر ہوا کر لی۔
 ہے۔ ان لہروں کی چاں باہر سے اندر نا طرف رہتی ہے۔ یعنی یہ ہر نصیبہ الرحم سے
 اٹھ کر رحم کی طرف جاتی ہے۔ اسی بحرانی نشاء محل کے پھیلے ہوئے منہ کے
 اندر دنی روئیں میں اس طرح کی لہر کی وجہ سے جو کشش ہوتی ہے اس کے
 ذریعہ سے بیض کے وقت بیضۃ النبیؐ جو نصیبہ الرحم سے نکل آتا ہے نلی کے
 منہ پر آئے ہی تیزی سے رحم میں فوراً داخل ہو جاتا ہے۔

حیض کے بعد جماعت کرنے سے مرد کی منی فرج میں گرتی ہے اس وقت
 رحم کا منہ پھیلا رہتا ہے۔ اس پھیلے ہوئے منہ کے راستے سے صرف حیوان
 منویہ (مرد کے منی کا کیسٹرا) رحم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے داخل
 ہونے پر رحم کا منہ سکڑ جاتا ہے۔ حیوان منویہ اپنی پونچھ کے سہارے رحم
 میں داخل ہوتا ہے۔ بہت لوگوں کی رائے ہے کہ رحم میں حیوان منویہ (مرد
 کے منی کا کیسٹرا) اور بیضۃ النبیؐ (عورت کے منی کا اندر) اکٹھا ملا رہتا ہے
 ان کے ملنے کے بعد حیوان منویہ کی پونچھ گر پڑتی ہے۔ لہذا اب اس میں چلنے
 پھرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اس کے بحرانی بیضۃ النبیؐ کے باریک روئیں لہر
 کی طرح کی چال کے مدد سے اس کو رحم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور رحم کے ڈھکنے والی
 جھلی میں ایک جگہ پر نہ بے رحم منویہ چپک جاتا ہے اور اس جگہ پر وہ ٹھہر جاتا ہے۔
 رحم میں خون کا لو بہتا ہے اور گھٹ کا شکر طاق کی ترقی اور بہت خوشی کے بارہ
 میں بیان کرے کے پہلے یہ بتا دیا ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے بیروں میں
 کیا فرق ہے۔ بیڑہ کے اندر اور فرج کے ٹھیک اور برعکس ہے۔ اور اس کے
 دونوں طرف میں دو نصیبہ الرحم ہیں۔ اولاد سے مشابہ

اور پیچھے مبرز ہے۔ راستہ فرج کے سامنے مجرئی المبول، اور پیچھے مبرز اور اسی طرح دہاند فرج کے آگے کی طرف پیشاب کا سوراخ اور پیچھے مبرز ہے۔

مرد کے پیڑوں میں رحم یا خصیتہ الرحم نہیں ہے۔ مرد میں استقرار حمل نہیں ہوتا۔ اسی لئے مرد اور عورت کے پیڑوں میں یہ فرق ہے۔ پیڑوں کے پیچھے قوت (چوتروں)

(SACRUM) اور دچی کی ہڈی (COCCYX) اور دونوں جوف میں اور

سامنے دو بالائی صلائی ہڈیوں سے ایک سخت کوٹھڑی سی بنی ہوئی ہے۔ ان ہڈیوں کے اوپر نرم گوشت اور طبقہ عضلہ کا پردہ چڑھا ہوا ہے۔ عموماً عورتوں کا پیڑو مرد کے پیڑو سے بڑا ہوتا ہے۔ عورت کے پیڑو کی چوڑائی زیادہ ہوتی

ہے۔ اور بہ نسبت آگے کے پیچھے کی طرف چھوٹا رہتا ہے۔ لیکن مردوں کے پیڑو کی، چوڑائی چھوٹی اور سامنے کی طرف بڑا رہتا ہے۔

اسی لئے عورتوں کی کمر مردوں کی کمر سے چوڑی اور مضبوط معلوم ہوتی ہے اور مذکورہ بالا گولان کی فرق کی وجہ سے عورت کا پیڑو بہت گول ہوتا ہے۔

اور کمر کا پیڑو چوڑائی میں چپٹا ہوتا ہے۔ عورتوں کے پیڑو میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ چکنا رہتا ہے۔ تاکہ بچہ آسانی سے پیدا ہو سکے۔ لیکن مرد کا پیڑو اتنا چکنا نہیں ہوتا۔

مجرائے غشا رحل میں حیوان منویہ (مرد کے منی کے کیڑے) اور بیضۃ المنی

(عورت کی منی کے انڈے) کے ملاپ کا حال اوپر بتایا جا چکا ہے۔ اب یہ بیان کیا جائے گا کہ اس ملاپ کے بعد جنین میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔

بیضۃ المنی اور حیوان منویہ کے میل سے جان کی پیدائش ہوتی ہے اسی لئے ماں، باپ، دونوں کی شکل، دماغی حالت، مرض صحت وغیرہ کا اثر اس جان

پر ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر اولاد کے پیدا ہونے کے وقت ماں، باپ ہیں جس کی جتنی فوقیت زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا ہی زیادہ حصہ

اچھائی اور بڑائی کا اولاد میں آتا ہے۔ اس جگہ اس مضمون پر بالتسریح بحث نہیں کی جاسکتی۔ بے موقع ہوگا۔ اگر کوئی صاحب اس مضمون پر زیادہ

معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ نمونہ پر ڈاروں

کی رائے (DARWIN'S EVOLUTION THEORY) ملاحظہ کریں۔

میفنڈا المنی اور حیوان منو یہ بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ یہ دونوں بہت باریک ہوتے ہیں۔ تخم میں جان کی مستقل دماغی طاقت، صحت، مرض، بُرائی اچھائی اور جھوٹے مضموں کی شناخت وغیرہ سبھی پوشیدہ ہیں۔ یہ ہی دونوں بیج جان کے سبب سمجھے ہیں۔ اگر انسان ذرا غور کرے تو اسکو معلوم ہوگا کہ کتنی لطیف چیزوں سے اس کی یہ شکل یعنی طاقتور جسم نمودار ہوا ہے۔ ان دونوں بیجوں کا صنایع کون ہے۔ اور وہ کس طرح۔ کتنی بھدھی بناوٹ والے اس طے ہوئے دونوں جانوں کے نمونے سے جب مناسب جسم تیار کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

بالوتہ پر صرف غور کرنے سے اس لازوال قادر مطلق کے قدموں پر خود بخود سر جھک جاتا ہے۔ یہ پہلے بنایا جا چکا ہے کہ مجرائے غشا، حل میں غورت اور مرد کے بیج (منی) ملنے کے بعد حیوان منو یہ کی دم ٹوٹ جاتی ہے۔ اور مجرائے غشا، حل کے باریک روئیں کی روئیں لہر کی مدد سے وہ رحم میں جا پہنچتا ہے۔ اس ملاپ کے بعد ہی یہ ملا ہوا بیج ناقابل دیدہ اور لائانی قدرت کی طاقت سے لطیف سے لطیف حصوں میں تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ اسی تقسیم کو سگمنٹیشن (کون و فساد) کہتے ہیں۔ اسی تقسیم ہی کے ذریعہ مختلف مضموں اور جسم کے لطیف حصوں کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اور وقت پا کر اس کی ایک شکل تیار ہو جاتی ہے۔

رحم میں جانے کے بعد ہی یہ ملا ہوا بیج رحم کی لعابدار جھلی میں چپک جاتا ہے۔ اسی لئے اس وقت رحم میں نہایت ہی ملامتئی ڈھکنے والی جھلیاں تیار ہوتی ہیں۔ انھیں جھلیوں کے مہائے پرورش پاکر اور غذا اکٹھا کر کے جان رفتہ رفتہ بڑھتی رہتی ہے اس کے بعد علی الترتیب اسکے چاروں طرف جھلی کی طرح ایک پردہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس پردہ میں ایک قسم کی رقیق چیز رہتی ہے۔ اور اسی رقیق چیز کے بیج میں حمل رہتا ہے۔ حمل کے ناف سے ڈوری کی طرح نال نکل کر رحم کے اندر دنی مشیمہ (بھول یا مکمل) یا پلاسٹا میں چلا جاتا ہے۔ یہ مشیمہ بھی رحم سے ڈھکنے والی جھلی سے ملا رہتا ہے۔ یہ مکمل مشیمہ رحم سے خون کے ساتھ پختہ کے لئے

پر روشنی غذا قبول کر کے نالی کے راستہ سے حل کے جسم میں پھیلا دیتا ہے۔
 اور حل کے جسم سے ناقص خون اسی نالی کے راستہ سے مکمل میں اور مکمل
 سے نالی کے جسم میں بند جاتا ہے۔ اور جسم کے راستہ سے نکال جاتا ہے ماسی
 لئے اولاد کی پرورش کرنے کیلئے حاملہ کو مقوی غذا کی مدد دیتا پڑتی ہے۔ اس
 ملک میں اولاد کی ولادت قبل از وقت کی تعداد اور بچہ اور بچہ کے اموات
 کی تعداد بہت ہے۔ کمزور حیوان منویہ، کمزور بینہ، امینی، اور حاملہ کو مقوی غذا
 کا نہ ملنا اس کے اسباب ہیں۔ خیر جو ہو، لیکن اس ملک کے بچوں کی اموات کی
 تعداد حقیقت میں دل شکن ہیں۔ جنین سائل المینونی، LIQUOR AMNII
 کی تفصیل کے پانی میں پینا ب کیا کرتا ہے۔ عموماً جنین کو رحم میں پاخانہ نہیں ہوتا۔
 کیونکہ جنین ماں کے غذا کا جو ہر خون سے حل کے ذریعہ پاتا ہے۔ باہر کی غذا لیکر
 اس کی پرورش نہیں ہوتی۔ اس لئے اس کو پاخانہ بھی نہیں ہوتا۔

اب مشیمہ (مکمل بھوسا) کے فعل کے متعلق اور جنین کے خون کے دوران۔
 (FOETAL CIRCULATION) کے متعلق کچھ بتا دینا مناسب ہے۔
 پلاسٹا یا مشیمہ (پھول یا مکمل) کا فعل :- مشیمہ ہی پھیپھڑا
 غذا کی نالیاں، جگر اور گردہ کا فعل کرتا ہے۔

- (۱) پھیپھڑا کا کام :- خون کے ساتھ آکسیجن (سوائے نسم) پہنچانا۔
- (۲) غذا کی نالی کا کام :- خون کے ساتھ جنین کو غذا پہنچانا۔
- (۳) جگر کا کام :- مشیمہ کی مدد سے حسب ضرورت شکر جنین میں پہنچانا۔
- (۴) گردہ کا کام :- مشیمہ کی مدد سے ناقص (کاربونائیٹ) اسٹو وغیرہ ملے ہوئے
 ناقص خون جنین کے جسم سے ماں کے جسم میں لے جانا۔

جنین میں خون کا دوران (FOETAL CIRCULATION)
 حل کے وقت مختلف مہینوں میں جنین کی شکل کا فرق :- پہلے ماہ کے
 آخر میں جنین کی شکل ایک کبوتر کے انڈے کے برابر ہوتی ہے۔ دوسرے
 ماہ میں مرغی کے چھوٹے ہنس کے انڈے کی طرح۔ تیسرے ماہ کے آخر میں
 راج ہنس کے انڈے کی طرح اور عموماً منقوص وغیرہ بھی بن جاتے ہیں چوتھے ماہ

اور ترادش پانے والی گلیٹیوں کا فعل بھی بڑھ جاتا ہے۔ وقت ولادت کے کچھ عرصہ پیشتر ہی اس تبدیلی کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ پیدائش میں مدد ملتی ہے۔

فخرج: خون کی زیادتی، جھکاؤ۔ اور گلیٹیوں سے اخراج کی زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیدائش کے وقت یہ تبدیلی زیادہ ہو کر پیدائش میں مدد ملتی ہے۔ دہانہ رحم:- اسکی سختی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور وہ ملائم اور جھکنے والا ہوتا ہے۔ خون کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ دہانہ رحم کے نمونہ کیسا تھا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے تین ماہ میں دہانہ رحم کچھ نیچے، اس کے بعد کچھ اوپر۔ اور ولادت کے دس روز پہلے ہی سے کچھ نیچے اُتر آتا ہے معمولی حالت میں تو جسم کے منہ میں ایک سوئی بھی داخل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن استقرار حمل بعد یہ راستہ رفتہ رفتہ ملائم ہوتا جاتا ہے اور حمل کے آخر چند ماہ میں ترتیب وار چھوٹا بڑا ہو کر ولادت میں مدد کرتا ہے۔ جن عورتوں کے ایک مرتبہ بھی کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے دہانہ رحم کا سوراخ گول۔ بہت چھوٹا رہتا ہے۔ لیکن جن کے اولاد ہو چکی ہے ان کا دہانہ رحم بڑا۔ سوراخ چپٹا۔ اور کسی کسی کو ٹوٹا پھوٹا نشان ظاہر ہوتا ہے۔

علامات حمل

حیض نہ ہونا۔ سب سے پہلی علامات ہے۔ لیکن اس علامات پر خاص بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ رحم اور خصیتہ الرحم کی اکثر بیماریوں میں اور کمی خون اور انجھار والے امراض وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔

متلی اور قبضہ۔ حمل کے دو تین مہینوں میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہے۔ رحم میں جنین کا رہنا۔ رحم کی پوریشن اور تبدیلی کی وجہ سے رحم اور پیڑوں میں اجتماع خون زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ کسی وجہ سے رحم اور پیڑوں میں زیادہ خون آتا ہے۔ ان وجوہات سے رحم کا جو فعل منعکس (REFLECTION) ہوتا ہے۔ اسی سے تپ اور متلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ متلی اور تپ خاص صبح کو ہوتی ہے۔ صبر و ری نہیں کر سب حاملہ عورتوں کو بیوی کسی کو برابر دو تین ماہ تک

متعلق تھے، ہو ا کرتی ہے۔ اور بہتوں کو پیٹ میں حمل رہنے تک ہوتی ہے۔ یہ بھی بھروسہ کرنے کے قابل علامت نہیں۔ پیٹ، رحم، اور خصیتہ الرحم میں دانے ورم، امعاء دانے وغیرہ کی وجہ سے بھی اس قسم کی متعلق اور تھے ہو ا کرتی ہے۔ دل اور آرتھریٹس :- اپنے جسم اور جنین ان دونوں کے لئے دوران خون اور صاف کرنے کے لئے دل کو اپنا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسلئے اس میں عموماً تبدیلی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن یہ علامت قابل تحریر نہیں ہے۔ اور دوسرے امراض رحم میں بھی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ دامائی تبدیلی :- نازک مزاج عورتیں حاملہ ہونے پر کچھ جڑ جڑی اور بد مزاج ہو جاتی ہیں۔ ان کو غصہ آ جایا کرتا ہے۔

پیشاب :- پیشاب میں زلال (الیومن) کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی مقدار بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن وزن نسبتاً گھٹ جاتا، خون :- خون کی مقدار اور خون کے سفید ذرات کا بڑھنا۔

جلد :- چہرہ کے رنگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ پستان کی ٹھنڈی کالی ہو جاتی ہے۔ پستان اور پیڑوں کی جلد بھٹی بھٹی معلوم ہوتی ہے۔ بستران کا لے ہو جاتے ہیں۔ اور ناف اور جڑھ جاتی ہے۔

لہر حم :- حاملہ ہونے کے بعد رحم بڑھا کرتا ہے۔ گہ یا قدرتا ہوتا ہے مگر یہ علامت کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ ورم پھنسیاں وغیرہ کی وجہ سے بھی رحم بڑھ سکتا ہے۔ فرج :- فرج اور شقراں (لب فرج) کے رنگ کا گاڑھا پن اور اخراج کی زیادتی ظاہر ہوتی ہے۔

پیمپرو :- پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ عموماً جو تھے ہی ماہ سے یہ علامت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ یہ علامت قابل بھروسہ کے نہیں ہے۔ پیڑوں کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ پیڑوں پر پھٹے پھٹے داغ ہوتے ہیں۔ پیڑوں کے دونوں طرف کے کچھ ڈھیلے عضلہ میں دونوں ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ سے دبانے پر دوسرے ہاتھ میں سخت چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ اولاد بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔

پستان کی شکل رفتہ رفتہ بڑی ہونا اور وریدوں کا دکھائی دینا۔
پستان کے حاملہ بھٹنی کے گرد کا حلقہ کا سیاہ ہونا۔ پستان دبانے سے
دودھ کی طرح پتلی چیز نکلنا۔ یہ خاص علامت قابل بھروسہ ہے۔

جنین :- پانچویں ماہ کے بعد سے رحم میں یا پیڑوں میں بچہ کی حرکت معلوم
ہوتی ہے۔ یہ بالکل قابل اتما و علامت ہے۔ لیکن کل حاملہ عورتوں میں یہ علامت
ظاہر نہیں ہوتی۔ حل کے آخر چند ماہ بعد معانہ اگر جنین کی حرکت حاملہ کے پیٹ
پر ہاتھ رکھ کر تجربہ کر سکے یا دیکھ سکے۔ (کبھی کبھی غور سے دیکھنے پر جنین کی یہ
حرکت دکھائی دیتی ہے۔) تو حل قرار پانے کی ٹھیک رائے دی جاسکتی ہے۔
پانچویں مہینہ سے جنین کے دل کی آواز سن پڑنے لگتی ہے۔

اگر معانہ حاملہ کے پیڑوں پر سٹی تھیاں کوپ رکھ کر جانچ کرے، اور یہ آواز
سنائی دے تو کہہ سکتا ہے کہ حل بد مشبہ قرار پانگیا ہے۔ ایک گھڑی پر پتلا
تکیہ رکھ کر اس پر اسٹی تھیاں کوپ لگا کر سننے پر جس طرح کی آواز آتی ہے۔
پیڑوں پر اسٹی تھیاں کوپ لگا کر سننے سے بھی ویسا ہی آواز آتی ہے۔ اس
وقت جنین کے دل کی آواز فی منٹ ۱۲۰ سے ۱۵۰ تک سنی جاسکتی ہے۔

بلٹ منٹ :- حاملہ ہونے کے بعد چودھویں مہینہ سے بتسیویں مہینہ تک
یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ حاملہ کو بستر پر تکیہ کے سہارے بٹھانے کے بعد فرق
میں دو انگلیاں داخل کر کے یکایک اوپر کی طرف ٹھیل دینے کے بعد
رحم کے اندر پانی میں تیرتا ہوا جنین یکایک اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر لمحہ
بمحہ کے بعد ہی نیچے اتر کر انگلی پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ علامت بلاشبہ خاص
قابل بھروسہ ہے۔

حل کے کئی مہینہ کے آخر میں رحم میں دباؤ پڑنے کی وجہ سے بار بار
پیشاب کا زور ہوتا ہے رحم کے دباؤ کی وجہ سے مثانہ میں زیادہ پیشاب
اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔

حمل کا زمانہ قیام :- آخر حیف کے بعد ۲۰، ۲۵ سے ۲۸ دنوں کے
اندروں ولادت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا کوئی مقررہ اصول نہیں ہے۔

شخص حالت کی خصوصیت ہمیشہ اصولی رہے گی۔ بس کرنے کا فرق، حیض کا فرق وغیرہ کے مطابق اس وقت سے (ایسا بھی کھٹا بیٹھا کرتے ہیں) ایک معمولی حساب کی فہرست کتاب کے تحت لکھنا چاہیے۔

حالات حمل میں اصول قابل پیروی :- یہ معلوم ہوتے ہی کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ خاصکر باجویہ د کے بعد خاموت باکل منع ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاخانہ صاف ہو اور کسی قسم کا جلدی مرض نہ ہو۔ حاملہ کو اپنی پرورش کے لئے اور جنین کی پرورش کے لئے اور ولادت میں جو خون زیادہ نکل جاتا ہے، اس سے کمزوری نہ ہونے کے لئے زود ہضم مقوی غذا کھانا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ توقض ہی ہو اور نہ پتیلے دست آنے لگیں حاملہ کو کسی طرح کا بل زندگی نہ بسر کرنا چاہیے۔ بلکہ گھر بار کے کام میں مقبوطی محنت کرنا اور ٹھلنا چاہیے۔ ورنہ ولادت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جو عورتیں حمل کے زمانے میں گھر کے ایسے کام جس میں بہت محنت نہیں ہوتی کیا کرتی ہیں۔ ان کو ولادت کے وقت کم تکلیف ہوتی ہے۔ گھر والوں کو بھی ایسے کام کرنے چاہئیں جن سے حاملہ خوش رہے۔ حاملہ سے اچھی باتیں کرنا۔ اچھے خیالات۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ اچھی عورتوں سے۔ چلنا، وغیرہ کام کرنا چاہیے۔ خوفناک چیزیں یا جاندار دیکھنا۔ مناسب نہیں۔ ہمیشہ اچھی دیکھنا ہی فرض ہے۔ ایسی جگہ میں رہنا مناسب ہے۔ جہاں روشنی اور ہوا اچھی ملتی ہو۔ پیدائش کا کام قدرتی ٹھیک طبعی لحاظ سے ہوا کرتا ہے۔ دو فیصدی سے زیادہ غیر طبعی ولادت نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھ کر ولادت کے خوف سے ڈرنا نہیں چاہیے۔

پیشاب میں زلال (ایلو من) نہ رہنے پاوے اور اس بات پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ بچے کے جسم میں استسقا نہ ہو۔ دونوں بہت بڑے علامات ہیں۔ حمل کے آخری کئی مہینوں میں حاملہ کو گھوڑا گاڑی، یا پانکی پر چڑھنا۔ بھاری چیز اٹھانا پانی کھینچنا وغیرہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے اسقاط ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر حاملہ کی طبیعت خوش نہیں رہتی تو اولاد بھی بد مزاج ہوتی ہے۔ خراب فکر کرنے سے اولاد کی خدمت گجڑ جاتی ہے جسم میں مرض رہنے پر اولاد کی عمر کم

ہوتی ہے اور زندگی بھر مرضی رہتی ہے ہمیشہ اچھی چیز دیکھنے پر اولاد اچھی اور خوش رہتی ہے اور خوفناک اور رونے والی صورت دیکھنے پر اولاد بھی بد صورت اور جسم خراب ہوتا ہے اور اسقاط ہونے کا اندیشہ رہتا ہے جسم سے خوب چپکا ہوا کپڑا یا خوب کس کر ساڑی نہ پہننا چاہیے اس سے پیٹ بردباؤ بڑھنے کی وجہ سے اولاد کو نقصان ہوتا ہے اور بچی جگہ پر چڑھنا ترنا زور زور سے چلنا یا ایک ہاتھ اوپنا کر کے اونچے پر کی چیز اتارنا وغیرہ چھوڑ دینا چاہیے۔

ولادت کا فعل

اب مختصراً ولادت کے متعلق بتایا جائے گا۔ اور آخر میں ولادت میں مدد دینے والی دوائیں یعنی تکلیف دہ ولادت کو آسان کرنے والی دوائیاں بتائی جائیں گی۔ زچہ کی تیمارداری بھی علم علاج کا ایک حصہ ہے اس تجویز کو بخوبی جاننے اور سمجھنے کے لئے بہت پڑھنے اور بڑے تجربہ کی ضرورت ہے۔ مختصر اس کا بتانا تو بہت مشکل ہے۔ پھر بھی یہاں اچھے جاننے والے ناظرین کا شوق اس مضمون پر پیدا کرنے کے لئے اور مفصل نہیں رہنے والی حاملہ ماؤں، بہنوں کے فائدہ کے لئے اس امید سے لکھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے ضروری ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح جانتے ہوئے کام کرنے پر قدرتی اہول سے طبعی ولادت ہونے کی امید رہے گی۔ اگر خدا خواستہ کہیں کچھ نقص ہو جائے تو مقامی ہوشیار معالج کی مدد لینی چاہیے۔

طبعی ولادت :- پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کے حاملہ ہونے پر جنین ماں کے پیٹ میں رحم نام کی جھلکنے والی قسح کی جگہ میں رفتہ رفتہ بڑھتا کرتا ہے۔ اور حاملہ ہونے کے ۲۸ دن بعد یا عموماً شمار کے مطابق ۹ ماہ ۱۰ دن کے بعد فرج کے راستہ سے نکل آتا ہے۔ رحم کو مصلب بھی کہتے ہیں۔ جتنا ہی جنین بڑھتا ہے۔ رحم بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ حل میں جنین کا سر نیچے کی طرف، پیرا سن لٹا کر بیٹھے رہنے کی طرح سینہ سگڑا۔ اور دونوں ہاتھ سینہ پر رکھے ہوئے رہتا ہے۔ رحم میں ایک طرف پردہ کی تھیلی کے بیج ہیں پانی کی طرح کی چیزیں جنین تیرتا رہتا ہے۔ اس پردہ کی تھیلی کے

امونیک سیک (AMONIACSAC) اور اسکے اندر کی رقیق چیز کو
 امونیک فلوئڈ (AMONIA FLUID) کہتے ہیں۔ پیدائش کے وقت
 جسے پانی نکلنا کہتے ہیں۔ وہ جنین کے سر کے پاس والے پردہ کی تھیلی سمٹ
 کر ہی نکلا کرتا ہے۔ اگر اس پانی پر مناسب دھیان دیں تو معلوم ہوتا ہے کہ
 ایک تو یہ رحم کے اندر دینی جنین کے جسم کے دباؤ کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے
 ولادت کے وقت یہ برابر کی حفاظت بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے اس
 رقیق چیز میں چکنا ہٹ رہنے کی وجہ سے ولادت کے وقت یہ پیدائش کے راستہ
 کو چکنا بنا دیتا ہے اور پھیلا ہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح پیدا ہونے
 میں بہت کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔

جنین جتنا بڑھتا جاتا ہے۔ حاملہ کا پیٹ چاروں طرف اتنا ہی بڑھتا
 جاتا ہے۔ اس کے بعد ولادت کے کچھ روز پہلے حاملہ کا پیٹ جھول پڑتا ہے۔ جس
 کا مطلب یہ ہے کہ آگے اور نیچے کی طرف گھبرے کا بڑا ہوا جانا۔ اس کی وجہ یہ
 ہے کہ اس وقت جنین کا جسم پیڑوں کے بڑھتی زلے حصہ سے آگٹتا ہے۔ اور
 بالائی پیٹ بہت کچھ خالی ہو جاتا ہے، اور نیچے کی طرف بہت حصہ پھیل جاتا
 ہے۔ اس سے حاملہ کو آرام ملتا ہے اور بغیر تکلیف کے تنفس کا کام پورا ہوتا
 ہے۔ اس وقت رحم کا منہ برابر پھیلتا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے دہانہ رحم سے بیرونی
 دروازہ (فرج) کا اور اندرونی دروازہ دہانہ رحم کا فاصلہ رفتہ رفتہ گھٹتا جاتا ہے۔

ولادت کے کچھ روز پہلے ہی آہستہ آہستہ درد ہوا کرتا ہے۔ اس کو جھوٹا
 دروازہ (FALSE PAIN) کہتے ہیں اس جھوٹے دروازہ کی وجہ سے رحم کی
 کشادگی آنتوں میں دباؤ اور بد ہضمی سی ہو جاتی ہے۔ یہ بد ہضمی ہلکا جلاب ہی
 لینے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی درد بھی دور ہو جاتا ہے جھوٹا
 دروازہ اور اصلی دروازہ میں یہ فرق ہے کہ جھوٹا دروازہ پیٹ کے بالائی
 حصہ میں ہوتا ہے۔ اور درد تھوڑی دیر اور بے قاعدہ ہوتا ہے۔
 اصلی دروازہ ہمیشہ کمر کے نیچے اور جو تھے مہرہ سکون کی ہڈی کے مقام پر ہوتا
 ہے۔ اور درد بھی رکنے والا اور بے قاعدہ ہوتا ہے۔

پہلی حالت (درجہ طبعی درد) وہ ہے شریعت میں مذکور نہ رہتا کہ جو کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کو پہلی حالت کہتے ہیں۔ یہ چند گھنٹوں سے کہی روز تک قائم رہ سکتی ہے۔ اسی وقت اصلی درد وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حاملہ بے چینی سے ٹھٹھکی رہتی ہے۔ بلکہ نصف گھنٹہ کا وقفہ دیکر اس قسم کے درد کی ہر آغوشی ہے۔ اس درد میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کمر کی ہڈی پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ کسی کو قے، اور کپکپی بھی ہوتی ہے۔ حاملہ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ دہانہ رحم رفتہ رفتہ پھیل کر فرج کے راستہ سے مل جاتا ہے۔ پانی کی تھیلی دھکا دیکر باہر نکلنا چاہتی ہے۔ اور اس کے بعد پھٹ کر جنین کے سر کے بال دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت دہانہ فرج اور فرج کے راستہ کے مابقی اعضاء کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ اخراج اور تھیلی پھٹ کر جو رقیق چیز نکلتی ہے اس سے پسندش کا راستہ اتنا چلنا ہو جاتا ہے کہ فوراً ہی ولادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت مشیمہ یعنی پھول کا بھی کچھ حصہ رحم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کچھ خون بھی اس اخراج کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ علامات نیک ہے۔

جنین کا سر سخت یا کی صفائی (BONY PELVIS) میں اڑ جانے کی وجہ سے اور تھیلی کے انارونی پانی میں رحم کو سکڑنے کے قدرتی اصول کے موافق جنین کے اوپر کچھ دباؤ پڑتا ہے۔ اور صرف جنین کے سر پر حصہ کے سکڑنے کا دباؤ نہ پڑنے کی وجہ سے دباؤ نیچے کی طرف یعنی جنین کے سر کی طرف آتا ہے۔ اس سے بھی رحم کا مضبوط پھینکا ہے اور ولادت میں مدد ملتی ہے۔

دوسری حالت (درجہ دباؤ) نہ رحم کے پورے طور سے پھیل جانے کے بعد سے جنین کے پورے طور سے نکل جانے تک کی حالت کو دوسری حالت (درجہ) کہتے ہیں۔ یہ حالت چند منٹوں سے لیکر گھنٹہ تک قائم رہ سکتی ہے۔

اس وقت لگاتار تیز درد ہوا کرتا ہے یہ درد اس قسم کا ہوتا ہے گویا کوئی چیز ڈھکیل کر باہر نکلنا چاہتی ہے (REARING DOWN) حاملہ خود بھی زور سے سانس کا دباؤ ڈال کر پیٹ کے حصہ کی مدد سے پیٹ میں دباؤ ڈالتی ہے یا کونٹھتی ہے کبھی کبھی تو زور ایک کی کسی چیز کو پکڑ کر زور سے کونٹھتی ہے، رونی

ہے۔ یا حیج اٹھتی ہے۔ گونٹھنے اور رحم کے سکڑنے کے دباؤ سے جنین کا سر آہستہ آہستہ باہر نکلتا جاتا ہے۔ اس دباؤ سے موقد اور راس فرج کے درمیان کا حصہ جس کو مہمان یا سیون کا مقام (PORINIEUM) کہتے ہیں۔ وہ بھی دھکا دیکر باہر نکل آتا ہے جنین کے دباؤ کی وجہ سے بار بار پاخانہ و پشیا بہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ زور سے دے دے کہ وہ سر باہر نکل آتا ہے اور پھر جسم باہر نکلتا ہے۔

تیسری حالت (درجہ) جنین کے باہر نکلنے کے بعد سے مشیمہ یا پھول یا مکمل (PLACENTA) باہر نکلنے تک کو تیسری حالت (درجہ) کہتے ہیں۔ اس میں اکثر ایک گھنٹہ لگتا ہے۔ پھر رحم سکڑتا ہے۔ اس سکڑنے کی غرض یہ ہے کہ شرائین کا منہ سکڑ کر اخراج خون کو روکنا اور پھول یا مکمل کو باہر نکال دیتا۔

عموماً ولادت کے وقت ۹۶ فیصد جنین کا سر ہی پہلے نکلتا ہے اور سر کی چند یا (VERTEX) پہلے رحم کے منہ پر دکھائی دیتی ہے۔ یا پیڑ و میں داخل ہوتا ہے کسی منہ، بھول، ہاتھ، پیر، پیڑ و وغیرہ حصے ہی حالات کے پہلے نکلتے ہیں۔ یہ بد علامت ہے۔ اکثر اس وقت بچہ کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایسی پیدائش کے وقت علاج کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم یافتہ دایاں بھی آسانی سے کام ولادت کا ٹھیک نہیں کر سکتیں اسی لئے طبعی ولادت کے بارہ میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مشکل حالت آپہنچے تو فوراً کسی ہوشیار دانی کی مدد لینی چاہیے۔

پیدائش کے وقت کا کام۔ اس کام کے لئے تین باتیں قابلِ تحریر ہیں جیسے راستہ ولادت جنین۔ قوت ولادت۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ پیڑ و، آڑا اور ترچھا (TRANSVERSELY) کچھ چوڑا اور سانسے پیچھے (ANTERIO-POSTERIORLY) کچھ دبا ہوا ہے۔ اس لئے مستعرض (TRANSVERSE DIAMETER) دائرہ۔ سانسے پیچھے کا دائرہ۔ (ANTERIO-POSTERIOR DIAMETER) سے کچھ بڑا ہے۔ اور ابھی ایک

بات قابل یاد رکھنے کی یہ ہے کہ پیڑ و کاٹیر صا، ترچھا دائرہ۔
(OBLIQUE DIAMETER) سے بڑا ہے۔ اس لئے ٹیٹو کا عقل میں یہ بات
آسکتی ہے کہ چوڑے راستہ سے ہی کسی چیز کا باہر نکلتا آسان ہے۔ قانون
قدرت کے موافق ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔

جنین کے سر کا دائرہ نا پنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے پیچھے کا دائرہ
جتنا بڑا ہے۔ چوڑائی یعنی اڑا ترچھا دائرہ اتنا نہیں ہے۔ ادھر حاملہ کے پیڑ و کا
ٹیر صا ترچھا دائرہ کے سامنے پیچھے کی طرف زیادہ ہے۔ اس سے یہ آسانی
سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ جنین کے سر کا چوڑا دائرہ یعنی سامنے سے پیچھے کا دائرہ
اگر پیڑ و کے ٹیڑھے ترچھے دائرہ کے ساتھ ملا ہوا خاص کر اگر جنین کا سر پیچھے کی طرف
پیڑ و کے سامنے کی طرف رہے اسی وقت یہ راستہ آسان ہو سکتا ہے۔
ایشور کی مہربانی اور قدرت کے اصول کے موافق ایسا ہوتا ہے۔

جنین کا سر پیڑ و میں ٹھیک طور سے بیٹھ کر ایک مرتبہ گھومنے کے بعد سر
پیچھے کی طرف حاملہ کے سامنے اور منہ حاملہ کے پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے اسی
حالت میں سر سلسلہ وار باہر نکلتا ہے۔

اس مہنوں کو سمجھانے کے بعد ایک اور بات رہ جاتی ہے۔ زیادہ تر جنین
سر کا دائرہ (CIRCUMFERENCE) پیڑ و کے دائرہ سے کچھ چھوٹا رہتا ہے۔
اس بات کا حل کرنے کے لئے جنین کا سر اور حاملہ کے پیڑ و کے اوپری حصہ
میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جنین کا سر رحم کے بیرونی دباؤ سے پیڑ و کے
مولفہ ڈھیلارہتا ہے اس کو ڈھالنا (MOULDING) کہتے ہیں۔ ولادت
کے بعد آہستہ آہستہ سر اپنی پہلی شکل میں آ جاتا ہے۔ حاملہ کے پیڑ و
کے سامنے والے حصہ کی ہڈی (OS PUBES) کے جوڑ میں دراز
ہو کر دائرہ بڑھ جاتا ہے۔

اس کے بعد دم کے سکرٹنے کی وجہ سے جنین کا سر آہستہ آہستہ باہر نکل
آتا ہے۔ یہاں پر ایک نئی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ جنین کے سر کا لمبا دائرہ
پیڑ و کے لمبے دائرہ سے باہر نکلنے پر بھی جنین کا کندھا باہر نکل آنے میں

رکا وٹ پیدا کرتا ہے کیونکہ کندھے کا دائرہ سر کے دائرہ سے الٹی طرف
رہتا ہے۔ اور سر کے بڑے دائرہ سے کہیں بڑا ہوتا ہے اس لئے جنین کا جسم صوف
گھوم کر حاملہ کے دائیں یا بائیں ران کی طرف رہتا ہے اور سز کے نیچے کا حصہ دوسرے
ران کی طرف رہتا ہے۔ اس وقت جنین کے کندھے کا بڑا دائرہ سر کے دائرہ اور پیڑاؤ کے
دائرہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیڑھا ہو کر پہلے اوپر کا حصہ باہر نکلتا ہے۔ پھر
نیچے کا حصہ نکلتا ہے کندھا باہر نکل جانے پر بڑی آسانی سے کل حصہ باہر نکل آتا ہے۔

ولادت کے وقت کی توجہ یا ہوشیاری

پہلے تو درد زہ شروع ہونے کے اندازہ کچھ وقت پہلے ہی سے اس بات کا خیال
رکھنا چاہئے کہ حاملہ کا پیٹ صاف رہے۔ ہلکا جلاب اور پھل، دودھ، مٹھائی
وغیرہ کھلا کر صاف کر دینا چاہئے۔ حالانکہ ہمیشہ نیم گرم پانی سے نہانا چاہئے۔ اس
سے جلد صاف رہتی ہے۔ حاملہ کو ہمیشہ بہلتے رہنا چاہئے۔ گھر میں جو کمرہ سب سے
اچھا ہو اس کو زچہ کے لئے ٹھیک کرنا چاہئے۔ یہ کمرہ صاف ہو اور صاف اور
روشن ہونا چاہئے۔ سوسائٹی کے طریقہ کے مطابق اگر علیحدہ کمرہ رکھنے کا اصول ہو
تو وہ بھی اچھا اور ہوادار اور روشن ہونا چاہئے۔ اس ملک میں زچہ خانہ کا مقام
سب سے گندہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ بچہ کی موت کا یہ بھی ایک سبب ہے۔
دنیا کے آئندہ نسل چلانے والوں کے لئے اس قدر کیوں لا پرواہی اس ملک میں
پھیل گئی ہے۔ اس کا کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا۔ زچہ خانہ میں بہت چیزیں
نہ ہونا چاہئے۔ ولادت کے وقت بہت آدمیوں کا رہنا یا جھانکنا خاص کر اس
جگہ پر مردوں کا جانا کسی حالت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے حاملہ میں شرم
پیدا ہوتی ہے۔ ولادت کے وقت حاملہ کو صاف ساڑی پہنانا چاہئے۔ زچہ خانہ
بہت اچھا بڑا ہونا ضروری ہے۔ اس کمرہ میں علیحدہ علیحدہ ضرورت کے لحاظ
سے صاف کپڑے، صاف تولیا، دو تین ٹب پانی، زردن یا نل کاتیل صابن
صاف بستر، آئل کلو تھ، ایک صاف ہندوچی، صاف سوت بھی رکھ دینا چاہئے
تھوڑا اگر گرم دودھ، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا کھانا، جو دارائی حاملہ کے جلنے کے
مقام کی جانچ کرے۔ وہ کبھی گرم پانی اور صابن سے ہاتھ صاف کئے بغیر فحش

میں ہاتھ نہ لگاوے۔ دانی کے ہاتھ کا ناخن بھی کٹا ہونا چاہیے۔ اگر ہاتھ میں کسی طرح کی جلدی بیماری ہو تو اس دانی سے کام نہ لینا چاہیے۔ درود اگر خوب زیادہ نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا گرم دودھ یا چائے پلانا چاہیے۔ ہومیوپیتھک مناسب دوا استعمال کرنے پر ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سر نکل آنے کے وقت میون یا عجیان پھٹ سکتا ہے۔ اس لئے اس مقام کو باہر سے اس طرح دبا رکھنا چاہیے کہ وہ پھٹ نہ جاوے۔ سر نکل آنے پر ایک تربیہ یا صاف کپڑا بھگو کر آنکھ صاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی بچہ کے گلے میں نال لپٹا ہو تو ہوشیار تعلیم یافتہ دانی یا معالج کی مدد سے گلے سے نال نکال دینا چاہیے۔ ورنہ پیدائش میں بیکار دیری ہوتی ہے۔ اور گلے میں پھانسی لگ کر بچہ کی موت ہو جاتی ہے۔

ماں کے عل اور زمین کی گرمی علیحدہ علیحدہ رہتی ہے۔ اس لئے بچوں کو بیدار ہونے کے بعد ہی سردی اثر کر سکتی ہے۔ اس بارہ میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی وقت سے بچہ کی قوت مدر کہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لئے پیدا ہونے کے بعد ہی بچہ ہونے لگتا ہے۔ تنفس کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سر میں خون غالب نہ ہونے پائے۔ حل میں سر کو نیچے کی طرف رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس لئے بچہ کا سر ذرا ڈھالو مقام کی طرف رکھ کر بستر پر کروٹ لٹانا چاہیے۔ دائیں کروٹ لٹانے پر اس کے خون کے دوران میں مدد ملتی ہے۔

اگر بچہ نہ روئے یا اس کی آواز نہ معلوم ہو تو اس کی کمر زور سے دلیکن ایسا نہیں کہ تکلیف ہو یا قہقہہ تھپانا چاہیے۔ یا آنکھ منہ پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا دینا چاہیے۔ اس بچہ کی قوت مدر کہ اپنا فعل کرنے لگتی ہے۔ زبان پر تھوڑا سا سیاہ مرنج کا سفوف رکھنے یا جسم پر آہستہ آہستہ چٹک کا رواج بھی ہے۔ اگر اتنے پر بھی بچہ ہوش میں نہ آئے تو فوراً نزدیک کے کسی معالج کی مدد لینا مناسب اور بہتر ہے۔

اس وقت بچہ کی سانس شروع ہو جاتی۔ بچہ کے تنفس کا کام شروع ہونے پر بھی غرمہ نکسا انتظار نہ رہتا ہے۔ بچہ کی نال (جو حل کے کل کے

ساتھ مل رہی ہے اکی جا پنچ کر کے نال کی تر پ بند ہونے پر ناف سے کم سے کم ڈیڑھ اینچ کے فاصلہ پر اور پھر وہاں سے تین اینچ ہٹ کر دو گانٹھیں دینا چاہیئے جس سے سوت (دھاگہ) سے گانٹھ رہی جائے۔ اس کو کھولتے پانی میں اچھی طرح جوش دینا چاہیئے۔ اس کے بعد باہر کی طرف یعنی ماں کی طرف بندھن کو بچھڑا کر ان دونوں گانٹھوں کے بیچ میں کاٹنا چاہیئے۔ اس کے لئے ایک نئی چھری یا قینچی پہلے ہی سے کھولتے پانی میں ابال لینا چاہیئے۔ ہمارے ملک میں کہیں سے ایک چھری لاکر نال کاٹا جاتی ہے۔ اس مہلک فعل کی وجہ سے بہت سی زچہ اور لڑکا مد بچہ کو ٹیٹنس یا کزاز مرض ہو جاتا کرتا ہے۔ اس کزاز کو بھوت یا پوتنا لگنا کہتے ہیں اور اپنی خطا کو بھوت کے سر ڈال کر اپنے کو تسلی دی جاتی ہے۔ نال کاٹنے کے بعد پھر نال کو گھوما کر باندھنا اچھا ہے۔ جیسے فٹ بال کا بلا ڈر باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ولادت کے وقت یہ خوبی دیکھ لینا چاہیئے کہ زچہ کی سیوں (یعنی مقعد اور فرج کے درمیان کا مقام) میں کہیں سے زخم تو نہیں ہو گیا۔ یا پھٹ تو نہیں گیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو قابل معالج کی مدد سے اس کی سلائی کر دینا چاہیئے۔

اس کے بعد لڑکا مد بچہ کی طرف رجوع ہونا چاہیئے۔ بچہ کو کچھ گرم پانی میں نہلا کر گرم بستر پر لٹا دینا چاہیئے۔ انگلی میں تھوڑا شہد لگا کر چننا دینا چاہیئے۔ ناف جب تک خشک نہ ہو جائے اس وقت تک صاف ستھرے کپڑے کی پٹی باندھ کر پیٹ کے ساتھ باندھ رکھنا اچھا ہے۔ اس بات پر خیال رکھنا چاہیئے۔ کہ مواد نہ پیدا ہو۔ ہمیشہ زچہ کا دودھ کچھ نکال کر دینے کے بعد بچہ کو پلانا چاہیئے۔

ماں کی پستان کا دودھ ہی بچہ کی بہترین غذا ہے۔ لیکن اپنا دودھ پلانے والی ماں اگر بیمار ہو جائے تو اولاد کو بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ ماں کے پستان کا دودھ نہ ملنے پر باہر کا دودھ استعمال کرنے پر بھی اولاد ہمیشہ کیلئے مریض یا مریضہ ہو جاتی ہے۔ یعنی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لئے ماں کے پستان میں کافی دودھ ایشور کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لہذا اس بات پر بھی خیال رکھنا چاہیئے کہ وہ دودھ صاف رہے۔ اور ماں کو کوئی بیماری نہ ہونے پائے

بیمہ کا جگر ٹھیک نہ رہنے کی وجہ سے اگر باں کا دودھ برداشت نہ ہو تو پوشیا رہ
 ہو میوہیتھک معالج کی مدد سے علاج منتخب کر کے اس کو تندرست بنانا
 چاہیئے۔ اور اسی وقت معالج کی رائے کے موافق کوئی دلائی دودھ استعمال کرنا چاہیئے
ولادت کے وقت کے تین ضروری فرائض

۱۲) چھوت (SEPSIS) ولادت کے وقت اس پر نظر تانی رکھنا چاہیئے
 کہ جراثیم کی چھوت نہ لگ جائے۔ اس وقت بہت اندرونی عضو کھلی حالت
 میں رہتے ہیں۔ اس لئے جراثیم کے داخل ہونے کا ہمیشہ خوف بننا رہتا ہے۔
 ولادت کے کچھ پہلے ہی سے صاف ستھرا رہنا چاہیئے۔ دائی کو بھی اسی طرح
 خوب صاف رہنا چاہیئے گرم پانی اور صابن سے بغیر دھوئے کسی دائی کو حاملہ
 کا امتحان کرنا مناسب نہیں۔ اس وقت بھی صاف رہا جائے اُتنا ہی اچھا ہے۔
 ۱۳) اخراج خون (HEMORRHAGE) خیال رکھنا چاہیئے کہ بہت زیادہ
 خون نہ نکل جائے۔ اگر کسی خاص وجہ سے زیادہ اخراج ہو جائے تو رچہ کو موقوف
 اور خون بڑھانے والی غذا اور کافی آرام وغیرہ کی مدد سے فوراً طاقت
 لانے کی کوشش کرنا چاہیئے۔

۱۴) سیون یا مقعد اور فرج کے درمیان کے حصہ میں پھٹنا :-

(LACERATION OF THE PERINEUM) دائی کی غفلت وادمانہ
 فرج کا چھوٹا ہونا، یا جنین کی بڑی جسامت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے اگر ایسا
 ہو تو فوراً کسی پوشیا رڈاکر کی مدد سے اس پھٹی جگہ کو سلا دینا چاہیئے۔

پیٹ چاک کر کے ولادت (CASAREAN SECTION)

فرج پیڑو، ویزرہ کا بہت چھوٹا ہونا۔ پیڑو کی سناخت میں نقص جنین کے
 سر کو جسم کا بہت بڑا ہونا وغیرہ اسباب سے کسی کسی حاملہ کا پیٹ چاک کر کے
 پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام بہت تسلیم یافتہ دائی کر سکتی ہے۔ مندرجہ بالا وجوہات
 سے اگر پیٹ چاک کر کے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت آپڑے تو پھر ایسا بندوبست
 کرنا چاہیئے کہ بھر دو مارہ حل نہ قرار پاوئے

آلہ کے ذریعہ سے ولادت (FORCEPS DELIVERY)

اگر بچہ رحم میں مر جائے۔ ولادت مناسب طریقہ پر نہ ہو، اور مختلف وجوہات سے آڑ کے ذریعہ ولادت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی تعلیم یافتہ دائی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کاٹ کر یا مار کر بچہ کی ولادت :- اگر جنین کا سر بہت بڑا ہو یا فرج اور پیڑ و چھوٹا ہو۔ بچہ اگر کمزور ہو۔ اور تعلیم یافتہ دائی اگر مناسب سمجھے کہ بچہ اور بچہ دونوں ہی کی جان بچائے تو زچہ کی زندگی قائم رکھنے کے لئے بچہ کا جسم کاٹ کر یا سر توڑ کر ولادت کرا سکتی ہے۔

مختصر ولادت کا بیان ختم ہوتا ہے۔ غیر موضوع ہونے کی وجہ سے اس کتاب میں دایہ گیری کے پورے علم کا بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ناظرین کی معمولی معلومات کے لئے مندرجہ بالا بیان مختصر اگھا گیا ہے۔ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لئے کتب متعلق علم دایہ گیری پڑھنا چاہیئے۔

وقت حمل کے علامات کی دوائیں

ایٹک ایسڈ - ۶۔ ۴۔ حمل کے وقت کھٹی ڈکارا اور تے۔ ون رات منہ میں پانی بھر آنا۔ اور رال ٹپکنا۔ بہت زیادہ پیشاب آنا۔

ایلیٹس فیریٹوسا ۱۲x۳۳ حمل میں تنگ کرنے والی مثل بتلی کسی طرح بھی بند نہ ہوتی ہو۔ اس کے ساتھ غذا ہضم نہ ہونا۔ بتلی اور غذا سے نفرت۔ کھانے کی چیز یاد دیکھتے ہی پیٹ میں خرابی پیدا ہو جانا۔ سر میں جکڑے ہوشی اور غفلت کی نیند۔ انا کا ردیم - ۳۰ پیٹ خالی معلوم ہونا۔ اور صبح متلی، تے، ہو جانے پر متلی گھٹنا، غذا کے پہلے اور بعد تے، غذا کے بعد تے ہو جانے پر گھٹنا۔

انٹیم کروڈ - ۶۔ تے اور اکرن، زبان پر سفید موٹی تہ، (کیلی میوئر)

آرسنک - ۳۰۔ تمام جسم میں جلن، پیاس، بے چینی، کمزوری، اور بد سہمی۔

ایسارم یو ۶x۳۳ حمل کے شروع کئی مہینوں میں حاملہ جو کچھ کھاتی ہے۔ وہ بھی تے کر دیتی ہے۔ بو وٹا۔ صبح متلی، صرف پانی کی تے ہونا۔ کچھ کھانے پر گھٹنا کیڑی سلف - ۶۔ معدہ میں بے چینی معلوم ہونا تے اور متلی۔

کاکیسوس - ۶۔ ۳۔ صبح سوکر اٹھنے پر تے اور متلی۔ ناؤ یا کارڈی پر چڑھنے کے وقت باکسی چلتی ہوئی چیز دیکھنے پر متلی اور تے ہونا۔

کافیا ۶۔ متلی، بے خوابی اور درد۔ کو لچیک ۶۔ ۳۔ غذا کی پوریداشت نہیں ہوتی، بیشخص ہی متلی اورتے، اور مقام ماؤف میں درد۔ پیشاب میں رطوبت زلالی (دالیوسن) ہاتھ پر پھیلا کر سونہیں سکتا۔ ایسا کرتے ہی تے ہونے لگتا۔ ہاتھ پر سمیٹ کر سونے پر گھٹنا۔

کوئی یم ۳۰۔ صرف سونے میں متلی، پستان میں اکڑن کان دیر یا ۶۔ تکیہ سے اٹھاتے ہی متلی اورتے کیو پر مٹ ۶۔ ۳۔ متلی، تے، ہاتھ وپیر میں اینٹھن سائیکلون ۶۔ تے، متلی، سر میں چکر، ایسا معلوم ہو کر گر جائے گی۔ قیرم فاس ۶۔ تے۔ خون کی تے، کھاتے وقت یکا یک حقوڑی تے ہو جاتی ہے اسی وجہ سے جی بھر کر کھا نہیں سکتی۔

اگنیشیا ۶۔ ۳۰۔ بھکی، تے، غذا کے بعد کم ہونا، اسپیکاک ۶۔ ۳۰۔ صفراوی تے لگتا، متلی اورتے، اس کے ساتھ ہی اسہال اور درد شکم۔ آئی رس ۶۔ لگتا، متلی کی طرح لیسدار بلغم بھرا حقوڑا نکلتا۔ جے پورنڈی ۱۶۔ دن میں حاملہ لگتا، متلی کا کرتی ہے، اسی وجہ سے رات میں بھی سونہیں سکتی۔

کیلی کارب ۳۰۔ متلی، لیکن تے، نہیں ہوتی۔ چلتے ہی بڑھ جاتا۔ لیک ٹک ایسڈ ۳۔ منہ میں حقوڑا بھرتا ہے، متلی غذا کے بعد گھٹنا بکھڑی تے ہلی ٹک ۳۰۔ اگر جنین کی حالت میں نقص ہونے کی وجہ سے تے ہو۔

نیرٹم میور ۳۰۔ صبح متلی اورتے، درد سومات میں چورڈا کو کا خواب ناٹیرٹک ایسڈ ۳۰۔ متلی اور گلا اور معدہ میں جلن، چلنے، پھرنے اور سواری پر گھٹنا نکس و امیکا ۶۔ ۳۰۔ صبح اور غذا کے بعد متلی اورتے، ایسا معلوم ہو کر تے ہو جائے تو اچھا ہو۔ قبض، مقوی دوا استعمال کرنے کی بے حد خواہش۔

پیٹرویم ۳۰۔ حاملہ کے ہر قسم کی خرابی معدہ میں مفید ہے۔ گاڑی میں چڑھنے سے متلی۔ لگتا، تے کرنے کی کوشش اور منہ میں حقوڑا بھرتا۔

پلس ۶۔ ۳۰۔ پیٹرو اور رحم میں اینٹھن۔ شام اور رات میں تے اسہال ہر باخانہ مختلف طرح کا ہونا۔ تے کے بعد متلی اورتے۔

سباد ۷۱۔ ۳۔ غذا کھانے۔ کی خواہش نہیں رہتی۔ لیکن کھانا شروع کرتے ہی کھانے اُستی ہے۔

سیسہ ۳۔ استقامت کی حالت میں متلی، دہانہ رحم سخت۔
سٹے ٹی سیگریا۔ ۳ پیٹ بھرا رہنے پر بھی خوب کھوک بٹخ میں ہمیشہ پانی بھرتا ہے۔ سلفر۔ ۳۔ ۲۰ متلی اور تے، اس کے ساتھ ہی تمام جسم میں جلن اور شراب پینے کی خواہش۔ سمفوری کارپس ۶۔ غذا دیکھنے پر ہی غذا کی بو سے یہاں تک کہ کھانے کی بات سوچتے ہی بے چینی معلوم ہونے لگتا۔ متلی اور تے۔
ولادت کے وقت کی مجرب دوائیں

ایکون۔ ۳۔ ۲۰۰۔ حاملہ بے چین خیال کرتی ہے کہ اس مرتبہ وہ زندہ نہ رہیگی۔ لگاتار کراہتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر تیز درد پیدا ہو جاتا ہے۔ درد کے وجہ سے سانس نہیں لے سکتی۔ خیال کرتی ہے کہ وہ درد برداشت نہ کر سکیگی۔ چہرہ پر خوف کی علامتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دہانہ فرج، دہانہ رحم خشک۔ سخت اور پُر درد۔ آرٹیکا۔ ۳۔ ۲۰۰ جنین رحم میں اڑا ہو جانے کی وجہ سے کمر میں ناقابل برداشت درد کی مجرب دوا ہے۔ حاملہ ہر لمحہ پر جگہ بدلتی ہے ہر مرتبہ درد ہونے پر چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اور بے چین رہتی ہے۔

ولادت کے وقت سخت تکلیف۔ آگ کے ذریعہ سے ولادت بہت زیادہ اخراج خون، ولادت کے بعد اخراج تھوڑا ہونا وغیرہ ولادت سے اگر بخارا درد کم۔ منہ میں۔ زخم وغیرہ خون کی خرابی وغیرہ کے علامات ظاہر ہوں تو آرٹیکا جادو کا کام کرتا ہے۔
مٹیا لیکم۔ اتنا تیز درد ہو کہ حاملہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لئے موت کو ترجیح دے کر موت کی خواہش کرتی ہے اور خود کشی کرنا چاہتی ہے۔

بیلادونا۔ ۳۔ ۲۰۰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درد یکا یک آتا ہے۔ گویا پیٹ کی سب چیز باہر نکل آئیگی۔ درد بہت تھوڑی ٹھہرتا ہے اور ایک بار غائب ہو جاتا ہے۔ دہانہ رحم سرخ، گرم تیز خشک ایکون اپتلا اور سخت (بھاری اور سخت جاس) دہانہ رحم کی نشانی سکڑن، زیادہ عمر والی حاملہ کے ولادت کی تکلیف کی یہ ایک اچھی دوا ہے کبھی کبھی جسم گرم، نبض تیز، قوی اور پُر معلوم ہوتی ہے۔

کالوناٹلم ۳۰۰۶۔ دہانہ رحم سخت، رحم کے سکڑنے کی وجہ سے روزہ روزہ کر ولادت کا درد ہوتا ہے۔ لیکن دہانہ رحم کی سختی کی وجہ سے ولادت دیر سے ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر یہ دوا کارآمد ہے۔

کیوٹا ۳۰۰۶۔ ناقابل برداشت تشنج، درد، لٹوڑنے کی طرح درد۔ مگر۔ سے پیر تک پھیل جاتا ہے۔ ہر مرتبہ درد کے ساتھ بہت سفید پیشاب ہوتا ہے۔ درد سے حاملہ روتی ہے۔ دہانہ رحم اکڑا ہوا۔

کلوروفارم ۳۰۰۶۔ تمام پیٹ میں درد۔ لیکن پیٹھ میں درد زیادہ حاملہ کہتی ہے کہ اسکی کمر ٹوٹ جائے گی۔ دہانہ رحم سخت، اس لئے درد کا زور نہیں گھٹتا۔ سیسی سفید گا۔ ولادت سے کچھ پہلے جھوٹا درد زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ دہانہ رحم کی تشنجی سکڑن درد آڑا تر چھا گھومتا پھرتا ہے۔ ولادت کے شروع حالت میں عصبی درد اور سردی معلوم ہوتی ہے۔ درد زہ کچھ دیر ہو کر اور ولادت کا قتل ہو کر درد فوراً بند ہو جائے تو یہ دوا بہت مفید ہے۔

کافیا ۳۰۰۶۔ درد زہ تو ہو لیکن فعل ولادت نہ ہو۔ حاملہ درد زہ سے بچہ نہیں ہو جاتی ہے۔ لیکن ولادت نہیں ہوتی۔

جلس ۳۰۰۶۔ درد زہ جھوٹا۔ اوپر یا پشت کی طرف پھیل جاتا ہے۔ دہانہ رحم سخت، (پتلا اور تشنج بیلا ڈونا) درد اوپر کی طرف پھیل جاتا ہے۔ اس لئے یہ معلوم ہوتا ہے گویا جنین بھی نیچے کی طرف نہ جا کر اوپر کو دھکا دیتا ہو اچڑھٹا ہے۔ رحم کی سختی کی وجہ سے خلاصہ دست نہیں ہوتا۔ حاملہ کو پیچ پیچ میں جاڑا محسوس ہوتا ہے، یہ عصبی سردی ہے۔ چہرہ اور آنکھیں تھناتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ حاملہ نادانی اور غشی میں پڑی رہتی ہے۔ روزہ بھی معلوم ہوتا ہے جس حاملہ میں مندرجہ بالا علامات کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ حاملہ کے مفصل پر عصب کی کوئی طالت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ولادت کے کام میں خرابی پڑتی ہے۔ ایسے موقع کی جلس ایک خاص دوا ہے۔

کیل کارب ۳۰۰۶۔ بے درد روزہ، کمر میں تیز درد۔ صرف کمر دبائے کے لئے کہتی ہے۔ موٹی نازی اور نعل نعل جسم دالیوں کے لئے زیادہ کارآمد ہے۔

کیلی فاس ۶x۲۰ کمزوری کی وجہ سے ولادت میں دیر یا ناقابل برداشت دروزہ کسی کسی کی رائے ہے کہ ولادت کے چند ماہ پہلے سے روز ایک خوراک کیلی فاس ۶x۲۰ کھانے سے حاملہ اور جنین دونوں ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ولادت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

لائیکوپوڈی ایم ۳۰۰۰۲۰۰ دروزہ اوپر کی طرف یا بائیں طرف پھیلتا ہو حاملہ برابر چلتی رہنا چاہتی ہو۔ کبھی کبھی کسی چیز پر پیر رکھ کر زور سے کانکھتی ہے۔

میگنیشیا فاس ۶x۳۰ تشنجی دروزہ ۱۵ ساتھ ہی ساتھ دونوں پیروں میں لڑن نمکس ماسکیڈا ۶x۳۰ نا کافی اور غیر طبعی دروزہ تشنجی اور بے قاعدہ دروزہ۔

نمکس وایکا ۶x۲۰ ہر مرتبہ زرد کے ساتھ ہی ساتھ حاملہ کا بیہوش ہو جانا اور بے خبری میں پالخانہ و پیشاب ہو جانا۔ گرمی دروزہ۔

اوسیم ۳۰۰۰۲۰۰ ڈرکی وجہ سے دروزہ کو دوبار کھتی ہو۔ چہرہ ہنٹایا معلوم ہوتا ہے۔ آنکھیں چڑھی ہوئیں۔ حاملہ غشی میں ڈوب جاتی ہے۔ بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ پلاٹینا ۴x۳۰ دلمہ رحم اور دلمہ فرج میں درد کی وجہ سے ولادت کا درد رک جاتا ہے۔ صرف بائیں جانب درد بنا رہتا ہے۔

میلس ۳۰۰۰۲۰۰ رحم کی سختی کی وجہ سے یا جنین کے غیر طبعی بے جگہ ہو جانے کی وجہ سے ولادت میں دیر ہو جانے پر ٹائپس کے استعمال سے درد بڑھ جاتا ہے اور جنین کی حالت غیر طبعی کو قاعدہ میں لے آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ولادت بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے اکثر آلہ کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اسکو "ہومیو پیتھک فارسیپ" کہتے ہیں۔

سیکیل ۶x۳۰ حاملہ سمجھتی ہے کہ پیٹ کی سب چیزیں باہر نکل پڑیں گی۔ لیکن ولادت نہیں ہوتی۔ بہت روز پہلے ہی سے بے قاعدہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لئے رحم کی کمزوری کی وجہ سے ولادت میں دیر لگتی ہے۔

حمل میں لڑکا یا لڑکی ہونے کا سبب

یہ لڑکا یا لڑکی پیدہ ہونے کے حمل میں جنین لڑکا یا لڑکی کس طرح ہو جاتا ہے مہرشی شمسرت فرماتے ہیں کہ مرد کے منی کے کثیر زیادہ ہونے سے

لڑکا اور عورت کے سنی کے اندر زیادہ ہونے سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ حیض میں جفت دنوں میں مجامعت کرنے سے لڑکا اور طاق دنوں میں مجامعت کرنے سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جفت دنوں میں عورتوں میں اندر کم رہتے ہیں۔ اور طاق دنوں میں زیادہ رہتے ہیں۔ اس لئے طاق میں لڑکی اور جفت دنوں میں لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے لڑکا چاہنے والوں کو بعد حیض پاک خیالات سے مجامعت کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے اکثر علم حیات کے ماہران نے تبیجی، شہد کے مکھی کا انڈا یا ریشم کا کیڑا وغیرہ ادنیٰ کیڑے مکوڑوں کو اچھی مقوی غذا کھلا کر اس جنس کی مادہ اور انھیں کو غیر مقوی غذا کھلا کر فاقہ کرا کر ان سے نہ شہد کی مکھی یا بھونرا پیدا کرایا ہے۔

(BESIDES THE WORKS OF GEDDES EVOLUTION OF SEX (P.163.) THOMPSON AND OF ROLP CONSULTYOUNG'S EVOLUTION OF SEX (P.41-46) AND HAVELOCK ELLIS'S MAN AND WOMEN P.2)

کیا اعلیٰ جانداروں کے لئے بھی یہ اٹھوں ہے کہ مقوی غذا کے مقوی جنین رحم میں لڑکا یا لڑکی بن جاتا ہے؟ کیا جنین کے پرورش کے پورا بیان کر دینے سے حاملہ لڑکی پیدا کرتی ہے۔ اور اچھی غذا نہ ہونے سے لڑکا ہوتا ہے؟

لے ایک جاپانی ماہر کی رائے کے مطابق ایک حاملہ عورت اپنی دماغی طاقت سے حمل میں جنین کو لڑکا یا لڑکی بنا سکتی ہے جیسے حاملہ حل قرار پانے کے دو ماہ کے درمیان کم سے کم دو ہفتہ تک "ہمیں لڑکا ہو گا" یہ بات سونے کے وقت تک سوجھتی رہے تو وہ حاملہ مناسب وقت پر ضروری لڑکا پیدا کرے گی۔ اس طرح کے رواج سے جاپان ۲۰۰۰ عورتوں میں تقریباً ۱۹۵۰ عورتوں کے لڑکا ہی پیدا ہوئے تھے۔

in actual practice it has been found possible
in the case of certain organisms to produce
either maleness or femaleness by simply
varying their nutrition femaleness being an
accompaniment of a abundant food maleness
of the reverse-Ascent of man-Cheepedition (P-114-115)
by H. DRUMMOND (لاحظہ ہو)

۱۱) حالات حمل کے علامات

حالات حمل میں حاملہ کو بہت ہوشیاری سے رکھنا چاہیئے۔ حمل قرار پانے سے لے کر
ولادت کے وقت تک عموماً مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حاملہ کو
بہت تکلیف ہوتا ہے۔ ذیل میں خاص خاص علامات اور ان کے دفعیہ کے طریقے درج ہیں
غشی :- بے ہوشی ہونے ہی منہ میں ٹھنڈے پانی کا چھینٹا دینا چاہیئے۔ اور مشک
یا اسپرٹ کی طرف سے خوشبو کا مناسب ہے۔ بے ہوشی درد ہونیکے بعد مندرجہ ذیل ادویات دینا چاہیئے
خون وغیرہ نکلنے کی وجہ سے بے ہوشی ہونے پر۔ چائنا ۶۔۳۰۔ خون سے بے ہوش
ہونے پر اوپیم ۶۔ صبح تکلیف وغیرہ سے بیہوش ہونے پر الگینٹیا ۶۔ دل کا فعل کمزور ہونے
کی وجہ سے بے ہوش ہونے پر ڈیجی ٹالس ۶۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے غشی ہونے
پر ایسٹراس ۶۔ سونے کے بعد غشی ہونے پر لائیکو ۶۔ بستر سے اٹھنے کے بعد بے ہوش
ہونے پر ایکونائٹ ۳۔۱۰۔ اخراج خون کی وجہ سے غشی ہونے پر چائنا ۳۔ چوڑا
کی وجہ سے بیہوش ہونے پر آرنیکا ۳۰۔ سپرٹیا کے وجہ سے بیہوشی میں ماسکس ۳۔
درد دسر۔ اجتماع خون کی وجہ سے درد دسر ہونے پر ایکون، بل، اوپیم، صفر، کبکاتھ
خون کی زیادتی سے مرل سول، پوڈو۔ وجع مفاصل درد دسر میں برائیونیا، بدہضمی کی وجہ
سے درد دسر میں نکس، وایکا، ٹالس۔ ایکاک، بلسفر، سردی کی وجہ سے درد دسر
میں ایکونائٹ، ڈاکا مار، اولیریا، نائو، تبتی درد دسر میں چائنا، کونیم خون کی
زیادتی کی وجہ سے سرگھومنا اور آنکھوں کے سامنے کانے کانے داغ عظم ہونا

ایکونائٹ ۳۲ ٹیکن کی طرح درد سر، آنکھیں اور منہ سرخ، اور کان میں بھوں بھوں کی آواز کی علامت میں ہیلا ڈونا ۶۔ سر میں چلکن ہونے میں نکس دامیکا ۳۰۔ ضرورت ہونے پر درد سر کے علاج میں سے دوائیں منتخب کرنا چاہیے۔

درد لشت اور درد کمر۔ برالونیا۔ رسٹاکس ۶ اور سیپیا ۳ اس کی خاص دوائیں ہیں نیچے کے پیٹ لینی پیڑ میں درد زہ کی طرح درد ہو تو سیکیں ۳، بہت محنت کرنے کی وجہ سے دردیں آر نکا ۳، پیٹھ میں درد ہو تو کلکیر یا کالاب اور کاسٹیکم ۶۔ درد دایں یا بائیں جانب ہوتا ہو تو کیو ملا ۶۔ پلس ۳، فاسفورس ۳۰ ایکونائٹ ۳۲۔ کمر میں فلانین یا کوئی گرم کپڑا باندھ رکھنا مناسب ہے۔

پیٹ کی اینٹھیں:- حل میں بچہ بڑھتا رہتا ہے اس وجہ سے شترائین وریڈیں پیٹھے وغیرہ بھی بڑھاکرتے ہیں اور اسی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں خون جا ہوا معلوم ہونے کے ساتھ بخار کی علامت میں ایکونائٹ۔ پیٹ میں چبانے کی طرح درد ہونے میں حاملہ بچے کی طرف جھک جاتی ہے۔

ہیلا ڈونا ۳۲ پیٹ میں کوچن (غذا) کے تیز بڑھ جانے اور متلی ریاخ خارج ہونے اور قبض رہنے میں نکس دامیکا ۳۲۔ قبض یا سوئی چھیننے کی طرح درد اور ساتھ ہی متلی یا غذا کی تیز کرنے میں پکس ۶۔ کبھی کبھی ورے ایلب کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہ کارآمد ثابت ہوا ہے۔

استسقا۔ حالت حل میں دوران خون میں رکاوٹ کی وجہ سے پیران اور فرج میں آس ہوا کرتی ہے۔ آرسنک ۳۰۔ چارٹا ۴ کینتھ ۳۰۔ سلفر ۳۰۔ برالونیا ۳۰۔ ڈبجی ۳۲، اپیس ۳۰۔ یا فیرم ۳۰۔ علامات کے مطابق دینا چاہیے۔ استسقا کا بیان ملاحظہ ہو۔

ہسٹریا۔ جن حاملہ عورتوں کی مزاجی کیفیت میں ریاخ کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کو ہمیشہ یہ بیماری ہوا کرتی ہے ہسٹریا کی وجہ سے انکڑن بہت زیادہ ہوتے ہیں اسقاط حل بھی ہو سکتا ہے اس انکڑن کے پہلے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا نگلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے۔ نازق قطار رونا۔ بیکار بنگلنے کی کوشش کرنا خوب محسوس کرنا گلا مضبوط پکڑنا۔ چہرہ میلنا۔ ہوش رہنے پر بھی بول نہ سکتا، وغیرہ علامات پہلے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد ڈاکار آنا یا صاف پیشاب ہونا۔

اور آخر میں بار بار چھٹنا۔ آنسو بہانا، وغیرہ علامات ہو کر مرض جاتا رہتا ہے۔
 اگنیشیا، ہاسکس، بکس، دامیکا، پلاٹینا، اور دیرینا، اس کی مخصوص دوائیں ہیں۔
 سسٹریا کا بیان ملاحظہ ہو۔

مرگی :- سر میں درد، ہستی، دوار، دماغی خرابی، بے چینی، نیند، کلیجہ
 دھڑکنا، ہمتی، تپ، چہرہ سرخ، وغیرہ اس مرض کے علامات سابقہ ہیں۔ ایگاریکس
 بیلادونا، کاسٹی، سائیکوٹا، کیوپرم، ہایوسیا مس وغیرہ اس مرض کی مخصوص
 دوائیں۔ ”مرگی“ کا بیان ملاحظہ ہو۔

سکتہ :- تیز درد سرتے اور غش کھا کر مریضہ کا زمین پر گرنا۔ ناک سے گہری
 آواز، چہرہ سرخ اور آنکھیں ایک جگہ قائم ہو جانا وغیرہ علامات اس بیماری میں
 ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ، بیلادونا، کایوس، لیکس، بکس، دامیکا، اوپیم
 وغیرہ اس مرض کی اچھی دوائیں ہیں۔ مرض سکتہ ملاحظہ ہو۔

دماغی حالت کی خرابی :- حاملہ کو کبھی کبھی غصہ، ذرا سی بات پر رونا، ولادت
 کی فکر سے پریشان رہنا وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ سیمی سفیوگا ۳۔
 اور پلساٹیل ۳۔ اس کی اچھی دوائیں ہیں۔ چڑچڑا مزاج کے لئے کیوملادینا
 چاہیئے۔ اگر ولادت کی تکلیف کا بہت خوف ہو تو ایکونائٹ ۳ دینا چاہیئے۔
 قے یا متلی۔ حالت حمل میں متلی، اور منہ میں پانی بھر آنا یہ تینوں علامتیں
 اکثر صبح بڑھ جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ تک رہنے کے بعد یہ علامات خود بخود گھٹ جاتے ہیں۔
 لیکن آسانی سے اگر نہ کم ہو جائیں تو علامت کے مطابق مندرجہ ذیل دوا
 دینا چاہیئے۔

سمفوری کارپس رسی موسا - ۲-۳-۲۰۰ اس مرض کی مخصوص دوا ہے۔
 خاص کر حسب ذیل علامات میں، حمل قرار پانے میں برابر تپ، متلی، معدہ کی خرابی
 کبھی غذا کی خواہش، کبھی نفرت، منہ میں کڑوا پانی بھر آنا۔ ذائقہ بھی کڑوا۔
 قبض ہر قسم کی غذا سے نفرت۔ جیت سونے میں آرام معلوم ہونا۔

متوازن تپ، قے کرنے کی خواہش کے ساتھ صفرا یا بلغم کی قے ہونا۔ اسہال کا
 خوف، قبض ٹوکار آنا۔ منہ میں پانی کھرا آنا۔ سچسکی، صبح کے وقت یا کھانے

اینٹھن تشنج :- حل جب چار یا پنج ماہ کا ہو جاتا ہے۔ تب مریضہ ران، پیر، پیٹھ اور کمر میں اینٹھن یا اکڑن کی طرح درد ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر مندرجہ ذیل ادویات ۶۔ طاقت کی استعمال کرنا چاہئے۔ پیروں اور ران میں ہو تو کیو ملا۔ اکڑن کے ساتھ درد سر میں اور ضعف معدہ یا متلی ہونے میں نکس و امیکا۔ برائیونیہ۔ سپیا۔ اسپہال ہو تو آئرس یا وائرٹم ایلب کمر اور پیٹ میں ہو تو کالوسنتھ کیو پرم۔ نکس و امیکا اسکے ساتھ پیٹ پھولنے پر لاییکو۔

یرقان کا نور :- حالت عمل میں رحم بڑھ جانے میں صفرا لے جانے والی نلی پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے ہمیشہ یرقان ہو جایا کرتا ہے۔ کیو ملا ۶۔ مرک سول ۶۔ جلی ڈونیم ۳۰۔ اس کی اچھی دوائیں ہیں۔ دن میں بائیں کروٹ دبا کر سولے سے فائدہ ہوتا ہے۔

خود بخود پیشاب نکل جانا۔ کناس سے ٹائی وائی کینتھر ۳۔ سیلا ڈونا۔ ۳۔ گرم چیزیں، انگ اور کھٹی چیزیں کھانا منع ہے۔ ٹھنڈی چیزیں دودھ، وغیرہ اچھی مندائیں ہیں۔

تھوڑا پیشاب یا پیشاب روکنا۔ حل میں بچہ جتنا بھی بڑھے گا پیشاب کے عضو پر اتنا ہی دباؤ پڑے گا۔ اسی سے پیشاب کم ہوتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ اور پانی برابر برابر ملا کر صبح و شام تھوڑا تھوڑا پینے سے پیشاب آسانی سے ہو جایا کرتا ہے۔ پیشاب رک جانے پر کیفر کینتھر ۶۔ سیلا ڈونا ۳۔ اور گرم پانی سے نہانا فائدہ مند ہے۔ پیشاب روک جانا اور پیشاب پیرا نہ ہونا، کا بیان ملے حفظ ہو۔

قبض۔ نلی ریزہ پر جنین کا دباؤ پڑنے سے تبض ہوتا ہے۔ بخستہ پیتا خوب فائدہ کرتا ہے۔ کال سوتیا ۳۰۔ خاص دوا ہے۔ دوسری ادویات نکس و امیکا ۳۔ برائیونیہ ۶۔ ساغس ۳۰۔ اوپیم ۳۰۔ پلیم ۶۔ لیمو منلا ۶۔ پو ڈو ۶۔ قبض کا بیان ملے حفظ ہو۔

اسپہال۔ مرکب آئرس سول ۶۔ چائنا ۶۔ ایرٹھ فاس ۶۔ کیو ملا ۶۔ فاسفورس ۶۔ پو ڈو فاسلم ۶۔ اور سلفر ۳۰۔ بیان اسپہال ملے حفظ ہو۔

کلیجہ میں جلن :- پلساٹیل ۶ - یا کیپیکم ۶ - اس تکلیف دہ مرض کی خاص دوا ہے۔ مرض تیزابیت کی وجہ سے کلیجہ پر آجلن ہونے کی وجہ سے کلکیر یا کارب ۶ - آرس ۳ - کاربووج ۳ - نکس و امیکا ۳ - فلیس ۶ - فاس ۳ - ٹائیٹرک ایسڈ ۶ - وغیرہ دوائیں دقت پر ضروری ہو سکتی ہیں۔
مرض تیزابیت اور بد ہضمی ادیکھئے۔

بے خوابی :- کافیا خاص دوا ہے۔ شب کے وقت نیند نہ آئے لیکن آخر وقت میں نذار دے سلفر ۳ - نیند نہ آنے کے ساتھ بخار ہو - ایکونائٹ ۳ - پیر میں اکڑن کے ساتھ نیند نہ آئی ہو - کیموٹا ۶ - یا ورائٹرم ورائٹڈ ۶ - سونے کے پہلے گرم پانی میں مقوٹ انک ڈال کر اس سے بدن رگڑنے کے بعد تو لیا سے پونچھ ڈالنے سے اچھی نیند نہ آتی ہے۔ بیان مرض بے خوابی، ملاحظہ ہو۔

بری اشیاء کی رغبت :- جنی ٹی، کھریانک، وغیرہ کھانے کی خواہش ہونے پر کاربووج ۶ - کھریا کھانے کی رغبت ہونے پر کلکیر یا کارب ۶ - یا ٹائیٹرک ایسڈ ۳ - سانس کی تکلیف :- زیادہ گھومنے یا کھانسی کی وجہ سے بد ہضمی عصبی کمزوری وغیرہ اسباب سے حمل میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے - ایکون آرس - اپیس - ماسکس - فاس - فلیس و امیکا - برا یو نیا - وغیرہ اس کی مخصوص دوائیں ہیں۔

دل یا کلیجہ دھڑکنا - ڈیجی ٹیلیس ۳ - خاص دوا ہے - بد ہضمی کے وجہ سے اگر کلیجہ دھڑکتا ہو تو نکس و امیکا ۶ - اسٹری فتمتس ۱ - ماسکس ۳ - ایکونائٹ ۳ - آرس ۳ - بیلاڈ ونا ۳ - فلیس ۶ - سلفر ۳ - کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔
لو اسیر کسی کسی کو لو اسیر کا مرض ہو جاتا ہے نکس و امیکا ۶ - اس کی عمدہ دوا ہے۔
لو اسیر کے ساتھ اگر قبض ہو تو کالمن سونیا ۳ - کاربووج - پوڈو، ٹائیٹرک ایسڈ - وغیرہ ادویات کی گاہے گاہے ضرورت پڑتی ہے۔

کھانسی - کبھی کبھی خشک کھانسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے - ایکونائٹ ۳ - اونکس و امیکا ۶ - اس مرض کی مخصوص دوائیں ہیں۔ آلات تنفس کی بیماری ملاحظہ ہو۔
پیشاب کی تکلیف - امپرٹ کیمراس کی خاص دوا ہے - ایکونائٹ ۳ - بیلاڈ ونا ایس ۶ - آرنک ۶ - یا کینتھر ۶ - کی بھی گاہے گاہے ضرورت پڑتی ہے۔

آلات بول کی بیماری، ملاحظہ ہو۔

مجرائے بول کا تشنج :- مجرائے بول میں اگر طن ہونے کی وجہ سے حاملہ کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی دن و رات پینش اب ٹھیکتا رہتا ہے۔ کاسٹیکم ۶۔ یا ایسٹراس ۳۰ کا داخلی استعمال اور ایک گریں کلورائیڈ آف زنک۔ ایک آؤنس پانی ملا کر اس سے فرج دھو ڈالنا چاہیے، اسپانچ اور اسٹے فی۔ سیگر یا بھی فید ہے۔ ادرا ر حوض۔ حالت حیل میں بھی کبھی کبھی حوض نمودار ہوتا ہے۔ کایکولس ۶ یا فاسفورس ۶۔ اچھی دوائیں ہیں۔

درد۔ حالت حمل میں کسی مقام پر اگر طن ہونے پر وائی برنم اوپ ۳۰۔ یا کالوسنتھ۔ ۶۔ دل میں تپکن کا درد ہونے پر۔ آرج مرٹ ۶۔ جنین کے گھوٹنے کی وجہ سے درد ہونے پر آرڈیکا ۳۰۔ سیسیا ۶۔ تھو جاس ۳۰۔ کو نیم ۶۔ پیٹ میں آئیٹھن ہونا۔ کیو ملا ۱۲۔ یا نکس و امیکا ۶۔ ایک ہی ٹوراک ٹینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کلک کارب بھی اچھی دوا ہے۔

درد تو لبح ملاحظہ ہو۔

بخار۔ حالت حمل میں اگر کئی ماہ تک تھوڑا تھوڑا بخار ہو تو کسی دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بخار کسی طرح اچھا ہو تو ایکو نامٹ ۶۔ دینا چاہیے فرج کے باہر کھلی۔ بورکیس ۳۰۔ اور امبر آکریٹیا ۶۔ اس کی اچھی دوا میرا ہیں۔ پانی میں سہاگ گول کر اس پانی سے دن میں دو مرتبہ فرج کو دھو ڈالنا چاہیے۔

پیٹ ٹھک پڑنا۔ جن کے پیٹ کی جلد دھلی رہتی ہے ان کا حمل قرار پانے پر اکثر پیٹ ٹھک پڑتا ہے۔ اور تکلیف ہوتی ہے۔ کپڑے سے پیٹ کس کر باندھ دینے سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔

پیٹ بڑا ہو جانے کی وجہ سے تکلیف۔ پیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے اگر پیٹ کا جڑا چر جائے پچھے اور پستان میں درد ہو تو تھوڑا ماریل کاتیل پیٹ اور پستان پر مل دینا چاہیے۔ اس سے تکلیف کم ہو جاتی ہے اگر تکلیف کم نہ ہو تو بیلڈ ڈنا ۶۔ یا نکس و امیکا ۶۔ دینا چاہیے۔ پیٹ میں جنین کی حرکت سے تکلیف۔ اور نیم ۶۔ آرڈیکا ۳۰۔

سیلان الرحم۔ درد رحم کی طرح منی نکلا کرتی ہے۔ کلکیر یا ۶۔ روز دیا پانی کی طرح نکلنے پر سیسیا ۱۲۔ سیلان الرحم کی بیماری سے بالکل کمزور ہو جانے پر چائنا ۶۔ یا ایسٹرناس ۳ x اگر سیلان الرحم کے ساتھ فرج کے اندر سٹراہٹ ہو۔ اور جماعت کی نہایت خواہش ہو تو پلاٹینا ۶۔ سیلان الرحم ملاحظہ ہو۔

در دستان۔ پستان سترخ سخت بھاری اور درد ہو جانے پر ہیلڈونا ۳ x۔ پستان سخت متورم ہر لیکن سرخی نہ ہو۔ ایسے علامات میں براہوینا ۳۰۔ ٹھنڈے پانی کی پٹی پر باندھنا فائدہ مند ہے۔ لیکن تشنجی تکلیف میں گرم پانی کی پٹی ہونی چاہیے۔

پستان کی گھنڈی میں سوزش یا زخم۔ چوٹ لگ کر سوزش ہونے پر آدینکا ۳۔ کا داخلی استعمال اور آرنیکا پانی کے ساتھ ملا کر پستان میں خارجہ لگانا چاہیے۔ گھنڈی میں زخم ہونے پر یا سٹراہٹ پر ہائیڈروکسیس ۳۰ کا اندرونی استعمال اور ہائیڈراسٹس ۱۰ دھات گنے پانی میں ملا کر اپٹی لگانا چاہیے۔

پستان بڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف۔ درد قلع کی طرح تکلیف میں کرناٹم ۳۔ سوزش کی وجہ سے تکلیف ہونے پر ہیلڈونا ۳ x یا براہوینا ۳۰۔

رومانی تکلیف۔ حاملہ ہمیشہ افسردہ رہتی ہو۔ سہی سفیوگا ۶۔ رخ سے بے چین رہتی ہو اگنیشیا ۶۔ ڈرنے میں ایکونائٹ۔ غصہ و رعبیت ہونے پر کیوٹلا ۱۲۔

حصوٹا درد ۵۔ آخر حالت میں جننے کی طرح درد برابر ہو کر تابعدا و طبعی علامات ملاحظہ ہو اکیوٹلا ۶۔ اس کی عمدہ دوا ہے پلساٹیل ۳۰ سہی سفیوگا ۳۰۔ یا کوٹونکلم ۳ کی بھی ضرورت ہو کرتی ہے۔

حالت حمل میں اخراج خون ۱۰۔ حاملہ کے ہنسنے اور نہ اٹھانے یا گر جانے پر رحم میں دھکا لگ کر مشیمہ (PLACENTA) رحم سے کچھ دور علیحدہ جاگرتا ہے۔ کما سے خون گرتا ہے۔ آرنیکا ۳۔ اس کی اچھی دوا ہے۔

۱۲۔ مندرجہ بالا اسباب کے علاوہ اگر پھول مشیمہ رحم کے منہ پر ڈھکن کی طرح رہے۔ اور اس کی وجہ سے خون گرتا ہو تو مرض سخت خیال کر کے ہوشیار دوائی گیری جاننے والی کو بلا کر دکھانا چاہیے۔ یہ مرض حمل کے آخر حصہ میں

یا ٹھیک ولادت کے وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اخراج خون ہی اس کی خاص علامت ہے۔ طبیعی دروزہ میں بلغم کی طرح ایک چیز نکلتی ہے۔ کبھی خون نہیں نکلتا۔ ولادت کی حالت دیکھئے) مٹلیم (اس اخراج خون کو بند کرنے کی ایک اچھی دوا ہے۔

کمی خون۔ پیریا بخار میں، بہت دیر رہنا۔ کیرٹس رہنے وغیرہ اسباب سے کمی خون ہو تو ان امراض کا علاج کرنا چاہیئے۔

سودا المزاجی (DIATRISIS) ماں باپ کو کسی مرض کے رہنے پر اولاد کو بھی وہی مرض ہوتا ہے۔ حاملہ کو مندرجہ ذیل ادویات کو ایک مرتبہ ہر ماہ میں استعمال کرانے سے اولاد اچھی اور طاقتور ہو سکتی ہے۔

کلکیریا کارب۔ ۳۰۔ ماں باپ پر کنٹھ ملا (SCROFULA) کا مادہ ہو۔
بیسلیم۔ ۲۰۰۔ خاندان میں تپیدتی ہونے میں

سورنیم۔ ۳۰۔ ماں باپ کو بدبودار جلدی امراض ہوتے ہیں۔

سدکا۔ ۱۰۰۔ ماں باپ کو بڑی آبیاری ہونے پر بے ثمار کارب۔ ۳۰۔ یوڈیم۔ ۳۰۔
محقوجا۔ ۳۰۔ مرکوریس۔ ۳۰۔ کارشیکم۔ ۳۰۔ پپیا۔ ۳۰۔ سلفر۔ ۳۰۔ علامات کے مطابق استعمال کرنا پڑتا ہے۔ امراض اطفال میں سودا المزاجی، ملاحظہ ہو۔

اسقاط حمل پیٹ کرنا (ABORTION)

حمل قرار پانے سے چھ ماہ تک حمل نکل جانے کا نام اسقاط حمل، یا پیٹ کرنا ہے۔ اس حالت میں تو اولاد زندہ رہتی ہی نہیں۔ اگر ہوشیاریا سے خبر گیری نہ کی گئی تو جس عورت کا حمل گر جاتا ہے۔ اس کی بری حالت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے جان کے لائے پڑ جاتے ہیں۔ اسقاط حمل کی پہلی علامت کمر اور پیٹ کے نیچے پیر و میں درد، ایسا معلوم ہونا گویا رگ کا پیٹ کے نیچے کھسکا آتا ہے۔ خون یا بلغم نکلتا ہے۔ حمل کی حالت میں کس کر کپڑا پہننا

سات مہینے کے بعد اور نو مہینے کے پہلے بچہ پیدا ہونے پر اسے دردت بے وقت کہتے ہیں۔ ایسی بے وقت کی پیدا ہونے والی اولاد آٹھ مہینے کی زندگی نہ رکھتی ہے۔

زیادہ محنت کرنا، گاڑی، پانکی، کشتی، ریل گاڑی وغیرہ پر چڑھنا (خاص کر حمل کے اول چار ماہ) درود صوب کرنا۔ گر جانا، بھاری چیز اٹھانا۔ زور سے اٹھن ملنا۔ میدہ پینا، روٹی بیلنا، اچھل کر چلنا (انگل پر بوجھ دیکر کھڑے ہونا)۔ تصویر یا مسہری ٹانگنا، چیمک کا بخار، اسہال وغیرہ ہونا (جامعت کرنا، نیزاد ویات کا استعمال، فسرخ میں درد، زیادہ خوف، نگرہ رخ وغیرہ اسباب سے اسقاط ہوتا ہے۔ حالت عل میں ہمیشہ ان باتوں سے خوب ہوشیار رہنا چاہیے۔ جس کو ایک مرتبہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ اس کو دوسرے مرتبہ بھی اسقاط ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لئے جب تک حمل رہے خوب ہوشیار رہنا چاہیے۔

اسقاط حمل روکنے کا علاج

سبب ۱۔ حمل میں پہلے تین مہینہ میں الفاظ کا اندیشہ رہنے پر (یعنی درد ہونا یا خون کا ہر ہونے والا)۔
سیکیل ۲۔ حمل کے پورے یا اسکے بعد کے مہینوں میں اسقاط ہونے کا خوف ہو۔ (یعنی درد ہو۔ اور خون ظاہر ہو)۔

آرتیکا ۳۔ گر بڑنا، بھاری چیزیں اٹھانا۔ مار کھانا۔ چوٹ وغیرہ اسباب سے اگر اسقاط ہونے کا خیال ہو۔

کیموٹا ۴۔ غصہ وغیرہ۔ دائمی تحریک کی وجہ سے اسقاط ہونے کا خوف۔ دائمی برہنہ اوپ ۳۔ تو لہجی درد کی تکلیف۔

علاج بعد اسقاط حمل

مندرجہ باتوں سے ہوشیار رہنے پر بھی اگر اسقاط حمل ہو جائے تو ایسی ترکیب کرنا چاہیے کہ حمل سے جنین یا پھل (مشیمہ) اچھی طرح سے نکل جائے۔ ہوشیار دایہ کو بلا کر اس کو بند ولبت کرنا چاہیے۔ نہیں تو زچہ خانہ کی بیماری پیدا ہو کر زچہ کی جان جانے کا خوف رہتا ہے و مشیمہ پھول گرنے میں دیر ہونے پر پلسا ٹیلا ۳۰۔ سیکیل ۳۰۔ ۲۰۰۔ دینا چاہیے۔ کسی ہفتوں تک خون نکلنے کے وجہ سے بہت کمزور ہو جائے تو چائنا ۲۰۰۔ ۲۰۰ دینا چاہیے۔

علاج اسقاط حاصل ہو بار بار ہو

پہلے جس وقت اسقاط ہوا ہو اس کے کم سے کم ایک ماہ پہلے چار سے فی ہفتہ علامات کے مطابق حسب ذیل ادویات استعمال کرنا چاہیے۔ رحم کی خرابی کی وجہ سے اسقاط ہونے پر آپیس ۶۔ سبائٹا ۶۔ یا سیکیل ۶۔ پھول (PLACEA) کی خرابی کی وجہ سے ہو تو ناسفورس ۶۔ جنین کی خرابی سے یا ماں کے آنشک کی وجہ سے اسقاط ہونے پر مکرور لیس کار ۶۔ ماں باپ کو دق رہنے پر سیلینم ۳۰ (ایک ماہ میں ایک خوراک) علاج معافون، حمل کی حالت میں لاشی رہ رہا اور جسم میں دھاؤ کے ساتھ اگر بلغم یا خون نکلتا شروع ہو جائے تو اس حالت میں اسی وقت زچہ کے سر کے نیچے سے تکیہ مٹا کر جت رٹا دینا چاہیے۔ اور خون بند کرنے کے لئے اس کے پیٹ پر اور فرج میں برف کے ٹکڑے یا سرخ پانی کی پٹی براہِ برکھنا چاہیے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زچہ کے جسم اور دماغ پر کسی قسم کی تکلیف نہ پہونچے۔ جس کمرہ میں زچہ آرام کرے وہ ٹھنڈا اور صاف رہنا چاہیے۔ اور دماغ اور پیٹ پر بھٹن نہ ہو بہت دیر تک چت سونے کی وجہ سے تکلیف ہونے پر ایک برسے تکیہ کی آڑ لگا کر زچہ کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ بھوک لگنے پر اچھ نذر دینی چاہیے۔

ولادت کے وقت کے علامات

ولادت کے وقت پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ حمل رہنے کے دن سے قریب قریب ۸ دن کے اندر (یعنی دسویں مہینہ) اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نو مہینہ تک حاملہ کالچے پیٹ یعنی پیڑو (چھوٹا پیٹ) بڑھتا ہے اس کے بعد دینے ولادت کے نو دن پہلے اپیرا وٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کمر پٹی ہوتی ہے۔ پیشاب کئی بار ہوتا ہے۔ اور ہڈی کے نیچے درد پیدا ہوتا ہے۔ ایسے علامات معلوم ہوتے ہیں زچہ خانہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ولادت کا دن معلوم کرنے کے لئے ولادت کا دن معلوم کرنے کی فہرست ملاحظہ ہو۔

زچہ خانہ۔ مکان میں جو اچھا کمرہ ہو دینی جو کمرہ بڑا صاف ستھرا اور بدبو سے پاک ہو جس میں ہوا خوب آتی جاتی ہو اور سردی اور دھواں کی گنجائش نہ ہو۔ ایسے کمرہ کو زچہ خانہ بنانا چاہیے۔ زچہ خانہ کی خرابی سے زچہ اور بچہ کے جان

جانے کی تیار ہو جاتی ہے موسم بہار سات اور جاڑ۔ کی سردی سے بچنے کے لئے
زچہ خانہ کے ایک کونے میں کوند یا ٹھوڑی آگ جلا کر رکھنا چاہئے۔ لیکن یہ خیال
رکھنا چاہئے کہ دھواں پیدا نہ ہو۔

درد زہ۔ رحم کے اندر بچہ کے بڑھتے رہنے پر حمل کے پورے دنوں میں وقت
وقت پر درد زہ ہوتا ہے۔ رحم کے عضلات کا سکڑنا ہی ولادت کا فعل ہے اسی
وجہ سے زندہ بچہ جس طرح آسانی سے باہر نکلتا ہے۔ مردہ بچہ بھی اسی طرح نکلتا ہے
باہر نکلنے کے لئے حمل کے بچہ کو نہ تو کوئی کوشش ہی کرنی پڑتی ہے اور نہ زور ہی لگانا
پڑتا ہے حمل کے کسی پوشیدہ طاقت کے ذریعہ ہی یہ ولادت کا کام ہو جاتا ہے۔
جنگل کی پتل پگ ڈنڈی سے آنے میں راستہ کی حالت سمجھ کر ہم روٹ جس طرح بچ کر
چلتے ہیں اسی طرح پیدائش کے وقت وہی پوشیدہ طاقت ماں کے حمل میں مردہ یا
زندہ بچہ کو آگے بڑھاتی ہے۔ پیدائش کے راستہ میں جو جگہ جیسی بنی ہے۔
ماں کے حمل میں اسی پوشیدہ طاقت کی مدد سے بچہ اسی طرح واپس رہتا ہے۔
ورنہ پیدائش کا فعل ایک طرح سے غیر ممکن ہو جاتا۔ ولادت کے راستہ کے خاص
مقامات میں جہاں کہیں بچہ کا کندھا رکتا ہے اسی وقت حمل کی وہی پوشیدہ
طاقت کے ہاتھوں سے اس کے کروٹ لینے کا فعل (ROTATION) ہوتا ہے اور
بچہ آسانی ہی سے جانے والے راستہ سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس پوشیدہ نہ
دیکھ بڑھنے والی طاقت اعظم کے خوش فعل کو خیال کر کے عالم سکھ میں ہو جاتا پڑتا
ہے۔ رحم کی شکل بدلتا۔ بیرونی اعضاء تناسل کا تردد بنا۔ ان عضلات کا ڈھیلا پن
اور دماغی تفکرات یہ سب درد زہ کے پہلے علامات ہیں۔ اس کے بعد بار بار
بول و بزا زہ سے فراغت پانے کی حاجت۔ جسم میں کچھ درد ہونا۔ اور قے آنا۔ جسم
کا نپنا۔ پانی نکلنا۔ (فرج سے پھیلنے کی طرح بلفم نکلنا) اور کمر سے درد شروع ہو کر
پیٹ کی طرف آ کر ٹھہر جانا۔ درد زہ کی علامت ہے۔ اکثر درد زہ کا شناخت کرنا
مشکل ہو جاتا ہے اسی سے سچے اور جھوٹے درد زہ کی شناخت مندرجہ ذیل ہے۔

درد زہ سچا { درد زہ جھوٹا
(۱) پیٹ کمر میں کبھی کبھی ران تک درد (۲) صرف پیٹ ہی میں درد کو چون کی طرح ایک جگہ

درِ درزہ سچا

درِ درزہ جھوٹا

(۲) ہر مرتبہ درِ درزہ کا قاعدہ بیسیس ہر نیدرہ (۲) درِ درزہ ہونے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جیسے بیس بیس منٹ کے بعد علی الترتیب آتا ہے۔

اور رفع ہو جاتا ہے

(۳) ہر مرتبہ درِ درزہ کے ساتھ رحم کا منٹھ ٹھوڑا (۳) درِ درزہ میں رحم کا منٹھ بالکل نہیں کھاتا اور کھل جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے۔ پانی نہیں نکلتا۔

درِ درزہ جتنا جلد جلد ہوگا۔ پیدائش کا وقت بھی اتنا ہی عرصہ سمجھنا چاہیئے۔ اور ہوشیار دایہ کو بلانا چاہیئے۔

علاج: کاوا قالم 3×3 جھوٹے درِ درزہ کی اچھی دوا ہے۔ بدھیمی سے پیدا ہونے والے اور دیس پلس ۳-۳۔ خوف یا ڈر سے جس کی تحریر ایک آسانی سے ہو جائے ان کے لئے ایکٹوارس ۳-۳ بہت اچھی دوا ہے۔

ولادت کے تین درجے: اگر درِ درزہ شروع ہونے کے چھ گھنٹے کے اندر لڑکا پیدا ہو جائے اور لڑکے کا سرزنگ نکلے تو اس کو طبعی ولادت کہنا چاہیئے۔ طبعی ولادت کے تین درجے (STAGES) ہیں۔

پہلا درجہ: درِ درزہ شروع ہوتے ہی رحم کا منٹھ کھلنے لگتا ہے اور پانی نکلنے کے وقت تک (یعنی درِ درزہ شروع ہونے سے پانی یا تحصیل پھٹنے تک)

دوسرا درجہ: رحم کا منٹھ کھلنے پر دراز ہو کر پانی نکلنے کے وقت سے بچہ نکلنے کی حالت تک اس درجہ میں رحم کا منٹھ اور باہری آلات تناسل میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایک سرزنگ کی طرح ہو جاتا ہے۔

تیسرا درجہ: بچہ پیدا ہو جانے سے رحم کا پھول (مشیمہ) باہر نکلنے تک۔

ملہ عموماً ولادت طبعی ہوتا ہے لیکن آج کل تیسری پ کی ترقی کی وجہ سے "غیر طبعی ولادت" درجے بچے کا ہاتھ، پیر وغیرہ باہر نکلتا۔ پاپر خراست و ذل تک ولادت کی تکلیف رہتا ہے کہ نہیں ہوتی ایسی میں مسلم دایہ گیری جاننے والے ہو میو پیٹھک معالج سے علاج کرنا چاہیئے۔

طبعی ولادت میں ضروری عمل کرنے کے قابل کچھ باتیں
 پہلا درجہ۔ ولادت کے پہلے درجہ میں زچہ جس طرح رہنا یا جو کام کرنا چاہئے
 اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درجہ میں اس کو زچہ خانہ میں
 لے جانا یا زور سے کو تھپنے کو کہنا ہیکار ہے۔ بیج بیج میں گرم دودھ یا گرم پانی
 پلانا چاہئے۔ اس سے کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ سرد چیز کھلانا یا پلانا ممنوع ہے۔
 ایسی چیز کھلانے سے درد بند ہو سکتا ہے۔ پہلے درجہ میں کوئی درد ادینا مناسب
 نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا معلوم ہو کہ بچہ کا سر آگے نہ نکل کر دوسرا کوئی عضو نکل
 رہا ہے تو پلساٹیل ۱۲۔ ورتین خوراک دینا چاہئے۔ اس دوا کے اثر سے بچہ کا
 سر گھوم کر نیچے چلا آ سکتا ہے۔ ولادت کے وقت کے علامات دیکھئے۔

دوسرا درجہ۔ اس وقت بہت ہوشیاری سے کام کرنا چاہئے۔ یا نکلنا شروع
 ہونے پر زچہ کو زچہ خانہ میں لے جانا چاہئے۔ اور پہلے ہی کی طرح بیج بیج میں گرم
 دودھ پلانا چاہئے۔ اگر درد محسوس ہو کر بند ہو جائے تو ٹیکے کے اندر انگلی ڈال
 کر یا ناک میں سینک ڈال کر یا کٹا ہوا بال کھلا کر یا کسی معمولی طریقے سے قے
 کرانے سے درد آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت زچہ کو ایک ہی
 مقام پر استقلاں سے رہنا چاہئے۔ زیادہ جھٹ پٹانے سے درد زور
 سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ولادت کے وقت زچہ کو بائیں کروٹ دکھا کر دوڑوں
 ہاتھ سر کی طرف پھیلا رکھنا چاہئے۔ اور دوڑوں کھٹنے سینہ کی طرف اٹھا
 کر پیر پھیلانا چاہئے۔ جس سے دوڑوں بیروں کے بیچ میں ایک گول تکیہ رکھا
 جاسکے۔ اس طرح رہنے سے ولادت ہو جاتی ہے۔ ولادت سے پہلے کم سے کم
 ایک مرتبہ پاخانہ اور پیشاب کرا دینا چاہئے۔ اخراج خون ہونے پر حمل میں
 اخراج خون ملاحظہ ہو۔

بچہ کا سر آلات تناسل کے اندر جا کے پردا یہ کو ولادت کے دروازہ کی
 حفاظت کرنی چاہئے۔ ورنہ بچہ کا کدرھا نکلنے کے وقت فرج پھٹ کر فرج اور

طبعی دروازہ میں ہضم کی طرح کوئی چیز نہ ہر نکلتی ہے کبھی کبھی بالکل اخراج نہیں ہوتا۔

مقدامیک ہو جاسکتی ہے۔

۲۔ بچہ کا سر باہر نکلتے ہی اس کے چہرہ پر کی رطوبت، بلغم وغیرہ صاف کر دینا چاہیئے اور نہ بلغم وغیرہ منہ اور ناک کے اندر جا کر سانس کو روک دے سکتے ہیں۔ اور بچہ کا سر باہر نکلتے ہی اگر معلوم ہو کہ اس کی نال مالا کی طرح بچہ کے گرد لپٹی ہوئی ہے تو انگلی ڈال کر اس کو اس طرح ڈھیلا کر دینا چاہیئے کہ اس کے بیچ سے بچہ کا کندھا آسانی سے باہر نکل سکے۔ بچہ کا سر نکلتے ہی زور سے بچہ کا جسم باہر نہ کھینچ لینا چاہیئے۔ اس سے ماں اور بچہ دونوں کے جان جانے کا خوف ہوتا ہے۔ شدت پر بھر دوسرے کرنے سے باقی جسم بھی خود بخود نکل آتا ہے۔

بچہ کے باہر نکل آنے پر اس کو زچہ کے بالکل پاس آہستہ آہستہ رکھنا چاہیئے۔ دور رکھنے سے ناف سے نال ٹوٹ کر اخراج خون ہو سکتا ہے اس سے زچہ اور بچہ دونوں ہی کی موت ہو سکتی ہے۔

نال نکلنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی رویا کرتا ہے۔ اسی وقت سے اس کے تنفس کا فعل شروع ہو جاتا ہے۔ طبیعی ولادت میں بچہ زمین پر آتے ہی رونے لگتا ہے۔ یہ رونا بہت اچھی علامت ہے۔ جب تک بچہ نہ روئے نال نہ کاٹنا چاہیئے۔ دایہ یا جو مورت نال کاٹے اس کے ہاتھ کا ناخن بڑھا ہوا نہ ہونا چاہیئے۔ یا ہاتھ میں کسی قسم کا زخم نہ ہو بڑھے ہوئے ناخن کے اندر بہت قسم کا زہر رہتا ہے۔ اور زخم میں مرض کے جراثیم رہتے ہیں اس سے زچہ کو بخار وغیرہ بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لئے ناخن کٹا کر جھنا نا چاہیئے۔ نال کے جس جانب بچہ کی ناف لگی ہے اسی طرف بچہ کے نال کے اوپر کی تین انگلی نال رکھ کر نرم ریشم سے خوب کس کر دو گانٹھیں لگا دینا چاہیئے۔

۳۔ خوب پتلا یا بہت موٹا نہ ہونا خوب پتلا ہونے سے نال کٹ جاسکتی ہے۔ اور خوب موٹا رہنے پر اچھی طرح گرہ نہ لگ سکے گی

کند چیز سے نال کاٹنے سے بچہ کے اس جگہ درد ہونے کا اندیشہ ہے۔ کند چیزوں سے نال کاٹنا کسی طرح مناسب نہیں ہے (بقیہ صفحہ ۹ پر ملاحظہ کیجئے)

اور اس کے اوپر کی طرف ایک انجلی تیکر کر دو ٹکنا چھیں اور لگا دینا چاہیے۔
اس طرح بچہ کی طرف اور زچہ کی طرف نال باندھ دینے سے دونوں بندھن کے
بیچ کی نال دھار دار قنیر یا چھری سے کاٹ دینا چاہیے۔ نندہ اس خوب سخت
نہ ہونے پر زیادہ خون نکلنے سے بھی بچہ کی جان جاسکتی ہے جسے دار بچہ کی
حرکت سے کاٹنے کے وقت اس کے ہاتھ میں چھری لگ کر کاٹ جائے۔ اگر
بچہ پیدا ہونے پر اس کا منہ نیلا ہو جائے تو پہلے نال کاٹ کر تھوڑا خون نکال
دینے کے بعد نال باندھ دینا چاہیے۔

نال کاٹ جانے پر بچہ کے نال کے اوپر تیل کی پٹی رکھ کر باندھ دینا چاہیے۔
اس کے بعد انگلی میں شہد لگا کر بچہ کے منہ کے اندر کا باخم وینرہ صاف کر دینا چاہیے
آخر میں تھوڑے گرم پانی سے اس کو نہلا کر صاف ملائم کپڑے سے اس کو
ڈھک دینا چاہیے۔ نہلا نہ کرے بعد ہی اس کو گرم کپڑے سے
ڈھک نہ دینے سے سردی کھائے۔ یہی ہو جانے کا اندیشہ رہتا
ہے ماں کے پیٹ میں ہوا سے بد جگہ میں رہنے کی وجہ سے جنین ہمیشہ
گرم رہتا ہے۔ اس لئے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو اسی طرح گرم حالت
میں رکھنا فرض ہے۔ اور زور سے جسم پر بچہ دینے یا رگڑنے سے بچہ کی ملائم
جلد چھل جاسکتی ہے۔ سردی یا خوب ٹھنڈی ہوا چلنے پر نہلا نا بند کر کے
خالص سرسوں کا تیل گرم کر کے بچہ کے سر اور کل جسم پر مالش کر کے خوب
پتلے کپڑے سے آہستہ آہستہ جسم پر بچہ ڈالنا اچھا ہے۔ بچہ کا پیدا ہوتے

پشت کا بقیہ نال کاٹنے کے بعد بچہ کی باقی نال سفید کپڑے سے دھک کر سینہ کی جانب ڈال کر
فلاین سے پیٹ کمر باندھ رکھنا چاہئے پانچ سات دنوں میں وہ اس خشک ہو کر خود بخود گر جاتی
ہے نال اچھی طرح نہ کاٹنے کی وجہ سے ناف پک کر تشیع مطلق ہو جاتا ہے۔ اس دوران میں کسی امیکا
۳۰ اس کی بہت مدد دے۔ امراض طفلان میں مرض نال و تشیع مطلق ملا خفہ ہو۔

مٹہ گرم پانی میں نہلانے سے بچہ کو برا نکو نمونہ مرض ہو سکتا ہے۔ اسی لئے بچوں
کے علاج کے ماہر ڈاکٹر قیرد نال کاٹنے کے تین دن تک اربعہ پشت پر

ہی نہ رز نے سے یا مردہ کی طرح پڑا رہنے سے یا مثل مردہ کے مرجھا یا ہوا
بچہ اکا بیان ملاحظہ ہو۔

تیسرا درجہ :- جب تک پھول نہ گرجائے تب تک زچہ کی حالت سے
بری نہ سمجھنا چاہیے۔ طبعی ولادت میں پھول خود بخود آدھ گھنٹہ کے اندر
گرجاتا ہے۔ کھینچنے وغیرہ سے آنت آجانے کا اندیشہ ہے۔ پھول کا نہ گرجنا
ملاحظہ ہو۔ پھول گرنے کے بعد زچہ کے کپڑے اور بستر صاف کر کے اس کے
آلہ تناسل کے منہ میں پانچ انگل کپڑے کی کئی پرت کر کے ڈال دینا چاہیے۔
اور بیج بیج میں یہ کپڑا بدل دینا چاہیے۔

تین ہفتہ لمبا اور آدھ ہفتہ جوڑا کپڑا زچہ کے پیٹ پر مثل پٹی لے دس روز
تک پیٹ کر رکھنا چاہیے۔ لیکن ولادت کے بعد ہی اگر دو گھنٹہ تک دوا
ہاتھوں سے زچہ کا رحم پیڑ ویر سے دبا رکھا جائے تو پھر پیٹ باندھنے ذات
بیمار کی ضرورت نہیں پڑتی۔

ولادت کے تین گھنٹہ بعد تک زچہ کو چپ لٹا رکھنا چاہیے کپڑا اتارنا
اور پاخانہ پیشاب لیٹے لیٹے کرنا چاہیے۔ حرکت سے بہت زیادہ خون
نکل جانے کا ڈر ہے۔ تین گھنٹہ تک ایک طرح سے رہنے پر خود بخود منہ
آکر زچہ کو بہت آرام مل جاتا ہے۔ ولادت کے آٹھ دس گھنٹہ بعد زچہ کو اگر
کچھ آرام ہو تو بچہ کو دودھ پلانا چاہیے۔ دودھ کھینچنے سے اپستان میں جلدی
جلدی دودھ آتا ہے۔ اور رحم سکڑ کر خون کا اخراج بند ہو جاسکتا ہے۔
اگر ولادت کے بعد کوئی زیادہ غلطات نہ ظاہر ہوں تو آرنیکا ۴۳۔ ہر چار
گھنٹہ پر تین روز تک زچہ کو راستہ ہال کرنا چاہیے۔ آرنیکا کے استعمال سے زچہ
خانہ کا بخار وغیرہ پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔

بقیہ پشت کامنوں ملاحظہ ہو۔ گرم پانی کے عوض نیم گرم پانی زیتون کے روغن

(PURE OLIVE OR SWEET OIL) استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں

(VIDE FISHERS DISEASES OF CHILDREN. P. 34-35)

ولادت کے بعد زیادہ خون نکلنے پر ولادت کے بعد علامات ملاحظہ ہوں۔

زچہ خانہ میں زچہ کی خدمت

مندرجہ ذیل باتوں پر زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔

(۱) ایک ماہ (۴۰ سے کم ایک ہفتہ) زچہ کو زچہ خانہ میں رہنا ہے پہلے چار پانچ روز تک آرام سے لیٹی رہے۔ پاخانہ پیشاب کے لئے ابھی اٹھنے نہ دینا چاہیئے حرکت کرنے سے خون زیادہ نکل کر موت تک ہو سکتا ہے۔

(۲) زچہ کبھی بائیں اور کبھی دائیں جانب ہو سکتی ہے کیونکہ متواتر ایک کروٹ لیٹ رہنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ زچہ خانہ میں زچہ کے لئے دو بستر رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ بہت دیر تک ایک بستر پر سونے سے (خاص کر موسم گرما میں) بستر گرم ہو جاتا ہے (۳) اس بات کا انتظام رکھنا چاہیئے کہ زچہ اور بچہ کو ٹھنڈی ہوانہ لگنے پائے۔ روپڑ میں دروازے کھڑ کیاں کھول کر زچہ خانہ میں ہوا جانے کا کافی انتظام رکھنا چاہیئے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیئے۔ کہ ہوا کا جھونکا زچہ اور بچہ کو نہ لگنے پائے۔

(۴) صبح یا چار گھنٹے کے دواں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ اس لئے اس وقت زچہ خانہ میں آگ رکھنا چاہیئے۔ دوسرے وقت تقریباً آگ رکھنے سے بھی کام نکل سکتا ہے جس میں زچہ اور بچہ کو کوئی تکلیف نہ ہو زیادہ دھواں ہونے سے بچہ کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔

عمرہ صندل وغیرہ خوشبودار چیزیں آگ ڈال کر زچہ خانہ کو خوشبودار رکھنا چاہیئے۔ گرم زیادہ گرم ٹھنڈا زیادہ دھواں سے بھرا ہوا نہ ہونا چاہیئے چیمک، الفلوکیترا وغیرہ چھوٹ دار بیماریوں کے مریضوں کے پاس سے اگر کوئی شخص زچہ خانہ میں نہ جائے۔

(۵) اس بات پر خیال رکھنا چاہیئے کہ بچہ ناک سے سانس لے بچہ اکثر منہ کھول کر سوتا ہے اور منہ سے سانس لیتا ہے ایسی حالت میں منہ بند کر دینے سے یہ کام بغیر کسی کوشش کے ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس بات کا خیال رکھنے سے لڑکے کو ٹھنڈی زچہ خانہ گرمیوں میں رکھنا چاہیئے۔ اس

طریقہ سے اکثر قسم کے امراضی جراثیم ٹیچہ کے راستہ سے جسم کے اندر داخل
ہونے کا احتمال۔ بتا ہے (VIDE DR. MC-CANKEY)

(VIDE DR. MC-CANKEY'S LECTURES ON HOW AND
WHEN IS TUBERCULOSIS CONTRACTED)
اس لئے ہمیں
ہی سے اسکودک دینا ضروری ہے۔

کوئی کوئی معالج فرماتے ہیں کہ ٹیچہ سے سانس لینے سے کسی کسی بچہ کا منہ
ٹیچہ صاف ہو جاتا ہے۔ کان۔ یہ کم سنتا ہے۔ اور اس کا بولنا دشوار ہو جاتا ہے۔
اگر تالو کی وریڈوں کے بڑھنے سے بچہ اس طرح سانس لیتا ہو تو نشتر لگا کر
اسکودک دینا چاہیے۔ (۶) زچہ کے پیٹ سینکے اور کپڑا آگ میں سینک کر
فرج کی جڑ میں رکھنے اور بچہ کی ناف سینک دینے سے درد کم ہو جاتا ہے۔
کچھ لوگ اس وقت اس طرح سینکے کی مخالفت کرتے ہیں۔

(۶) جس زچہ خانہ میں آگ نہ رکھی جاسکے جو بچہ سینک دینے کو برداشت نہ کر
سکے یا گرم چیز نہ کھائے تو اس کے لئے اور اس کے بچہ کے لئے گرم کپڑا اور اوڑھنا
ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہت زیادہ کھانا پینا اور گھسی پلانا منع ہے۔

ولادت کے پہلے دو تین روز دودھ اور بارہا اس کے بعد دو روز سپرٹ
گھسی میں مل کر اور سانس میں سیاد مزاج کا سفوف اور بہت ہلکا ذرا سی گھسی
اور پانچویں روز دودھ اور چادر دینا ضروری ہے۔ ال یا کوئی بچی ہوئی چتر
یا ترکاری پہلے ہفتہ میں نہ دینا چاہیے۔

(۷) ولادت کے وقت سے کم سے کم نو ماہ تک ہر موعیت منع ہے۔ اس اُصول
پر خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان میں ملک کے زچہ اور بچہ کی تندرستی خراب ہو گئی
ہے اور شاید بچوں کو مرضی جگر اور بے وقت کی موت ہو رہی ہے۔

وقت ولادت کے ملاقات سے ولادت کے دو ماہ قبل انکیا اس
موسا۔ ۳۔ روزانہ دم مرتبہ اسپتال کراٹنے سے بغیر کسی تکلیف

سے جراثیمی امیگو ٹھما گرم کر کے بچہ کی ناف سینکے۔ ناف ہلکا ہو جاتی
ہے۔ سینکے کے وقت ناف پر زیادہ دباؤ نہ رکھنا۔ یہاں سے لگوانے کے۔

کے ولادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ خوف ہو کہ ولادت میں تکلیف ہوگی۔ تو اکیٹھ سال سے سو سال کے بجائے آرٹھ سال یا کیلک فلور ۶۶ سفوف دن میں دو مرتبہ روزانہ دو ماہ تک استعمال کرنا چاہیئے۔ اس کے علاوہ ولادت کے آخر کی مہینوں میں جن حاملہ عورتوں کو قبض کی وجہ سے تکلیف ہو کر رہتی ہے ان کیلئے کالین سو نیا استعمال کرنا چاہیئے۔ یہ نہایت مفید اور کارآمد ثابت ہوا ہے۔

اگر دروزہ شروع ہو کر پانچ چھ گھنٹہ کے اندر ہی بچہ پیدا ہو جائے تو کسی دوا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دیر ہونے پر علاج کرنا چاہیئے۔ مندرجہ ذیل ادویات سب علامات کے دینے سے تھوڑے وقت کے اندر بغیر کسی تکلیف کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔

رحم کا مشد سکرار ہونے کی وجہ سے پیدائش میں تکلیف ہونے پر جلس ۳۰۔ لے قاعدہ ہلکایا نیٹھا درد ہوئے پر پہلے پانی کی طرح اخراج ہونے کے بعد بھی اگر درد نہ بڑھے اور متلی ہو تو پلسا ٹیلا ۳۰۔ علامات مندرجہ بالا کے بعد ران میں اینٹھن ہو (خامک) عورت کو جب کے تین چار اولاد ہو چکی ہو تو) سیکیل ۳۰۔ درد سر، تپ بینی، آنکھیں، اور چہرہ سرخ، بہت زیادہ بھیجی بکنا، جھکنا، ہاتھ پر ٹپکنا۔ کے علامات میں ہیلا ڈونا ۳۰۔ بہت زیادہ درد رہنے پر کمیوٹا ۶۔ کافیاد ۶۔ جلسیم ۶۔ بہت زیادہ درد زہ کے بعد یکا یک درد

لے ہوسکلٹ اسپتال کے معلم اور فرانس کے علم دایئر می کے ماہر ڈاکٹر فرینک جیٹانا اگدرو فارم سے بنی طاقت کی ایک دوا۔ رنی خوراک ایک ایک قطرہ کے حساب سے استعمال کر اگر بغیر تکلیف کے ولادت کر رہے ہیں۔ ایسی حالت سے ولادت کے وقت زچہ کو کسی قسم کا تکلیف درد نہیں ہوتا۔ اور زچہ اور بچہ کے عصب اور دوران خون کے آلات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کا بیان ہے کہ عورتوں حاملہ عورتوں کو اس دوا کے کھلانے کے بعد ہوش و حواس میں بات کرتے کرتے بغیر تکلیف ہی ولادت ہوئی ہے۔

ولادت کے وقت یا اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

بند ہو کر آنکھیں اور منہ سرخ ہو جائے۔ سانس زور زور سے چلنے لگے۔
گھٹا گھٹا اسٹ ہو بے ہوشی ہو تو اوپیم ۳۰۰۶۔ بہت تشیخ کی وجہ سے حاملہ
پریشان ہو کر چیخ کر مرنے لگے۔ ہالہ سیاس ۶۔ اور ولادت کے وقت رحم
کامنڈ پھیلا رہنے پر بہت گرم کیلڈ ٹیونا کے کوسن (کیلڈ ٹیونا)۔ دودھ رام اور گرم
پانی ڈیڑھ پاؤں میں نئے اس بیج کو بخور کر رحم کے باہر لگانا چاہیے۔

ولادت کے بعد بھی اگر یہ ترکیب کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔
اگر یہ خیال ہو کہ جنین کا سر پہلے نہ نکلے گا تو پلسا پلسا۔ رحم کا منہ سخت
رہنے پر اور نہ پھیلنے پر سیلا ڈونا، ۳۰۔ بہت زیادہ تکلیف دہ درد ہے اس میں اگر
آرنیکا ۳۰۔ بہت تکلیف دہ درد ہے۔ ہمیشہ نہ کرنے کی وجہ سے مرنے پر اور
اور ہر قسم کے درد کے ساتھ ناف کے چاروں طرف گرنے کا ایسا تیز درد ہونے
پڑا اور اس درد کے رحم تک پھیل جانے پر آپیکاک ۳۰ دینا چاہیے۔

ولادت کے وقت یا بعد بہوشی اور اس کے ساتھ ہی نکل جیسے بہت سی طرح
کھنڈا اور نبض ساتھ ہونے پر کیف ۵۔

پھول نہ گھرنا۔ بچہ پیدا ہونے کے تھوڑے ہی دیر بعد رحم سے پھول باہر
نکل پڑتا ہے۔ لیکن ولادت کے بعد اگر ایک گھنٹہ کے اندر پھول باہر نہ نکل پڑے۔
تو پلسا پلسا ۳۰۔ سیکیل ۳۰۔ ہر چند منت پر دینا چاہیے۔ دوا دینے کے بعد اگر
آدھ گھنٹہ میں کوئی فائدہ نہ ہو تو ایک ہاتھ سے تم کو دبا کر دوسرے ہاتھ سے
پھول آہستہ آہستہ کھینچ دینا چاہیے۔ زور سے کھینچنے سے پھول ٹوٹ کر
کچھ حصہ اندر رہ جاسکتا ہے۔ اس سے خون اتنا نکلتا ہے کہ زچہ کی جان چائیکا خوف ہے۔
(۱۳) ولادت کے بعد سر کے علاوہ

پھول گر جانے کے بعد اگرچہ کوئی علامت (فساد) نہیں رہتی تو بھی زچہ کو
آرنیکا ۳۰ روز اند چار مرتبہ تین روز تک کھانا چاہیے۔ آرنیکا کھانے سے
زچہ خانہ کی سخت بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔

ولادت کے بعد جو علامات نمودار ہوتے ہیں ان کا بیان حسب ذیل ہے۔
دہانہ فوج و مقعد کا پتہ مل جاتا ہے۔ زبان فرج ولادت کے بعد کھ

نہ کچھ پھٹ جائے یا کرتا ہے۔ ولادت کے وقت اگر زچہ کے مقصد کی حفاظت نہ کی گئی تو وہ بھی پھٹ جاتی ہے۔ کیسلنڈیولا ۱۰۔ دس قطرے ایک چھٹانک پانی میں ملا کر اس میں کپڑا بھگو کر کئی ہفتے تک پر لگانے سے جلد آرام ہو جاتا ہے۔ ولادت کے بعد کا درد :- پھول گرجانے کے بعد رحم سکڑنے کے وقت کئی مرتبہ درد اٹھتا ہے اسکو ولادت کے بعد کا درد کہتے ہیں۔ ولادت کے بعد رحم میں خون و غیرہ جو کچھ جمع رہتا ہے۔ اس درد کی وجہ سے وہ باہر نکل آتا ہے اگر ۴۸ گھنٹہ کے اندر یہ درد بند نہ ہو جائے تو آر نکا ۳۰-۴۰ دینا چاہیئے۔ جن عورتوں کا مزاج تیز ہو ان کو کمیولا ۶- دینا چاہیئے۔ آر نیکا سے اگر آرام نہ ہو تو جلیس ۳۰- یا کافیا ۶- یا سیکیل ۳۰- دینا چاہیئے۔ بیج بیج میں پلسا ٹیلا ۳۰ یا نکس دامیکا ۶- یا کیوپرم ۳۰- کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

(LOCHIA)

نفاس

پھول گرنے کے بعد بیس روز تک رحم سے محوطہ استقوڑا خون نکلا کرتا ہے۔ شروع میں دو روز جو خون نکلا کرتا ہے وہ گہرا سرخ بعد کو زردی مائل اور آخر میں پانی کی طرح یا پتلے مواد کی طرح نکلتا ہے۔ اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اگر خود بخود اس طرح بند ہو تا رہے تو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن حسب ذیل علامات میں دوا دینا چاہیئے۔ اخراج بہت عرصہ تک جاری رہی تو سیکیل ۳۰ بہت دنوں تک گہرا سرخ رنگ کا خون نکلتا رہے تو سبائٹا ۳۰- یا ایک بند ہو جائے تو ایکونائٹ ۳۰- بدبو ہو تو کریازوٹ ۳۰- کاربوونج ۶- استعمال کرنا چاہیئے۔ اور کیسلنڈیولا ۱۰- بیس گنے پانی میں ملا کر روزانہ تین مرتبہ فزج کوڈھو ڈالنا چاہیئے۔

(HAEMORRHAGE) اخراج خون

ولادت کے بعد زیادہ خون نکلنے پر زچہ کی زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیئے کہ ولادت کے وقت خون کم نکلے۔ اگر بہت زیادہ خون یا بالکل سرخ خون چشمہ کی طرح نکلتا رہے تو مندرجہ ذیل طریقوں سے اس کو بند کر دینا چاہیئے۔

زچہ کو لٹا کر اس کا سر نیچے اور دونوں ران اور پر کی طرف اٹھانا چاہیے۔
 اس کے بعد اسی وقت اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رحم اس طرح مٹھی میں پکڑ
 لینا چاہیے کہ یہ سکڑ سکے اور گرم پانی (۱۲-۱۳ ڈگری) اس کے آدے تناسل میں ڈالنا
 چاہیے۔ اگر ہو سکے تو برف کے ٹکڑے زچہ کے پیٹ پر، اور فرج میں رکھنا
 اور اس کو چوسنے دینا چاہیے۔ برف میں خون بند کرنے کی طاقت ہے
 اخراج کی وجہ سے بالکل کاہل ہو جانے پر چاہنا ۶۔

اخراج خون کے وقت سبائنا ۳x- یا سہمی میلس ۳x- اور اخراج کی
 وجہ سے سر میں درد رہنے پر فریم ۶- دینا چاہیے۔

ولادت کے پہلے یا بعد میں بے ہوشی

ولادت کے وقت یا بعد ولادت کوئی کوئی زچہ بے ہوش ہو کر اپنی
 زندگی کھو بیٹھتی ہے۔ اس لئے بڑی ہوشیاری سے علاج کرنا چاہیے۔
 اگر بے ہوشی کے ساتھ کل جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ جائے تو روہی کیمفر
 ۱۰۔ ذرا حرکت کرنے پر یا بے ہوش ہو جانے پر یا بے ہوشی کے ساتھ سر میں
 ٹھنڈا پسینہ نکلنے پر درارٹیم الب ۶- اخراج خون کی وجہ سے غشی میں جاتا
 ۶- یا کاربووج ۳۰۔ اگر بار بار بے ہوش ہو جائے یا بے ہوشی زیادہ دیر
 تک رہے تو سٹرا مونیم ۳x

چوٹ کی وجہ سے بے ہوشی میں آرٹیکا ۳x ۳- خوف کی وجہ سے بے ہوشی
 ہو تو ایکونائٹ ۳x یا کافیا ۶- فائدہ کرتا ہے۔ اگر دو انگلیں کی طاقت نہ ہو
 تو منتخب دوا سونگھنا چاہیے۔ شروع میں گرم دودھ، باری دغیرہ ہلکی چیزیں
 دیں۔ اس کے بعد مقوی غذا دینا چاہیے۔

تشنج - اینڈٹھن

(CONVULSIONS)

ولادت کے پہلے یا بعد دیا ولادت کے وقت تمام جسم میں تشنج ہونا بہت
 خراب ہے۔ زیادہ فکر۔ قوت بینائی کا کم ہو جانا۔ منہ سے بات نہ نکلنا۔
 ہاتھ پیروں میں اکڑنا، گہری نیند وغیرہ علامات تشنج کے علامات سابقہ میں

اس کے بعد آنکھوں کی پتلی گھومنے لگتی ہے۔ منہ کبھی اس کندھے اور کبھی اس کندھے کی طرف رہتا ہے۔ زبان باہر نکل آتی ہے کزاز کی طرح کل بسم تشیخ ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر تشیخ ہو کر زچہ بہوش ہو جاتی ہے۔ اس طرح بار بار تشیخ اور بے ہوشی ہونے سے موت تک ہو جاتی ہے۔

جگر کے اوپری حصہ میں چھوٹی شکل میں بیتھار اخراج خون یا دماغ میں کمی خون

(ANEMIA) یا پیشاب میں آب زلال (ALBUMEN)

جڑ ہونے کی وجہ سے شاید ایسا تشیخ ہوتا ہے۔

ہمیشہ سر بخاری اور غصہ کا ہلنا۔ پیشاب کی مقدار کی کمی! جسم میں کچھ درد۔ پیر اور منہ میں آماس! یا آنکھوں کے آگے اندھیرا وغیرہ علامات بند نمودار ہونے پر اسی وقت حاملہ کو لٹا دینا چاہیے اور سخت اور نمکین غذا بند کر کے دودھ پانی اور پھلوں کا رس پلانا چاہیے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل ہو یہو پتھک دواؤں سے انتخاب کر کے دوا دینا چاہیے۔

تشیخ ہونے کے پہلے کی علامات میں ہایوسیماس ۳x تشیخ کے وقت ہیلادونابا۔ یا ہائیڈروسیانک الیڈ ۳۔ تشیخ بند ہونے کے بعد (خاص کر دماغ میں کسی قسم کی خرابی رہنے پر) اوپیم ۳۰۔ دینا چاہیے کسی زچہ کو تشیخ ہونے کے پہلے بخار کے ساتھ تیز سیاس ہو تو ایکو نائٹ ۳x دینا چاہیے۔ اگر ولادت کے پہلے یا بعد تشیخ کے ساتھ لیبر اور ٹھنڈا پسینہ نبض پر دور سریع اور ہڈیاں وغیرہ علامات ہوں تو وراٹرم وراٹریڈ ۳x دینا چاہیے۔ (زچہ خانہ کے بخار کی دوائیں ملاحظہ ہوں۔)

پسینہ بند

ولادت کے بعد پسینہ بند ہو تو ڈلکمار ۶-۶- کیوٹلا ۶- دینا چاہیے۔

مستی

ولادت کے بعد بہت کمزور اور مست ہو جانے پر چائنا ۶- یا فاسفورک ایسڈ ۶- دینا چاہیے۔

نمید نہ آنا

کوئی خاص بیماری نہیں ہے۔ لیکن ولادت کے بعد اگر رات میں

نہندہ آئے تو کافی ۶۔ دینا چاہئے

پیشاب بند

ولادت کے بعد اگرچہ گھنٹہ تک پیشاب بند نہیں ہوتا۔ اگر بارہ گھنٹہ تک پیشاب نہ ہو تو ایکونائٹ ۳۰ x ہر پندرہ منٹ پر دینا چاہئے۔ اگر چار خوراک ایکونائٹ کھلانے پر بھی پیشاب نہ ہو تو بیلادونا ۶۔ ہر آدھے گھنٹہ پر دینا چاہئے۔ تین خوراک بیلادونا دینے پر بھی اگر پیشاب نہ ہو تو اکیوازیٹم ۱ x دینا چاہئے۔

قبض

ولادت کے بعد رحم وغیرہ آلات کو آرام لینے کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی سے تین چار روز زچہ کو پاخانہ نہیں ہوتا۔ اس حالت میں دوا کھلانے سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن پانچ چھ روز تک پاخانہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر پیٹ میں درد ہو تو کالٹن سونیٹام ۱ x یا ورائٹم الیم ۶۔ دینا چاہئے۔

اسہال

ولادت کے بعد اسہال ہونے پر ہائوسیا مس یا پلساٹیل ۶۔ دینا چاہئے۔

بواسیر

ولادت کے بعد زچہ کو کبھی کبھی بواسیر ہو جایا کرتی ہے۔ پلساٹیل ۶۔ دینا چاہئے۔ اور ہیملیس ۵ بیس گنے پانی کے ساتھ ملا کر لوشن کا استعمال بیرونی کمرنا چاہئے۔

پیرسوت کا بخار۔ زچہ خانہ کا بخار۔ سورا کا بخار۔ عفونت (نفاسی)

(PUERPERAL FEVER)

زچہ خانہ کا بخار یا پیرسوت کا بخار بھی امراض خون کے دائرہ میں ہے۔ لیکن عورتوں کی بیماری ہونے کی وجہ سے اس کا بیان اسی جگہ کیا جاتا ہے۔ پیرسوت کا بخار نہایت خراب اور خوفناک بیماری ہے۔ اس مرض کے پیرا ہونے کے اسباب ایک قسم کے جراثیم یا زہریں ہیں۔ جنہ کے بعد مختلف اسباب سے رجم کا ٹوکف ہو جانا۔ جنہ کے بعد پھیول (مشیمہ) کا کچھ حصہ رجم میں جانا اور اس کا مٹنا اس بیماری کے اسباب سابقہ میں پیدائش کے تین چار روز بعد ہی پیرسوت

کا بخار ہو تا ہے۔ شروع میں بخار ہوا کہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت جارا گرمی؛ یا لوزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ درد سرا حرکت؛ نبض تیز؛ پیٹ میں درد؛ حرارت جسم؛ ڈگری تک ہوتی ہے۔ لیک ایک ولادت کے بعد کا اخراج؛ پسینہ اور اکثر پستان سے دودھ نکلا بند ہو جاتا ہے۔ اور سات آٹھ دنوں میں موت ہو جاتی ہے۔ رم سے مواد کی طرح بد بودار اخراج نکلا۔ بہت ہی بد علامت ہے۔ یہ بیماری کبھی پیرانی شکل میں نہیں بدلتی۔ امراض حزن پر موت ملاحظہ ہونا اس میں مندرجہ ذیل ادویات مفید و کارآمد ہیں۔

ایکونامٹ ۳۰-X۔ مرض کے شروع حالت میں (جب بہت بخار ہو) سردی، لوزہ؛ نبض سریع اور سخت؛ جسم خشک؛ نفخ شکم اور درد تیز؛ پیاس اور رم میں درد ہو؛ ڈاکٹر لٹلمن نے اس حالت میں ورائٹرم ورائٹل استعمال کرا کر اکثر لوگوں کی جان بچانی ہے ورائٹرم ورائٹل:- بہت لوزہ، کھینچاؤ۔ یا تشنج کی وجہ سے مرلیفہ کی جان جانے کے اندیشہ میں یہ دوا چار یا پنج منٹ کے وقفہ سے دینا چاہئے (جب تک لوزہ یا تشنج کم نہ ہو جائے) اس کے بعد یعنی جب لوزہ اور تشنج کم ہو جائے۔ تب چند گراہ بیٹیں۔ بائیس منٹ کے وقفہ سے یہ دوا دینی چاہئے۔

بیسلا ڈونا:- پیٹ میں سخت درد، بے چینی۔ پستان میں دودھ کی کمی۔ سر میں تپکن کی طرح درد۔ آنکھیں اور چہرہ سرخ؛ تنکس و امیکا:- ۳۰۔ رم زیادہ موقوف ہونے پر؛ کالوسنتھ ۶:- پیٹ میں زیادہ نفخ ہونے پر؛ کالی سائے لٹس:- ۲۰۔ یا ایک چلکن کی طرح درد ہونے پر مرلیفہ روتے روتے بے چین ہو جائے۔ کچھلی رات میں مرض کی ترقی۔

مرکیور لیس کار ۶:- پیٹ میں کترنے کی طرح درد۔ اسی وجہ سے مرلیفہ پیٹ پر ہاتھ نہ رکھنے دے؛ تیز پیاس؛ خون یا آلون ملا دست۔

ٹیکس ۶:- پیٹ میں درد (غیر کے بعد درد کا ٹرھٹا)

رٹاکس ۶:- رم میں سوزش (قحط کر زہرین حصہ میں پٹیاب کر نیوالا درد) بد بودار اخراج کا زیادہ عرصہ تک رہنا اور سرسامی بخار کی علامت میں

کیل فاس ۳۳x - سفوف۔ اس مرض کی بہت اچھی دوا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر مینڈس نے اس دوا کو استعمال کر کے ایک مریضہ کی جان بچائی ہے۔
پائروجن ۶-۲۰۰۔ مواد ہونے کی وجہ سے خون خراب

(PYAEMIC CONDITIONS) ہونے پر بخار زور سے آکر اگر قوت حیات جلد جلد گھٹ رہی ہو تو آرسنک ۳۰ - (لیکس ۶ - یا بالو سیامیس ۶ - کے ساتھ کچھ لوگ یکے بعد دیگرے دینے کی صلاح دیتے ہیں)۔

دوسری دوائیں :- برالیوٹیا ۶ - پلساٹیل - ہیمی میکس ۱ - چائٹ ۶ - اے پس ۶ - بیٹ کا درد تیز ہونے پر خوب گرم فلائین لپیٹا رہنا چاہئے۔
پرسوت کے بخار کے ساتھ ورم باریٹون ہونے میں بیٹا ۵ - یا یو سیامس ۳۳x - کیوٹا ۱۶ اور ادویات، یا ریلٹون، استعمال کرنا چاہئے۔

علاج معاون :- گندے کپڑے وغیرہ بھینک دینا چاہئے۔ خوب گرم فلائین بیٹ پر رکھنے سے بیٹ کا درد اچھا ہو جاتا ہے۔ دارچینی کا جوتہ زندہ گرم پانی میں ملا کر گرم ہی گرم مریضہ کے جسم پر چھڑکنا چاہئے۔ اس سے وہ ہوش میں آجائے گی (تشخیص کا بیان ملاحظہ ہو)

مرزمن مرض پرسوت

کسی ایک بہت مشہور علاج کی کتاب میں طبکار کو بتایا گیا ہے کہ "پرسوت کا بخار" اور "مرزمن" مرض پرسوت" ایک ہی مرض کی دو شکلیں ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ بات نہیں ہے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بیماریاں ہیں۔

پرسوت کا بخار چھوٹ کا مرض ہے۔ (ایک قسم کا جرم یا زہر) فون میں داخل ہو کر یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ لیکن "مرزمن مرض پرسوت" چھوٹے سے نہیں پھیلتا۔ یا کسی قسم کا خراب زہر (یا جرم) اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ پرسوتی بخار کی مرزمن حالت نہیں ہے۔ بچہ جننے کے بعد اگر زچہ کی اچھی طرح خبر گیری نہیں ہوتی تو تندرستی بگڑ کر جسم سے خون آہستہ آہستہ زائل ہو جاتا ہے۔ اور بخار کہتے، اسہال، استفار وغیرہ علامات پیدا ہو جاتے

ہیں۔ اسی کو پرسوت کی بیماری یا مزمن، مرض پرسوت کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک بڑھتی ہوئی تیز کمپی فون، کی بیماری ہے۔

علاج :- اس سخت بیماری میں نیٹرم میور - آر سے نکم الیم - ۳ - جانتا ۶ - فرم ٹیالیم ۳ - ایلومینا ۶ - سیپیا ۳ - گریفائٹس ۳ - پلسٹیل ۳ - ٹکس و امیکا ۳ - دینا چاہئے۔ لیکن کلگریا فاس ۳ - اور فرم آر ۳ - اس بیماری کی بہترین دوائیں ہیں۔
مانگر محمد علی کاشور بہ پڑانا خوب فائدہ کرتا ہے۔ اس کتاب میں بڑھتی ہوئی تیز کمپی فون، کی بیماری کا علاج دیکھنا چاہئے۔

پرسوتی جنون - زچہ کی دیوانگی

PUERPERAL INSANITY

وضع حمل کے بعد یا پہلے زوال طاقت وغیرہ کے اسباب سے کسی عورت کو جنون ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دو قسم کا ہو جاتا ہے۔ (۱) وحشت (MANIA) اور (۲) مالنچولیا (MELANCHOLIA)

(۱) مرض جنون میں عقل میں فتنور، بیکار بکنا۔ اپنے آدمیوں کو مارنے کاٹنے۔ دوڑنے وغیرہ جنون کے مخصوص علامات ہیں۔ عموماً پاگل پن۔ یا ہنسنے کھیلنے کے علامات میں ہالید سیاس ۳ - سخت پاگل پن (جیسے تیز ہڈیاں، غصہ۔ کاٹنے دوڑنا۔ تنہا یا خاموش رہنے کی خواہش نہ ہونا، بے شرمی وغیرہ علامات میں) اسٹرامونیم ۳ - ہڈیاں۔ اعلیٰ خیالات کے (گزیادہ تاول کا ٹھیک حکم ہے) یا تنہا اور اندھیرے میں رہنے کی خواہش۔ یا ٹھہر ٹھہر کر مریضہ کی جسمانی، دماغی فعل کا جمود (CATAPLEPSY) کی علامت میں کنالس انڈیکا، دینا چاہئے۔ یہ نہایت مفید و کار ثابث ہوا ہے۔

(۲) مرض مالنچولیا ہمیشہ بڑھا ہوا۔ یا حاققت کا طریقہ۔ دل میں خلا معلوم کرتا۔ یا خود کشی کی خواہش وغیرہ مرض مالنچولیا کے مخصوص علامت ہیں۔ سمی فیوگا ۳ - اس کی عمدہ دوا ہے۔ اگر خود کشی کی خواہش زیادہ ہوتی ہو تو آرم مٹ ۶ - دینا چاہئے۔ پلاٹینا ۶ - فلیس ۶ - یا الگنس کیٹس ۳ -

کی بھی گاہے۔ ہے ضرورت پڑ سکتی ہے، مرض مایخولیا، ملاحظہ ہو۔
ایسا بندہ بسٹ رکھنا چاہئے کہ مایخولیا والی عورتوں کے دل پر کسی
طرح تحریک نہ ہو۔ نے پائے۔ دودھ وغیرہ ہلکی لیکن مقوی غذا دینی چاہئے۔

زچہ کے پیروں کا سفید آماس

(PHLEGMASIA ALABA DOLENS)

وضع حمل کے بعد کسی کسی عورت کا پیر پھول جاتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے
پڑو سے پیر تک درد، بخار، نفاسی (Lochia) اور پستان
کا دودھ کم ہو جاتا۔ اس تکلیف دہ بیماری کے خاص علامات ہیں۔
پیس ۶۔ یا ہی ملیس ۳۔ اس کی بہترین دوائیں ہیں۔ اے پس
۶۔ یا رٹاکس ۶ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
روٹی سے پیر باندھنا اور ہلکی لیکن مقوی غذا دینی چاہئے۔

ولادت کے وقت بار بار آلات کے استعمال کا نتیجہ

(REPEATED ARTIFICIAL DELIVERY)

مین کے نکلنے کا راستہ، اگر جنین کے راستہ سے چھوٹا ہو تو نشتر کی مدد
سے بار بار وضع حمل کرانا پڑتا ہے۔ لیکن اس سے زچہ کا جسم خراب ہو
جاتا ہے۔ اس حالت میں فرم فاس ۲۰۰۔ کیلی فاس ۲۰۰۔ اور انیشیا فاس
۲۰۰۔ بیج بیج میں لیکن بہت دلوں تک کھلانے سے مریضہ کی صحت خراب
ہونے سے پیدا ہونی تکلیف دہ ہو جاتی ہے اور مریضہ رفتہ رفتہ بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔
اگر وہ دوبارہ حاملہ ہو تو وضع حمل کے تین چار ماہ پہلے سے اس کو کلیریا
فلورٹیا ۱۲۔ سفوف ۱ اور کلیریا فاس ۶۔ بیج بیج میں کھلانا چاہئے۔ اس
سے بغیر جبر بچاؤ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔

(PELVIC CELLULITIS) ورم جوالی رحم

نشتر لگوانے یا جھوٹ وغیرہ لگ جانے سے یہ ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

پیر میں درد بخار، یا آلہ تناسل کا ورم، اس مرض کے مخصوص علامات ہیں۔
 اے پس ۳۰۔ اور رسٹاکس ۶۔ اس مرض کی دوا میں ہیں۔
 بخار تیز رہنے پر وراثم ورائیڈ XI۔ دینا چاہئے۔

(PELVIC ABSCESS)

پیر و کا کھوڑا

اگر ورم حوالہ رحم، مندرجہ بالا ادویات سے اچھا نہ ہو اور رفتہ رفتہ
 کھوڑا ہو جائے (یعنی مواد پیدا ہونے لگے، تو پکانے کے لئے ہیر سلف
 XI ۳۰ X سفوف دینا چاہئے۔ اور مواد نکلنے رہنے پر سٹاک ۶۔ یا ۳۰۔ دینا چاہئے۔

پیٹ لٹک پڑتا

وضع حمل کے بعد کسی کسی کا پیٹ نیچے کی طرف لٹک پڑتا ہے۔ یہ
 دیکھنے میں بڑا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقت میں کوئی بیماری نہیں ہے۔
 کلکیر یا ۳۰ یا سٹاک ۳۰، ہر ماہ میں ایک مرتبہ دینا چاہئے۔

سر کے بال گر جانا

وضع حمل کے بعد کمزوری وغیرہ کے اسباب سے کسی کسی عورت
 کے بال گر جاتے ہیں۔ فاسفورک الیڈ ۶۔ چائنا ۶۔ یا آرسنک ۶۔
 اس کی دوا میں ہیں۔ باب امراض طفلان، میں بال گرنا ملاحظہ ہو۔

مرض پستان۔ پستان کے دودھ کی بیماری

ولادت کے بعد امراض پستان کا مقصد ملاحظہ ہو،

وضع حمل کے بعد پستان کی بیماری

(DISEASES OF THE BREAST FOLLOWING DELIVERY)

پستان کے متعلق زچہ کو مندرجہ ذیل باتیں یاد رکھنی چاہئے۔
 (۱) تین چار ماہ کا عمل ہوتے ہی پستان بڑھنے لگتے ہیں۔ اسی وقت

سے بھسنی کی طرف خیال رکھنا چاہئے۔ آج کل کی تہذیب قائم رکھنے کے لئے کپڑا ایسا کس کر نہ پہننا چاہئے کہ جس سے پستان کی بھسنی پر دباؤ پڑے۔ اور اس کے بڑھنے میں روکاؤٹ پیدا ہو جائے۔

۲، شروع میں کہا جا چکا ہے کہ ولادت کے آٹھ دس گھنٹہ بعد بچہ کو دودھ پلانا چاہئے۔ اس سے بچہ کو آسانی سے پاخانہ ہوتا ہے اور زچہ کو دودھ کا بخار وغیرہ نہیں ہوتا۔

۳، ہر مرتبہ بچہ کو دودھ پلانے کے پہلے تھوڑا دودھ پھوڑ ڈالنا چاہئے۔ اس کے بعد پستان کی بھسنی بچہ کے منہ میں دینا چاہئے۔

۴، زچہ کی خراب غذا کی وجہ سے پستان کا دودھ خراب ہو جاسکتا ہے۔ اس دودھ کو پینے سے بیٹ اینٹھتا ہے۔ اور امراض بد بھسنی وغیرہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اس لئے گھانے پینے کے متعلق زچہ کو خوب ہوشیار رہنا چاہئے۔

۵، بھسنی میں زخم ہو یا ماں کے بیٹ میں بیماری ہو یا بخار وغیرہ ہو تو بچہ کو دودھ نہ پلانا چاہئے۔

۶، سخت سخت گھسنے کے بعد یا غصہ وغیرہ دماغی تحریک کے وقت یا جماعت کے بعد ہی پستان کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بچہ کو دودھ پلانے سے اسی وقت بچہ کو کوئی سخت بیماری (یہاں تک کہ موت) بھی ہو سکتی ہے۔

دودھ کا بخار (MILK FEVER)

وضع حمل کے بعد دودھ پیدا ہو جانے کی وجہ سے کسی کسی زچہ کے پستان میں کانٹا جھیننے کی طرح درد ہوتا ہے اور ایک دو دنوں میں ہی پستان کا دودھ جم کر بخار آ جاتا ہے۔ اسی کو دودھ کا بخار کہتے ہیں۔ اس میں کوئی دوا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صرف بخار کی موجودگی میں بچہ کو دودھ نہ پلانا چاہئے۔ اور پستان کو سردی سے بچانا چاہئے۔

لیکن یہ دودھ کا بخار اگر مہر ہو اور پینسل گھنٹہ سے زیادہ رہے تو ایکواٹ ۳۰-۳۵ دینا چاہئے۔ اور بخار چھوٹنے پر بھی اگر پستان ملائم نہ ہو جائے

تو (پستان سخت رہنے تک) برائیو نیا ۶۔ دینا چاہئے۔

ورم پستان (MASTITIS)

وضع حمل کے بعد (کسی وقت) ورم پستان اور اس کے ساتھ بخار ہو سکتا ہے۔ اُس وقت زچہ کے گل پستان، یا صرف بھٹنی میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ گل پستان سرخ ہو کر اس میں جلن ہو تو برائیو نیا ۳۔ کسی کسی کی رائے ہے کہ بیماری کی شروع حالت میں ہلا ڈوتا۔ اور برائیو نیا باری باری سے دینا چاہئے۔ اس سے درد جلد جلد گھٹ سکتا ہے۔ بڑھ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تیز بخار رہنے پر ایکونائٹ اور برائیو نیا (کچے بعد دیگرے) دینے کی صلاح دیتے ہیں۔ جلد نہ گھٹ کر اگر پستان ورم کرتا جائے یا مواد بڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ٹریکیورس سول ۶۔ مواد بڑ جانے پر سپرسلفس ۳۰ x ۳۔ بھوڑا جلد آرام کرنے کے لئے فاسفورس ۶۔ پستان خوب سخت ہو تو فاموٹو ۳۰ x ۳۔ کا استعمال اور فاموٹو ۵۔ میں قطرے آدھا آؤنس گرم پانی میں ملا کر پستان کے اوپر پٹی باندھنی چاہئے۔

پستان سخت ہوتا ملاحظہ ہو۔

(SORE NIPPLES)

بھٹنی میں زخم

پستان کی بھٹنی میں زخم ہونے سے زچہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کیلنڈریولا ۵۔ ۶۔ قطرے سے ایک ٹیبلٹ پانی میں ملا کر دھو ڈالنا اور پپی باندھنی چاہئے۔ اگر بھٹنی میں چھوٹی چھوٹی پھنیاں ہو کر ان سے پانی نکلتا ہو تو ٹریکٹس ۶۔ دینا چاہئے۔

پستان میں درد (PAIN FULL NIPPLES)

جس وقت بچہ دودھ پئے۔ اگر اسی طرح پستان میں درد ہو تو فلانڈریم ۳۰ x ۳۔ استعمال کرنا چاہئے۔ کبھی کبھی بھٹنی سے کدھرے تک قوی سوزی دردی کی طرح درد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت پر کروٹن ٹیکم ۳۔ دینا چاہئے۔ پستان خالی معلوم ہونے پر اور بچہ کے دودھ پینے کے وقت بہت تکلیف ہونے پر، بورکیس ۶۔ ۳۔ دینا چاہئے۔

دودھ پلانے وقت کستی۔ دودھ پلانے کے بعد اگر زچہ کو کمزوری معلوم ہو تو چائنا ۶۔ الیڈ فاس ۳۔ دینا چاہئے۔

پستان میں زیادہ دودھ ہونا۔ پستان میں دودھ اکیبارگی بڑھ جائے تو کم کرنے کے لئے نیٹرم سلف ۱۲ x سفوف یا پلس ۳ دینا چاہئے۔ مسور کی دال میں کم پستان پر لگانے سے دودھ خوب خشک ہو جاتا ہے۔

پستان میں دودھ نہ ہونا یا کم ہونا۔ وضع حمل کے قبل گھسنے کے اندر دودھ نہ ہونے پر اگنس کلیٹس ۴ x دینا چاہئے۔ یکایک دودھ گھٹ جانے پر یا بند ہو جانے پر ایسٹرو ۳۔ دینا چاہئے۔ کلمی ساگ کھانے سے اور سبزٹا کے پتے پانی میں جوش دے کر اس سے پستان دھو ڈالنے سے دودھ خوب بڑھتا ہے۔

دماغی تحریک کا وجہ سے کبھی کبھی دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ غصہ کی وجہ سے یکایک دودھ خشک ہو جانے پر کیوٹا ۶۔ ڈر جانے پر کیوٹا ۳۔ حسد کی وجہ سے ہائیو میا مس ۳۔ اور رنج کی وجہ سے کم ہو جانے پر اگنیشیا ۶۔ دینا چاہئے۔

پستان سے خود بخود دودھ نکلنا۔ بوریس ۳۔ سفوف ۶۔ کیلک کارب ۶۔ چائنا ۶۔ روزانہ تین چار مرتبہ ٹھنڈے پانی سے پستان دھو ڈالنا چاہئے۔

پستان کی سختی۔ کبھی کبھی دودھ کم کر پستان سخت ہو جاتے ہیں اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کا بہترین دوا ہے۔ ورم پستان کا بیان ملاحظہ ہو۔

پستان میں پھوڑا ہونے کو ہو۔ یعنی پستان سخت ہوں اور درد کرتے ہوں۔ برا یونیا ۳۔ ہر گھنٹہ پر استعمال کرنا چاہئے۔ اس سے اکثر پھوڑا بیٹھ جاتا ہے۔

اگر پھٹیل گھنٹہ میں کچھ فائدہ نہ ہو تو ٹائموٹک ۳ x ہر تین گھنٹہ پر استعمال کرنا چاہئے اور فائٹو ۶۔ دیا بن قطرے ۳ آؤنس خوب گرم پانی

میں ملا کر، پستان کے اوپر بیج بیج میں جھڑک دینا چاہئے۔ چوٹھ کی جلی مٹی کا لپی پستان پر خوب فائدہ کرتا ہے۔ فائٹو ۶۔ فائدہ نہ ہو (یعنی مواد پیدا ہو جانے پر) پر سلف ۶۔ ۳ استعمال

کرتا اور السی کی گرم میٹس لگانا چاہئے۔

ناسور ہونے پر سلف ۶۔ ۳۔ استعمال کرنا چاہئے۔

چوتھا باب

امراض طفلان

تنھے بچے کی پرورش :- پیدائش کے وقت سے دانت نکلنے کے وقت تک بچہ کو، نھانچہ، کہتے ہیں۔ بچہ کی نال کاٹنے اور نہلانے کے کچھ دیر بعد ہی بچہ کو کھوڑا گرم دودھ (برابر حصہ پانی کے ساتھ کچھ گرم کر کے) پلا دینا چاہئے۔ اس کے بعد بچہ کو پانچھانہ پیشاب ہو جائے۔ بچہ کے بعد اور زخم کے ہوشیار ہونے پر بچہ کو اس کی ماں کا دودھ پلاتا چاہئے۔ اگر بارہ گھنٹہ کے اندر بچہ کو پانچھانہ و پیشاب نہ ہو تو نکس و امیکا ۳۰ دینا چاہئے۔ "نال کاٹنا" اور وضع قبل کے بعد "پستان کی بیماری" کا باب ملاحظہ ہو۔

پیدائش سے اکیس دن تک بچہ کو کبھی چت لٹانا چاہئے۔ ڈاکٹر فیر صاحب پیدائش سے دو تین ہفتہ یا زیادہ وقت تک یہ نسبت بائیں کروٹ کے دائیں کروٹ لٹانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ورنہ اس کو کزاز وغیرہ امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔

بچہ کے نرم جسم کو بڑھانے کے لئے نمیند کی ضرورت ہے۔ اور اس حالت میں اوپر پٹرا ڈال کر سٹلانا چاہئے۔ خالص سرسوں کا تیل مل کر دھوپ میں لٹانا اچھا ہے۔ لیکن ضرور دیکھنا چاہئے کہ اس کو کھنڈی ہوا کا جھونکا نہ لگنے پائے۔ مشورہ میں کچھ گرم پانی میں اور اس کے بعد بچہ کے کچھ طاقت ور ہو جانے میں کھنڈے پانی سے نہلانے کی عادت ڈالنا چاہئے۔ اس عمل سے سردی کھانسی کم ہو جانے کی امید ہے۔ نہلانے کے وقت پہلے سر میں کھوڑا کھنڈا

۱۹۳۲ء میں شہر لندن میں مختلف ممالک کے ڈاکٹروں کی ایک بڑی مجلس (CONGRESS) منعقد ہوئی۔ وہاں ایک مشہور ڈاکٹر نے فرمایا کہ روز بچہ کو تنگے بدن کی طرح دیر تک سٹلانے سے اس کی ریڑھ کی کمزوری وغیرہ بہت سے امراض اچھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہندوستان کی عورتیں بچہ کو تیل لگا کر کھڑکھوپ میں کچھ دیر سٹلا دیتی تھیں۔ برطانیہ کی بات ہے کہ اعلیٰ رواج آہستہ آہستہ بند ہوتا جا رہا ہے۔

پانی ڈالنے کے بعد جسم کو تر کرنا چاہئے۔ یہ ہی اس ملک کا پُرانا رواج تھا۔
ڈاکٹر فیض صاحب بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

جب بچہ دودھ پیتا ہے تب تک زچہ کو رات میں جاگنا۔ دیر سے کھانا
زیادہ کھڑی یا کھٹی چیز کھانا یا دل میں زیادہ غصہ، رنج وغیرہ کرنا مناسب
نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے بچہ کو مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بچہ کو
کسی بیماری کے ہونے پر ماں کو خوب ہوشیار ہونا چاہئے۔ ورنہ بچہ کی بیماری بھی
بڑھ جائے گی۔ اس بد نصیب ملک میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک چوتھائی
حصہ بھی ایک سال پورا نہیں کرتے اور لقمہ اہل ہو جاتے ہیں۔ ہندوستانی
عورتوں کو یہ بات دل پر نقش کا لکھ کر کرنے کے بعد بچہ کی پرورش
کا بوجھ اپنے سر پر لینا چاہئے۔

ماں کو مرض ہونے پر یا اس کے پستان میں کافی دودھ نہ رہنے پر
مکان میں کسی دوسری عورت کے اگر اچھا دودھ ہو تو وہ بچہ کو پلا سکتی ہے۔ اُس
کے نہ ملنے پر گدھی یا گائے کا دودھ پلانا چاہئے۔ گائے کا دودھ خوب گاڑھا ہو
تو برابر حصہ پانی ملا کر کے بچہ کو پلانا چاہئے۔ زیادہ دودھ پلاتا۔ یا
سونے میں یا سونے سے جگا کر دودھ پلانا نقصان کرتا ہے۔ بچہ کے
روتے ہی اس ملک کی عورتیں بچہ کو دودھ پلا کر چپ کرنا چاہتی ہیں لیکن
ایسا کرنا اُن کی غلطی ہے۔ جب تک بچہ ماموش نہ ہو اُس وقت تک
ہرگز اُس کو دودھ نہ پلانا چاہئے۔ روتے ہوئے بچہ کو دودھ پلانے سے
اُس کو بد صفی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بغیر بھوک کے بچہ کو کبھی کچھ نہ کھانا
چاہئے۔ گھوٹا بچہ کا بالائی پیٹ ملائم رہنے کی وجہ سے مملو ہوتا ہے کہ اُس
کو بھوک لگ رہی ہے۔

بچہ پانچ سات ماہ بعد جسم کو کچھ اونچا اٹھا سکتا ہے۔ آٹھ دس ماہ میں
اٹھنے لگتا ہے۔ اور ایک سال کی عمر میں چلنا سیکھتا ہے۔ اگر پندرہ ماہ کا
ہونے پر بھی بچہ چل نہ سکے تو مناسب غذا اور علاج کا بندوبست کرنا
چاہئے۔ دو تین سال کی عمر تک وہ اب جھلنے، کودنے، چڑیوں

بھاڑنے، پھینکنے یا کسی چیز کے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ تین چار سال کی عمر میں اس کی قوت یادداشت ظاہر ہو سکتی ہے۔ بچہ کے کل دانت نکل آنے نکل آنے پر پیکر آنے چا دل کا خوب نکلا بھات اس کو کھلانے کی عادت ڈالت چاہئے خبردار! جب بچہ روتا ہو تو ہرگز اس کے منہ میں کوئی چیز نہ ڈالی جائے کیونکہ ناک میں چڑھ جانا سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ موت تک ہو سکتی ہے۔ دو سال کا سن ہونے پر بھی اگر وہ بول نہ سکتا ہو تو علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ پانچ برس کے پہلے بچہ کو پٹرھنے لکھنے کے لئے تنگ کرنا بڑا ہے۔ ساٹھ ہی ساٹھ سات برس کا سن ہوئے بغیر بچوں کو اسکول بھیجنا بڑا ہے۔ بچہ کی ہاتھ کی انگلی کے ناخن کے نیچے میل نہ جمنے پائے۔ اور دانت میں کیرا نہ لگنے پائے۔ اس بات پر مرنی کو زیادہ خیال رکھنا چاہئے۔ بچوں کی دوا یا فی نین ملا کر نہ دینی چاہئے۔ بلکہ گولیوں (GLOBULES) میں دوا ڈال کر دینا چاہئے۔ اس سے کھانے میں آسانی ہوتی ہے۔

امراض طفلان اور علاج

بے حس و حرکت مردہ کی طرح بچہ

بچہ پیدا ہوتے ہی اگر وہ مردہ کی طرح ہو تو فوراً اس کے منہ کا کمر پھونک دینے سے یا کسی دوسری ترکیب سے اس کے کھیمچرے میں ہوا پہونچانے سے وہ بچا یا

سہ نکلنے کے وقت کسی وجہ سے کھائی ہوئی چیز کا کچھ حصہ غذا کی نالی میں نہ جا کر اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو اس کو ناک میں چڑھ جانا کہتے ہیں۔ سہ منہ صاف نہ رکھنے پر غذا کی چیزوں کے جو دانے منہ کے اندر رہ جاتے ہیں وہ وقت پا کر مٹرنے لگتے ہیں اور تیزابیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہی تیزابیت ہمیشہ دانت میں لگے رہنے سے دانت کا زوال ہے۔ اسی لئے دانتوں میں گڑھا پڑ جاتا ہے اور دانت کے اندر کے باریک سوراخ میں جا کر بہت درد پیدا ہونے کے باعث ہوتا ہے۔ اسی کا نام (VARIOUS TEETH) دانت میں کیرا لگنا۔ گرم دندان ملاحظہ ہو۔

جاسکتا ہے۔ بہت عرصہ تک درد ہو۔ نے کے بعد یا زچہ کو رُم کی بیماری
 ہونے پر بچہ مُردہ کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ آکہ دوران کا فعل گرنے سے سانس
 میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور لڑکا روٹا نہیں ہے۔ اس حالت میں مندرجہ
 ذیل ترکیب کرنی چاہئے۔ بچہ کے گلے میں اگر نال لپیٹی ہو تو اس کو علیحدہ کر دینا
 چاہئے۔ بچہ کے پیدا ہوتے اگر نال کی نبض چلتی ہو تو اُسے کاٹنا نہ چاہئے۔ اور
 گلے میں جو کھٹا اٹکا ہو اُسے فوراً صاف کر دینا چاہئے۔ لیکن اگر نبض میں تپن
 نہ ہو تو غوراً نال باندھ دینا چاہئے۔ اس کے بعد انگلی سے بچہ کی ناک دبا کر اس
 کے منہ میں اس طرح پھونکنا چاہئے کہ اس کے منہ میں پھونک داخل ہو جائے
 اور اس کی پسلی اس طرح دبانا چاہئے کہ یہ ہوا پھر باہر نکل جائے۔ اس طرح
 فی منٹ چودہ مرتبہ ہوا پھونکنے اور نکالنے سے دس منٹ میں بچہ کی سانس
 لینے کا فعل شروع ہو سکتا ہے۔ اگر دس منٹ میں کوئی فائدہ نہ ہو تو بچہ کے
 منہ اور سینہ پر ایک مرتبہ گرم پانی اور دوسری مرتبہ ٹھنڈے پانی کا چھینا بار
 بار مارنا چاہئے۔ اور فشک ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پیر اور پیچھ کو ملنا چاہئے۔
 قیال رہے کہ لڑکے کے منہ پر ہوا نکلنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ کام
 بڑی ہوشیاری اور اطمینان کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اس ترکیب سے بہت سے
 بچے جو مُردہ کی طرح پیدا ہوئے تھے۔ تین گھنٹہ کے بعد بھی سانس لے سکتے ہیں۔
 دودھ نہ پینا۔ اگر کمزوری کی وجہ سے نوزائیدہ بچہ زیادہ دودھ کھینچنے
 کی طاقت نہ ہو تو پستان کا بہت کھوڑا دودھ ایک گچہ میں بھجوا کر بچہ

سے نوزائیدہ بچہ اگر بچہ کی طرح ہو اور اس کا سر گرم ہو تو اس کے سر کی چند یا پیر
 یا گرم میدا یا نلکے سے سینکے سے بھی آہستہ آہستہ اس کی سانس چلنے لگتی ہے۔ امتحان کرنا
 چاہئے۔ جان کی کوئی علامت نہ معلوم ہونے پر اوہیم۔ ۳۰ یا انٹیمپٹارٹ۔ ۳۰ زبان کے
 اگلے حصہ میں ایک دو خوراک لگا دینا چاہئے۔ اور آخر وضیح حل میں آکہ کے استعمال کی
 وجہ سے بچہ مُردہ کی معلوم ہو تو آرنیکا۔ ۳۰۔ ۳۰۔ اس کی زبان کے اگلے حصہ میں تین
 خوراک لگا دینا چاہئے۔

بچہ کو پلانے سے بچر آپ ہی آپ دودھ کھینچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بھی انہی
بچہ کے منہ میں بھٹی دینے سے وہ دودھ نہ پئے تو چائنا ۶ کی ایک چھوٹی
تولی اس کے منہ میں ڈال دینا چاہئے۔

بچہ کا یرقان :- پیدار ہونے کے دو ایک روز بعد گاسے ماہے بچہ
کا جسم اور آنکھوں کا کونہ زرد پڑ جاتا ہے۔ کمیولا ۶۔ اس کی عمدہ دوا
ہے۔ اگر کمیولا سے فائدہ نہ ہو تو مرکبوریس ۶۔ دینا چاہئے۔ اگر مرکبوریس
سے بھی فائدہ نہ ہو تو چائنا ۳۔ دینا چاہئے۔ قبض رہنے پر نکس و امیکا ۳۰۔ اور تیل
دست آنے پر پانڈو فالکم ۳ دینا چاہئے۔ مزمن یرقان میں جیلڈوینم ۶۔ ابھی
دوا ہے۔ بچہ کو یرقان ہونے پر علاج کے لئے "یرقان" ملا دیا ہو۔

سینہ میں سائیں سائیں کی آواز :- نوزائیدہ بچہ میں کبھی کبھی
سینہ یا سانس کی تلی میں بلغم جم کر اس کا گلا سائیں سائیں کرنے لگتا ہے۔
بھی کبھی بلغم بھی نکلتا ہے۔ پہلے اپیکا ک ۳۔ روخوراک دینا چاہئے۔ اس سے
فائدہ نہ ہو تو مرکبوریس ۶۔ دینا چاہئے۔ یہ نہایت مفید و کارآمد ثابت ہوا ہے۔
بچہ کے ناف کے امراض :- نال کاٹنے کے بعد پانچ چھ دنوں تک ناف
خشک ہو جایا کرتی ہے۔ اگر وہ خشک نہ ہو اور اس سے پانی یا مواد نکلتا
ہو تو ناف کو گرم پانی سے دھو کر کلینڈیولا ۵۔ دست قطرے ایک چھٹانک
مہر سوں کے تیل میں ملا کر ناف کے اوپر کپڑے کی گڈی تر کر کے رکھ دینا
چاہئے۔ اور سلاک ۶۔ کھلانا چاہئے۔ لیکن اگر مواد بدبودار ہو تو سلاک کے
بجائے آرسنک ۶۔ دینا چاہئے۔ اگر سوزش یعنی ناف سرخ ہو اور اس
میں ورم اور درد ہو تو بیلا ڈونا یا آرسنک دینا چاہئے۔

ناف پک کر مواد تھکنے لگے تو آدھا جافلی پیس کر دیا جائے تھوڑے
پانی میں تین چار قطرے ماسکاٹا ۲ x ملا کر اس میں کپڑا تر کر کے ناف
کے اوپر باندھ دینا چاہئے۔ اور نکس و امیکا ۳۰۔ کھلانا چاہئے۔ اگر پانچ
سات روز میں بھی مواد گرنا بند نہ ہو تو سلاک ۶۔ دینا چاہئے۔

نال اچھی طرح باندھنے کی وجہ سے بھی یا نال کی بندش کھل جانے کی

وجہ سے اگر خون بہتا ہو تو ابھی ملیں ۵ ایک صاف کپڑے میں ڈال کر اس سے خون نکلنے کی جگہ ذرا دبا رکھنے سے خون نکلتا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اخراج بار بار ہونے پر اگر سنگ ۶ دینا چاہئے۔

ورم ناف :- زخم خشک ہو جانے کے بعد بھی اگر ناف اونچی رہ جائے تو اس پر روئی کی موٹی گدی (۲۸۵) بنا کر رکھنا اور ایک کپڑے کا ٹکڑا دے کر اسے پیٹ کے سپرد کرے یا بندھ دینا چاہئے اور ٹکس و امیکا ۶ نکھانا چاہئے۔
مرض بد رنگ :- بچہ کے ہونٹ اور گال بد رنگ اور جسم کی حرارت کم ہوتی جاتی ہے۔ دل کے ٹکڑے ہونے یا اس کے فعل میں خرابی ہونے کی وجہ سے خاص کر یہ بیماری ہوتی ہے۔ ڈیجیٹلس ۳۔ اس کی اچھی دوا ہے۔ تمام جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو اگر سنگ ۶ دینا چاہئے تنفس کی تکلیف کے ساتھ پیر میں ورم ہو تو فاسفورس ۶ دینا چاہئے۔ رشاکس ۶ دینا چاہئے۔ رشاکس ۳۔ یا میڈروسیانک ایڈ ۳ x لیکس ۶۔ فاسفورس ۶۔ سلفورس کی بھی وقتاً فوقتاً فروت پڑتی ہے۔ جسم اچھی طرح ڈھک کر بچہ کو دائیں کروٹ سٹلانا چاہئے۔ اور اس بات کا بندوبست رکھنا چاہئے کہ زچہ خانہ میں اچھی طرح ہوا کی آمد و رفت اور دھواں نہ جائے۔ اور غذا کھانسی کی وجہ سے بچہ کم در نہ ہو جائے۔ اس بات کا لیور اپورا فیال رکھنا چاہئے۔

ٹیکا لگانا :- مرض چیچک کے بیان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ٹیکہ لگوانا یا ویکسین ۶۔ سفوف (صرف ایک خوراک) استعمال کرنا چاہئے۔ چیچک روکنے کی عمدہ ترکیب ہے۔ بچہ کے پیدا ہونے کے چھ ماہ کے اندر ٹیکہ لگوادینا اس ملک میں سرکاری قاعدہ ہے۔ جہاں اچھا لطف نہ ملنے کی وجہ سے ٹیکہ نہ لگ سکے وہاں ایک ہفتہ تک ویکسین ۶ یا تین ایک خوراک روزانہ استعمال سے نقصان ہونے کا خوف کبھی نہیں رہتا۔ پیاروں طسرف مرض چیچک پھیلا ہو تو

لے کیلے کے ڈنٹھل یا کیلے کے پتے کے ڈنٹھل کا عرق پھونک کر آٹھ دن قطرے ناف پر لگانے سے اسی وقت خون بند ہو جاتا ہے۔

دیر یولیم ۲۰۰۰ ۲ ہر ہفتہ کو ایک مرتبہ کھلانا چاہئے۔
 ٹیٹا لگانے کے تین روز بعد عموماً ٹیکہ لگانے کی جگہ پر سوزش (یعنی سرخی اور
 آباس) ہو جاتی ہے اور کئی روز بعد دانہ خشک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے
 سوکھنے میں دیر ہو تو کیلنڈر لیا (CALENDULA OIL) لگانا چاہئے۔
 ہوشیار رہنا چاہئے کہ بچہ ٹیکہ لگانے والی جگہ کو کھجلا کر آنکھوں میں نہ لگائے۔
 اس سے آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں۔

ٹیٹا لگوانے کی وجہ سے اگر کوئی جلدی بیماری پیدا ہو تو جسم خراب
 ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھو جا ۲۰۰۰ ۲ استعمال کرانا چاہئے۔
 بچہ کی کاپنج نکلنا، مقعد اور کاپنج نکلنا۔ کاپنج ملاحظہ ہو۔
 انیوا ۶۰۰۰ ۲ کاپنج نکلنے کی تیر ہدف دوا ہے۔ کاپنج نکلنے کے لئے یوٹرو فاکٹم ۱۲
 فائدہ کو تا ہے۔ لیکن بچہ کی پٹی خراب ہونے کے ساتھ بیماری ہو تو ناسفورس ۳، ۶، ۳
 کرتا ہے۔ پیشاب کرنے کے وقت اگر کاپنج نکلے تو اسے سور ۶ دینا چاہئے۔
 بچہ کی آنت بڑھنا:۔ کونستینٹ، زیادہ ہلنے یا رونے، پیٹ اینٹھینے وغیرہ
 اسباب سے ناف پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے اگر ناف کی آنت (UMBILICAL NERHIA)
 نکل آئے تو آرنیکا ۳۔ یا سلیورک اسٹ ۶۔ کھلانا اور روئی کی چھوٹی
 گدی سے ناف کو اس طرح دبا رکھنا چاہئے کہ آنت باہر نہ نکل سکے۔
 بچوں کو آنت اترنے یا آنت اترنے کے ساتھ آب نرول خصلہ
 (HYDROCELE) ہونے سے کلکیر یا کارب ۶ دینا چاہئے۔

آنت اترنے کی ادویات ملاحظہ ہوں۔

بچہ کا آب نرول خصلہ

فوطہ کے نیچے کی جلد میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے اس کے بڑھنے اور
 جھکے رہنے کو آب نرول خصلہ کہتے ہیں۔ تکلیف دہ وضع حمل میں چوٹ لگنے
 کی وجہ سے یا سوراخ المزاجی سے یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ آنت اترنے کے
 ساتھ آب نرول ہو تو ایک کارب ۶۔ بچہ کو جلدی بیماری ہو اور بچہ کی جلد
 پھیلی پڑ جائے تو گریٹا کسٹ ۶۔ حق کے مادہ والے مریض کو بیسیلیم ۲۰۔

یا آرس آیوڈ ۶ کینتھ مالا کے مادہ کے مریض کو کلیر یا کارب ۶ کلیر یا فلوریکا
 x ۱۳ سفوف اور سور کے مادہ (PSORA) دے لے بچہ کو سلفر ۲۰ دینا چاہیے
 ابرو ٹینم ۶ ہیلی بورس ۶ سپنجیا ۶۔ یہی میس ۳ کی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی
 ہے۔ باب اعراض طفلان سور المزاجی اور آب نزول کی دوائیں ملاحظہ ہوں

نوزائیدہ بچہ کو پاخانہ پیشاب نہ ہونا

نوزائیدہ بچہ کو پاخانہ پیشاب میں بہت زیادہ دیر ہونے پر بیلادونا ۶
 یا اوپیم ۶ دینا چاہیے۔ اور ہاتھ گرم کر کے اس کے پیٹ پر پھرنا چاہیے۔
 یا اگر پاخانہ یا پیشاب کا راستہ بند ہو تو کسی ہوشیار ڈاکٹر کو بلا کر فوراً
 اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ پیدا ہونے کے بعد کسی کسی بچہ کو پاخانہ نہ ہوتا ہے
 لیکن پیشاب نہیں ہوتا۔ چھتیس گھنٹہ پیشاب نہ ہونے پر ایکونائٹ ۳۰ دینا
 چاہیے۔ ایکونائٹ ۳ سے فائدہ نہ ہو تو بیلادونا ۶ یا کینتھس ۶ دینا چاہیے۔
 سر بڑا ہونا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا سر کچھ نہ کچھ بڑا ہوتا ہی ہے۔
 زیادہ روز تک خوب بڑا ہونے آرنیکا x ۳۳۔ استعمال کرنا چاہیے دیکھ کے
 دماغ میں اجتماع آب ملاحظہ ہو۔

سوزاک یا آتشک کی وجہ سے گلٹی ہو تو کو نیم سپنجیا x ۳ بیڈ یا گا x ۶
 تھو جا ۶ وغیرہ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ د آب نزول ورم خصیہ،
 پلیگ، ورم کرمول، وغیرہ ملاحظہ ہوں

ابھار۔ دانے کسی کسی بچہ کے سر پر بعد پیدائش کے دانے ظاہر ہوتے
 ہیں۔ خالص سرسوں کا تیل گرم کر کے اس پر لگاتا اور آرنیکا ۳ کھلانے سے
 فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے اگر فائدہ نہ ہو تو کلیر یا کارب ۶ کچھ عرصہ تک کھلانا چاہیے۔
 ہستہ تھو جا x ۳۰۔ اس کی اچھی دوا ہے۔ ڈاکٹر ٹنک نے چار پاتنج
 قطرے تھو جا ۵۔ تھوڑی شکر کے ساتھ کھلا کر صرف انسان ہی کے متہ نہیں بلکہ
 گھوڑا۔ کتا۔ وغیرہ (JOUR THERAP. AND DIET. DECEMER) جانوروں
 کا متہ بھی اچھا کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

متہ وغیرہ اچھا کرنا۔ حمل کے بچے کے متہ تل وغیرہ نہ ہونے

پائے۔ اس کے لئے ماں کو پہلے سلفر۔ ۳۔ اس کے بعد حقو جا۔ ۳۔ اور آخر میں مرکوریس۔ ۳۔ استعمال کرنا چاہیئے۔ ہر ایک دو کم سے کم ایک ماہ تک دہفتہ میں ایک مرتبہ کھانا چاہیئے۔

تیل :- بعد پیدائش کے کسی کسی بچہ کے وریدیں جلد کے نیچے کہیں کہیں پر کبھی کبھی اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ وہاں ایک داغ پڑتا ہے (کبھی کبھی وہ مسہ کی طرح معلوم ہوتا ہے) اس کا نام تیل ہے۔ حقو جا۔ ۳۔ استعمال کرنے اور حقو جا تیل پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ریڈیم بروماٹ۔ ۳۰ (دہفتہ میں صرف ایک مرتبہ استعمال کرنا چاہیئے) کلکیر یا کارب۔ ۶۔ فاسفورس۔ ۶۔ اور لائیو پوڈیم ۱۲ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

بچہ کے جسم پر زخم

بچہ کو گندہ رکھنے کی وجہ سے یا اس کی جلد خراب ہونے کے سبب سے اس کے بغل میں اور کان کے پیچھے گتھی وغیرہ میں زخم ہو جاتا ہے۔ کبھی یا مواد سے بھری پھنسیاں ہو تو سلفر۔ ۳۔ جلد کی خرابی کی وجہ سے زخم ہو تو کلکیر یا کارب۔ ۶۔ خاص کر موٹے اور چربی والے لڑکوں کے لئے، زخم سے ہمیشہ خون بہتا رہے تو لائیو پوڈیم ایم۔ ۱۲۔ زخم سے لیسدار پانی نکلتا ہو تو گریفا۔ ۶۔ (خاص کر کان کے پیچھے زخم میں) زخم میں جلن ہو کاربووج۔ ۳۔ تمام جسم میں سٹرخ پھنسیاں ہوں تو کیمو ملا۔ ۱۲۔ کچھ گرم پانی میں کئی قطرے نیم کی مٹی کا عرق یا دوا قطرے کیلینڈیولا۔ ڈال کر اس سے روزانہ صبح و شام زخم دھونے کے بعد میرہ چھڑکنے سے زخم کی رطوبت جسم کی اچھی جگہ پر لگنے نہیں پاتی۔

زخم، دہان، ملاحظہ ہو۔

سٹرخ جانا :- کوئی حصہ جسم سٹرخ جانے پر مرک سول۔ ۶۔ یا آرژکاس۔ استعمال کرنا چاہیئے۔ اور آرنگاہ قطرہ دودھنی بالائی یا (OLIVE OIL) روغن زیتون کے ساتھ لگانا چاہیئے۔ اگر سٹرخنے کے ساتھ بچہ کو تیزایت کا مرض ہو تو کیمو ملا۔ ۱۲۔ دودھ پلانے والی کو ہسٹریا ہو یا چائے پینے کی عادت ہو تو اگنیشیا۔ ۶۔ خلقی خرابی سے ہو تو سلفر۔ ۳۔ کیلک کارب۔ ۶۔ لائیو پوڈیم۔ ۱۲۔ بیسیپیا۔ ۶۔ رٹا کس۔ ۶۔ وغیرہ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ صاف ستھرا رکھنے کی طرف خیال رکھنا چاہیئے۔

اندھوری: گرمی لگنے کی وجہ سے یا ہمیشہ کپڑے لٹے کے رکھنے کی وجہ سے اندھوری ہونے پر کیو ملا ۱۲۔ سردی لگ کر اندھوری ہونے پر ڈنکمارا ۱۔ اندھو کا ٹیڑا رطوبت ہونے پر رسٹاکس ۶۔ اندھوری بہت کھجلا نے یا بیٹھ جانے پر بچہ کو تکلیف ہو تو سلفر ۳ کیلک کارب ۳۔ ملا ٹیکو ۳۰۔ یا سپیا ۳۰ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ اندھوری پر سفید صندل گھس کر لگانا چاہیئے۔

کھجلی: سلفر ۳۰۔ ۲۰۰۔ اس کی اچھی دوا ہے بستر پر سوتے ہی تمام جسم میں کھجلی ہونے پر گنیشیا ۶۔ جسم کا کپڑا اتارتے ہی کھجلی ہو تو آرس ۶، یا نکس و امیکا ۶۔ سونے کے بعد جسم گرم ہوتے ہی کھجلا نے پر یا مرک سول ۶۔ کھجلا نے کے بعد جلن ہونے پر رسٹاکس ۶۔ ایپس ۶۔ ہیپرسلفر ۶۔ کھجلا تے کھجلا تے خون نکل آتا ہو۔ تو مرک سول ۶ یا سلفر ۶۔ سونے سے پہلے بچہ کا جسم میدہ سے مل دینے سے رات میں کھجلی ہوتی ہے۔

آبلہ: بچہ کی پیدائش کے چند روز بعد کبھی کبھی بچہ کی پشت، کے پیچھے، گلے کے پیچھے، ہاتھ پر، نبل وغیرہ میں ایک قسم کے آبلے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کا پانی پہلے زوراً پھر سرخ ہو کر خشک ہو جاتا ہے۔ یا پھٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی رطوبت پر پیڑی بھی جم جاتی ہے۔ رسٹاکس ۳۰۔ اس کی خالص دوا ہے مرض مزمن ہونے پر آرسنک ۳۔ آتشک سے جو آبلہ پیدا ہو تو مرک کار ۳۰۔ آگے مقعد میں سرخبادہ اور خسرہ، ملاحظہ ہو۔

سرخبادہ (ERYSIPELAS)

سردی وغیرہ اسباب بچہ کے جسم کی جلد کا کوئی حصہ پہلے کچھ سرخ ہونا ہے بعدہ تمام جسم سرخ ہو جاتا ہے۔ ماؤف جگہ سوج جاتی ہے۔ اور زخم ہو کر رطوبت نکلتی ہے۔ یہ ایک سخت بیماری ہے۔ ہیلا ڈونا ۳۰۔ ایپس ۳۰۔ رسٹاکس ۶۰۔ اس کی عمدہ دوائیں ہیں سرخبادہ کا بیان دیکھئے۔

خسرہ (ECZEMA)

اکثر بچوں کو یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔ جو ایک قسم کی کھجلی ہی ہے۔

دیکھنے میں سُرخ خسرہ کی طرح، ادھر ادھر نہ رہ کر کئی پھنسیاں ایک ہی جگہ رہتی ہیں۔ اتنی چھوت دار کبھی نہیں سوز (PSORA) کے مزاج والے بچوں کو خاص کر یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔ اس سے مواد نکلیں گے اگر کپڑے پر لگ کر خشک ہو جائے تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ چھالے جس میں رطوبت بھری ہو مرکبوں میں ۱-۲ اور رطوبت والے آبلوں میں لائیو کو پوڈیم ۱۲-۱۳۔ فائدہ کرتا ہے رسوین ۳۔ اس کی اچھی دوا ہے۔ کبھی کبھی ایک دو روزہ اس دوا کے استعمال سے بیمار کے ساتھ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت دوا بند کرنے سے بیماری خود بخود اچھی ہو جاتی ہے (ضرورت پڑنے پر رسوین ۲۰-۱ ایک خوراک کھلا دینا چاہیے)۔ ایلمینا ۶-۱۰، وینینڈ ۶-۱۰، کروٹن ۶-۱۰، انٹم کروڈ ۶ کی بھی بیج بیج میں ضرورت پڑتی ہے۔ بیماری مزمن ہو جانے میں گریفٹاٹس ۳-۱ دینا نکالے گا۔ پیڑ ولیم ۶-۱، مرک کار ۶-۱، پیسلفر ۶-۱، آر سنک ۶-۱ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے زیتوں کا تیل (OLIVE OIL) لگانا چاہیے۔

جلد کا باہم رگڑ کھانا (INTERTRIGO)

بچہ کی جلد خوب نرم ہوتی ہے۔ اس لئے معمولی اسباب سے جلد چھل کر زخم ہو جاتا ہے میل جتنا زور سے جسم رگڑنا۔ وغیرہ اسباب سے جلد چھل جانے پر بچہ کے کان کا بچھلا حصہ یا گردن کے پیچھے کا بورڈ، بغل، پیٹھے وغیرہ کی جلد سوج جاتی ہے۔ سرخ ہو جاتی ہے۔ جلن ہوتی ہے۔ اور اس سے رطوبت نکلتی ہے۔ کیو ملا ۶-۱ اسکی علاج دوا ہے۔ تکلیف دہ زخم ہوا اور اس سے خون نکلتا ہو تو مرکبوں میں سول ۶ دینا چاہیے۔ بار بار بیماری کا حملہ ہو تو لائیو کو پوڈیم ۱۲-۱ دینا مناسب ہے۔ بچہ کے مُنہ میں زخم :- بچہ کے مُنہ میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اکثر ہوتی ہیں مٹروں میں گال میں بعدہ سر میں اور کبھی کبھی تمام جسم میں پھنسیاں ہوتی ہیں۔ کچھ روز بعد ہی ان پھنسیوں کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ پھٹ جاتی ہیں۔ پھٹ جانے کے بعد زرد پیر میں جم جاتی ہے۔ دانی رولا ٹریکٹر ۳-۱ اس کی بہترین دوا ہے۔ دانی رولا سے اگر فائدہ نہ ہو تو رسٹاٹس ۶-۱ دینا چاہیے۔ رسٹاٹس دینے سے کبھی کبھی

سوزش بڑھ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں رسٹائکس بند کر دینا چاہیے
 منہ کے اندر پھنسیاں یا زخم ہونے میں پوریکس سو۔ سفوف استعمال
 کرنا چاہیے۔ اور سہاگہ کی کھیل (سہاگہ بھوننے سے کھیل تیار ہو جاتی ہے)
 شہد میں لگا کر زخم میں لگا دینا چاہیے۔ ہونٹ اور منہ میں پھنسیاں، زبان
 کے پچھلے حصہ پر میل کا پرت اور بیج کے حصہ پر سرخ لکیریں منہ میں بدبو بہت
 بے چینی سبز رنگ کا پتلا دست ہونو آرسنک ۶۔ دانت نکلنے کے وقت منہ
 کے زخم میں چہرہ اور سر پر سینہ، پاخانہ میں غذا اگر ناپا پر کے تلوے سر۔ ان
 علامات میں کلکیر یا کارب ۳۔ زبان سوجی اور سوزشی، دانت کی جڑ میں زخم اور
 اسی وجہ سے خون نکلتا منہ سے سڑی بدبو۔ منہ سے زیادہ مقدار میں رال ٹپکنا پھس
 کی طرح بلغم آلود پتھے دست کی علامت میں مرک سول ۶۔ تمام چہرہ پر پھنسیاں
 اور سڑی بدبو۔ منہ سے زخم پیدا کرنے والی رال ٹپکنا۔ علامت میں ایسڈ
 ٹائٹریک ۶۔ داگرماں باپ کے خون میں پارہ سے خرابی ہونے سے ایسی
 پھنسیاں نکلیں تو یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے (زبان پر سفید تہہ جی ہو چہرہ
 پر بڑی بڑی پھنسیاں ہوں منہ سے خون آلود رال ٹپکتی ہو) لیسڈار
 دست المقعد کے چاروں طرف پھنسیاں ہوں۔ مواد میں روکا دٹ ہونو سلفر
 ۳۰۔ قبض ہونو لاسیکو پوڈیم ۳۰۔ چہرہ کا پسینہ سیاہ اور ٹھنڈا ہو کر
 متعفی ہونا شروع ہو جائے تو سیکیل ۲۔ سفوف استعمال کرنے کی ڈاکٹر
 ہارٹ میں بھی مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا شہد انگلی میں لگا کر بچہ کے منہ کے
 اندر زخم میں لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

پھوڑا:۔ گامے ماہے بچوں کے سر، گلہ، کان کے پیچھے، نبل میں بازوؤں
 کے جوڑ میں، پٹھے وغیرہ مقامات میں پھوڑا ہوا کرتا ہے اگر موٹے تازے
 بچہ کو پھوڑا ہو تو کلکیر یا کارب ۳۰ اکثر (خاص کر گرمی میں) زخم ہو جانے
 پر کاربوج ۳۰۔ زخم کے چاروں طرف پھنسیاں ظاہر ہوں اور اس کی
 وجہ سے بچہ ہمیشہ روتا ہو تو کیوٹلا ۶۔ کان کے پچھلے حصہ میں سرخ
 زخم اور زخم سے لیسڈار گانٹھ کی طرح مواد نکلنے پر گریفٹس ۶،

بدبو دار زخم سے خون نکلنے پر، اور اس کے ساتھ قبض ہوئے پر لائیکو ۳۰ پہلے سر میں ایک دد پھوڑا ہو کر اس کی رطوبت لگنے کی وجہ سے اور دوسرے حصوں میں بھی پھوڑا ہو جانے پر سلفر ۳۰، ہیر سلفر ۳۰ یا کلکریا کارب ۳۰ اکثر موقعوں پر آر نکاسہ فائدہ کرتا ہے۔

بچہ کا سرطان: یہ ایک خاص قسم کا خراب پھوڑا ہے۔ ہونٹھ پر شروع میں ایک چھوٹی سی پھنسی ہو کر یہ بڑھا اور سخت ہو جاتی ہے اور اس میں آگ کی طرح جلن بخار بے چینی، نیند نہ آنا وغیرہ علامات ہوتے ہیں یہ پھوڑا اکثر پکتا نہیں (یعنی مواد شاید ہی پیدا ہوتا ہے) اور ایک ہفتہ میں کے آخر میں ہی سڑنے لگتا ہے۔ اور اچھی طرح علاج نہ ہونے پر مریض کمزور ہو کر فوراً مر جاتا ہے۔ انتھر اسینم ۳۰، اس کی عمدہ دوا ہے۔ (خاص کر جلن زیادہ ہونے پر) ایس ۲۰۰، ڈنگ مارنے کی طرح جلن میں) لیکن زیادہ مواد نکلنے پر ہیر سلفر ۶، آرسنک ایکس، آر نکا۔ سنکا، کاربوج، بیلا ڈونا وغیرہ دوائیں کبھی کبھی ضروری ہو سکتی ہیں (سرطان کی دوائیں ملاحظہ ہوں) ہلکی زود ہضم غذا کھانا ضروری ہے۔ کبھی کبھی نشتر لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

جسم پھٹنا۔ جاڑا کے دلوں میں بچوں کے ہاتھ پیر، ہونٹھ وغیرہ جسم کا کوئی حصہ پھٹ جاتا کرتا ہے۔ آرس ۶، ہیر ۶، کیلی کارب ۳، نیٹرم میور ۱۳، سفوف ۲۰۰، نیٹک ایسڈ ۶، سلفر ۳۰، آس کی مخصوص دوائیں ہیں ماؤف جگہ میں بالائی مکھن، گھی، تل یا زیتون کا روغن لگانا چاہیے۔

لہ پھوڑے کی نسبت سرطان زیادہ گہرا اور بڑا (ایک سے تین انچ تک) ہوتا ہے۔ اس مرض میں ہونٹھ، پشت، گردن، ران، سر، چہرہ، کندھا، وغیرہ حصہ میں پہلے سوزش ہوتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ماؤف جگہ میں تیز جلن اور کچھ سیاہ رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ بعد کو اس کا اگلا حصہ چپٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے چاروں طرف مستح ہو کر مواد نکلنے لگتا ہے۔ (مقصد امراض جلد میں سرطان ملاحظہ ہو)۔

سر میں روسی۔ سر صاف نہ رکھنا۔ خلتی خرابی کی وجہ سے سر کی جلد میں زرد یا رنجین مردہ گوشت کی طرح پھنسیاں ہوتی ہیں۔ اسی کو روسی کہتے ہیں۔ سلفر ۳۰ ہفتہ میں دو مرتبہ استعمال کرنا چاہیئے۔ روز رات میں اذیتوں کا تیل (OLIVE OIL) سر میں لگانا اور صبح پانی میں سوڈا حل کر کے سر دھو ڈالنا اچھا ہے۔ سر میں پیچ پیچ میں بھین، اچھی طرح رگڑ کر پانی سے دھو ڈالنا چاہیئے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

بال گرنا :- خاص کر بچپن اور لڑکپن ہی میں سر سے بال گرنے لگتا ہے سولہ برس کی عمر کے بعد یہ بیماری ایسی کبھی نمودار ہوتی ہے۔ اگر بال گر جاتے ہوں تو ایسڈ فلور ایک اچھی دوا ہے۔ ڈاکٹر ہونج کہتے ہیں کہ آتشک کے مادہ والوں کو یہ دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر ہنٹ کی رائے ہے کہ گنجہ مرض کے لئے آرسنک ایک اچھی دوا ہے۔ اگر گنجہ مرض ہونے پر سر بہت کھجلا تا ہو تو ونکامائز دینا چاہیئے۔ تھیلیئم بھی کبھی کبھی بہت فائدہ کرتا ہے۔ بال خشک ہو جانے پر کیلی کارب ۶۔ منیٹ بیماری کے بعد یا د ایک حصہ کی یہ تمام جسم کی کمزوری یا ذماغی سستی کی وجہ سے بال گرنے پر ایسڈ فاس ۲x۳۔ استعمال کرنا چاہیئے۔ سیسیا ۶۰۰۔۱۲۰۰ استعمال کرنا چاہیئے۔ اور دھوئی کا استعمال کیا ہوا پاٹ یا ڈارڈیم ۵۰۔) شہد میں ملا کر لگانے سے یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ سلفر ۳۰۔ کیلک کارب ۳۰۔ یا کینتھر ۳۰۔ ۶۔ استعمال، یو پی لٹری ایم کے ساتھ کینتھر ۵۰ ملا کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے ایکسٹریکٹ سرے (XTIRAY) کا استعمال کرنے سے ہی اکثر لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ گوشت کھانا چھوڑ دینا چاہیئے۔ کبھی کبھی داد کی وجہ سے بال گرنا (ALOPECIA AREATA) ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر مندرجہ ذیل ادویات (ہر ایک تین ماہ تک استعمال کرنے سے گنجین بالکل اچھا ہو سکتا ہے۔

۱۹۳۵ء میں (WESTERN MEDICAL TIMES) اخبار میں ڈاکٹر سی۔ ایف۔ ایڈسٹ (DR. C. F. PADST) نے لکھا ہے کہ گوشت نہ کھانے والوں کو یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے۔

بیلینم ۲۰۰۔ حقو جا ۳۔ سلفر ۳۔ اینڈر اسٹس ۵۔ اور یورٹیکا یورنس ۵
 سر میں جوں: بچہ کے بال میں جوں پڑ جانے پر روز بال کو دھو ڈالنا
 چاہیے۔ اور دھو ڈالنے کے بعد سب ڈالا ۵ ایک حصہ میں حصہ پانی کے
 ساتھ ملا کر لوش تیار کر کے بچہ کو نہلانا چاہیے۔ نیٹرم میور ۱۲ x سفوف استعمال
 کرنا چاہیے۔ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔

کبھی کبھی بچہ کی جوں کسی طرح جانا نہیں چاہتی۔ نہلانے، دھلانے اور صاف
 ستھرا رکھنے پر بھی کسی طرح اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے موقعوں پر دن ولیرس۔
 (VEN VILLAERS) کا بیان ہے کہ سٹے فی سیگریٹ ۳۰ استعمال کرنے سے
 کچھ ہی عرصہ میں تعجب خیز فائدہ ہوتا ہے۔

(ANSHUTZ'S THERAPEUTIC BY WAYS) ملاحظہ ہو۔

بھوت لگنا، ہوا لگنا یا بچوں کا کزاز۔ پیدا ہونے کے بعد کبھی کبھی
 بچہ کو یہ خوف ناک مرض ہوا کرتا ہے۔ شروع میں بچہ دودھ نہیں سکتا ہے
 گردن سخت ہو جاتی ہے جبڑے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیہوشی
 اکڑن ہونے پر، منٹھ اور جسم سرخ، ہونٹھ نیلے، ہاتھ کی مٹھی بند اور کبھی کبھی
 بخار ۵۰-۱۰۰-۹۰-۱۰۰ ڈگری تک ہوتا ہے۔ اور ہاتھ پر کھینچ کر جبراً اٹھایا جاتا
 ہے۔ منٹھ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور آخر میں مر جاتا ہے۔ کوئی کوئی
 اس کو بھوت وغیرہ کہتے ہیں۔ لیکن جوٹ لگنے، نال کاٹنے کی خواہش سے
 یا ناف میں زخم ہونے کی وجہ سے بچہ کے جسم میں کزاز کے جرم
 داخل ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔
 سردی لگ کر کزاز ہونے پر ذیچہ کا بخار اور برا بر رونا اور
 بے چینی کی علامت ہیں) ایکونائٹ ۳۔ اکڑن کا نپنا اور جبراً
 کا اور عزا دھر ہلنا۔ ان علامتوں میں جلمیم ۳۰۔ بیلادونا ۶۔
 اس کی اچھی دوا ہے دھاکہ ناف کے ورم کی وجہ سے بیماری پیدا
 ہوتی ہو) ناف کے ورم کی وجہ سے کزاز میں کیلینڈریولا۔ ٹیل کی گدی ناف
 پر رکھنا ضروری ہے۔ چوٹ کی وجہ سے کزاز میں آرنیکا ۳ x سفوف بائی پرکیم ۳ x

ایکس: ایکس ۳۰۰ x ۲۰۰ میٹر کنیا، سفوف، سائیکوٹا ۶۔ ایسٹ ہائیڈروسیانک۔
۳۔ کی بھی گا ہے ما ہے ضرورت پڑتی ہے۔ ماں کے زیادہ غصہ یا رنج وغیرہ
میں پستان کا دودھ خراب ہو جائے پر اس دودھ کو پینے کی وجہ سے بچہ کو
پرہیز ہو تو بچہ اور زچہ دونوں کو انیشیا۔ دینا چاہیے۔ بچہ کے گلے کی
بشت کی ریڑھ کو سینک دینا مفید ہے۔

بچہ کی آنکھ دکھنا:۔ پیدائش کے چند روز بعد کسی کسی بچہ کی آنکھیں
دکھنے لگتی ہیں۔ آنکھیں ورم کر جاتی ہیں۔ اور سرخ ہو جاتی ہیں۔ مواد نکلتا
ہے۔ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی آنکھوں میں زخم
ہو جاتا ہے۔ اس طرح عرصہ تک مواد نکلتے رہنے پر آنکھیں ضائع ہونے
کا خوف رہتا ہے اس لئے شروع ہی سے علاج کرنا مناسب ہے
میلے مکاں میں رہنا۔ ٹھنڈی ہوا یا دوسرا لگنا۔ آنکھوں میں
زیادہ روشنی، دھوپ، یا دھواں لگنا، یا زچہ خانہ میں
آگ کی گرمی زیادہ ہونا ماں باپ کو کوئی خلعی مرض پر
بیماری ہو سکتی ہے۔

آرج نانی ۳۔ بچوں کے آنکھ دکھنے کی ایک بہت اچھی دوا ہے۔
سر دی شبنم یا زیادہ روشنی کی وجہ سے آنکھوں میں ورم ہو گیا ہو۔
بخار بے چینی، نیند نہ آنا، آنکھوں سے بہت پانی گرنا پتلیوں کا سرخ
ہو جانا وغیرہ علامات میں ایکو نائٹ ۳ x چھپک وغیرہ کے بعد یہ بیماری
ہونے پر ایس ۳ چوٹ لگنے کی وجہ سے آنکھ دکھنا۔ آر نکا ۳۔

پلکیں پھولی۔ سرخ اور کبھی کبھی اخراج خون ہونے پر بیلا ڈونا۔
پلکیں پھولی اور ان کی جڑیں پھنسم اور زیادہ مواد جمع ہو جانے پر مرک سول
۶۔ آر جنٹم مائٹیریکیم ۳۔ کلکریا کارب ۶۔ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔
نیم گرم پانی میں صاف کپڑے کا ایک ٹکڑا بھگو کر اچھی طرح بخور
کر آہستہ آہستہ بہت ہوشیاری سے آنکھوں سے کچھ وغیرہ نکال ڈالنا
چاہیے۔ پلک چمٹا جانے پر جب وہ کھینچنے سے نہ کھلتی ہو تو اسکو کھینچ کر نہ

نہ کہو لٹا چاہیے۔ پلکوں پر تھوڑی پانی لگانے سے ہی وہ خود بخود کھل جائیگی۔
پانی خوب صاف ہو اور اس میں صابن یا دودھ نہ ملایا جائے۔ آنکھ صاف
کرنے کے بعد ایک قطرہ آرجنٹم نائیٹرکیم کم طاقت کے لوشن
(WEAK SOLUTION) سے دونوں آنکھوں میں ڈال دینے سے اکثر فائدہ
ہو جاتا ہے دوسری دواؤں اور علاج معاون کے لئے اسی کتاب میں
آنکھ دکھنا ملاحظہ ہو۔

ماں باپ میں سورالمزاجی کی وجہ سے آنکھ کا ورم ہونے پر تھوچا،
۳۰۔ مرکبوریس مول ۶۔ سلفر ۳۰۔ آرم میو ر ۲۰۰ ایسٹ نائیٹرک ۶۔ ۳۰۰ وٹیرہ
ادویات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان سب دواؤں کا مشرح حال معلوم کرنے
کے لئے اسی امرامنی طفلان کے باب کا مقصد (ب) اور سورالمزاجی ملاحظہ ہو۔
بلینی۔ انجنی۔ پلکوں کے کنارے کنارے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پھوٹ
ہونے پر اس کو انجنی یا بلینی کہتے ہیں کبھی کبھی اس میں مواد پیدا ہو جاتا
ہے پیلس ۳۰ ہیر ۳۰ اور سٹافائی سیگنیر یا ۳۰۔ اس کی عمدہ دوائیں ہیں۔
کسی ایسی خاص فائدے والے بچوں کی بلینی کسی طرح اچھی نہیں ہوتی ان کو
سلفر ۳۰ یا تھوچا ۳۰ کا متواتر کچھ عرصہ تک استعمال کرانے سے
فائدہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔

لہ آج کل آرجنٹم نائیٹری سڈیشن کے استعمال کے متعلق مبالغوں میں اختلاف
رائے ہو رہی ہے بہت کچھ بحث و مباحثہ کے بعد ڈاکٹر وارکر کی رائے کے سامنے
سب نے سر جھکا دیا ہے۔ اور وہ یوریک ایسٹ ڈوگرین۔ کیلنڈیولا کے ساتھ
ٹاکر فورڈ کے پیدا ہونے بچوں کے آنکھ میں استعمال کر کے آرجنٹم نائیٹری لوشن
کی نسبت زیادہ فائدہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔

آرجنٹم نائیٹری لوشن کا استعمال کرنے پر جو نقصان ہونے کا خوف رہتا ہے۔
وہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ فائدہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔

(Vide the Home Recorder for Jan 1912)

کان میں میل :- بہت عرصہ تک پکا ہونے سے کان میں میل پیدا ہو جاتا ہے۔ سٹے فانی سیگنر یا ۳-۱ اس مرض کی مخصوص دوا ہے۔ کبھی کبھی کلکیر یا کارب کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

کان میں میل ورم گرم نمول، کان میں کھجلی قوت سامعہ کی کمی بہرہ ران کے علاج کے لئے، امراض گوش کا باب ملاحظہ ہو۔

بچہ کے کان میں درد، ٹھنڈک لگنے پر، سردی یا چھک بھٹکے پر یا کان میں پانی جانے سے یا دانت نکلنے وقت کھامے ماسھے بچہ کے کان میں درد ہوتا ہے۔ بچہ کے کان پر ہاتھ لگتے ہی وہ چیخ اٹھتا ہے۔ ایسی حالت میں سمجھنا چاہیے کہ اس کے کان میں درد ہے۔ سردی سے کان میں درد ہونے پر، ایکونائٹ سوکان سوچ کر گرم ہو جانے پر بیلڈونا ۳۰ دانت نکلنے وقت کان میں درد ہونے پر کمیو ملا ۱۲-۱ دردنا قابل برداشت ہونے پر مینشیا فاس ۱۲ x سفوف، خوب گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ کان پر خشک سینک دینے سے درد کان کم ہو جاتا ہے۔

درد کان اور آماس پسہم لگنا، برسات کی نرم ہوا سردی کے دونوں کی ٹھنڈی ہوا لگنا۔ کان میں جلدی امراض کے دانے یا یکا یک بٹھ جانے وغیرہ کے اسباب سے درد کان۔ یا ورم ہوا کرتا ہے۔ کان میں جلن ٹپکن کی طرح درد بہت تشنج، کان کے اندر اور باہر گرم، سوچن، سرخی ہونا۔ اس کے ساتھ اکثر بخار رہنا اس کی مخصوص علامت ہے۔ کان کے درد کے اسباب اور علامات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فری اتنا ہے کہ کان کے ورم میں ٹپکن کا درد ہوتا ہے۔ لیکن درد کان میں ایک بار سچی چھٹنے کی طرح درد ہوتا ہے۔ پلسا ٹیلا کا استعمال اور پلسا ٹیلا چند قطرے کان میں ڈال دینے سے دونوں بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے۔ اگر موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا لگنے سے یہ مرض ہو تو ایکونائٹ ۶ x جوڑ دے کیوجہ سے ہو تو آر نکا ۳۰ کان کے اندر اور باہر سوزش ہو کر کان کے اندر درد، اور باہر جلن، اگال اور دانت تک پھاڑنے کی طرح درد

در دہونے پر مرکبوائی داس ۳۰۔ سفوف فائدہ کرتا ہے۔ ہلکی غذا
تکلیف دہ زیادہ ہونے پر سینک دینا چاہیے۔ دوسری دوائیں اور علاج
معاون کے لئے اس کتاب میں ورم گوش، اکابیان ملاحظہ ہو۔

کان پکنا مواد بہنا۔۔۔ چیچک، بخار، وغیرہ بیماریوں کے بعد یا کوئی
جلدی بیماری دب جانے پر۔ (خاص کر کٹھ مالا والے) لڑکے لڑکیوں کے
کان میں مواد بڑھ جاتا ہے۔ چیچک کے بعد کان پکنے پر۔ دیا کان سے مواد
نکلنا بند ہو کر کندھے کی گتھی آگے کر جائے، شروع میں پلسا ٹیلا ۳۰۔ اور
بعد میں ۳۰ دینا چاہیے۔ کان سے مواد آنے کے ساتھ در دہر ہو تو بیلا ڈونا
۳۰۔ بیلا ڈونا کے بعد مرکب ۶۱۔ (خاص کر مواد گھاڑھا اور بہت بدبو دار اور
بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھ جانے پر)۔ لیکن پارہ یا مرکب کا اگر زیادہ
استعمال کیا ہو تو ہیرسٹف دینا چاہیے۔ نیم گرم پانی میں سہاگ ملا کر اس سے
آہستہ آہستہ دھو ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد پلاٹینک کاغذ سے کان اچھی
طرح پونچھ کر دھنکی ہوئی۔ کان میں لگا دینا چاہیے۔ خبردار اگر بچہ کے
کان سے مواد اگڑا آتا ہو۔ یکایک کسی دوا کا بیرونی استعمال کر کے اس کو
بند کر دینا مناسب نہیں ہے۔ اخراج بند ہو جانے سے خونناک بیماری
ہو جاسکتی ہے۔ کان پکنا، ملاحظہ ہو۔

تشخیع یا اینٹھن

بچپن میں نظام انہضانی کا فعل معمولی طور سے محرک ہو جاتا ہے۔
اس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس بیماری کی علامت مرگی
اور ہسٹیریا کے مانند ہوتی ہے۔ دانست نکلنے کے وقت یا چیچک اور خسر اچھی
طرح نہ نکلنے پر یا مرض گرم رہنے پر یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے یہ بیماری
ہوتی ہے۔ آنکھیں اور چہرہ سرخ۔ آنکھوں کی پتلی پھیلی ہوئی۔ سر گرم
ہو نکلنا، یا اچھلنا۔ ایسی علامت میں بیلا ڈونا ۶۱۔ چہرہ داس، گرم اور
سو جاتا ہو۔ تمام جسم میں لیزہ، گول گول کی توار اور کی طرف کھینکی پاندھے
پڑا رہنا۔ اور تبصر کے علامات میں کوہیم ۶۰۔ دانست نکلنے کے وقت تشخیع۔

ہونے پر کیو ملا۔ ۶۔ چھک اچھی طرح نہ نکلنے کی وجہ سے ہوتو زنگم ۶۔ یا۔ اسے امونیم ۶
 دینا اچھا ہے بقیل چیز کھانے کی وجہ سے اکڑن ہونے پر پہلے نکس دایمیکا ۶
 دینا چاہیئے۔ اگر تین چار مرتبہ نکس دایمیکا کھلانے سے کوئی فائدہ نہ ہو تو گرم پانی
 کی پچکاری سے براز نکال دینا یا قے لانے والی دوا کھلا کرتے کرادینا
 مناسب ہے۔ کیڑے کی وجہ سے اکڑن میں سائنٹا ۳۰۰ x ۳۰۰ تیز بخار کے
 ساتھ جسم پیچھے کی طرف اکڑ جانے پر ورے ٹرم ورائڈس ۳۰۰ x ۳۰۰، امراض
 جلد کے دانے بیٹھ جانے سے اکڑن ہوتو سلفر ۳، کیوپریم ۱۶، ایپس ۶۔
 انٹ مارٹ ۶۔ زنگم ۱۶، آر سی ۶۔ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ نظام
 اعصابی کے بیان میں، اکڑن، مرغن کی دوائیں ملاحظہ ہوں، گرم پانی میں بچہ
 کا پیرو ڈبو کر اس کو خشک کپڑے سے پونچھ دینے اور ساتھ ہی ساتھ سر
 پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے سے اکثر فائدہ ہو جاتا ہے۔ لاج و نسی بیل
 کی مکڑی بچہ کے گلے میں باندھنے سے اکڑن فوراً اچھی ہو جاتی ہے۔

بچہ کی سردی گرمی :- بچہ کے تمام جسم میں دھاگر سر میں (دھوپ
 لگنا گرمی کے دنوں میں زیادہ سواری وغیرہ میں دیر تک گھومنے سے
 سردی گرمی ہو سکتی ہے۔ پہلے گرم معلوم ہونا، پیاس لگنا۔ اس کے بعد
 جاڑا جسم کی جلد خشک ہونا۔ درد سر۔ آنکھیں سرخ، متلی یا تے، بار بار
 پیشاب ہونا اور اس کے بعد جسم کی حرارت کم ہونے لگتی ہے۔ اور آہستہ
 آہستہ ایک ایک بیہوش ہو سکتی ہے کبھی کبھی اسی طرح مرضی مر بھی جاتا ہے۔
 یکایک بیہوش ہو جانا۔ تمام جسم۔ خاص کر چہرہ اور سر گرم اور سرخ ہونا۔ نبض
 تیز ہونا۔ بچہ کی سانس رک جانا۔ دست، اتے، وغیرہ علامات میں گلو نائن ۳۔
 دھنٹ کے وقفہ سے استعمال کرنا چاہیئے۔ کاربودج ۳۔ وغیرہ دواؤں
 کی بھی کبھی کبھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سردی گرمی کا بیان ملاحظہ ہو

دماغی کھجلی کا ورم (MENINGITIS)

اس بیماری میں شروع میں بھوک نہیں لگتی۔ سر بھاری رہتا ہے اور قے
 ہوتی ہے۔ بنف کمرور، تنفس، بے قاعدہ اور نظر ٹٹری ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد آہستہ آہستہ تشنج، ہنسی، تیز نبض، جسم کی حرارت کی زیادتی (۱۰۳) ڈگری تک، وغیرہ ہو کر دو تین ہفتے کے اندر ہی بچہ مر جاتا ہے۔ ایسے ۳۰۔۴۰ اس کی عہدہ دوا ہے۔ خاص کر نیند کی حالت میں اکثر بچہ چیخ اٹھتا ہو کسی چوٹ کی وجہ سے ہو تو آرژیکاز ۳۔ زیادہ ہڈیاں ہو تو بیلادونا ۳۔

سر کے پشت اور گردن کے پیچھے بہت درد رہنے پر ہلی بوریس ۳، بیلینم ۲۰۰ (صرف ایک خوراک) فاسفورس ۶، زینک ۶، برائیونیا ۶، سلفر ۳۰، جلیسم ۳۰، سٹرامونیم ۳۰ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ کے سوراخ مزاجی میں دق ملاحظہ ہو۔

دماغ میں اجتماع آب (HYDROCEPHALUS)

پیدائش کے ایک سال کے اندر دماغ میں استقامت ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری آٹھ دس برس کی عمر تک رہ سکتی ہے۔ بچہ ماں کا دودھ اچھی طرح پیتا ہے۔ لیکن دبلا ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ سر بڑا ہوتا ہے۔ بچہ بوڑھوں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اور ہمیشہ پڑا رہنا چاہتا ہے۔ اس کے حواس بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں وہ مر جاتا ہے۔ کلکریا ۳۰، سلکاز ۳۰، سلفر ۳۰ اس کی بہترین دوائیں ہیں اگر بے خبری میں بچہ کا پیشاب بند ہو جائے اور وہ بھڑپانی کے اور کچھ نہ کھانا چاہے تو ہلی بوریس ۳۰، عہدہ دوا ہے۔

بچہ کے دماغ میں اجتماع خون

بچہ کا تالو کچھ سوچ جاتا ہے اور وہ بالکل سُست ہو جاتا ہے۔ سر گرم ہونا نبض کی چال کبھی تیز اور کبھی سُست ہو جانا، قبض، اتنے غلط دیکھنا یا بکنا یا غلوں غلوں کرنا ٹکٹکی لگا کر دیکھنا۔ آنکھوں کی پتلی پھیلنا، زبان اور آنکھوں کا سُرخ ہونا، چہرہ اور آنکھیں تھمتانی، سر اور گردن کے پیچھے کی سوجن، سانس جلد جلد اور تکلیف سے لینا۔ گہری نیند میں بھی یکایک چیخ اٹھنا وغیرہ اس بیماری کے مخصوص علامات ہیں۔ چوٹ لگنا دانت نکلنا ہو پکھانسی کی وجہ سے سر میں خون کی زیادتی۔ دریدوں پر زیادہ دباؤ پڑنا۔ خسرہ، چھپک یا کسی دوسری جلدی بیماری کا دب جانا وغیرہ

اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آپس ۳ اس بیماری کی بہت اچھی دوا ہے۔ سر بھاری آنکھیں بند کئے پڑے رہنا، جسم کی حرارت ۱۰۰ ڈگری تک ہونا، ان علامتوں میں جلس ۱۰- دینا چاہئے۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ اور چمکیلی۔ آنکھوں کی پتلی پھیلی، گہری، نیند کی خواہش لیکن نیند نہ آنا۔ پیچ پیچ میں چونک پڑنا۔ تالو کی سوچن وغیرہ علامات میں سیلا ڈونا ۳۰- اگر یہ علامات زیادہ ہوں تو گلوٹائین ۳- دینا چاہئے۔ ہلکی اور مقوی غذا دینا چاہئے۔ دماغ اور دماغ کے ڈھکنے والی غصتی اور درم، غشیۃ الدماغ ملاحظہ ہوں۔

بچہ کے دماغ میں کمی خون کی وجہ سے نقائص

(HYDROCEPHALOID DRAIN)

ہیضہ اسہال، بخونیا، وغیرہ بہت سے خوفناک امراض کے سبب سے خون کم ہو جانے سے بچہ کی پرورش میں نقص پڑ جاتا ہے۔ مناسب پرورش کے بغیر نہ ہونے کا نام، دماغ میں کمی خون کی وجہ سے نقائص ہے۔ بچہ کا گلا بیٹھ جانا۔ سر ہمیشہ ہلاتے رہنا یعنی اس کروٹ اور اُس کروٹ، غفلت ہو جانا۔ یہ کل خراب علامات ہیں۔ خیال رکھنا چاہئے کہ متہ کرہ بالادماغ میں، اجتماع آب و نقائص، ایک ہی بیماری نہیں۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بیماریاں ہیں۔ فاسفورس ۶- کلکیر یا کارب ۳۰- ایتھوز ۶- کلکیر یا فاس ۱۲- سفوف، کیدیم سلف ۳۰- ہائیڈرائیکس ہلی بورس ۳۰- وغیرہ بھی اچھی دوائیں ہیں۔ زیادہ حال اور علاج کے لئے ہماری کتاب موسومہ ہیضہ و طائون، ملاحظہ ہو۔

بچہ کے حرام مغز میں اجتماع آب سے پیدا ہوا منقسمہ حرام مغز

(SPINAL BIFIDA) حالت میں ریڑھ کی نلی (SPINAL CANAL)

میں پانی جمع ہونے سے فوراً کے پیدا ہوئے بچہ میں ماؤف جگہ تھوڑی (TUMOUR) کی طرح سوج جاتی ہے اور ریڑھ کی ماؤف ہڈی ناممکن ہونے کی وجہ سے علیحدہ دکھائی دیتی ہے اس کا نام منقسمہ حرام مغز ہے۔ کینک فاس ۳۰-

سفوف کے استعمال سے بدن کا قصص جاتا رہتا ہے۔ اور ابیس ۳ کے استعمال سے اور خارجی استعمال سے توڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ بے سی لینم ۲۰۰ براؤنیا ۳۔ سلفر ۳۔ آرس ۱۰ لائیو ٹو ڈیم ۳۔ کیدک کارب ۶۔ کی بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر توڑی بڑھتی جاتی ہو تو شتر گوار دینا چاہیے۔

بچہ کا فاسج یا لقوہ

بخار یا اگر ن کے ساتھ یہ بیماری مونا، کھائی دیا کرتی ہے۔ مفلوج جگہ پندرہ بیس دنوں میں خشک ہو جاتی ہے۔ اور پتلی پڑ جاتی ہے۔ ماؤف جگہ پھر بڑھ نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ ہڈی پتلی پڑ جاتی ہے۔ سیکسل ۳۔ ایکو نائٹ ۳۔ بیلا ڈونا ۳۔ پلمبم ۶۔ حقہ جا ۳۔ جلسیم ۳۔ سلفر ۳ وغیرہ اس بیماری کی مخصوص دوائیں ہیں۔ مرض افانج کا بیان ملاحظہ ہو۔

بچہ کی ریڑھ میں فانج (INFANTILE SPINAL PARALYSIS)

ماؤف جگہ کا عضلہ پتلا پڑ جانے پر بچہ کی ریڑھ مفلوج ہو گئی ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک قسم کا زہر شاید اس کی خاص وجہ ہے۔ اصرطیل کی مکھیاں اس مرض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں۔ سردی لگتا یا پسینہ یا یک بند ہو جانا اس کا سبب ٹالوزی ہے۔ موسم گرما میں ہمیشہ ایک سال سے چار سال تک کے لڑکے، لڑکیوں کو بخار کے ساتھ اس بیماری کا ایک حملہ ہوا کرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے مفلوج حصہ ہت جلد پتلا پڑ جاتا ہے۔ بخار بے چینی، انصاب میں درد وغیرہ علامات میں ایکو نائٹ زہر (مرض نمودار) مونا کے وقت سے ہی کچھ عرصہ تک اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن یہ معلوم ہوئے ہی کہ فانج شروع ہو گیا ہے۔ ایکو نائٹ روک کر

بیس ۱۰۰ دینا چاہیے۔ بخار کے ساتھ رنجیدہ رہے تو جلس کے استعمال سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تیر بخار، چہرہ پر اجتماع خون جلد خشک وغیرہ علامات میں بیلا ڈونا ۳۔ دینا چاہیے۔ موٹے (یا ڈبلے) بچوں کے لئے کیدک کارب ۶۔ گرم پانی میں نہانا اور بیماری ہونے کے چھ ہفتہ بعد بجلی لگوانا اور مالش کرنا کم از کم ایک سال تک فائدہ کرتا ہے۔

بچہ کو مرض صرع یا مرگی۔ مرض صرع ملا دظہ ہو، اکثر بچوں کو یہ بیماری ہو کر مرنے لگتی ہے۔ کلکیر یا کارب۔ ۳۔ اس کی اچھی دوا ہے۔ مرض مزمن ہونے پر سلفر۔ ۳۔ کیو پریم۔ ۶۔ بیوفو۔ ۶۔ سلکا۔ ۳۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ ۳۔ کلکیر یا فاس۔ ۶۔ سفوف۔ ۶۔ زینک فاس۔ ۳۔ ۴۔ میلاڈونا۔ ۶۔ کیمو ملا۔ ۶۔ سائنا۔ ۳۔ ۴۔ ۲۰۰۔ اگنیشیا فاس۔ ۳۔ نکس و امیکا۔ ۳۔ اور سٹرا مونیم۔ ۶۔ کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

حمی لازمی۔ کبھی کبھی بچوں کو بخار چھوڑتا ہی نہیں۔ فیرم فاس۔ ۱۲۔ ۴۔ یا جلسیم۔ ۳۔ ۴۔ اس کی اچھی دوا ہے۔ متحدہ کی خرابی رہنے سے پلس۔ ۳۔ زبان پر تہہ جمی ہو تو انٹ کر وڈ۔ ۳۔ کیڑے کی وجہ سے ہو تو سائنا۔ ۳۔ ۴۔ یا سپانی جلیا۔ ۶۔ جسم خوب گرم، چونکنے یا اکڑنے کے علامات میں میلاڈونا۔ ۳۔ فائدہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی مریض کا بخار کسی طرح جاتا ہی نہیں، قبض رہتا ہے۔ ناف کے چاروں طرف درد۔ کیڑے رہیں یا نہ رہیں۔ تاک کو گریڈتے رہنا علامات میں سائنا۔ ۲۔ ۳۔ اور سائنا سے کوئی فائدہ نہ ہونے پر، سپانی جلیا۔ ۳۔ ۴۔ دینا چاہئے۔ اگر خرابی کے علامات ظاہر ہوں تو شروع میں کیسکیم۔ ۶۔ دینا چاہئے۔ اگر پانی میں پکی بارلی وغیرہ ہلکی چیزیں کھانے کو دینا چاہئے۔ بخار کے وقت دودھ دینا منع ہے۔ زچہ کے نہانے اور غذا پر بھی نظر رکھنی چاہئے۔ حمی لازمی۔ لیریا سے پیدا ہوا بخار نہی کا بخا اور سر سام ملا دظہ ہو۔ تلی بطحال۔ بہت عرصہ تک لیریا میں مبتلا رہنے سے تلی بڑھ جاتی ہے، سوچ جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ اکڑ جاتی ہے اور بھڑے کی طرح درد کرتی ہے۔ کونین کے غلط استعمال سے یا آرسنک کے غلط استعمال کی وجہ سے تلی اس طرح بڑی اور سخت ہو جاتی ہے۔ مرکورس۔ ۳۔ آئیوڈ۔ ۳۔ ۴۔ ۶۔ ۴۔ سفوف اس کی اچھی دوا ہے۔ سیانوفیس۔ ۴۔ تلی پر لگانے اور سیانوفیس۔ ۴۔ ۱۔ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آرسنک۔ ۳۔ نکس۔ ۶۔ جانا۔ ۳۔ لائیو پوڈیم۔ ۳۔ کیلک کارب۔ ۳۔

آرنیکا ۶ سلفر ۳۔ کی بھی کبھی ضرورت ہو سکتی ہے (دطحال کا بڑھنا)
تپ لرزہ، وغیرہ ملاحظہ ہو۔

بچہ کی بے خوابی۔ سر میں خون کی زیادتی۔ خون صبح ہونے پر یا
نہ چہ اور بچہ کے کھانے پینے کی بد پر ہیز یا کیڑے کی وجہ سے نیند نہیں
آتی ہے۔ قبل اس کے کہ علاج شروع کیا جائے۔ یہ طے کر لینا چاہئے کہ
نیند کس سبب سے نہیں آتی۔

سر گرم بغیر کسی سبب کے رونا۔ نیند میں یا ایک چیخ کر رونا۔
ایسے علامات میں میلا ڈونا ۶۔ ٹھٹھہ ٹھٹھہ کر جسم کا بھڑکنا۔ جسم گرم۔ جڑ جڑی
عادت۔ اور ہمیشہ گود میں رہنے کی خواہش ہو تو کمیو ملا ۶۔ بچہ ہٹا کھٹا ہو
لیکن جسم ہمیشہ گرم رہے اور بیچ بیچ میں ڈر کر چیخ اٹھتا ہو تو ایکونائٹ،
۳۔ کیڑے کی وجہ سے نیند نہ آنے پر۔ ساٹنا ۳۔ X۔ قبض کی وجہ سے نیند
نہ آتی ہو تو نکس و امیکا ۶۔ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو
پلساٹیل ۶۔

دودھ کی قے کرنا۔ اعصابی ترکیب یا مسدود کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے بچہ جو
دودھ پیتا ہے وہ قے کر دیتا ہے۔ بچہ کو دودھ نہ پینے کی خواہش، کھٹی یا بدبودار قے
یا صفرائی سبز رنگ کی قے۔ قبض وغیرہ کی علامت میں نکس و امیکا ۶۔ زہر کے افسیل پر کھانے
کی وجہ سے بچہ کے فعل مضمی میں نقص پڑ کر جمے ہوئے دہی کی طرح قے ہوتی ہے۔
ایسی حالت میں پلساٹیل ۶۔ تیزابیت کی وجہ سے دودھ کی قے کرنے پر
کلکیر یا کارب ۳۔ سمندر کی ایک چھوٹی سیپ کے گلے میں تھوید کی طرح لٹکا
دینے سے کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ دودھ پیتے ہی فوراً آرام کے ساتھ
زور سے قے، جمے ہوئے دہی تھکے کی طرح قے، قے کرنے کے بعد بچہ
کو سستی آ جانا اور کچھ دیر بعد اسی طرح دودھ پلانے سے بھر قے،
ایچھوڑ ۶۱۔ مندرجہ بالا علامات کے ساتھ اگر زبان سفید رہتی ہو تو
انٹ کر وڈ ۶۔ اسی کے ساتھ بدبودار دست آتے ہوں تو کلکیر یا کارب ۳، دودھ
کے ساتھ صفرائی اراں کی طرح بلغم کی قے ہونا۔ اییکاک ۶۔ وراٹرم البم ۶۔

دودھ پیتے کرنے کی بیماری اگر پُرانی ہو تو کریازوٹ ۶۔ ٹیکس و امیکا ۶۔ پلسٹیل
۶۔ ورائٹرم البم ۶۔ وغیرہ دواؤں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

قے یا متلی نہ لگے مابے بچہ کو متلی ہوتی ہے۔ جو کھاتا ہے قے کر دیتا ہے۔
بار بار قے کرنے کی وجہ سے گرم ہو کر خون ٹک کی قے ہو سکتی ہے۔ لگاتار متلی،
اُبکائی کی علامت۔ انیم مارٹ ۶۔ متلی یا قے میں اسکاک ۳ x نہایت سُرخ
خون کی قے ہو تو فاسفورس ۶۔ کالے خون کی قے ہو تو ہیپس امیس ۳ x۔

چوٹ کی وجہ سے قے ہو تو آرناک ۳ x۔ کپڑے کی وجہ سے ہو تو سائنا ۳ x ۲۰۰۔

بچہ کو خون یا خون صفرا آلودہ قے ہونے پر:- پیدائش کے کچھ عرصہ بعد
کسی کسی بچہ کو خون کی قے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچہ کے ناک یا منہ میں زخم
ہونے پر یا ماں کے پستان پر کسی طرح کا زخم رہنے پر، وہ خون پیٹ میں
جا کر کبھی کبھی خون کی قے ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی زور سے قے ہونے پر گرم خون کی قے ہو سکتی ہے۔
جبکہ اُس سُرخ رنگ کے خون کی قے:- ملی فولیم ۱ x۔ متلی یا قے کے ساتھ

جبکہ اُس سُرخ خون آنا۔ اور حقوڑی دیر تک تیز کھانسی ہو تو ایمپاک ۳ x۔ لگاتار

خون کی قے مرگ کار ۶۔ کسی قسم کی چوٹ لگ کر قے ہونے پر آرینیاک ۳ x۔

حقوک کے ساتھ خون آنا اور اس کے ساتھ دل دھڑکنا اور بے ہوشی غیرم ۳ x۔

سفوف، خون کی قے یا خون صفرا آلودہ ملاحظہ ہو:-

کشتی وغیرہ سواری میں گھومنے سے قے، کشتی، جہاز، ریل،

وغیرہ میں گھومنے کے وقت کسی کسی بچہ کو قے ہوتی ہے۔ یا متلی پیدا ہو

جاتی ہے۔ کایولس انڈیکا ۶۔ اس کی اچھی دوا ہے۔

مریض کو لٹا رکھنا چاہئے اور ضرورت پڑنے پر برف کا ٹکڑا چوسنے

کو دینا چاہئے:- کچر کی بھکی:- کبھی کبھی سردی لگنے کی وجہ سے بچوں کو بھکی آنے

لگتی ہے۔ چند قطرے مہری ملا کر پانی یا ٹیکس و امیکا ۳ پلا دینے سے فائدہ

ہوتا ہے۔ بچہ کے بدن پر ہمیشہ گرم کپڑا رکھنا چاہئے۔

دانت نکلنا:- بچہ کو ۶ سے ۱۰ مہینہ کے اندر ہی دانت نکلا کرتے

ہیں۔ پہلے بچے کے مسوڑھے میں، دوپھراؤ پر کے مسوڑھے میں دو۔ اسی طرح

تین سال میں سب دانت نکل آتے ہیں۔ بخار، قبض، تشنج، بے خوابی وغیرہ علامات دانت نکلنے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ ان جملہ علامتوں کی کمیولا ۱۲۔ بہترین دوا ہے۔ بخار ہو تو ایتھرنائٹ ۳۔ زیادہ اسپہال ہو تو کمیولا ۶۔ آنوں ہو تو ملک کار ۶، قبض ہو تو نکس و امیکا ۳۔ اگر ن ہو تو بیلاڈونا ۶۔ دانت نکلنے میں اگر دیر ہو تو ٹیکسیر یا کارب ۳۔ اگشا ۶۔ ساٹنا ۳۳-X-۲۰۔ ایکاک ۶۔ سلفر ۶۔ وغیرہ کی بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مسوڑھے میں اگر سوراخ کر کے دانت باہر نہ نکل سکا ہو تو مسوڑھے تشر دینے سے دانت باہر نکل آتے ہیں۔

دندان :- (CARIOUS TEETH) بے ہوئے دانت نکلنا۔ غذا لاحقہ دانت میں ادھر ادھر لگا رہتا، زیادہ مقدار میں کھٹی یا میٹھی چیزیں کھانا۔ یا بد ہضمی کی وجہ سے دانتوں میں زوال آتا ہے۔ اسی کا نام کیڑے لگنا ہے۔ یا کرم دندان۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دانت میں باہر کے کیڑے لگ کر برباد ہو جاتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ د کرم دندان کے بیان میں فٹ نوٹ ملاحظہ ہو) کمر یا زوٹ ۶۔ ۱۲۔ سٹے فانی سیگریا ۶، مرک سول ۶۔ سلاک ۶۔ اس کی عمدہ دوائیں ہیں۔ کمر یا زوٹ چند قطرے ایک روٹی کے پھائے میں لگا کر ماؤف دانتوں کی جڑ میں لگا دینے سے دانت کا درد کم ہو جاتا ہے۔ غذا کے بعد دانت اچھی طرح صاف کر ڈالنا چاہئے۔ یعنی چاول، روٹی، ترکاری وغیرہ کا حصہ لگانہ نہ رہ جائے۔ اس طرح صاف کر کے منہ دھونا چاہئے۔ بچوں کو چینی، مہری، مسٹھائی وغیرہ میٹھی چیزیں زیادہ کھلانا منع ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم کے موقع پر شکر نہ لینے کی وجہ سے انگلستان کے لڑکے لڑکیوں کے دانت بہت اچھے رہے۔ بچہ کا دانت بیٹھنا :- چوٹ، دھوپ، شینم، یا خراب ہوا لگنا۔ مفر جیروں کا کھانا پینا۔ اخراج وغیرہ اسباب سے بچوں کا دانت الگ جاتا ہے۔ ایسی حالت کا زیادہ عرصہ تک رہنا بہت اندیشہ ناک ہے۔ اسی لئے اس کو جھڑانے کی ترکیب فوراً کرنا چاہئے۔

علاج :- چوٹ کی وجہ سے دانت بیٹھ جانے پر آرکا ۳ x عصب میں
چوٹ لگنے یا جسم کا کوئی حصہ کٹ جانے سے دانت بیٹھ جانے پر بائی پیرکیم x
۲۰۔ موسم سرما میں خشک ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے دانت بیٹھنے پر ایکوٹا
۳۔ مریچھے کی طرف جھک جائے یا جسم ایک طرف جھک جائے تو ساکھوٹا ۶۔
جبرے کی ادھر ادھر رہنے پر جلیسم ۳۔ عصبی کمزوری یا بد ہضمی کی وجہ سے
دانت بیٹھ جانے پر نکس و امیکا ۳۔ اخراج خون کی وجہ سے دانت بیٹھ جانے
پر مہی ملیس x۱۔ اگر بچہ روانہ نکل سکتا ہو تو اس کو دوا سونگھانا چاہئے۔
بچہ کی ناک سُرخ ہونا۔ غذا کے بعد ناک سُرخ ہوا ۱ پس ۳ x
گہرا سُرخ یا سیاہ رنگ ہو تو کاربو و ج ۶۔ نوزامیدہ بچہ کی ناک سُرخ
ہو تو بورکس ۳۔ دینا چاہئے۔ بچہ کی ناک کا ورم۔ بار بار سردی لگنے کی وجہ سے
ناک متورم ہو جاتی ہے۔ کنجٹا ملا دالے مزاج کے بچوں کی ناک اکثر متورم ہوتی
ہے۔ ناک ورم کرنے پر شروع میں مرک سول ۶۔ (خاص کر تپلی رطوبت جاری
رہنے یا ناک کی ہڈیوں میں درد رہنے پر) اگر مرک سول سے فائدہ نہ ہوا
رض کچھ کم ہو جائے تو ہیرسلفر ۶ دینا چاہئے۔
بچہ کی ناک میں زخم۔ سر میں سردی لگنے کی وجہ سے ہمیشہ ناک میں زخم
ہوا کرتا ہے۔ ناک کا زخم بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آسانی سے اچھا نہیں ہوتا۔
گر لفاٹس ۶۔ استعمال کرنا چاہئے۔ اور رات میں سونے کے وقت ناک
میں زیتون کا تیل لگانا چاہئے۔ ناک کے سوراخ میں زخم یا پھسیاں جن میں
مواد بھرا ہوا، یا سٹرنا شروع ہونے میں کیسل بائی ۶۔ دینا
چاہئے۔ ناک کے سوراخ کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے زخم ہونے
پر یا پٹری جمنے پر ناٹھیرک الیڈ ۶۔ ۳۰۔ دینا چاہئے۔
بچہ کی ناک پر مواد بھری پھنسی :- ناک پر پھوڑا۔ پھوٹا پھوڑا یا مواد
بھری پھنسی ہونے پر پیرولیم ۳۰۔ استعمال کرنا چاہئے۔
بچہ کی ناک کی سو جن :- ناک کا بیرونی حصہ متورم ہونے پر (حاد میں)
بیلادونا ۲۔ x دینا چاہئے۔ بیماری مزمن ہونے پر آرم میوور ۳ x۔

اس کتاب میں ورم بینی ملاحظہ ہو۔

بچہ کی ناک کی جڑ میں دباؤ معلوم ہونا :- ناک کی جڑ میں دباؤ معلوم ہونے پر کیلی بانی گروم ۳۔ ناک کی جڑ میں دباؤ کے ساتھ ہی درد ہونے پر کیلیکم ۳۔ کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

بچہ کے ناک کے اگلے حصہ کی بیماری :- ناک سرخ ہونے پر اور کھلنے پر سلا ۶۔ ناک کے اگلے حصہ میں تشنج معلوم ہو، ساتھ ہی کھلنا ہو تو کاربو انیس ۶۔ ناک کے اگلے حصہ میں سوزش اور درد ہو تو الیڈ انریک ۳۔ ناک پر چھوٹی چھوٹی ٹھنکیاں ہونے پر ایمون کارب ۳۔ مواد بھری ٹھنکیاں ہوں تو نیلی بروم ۳ X۔ پھوڑا اور کھچاؤ ہونے میں پورکیس ۳۔ ناک کا اگلا حصہ سرخ اور اس کے ساتھ بخار ہونے پر دماغ کمر شام کے وقت، کیلیکم ۳۔ دینا چاہئے۔

بچہ کی ناک سے خون نکلنا :- بچہ کی ناک سے خون گرنے پر ملی فولیم اس مرض کی اچھی دوا ہے۔ گھونہ مار یا اور کسی طرح کی چوٹ لگنے کی وجہ سے خون نکلنے پر آرناکس ۳۔ مرلیض کے بالکل کمزور ہو جانے کی وجہ سے خون گرنے پر چائنا ۶۔ صبح خون گرنے پر برابو نیا ۳۔ رات کے وقت خون گرنے پر مرک وائی X۶۔ سفوف۔

کسی سخت بیماری دہیے سرسامی خرابی میں، بیچ بیچ میں ناک سے خون گرتا ہے۔ اس طرح خون نکلنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دوا کھلا کر بند کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ دوا کھلانے سے اکثر نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں، ناک سے اخراج خون، ملاحظہ ہو۔

ناک بند ہونا :- ناک کی رطوبت خشک ہو جانے سے کبھی کبھی بچہ کی ناک بند ہو جاتی ہے۔ سانس کی آمد و رفت میں تکلیف ہوتی ہے۔ دودھ پینے اور نیند میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے سانس کی آمد و رفت میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ کبھی سانس سانس کی آواز نکلتی ہے۔ اور کبھی کف نکلتا ہے۔ ناک خشک معلوم ہونے پر ڈنک رام ۳۔ یا سمبوکس ۳،

یانکس و امیکا ۶۔ ناک بند ہو کر کلیجہ میں گھڑ گھڑ آواز ہونے پر انٹرمٹارٹ
۶۔ تلی رطوبت نکلنے کی وجہ سے ناک بند رہنے پر کمیو ملا ۱۲۔ رطوبت بالکل
خشک ہو جانے پر ناک کے اندر اور بالائی حصہ میں خالص سرسوں کا تیل
گرم کر کے ڈالنے سے بلغم تپا ہو جاسکتا ہے۔ یا کوئی سے پیڑی نکال لینے سے
بچہ کو آرام لینے لگتا ہے۔

سردی کی کھانسی :- سردی لگ جانا وغیرہ اسباب سے بچہ کی ناک
سے رطوبت نکلا کرتی ہے۔ کبھی کبھی کھانسی اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ ناک
بند ہو جاتی ہے۔ لڑکا بانہیں لگتا ہے اور دودھ نہیں پی سکتا ہے۔ سینہ
میں سردی لگتا۔ خوفناک بات ہے۔ سردی لگنے کی وجہ سے سردی یا
کھانسی یا اس کے ساتھ بخار ہونے پر کسی دوا دینے کے پہلے ایکونامٹ
۳۳ جلد جلد استعمال کرنا چاہئے۔ خشک کھانسی، سینہ میں درد، زرد
کف لگنا وغیرہ علامات میں برا ایونیا ۳۔ خوب کمزور ہو جانا۔ قے ہونا۔ یا
کف گھڑ گھڑانا اور اس کے ساتھ کھانسی میں انٹرمٹارٹ ۶۔ کشمی کھانسی
میں اور اس کے ساتھ زیادہ بلغم لگنا۔ قے یا متلی، وغیرہ علامت میں ایپاک
۶۔ رطوبت نکلنے رہنے پر میلاٹیل ۶۔ اور ناک بند ہونے کی وجہ
سے دودھ نہ پی سکنے پر نکس و امیکا ۶۔ نکس سے اگر فائدہ نہ
ہو تو سمبوکس ۱۳ X ۳۔ دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سردی لگنے
کی وجہ سے زکام اگر کسی طرح اچھا نہ ہو تو مرکوریس ۶۔ نزلہ گرم کرنے
کی وجہ سے ناک اور ہونٹھ میں زخم ہو تو آرسنک ۶۔ دینا چاہئے۔

امراض آلہ تنفس، اور ہو پ کھانسی، ملاحظہ ہو۔
بچہ کا دمہ :- بہت عرصہ تک زکام اور کھانسی میں مبتلا رہنے
سے دمہ کی علامت ظاہر ہوتی ہے، ایپاک ۳ X ۲۔ لو بے لیاس ۳ X
آرسنک ۳ X ۳۔ سی لے گا ۶۔ اس کی اچھی دوائیں ہیں۔ دمہ ملاحظہ ہو۔
بچہ کے تنفس میں تکلیف :- گاہے گاہے بچہ کو یکایک دمہ یا
کھانسی کی میں تکلیف ہوتی ہے۔ سمبوکس ۱ X ۱۔ کیوپرم ٹیالیم ۶۔

لیکس ۶۔ اور سپائی جلیا ۳۔ اس کی اچھی دوائیں ہیں۔
کالی کھانسی، ادھر دغیرہ کی دوائیں دیکھئے۔

بچہ کا برنگاٹس ۱۔ بخار، کھانسی، درد سینہ، گلے کا سائیں سائیں
کرتا۔ اس مرض کی خاص علامات ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی تنفس کی لیلیوں کی بلغمی جھلی
ماؤف ہو تو اس کو ورم، عروق شعریہ (CAPILLARY BRONCHITIS) کہتے ہیں، یہ
بہت سخت بیماری ہے۔ فرم ۱۲ x سفوف اور برالوینا ۳۔ حاد میں فائدہ کرتی ہیں۔
بیماری مزمن ہو جانے پر ہیرسلفو ۶۔ لائیگوپوڈیم ۱۲۔ انٹیمٹارٹ ۶۔ فائدہ
کرتا ہے۔ ورم عروق شعریہ کی دوائیں ملاحظہ ہوں۔

بچہ کا کمونیا۔ ورم پھیپڑے کے ساتھ کبھی کبھی ہوا کی نالی کا بھی
ورم ہوتا ہے۔ ایسے مونیج پر اسٹن کو برانکو نمونیا کہتے ہیں۔ حاد مرض میں
فرم فاس ۶ x فاسفورس ۶۔ عمدہ دوائیں ہیں۔ کچھ عرصہ تک بیماری میں
بتکار رہنے کے بعد اگر دوا ہوئے کا احتمال ہو تو بیلیم ۳۰۔ ۲۰۰ (ہفتہ میں ایک فورا ک)
دینا چاہئے۔ ورم پھیپڑے کی دوائیں ملاحظہ ہوں۔
بچہ کی پلوریسی۔ پلوریسی کا بیان ملاحظہ ہو۔

خناق مطلق (CROUP) نرخرہ (یعنی لیرکس یا ہوا کی نالی کا بالائی
حصہ) اور ہوا کی نالی (TRACHEA) کے ورم کے ساتھ سانس میں تکلف
سانس روکنے والی کھانسی وغیرہ علامات پیدا ہو جانا۔ اور کبھی کبھی اس کے
حوالی میں نقلی جھلی پیدا ہو جانے کا نام خناق مطلق ہے۔ خناق مطلق دو قسم
ہوتا ہے۔ (۱) نقلی یا کاذب (۲) خلقی۔ خناق مطلق کاذب بچوں کو یکایک
ہو جاسکتا ہے۔ بچہ سویا ہوا ہے۔ یکایک گلے میں سرسراہٹ پیدا
ہو کر نیند کھل گئی۔ اور سانس میں ایک قسم کی سائیں سائیں کی آواز ہو کر
بچہ گھر گھڑانے لگتا ہے۔ یہ مرض بہت خوفناک ہوتا ہے۔ خناق مطلق
خلقی میں شروع میں خشک کھانسی اور بعد میں نشہی خشک کھانسی
ہوتی ہے۔ اس حالت میں بار بار کھانسنے کی وجہ سے گلہ بھٹ جاتا
ہے۔ گلے میں درد ہوتا ہے، جسم اکیبارگی گرم ہو کر مرض کی پوری پوری علامات

پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کھانسی کا آواز کتے کے بچے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ مرض بہت ہی خوفناک ہے۔

(نقلی یا خلقی خاق میں) آواز بیٹھ جانے کے ساتھ کھانسی، کھانستے کھانتے

دم رک جانا، جلد خشک، بے چینی، بخار، تیز پیاس وغیرہ علامت میں ایکونائٹ X۳۔ دس دن منٹ کے وقفہ سے استعمال کرنا چاہئے۔

ایکونائٹ کے استعمال کے بعد مذکورہ بالا علامات میں اکثر کچھ کمی ہو تو سبھی ۳۔ مندرجہ ذیل علامات میں دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے دینا چاہئے۔

کھانستے کھانتے دم رکنے کی وجہ سے آدھی رات میں نیند کھل جائے۔ کھانسنے کے وقت سائیں سائیں کی آواز ہو۔ آواز نہ نکلتی ہو وغیرہ۔

نقلی (کاذب) خاق میں یہ زیادہ فائدہ کرے گا۔ ایکونائٹ اور سبھی کے استعمال سے بیماری کچھ گھٹ جانے پر (یعنی بخار رفع ہو جانے اور کھانسی ترک ہو جانے پر) ہیرسلفور ۴۔ تیشی کھانسی کے لئے سمبوکس X۲۔

اچھی دوا ہے (خاص کر رات کے وقت بچے کی نیند کھل کر ایک سانس رکنے کی حالت ظاہر ہوتی ہو) سانس لینے کے راستے میں نقلی جھلی ٹوٹی ہو کر بچے کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو برومین X۳ ہر پندرہ منٹ پر

استعمال کرنا چاہئے۔ بچے کا گلا پھیلا ہوا، اور سر پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہو تو انٹیم پلارٹ ۲ دینا چاہئے۔ یہ نہایت مفید اور کارآمد ہے۔

بلاڈونا ۳۔ (خشک تکلیف دہ کھانسی، چہرہ تھمایا۔ آنکھیں سرخ، نبض پر اور سخت) فاسفورس ۴۔ آواز بیٹھی، درد، مرض کے حملہ

کے وقت بہت دیر بعد کف نکلا، کاسٹیکم ۴۔ (کھانسی سینہ میں درد یا تشنج، آواز بیٹھی یا غائب) آلوڈیم ۴۔ (حوالیہ نخرہ میں درد، بہت تکلیف دہ خشک کھانسی۔ کھانستے وقت بچے کو کس کس پر

لیٹا ہو۔ سانس میں تکلیف، گلے کا سائیں سائیں کرنا) وغیرہ۔ دوائیں کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہیں، کبھی جھلی میں دم ہو جاتا ہے۔ اس وقت

خاق (DIPHTHERIA) (ڈیفٹیریا) مرض کے دواؤں میں سے

دوا کا انتخاب کرنا چاہئے۔

ڈاکٹر سٹرن فرماتے ہیں کہ کیلک فاس (۳۰ x ۱۲) کیلک سلف ۱۲ x ۳۰۔
اور فرم فاس ۱۲ x ۳۰۔ یکے بعد دیگرے آدھ گھنٹہ کے وقفہ سے استعمال
کرنے پر، غلطی خفاق مطلق، کو آرام ہو جاتا ہے۔ ان کے خیال سے فرم فاس
۱۲ x سفوف ۲۰۰ اور کیلک سیور ۱۲ x سفوف ۳۰۔ دیکے بعد دیگرے
استعمال کرنا، نقلی خفاق مطلق، مرض کی خاص دوا ہے۔

(VIDE C.S. SAUNDER'S BIOCHEMICAL MEDICINES. P. 41-42)

نفس کے وقت گرم پانی اس کے بید پانی کا اراروٹ، پانی کی بارگاہ، دودھ،
وغیرہ ہلکی غذا۔ بچہ کو کبھی اٹھا کر پیٹا دینے کی کوشش نہ کرنا چاہئے۔
زچہ کے کھانے پینے پر خاص نظر رکھنا چاہئے۔ دوسری دواؤں اور
حال کے لئے نظام اعصابی کے امراض کے باب میں گلے کی نالی کا تشیخ،
یا خفاق مطلق ملاحظہ ہو۔

بچہ کا تھی غدیہ بھی ملاحظہ ہو۔

بچہ کے پھیپھڑے کی رسل: آج کل کے مسالحوں کی رائے سے
اں باب کی وجہ سے بچہ میں یہ بیماری نہیں آتی۔ لیکن یہ بلاشبہ قرار پایا ہے
کہ مرض رسل کا ہونا خاندانی ہے۔ کبھی بھی نمونیا بھی رسل میں تبدیل ہو جاتا
ہے۔ بچہ کا نمونیا اور رسل ملاحظہ ہو۔

کالی کھانسی (WOODPING COUGH) یہ بچہ کی ایک قسم کی جھوت دار
کھانسی ہے اس کھانسی کے زور کے وقت سانس کھینچنے میں، ہوب کی
آواز ہوتی ہے۔ مرض تین چار ہفتہ سے چھ ماہ تک رہ سکتا ہے۔ بہت
عرصہ تک اس میں مبتلا رہنے سے بچہ کو رسل کی کھانسی ہو جانے کا
اندیشہ رہتا ہے۔ دوسری دوا دینے کے لیے (PERTUSSIN) پرنٹوسن
۳۰ دن میں تین بار مرتبہ دینا چاہئے۔ اگر اس دوا سے ایک ہفتہ میں
فائدہ نہ ہو تو آفامس ۳۰ x ہر دو گھنٹہ پر استعمال کرنے سے فائدہ ہو جاتا
ہے۔ جلد جلد اور ساکت ہوتے، زرد کف نکلتا۔ تکلیف دہ کھانسی

آواز بیٹھنی رات میں (خاص کر آدھی رات کے بعد) مرض بڑھنے کے علامت
 ڈرا سپر ۳۱-X زیادہ تشنج ہونے پر کیویرم ۶-۱ ایکاک ۶-۱ لفیٹے لن ۳۱-X
 سفوف بیلڈونا ۳-۱ ہائیڈروسیانک انسٹ ۳۱-X یا انیم ٹارٹ ۶-۱ کی
 بھی بیچ بیچ میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھی طرح علاج نہ ہونے کی وجہ سے
 اگر کالی کھانسی، نمونیا، دہنہ، اسل وغیرہ میں تبدیل ہو جائے تو اس
 مرض اور امراض تنفس کی بیماری ملاحظہ ہو۔

بچہ کا دفیقیر یا:- گلے کے اندر کا زخم۔ تالو کے دونوں جانب غدد
 (TONSIL) آٹاس کرنا۔ اور اس پر سفید پردہ پڑ جانا۔ نگلنے اور سانس
 لینے میں تکلیف، تیز بخار وغیرہ علامات نمودار ہونے پر اسی وقت ہوشیار
 معالج کا مشورہ لینا چاہئے۔ جب تک ڈاکٹر نہ آجائے تب تک مکیوورس
 سائینس ۶-۱ ہر دو گھنٹہ پر استعمال کرنا چاہئے، ورم جھلی دیکھئے۔

بھوک نہ لگنا:- بہت زیادہ لفیل چیزیں کھانا۔ کھانے کے بعد ہی
 سو جانا۔ زیادہ استعمال کرنا۔ محنت بالکل نہ کرنا۔ کاپلوں کی طرح دن
 کاٹنا۔ ہمیشہ رات میں جاگنا۔ مفر صحت کی جگہ میں رہنا وغیرہ مختلف اسباب
 سے لڑکے، لڑکیوں کو سوسہضمی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نکسی و امیکا ۱-۱-۱-۱
 اس کی اچھی دوا ہے۔ ٹیس ۳-۱ کاربووج ۳۱-X سفوف، کیوولا ۱۲-۱ انیم کروڈ
 ۶-۱ سلفر ۳-۱ جینا لوتھین ۳۱-X وغیرہ کی وقتاً فوقتاً ضرورت ہو سکتی ہے۔

بھوک کا ہوکا:- پیٹ میں کرم ہونا۔ ماحہ کی خرابی وغیرہ اسباب
 سے بچہ کو بہت بھوک لگا کرتی ہے۔ کرم کی وجہ سے زیادہ بھوک لگتی ہو تو
 سائینس ۳۱-X پیٹ بھرا رہنے سے بھوک کا ہوکا ہو تو سٹے قانی سنگیریا ۶-۱

غذائے بعد بھوک لگتی ہو تو لایکو ۳۱-X یا چائنا ۳۱-X دینا چاہئے۔

بچہ کا قبض:- حمل میں ماں کو قبض۔ کھانے پینے کی خرابی۔ ماں کا دودھ
 نہ پنی کر گائے کا دودھ پینے یا جگر کے فعل کی خرابی سے بچہ کو قبض ہو
 سکتا ہے۔ برالیو نیا ۳۱-X یا ایلو مینا ۶-۱ اس کی اچھی دوا ہے۔
 کھانے کے بعد ہی قے ہو جانے پر برالیو نیا، خوب کام کرتا ہے (کھائی ہوئی

جزروں کا جزلا ہوا سفید رنگ کا سخت براز، قبض کی وجہ سے ہر روز
 بچہ ڈبلا ہوتا جاتا تو کلکیر یا کارب ۶۔ سخت براز بہت تکلیف سے بھڑکا
 نکلنے پر۔ ریاخ کی وجہ سے رگڑ گڑنے پر لایکو پوڈیم ۳۔ پیٹ میں اینٹھن
 یا نفخ شکم، موٹا لمبا لینڈ بہت تکلیف سے نکلتا۔ علامت میں نکس و امیکا
 ۳۔ اسپہال کے بعد یا قلاب لینے کے بعد قبض اور اُسی کی وجہ سے گرہ گرہ
 یا خانہ ہونا اوپم ۳۰۔ قبض کا مزاج ہو تو بچہ بیچ میں سلفو ۳۰۔ کسی دوا
 سے بھی فائدہ نہ ہو۔ نفخ شکم ہو۔ براز سخت اور سرخ رنگ کے علامات
 میں بلیم ۶۔ معدہ کی خرابی اور زبان پر سفید تہہ ہونے پر انٹروڈ ۳۰۔
 دودھ پلانے والی کو پلکی چیز کھانی چاہئیں۔ ضرورت پڑنے پر کلیرین سے
 ساتھ گرم پانی کی پتی بھی پچہ کے مقعد میں لگا دینے پر آسانی سے پافانہ
 ہو جاتا ہے۔ نفخ شکم کی وجہ سے بہت تکلیف ہونے پر پانچ چھ قطرے
 روغن تارپین بچہ کے پیٹ پر عطر کمر انگلی سے رگڑنے پر یا کتا جھری کا
 پتہ پیس کے مقعد پر لپیٹ کر دینے سے آسانی سے پافانہ ہو جاتا ہے۔
 بچہ کے پیٹ میں اینٹھن :- ماں کے کھانسنے سے بچہ کی خرابی سے
 بچہ کا زیادہ گائے کا دودھ پینا۔ سردی لگنا یا گرمی کی وجہ سے۔
 پیٹ میں اینٹھن ہونے کی وجہ سے بچہ رہ رہ کر رو اُکھتا ہے۔ پیٹ سخت
 اور اُسی وجہ سے بچہ بے عین رہتا ہو۔ اور کھٹنے پیٹ پر رکھنا چاہتا
 ہو۔ ہمیشہ گود میں رہنا چاہتا ہو۔ سبز رنگ کا تیلادست اور ہاتھ و پیر
 ٹھنڈے ہوں تو کیو ملا ۱۲ x۔ بچہ اجابت کی کوشش کرتا ہو لیکن
 ریاخ خارج ہوتی ہو۔ اور پافانہ نہ ہوتا ہو (یا براز بہت کم ہو)
 اور گرم رہنے پر ساکتا ۳ x۔ فائدہ کر تلے۔ روز ایک ہی وقت پر
 اینٹھن ہونے میں چائنا ۶۔ سبز دست۔ مڑاید بوار ترش یا بھنگ کے ٹوٹے
 کی طرح نان کے چاروں طرف اینٹھن، تے، مٹی کے علامات میں اپناک ۳۰۔
 اجابت رکھنے کی وجہ سے اینٹھن یا ناف کے بالائی حصہ کے علامات میں
 نکس و امیکا ۳۰۔ دانت نکلنے کے وقت ہیفہ کی طرح دست اور ساتھ ہی

پلاس رہنے پر کیمفور و اسڈس x سفوف بھی فائدہ کرتا ہے۔ ثقیل چیزوں کے کھانے کی وجہ سے پیٹ میں اینٹھن ہونے پر گائے کا دودھ پلانا مناسب نہیں ہے۔ یقیناً جو اسن کپڑے میں باندھ کر گرم کر کے ناف اور جس کے ارد گرد سینکے سے فائدہ ہوتا ہے۔

بچہ کا قولنجی درد۔ بچہ کے ناف کے چاروں طرف ٹھہر ٹھہر کر بہت تکلیف دہ اینٹھن یا کھنچاؤ ہونے کا نام قولنجی درد ہے۔ کھٹی چیزیں کھانا، ککڑی، سرف، خراب دودھ، زیادہ کڑا، یا کڑوا کھانا، کرم رہنا وغیرہ سے بچوں کو یہ تیز قولنجی درد ہوا کرتا ہے۔ قولنجی درد مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جیسے درد تیز ابیت، ریاحی قولنج، صفراوی قولنج، قولنج وغیرہ۔

(۱) غذا کھانے کے تین چار گھنٹہ بعد غذا کھٹی ہو کر تے ہو جانا۔ اس کے بعد کلیجہ پر اور سینہ میں جلن۔ پیٹ میں خونا کا درد وغیرہ کا نام تیز ابی قولنج ہے۔ بیماری نرس ہو جانے پر ترشش تے نہیں ہوتی۔ پیٹ میں تیز درد ہوتا ہے۔ ٹیکسیلا ۶، نکس و امیکا ۳، کالوسنٹھ ۶۔ الیڈسلف ۳ x۔ تیز ابی قولنج کی اچھی دوائیں ہیں۔

(۲) پیٹ میں زیادہ ریاح کھٹی ہو جانے کی وجہ سے پیٹ میں بہت درد ہوا کرتا ہے، اسے ریاحی قولنج کہتے ہیں۔ نکس و امیکا ۳۔ چائنا ۶۔ بیلادونا ۳۔ کیمولا ۶۔ کالوسنٹھ ۶۔ اس کی مخصوص دوائیں ہیں۔

(۳) جگر سے چھوٹے چھوٹے صفرا کے ٹکڑے آنٹوں میں اترنے سے جگر میں بہت درد، اور صفراوی تے ہونے کا نام، صفراوی قولنج ہے، ابراویٹا ۳۔ نکس و امیکا ۳۔ چائنا ۶۔ امیکا ۳ x وغیرہ، صفراوی قولنج میں فائدہ کرتی ہیں۔

(۴) بہت دنوں تک سینہ (LEAD) سے کام کرنے پر پیٹ، سینہ اور دونوں ہاتھوں میں بہت درد ہوتا ہے، اسی کا نام سسین، قولنج ہے۔ اوپیم x ۳۔ کا استعمال اور پیٹ پر گرم پانی سے سینکے سے یہ اچھا ہوتا ہے۔

(۵) کرم کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف دہ درد ہو تو ساٹنا ۲x یا من لوئاس ۱x سفوف سے فائدہ ہوتا ہے۔ (اس کتاب کا قونی نسخہ درد کی دوائیں ہیں)
 بچہ کا ورم زائدہ ۵۔ مرض ورم زائدہ (انڈکس کا ورم) ملاحظہ ہو۔
 موجودہ زمانہ میں امریکہ کے بہت سے بچوں کا زائدہ کاٹ ڈالا جاتا ہے۔
 لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے اتنی خوبی کی بات نہیں ہے بیکس ۶۔
 دو گھنٹہ کے وقفہ سے استعمال کرنے سے تعجب خیز فائدہ ہوتا ہے۔

DR. KOPP IN THE HDM. WORLD. DECEMBER 1911

بچہ کا اسہال :- ثقیل چیزیں کھانا کرم ہونا یا دانت نکلنا وغیرہ۔
 اسباب سے اسہال ہوتا ہے۔ اگر سردی لگ کر اسہال ہوتا ہو اور اس کے
 ساتھ ہی بخار ہو تو ایکوٹائٹ ۱۳x دینا چاہئے۔ ثقیل چیزوں کے کھانے سے
 اسہال ہو تو پلساٹیل ۶۔ دانت نکلنے وقت یا سردی لگ کر اسہال ہو،
 خاص کر بچہ کا جگر مزاج ہونے پر، کمیولا ۶۔ اسہال کے ساتھ ہی
 متلی یا قے ہو تو ایپاک ۱۳x۔ نفخ شکم کی وجہ سے تکلیف۔ ناف کے چاروں
 طرف پیڑوں میں انقبض، چہرہ اسرا ہوا، لکڑی کی علامت میں پلساٹیل ۱۰۔
 پیٹ میں انقبض کی وجہ سے آگے کی طرف جھکنا، کالوسنتہ ۶۔ پیٹ کے
 درد سے بچہ بے چین ہو جائے اور اس کا سبب سمجھ میں نہ آئے تو
 مگنیشیا فاس ۱۲x۔ سفوف (گرم پانی کے ساتھ) استعمال کرنا چاہئے، تبرش
 بدبودار، سہلہ یا لیسار زیادہ مقدار میں غلیظ نکلنا۔ اور پیٹ میں انقبض
 ہو تو ریوم ۱۰۔ (خاص کر دانت نکلنے وقت) کیتھرٹک طرح دست اور پیاس
 رہنے پر مرکوریس۔ ڈال سس ۶۔ آنوں خون غلا دست (مرک کار) چاول
 کے بیج (دھون) کی طرح دست ہو تو ورٹرام البم ۶۔ کلکیر یا کارب ۱۰۔ کاربونیٹ
 ۱۰۔ گی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ مزمن اسہال میں آرسنک ۱۰۔ سلفر
 ۱۰۔ امرتس اسہال اور بچش ملاحظہ ہو۔

سوسم گرمی میں بچہ کا اسہال بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ بڑی ہوشیاری
 سے اس کا علاج کرنا چاہئے۔ ایک قسم کے نباتاتی جرم شاید اس بیماری کا خاص

باعث ہیں۔ مریض کے براز میں یہ دکھائی دیتے ہیں۔ لکھیوں سے زیادہ فیصلی ہے۔ جس سے بچہ کے جسم پر دھواں گرنا اور منہ میں لکھیاں نہ بیٹھنے یا کس۔ اس کا انتظام گرمی سے ہے۔

بچہ تیزی سے مریض ہے۔ غذا کے بعد ہی پیٹ میں سردی معلوم ہوتا ہے۔ ہلکی آنا۔ ہلکی بند ہونے پر پیٹ میں انقباض، پیٹ میں گرمی، اس کے بالکل ہی سہم نہ ہوتا۔ براز کبھی خوب تیز اور کبھی سخت۔ اس کے علاوہ خوب کھوکھ اور پیاس۔ مریض کا آہستہ آہستہ دبلا اور کمزور ہوتا۔ اور تشکر رہتا اور پافاٹہ ہونا وغیرہ اس بیماری کے مخصوص علامات ہیں۔ جلد نہ سہم ہونیوالی چیزیں کھانا۔ زیادہ دوا استعمال کرنا، ترنگہ میں رہنا۔ وغیرہ اسباب سے بیماری ہوتی ہے۔ آرٹک ۶۔ یا چائنا ۶۔ اس بیماری کی بھی اعلیٰ ترین دوائیں ہیں۔ اولینڈر ۳۔ ٹکس و امیکا ۳۔ ادرسلفر ۳۔ کی بھی درمیان میں ضرورت ہو سکتی ہے۔ منہ میں پانی بھر آنا۔ خوب ثقیل چیزیں کھانا۔ بہت گرم یا بہت ٹھنڈا پانی پینا۔ فاقہ کرنا، پیٹ میں گرم رہنا، وغیرہ اسباب سے بچوں کے منہ میں پانی بھر آیا کرتا ہے، ٹکس و امیکا ۳، ٹکس ۳۔ کیلی کارب ۶۔ آرٹس ۳۔ کاربوونج ۳۔ سفوف ۶۔ الٹیشیا ۶۔ سلفر ۳۔ اس کی مخصوص دوائیں ہیں۔ گرم کی وجہ سے ہمیشہ منہ میں پانی بھر آنے پر ساٹا ۱۲ x ۲۰۰ مرض منہ میں پانی بھر آنا ملاحظہ ہو۔

ورم الامعاء (ENTERITIS)

جارا بخار۔ تار کی طرح تیز نبض، پیاس، تیز یا آبکائی، پیٹ میں تیز درد، دھواں کے چاروں طرف، گھٹا ہمیشہ اوچھا رکھنا۔ فیض یا اسہال ہونے پر سمجھنا چاہیے کہ بچوں کا ورم الامعاء ہوا ہے۔ سردی لگنا۔ غذا کی خرابی، دست آور دوا کا استعمال، گرم کی خرابی وغیرہ اس بیماری کے سبب ہونے کے اسباب ہیں۔ مرض شروع ہوتے ہی دھواں سردی لگ کر بخار وغیرہ ہونے پر ایکو نائٹ ۳ x سفوف، ناف کے چاروں طرف سوزش درد، تیز تیز غشی وغیرہ علامات میں آرٹک ۳ x ۳۔ سفراوی تے۔ پیٹ

بھول کی طرح بھولنا۔ پیٹ میں تیز درد وغیرہ علامات میں کالوسٹھ ۳۰۔
 پیٹ میں سخت درد لقمہ، اور تشنہ، کانکھنا، آنکھوں میں بخونی دست وغیرہ علامات
 میں مرک کار ۶۔ اسہال اور سرقان میں یوڈو فالکلم ۶۔ مرض مزمن میں آرج تانی
 ۶۔ پیٹ پر گرم پانی سے سینکنا اور ہلکی غذا دینا مناسب ہے۔

ورم الامعاء ملاحظہ ہو

بچہ کا ہیضہ:- یکایک پانی کی طرح تپلا، سبز، یا درد کبھی کبھی لیدار
 یا خون پلا یا بد ہضمی کا، دست، دودھ وغیرہ کی تھ، سختی، بسم گرم۔
 سینکنا ہاتھ پر ٹھنڈے، وغیرہ۔ بچوں کے ہیضہ کی خاص علامت ہے یہ
 بہت سخت بیماری ہے۔ ایتھوزا ۶۔ ۳۰۔ اس کی بہت اچھی دوا ہے۔
 زیادہ بدبو دار دست، اور صبح بیماری کی زیادتی۔ یوڈو فالکلم ۶۔ جسم نیلا
 برف کی طرح سرد، سر ہلکا، تشنہ، یا اکٹرن، ہچکی یا ہاتھ پیر کی انگلی کا خود
 بخود ہلکے رہنا۔ سختی وغیرہ۔ سر میں کئی خون کی دھبے سے پیدا ہونی خرابیاں
 کیلی برویلیم ۳۰ x سفوف، ایکونائٹ ۳۰۔ کروٹن ۳۰۔ کمیوٹا ۶۔ آرسنک ۳۰۔
 یا کلکیر یا الیٹا ۳۰ سفوف، کاربووج ۳۰۔ اپیکاک ۶۔ فاسفورس ۶۔ چائنا
 ۳۰۔ وراٹوم ۶۔ کمیو پرم ۶۔ کمیو پرم آرس ۳۰ x سفوف، سیکیل ۶۔ سلفر ۳۰۔
 روہنی کا اسپرٹ کمیوٹ کی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی کو
 ہلکی غذا اور ارا روٹ وغیرہ دینا چاہئے۔ غذا اور دوسری دواؤں کے لئے
 ہیضہ اور بچہ کا اسہال دیکھنا چاہئے۔ اس خوفناک مرض کے پورے علم کیلئے

ہمارا ہیضہ اور اس کا علاج، کا تیسرا مقصد ملاحظہ ہو۔

بچہ کے کرم کی خرابی:- بچوں کے لئے کرم بہت نقصان پہنچانے
 والی چیز ہے۔ پانی میں نمک ملا کر یا پیکاری دینے سے بچوں کے چھوٹے
 کرم اکثر پیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اگر اس سے کرب سے بیماری اچھی نہ ہو
 تو کرم، کتے باب سے دو منتخب کرم کے بچہ کو دینا چاہئے۔ کرم کی خرابی رہنے پر
 بچہ کو بخار، ہیضہ وغیرہ بیماریاں اور پیش اکثر سخت اور خراب مرض ہو جاتا
 ہے۔ اس بات کو بچہ کے پرورش کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہئے۔

بچہ کو پیشاب کی بیماری: کسی کسی بچہ کو پیشاب وزن اور گنتی میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سیر دو سیر تک ہو جاتا ہے۔ اور ہر گھنٹہ ایک یا دو مرتبہ پیشاب ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو اچھی طرح سے نیند نہیں دینے پاتی۔ اور جسم بالکل خون سے خالی زرد پڑ جاتا ہے۔ اس کا واس ۶ X ۲ اور یورینیم، ٹائیٹرکیم، ٹائیٹرکیم ۳۔ سفوف، اس بیماری کی بہترین دوا۔ نیند میں پیشاب:۔ اعصابی تحریک کرم کی خرابی وغیرہ اسباب سے مشابہ میں پیشاب روکنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور بچہ نیند کی حالت میں بے خبری سے پیشاب کر دیتا ہے، کرم کی وجہ سے ہو تو سا ۲۰۰ X ۲ (خاص کر اگر کچھ دیر رکھنے پر پیشاب دودھ کی طرح ہو جائے) گہری نیند، بیلا ڈوتا، دن یا رات میں پیشاب روکنے کے ناقابل، یا پیشاب کے وقت دیکھنے پر ایکویسیٹم ۶-۹۔ دن رات میں پیشاب روکنے کی نااہلیت، جلسیم ۳ X ۳۔ پیشاب میں زیادہ بدبو ہو تو بن زونیک ایڈر ۳ X ۳۔ پیشاب میں یورک ایکسڈرینے پر لایکو ۶۔ میولن آئل اس کی اچھی اور مشہور دوا ہے۔ رات میں بچہ کو درمیان میں جگا کر پیشاب کرانے سے بغیر کسی دوا کے ہی یہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔

پیشاب بند:۔ نوزائیدہ بچہ کو اگر پیدائش سے چوبیس گھنٹہ کے اندر پیشاب نہ ہو تو گھبرا کر کسی دوا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر چھتیس گھنٹہ تک پیشاب نہ ہو تو اور بچہ بے چین ہو تو ایکونائٹ ۳۔ ایک دو خود اک دینا چاہیے، بیلا ڈونا ۶۔ کینتھر ۴، یا ادیم ۲ کی بی بی بیج میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کچھ زیادہ عمر کے بچوں کو بھی کبھی کبھی پیشاب نہ ہو کر انکی پیشاب کی جگہ پھول اکھٹا ہے۔ یا کرم ہو جاتی ہے۔ اور وہ تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے۔ نیچے کا پیٹ (پیٹرو) گرم پانی سے سینک دینے سے پیشاب ہو سکتا ہے اس سے فائدہ نہ ہو تو اجنٹا س بول، اور عسل الہون، یعنی پیشاب بند ہونا، ملاحظہ ہو۔

خون کا پیشاب:۔ چونکہ بوائے، بچہ، بچہ وغیرہ بیماریوں میں کبھی کبھی خون کا پیشاب ہو کر تھکے کینتھر ۴۔ کینتھر ۳ X ۳۔ اور ملی فریم ۱۰ X ۱۔ اس کی اچھی

دوائیں ہیں، اگر نے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے خون کا پیشاب ہونے پر آرزو کا ۲۳-
سیاہ خون کا پیشاب ہو تو بھی میلس ۲۳- استعمال کرنا چاہیے۔

خراب پیشاب

(الف) پیشاب کا رنگ خراب ہونا: پیشاب کا رنگ سیاہ ہونے پر
کوچکیم ۶- پیشاب کا رنگ گہرا سیاہ یا خاکی ہونے پر اے پس ۶- یا ٹرنٹھنا ۶-
یا کنٹھرس ۶-، پیشاب خوب گندلا ہونے پر بیلاڈوتا ۶-، کنیم سلف ۶-، سائنا ۲۰-
۸۰-، لائیگو پوڈیم ۱۲-، ایڈ فاس ۶- یا ٹری بنتھنا ۶-۔ پیشاب کا رنگ زرد ہونے
پر سیانو تھس ۲۳-، گرم کی وجہ سے سفید رنگ کا پیشاب ہونے پر سائنا-
۲۰۰ ۲۳-، پیشاب کا رنگ محلول کھریا یا دودھ کی طرح ہونے پر سائنا-
۲۰۰ ۲۳-، ایڈ فاس یا دایو لارڈ ۲۳-، پیشاب سیاہ رنگ ہونے پر-
ایکو: اسٹ ۳-، اے پس ۶-، بیلاڈوتا ۶-، براؤنیا ۶-، کنٹھرس ۶-، یا ٹری بنتھنا ۶-
زرد رنگ کے پیشاب ہونے پر، سیانو تھس ۲۳-، کیو ملا ۶-، کیلی فاس ۱۲-
سفوف۔ پیشاب میلا ہونے پر، ٹری بنتھنا ۶-، یا بنرک ایڈ ۶-، پیشاب
گاڑھا ہو تو بنرک ایڈ ۶-، کنیمفر ۳-، ہیرسلف، مرک سول ۶-، یا فاسفورس ۶-
(ب) پیشاب میں بدبو، پیشاب سٹرا ہوا بدبو ہونے پر بنز ویک ایڈ ۶-
لائیگو ۱۲-، نائٹرک ایڈ ۳-، سیبا ۶-، مچھلی کے دھون کے پانی کی بدبو ہو تو
یورین نائی ۳-، لہسن کی بدبو ہو تو کیو بریم آرس ۶-، تیز بدبو ہو تو نائٹرک ایڈ
۳۰-، بنز ویک ایڈ ۶-، بوریکس ۶-، کنیم سلف ۶-، سلفر ۳-، بی کے پیشاب کی
طرح بدبو ہو تو نائٹرک ایڈ ۳-، یا بنز ویک ایڈ ۶-، کھٹی بو ہو تو کلکیر یا-
کارب ۳۰-، یا گریفائٹس ۳۰-، میھی ہو تو ٹیرب ۶-۔

(ج) پیشاب کے نیچے لچھٹ، صفراوی پیشاب ہونے پر، چلی ڈونیم ۳۰-، بنرک سلف
۳۰-، سفوف (جگر کی بیماری ملاحظہ ہو)۔

پیشاب کے نیچے سرخ تہہ نشیں ہو تو مرک کار ۶-، فاسفورس ۶-، پلیم ۶-، ٹرے
بنتھنا ۶-، کنٹھرس ۶-، لائیگو پوڈیم ۱۲-، (سرخ رنگ کا پیشاب ملاحظہ ہو)۔
پیشاب میں کافی کے سفوف کی طرح کچھ تہہ نشیں ہونے پر ٹیرب ۶-، یا میلی بورس

پیشاب یعنی لئی کی طرح ہو تو ایڈ فاس ۶؛ کینتھرس ۶۔ پیاٹیل ۳۔ یا سارسا
پر ۳۔ پیشاب میں لینتھک ایڈ یا اینٹ کے سفوف کی طرح تہ نشیں ہو تو
لائیکو پوڈیم ۳۔ نائٹریک ایڈ ۳۔ یا کس و امیکا ۳۔ (رنگ متانہ ملاحظہ ہو)۔
سفید چیز تہ نشیں ہونے پر اور اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہننے پر ایکز الگ
ایڈ ۶۔ یا گریفائٹس ۳۔ نہایت مفید و کار آمد ثابت ہوا ہے۔

بچے کا جگر :- بار بار (خاصکرات کے آخری حصہ میں بخار) ہونے

پر اگر بچہ ڈبلا ہوتا جائے اور اس میں جگر کی خرابی ہو اور جلد جگر بڑھ جائے
اور سخت ہو جائے اس کے بعد غذا سے نفرت، پیٹ بڑھا ہوا، قبض یا پتلے
(پاخانہ کارنگ سفید یا سیاہ اور آنوں یا خون ملا)۔ یرقان تمام جسم کا زرد
ہو جاتا۔ دغیرہ علامات بد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر دو برس سے بھی کم
عمر کے بچوں کو بھی یہ بیماری ہو جائے تو بڑے خوف کی بات ہے۔ اور
نہایت ہوشیاری سے اس کا علاج کرانا چاہیے؛ کلیر یا آرس ۳۔ اس
بیماری کی خاص دوا ہے۔ قبض میں سلفر ۳۔ یا کلیر یا کارب ۶۔ پتلے دست

آنے پر پوڈو فاکٹم ۶؛ جگر سخت رہنے پر مرک آئوڈ ۳۔ یا کلیر یا کارب ۶۔
یرقان میں مرک سول ۶؛ منہ میں زخم نائٹریک ایڈ ۶۔ تکلیف دہ کھانسی
فاسفورس ۶۔ بچہ بہت ڈبلا ہو جائے تو آرج نائی ۶۔ سوچن (استسقا) ہو تو
آرس ۶۔ دینا چاہیے۔ سلفر ۳۔ کس و امیکا ۶؛ براؤنیا ۶۔ وغیرہ دواؤں
کی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ غذا کی طرف زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔

دودھ بالکل منع ہے۔ پانی کی باری دینا چاہیے۔ دودھ پلانیوالی
اگر تیزابیت کی بیماری نہ ہو یا پستان کا دودھ نہ بگڑ گیا ہو تو
بزج بیچ میں اس کا تھوڑا دودھ پلانا چاہیے۔ گائے کے چھوٹے بچہ
کا گوہر یا پیشاب گرم کر کے جگر پر سینک دینا اچھا ہے۔ ورم جگر یرقان
آماس، اور (استسقا) اور بچہ کا یرقان ملاحظہ ہو، اگر پورن ساسی اور آماں
کو بیماری برابر ترقی کرتی جائے تو سلکا ۶۔ ۲۰۰ دینا چاہیے۔ بچہ
کو یا اس کی دودھ پلانے والی کو چونہ کا پانی نہ پلایا جائے اور دودھ

پلانے والی کو بھی پان کے ساتھ چونہ کھانا چاہیے۔

بچہ کا رونا :- بچہ روتا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بیماری یا کسی طرح کی تکلیف ہے۔ اس کو دریافت کرنا ضروری ہے کہ بچہ کس وجہ سے رورہا ہے۔ روتے وقت اگر کان پر ہاتھ لگائے تو کان کی بیماری، مسخہ میں انگلی ڈال کر روتا ہو تو دانت نکلنے کی تکلیف، گھٹنے سکڑ کر پیٹ پر رکھا ہو تو پیٹ کا تشخ، سخت آواز سے روتا ہو تو زرخہ میں تکلیف۔ کھانتے کھانتے زور پڑے تو سینہ کی بیماری، بہت چیخ کر روتا ہے تو پھیپھڑے کی بیماری ہوگئی ہے، کبھی کبھی چیونٹی کاٹنے کی وجہ سے بھی بچہ تکلیف سے پریشان ہو کر یکایک رو پڑتا ہے۔ گرم خشک جسم اور بہت بھینپی اور نیند نہ آنے کے علامات میں ایکونائٹ ۳-X۔ سرگرم آنکھیں اور چہرہ سرخ یکایک چونک پڑنے کے علامات میں بیلا رونا ۶۔ بچہ کی چرچرٹی عادت، برابر روتے رہنا۔ گود میں، گھومنے کی خواہش، پیٹ میں انٹیمیں کی وجہ سے گھٹنے سکڑے رہنا۔ اور بخار رہنے پر کیومولا ۶ (خاص کر دانت نکلنے کے وقت۔ بچہ بہت قسم کی بیماریوں کی وجہ سے رویا کرتا ہو)۔ اس حالت میں کیومولا سے فائدہ نہ ہو تو ایون کا تیفرا ایک دو قطرہ دیا جاسکتا ہے۔ اعصابی تحریک کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو کافی ۶۔ قبض یا نفخ شکم کی وجہ سے بچہ روتا ہو، اور بے چین ہو تو میکنیشیا فاس ۶-X۔ سفوف۔ (گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے)۔ بہت عرصہ تک نہ نہلانے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اس وجہ سے بچہ روتا ہو تو درمیان میں بچہ کو تیل کی مالش کر کے نہلا دینا چاہیے۔ رونا بند کرنے کے لیے بچہ کو کوئی دوا افیون ملی نہ کھلانا چاہیے۔ ایسی دوائیں دینے سے بچہ ضرور ہی سو جاتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ خراب ہوتا ہے۔

بچہ کا سیلان الرحم :- سردی لگنا، گندہ رکھنا۔ کرم کی خرابی وغیرہ اسباب سے چھوٹی لڑکیوں کو سیلان الرحم ہو جاتا ہے۔ بکلیر یا کارب ۶۔ ساٹا ۳-X۔ اس بیماری کی خاص دوائیں ہیں (مشرح حال کیلئے اس کتاب میں مرض سیلان الرحم ملاحظہ ہو۔

بچہ کا۔ قاعدہ نشود سما پانا۔ بچہ کبھی بے طرح لمبا ہوتا ہے یا صرف اس کے سینہ لمبا ہی بڑھتی ہے۔ ہمیشہ سونے کی زیر دست خواہش ہوتی ہے، قوت ہضمی اور یادداشت گھٹ جاتی ہے، چل نہیں سکتا۔ دُ بلا پن۔ سانس میں تکلیف۔ یکدم دھڑکنے وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں، پائیس سل پٹریس ۴-۳۰۔ (خاص کر زیریں حصہ جسم دُ بلا اور گھٹنے کمزور ہونے پر نیز نقرس، کھجلا ہٹ وغیرہ علامات میں) سلفر ۳۰۔ (باتھ پیر کمزور، تپلے کھیلنے یا چلنے میں کمزور) کلک فاس ۱۲۔ سفوف؛ کلک کارب ۳۰۔ اس مرض کی اعلیٰ دوا میں ہیں۔

بچہ کا دُ بلا پن۔۔۔ بچہ روز بروز دُ بلا ہوتا جاتا ہو تو سلفر ۳۰-۲۰۔ کلک فاس ۶ X ۳۰۔ سفوف، اینڈ فاس، ۶۔ کلکیر یا کارب ۳۰۔ ابروینیم ۳۰-۲۰۰۔ سلکا ۶-۳۰۔ وغیرہ دوائیں فائدہ مند ہیں۔ عام اصول کی پابندی کرنی چاہیے تھوڑی اور ہلکی چیزیں کھانے کو دینا چاہیے۔ لاغری۔ سوکھا (MARASMUS) اچھی طرح ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بچہ کا جسم مضبوط نہ ہو کر خشک ہوتا جائے اور جسم کی طبیعت حرارت (۹۸° F) سے کم رہنے پر سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری ہوگئی ہے۔ شروع میں سلفر ۳۰۔ اسکے بعد کلکیر یا کارب ۳۰۔ اس کی عمدہ دوا ہے۔ بچہ کی غذا پوری ہو۔ لیکن دُ بلا ہوتا جاتا ہو تو ابروینیم اچھی دوا ہے۔ سور المزاجی، کی دواؤں سے انتخاب کر کے کبھی کبھی دوا استعمال کرنا چاہیے۔ مقوی غذا۔ صاف ہوا۔ خالص سرسوں کا تیل کچھ گرم کر کے جسم پر مالش کرنا اچھے مکان میں رہنا وغیرہ اصول صحت کی پابندی کرنی چاہیے۔

مرض برص (LEUCODERMA) اسے بہت سے لوگ جذام بھی کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ جذام یا کسی قسم کی جلدی بیماری نہیں ہے۔ اس نے مریض کو علیحدہ رکھنے کی یا اس سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں مادہ ملونہ (رنگ پیدا کرنے والا مادہ (PIGMENT) کی کمی کی وجہ سے کسی کسی جلد کا رنگ بگڑ کر دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔

تب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مرض برص کیا ہے۔ اگرچہ اس کا سبب ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ تو بھی بچہ کی تمام جسم کی ریاضت اعصاب کا کمزوری ہی اس کا اصلی سبب ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اکثر آٹھ برس سے کم عمر والے بچوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ ہاتھ، گلے کے پیچھے چہرہ اور سینہ کے اوپر شروع میں چھوٹے سفید داغ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد داغ سفید اور چمکتے کی شکل میں ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہ چمکتے آپس میں مل کر ایک بڑے آبلہ کی شکل کے ہو جاتے ہیں۔ ادھر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کوئی جلدی بیماری نہیں ہے۔ بچہ کے تمام جسم کی صحت خراب ہونے یا نظام اعصابی کے فعل میں نقص پڑنے کی وجہ سے اس کی جلد دودھ کی طرح سفید ہو جاتی ہے۔ اس لئے جو دوائیں بچوں کے تمام جسم کی صحت اور نظام اعصابی کے اوپر کام کرتی ہیں۔ وہ ہی سب ادویات اس مرض میں بھی فائدہ کرتی ہیں۔ امراض جلدی کی دوائیں دے کر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آرٹھک الیم۔ ۳؛ یا آرٹھک آلوڈ ۴۔ سفوف چند مہفتہ تک استعمال کرنے سے بیماری آہستہ آہستہ اچھی ہونے لگتی ہے۔ لیکن ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آرٹھک سلف پلورم ۴۔ سفوف کے استعمال سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر عرصہ تک آرٹھک دینے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو؛ (خاص کر سینہ دھڑکنا۔ تنفس میں رکاوٹ وغیرہ سستی کی علامت ہیں) تو فاسفورس کے استعمال سے اکثر موقعوں پر امید افزا فائدہ ہوتا ہے۔ لیٹے رہنے پر آرام معلوم ہو۔ نیند نہ آنا۔ (خاص کر رات میں تین بجے کے بعد) دماغی پریشانی، قوت یادداشت غائب ہونا وغیرہ علامات میں زرنک فاس ۳؛ سفوف۔ ہٹیریا کے مریضان کے برص میں اگنیشیا ۶۔ اچھی دوا ہے۔ سلفر ۳۔ تھو جا ۶۔ کلکیریا کارب ۳۔ کلکیریا فاس ۶۔ سفوف، انٹیم ٹارٹ ۶؛ ٹائٹیرک ایڈ ۶۔ (X-RAY 30) زرنک ۶۔ بھی کبھی کبھی مفید ہوتے ہیں۔ کسی چیز کے خارجی استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ (لیکن اخروٹ کا مغز سفید داغ پر لکھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے بچ اور پیل کی جڑ گارے کے چھوٹے بچے کے پیشاب کے ساتھ پیس کر لیپ لگا کر کے ایک بچہ کو آرام کیا ہے۔ لیکن آٹھ سال بعد اس کو پھر برص ہو گیا

تھا۔ جو مناسب ہو میو پتھیک دواؤں کے استعمال سے اچھا ہو گیا۔
 بچہ کو اچھی طرح بھوک معلوم ہو اور باضمہ کی طاقت بڑھتی رہے۔ اس کا
 انتظام کرنا چاہیے۔ دودھ، کاڈ لیور آئیل (روغن مچھلی) بچہ مقوی پھل اور
 دوسری مقوی چیزیں (جو عصب اور خون پیدا کرتی ہیں) کھانا اور اچھے
 آب و ہوا والے پہاڑی مقامات یا سمندر کنارہ کی جگہ میں کچھ دنوں تک۔
 رہنا اچھا ہے۔ کل جسم میں مرض ہو تو گنگا جی کی بالوٹا اور گنگا جی میں نہانا
 بھی فائدہ کرتا ہے۔ مٹھائی، اجار، وغیرہ ترش چیزیں اور جو چیزیں باضمہ
 کے فعل میں نقص پہونچاتی ہوں۔ ان کو ترک کر دینا چاہیے۔
 کٹا ہو نہٹھ۔ کسی کسی خاندان میں کٹے ہوٹھ (HARE LIM)

پیدا ہوتے ہیں۔ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو اس مرض سے بچانے کیلئے حاملہ کو تین سے
 سات ماہ تک کلک سلف XII سفوف روزانہ صبح و شام ایک ایک گریں کھلانا چاہیے۔
 ایسے ہوٹھ والے بچہ ہونے پر کوئی کوئی نشتر لگوا دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر (نشتر کا
 زخم خشک کرنے کے لئے کیلنڈر یولائیں لگانے سے خوب فائدہ ہوتا ہے۔

لکنت :- (STAMMERING) اسٹرمیٹم ۳۔ یا بالو سیاس ۲۔ کچھ
 عرصہ تک استعمال کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ گڑ، مٹھائی، کھانا اور ہمیشہ
 غصہ ور رہنا منع ہے۔ صبح و شام، زبان صاحب کرنا اور بولنے وقت سنگ مرمر
 کی گولی یا پتھر کا چھوٹا ٹکڑہ زبان پر رکھ دینا فائدہ کرتا ہے۔
 ایک اخبار میں اس مضمون پر لکھا گیا ہے۔

(To the Editor "T.D. News")

Sir With reference to the rules for stammering
 cure appearing in the "Facts" column of your
 to-days issue I cannot help suggesting the follow-
 ing rules which might help to cure stammering.
 The rules are as follows:- (1) Molasses and sweetmeats
 should be avoided (2) At the time of speaking :

لے (Dr. Fisher's Diseases of children) ملاحظہ ہو)

"MARBLE" SHOULD BE KEPT ON THE TONGUE (3) "ANGER"
SHOULD BE GIVEN UP (4) IMPURITIES AND MUCUS OF THE
TONGUE SHOULD BE CLEANSSED PROPERLY EVERY
MORNING AND EVENING:-

KAIKALA

YOURS ETC.

JANUARY. 19

BIMALACHARAN DUTTA.

لنگ کرنا (LIMPING) گر پڑنے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے لنگر کر
چلنے پر آرنیکا ۳۔ کمزوری یا خلقی خرابی کی وجہ سے لنگر آنے پر سلفر ۳۔ کلکیر یا کارب
۳۔ دینا چاہیے۔ یہ نہایت مفید و کار آمد ثابت ہوئے ہیں۔

ہڈی کا ٹیڑھا ہونا (RICKETS) بچہ کی ہڈی چونہ کا حصہ
کم ہونے میں ہڈیاں قاعدہ سے مضبوط ہو کر آہستہ آہستہ نرم، بڑھی ہوئی
ٹیڑھی اور کمزور ہوا کرتی ہیں، پیلاہرست، سر پر پسینہ، وقت پر دانت نہ نکلنا
ہاتھ پیر کی گلیاں ہونے اور اس میں درد سر کی ہڈی سوچ کر ہڈی ہونا پسینہ کی
پیلیوں کی ہڈیاں اونچی ہونا۔ عضلہ نرم، ہڈیاں کمزور۔ محنت نہ کر سکتا۔ اور
پشت کے ریڑھ کا ٹیڑھا ہونا۔ اس بیماری کے مخصوص علامات ہیں کلکیر یا
فاس ۱۲-X۔ سفوف، اس مرض کی خاص دوا ہے (خاص کر دبلے اور کئی خون والے
بچوں کے لئے) موٹے بچوں کے لئے کلکیر یا کارب ۶۔ ۳۔ دبلے بچوں کے لئے
آرٹنک ۶۔ یا آرٹنک آکٹوڈ ۶-X۔ اور اچھی طرح پرورش نہ ہونے کی وجہ سے
برص کے ساتھ ہو تو فاسفورس ۳۔ ۳۔ خوب فائدہ کرتا ہے۔ سلکا ۶۔
ایسڈ فاس ۶۔ یا سلفر ۳۔ کبھی کبھی فائدہ کرتا ہے۔ جس جگہ کی مٹی دودھیا
ہو وہاں تبدیل آب و ہوا کے لئے بھیجنا اچھا ہے۔ اچھے دودھ اور ترکاری
کا بھی بندوبست رکھنا لازمی اور مفید ہے۔

سور المزاجی یا خاندانی خرابی :- مندرجہ ذیل تین امراض اکثر موقعوں

۱۔ ہی مین کے بیان کے ہوئے تینوں خلط غلط یا سور المزاجی یعنی سورا (PSORA) آتشک
(SYCOBIC) اور سوزاک (SYPHHIS) کے لئے مقصد رہا ملاحظہ ہو۔

پر والدین سے ہی بچہ میں آتے ہیں (۱) مرض سل (ب) کنٹھ مالا (ج) آتشک
 (۱) مرض سل کا مادہ (TUBERCULOSIS) پھیپھڑا، داغ، آنت،
 و غیرہ بچہ کا کوئی بھی جسمانی عضو یا سچ میں سل یا دانہ (TUBERCLES) پیدا
 ہو جاتے ہیں، یہ سل میلی یا زرد رنگ کے پیرے شکر کی طرح دکھائی دیتی ہے
 اور ان میں جراثیم سل یا دانہ (TUBERCULOUS BACILLI) پایا جاتا
 ہے۔ پھیپھڑے میں سل ہونے پر دق (PHTHISIS) پیدا ہوتا
 ہے۔ سر میں ہونے سے مرض داغی جھلی کا (TUBERCULAR)
 (MENINGITIS) فاسفورس ۶۔ اس مرض کی خاص دوا ہے۔
 بچہ ایک بار گی سست ہو جائے یا خون غائب ہو جائے تو کلیر یا فاس ۴
 سفوف دینا چاہیے، منہ سے خون آئے یا ناک سے خون نکلے، بخار زمانہ
 حیض میں خون نہ نکلتا وغیرہ علامات میں فیرم فاس ۴۔ اچھی دوا ہے۔
 بخار، سینہ، تپ، دست، کھانسی (صبح و شام میں زیادتی) پھیپھڑے میں تیز
 درد، حرکت سے بڑھتا، وغیرہ علامات میں آرٹک ۶ استعمال کرنا چاہیے۔
 پیر سلف ۶، سلکا ۳، لائیکو پوڈیم ۱۲۔ اور آیوڈیم ۶ کی کبھی کبھی ضرورت
 پڑ سکتی ہے۔ بیلینم اور پارو جین کے استعمال سے ڈاکٹر فیر صاحب کو کوئی
 فائدہ نہیں محسوس ہوا۔

مقوی چیزیں کھانا، کھلی صاف ہوا میں رہنا، صاف ستھرے اچھے کشتادہ
 مکان میں رہنا وغیرہ اصول صحت کی پابندی کرنی چاہیے۔
 (ب) کنٹھ مالا (SCROFULA) یہ متذکرہ بالاسل کی ایک خاص حالت
 ہے۔ اس بیماری میں جسم کی گٹیاں (خاص کر گردن کی گٹیاں) سوج کر درد
 کرنے لگتی ہیں، اکثر پیٹ کی بیماری ہوا کرتی ہے۔ مریض زکام میں مبتلا
 رہتا ہے۔ اور آنکھ اور کان سے بھی مواد نکلا کرتا ہے۔ کلیر یا کارب
 ۳۔ آیوڈیم ۳۔ یا نیٹریم سلف ۱۲۔ سفوف ۱۰۰۔ اس کی مخصوص
 دوائیں ہیں۔ مرض سل کی دواؤں میں سے انتخاب کر کے استعمال کرنا۔ اور
 غذا وغیرہ اصول کی پابندی کرنی چاہیے (بیان کنٹھ مالا ملاحظہ ہو)۔

(IN FANTILE SYPHILIS)

(ج) بچہ کا آتشک

والدین کے خاندان میں مرض آتشک (آتشک ملاحظہ ہو) رہنے پر اولاد پیدا ہوتے ہی یا چند روز بعد اس بیماری میں حسبِ بل علامات نمودار ہوتے ہیں۔ بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور برابر روتا ہے۔ سانس اچھی طرح نہیں لیتا۔ اور جسم پر کھجلی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ بچہ کے جسم سے اس بیماری کا زہر اگر کسی دوسرے آدمی کے جسم میں لگ جاتا ہے تو اس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے؛ مرک سول۔ ۲۔ اس کی بہترین دوا ہے۔ کھجلی اور زخم ہونے پر نائٹریک ایسڈ۔ ۳۔ آرم میا لیکم۔ ۳۔ کھوجا۔ ۳۔ سفلیئم۔ ۳۔ پڈیاگا۔ ۳۔ سلفر۔ ۳۔ کی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑ سکتی ہے۔ (رپید اسٹی آتشک ملاحظہ ہو)

چند خلقی امراض کے علامات اور دوائیں

بچہ کا نشوونما زیادہ ہو تو ایسڈ فاس۔

جن کے جسم سے آسانی سے اب خون وغیرہ نکل پڑتا ہو۔ ان کو فاسفورس۔ جن کی آنکھیں ناک یا جسم کے سوراخ سے آسانی سے اخراج ہوتا ہو؛ ان کو کروٹلیس؛ کسی بیماری کا دھبہ سے مرض بالکل خشک اور دُبلتا ہو تو آرج نائی کھڑا ہو کر بیٹھنا۔ جھک کر چلنا وغیرہ علامات میں سلفر۔

سست کرنیوالی کسی بیماری میں عرصہ تک مبتلا رہنے کی وجہ سے قوت حیات کم ہو جائے کار بوج، سوکھے، دُبلے پتلے لڑکوں کے لئے ایلو مینا۔ سوکھی دُبل، پتلی، رطبیوں کے لئے مرمن بیماری میں مبتلا رہنے میں جس سے سردی لگتی ہو یا اسہال ہو جاتا ہو؛ ایسڈ نائی۔

سورا (PSORA) مزاج والے بچوں کے لئے سلفر اعلیٰ دوا ہے۔

آتشک مزاج والوں کے لئے مرک اعلیٰ دوا ہے۔

سوزاکی مزاج والوں کے لئے کھوجا اعلیٰ دوا ہے۔

آتشک اور مرکری (یارہ) کے بے جا استعمال کرنے سے پیدا ہوئے امراض کے لئے کیلی آیوڈائیڈ یا آرم میٹ۔

تبدیلی موسم کے وقت بچوں کی بیماری بڑھنا۔ موسم برسات پہلے

بچہ کی کوئی بیماری کی ترقی ریڈ وڈنڈرن ۳۔ سرد تر ہوا میں مرض کی ترقی میں
 رشاکس ۶۔ امراض تبدیلی موسم بالکل نہ پسند کرتا ہو۔ یا برسات میں بیماری بڑھنے
 پر دکھارا ۶۔ یا برسات میں مرض کی ترقی کی علامت میں زمین کیوں بلبلا
 موسم گرما کے اسہال میں آئرس ۶۔ کھربا آندھی طوفان کے ایام میں ترقی کرے۔
 تو جلیسم ۳۔ بجلی گرنے کے پہلے بیماری بڑھے تو انگریس ۳۔
 خسرہ دم، کرم، چھپک وغیرہ امراض کے لئے اس کتاب میں ان امراض کو اپنے
 اپنے مقامات پر ملاحظہ کرنا چاہیے۔

بچہ کے مزاج اور علامات کے موافق ادویات

(امراض طفلان میں کیلی کارب، جلیس ورے ایلب، تھو جاپٹو کریم، نکس،
 ماسکیٹ، سائنا، اسٹرامونی ایم، ایڈسلف، سینجیا، ساکیٹ، مایلی، بر دم،
 مرک، پلس، ساڈلا، اسپیکاک، سلکا، لائیو پوڈیم وغیرہ دوائیں (خاص
 کر استعمال ہوتی ہیں۔

بے خبری کی حالت میں خواہش نہ ہونے پر بھی ایک ہاتھ اور ایک پیرو
 ہمیشہ ہلاتے رہنا۔ ایو سائٹم، بے خبری کی حالت میں بچہ صرف اپنے جسم کے
 اشارہ سے ضرورت تیلے۔ اسٹرامونی ایم۔

بے خبری کی حالت میں آنکھیں بغیر حرکت کے اوپی۔ ایم۔ بے خبری کی
 حالت میں ہڈیاں، بے چینی سے لوٹنا۔ جسم اچھلنا۔ کیو پریم،
 بے خبری کی حالت میں جب زور سے پکارا جائے تو آنکھ کھولے۔ یہ وقوف
 کی طرح دیکھا کرے اور آہستہ آہستہ جواب دے تو ایڈسلفاس۔

بے خبری کی حالت میں ٹکٹکی لگا کر منہ پھاڑے دیکھتا ہو۔ جھومتا ہو اور
 کسی سوال کا جواب نہ دیتا ہو۔ ہایوسیا مس۔

بے خبری کی حالت کے ساتھ دماغ پر حملہ ہونا۔ کیو پریم۔
 بچہ کے دماغ سر کی ہڈی پر حملہ اُبھار۔ یا خون، کلک فلورڈ۔
 آنسو، چار ماہ کے بچہ کی آنکھوں میں پانی ایک دفعہ بھی نہ دکھائی دینے
 پر سمجھنا چاہیے کہ اسے کوئی سخت بیماری ہوئی ہے۔

ترشح، بہت بہنے یا کھیلنے کے بعد، کافیا

” آمادس اور پورنماشی کو، سلکا۔

” گیارہ بجے کے وقت دوزخ پینے کے بعد پیدا ہونے پر کیلنڈریلا۔

” ہر دسویں روز، لیکے سس۔

” درد سر۔ دانت نکلنے یا پیٹ کی خرابی سے اسکیوٹسیریا۔

” کے وقت یا پہلے جینا، اوپ۔

” کے ساتھ روٹا یا مہنٹا، اگیشیا۔

” مارنا (آرام کے لیے) چہرہ یا سر پر ہاتھ کی مٹھی سے آرسنگ۔

چوٹ، دیوار یا صحن پر سر پکنا۔ رستیا کس۔

جوش غائب۔ تمام چیزوں کی طرف سے غمگین، فاسفورک ایسڈ۔

سخت، خشک برتن، اور آلات تناسل کے چاروں طرف پھنیاں میدوریم۔

کان میں ہمیشہ انگلی ڈالنا، کنس سلفٹ۔

کانپنا، رونے اور نچنے کے ساتھ تمام جسم کا ہٹنا۔ اگیشیا۔

رونے کی وقت (غصہ ہونے پر بھی) بچہ کی سانس بند ہونے پر کیوریم۔

بدبودار خون پیپ ہٹنے کے ساتھ بچہ کی آنکھوں میں رক্ত، بیل سلف۔

کاٹنا اور دانت پینا (مرض ورم، دماغی جھجکی میں) بیلادونا۔

کھانسی کی زیادتی۔ غصہ ہونے پر انٹرمارٹ۔

کھانسنے کے وقت یا کھانسنے کے کچھ پہلے کچھ چھینا ہو۔ آرنیکا۔

کھانسا اور جمائی لینا۔ باری باری سے انٹرمارٹ۔

کام میں تیار نہ ہو، پھرتی نڈارو، لائیکوپوڈیم۔

کسی سخت چیز کے کاٹنے کی خواہش۔ فاسٹو۔

کوئی نہ چھپتا ہے۔ چوٹ خیال کرے اور ہر بات پر اتنا ہو، کیفرا۔

بوسہ دینے پر بچہ کی محبت ظاہر ہونے کی علامت میں، ٹیپس۔

چونہ کے پانی کے لیے استعمال سے یعنی عرصہ تک اس کے استعمال کی وجہ

فعل باضمہ خراب ہونے پر، سکیر یا کارب۔ ۲۔ ۱۰۰۰۔

آلات ترانس دھو ڈالنے پر بھی کھٹی بو مستلوم ہونا۔ سینی کیولس۔
پانی پینا تیزی اور جلدی پر ایونیا۔

پانی یا دودھ پیتے وقت پچھرتن کو دانت سے پکڑ لیتا ہو۔ کیورم۔
زبان اور منہ میں بہت آبلے، چہرہ پر بہت سخت پھنیاں۔ یوپے ٹوٹیم
ابرو ٹیکا۔ کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہے۔

تیلی چیز پیتے وقت سانس رکتی ہو۔ لیکن سخت چیز آسانی سے
نگل جائے۔ تیلی بروم۔ پیڑ میں ریاچ بھری ہو۔ سینا۔
تیز درد کے ساتھ سورمھی، یکا یکا چنیا۔ پیچھے سر جھکانا۔ بیلا ڈونا۔
دانت پیتا اور کاٹتا ہو۔ بیلا ڈونا۔

دیر سے باتیں کرنا سیکھنے پر۔ قیڑم مینور۔
جھولا سے اٹھائے، پستان کا دودھ ایلانے یا رونے کے بعد پتھ کو سانس
کی تکلیف ہونے پر۔ کیٹک فاس۔

نہانا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا نہ چاہتا ہو۔ لیکن گرم سے کوئی عذر نہ ہو۔
انٹم کروڈ، نہانا یا دھلانا نہ چاہتا ہو، سر میں پھوڑا ہونے کی وجہ سے
چھینٹا ہو، اور ہاتھ پیر پٹکتا ہو، ہیر۔

نہانا یا دھلانا بالکل پسند نہ کرے، ایمون ٹارپ، انٹم ٹارٹ۔ سلفر۔
ناک بند ہو کر دودھ نہ پیتا ہو، کیلی بالی نکس و امیکا۔

ناک بند ہو کر منہ سے سانس نہ اور عجیب آواز آتی ہو۔ لاسیکو۔
ناک سے سرخ یا غم نکلنا، بلیک یا کارب سلفر (حاد میں) سلا (فرمن حالت میں)
ناک اور آنکھیں نیند سے اٹھتی ہی رگڑتا ہو۔ سینی کیولس۔

ناک سے پانی کی طرح اور سُرخ مائل اخراج پانا۔ ابروٹیم، کیٹک فاس۔
ناک باہر نکلنا۔ سرخ اور زخمی، بہت رونا۔ تھو جانا۔

ناک سے پانی، مواد وغیرہ نکلنا۔ نال کاٹنے کے بعد کیٹک فاس، دودھ شکر
پنے ہاتھ کی مٹھی کاٹتا ہو، براہ سخت اور آسانی سے باہر نہ نکلنا۔ ایکونٹ
نیند، آدھ منٹ بعد ہی جگ پڑتا ہو، چونک پڑنا یا چنیا۔ ایپیکا۔

نیند کی حالت میں لوٹنا اور رونا۔ کیلی کارب۔
 نیند کے وقت رونا (غصہ درد اور چڑچڑا ہونے کے بعد) اور جاگنے
 پر خوف سے پریشانی کی علامت میں، زنک؛

نیند کے وقت رونا۔ یا چونک پڑنا۔ کروٹ بدلتا۔ زنک۔
 نیند کے وقت رونا۔ اکثر چباتا ہو اور تھوک نکلتا ہو، بلیکریا کارب۔
 (برایونیا) نیند کے وقت رونا؛ چلا اٹھے۔ سائنا۔

نیند کے وقت رونا (خاص کر رات میں) درد سے چنچنا۔ لیکن سبب دریافت
 کرنے پر، جواب نہ دے، اسے پس۔

نیند۔ دن رات نہ سوئے۔ لیکن نیند کے جھونکے لپٹا رہے۔ چڑچڑا ہو۔
 رونا ہو۔ سو رہا تم۔

نیند جھولے میں آتی ہو، بغیر جھلائے نہ آئے؛ سائنا۔

نیند میں خرافات بکنا۔ رونا۔ اور آہستہ آہستہ بک کر چونک پڑنا۔ سلفر۔
 نیند سے چڑچڑا کر اٹھ بیٹھنا۔ آرسنک۔ کیلی کارب، یکے۔ لاسیکو۔
 نیند غائب اور بے قرار، اس کے بعد نیند آنا۔ کافیا۔ ادپ۔

نیند دن رات نہ آئے؛ سو رہیم۔

نیند میں چڑچڑاتا ہو؛ کافیا۔

نیند کے وقت جسم بھر کتا ہو، چنچتا ہو، کانپتا ہو، اور درد کر جاگ پڑتا ہو؛

ہایوسیا مس۔

ہر وقت ریاخ خارج ہوتے وقت براز نکل پڑتا ہو؛ اولینڈر۔

ماں باپ کے خاندان میں آتشک یا سوزاک ہونے کی وجہ سے بچہ کی صحت

خراب ہونے پر، ٹٹے فائی سیگیریا۔

پیٹ میں قولنجی درد برابر رہنا۔ جلس

قبض کے ساتھ " " " "

" " " " کھانے کے بعد ہی گریفاٹس۔

" " " " کے ساتھ ریاخ پیدا ہونا۔ سائنا۔

بچہ جگ پڑے۔ خوف سے پریشان اور بیوقوف ہونا۔ اسیکولس۔

” ” ” سر کھلائے۔ کلک کارب۔

” ” ” رات میں سونے کے دو گھنٹہ بعد ہاتھ پیر پیکتا ہوئے۔

کسی سوال کا جواب نہ دیتا ہو۔ پیشاب کرنے کو کہا جائے تو نفی میں جواب دے۔

لیکن پیشاب کرنے کو بٹھالا جائے تو اسی وقت سو جائے۔ بھوجا۔

بچہ جگ پڑے، رات کو ہنستا ہوا کیلے اور بالکل سونا نہ چاہے پیر پیکتا ہو۔

” ” ” رات میں یکایک درے اور کانپنے لگھٹے پسیر کے

ساتھ، اگساری سی موسی۔

بچہ جگ پڑے۔ سانس میں رکاوٹ، تکلیف کے ساتھ سانس نہ

لے سکے۔ لیکن باہر نہ نکال سکے، سمبوکس۔

بچہ جگ پڑے یکا یک اور چلائے اور بلا سبب پٹا پکڑ رکھتا ہو۔ بوریس۔

بچہ اپنا بال کھینچتا ہو (در دسر ہو)۔ بیلا ڈوٹا۔ ڈیجی۔

بچہ تیزی اور رولائی کے ساتھ بہت قسم کی چیزیں مانگتا ہو۔ ریوم۔

بچہ تے کرتا ہو، کچھ کھانے کے بعد دن ہی منٹ میں؛ فاس۔

” ” ” کھانے پینے کے بعد اور اس وجہ سے کھانا پیتا بالکل نہ ہو؛

لیکن نیند اچھی طرح آتی ہو۔ آکرسنگ۔

بچہ تے کرتا ہو، دودھ پینے کے کچھ ہی دیر بعد کل غذا کی بڑے زور

تے کر دے اور گہری نیند میں سو جائے۔ سینی کیولا۔

بچہ دیر میں چلنا سکھے۔ کیلک کارب، سلکا۔

بچہ خاموش رہے، جتنا لاڈ کیا جائے اتنا ہی رنجیدہ ہوتا جائے۔ سائنا۔

بچہ قضیت کھینچ کر لبا کرے۔ مارک دالی۔

بچہ سب باتوں میں غمگین رہے۔ قوت شنودائی کے علاوہ اور سب

طاقتیں کمزور ہو جائیں۔ کیلک کارب

بچہ دقت پر نہ ہنستا ہو، نہ کیلٹا ہو، آسانی سے سوتا بھی نہ ہو اور

نیند میں ہنستا ہو۔ داعی تحرکیا۔ سیری پیڈریم۔

پچھکارونا۔ معمولی وجہ سے، کاسٹیکم،

تکامل دن اور رات سوئے۔ لائیگو۔

کرم، پیٹ لیا۔ اور اس کے ساتھ پیٹ میں درد۔ شے فانی سیکر۔

جسم نرم - برده میم -

” غصہ سے پیدا ہونی علامت میں ایکونائٹ۔ ”

بچہ کا جسم بادِ ناکبر (بچہ کا جسم نہ بڑھتا ہو) ایسے بچہ گنے کا رب۔ گنے میوؤں۔ لایسکو۔

بچہ کا کھلونا مانگنا۔ درود کی شکر۔

پھر کاچر حط امراج، ہسیر، لاسکو۔

بکھر اور سے نیچے اترنے میں ڈرے۔ پورے ہیں۔

بچے رات و دن ہمیشہ گھومنا چاہے اور ہلنا چاہے۔ یہاں (درشاہی)

بجہ اکثر گورد میں گھومنا چاہیے۔ سینی کیولا (ریشا کس)

بجای هر چه است نبرد داشت گرفته بود. کافی.

نچہ کی کلیاں سخت اور بڑھی ہوں، کیلک کارپ۔

تخت کی گلیاں سوچی، مارک ڈالیں۔

بچہ کے جسم کی پود دھونے کے بعد کھٹی، پیسیر، گینیشیا کارب،

پھر کے جسم کی تو ہمیشہ مٹے بٹھکے کی طرح سینہ کو لا۔ سو رہیں۔

پہلے، اسم کا جو، ایسے سر کے پیشین میں طرح، سیسی ہی یوں، سواریم۔
بچ کا غول، غول اکنا، کھمبہ نصف کھار چھا، اڑا، آواز میں، ریتا، اڑا

چرخہ کا عوں عوں اڑنا۔ اظہیں نصف مہلی سرکھول پینا (قابو پینا)

کچھ کا عوں عوں کرنا اور سستی رہنا۔ بیل ڈرنا۔

رات میں بجے، کیلی کار

آخر رات میں رہا کس

بچہ کی زبان پر سفید سیل کی تہہ : انہم کروڑی

خیر کا بیڑو اور اس کی حامد حکمت، حکمتِ سخت ہو، قوراکے سدا پہنچے، بحیرہ کا

چند روز بعد از آنکه ایامی که در آنجا بود، به یکدیگر گفتند که این شهر را چه نام دارند؟

ی سے تر تھنا۔ اور زیادہ صحت ہونا۔ ابھی ابھی سرخ رنگ ہو کر جلد

بچہ کا چہرہ میللا، رنگ پھیکا۔ سورنیم، کیلک، مرک و ایوس۔
بچہ کے سر پر ذرا میں پسینہ آجائے۔ کیلک۔

بچہ کا سر بڑا۔ جھڑا چھوٹا۔ کیلی آؤڈ۔

بچہ کا سر بڑا ہونے پر، کیلی آؤڈ، کیلک کارب، سلکا۔

بچہ کے چہرہ کے چاروں طرف نیلگوں سفید رنگ، سائنا، سبنا،

بچہ کا پستان کا دودھ پینے کی وجہ سے منہ میں زخم، ورنیکا،

بچہ کا چہرہ بوڑھے کی طرح ہو، ابرو ٹیم، ایتھوزا، ایڈروسیانک،

کریازوٹ، (بوڑھے کی طرح معلوم ہو۔)

بچہ کے چہرہ سے پریشانی معلوم ہوتی ہو، ایتھوزا۔ بیلادونا۔ کیوپرم۔

بچہ کا چہرہ عقل سے خالی محسوس ہو، پلیم، اسٹرمونیم، زینکم،

بچہ کی مناسب پرورش نہ ہوتا۔ دیر سے چلنا۔ سیکھنا۔ پیٹ لبا۔ سر بڑا۔ لیکن

دانت نہ نکلتا ہو۔ کلکیر یا کارب۔ کلکیر یا آؤڈ۔

بچہ کا مرض بہت سخت، سورنیم۔

بچہ ڈبلا۔ کیلی آؤڈ، سلفر۔

بچہ ڈبلا اور بوڑھے کی طرح دکھائی دے اور تشخ ہو اور دردِ قلع میں آج نالی،

بچہ کمزور یا سوکھا، بہت سست، کھال لکی، چہرہ بوڑھے کی طرح، پیٹ

بڑا۔ راز میں ماڑ کی طرح، کھال میں پانی بھرا چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ منہ

میں زخم، سارسا پر یلا۔

بچہ کا ڈبلا پن، اوپر کے حصہ سے بچے کی طرف۔ سین کرس۔

” گلیاں بڑھیں اور جسم کمزور ہوتا جائے۔ آؤڈ۔

” چھوٹے بچوں کا بیرام ویرم۔

” بچے حصہ سے اوپر کی طرف بڑھے۔ ابرو ٹیم۔

” خافسگر گردن کا پچھلا حصہ عضلہ، کلکیر یا فاش، گرم میور۔ سینی کیولا۔

” (خافسگر گردن کے نیچے اوران کا) مرض اسہال کے بعد۔ سینی کیولا۔

” اور سر کا پچھلا حصہ پیٹھ جانا۔ شیا کارب۔

بچہ کا دہلا پن، منہ میں زخم، جسم پر زرد دانے ایسٹہ سلف،
 " " " مناسب غذا ملنے پر بھی عضلہ سوکھتے جانا۔ آیوڈ، نیٹرم میور۔
 " " " یکا یک اسہال رگ جانے کے بعد، ابرو ٹٹے نہ،
 " " " آسانی سے متحرک ہونا۔ امبرا۔ لائیکو۔ ہایوسیا مس۔
 " " " چونکنا، کیلک کارب،

بچہ سے بات کرنے پر روٹھے، میڈو، نیٹرم، سلا۔ میو، کیونی ایم، بچہ
 ہمیشہ گود میں گھومنے کی خواہش کرنے کی علامت میں، انٹرم مارٹ، کیو بلا، جانا، سٹیم، کیلی کارب،
 ہمیشہ خوفناک خوابے بچے اور سونے کی خواہش نہ ہو، نکس وریٹکا۔
 بچہ پستان کی گھنڈی یکا یک چھوڑ دے اور روئے، گویا سانس رگ جاتی ہو۔
 سیدھی طرح اٹھ کر گھومنے سے اچھا رہے، انٹرم مارٹ۔
 بچہ پستان کا دودھ پینے کے بعد فوراً ہی پانی پینے کے لئے روئے، لیکن پانی
 ایسا ہی پھینک دے۔ آرنیکا۔

بچہ دودھ پیتے وقت اور پینے کے بعد روتا ہو۔ آرسنیکا۔
 بچہ پستان کا دودھ نہ پینا چاہے خنچا ہو۔ پستان کے دودھ سے دونوں
 ہونٹھ تر ہوتے، یا وہ دور سے پستان کھینچتا ہو، بر ایونیہ۔
 بچہ ہمیشہ پستان کا دودھ پیتا ہو لیکن اس کے جسم پر گوشت نہ چڑھتا ہو، سینک
 بچہ کے پستان کا دودھ پینے کے بعد کھلی یا تشخ، خالی ڈکار، میرم دے دم۔
 پستان کا دودھ پینے والے بچہ کو دودھ بالکل برداشت نہ ہو، سلا۔
 اعصابی کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ کاغذ موڑنے کی تھوڑی کھڑا ہٹ یا درد
 کی زور کی آواز سے بھی گھبرا کر بچہ اٹھ بیٹھے، اور روئے، بوریکس۔

کمزوری کی وجہ سے بچہ کا پیٹ پھوٹنا۔ پیٹ میں گھڑ گھڑانا، بے سی فلور، چھوٹے
 ایڈرے۔ یکا یک چونکنا، لیکن چیخے نہیں، کیلی کارب، انٹرم کروڈ۔

بچہ چھوٹا برداشت نہ کر سکتا ہو، چھوٹے سے روتا ہو، سانا، کیلی آیوڈ۔
 اچھی طرح آرام سے سوتا نہ ہو، ادھر ادھر کرے۔ لائیکو۔
 جمائی سے ہمیشہ ہلا۔ بے ادھر کا بچہ جھک کر رہے۔ اگنیٹا۔

چلنا اور بولنا دیر سے سیکھ۔ اگاری کس
چلنے اور بولنے پر قابو نہ رکھنا۔

” ” ” ” ” ایک دہریس کا بچہ اسی دوا سے اچھا ہوا ہے۔ ماسکٹا۔
گھر میں ہمیشہ جو بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں ان کا علاج اس طرح ادھر لکھا گیا ہے۔
علاج بالمش کے طریقہ سے علاج کر کے فائدہ ہونے پر گھر والوں کو عقیدہ
کے ساتھ دل سے جناب ہمیں صاحب کا سکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بچہ کو کڑوی
اور تکلیف دہ ادویات سے اُنھوں نے بچایا۔

اس کے متعلق مس کوپ (MISSCOBBE) نے بغیر جانب داری کے
جو کچھ کہاہے اُسکو تبا کر ہم امراض طفلان، کا علاج ختم کرتے ہیں

(CHILDREN, NOTICING THE BUST OF HAHNEMANN IN THE
SHOP-WINDOWS, MAY BE PROPERLY TAUGHT TO BLESS THAT
GREAT DELIVERER WHO BANISHED FROM THE NURSERY
THOSE HUGE AND HATEFUL MASSES OF MISERY BLACK TOUNTS
OF SO MANY INFANTINE TEARS- IN UGS OF SOBS AND SIGHE
AND JASPS AND STRUGGLES IN UTTERABLE FROM ONE OF
WHICH MADAME ROLOND DREW THE FIRST INSPIRATION
OF THAT MARTYR SPIRIT WHICH LED HER ONWORD TO THE
GUILLOTINE WHEN SHE BUFFERED HERSELF TO BE WHIPPED
SIX TIMES RUNNING, SOONER THAN SWALLOW THE
ABOMINABLE CONTENTS- SACRIFICIAL MEDIEINE
IN F.P. COBB'S THE PEAK IN DARIEN P. 1960

(ACCIDENTS)

حادثات

آگ میں جلا۔ آگ میں جلنے پر آگ بے پڑ جاتے ہیں؛ زخم ہو جاتا
ہے۔ موت تک ہو سکتی ہے

پہننے کے کپڑے میں آگ لگتے ہی زمین پر لوٹنے سے اور جلتے ہوئے کپڑے کو جاجم، تکیہ، گدی، قالین وغیرہ سے دبا دینے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ دھڑنے یا پانی سے بجھانے کی کوشش کرنے پر سخت آفت کا خون ہے۔ کیونکہ ہوا لگ کر آگ اور بھی بھڑک اٹھتی ہے۔



آگ بجھانا، جاجم، گدی وغیرہ سے دبانے۔

جلے ہوئے مقامات کی جلد اُدھیر نہ چاہیے۔ جلی ہوئی جگہ پر ہوانہ لگنے پائے اس لئے جلتے ہی (معالجہ کے نہ آنے تک) تھوڑا تیل اور چونا ملا کر مادیان جگہ پر لگانا چاہیے۔ اگر تیل یا چونا نہ ملے تو صرف میدہ (یا آٹا) یا اراروٹ جلی ہوئی جگہ پر چھڑک دینا چاہیے۔

تھوڑا یا بہت جلنے پر یا آبلہ پڑ جانے پر جلی ہوئی جگہ سوڈا سے دھک رکھنے پر اور اس پر گیلیا کپڑا بھگو کر رکھنے سے اکثر مہاجوں نے بہت فائدہ دیکھا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ڈن (G.W. DUNN) کی رائے ہے کہ کینتھرس (X 4 X) -

سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل یا کوئی دوسرا تیل جو اس وقت مل جائے۔ ڈاکٹر ہمارے کا بیان ہے کہ کپڑا دھو کر سوڈے کا پانی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے تکلیف فوراً بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زخم گہرا ہو گیا ہو یا جسم کے اکثر مقامات جل گئے ہوں تو سوڈا کی گیلی ٹی (نوجھ پانی) اور ایک حصہ سوڈا جلے ہوئے مقام پر لگانا چاہیے۔ (THE INDIAN MEDICAL RECORD JAN 1915. PAGE)

۱۲۸۱۲۰۳۔ داخلی استعمال کرنا، سوڈا اور بھی اچھی دوا ہے اُن کا قرمانا ہے کہ اسی علاج سے جلا ہوا مقام ہمیشہ تر کھنے سے آبلہ یا زخم کچھ بھی نہیں ہوتا
ملاحظہ ہو۔

(THE HOME RECORD DECEMBER 1812)

علاج :- تھوڑے سے جلنے پر آبلہ ہو تو کیلیمکس (یا آرٹیکا یورنیں) ۵۔ ایک ڈرام۔ ایک آؤنس پانی میں ملا کر ایک ٹیکڑا کپڑا اُس میں تر کر کے جلے ہوئے مقام پر باندھنا چاہیئے (دوا اگر نہ مل سکے) تو جلے ہوئے مقام پر روغن سرسوں یا ناریل میں تر کر کے اُس پر میدہ یا آم آرا روٹ چھڑک کر یا ناریل کے تیل میں چونے کا پانی ملا کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے، آکویا یو کے پتے پیس کر یا بختہ کیلا چھیل کر اور کچل کر ناریل کا تیل اور چونہ دونوں کو کھینٹ کر یا گڑ شہد گوہر جلے ہوئے مقام پر لگا دینے سے جلن بند ہو جاتی ہے اور آبلہ بھی نہیں پڑتا۔ جلی ہوئی جگہ پر گرم سوچی، بخار، پیاس، جلد خشک، خوف اور پریشانی وغیرہ علامات میں ایکونائٹ، ۳۰-X استعمال کرنا چاہیئے۔ آگ سے جل کر یا زنگ کا آبلہ، جلیں، بخار، تیر پیاس، بہت کمزوری، موت کا خوف وغیرہ علامات میں آرسنک ۶۔ زخم کی جگہ پر مواد پر جلنے، سپر سلف ۳۰-X استعمال کرنا چاہیئے۔ ایک حصہ کیلیمکس ڈیولا ۵۔ دس حصہ روغن زیتون (OLIVE OIL) کے ساتھ ملا کر لگانا چاہیئے۔ زخم روڑ حقہ کے پانی سے دھونا چاہیئے۔ اگر زخم سترنا شروع ہو تو سلکا ۳۰۔ جلی ہوئی جگہ دھک رکھنا چاہیئے۔ تاکہ اُس میں ہوانہ لگنے یا بے جھٹک روئی خوب گندی نہ ہو جائے تب تک اسکو بدلتا رہنا چاہیئے (کیونکہ بار بار روئی بدلنے سے جلی ہوئی جگہ میں نئی جلد جلدی نہیں پیدا ہوتی) بلکی غذا دینی چاہیئے۔ محرک چیزیں ممنوع ہیں۔

عضلات میں تکلیف :- کسرت، دوڑ دھوپ، ذمہ بال، وغیرہ کیلیمکس کیوجہ سے عضلات مست پڑ جاتے ہیں، جسم میں درد اور آبلے ہوں تو آرسنک ۳۰۔ اچھی دوا ہے ضرورت پڑنے پر نیم گرم پانی سے بدن کو چھڑانا چاہیئے۔ کٹی جگہ سے خون نہ ناز۔ ہاتھ، پیڑ، انگلیاں وغیرہ کٹ کر وہ خون نکلنے پر ایک صاف کپڑا سے (جس کو گرم پانی میں بھگو لیا ہو) کٹی جگہ کی دھول صاف

اس کے بعد ایک ٹکڑے کپڑے کی گدی بنا کر اور تر کر کے اُس مقام پر رکھ دینے سے خون نکلتا بند ہو جاتا ہے آخر میں پندرہ قطرے کیلنڈیولا ۱۰ نصف چھٹانک پانی میں ملا کر اُس کٹی ہوئی جگہ پر بھی باندھ دینا چاہیئے۔ خبردار کٹی جگہ پر صول وغیرہ نہ گرنے دے۔

وریدیں یا شریانیں کے کٹنے سے اخراج خون :- یکایک کسی وریدیں یا شریانیں کے کٹ جانے سے جسم کا تمام خون اُس کے راستہ سے نکل جاسکتا ہے اس حالت میں موت ضرور ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو بند کرنے کا فوراً کوشش کرنی چاہیئے۔

اس خون کے بند کرنے کے پہلے یہ رائے قائم کرنا چاہیئے کہ یہ خون ورید سے نکل رہا ہے یا شریان۔ سنے دل اور عروق دمویہ کا بیان پہلے کر دیا گیا ہے۔ کہ (۱) شریان کا خون دل سے جسم کے تمام جگہوں میں پہنچتا ہے اور شریان کٹ جانے پر سرخ خون جھونکنے سے وہاں سے نکلتا ہے۔ اور (۲) ورید کا خون سب جگہوں سے دل کی طرف دوڑتا ہے اور ورید کے کٹ جانے سے سیاہ مگنی خون آہستہ آہستہ معمولی طور سے نکلتا ہے۔

اس لئے سرخ خون ایک بارگی بند کرنے کے لئے شریان کا کٹا منہ دل کی طرف ہے (یعنی اوپر کی طرف کا کٹا منہ) اُس کو دیا کر پکڑ رکھنا چاہیئے۔ یا باندھ دینا چاہیئے اور سیاہ خون بند کرنے کے لئے کسی انس کے نیچے کاٹ کر دیا کر پکڑ رکھنا چاہیئے۔ یا باندھ دینا چاہیئے۔ یا تھ یا ہاتھ کی انگلی سے کسی ورید زور سے اُس وقت تک پکڑ رکھنا چاہیئے۔ جب تک خون کا اخراج بند نہ ہو جائے یا معالج آکر بینڈج نہ باندھے۔

جہاں ڈاکٹر نہ مل سکے وہاں مندرجہ ذیل آسان ترکیب سے بینڈج باندھ دینا چاہیئے۔ (۱) اگر کسی شریان یا ورید جگہ کے بہت تر دیکھ ہو تو موٹے ڈورے، پتہ یا ڈوری یا رول سے شریان کے اوپر کی طرف یا ورید کے نیچے اکثر باندھ دینا چاہیئے۔ اسی بندھن کا نام بینڈج ہے۔

(۲) لیکن اگر کٹا گہرا ہو تو مندرجہ ذیل ترکیب سے بینڈج باندھ دینا چاہیئے۔

ایک لہنا چھتر اڈوری کی طرح بٹ کر کٹی جگہ کو باندھنا چاہیے اس کے بعد اس بندھی ہوئی رسی کی طرح کپڑے کو اور جسم کے نیچے (یعنی بندرج میں گانہ باندھنے کے سوراخ میں) ایک نیپل، قلم یا قینچی، چھو کر جب تک خون نکلتا بند نہ ہو جائے وہ قینچی، نیپل، یا قلم، چاروں طرف گھمانا یا انھٹنا چاہیے۔ خون نکلتا بند ہونے پر کچھ دیر تک وہ کٹے حصہ پر بندھی رہے۔

کٹی شریان سے خون نکلتا بند ہونے پر آرنیکا X۳ - استعمال کرنا چاہیے۔ اور کیلنڈیولا ۱۰ - (آٹھ حصہ پانی کے ساتھ ملا کر) پٹی باندھنا یا دھونا چاہیے کہہ ورید کا خون گرنے پر بھی میلس X - کا داخلی اور بھی میلس ۱۰ (آٹھ گنے پانی میں ملا کر) میں پٹی تر کر کے باندھنا چاہیے، ہوسٹیا رر ہو۔ کٹے زخم پر آرنیکا کا خارجی استعمال کبھی نہ کرنا چاہیے۔ سیلولائٹس پیدا کر کے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جس طرح سچل جانے کی چوٹ میں خون نہیں نکلتا اس میں آرنیکا کا بیرونی استعمال ہو سکتا ہے۔

ناک سے خون گرنے کا۔ اس کتاب کے مرض ناک کے بیان میں ناک سے خون گرنے کا ملاحظہ ہو!

دانت کی جڑ سے خون نکلتا:۔ دانت کے اکھڑنے وغیرہ کی وجہ سے کبھی کبھی خون نکلتا ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

علاج :- سُرخ خون نکلنے پر آرنیکا ۱۰ ایک حصہ دھل گئے پانی میں ملا کر تھوڑا کپڑا تر کر کے گدی بن کر دانت کے مسورے پر زور سے دبا دینا چاہیے۔ اس کے بعد اتنا ہی بڑا ایک کاک (CORK) اس کے اوپر رکھ کر مسورے پر دبانے سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے اگر خون بالکل سُرخ نکلتا ہو تو آرنیکا ۱۰ کے پدے ہی میلس ۱۰ دینا چاہیے۔

چوٹ :- کٹا، کھٹا ہوا، کچلا ہوا، موج کھایا ہوا وغیرہ بہت طرح چوٹ لگتی ہے۔ چوٹ کی وجہ سے جلد جھیل کر زخم ہو جاتا ہے۔

علاج :- چوٹ والی جگہ سے خون نکلنے کو روکنا مناسب ہے زخم کا ٹھنڈا دیر کی طرف رکھ کر ٹھنڈے پانی سے زبردستی اس کی طرف سے پٹی باندھنے

سے فائدہ ہوتا ہے، کٹی جگہ پر دوب چبا کر یا پیکر لگا دینے یا تازہ گوہر شکر
 لگا کر باندھنے سے خون گرنا بند ہو سکتا ہے۔ اگر چوٹ کی وجہ سے زخم ہو جائے
 (یعنی گر جانے یا مارنے وغیرہ کی وجہ سے نشان پڑ جانے کا لادارغ ہو جائے)۔
 تو آرنیکا ۱۔ (ایک ڈرام، ایک اونس کے ساتھ ملا کر اُس پانی میں پڑا ہو کر)
 چوٹ والی جگہ پر پیٹی باندھنی چاہئے (کھردری چیز سے زخم ہونے پر آرنیکا
 زیادہ فائدہ کرتا ہے)۔ چوٹ کی وجہ سے رکناٹا۔ الپین۔ چمکھ جانے
 یا حوالا کاٹنے کی وجہ سے) وریس (نروس) (NERVES) کٹ کر درد
 ہونے پر۔ ہالی پیریکیم ۱ (آٹھ گنے پانی کے ساتھ پیٹی باندھنے سے اور ہالی
 پیریکیم ۳ کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے) چوٹ کی وجہ سے زہریلا زخم ہو جا
 سے ہالی پیریکیم ۱۰۔ استعمال کرنا اور پھوڑے پر سینکنا چاہئے۔ تیز دھار
 والے آستے سے کٹنے کی وجہ سے جلد چھل جانے (LACERATED)
 پرٹے فائی سیکریا ۱۔ (دس گنے پانی کے ساتھ پیٹی باندھنا اور سٹے فائی سیکریا
 ۳۔ ۲۔ استعمال کرنا فائدہ کرتا ہے۔ تیز دھار والے لستر سے کٹ
 کر زخم ہو جانے پر یا بارود سے جل کر زخم ہونے پر کیلٹ ڈیولا ۱۔ ۳ قطرے
 دو تولہ پانی میں ملا کر مذکورہ بالا طریقہ سے لگانا چاہئے۔ بارود سے زخم
 زخم یا آبلہ ہونے پر، اگر وہ کسی طرح اچھا ہوتا ہو، خون حراب ہو گیا ہو
 زخم پر شکر لگانا چاہئے۔ جرمی کے ڈاکٹروں نے گزشتہ جنگ عظیم میں
 میں زخمی سپاہیوں کے زخم میں شکر لگا کر اچھا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں نکلتا
 ہے۔ لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ دانہ دار شکر سے زخم کو دس کر کے باندھ دیا
 جاتا ہے۔ شکر کسی پھیلنے والی بیماری کو روک نہیں سکتی۔ جب تک خون نکلتا بند نہ ہو
 جائے تب تک شکر لگانا نہ چاہئے۔ صاف کٹے ہوئے زخم پر شکر کے استعمال کرتے زخم
 بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ بعد وہ ڈرل کر کے وقت زخم کو دھونا
 نہیں پڑتا۔ تین روز کا وقفہ دیکر شکر لگا لیا جاتا ہے۔ جس زخم میں گوشت جوڑنے کی
 ضرورت نہیں رہتی اُس میں بھی شکر سے فائدہ ہوتا ہے۔ جناب ڈاکٹر کارمک چند

پیر، ایم، ای، کے ذریعہ ایڈیٹر سوراہتم سماچاڑ جیشہ ۱۳۳۳ء فصلی۔

دیگر علامات میں بارود X۳۔ (GUNPOWDER) آٹھ گرین مقدار میں
 دایہ میں تین مرتبہ استعمال کرنا چاہیے (THE HOME WORLD)
 (JANUARY 1915 AND FEBRUARY 1915) ملاحظہ ہو

چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو (اچھے سرجن، جراح)
 سے ہڈی ٹھیک جگہ پر بٹھا کر سم فائی ٹم X۱۔ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر
 زخم ہو کر دوسرے دوسرے علامات محسوس ہونے لگیں تو مندرجہ ذیل ادویات
 استعمال کرنا چاہیے۔

بخار، سردی، پیاس، پریشانی، موت کا خوف، اور سہ گرم کے
 علامات میں ایکونائٹ X۳۔ چوٹ ایک ہی جگہ ہو اور کل جسم میں درد ہوتا
 ہو تو آرژنکا X۴۔ چوٹ لگ کر بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور
 ہو جانے پر چائنا ۶۔ یا آرژنکا ۳۔ شکر یا گندھک کا سفوف چوٹ والی
 جگہ پر باندھنے سے خون بند ہوتا ہے۔ اور کٹنے کا زخم بھر جاتا ہے۔ ہلکی
 چیزیں کھانے کو دینا چاہیے۔

بندوق یا پستول کی گولی وغیرہ یا لڑائی کے ہتھیار سے زخمی ہونے پر
 درم کی حالت میں فرم فاس X۱ یا ایکونائٹ X۳ استعمال کرنا چاہیے۔
 خون خراب ہو کر سڑنا شروع ہونے پر ٹیکس ۶۔ اینٹیا ۱۰۔ استعمال
 کرنا اور کیلنڈر یولا کی ترپی باندھنے سے مواد نہیں ہوتا۔ بارود X۳۔
 سفوف (GUNPOWDER) استعمال کرنے کے بارہ میں شروع میں

بیان کیا گیا ہے (چوٹ کا بیان ملاحظہ ہو)۔

جلد کٹ کر بہت تکلیف، کزاز، نکل نہ سکنے کی علامت میں
 ہائی پیریکیم ۳۰۔ ۱۰۰۰۔ بہت فائدہ کرتا ہے۔

صدمہ میں چوٹ:۔ اگر جلد نہ پھلی ہو تو مندرجہ بالا طریقہ سے آرژنکا
 کی پیٹی باندھنا چاہیے۔ لیکن اگر جلد کٹی ہو تو کیلنڈر یولا ۱۰۔ (ساتھ بوند)
 ایک جھٹانک پانی میں ملا کر پیٹی باندھنا چاہیے۔ بخار تمام جسم میں درد ہونے
 پر آرژنکا ۶۔ اور ایکونائٹ ۶۔ (دیکھ بعد دیگرے) کھلانے کی بھی کچھ دواؤں

کی رائے ہے سر میں گہری چوٹ آنے کی وجہ سے اگر مریض بے ہوش ہو جائے تو آر نکاس ۳۔ زبان پر لگا دینا چاہیے۔ جب تک مریض ہوش میں نہ آجائے تب تک اس کو پیکا کر ہوش میں لانا مناسب نہیں ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اگر مریض کو درد ہو تو آر نکاس ۳۔ بخار ہونے پر ایکو نائٹ ۲۔ دینا چاہیے۔

دماغ ہل جانا (CONCUSSION OF THE BRAIN)

سر میں زیادہ چوٹ لگنے، گر جانے وغیرہ اسباب سے دماغ کے فعل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ یا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا نام دماغ کا ہل جانا ہے۔ بالکل یا تھوڑی بے ہوشی، چہرہ میلنا، نبض سرخ، بیقاعدہ، ساه یا ضعیف کمزور اور بے قاعدہ سانس، ہاتھ، پیر، ٹھنڈے، پکارنے پر جاگتا یا جواب دیتا ہو، لیکن فوراً ہی بے ہوشی ہو جاتا ہو۔ وغیرہ۔ اس مرض کا شروع درجہ ہے۔ اس کے بعد زنانہ رواں فعل شروع ہوتا ہے۔ یعنی مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ جسم کی حرارت بڑھتی ہے (۱۰ سے ۱۲) متلی، قے، وغیرہ۔

علاج :- شروع میں آر نکاس ۳x کرنا چاہیے۔ بخار ہونے پر ایکو نائٹ

۳x۔ سر میں درد، مٹھہ تھمایا وغیرہ علامات میں بیلادونام۔ سانس میں گھٹ گھٹا ہٹ ہونے پر، ادیم ۳۔

مریض کو گرم بستر پر لٹایا جائے اور اس کے بغل میں اور ہاتھ پیر کو سینکا جائے۔ پہلے سر نیچا رکھ کر لٹانا چاہیے۔ اسکے بعد (یعنی رد الفعل شروع ہونے پر) سر اور کندھے کو کچھ اونچا رکھ دیا جاتا ہے۔ مریض کو کسی حالت میں کچھ کھلانا پلانا نہیں چاہیے۔

سیاہ داغ :- کبھی کبھی چوٹ والی جگہ سے خون نہیں نکلتا۔

اور وہ جگہ نیلی پڑ جاتی ہے۔ اسی کا نام سیاہ داغ ہے۔ ایسی حالت میں

اگر یہ خون باہر نہیں نکلتا۔ لیکن مجری دمویہ (BLOOD VESSELS)

کٹ کر خون نکلتا ہے۔ اور وہ خون اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس

طرح سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ چوٹ لگتے ہی آر نیکا کی تر پٹی باندھنے پر

اکثر یہ کالا داغ بتیں پڑتا۔ اگر آر نیکا کے استعمال سے کالا داغ نہ اٹھا ہو تو

ہی ملیں گی ترپٹی باندھنا چاہیے۔ اگر کوئی دوانہ ملے تو ایسے داغ کی جگہ کو
حصّہ پانی سے دھو کر نیکھنے سے درد اور سوجن کم ہو جاتی ہے۔

موج :- ہر کی طرح رسی سے پیر کی اٹری، کلائی وغیرہ میں گانٹھ
پڑی رہتی ہے۔ چوٹ لگنے پر وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ
جاتی ہے۔ اسی کو موج آنا کہتے ہیں، چوٹ والی جگہ میں درد ہوتا ہے۔
اور وہ کھول جاتی ہے۔ خاص خاص حانتوں میں آرٹیکا۔ سم فاسٹم، ر ہڈی
ٹوٹنے پر ہائی پری کم، روٹا، وغیرہ، ادویات وغیرہ کھلائی اور
لگائی جاسکتی ہے۔ ایک حصّہ درد نیکھ کر دس گنے پانی میں ملا کر آرٹیکا
وغیرہ دواؤں کا بیرونی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

موج والی جگہ کو جہاں تک ہو سکے بلایا ڈلایا نہ جاسکے۔ دوانہ مل سکے
تو ہڈی اور چونہ دینے پسی ہڈی میں تھوڑا چونہ اور نمک یا شوربہ
ملا کر گرم کر کے لگانا چاہیے (گرم گرم موج کی جگہ پر لگا کر پٹی بندھج)
باندھ دینا چاہیے۔ اس طرح دو تین مرتبہ گرم گرم ہڈی چونہ باندھنے سے
سوجن اور درد کم ہو جاتا ہے۔

مچل جانا :- جسم کا کوئی حصّہ سخت چیز کی معمولی اور گہری چوٹ سے
کٹ نہ جانے پر اس کے خون نہ نکلنے پر اسے کچل جانا کہتے ہیں۔ اس
حالت میں چوٹ والی جگہ کے اندر کا خون بہانے والی چھوٹی چھٹی ٹالیاں
کٹ کر خون جم جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جگہ نیلی یا کالی معلوم ہوتی ہے۔
اندر گہرے تھمے میں چوٹ لگنے پر اس پر مواد پیدا ہو جاسکتا ہے۔

علاج :- ایک حصّہ آرٹیکا ۱۰۔ دس حصّہ پانی کے ساتھ چوٹ کی جگہ پر
پٹی باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پٹی کے اوپر لیٹا کا پتہ اور
کپڑا باندھنا چاہیے۔ بخار یا جسم کے دوسرے حصّہ میں درد محسوس
ہونے پر آرٹیکا X۲۰ کا استعمال کرنا مناسب ہے۔ چوٹ والی جگہ کے
چاروں طرف چھوٹی پٹیاں نیکھنے پر اور جگہ کالی پڑنے پر بھی ملیں ۱۰
ایک حصّہ پانی چھ حصّہ میں ملا کر آرٹیکا کی طرح پٹی باندھنا چاہیے۔

ٹھہری میں چوٹ لگنے پر، بروٹا XI۔ پستان یا گلچ میں چوٹ ہونے پر کوئیم
 X۳۔ مواد پڑنے کا اندیشہ ہو، ہیسپر سلفر ۳۰۔ سٹرناس شروع ہونے پر آرٹک
 ۳۰۔ یا سلکا ۳۰۔ دینا چاہیے۔

تیز صدمہ (SHOCK) تیز چوٹ یا دماغی تحریک سے
 قوت زلیست کے سست ٹر جانے کا نام تیز صدمہ ہے۔ ششکاکو کے مشہور جن
 ڈاکٹر ہوورڈ کرشٹر (DR. HOWARD CRUTCHER) فرماتے ہیں کہ تیز
 صدمہ کی تین خصوصیات ہیں، کیفیہ، کاربووج اور وریٹرم الیم جسم
 سرد ہونے پر، کیفیہ جسم نینا ہونے پر کاربووج، سر پر ٹھنڈا پسینہ نکلنے
 پر وریٹرم ایلیم فائدہ کرتا ہے۔ چھیل صاحب کا بیان ہے کہ دل اگر
 دوب جائے تو وریٹرم ایلیم کا استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ہیوز فرماتے ہیں کہ تیز صدمہ میں اگر تسج کے سخت جلیں کی غیر
 طبعی تحریک معلوم ہو تو ایسی حالت میں وریٹرم ایلیم کی جگہ آرٹک ۳۰
 طاقت کا بہت فائدہ کرتا ہے۔

سواری پر گھوڑے کے وقت قحہ۔ گاڑی، پانکی، ریل، سٹیم ناؤ۔
 وغیرہ سواروں پر چڑھنے سے کسی کسی کو تیز قحہ ہونے لگتی ہے، کاکبوس،
 ۱۳، ۲۰۰؛ اس کی مفید اور کارآمد دوا ہے۔

پاگل کتا اور سانپ کا ٹٹا۔ کٹی ہوئی جگہ کا بالائی حصہ رسی
 سے باندھ لیتا چاہیے۔ اس کے بعد جس کے دانتوں میں کوئی بیماری نہ ہو،
 اس کو یہ مقام چوس لینا چاہیے۔ اور اسی وقت کاٹک یا گرم لوہے سے
 اُس مقام کو جلا دینا چاہیے، یا تیز چھری سے اُس کے گرد کی جگہ کاٹ دینا
 چاہیے۔ مفصل علاج کے لئے سانپ کا ٹٹا ملاحظہ ہو۔

پاگل کتا کاٹنے پر سات دنوں کے اندر نزدیک کے ضلع یا سب ڈویژنل
 گورنمنٹ ڈسپنسری میں جا کر دو ہفتہ تک دوا انجکشن روزانہ اٹھائیں
 انجکشن لینے پر موت کا خوف نہیں رہتا۔ پاگل کتا، سیار، بندر وغیرہ
 کے کاٹ لینے پر دنوں کے اندر اگر موت نہ ہو جائے تو سمجھنا چاہیے وہ جانور

پاکل نہیں تھا۔

سکیر آکاٹنا۔ بھونرا، بر، بھو، کن بھو، وغیرہ کاٹنے پر کٹی ہوئی جگہ سے اس کا ٹرنک چھری سے نکال دینا چاہیے۔ اسکے بعد اسپرٹ کیف، سون کا تیل یا کراسن تیل یا تباکو یا حقہ کا پانی یا نمک ملا کر ایک عرق پیالہ لگا دینا چاہیے۔ زیادہ سوچنے پر ایسے ۶۔ استعمال کرنا چاہیے۔ بھو کاٹنے پر زمین قند کا سفوف یا اروئی کے درخت کا سفوف لگا دینا چاہیے۔ پتھر کھس یا کوئی دھیر ملا کاٹا پر یا بر منی لگ جانے پر اگر کوئی حتمہ زیادہ پھول جانے اور وہاں درد ہو تو اس جگہ پر پہلے اسپرٹ کیف یا لیمون کا عرق لگا کر ملنا چاہیے۔ اسکے بعد چونا گرم کر کے لگانا چاہیے اور ایسے ۶۔

استعمال کرنا چاہیے۔ مچل کا کاٹنا اگر جانے سے درد معلوم ہوئے پر گرم پانی میں شوریا نامک ملا کر چوٹ والی جگہ کو اس میں ڈبو رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مدھ مچھی کاٹنے کی وجہ سے اگر خرابی ہو تو کاربوئک ایسڈ ۱۲x۶۔ استعمال کرنے سے فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ شویا پوک ملنے پر وہاں کان چھڑا، ۳۲ مدھو درخت کے پتے کا عرق ملا پھوڑ کر لگا دینے سے پھر کوئی خرابی کا خوف نہیں ہوتا۔

اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو گولر یا اروئی کا پتہ یا چھری سے گھس کر وہاں چونہ لگا دینا چاہیے۔ کڑا اگر کاٹے تو گھی میں نمک ملا کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چوہا کے کاٹنے پر لیڈم اچھی دوا ہے۔ معمولی کتے کے کاٹے ہی کافی ہوئی جگہ گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر اس جگہ کو کاٹشک

ملا کیلنڈر یولا اور لیڈم کے بھی استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نشتر

ANSHULZ IN HOM-

دیکھیے (RACODER FOR AUG 1916. (VINEGAR)

(۱) شویا پوک لگنا بہت خراب ہے۔ اس کے لگنے پر کبھی کبھی عضو سڑنے لگتا ہے

(۲) کان چھڑا درخت کا دوسرا نام دھولا ہے یا کرنا، استنوا، ہے۔

(۳) مدھو کا درخت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ دیواروں پر پیدا ہوتا ہے۔

اس کا پھول بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے زرد رنگ دیکھنے میں گتیر کے پھول کی طرح لڑکے اس بھل کو چوتہ کر اس کا دس پتے ہیں۔

سے جاتا۔ بریکٹ آف یوٹاشن کاسٹون چھڑک دینا چاہیے۔ کتا۔ سیار وغیرہ کے کاٹنے پر لوہے کی کسی چیز کو آگ میں سُرخ کر کے اس سے سینکنا چاہیے اور اسٹرامونی ایم، x۳۰ کی جگہ پر کئی مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک ہفتہ تک تھوڑا کرکڑن میں تین دفعہ کھانا چاہیے، پاگل کتا یا سیار کاٹنے پر کتے کا یا گل پن، ملا خطہ ہو،

کسی کڑا یا کچھو کاٹنے پر :- اگر کہیں کھونے کاٹا ہو تو اس کے مخالف جسم کے کان میں دینے کسی کو دائیں حصہ جسم میں کاٹا ہو تو بائیں کان میں بائیں کان میں کاٹا ہو تو دائیں کان میں (تھوڑے گرم پانی میں کچھ تک مل کر کے چار مرتبہ ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے) اگر چار، پانچ مرتبہ ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو تھوڑے گرم پانی میں صابن کا پھین نکال کر اس میں تھوڑی شکر ملا کر چار، پانچ مرتبہ اس کو کان میں ڈالنے سے یہ سب جلدیں اور تکلیف فوراً دور ہو جاتی ہے۔ اور بہت کار آمد ہوتا ہے۔

ناک، آنکھ یا کان میں کیسٹرا جانا :- آنکھ میں راکھ یا دھول پڑنے پڑ۔ ملائم کاغذ کی تلی بنا کر اس کو گرم پانی میں ڈبو کر اس سے دھوئیں یا راکھ نکال لینا چاہیے۔ دوسری آنکھ اگر پڑے رہے تو کئی کئی بار یا بال آنکھ میں پڑنے پر پلک کو الٹ کر صاف کیرے کی نوک سے اس کو باہر نکال لینا چاہیے۔ آنکھوں کو کھول کر بھی رگڑنا نہ چاہیے۔ آنکھوں میں چونہ، کوکڑ، یا تبا کو کی خاک گرنے پر فوراً آنکھوں میں دی یا ۲ قطرے سے کہ نصف آؤٹس گرم پانی میں ملا کر آنکھیں دھو ڈالنی چاہیے۔ چونے کاسٹون جمانے پر

کیلند یو لادس قطرے (ورنہ لیون کا عرق) ایک چھٹانک بانی میں ملا کر آنکھوں پر پٹی باندھنی چاہیے (خالص پانی سے آنکھیں نہ دھوئی جائیں) آنکھیں خراب ہوسکتی ہیں، بانو یا کسی دھات کے ذرات آنکھ میں پڑنے سے انڈے کا سفید حصہ لگانا پڑتا ہے۔ کان میں کڑی یا سفوف جمانے پر نیم گرم پانی کی پچکاری سے وہ نکل جاتا ہے۔

کان میں کیرا جاسے پر گرم تیل کان میں ڈالنے سے کیرا مر جاتا ہے۔

بیج یا اور کوئی چھوٹی چیز ناک یا کان میں جالے پر بڑی ہوشیاری سے چھی
 ے اُسکو باہر نکال لینا چاہیے۔ (ناک میں کپڑا وغیرہ داخل ہونا، کا باب ملاحظہ ہو)
 ناک، کان، یا آنکھ سے بال وغیرہ نکلنے پر اگر آنکھیں انیسٹھتی ہوں، تو
 آرنیکا ۳۔ استعمال کرنا چاہیے۔

سانس بند، پانی میں ڈوبنے، پھانسی لگانے یا زہریلی پھاپ
 جسم میں داخل ہونے پر اور پاس کی جگہ پر چلی گئے سے یکایک سانس رک جاتی ہے۔
 علاج :- (۱) پانی میں ڈوبنے یا پھانسی لگانے کی وجہ سے سانس رکنے پر،
 (۱) پہنے ہوئے کپڑوں کو اُتار کر ہاتھ پیروں کو گرم گرم سینک دینا چاہیے۔
 (۲) پھیپھڑے سے پانی نکالنے کے لئے مریض کو پٹ لٹا کر جسم کا درمیانی حصہ
 اس طرح اوجھار رکھنا چاہیے کہ سر نیچے کی طرف ٹٹک پڑے۔ پیٹ اور سینہ
 کو ہاتھ سے دبا کر رکھنا چاہیے۔



اس کے بعد مریض کو چیت لٹا کر دونوں ہاتھوں سے اُس کی دونوں کہنی
 اوپر کو اور اچھی طرح پکڑ کر ایک بار اوپر چھوٹکا دے کر اُٹھانا چاہیے۔ اس کے
 بعد دونوں کہنی موڑ کر سینہ پر آہستہ آہستہ لیکن کس کر دبا رکھنا چاہیے۔
 (۳) رد مال یا رسی کے ساتھ اسپین کی مدد سے زبان کو کھینچ کر باہر نکال کر
 مریض کے دونوں نتھنوں کا سیدھا رخ نہ کر کے اس کے منہ میں نمی صرتبہ زور

میں پھونکنا چاہئے، پندرہ بیس مرتبہ اس طرح کرنے سے سانس کی حرکت



شروع ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اوپیم ۳۰۔ دینا چاہیے۔ اگر اوپیم سے



فائدہ نہ ہو تو اٹم ٹارٹ ۳۰۔ یا ایکس ۳۰۔ دینا چاہیے۔
 رائے بہ خدمت کرنیوالوں کو کسی طرح نا امید نہ ہونا چاہیے۔
 دیکھا گیا ہے کہ کئی گھنٹہ تک استقلال سے مریض کی اس طرح خدمت
 کرنے پر سانس چلنے لگتی ہے۔
 (۴) سانس چلنے لگے تو مریض کو گرم بستر پر لٹا کر گرم پانی میں ایک
 دو قطرہ مشراب پلا دینا چاہئے۔

(ب) بجلی گرتا۔۔۔ سے سانس رُک جانے پر ہوا اور گلہ میں بے ہوش آدمی کو غفلت کی حالت میں تکیہ کے سہارے بٹھالنا چاہیے اور چہرہ سینہ کندھوں پر چڑھ کر پانی کا چھینٹا دینا چاہیے۔ اس کے بعد سوزج کی طرف اُس کا منہ کر کے نئی مٹی کھود کر اُس مٹی سے دھبہ کر آرنیکا دینا چاہیے۔ سر اور چہرہ کو چھوڑ کر کل جسم کو ڈھک دینا چاہیے۔ اس طرح کچھ دیر رہنے پر وہ ہوش میں آسکتا ہے۔ لیکن اتنا کرنے کا بھی اگر موقع نہ ہو تو جسم پر کھنڈے پانی کا چھینٹا دینے سے ہی کام چل سکتا ہے۔ لیکن ہوشیار! بھڑ سے ہوا بہت دیر ہو کر اُس کے تنفس میں نقص نہ ہو جائے، مریض میں تنگی کی طاقت جب آجائے تو اسے نکس واسیکا۔ ۳۔ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بجلی کی چمک سے دیکھنے کی طاقت جاتی رہے تو فاسفورس ۳۰۔ دینا چاہیے۔ یہ کار آمد ثابت ہوا ہے۔

(ج) سٹرا پاخانہ، موری وغیرہ کی زہریلی بھاپ کی وجہ سے سانس بند ہونے پر مریض کو فوراً کھلی ہوا میں لا کر پانی میں ڈوبے ہوئے انسان کی سانس رکنے والا طریقہ کام میں لانا چاہیے۔ ہوش میں آجانے پر گاڑھی کافی پلانا۔ اور سر اور سینہ پر سرکہ لگانا چاہیے۔

سردی گرمی :- مریض کے کپڑے ڈھیلے کر کے مریض کو سایہ میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد برف کا ٹھنڈا پانی اُس کے سر پر ڈالنا چاہیے۔
(مفصل حالات کے لئے سردی، گرمی، ملاحظہ ہو۔)

بیہوش ہونا :- قوت ارادی اور عضلات کی کمی کے ساتھ بالکل یا تھوڑی غفلت ہو جانے پر اسی کا نام بے ہوشی ہے جسم کے خون کا زوال یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے دماغی احساس (جیسے خوشی، رنج، خوف وغیرہ) زیادتی، ہیشیا وغیرہ اسباب سے بیہوشی ہو کر آتی ہے ایسے بھی درلے والے (دور پوک) لوگ موجود ہیں۔ جو کسی کے جسم کے خون نکلنے یا کسی کو چوٹ لگنے یا دیکھتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
علاج مختصر :- (۱) بیہوشی کے وقت رو بہی میفر (۲) ہوتہ خالی کا فور

یا مکس X۲۔ (کستوری) سو نگھاڑ اور ایکونائٹ X۱۔ استعمال کرانا (۳) کمزوری کی وجہ سے چائنا X۲۔ آرس X۲۔ آیوڈ X۴۔ ور۔ ۷ ور۔ X۲۔ (۳) دار کی بیماری کی وجہ سے بے ہوشی، ماکس X۳۔ ڈیجی ٹے لس X۳۔ ورا ٹرم ورائیڈ X۳۔ (مجرئی دمن کی بیماری کے بیان میں بے ہوشی ملاحظہ ہو۔

(۴) بیٹے یا کی وجہ سے بے ہوشی۔ مرض ہیمپریک دوا میں ملاحظہ ہوں) بے ہوشی ہوتے ہی، نزدیک والے آدمی بغیر اگر بھی نئی آفت بپا کر دیتے ہیں، اگر بے ہوشی کا سبب مہلک ہو تو مریض کے لئے بے ہوش ہوتے ہی اسکا گلا سینہ، اور پیٹ کا کپڑا ڈھکیا کر دینا چاہیے۔ اور اسی وقت اسے اس طریقہ سے لٹا رکھنا چاہیے کہ جس میں اس کا سر اس کے گلہبم سے نیچے جھکا رہے (یعنی اس کو چپٹ دٹا کر اس کے منہ، سر گردن کے پیچھے اور پیٹ کے ادھر سرد پانی کا تھنڈا دینا اور ہوا کرنا چاہیے۔ اگر اس سے فائدہ نہ ملے تو اس کو سیرٹ کیمفر یا کستوری سو نگھاڑا چاہیے۔ اگر بے ہوشی کی وجہ معلوم ہوئے تو حسب ذیل ادویات میں سے علامات کے مطابق دیا جائے۔

سخت دلی تکلیف، اگر بے ہوشی ہو تو کیوٹا ۶۔ رنگ کو دیا رکھنے کی وجہ سے اگر بے ہوشی ہو تو آگنیشا ۶۔ زیادہ غصہ کی وجہ سے بے ہوشی ہو تو ایکونائٹ ۳۔ خوف کی وجہ سے بے ہوشی ہو تو ایکونائٹ ۳۔ یا اویم ۳۔ خون کے زائیں ہونے کی وجہ سے بے ہوشی ہو تو چائنا۔ عشق میں نا اُمیدی کی وجہ سے مُردہ کی طرح پڑے رہنا۔ لیکے سس ۶۔ سینہ نہ آنے کی وجہ سے بے ہوشی ہونے پر کاکیولس ۶۔ درد کی وجہ سے بے ہوشی ہونے پر ایکونائٹ ۶۔ کیوٹا ۶۔ کافیا ۶۔ وریٹرم ایلپ ۶۔ شراب پینے یا تیز ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو تو نکس رامیکا ۳۔ بہت پارڈ (MERCURY) استعمال کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو تو کالہ بوج ۳۔ جسم میں کچھ درد ہو کر بے ہوش ہو تو اپیکاک ۳۔ سر جکڑ کھا کر بے ہوش ہونے پر کیوٹا ۶۔ سیر ۶۔ گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہونے پر اپیکاک ۳۔ لیکن گرنے کے بعد اخراج خون کی وجہ سے بے ہوش ہو تو چائنا ۶۔ نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہونے پر پہلے پہلے بونڈ بونڈ گرم دودھ

اس کے بعد ہوش میں آنے پر شور بہ وغیرہ دیا جاسکتا ہے۔ سردی یا برف کی وجہ سے جسم جکڑ گیا ہو تو مریض کو کھلی ٹھنڈی جگہ میں لا کر خوب ٹھنڈا پانی یا برف دیکر رگڑنا چاہیے۔ خبردار! آگ سے سینہ سینکا نہ جائے۔ سینکے سے موت آسکتی ہے) جسم کے نکل جھٹہ نرم اور سرخ ہونے پر اس کو خشک بستر پر ٹٹا کر ٹھنڈے فلائین یا پرائے صاف کپڑوں سے برابر رگڑنا چاہیے۔ اور دس تا پندرہ منٹ بعد ایک دو بوند اسپرٹ کیسٹرا استعمال چاہیے۔ ہوش میں آنے پر کاربووج ۳۰-۳۰ آرٹک ۳۰-۳۰ یا اکوناٹ ۱۰-۱۰ استعمال کرنا چاہیے؛ دماغ کی کسی تیز تبدیلی کی وجہ سے یکایک ہوش ہو جانے پر اگر چہرہ زرد ہو تو اسے ۶ یا گلوٹائین ۶ استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کے گرم کپڑے ہوش میں سانا ۲۰۰-۲۰۰ وغیرہ دوائیں دینا چاہیے۔ ہوشیار اگر ہوشی دور ہونے کے بعد تے شروع ہو تو اسکو روکنے کے لئے روانہ دی جائے یا مریض کو نیند آنے پر اسکو جگایا نہ جائے۔

امراض اعصاب اور بے ہوشی (FAINTING) ملاحظہ ہو۔
 نہ ہر کھانا:۔ یہ معلوم ہوتے ہی کہ نہ ہر کھایا ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس درمیان میں مریض کو تے کر اگر پیٹ سے نہ ہر نکال دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ذیل ادویات میں کوئی ایک دوا کھلا کر تے کرائی جاسکتی ہے۔ (۱) گلے میں آٹھ گلی یا تے کے ذریعہ سے
 (۲) ایک پاؤ گرم پانی میں دو پیچ نمک (یا ایک پیچ سرسوں کا سفوف لا کر پلانا چاہیے۔

(۳) چوٹے دھوئے پانی کا پلانا۔

(۴) انڈے کا سفید حصہ گرم دودھ کے ساتھ پلانا۔

(۵) ۵، ۵، ۵ گرین تو تیا (۳ گرین سفوف) ایک ایک یا ۳ گرین سلف آف زینک) نیم گرم پانی میں حل کر کے پلانا چاہیے۔

تے کے ساتھ نہ ہر نکل جانے پر اس نہ ہر کا تریاق (اٹا زہر) کچھ روز تک کھلانا چاہیے۔ مروجہ بارہ قسم کے نہ ہر کا تریاق صنفی بن مندرج ہے

زہر
ایڈ (ٹائٹریک) وغیرہ
شراب (الکوحل)
سنگھیا (آپٹیک)
توتیا وغیرہ تانبائی دوا۔ سیندور و پیکور
پارہ وغیرہ سے بنی دوا

تارپین کا تیل (TURPENTINE)
جمال گولیا کا تیل (CROTON OIL)
سیسہ (LEAD)

ادیم
دھتورا
تبکو
کافور
بل ۱۰۔ گاڑھی کافی یا پانی ملا سرکہ
کافی، سرکہ یا لیمونینڈ
ایپیکاک، یا سرکہ
کافی کافی یا ادیم X۳۔

افیون زہر کی مقدار میں :- آج کل اس ملک میں ادیم جان دینے کے کام میں آتی ہے۔ اسلئے یہ مضمون علیحدہ رکھنا پڑا۔ شروع میں زہر کھانا کے بیان میں مندرجہ ذیل طریقے سے پیٹ زہر سے صاف کر لینا چاہیے۔ زہر نکل جانے پر دس بوند سیلا ڈونا ۱۰۔ ہر آدھے گھنٹہ پر استعمال کرانا چاہیے۔ اسکے بعد گاڑھی کافی یا پانی کے ساتھ (VINEGAR) سرکہ پلانا مناسب ہے۔ اسکو دیر تک سونے نہ دینا چاہیے۔ پیٹھ پر مار کر اس کو گھر میں دوڑانا چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر وہ طریقہ علاج جو ڈوبنے کی وجہ سے سانس رکنے کے بیان میں لکھا گیا ہے۔ کام میں لانا چاہیے۔

گلے میں مچھلی کا کانتھا وغیرہ اکٹھا کر۔ پھل کا تیز کاٹیا لکڑی کی سنگ لکے میں اٹک جانے پر روٹی، چاول، کبیرا وغیرہ سخت چیز نکلنے کے ساتھ وہ بھی نیچے اتر جا سکتی ہے۔ گوشت کا کڑا یا کوئی دوسری بڑی لیکن ملائم چیز گلے میں اٹکنے پر گلے میں انگلی ڈال کر کھیل دینے سے

وہ پیٹ میں اتر جاتی ہے، کھردری اور سخت چیز نگے میں اٹکنے پر گلے میں
 انگلی ڈال کرتے کرتے سے وہ منہ کے راستہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ چھوٹی چوٹی
 سے بھی نکالی جاسکتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر شتر لگانے والی مدد لیتی چاہیے۔
 مچھلی کا زہر :- کچھ قسم کی مچھلیوں کے کھانے سے جسم میں زہر کا اثر
 معلوم ہوتا ہے، بھڑی ہنکی زہریلی علامت میں لکڑی کا کوئلہ پیس کر
 گڑ کے ساتھ کھانا یا شکر کا گاڑھا شربت یا کالی کافی یا برابر کے مقدار میں
 پانی کے ساتھ سرکہ (VINEGAR) پینا مفادہ کرتا ہے۔ لیسکر
 جسم سرنج، چہرہ اور دونوں ہاتھ سوچے، گلے میں زخم وغیرہ میں پیلا ڈونا
 x۲ یا کیپکم x۳ - دینا چاہیے۔

بیماری پھیلائی والی مچھلی یا مکھی کا فساد بند کرنا
 تازہ پانی مار تھیم کاسفٹ (PYRETHRUM POWDER) کرہ میں رکھ دینے سے
 یا جس دودھ میں پندرہ فیصد فارملین (FORMALIN) ہو، اس کے
 ساتھ کریسول (CRESSOL) ملا کر مکان میں جلانے پر مکان مکھی سے
 پاک ہو جاتا ہے۔

(THE ADDRESS GENL VAILLARD PRESIDENT OF
 THE - HEALTH BOARD OF THE FRENCH ARMY - TO THE
 ROYAL SOCIETY OF MEDICINE IN LONDON. SUMMARISED
 IN THE "INDIAN DAILY NEWS" DATED FEB. 13-1915)

سانپ کا ٹسنا :- سانپ کاٹتے ہی کاٹی ہوئی جگہ کے کچھ اوپر
 فوراً خوب کس کر ایک کے اوپر ایک تین جگہ باندھ دینا چاہیے۔ بندھن
 اتنا کسا ہوا ہونا چاہیے کہ خون کا دورہ بند ہو جائے۔ (یعنی بندھن کے
 نیچے کا خون کا دورہ معلوم، اس کے بعد چھڑی یا کسی تیز آلہ سے جہاں
 سوراخ ہو گیا وہاں سے سفوف پانی رسیخرم کو کرہ میں سلگا دیتے ہیں۔ اس
 سے زیادہ دھواں نکلتے پر پھر اور کبھی مر جاتی ہیں۔ دس مرلج فٹ
 کے کرہ کے لئے ایک بار سفوف کی ضرورت ہوتی ہے۔

جہاں دانت کا نشان ہو وہاں دوا بخ لیا اور آدھ انچ گہرا شتر لگا کر انگلی سے اسے چیر کر پھانک کر دینا چاہیے۔ اگر وہاں زہر ہو گا تو سرخ پانی کی طرح وہاں سے ایک پتلی چیز نکلتے گی، زیادہ خون نکلنے پر دونوں طرف آہستہ آہستہ دبانے سے خون بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک گرین پریسکینٹ آف پوٹاس ٹھوس پانی یا تھوک میں حل کر کے اس کا ٹی ہوئی جگہ پر رگڑنا چاہیے۔ اس طرح کچھ دیر رگڑنے سے وہ جگہ سیاہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کپڑے کی گدی رکھ کر باندھ دینا چاہیے اور وہ تینوں بندھن کھول کر دینا چاہیے مرنے کو اس طرح بٹھانا چاہیے کہ وہ سو نہ جائے۔ سانپ کاٹنے کے بعد اس طریقہ عمل سے جان بچ سکتی ہے، تھوڑا پر میگنٹ آف پوٹاس ہر مکان میں رکھنا چاہیے۔

حب ذیل چار طریقوں کی آزمائش بھی کرنی چاہیے۔

(۱) زخم کی جگہ کے اوپر تک کی پوٹلی سے سینکنا۔ گرم پانی میں ڈالنے سے خون نکلتا رہے گا۔ جب تک صاف سرخ خون نہ نکلے، اس وقت تک یہ عمل بند نہ کرنا چاہیے (۲) زیتون کا تیل کھلانے، اور لگانے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ (۳) دنا پور ضلع کے اندر پنچلی کا مٹی کے محکمہ کے خلیج ننگال کے نزدیک بالو کی زمین میں ایک قسم کا بادام پیدا ہوتا ہے۔ اسے نچتہ پھل کے بیج کا مفید معمولی کام میں آتا ہے اور اس کے پھلکے کا عرق رینڈی کے تیل کی طرح جلانے کے کام میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل سانپ کاٹنے کی اچھی دوا ہے۔ اس پھل کا مضر نصف پاؤ سانپ کے کاٹے ہوئے آدمی کو کھلانے سے فوراً اچھا ہو سکتا ہے۔

(۴) عرق درخت کیلا یا عرق تیل سی پلا نامفید و کار آمد ہے۔ (۵) مار گزیدہ کا طریقہ علاج۔ جسم میں زہر داخل ہونے پر ایک قسم کی رال پیدا ہوتی ہے۔ اور منہ سے لیسار رطوبت آنے لگتا ہے۔ جب اس رال سے سانس بند ہوتی ہے اس وقت موت ہوتی ہے۔ رال پیدا ہوتے ہی چھڑا یا انگلی ڈال کر اسے نکال دینا۔ ایسے تھوڑا تھوڑا گرم پانی پلا کرتے کرانی چاہیے۔ اسی۔ اس کو تیار یا چھڑے کا پانی ملا کر فے کرانی

چاہئے۔ اہلی، املتاس، یالیسون وغیرہ استعمال کرانے سے زہر کے مار ڈالنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔

مریض کے جینے کی اُمید نہ رہنے پر "جل سار" سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مریض کو بٹھا کر نیم گرم پانی چار پانچ لمحوں کی اونچائی سے چالیں پچاس گھڑا پانی جسم پر (جب تک لرزہ پیدا ہو جائے گا۔ لگاتار ڈالتے رہنے کا نام "جل سار" ہے۔ جب تک مریض کا جسم بالکل زہر سے بری نہ ہو جائے تب تک پانی ڈالتا بند نہ کرنا چاہیے۔

مریض سوئے نہ پائے۔ اس بات پر ہوشیاری سے نظر رکھنا چاہیے (۹) کسی گھوڑے کو زہریلے سانپ سے کٹوا کر ان کا خون کسی سانپ کے کاٹے انسان کے (کاٹنے سے ایک گھنٹہ کے اندر) جسم میں خون کے ساتھ ملا دینے سے سانپ کا زہر رخص ہو جاتا ہے۔ زمانہ موجودہ کے معالجوں کی رائے سے سانپ کے کاٹے کی یہ ہی تیر بہدت دوا ہے۔ (ملاحظہ ہو۔)

(THE INDIAN AND EASTERN DRUGGISTS FOR DEC. 1922)

بڑی ٹوٹنیا اکھڑنا

(FRACTURES & DISLOCATIONS)

جاننے کے قابل چند باتیں :- چوٹ وغیرہ کی وجہ سے مریض کچھ دیر تک بے ہوش مُردہ کی طرح پڑا رہ سکتا ہے۔ اس حالت میں اُس کی تیمارداری اچھی طرح کی جائے تو ہوش آ جاتا ہے۔ اسلئے ایسے حادثہ کے موقع پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ مریض مر گیا یا زندہ ہے۔ بالکل ہی بیکار ہے۔ ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر نہایت ہوشیار معالجوں کو بھی یہ تشخیص کرنا کہ مریض زندہ ہے یا مُردہ بہت دشوار ہے۔

یہ ایک چوٹ لگنے پر خون نکلنے کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ بہت خون نکل جانے کی وجہ سے آسانی سے موت واقع ہوتی ہے۔ اسلئے سب سے پہلے اخراج خون کے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسلئے بعد دوسری باتوں پر خیال کرنا چاہیے۔ جس جگہ پر زخم ہو گیا ہو سب سے پہلے اُس جگہ کو

صاف پٹریا یا بورک کا ٹن یا پٹی سے ڈھک دینا چاہیے۔ تاکہ اس میں خراب جراثیم دخل نہ پاسکیں۔

اس کے بعد نزدیک کے کسی قابل معالج کو مدد کے لئے بلا لینا چاہیے۔ اگر معالج کی مدد ملنے میں دیر ہو تو خود ہی مریض کی خدمت کرنا چاہیے۔ اگر مریض بے ہوش نہ ہو جائے تو اس کا دل خوب بڑھائے رہنا چاہیے۔ اور غوراً ہی آرام ملنے والی جگہ پر لیجانا چاہیے۔ اگر ایک ہاتھ ٹوٹ گیا ہو تو مدد کرنے والے کو اس کے اچھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو کر اس کے اچھے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ اور دوسرے ہاتھ سے مریض کی کمر پکڑ کر مریض کو لکڑی پر یا رکھ کر چلنے کی ہدایت کی جاسکتی ہے۔

پیر میں چوٹ لگنے پر مریض کو چلنے دینا مناسب نہیں ہے۔ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں دو آدمیوں کو آمنے سامنے کھڑے ایک کا دایاں ہاتھ دوسرے کے بائیں ہاتھ سے کس کر پکڑ لینا چاہیے۔ اور اس پر مریض کو بٹھانا چاہیے۔ اور مریض کے دونوں ہاتھ مددگاروں کے کندھے پر رکھ آسانی سے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جاسکتے ہیں۔ کھٹنیا ران کے نیچے کی جگہ میں چوٹ لگنے پر ایک مددگار کو مریض کے دونوں ران کے درمیان ہاتھ دیکر مریض کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مددگار مریض کے پشت اپنے سینہ پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاسکتے ہیں۔

بے ہوش مریض کو یا جن مریضوں کے کمر اور ران کے بالائی حصہ میں اور سر میں چوٹ آگئی ہو اور اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام میں لے جانا ہو تو دو چار پانچ ہاتھ لمبے سخت بانس یا تختہ میں ایک سے دو ہاتھ چوڑے کئی بانس باندھ کر ایک میٹر ہی کی طرح بنالینا چاہیے۔ یا نزدیک کے کسی مکان سے ایک میٹر ہی مانگ لینا چاہیے۔ اس پر ایک توشک بچھا کر اس پر مریض کو بے ہوش بنا دینا چاہیے اس طرح اس کو بغیر تکلیف کے جگہ معینہ پر لے جاسکتے ہیں۔ اگر گتائی نہ ملے تو صرف میٹر ہی پر یا اگر میٹر ہی نہ ملے تو ایک تختہ پر لٹا کر اس کو لے جایا جاسکتا ہے۔ اگر یہ سب انتظام نہ ہو سکے اور اندیشہ ہو یعنی مریض کا کوئی

فائدہ نہ دکھائی دے۔ مددگار تنہا ہو تو مریض کو اپنی پیٹھ پر لے کر اس کے دونوں کندھوں کے اوپر سے آگے کی طرف ملا۔ ذرا اونچا ہو کر چلتا ہو مریض مریض کو دوسری جگہ لے جاسکتا ہے۔ اگر مددگار دو ہوں تو ایک ایک دونوں طرف پیٹھ کر دونوں کو نمایاں ہاتھ مریض کے کمر کے نیچے لگا کر دونوں ہاتھ سے مٹھی باندھ کر پکڑ لینا چاہئے۔ اور ایک کا دایاں ہاتھ مریض کے سر کی طرف اور دوسرے کا دایاں ہاتھ سر کی طرف رکھ کر مریض کو مقام پر پہنچایا جاسکتا ہے۔ اگر مریض کے تمام جسم میں چوڑا آٹھی ہو، اور سیڑھی، جھولا، چوکی نہ ملے تو پاس کی کسی جگہ سے دو چھ ہاتھ لمبے بانس یا لکڑی اگر یہ بھی ملنا ممکن نہ ہو تو ایک ہی بانس یا لکڑی لے کر مریض کو اس بانس یا لکڑی سے کپڑا کے ذریعہ باندھ کر سہٹایا جاسکتا ہے۔ کپڑا کی کمی ہو تو مدد کرنے والے کی دھوتی یا کپڑا بھار کر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔

اتفاقہ چوڑا وغیرہ کے وقت مددگار کا پہلا فرض ہے۔ تیزی سے کام کرنا اور گھبرانہ جانا۔ اگر مدد کرنے والا خود ہی گھبرا جائے گا تو کوئی بھی کام نہ ہو سکے گا۔ خرافات کام یا شور و غل کرنے سے مریض کو نقصان کے سوا فائدہ نہ پہونگا۔ اس سے مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔

اگر مریض بے ہوش نہ ہو جائے تو اس کو آہستہ آہستہ ایک پیالہ گرم چائے یا گرم دودھ یا تھوڑی مشراب پانی میں ملا کر پالا دینا چاہئے۔ اس سے مریض کی تکلیف گھٹ جاتی ہے اور رواں فعل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔

جو اس کھو دینے پر، آنکھ، منہ پر پانی کا چھٹیا، سر پر نیکچے کی ہوا اور ممکن ہو تو اسلنگ سالٹ یا ایوینیا سوگھا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہوش و حواس خائب ہونے یا موجود رہنے میں کسی حالت میں بھی مریض کے چاروں طرف بیکار بھڑ نہ ہونا ہونا چاہئے۔ بھڑ ہو جانے سے آدمیوں سے مدد تو نہیں ملتی۔ بلکہ اس کے بدلہ مختلف دوائیں دے کر لوگ مریض اور مددگار کو طرح طرح کی ہدایت کرتے اور گھبرا دیتے ہیں۔

ہڈی ٹوٹنا (FRACTURES)

اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہاتھ پیر کی انگلیاں ٹوٹ جائیں یا اس جگہ کی جلد کٹ کر خون نکلنے لگے تو پہلے تھوڑا گرم پانی اگر نہ ملے تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ عرق کیلنڈیو لالہ لگا کر کپڑے یا روئی سے اس مقام کو آہستہ آہستہ دھو ڈالنا چاہیئے۔ اس کے بعد اس شخص کے درست حصہ کے ساتھ یا دوسرے شخص کے اچھے حصہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیئے کہ اس جگہ کی ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں۔ اگر دوسرے حصہ میں چوٹ لگی ہو تو حرکت دینے اور درد وغیرہ کے ذریعہ ہڈی ٹوٹنے کی تشخیص کرنی پڑتی ہے۔ برف یا ٹھنڈے پانی کی پٹی باندھنے سے اخراج خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اور سوزش بند ہو جاتی ہے۔ زخم کو صاف کر کے انگلی چھوٹی ہونے سے اس پر تھوڑی روئی لگا کر آدھ انچ سے ایک انچ چوڑا صاف کپڑا پیٹ کر سینڈج باندھنا چاہیئے۔ اگر انگلی بڑی ہو تو ضرورت کے مطابق دو انچ سے چار انچ تک لمبا اور نصف انچ چوڑا دیوانس یا لکڑی کی کھیا چیں یا ٹکڑے انگلی کے اوپر اور نیچے رکھ کر اس پر تھوڑی روئی رکھ کر ایک سے تین انچ چوڑے کپڑے سے باندھنا چاہیئے۔ اگر بالنس یا لکڑی کا ٹکڑا نہ ملے تو ضرورت کے موافق قلم کا ہینڈیل کاٹ کر کام میں لایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ پیر کی لمبی ہڈی ٹوٹ جانے پر مندرجہ بالا اصولوں سے دھو کر اسی طرح بالنس کی کیفیت پر یا لکڑی کا ٹکڑا اسی ناپ کا اور نیچے یا دونوں طرف کچھ روئی رکھ کر اس پر لکڑی کا ٹکڑا رکھ کر دو سے چار انچ چوڑی اور آٹھ دس بلاتھ لمبی پٹی باندھنا چاہیئے۔ روئی رکھنے کی یہ ہی منشا ہے کہ اس کے دباؤ کے جسم میں تکلیف نہ پہنچے۔

اگر چوٹ کی جگہ سے بہت خون نکلتا ہو تو اس صفحہ کے بالائی حصہ میں فوراً ایک ڈوری یا جوتہ کا فیستہ یا دھوتی یا ساڑی کا کنارہ اکس کر باندھ دینا چاہیئے۔ اگر ڈوری وغیرہ ملنے میں دیر ہو تو اس مقام سے کچھ اور دونوں ہاتھوں سے خوب کس کر زور سے دبا رکھنا چاہیئے۔ اس سے شرابین میں دباؤ پڑ کر اخراج خون بند ہو جاتا ہے۔

اگر ہڈی ٹوٹ کر باہر نکل آئے تو ذرا عقل سے کام لے کر ٹوٹے

مقام کو دونوں طرف سے کھینچ کر ان دونوں ٹوٹے مقامات کو ملا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کام کے بارہ میں معلومات نہ ہو تو بے کار کھینچ کر مریض کو تکلیف نہ دینا چاہیے۔ ہڈیوں کو خاص کر ٹوٹی ہڈیوں کو ملاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے درمیان میں گوشت کا ٹکڑا نہ رہ جائے ورنہ جوڑ نہ ملے گا۔ اس طرح دونوں ہڈیوں کو ملا دینے کے بعد لکڑی کی پٹری رکھ کر اوپر سے باندھ دینا چاہیے۔ باندھنے کا طریقہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

اگر حرام منخر میں چوٹ لگے۔ اور وہ ٹوٹ جائے تو اسی طرح لکڑی کی پٹری رکھ کر باندھ دینا چاہیے۔ لیکن ہڈی ٹوٹ جائے تو بھی اسی طرح لکڑی کی پٹری رکھ کر باندھا نہیں جاتا ہے بلکہ پلاسٹر آف پیرس (PLASTER OF PARIS) (نیتہ میں ایک طرف گوند لگا ہوا) لگا کر باندھا جاتا ہے۔ یہ پلاسٹر آف پیرس دو خانوں میں ملتا ہے۔

سر میں چوٹ لگنے پر دماغ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو فوراً سر پر پرف رکھ کر خون گرنار دک دینا چاہیے۔ اگر برف نہ ملے تو کپڑے کی پیٹی بست کر اس کو کیلنڈر یا لائوشن سے تر کر کے ٹوٹی جگہ پر رکھ کر لمبی پیٹی سے باندھ دینا چاہیے۔ اس طرح کی چوٹ میں مریض کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ معالجوں کو بھی مشق نہ رہنے کا وجہ سے اس کام میں بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑتا ہے۔

اسلئے مریض کے علاج کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر مریض کی جان زیادہ خطرہ میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر اچھا معالج نہ ملے تو مجبوراً کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو تو فوراً نزدیکی کے ہوشیار معالج کی مدد لینا چاہیے۔ اور جب تک مریض کو اچھے معالج کی مدد نہ ملے اس وقت تک مندرجہ بالا طریقوں سے مریض کی مدد کرنی چاہیے۔

ہاتھ پیر ٹوٹ کر اگر اخراج خون ہوتا ہوتا ہو تو اس اخراج خون کے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے مقام پر ایک رومال ڈھیلے لگا کر باندھ دینا اور اس کے اندر ایک پستلی لکڑی یا بانس کا ٹکڑا داخل کر کے گھمانا۔ اس سے

رومال کا گھیرا چھوٹا ہوتا جائے اور اُس ٹوٹے ہوئے مقام پر دباؤ پڑے گا۔ اس طرح وہاں کی ورید پر دباؤ پر اخراج خون بند ہو جاتا ہے۔

جوڑا کھڑنا۔ ہڈی کھسک جانا۔ ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا

(DISLOCATION OF THE BONES)

بورھوں کے نسبت لڑکوں اور بچوں کی ہڈی خاص کر اپنے مقام سے ہٹتی ہے اس کے علاوہ بچے کی ہڈی کے نسبت اوپر کی ہڈی خاص کر ہٹتی ہے اور بچے کی ہڈی جلد اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے یعنی جوانوں اور خاص کر بچے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو خاص کر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بچوں کی اور اوپر کی ہڈی جلد بیٹھ جاتی ہے ہڈی کھسک جانے پر وہ مقام ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ہلانے پر تکلیف ہوتی ہے۔

جبراً کھسکنا یا اکرنہ۔ زور سے گاتے، چلاتے چلاتے اُچھل کود کے وقت یا زور سے چلنے پر ایسا ہو سکتا ہے کہ جبراً اکڑ جاتے ہیں ہڈی ہٹ جاتی ہیں، مرنی کا مٹھ کھلا رہ جاتا ہے۔ ہاتھ میں تو لیا یا کپڑا لپیٹ کر (ورنہ دانت لگ جانے کا خوف ہوتا ہے) مٹھ میں ہاتھ ڈال کر پخلا جبراً بچے کی طرف اور پیچھے کی طرف دبا دینے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔

گلے کی ہڈی کھسکنا۔ ایک ہاتھ سے ہڈی کے اوپر دباؤ ڈالنے اور دوسرے ہاتھ سے اُس ماؤں ہڈی پر کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کھینچنے سے گلے کی ہڈی بیٹھ جاتی ہے۔ اُچھلنے یا ایک ہاتھ اونچے اُٹھانے وغیرہ اسباب سے ایسا ہوتا ہے۔

بازو کی ہڈی۔ (HUMERUS) اگر کندھے کی ہڈی ہٹ

جائے تو ہنسی یا کندھے کی ہڈی ایک ہاتھ سے اپنی جگہ پر دبا کر کہ بازو دوسرے طرف اُٹھانے سے یہ کندھے کی ہڈی جوڑ میں بیٹھ جاتی ہے دوسرے طرف کی ہڈی سے مقابلہ کرنے سے معلوم ہو گا کہ ہڈی ٹھیک طرح سے بیٹھی ہے یا نہیں۔

کہنی کی ہڈی کھسک جانا۔ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے جو انوں کو زیادہ ہوتا

ہے اور بازو کی ہڈی کو ہنی کے پیچھے کی طرف سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔
 دوسری ہڈیوں سے مقابلہ کرنے پر اُس کی تشخص آسانی سے ہو سکتی ہے۔
 مریض کو ایک کرسی پر بٹھا کر معالج یا امداد کرنے والے مریض کی کرسی پر
 پیر رکھ کر کھڑا رہنا پڑتا ہے، معالج کا گھٹنا مریض کے ران پر رکھ کر اور بازو
 کو پکڑ کر کھینچنے سے کھسکی ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔

اگر انگلی کی ہڈی کھسک جائے تو کلائی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے
 ہاتھ سے انگلی کو کھینچنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے
 اس کے بعد جب انگلی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے تو ایک پٹری لکڑی کی رکھ
 کر باندھ دینا چاہیے۔

ران کی صفائی۔۔ اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو مریض اپنا
 پیر زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ ٹیڑھا بنا رہتا ہے اور وہ پیر کچھ چھوٹا ہو جاتا
 ہے۔ اس حالت میں مریض کو بستر پر یا زمین پر لٹائے رکھنا چاہیے۔

اگر ہڈی کھسک کر آگے کی طرف آجائے تو پیر کو پہلے باہر کی طرف گھما کر
 پیچھے کی طرف کھینچنا چاہیے۔ اس کے بعد اندر کی طرف گھما کر پیر سیدھا کرنا
 پڑتا ہے۔ ہڈی کھسک کر پیچھے کی طرف ہٹ جانے پر پہلے پیر اندر کی
 طرف گھمانا اور کھینچنا پڑتا ہے، اس کے بعد باہر کی طرف گھما کر سیدھا کرنا چاہیے
 گھٹنا کھسک جانا۔۔ مریض کو لٹا کر ایک آدمی کو اُسے کس کر
 پکڑ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی اُس ماؤف حصہ جسم کو
 پکڑ کر کھینچے، اس سے ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔

پانچواں باب علم ادویات

تمہید کے باب میں ادویات کی تیاری (دوا سازی) اور ادویات

کے استعمال کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس باب میں ہومیو پتھک دواؤں کی خاص علامات، طاقت وغیرہ مضمون پر بیان کیا جائے گا۔ یہ باب مندرجہ ذیل تین حصوں میں منقسم ہے۔

(۱) تشریح ادویات :- اس مقصد میں ۲۲ مخصوص ادویات کے خاص علامات (PECULIAR SYMPTOMS) درج ہیں۔

(۲) کتاب اندام میں جن ادویات کا تذکرہ ہے ان کی فہرست ان کی طاقت مروجہ (ڈائینوسن) اور ان کے فعل کا مدت قیام درج کیا گیا ہے۔

(۳) کل مخصوص ہومیو پتھک ادویات کا رشتہ اس مقصد میں درج ہے۔

خواص الادویہ یعنی میڈیکا

(MATERIA MEDICA)

اب ہم یہاں چند خاص اور عام طور سے مستعمل ہونے والی ادویات کے خواص کا بیان کریں گے۔

(۱) آرنیکا :- خون عضلات اور عروق شریہ پر اس کا خاص فعل ہوتا ہے چوٹ لگنے، کچل جانے یا زخم ہونے پر جیسا درد شدت سے ہوتا ہے۔ تمام جسم میں ویسا ہی درد معلوم ہوا بستر سخت محسوس ہونا۔ دماغ میں جلن یا سرد اور چہرہ گرم۔ لیکن جسم کے دوسرے حصے (خاص کر ہاتھ پیر) ٹھنڈے۔ کالا داغ پڑنا۔ ڈکارا، دست، یا زبان سے مٹھے انڈے کی طرح بھوٹنا۔ چوٹ وغیرہ سے خون بہنا، بے ہوشی، بخار سے بے چینی ہونا۔ لیکن پوچھنے پر مریض جواب دے کہ اچھا ہوں، بخار میں مریض کو جواب دینے میں بے ہوش ہونا۔ سڑنے کا فعل، چوٹ کی وجہ سے جسمانی محنت سے پیدا ہوئی بیماریاں، بچہ جنم کے بعد فالج، سرسامی بخار، عضلات میں درد گرنے یا چوٹ کی وجہ سے کزاز، وجع مفاصل، بستر کا زخم (BED SORE) پُرانا لیٹیر یا بخار، ناک یا منہ سے خون گرنے۔ اخراج

خون اور بخیری میں پیشاب ہو جانا وغیرہ علامات میں یہ دوا فائدہ کرتی ہے۔
 چوٹ، گزنا، چڑا چل جانا۔ سیاہ لکیر پڑ جانا وغیرہ میں اسکا بیرونی استعمال ہو
 سکتا ہے (۲) آرتھرو جیم کے کل آلات اور خاصاً اخراج خون پر اس کا خاص فعل
 ہے۔ جسم یا دماغ کی بہت تکلیف کی وجہ سے مریض بے چین ہو، ذرا بھی یکسو
 نہ رہنا چاہتا ہو، یکایک سست ہو جائے۔ یا قوت حیات سے ہراساں ہو،
 جسم میں جلن ہو۔ لیکن کپڑے سے جسم ڈھکنے سے جلن کم ہو جائے بہت پیاس
 بار بار تھوڑا پانی پینے کی خواہش، اٹھنے، بیٹھنے یا سیر کھی پر چڑھنے سے بہت
 تھکاوٹ محسوس ہونا، یا سانس میں تکلیف، دست اور قے کھانے پینے کے
 بعد ہی اسہال اور قے کی زیادتی، رات میں بارہ بجے سے تین بجے تک، مرض کی
 زیادتی، سرد ہونا، ٹھنڈی کوٹھڑی یا ٹھنڈک لگنے سے، مرض کی زیادتی،
 گرم ہونا، گرم کوٹھڑی یا گرمی لگنے پر مرض میں کمی محسوس ہونا، سردی لگ کر
 سر کی بھگی بھگی اور ناک کی بھگی بھگی ماؤف ہو کر جلن اور زخم پیدا کرنا اور اخراج
 ہو کر مرنے کا ہے۔ ناک بند ہو جاتی ہے، دل کی بیماریاں، پانی کی طرح دست، یا
 سبز اور کالے رنگ کا جلتا ہوا اسہال، پیچ پیچ میں قے، اسہال، یا ہنسیہ زچہ
 خانہ کا بخار، معدہ میں بے حد جلن کے ساتھ درد، معدہ میں زخم، جلد میں سوزشی
 پھنسیاں اور اس کے ساتھ ہی کھجلی سے جلد کی پرت نکلنا۔ چہرے کے چاروں طرف
 جلن پیدا کرنے والی کھجلی، اس کھجلی سے سفید پانی نکلنا، مزمن تپ و لرزہ
 و بخار، کونین سے فائدہ نہ ہونے یا کونین کے غلط استعمال سے آنکھ دکھنا
 جس میں درد اور جلن زیادہ ہو۔ استسقاء مزمن، سڑا بخار، نیند نہ آنا، خون
 کی کمی، اعصابی درد، جسم کمزور کرنے والی کل بیماریاں۔

(۳) ایکونائٹ۔ سر اور پشت کے اعصابی نظام پر اس کا خاص فعل ہوتا
 ہے، موت کا یا کھیر جانے کا دور، جسمانی یا دماغی تحریک، تکلیف سے بے چین
 ہو جانا۔ یا کوئی شدید بیماری یکایک ٹھنڈی ہو لگنے (یا پسینہ بند ہو جانے کی
 وجہ سے) کوئی بیماری پیدا ہو، سوزشی بیماری کی شروع حالت میں جیسے بخار
 موتیا بند، سیٹلا، زکام، خشک کھانسی، ککھ کھانسی، برانکائیٹس۔ نمونیا

وجع مفاصل، جوڑوں کے وجع مفاصل وغیرہ بیماریوں کی شروع حالت میں کپڑا اتارنے یا کھلی ہوا میں جانے سے بیماری کا کم ہو جانا۔ گرم کوٹھری میں یا بائیں کروٹ لیٹنے پر بیماری کی زیادتی، تیز پیاس، جسم خشک اور گرم پسینہ بالکل، ندارد، نبض سخت، سرخ اور پُر۔ چہرہ سرخ، سانس میں تکلیف، دل دھڑکنے کی کیفیت اور کاوٹ۔

(۴) انسوائیم ٹائپیریکم:- جگر، پھیپھڑے اور معدہ کی بطنی جھلی کے اوپر اس کا خاص فعل ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کی بیماریاں، مرضِ نفس کی جن بیماریوں میں ہوا نکلنے کے راستے میں بہت بلغم جمع ہوتا ہو یا گھٹ، گھٹ کی آواز بلغم میں ہوتی ہو، اس کو باہر نکالنے کے ناقابل ہو، بہت مستی یا گہری نیند یا غفلت، پسینہ کمزوری، مستی یا قے، غذا سے نفرت ہمیشہ قے کرنے کی کوشش۔ لیکن قے نہ ہوتی ہو، جسم سرد۔ سرد پسینہ چہرہ پھیکا یا نیلا، تمام جسم میں خالص کرہ اور سر میں کرہ دودھ سے نفرت، کھٹی چیزوں کی رغبت، پیاس ندارد، ہیضہ، ڈکار یا کف نکل جانے سے بیماری کی کمی، آنکھیں سرخ، پھیپھڑے میں فالج یا ورم ہونے کا اندیشہ، جلد پر کھجلی، جس میں مواد بھرا ہو، چھوٹے بچوں کی ہوا کی نالی کی سوجن، بلغم کی قے ہونا۔ دمہ، تکلیف اور درد کمر۔

(۵) ایسڈ ٹائپیرک:- خون بطنی، چھلی، گٹھیاں اور ہڈی، جلد مبرز اور آلات تناسل وغیرہ میں اس دوا کا فعل ہوتا ہے، زیادہ مقدار میں پارہ کے بے جا استعمال سے پیدا ہوتی بیماریاں، مرضِ آشک، گلے کے اندر زخم، جگر کی مزمن بیماری، مبرز میں تاسور، خونی بواسیر، پاخانہ ہونے کے پہلے اور بعد مبرز میں تیز درد، پسینہ یا پیشاب میں گھوڑا کے پیشاب کی بدبو، مزمن، سیلان الرحم، پیش و غیرہ۔

(۶) ایسڈ فاسفورک:- اعصابی نظام، مثانہ اور قضیت ریڑھ کی ہڈی ہڈی اور جلد پر اس کا خاص فعل ہوتا ہے، گہری نیند، غمگین، مریض کے سامنے جو بہور ہا ہے وہ اس کو معلوم نہیں کر سکتا۔ لیکن جگا دینے پر

ہوش لوٹ آتا ہے۔ رنج، جسمانی اور دماغی محنت یا زیادہ مجامعت کی وجہ سے پیدا ہوئی بیماریاں (جیسے سفید بال، پڑمردہ چہرہ) پیشاب کا رنگ دودھ یا پانی کی طرح جسم کی بالیدگی، تیز پڑھنے وغیرہ کے سبب سے لڑکیوں کے سر کا درد، اعصابی نظام اور آلات تناسل کی بیماری، سفید رنگ کا پانی کی طرح سیلان الرحم، زیادہ پسینہ کی وجہ سے جسمانی کمزوری، اخراج خون، مزمن اسہال، بلاتکلیف، رقت منی، مشت زنی کے برے نتائج، کنٹھ مالا کی وجہ سے بڑی کا زخم، بال گر جانا۔ (خاص کر تھوڑا پیشاب ہونا۔ پیشاب دودھ کی طرح سفید، بہت زیادہ پیشاب ہونا۔ خواب میں انزال، جس سے کمزوری زیادہ ہو، مشت زنی کی وجہ سے مُنہ کا پھوڑا۔

(۷) اپیکاک :- آلات تنفس اور معدہ پر اس کا خاص فعل ہوتا ہے۔ درم، سائیں سائیں یا گھڑ گھڑ آواز، تلی کی سانس کی تکلیف۔ ہمیشہ متلی ہونا۔ درد سر کے ساتھ متلی، رحم، ناک، مُنہ، مقعد یا پھیپھڑے وغیرہ سے چمکدار سرخ رنگ کا زیادہ اخراج خون، گندلا، یا پسینہ کی طرح یا سبز رنگ کا دست، ایک روز ناغہ دیکر جوڑی بخار، کونین کے غلط استعمال سے بخار، بے قاعدہ بخار، پنجوں کے بخار کے شروع حالات میں سبز رنگ کا آنوٹوں ملا اسہال، اور اس کے ساتھ خون کی چھٹیٹیں، گھاس کی طرح سبز رنگ کا دست۔ صفراوی درد سر، قے اور لگا تار متلی اس کی خاص علامت ہے۔

(۸) اوبیم :- دماغ اور پشت اور نظام عصبی کے اوپر اس کا خاص فعل ہے۔ مریض کو درد بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ تیز آتی ہے۔ لیکن سو نہیں سکتا۔ مُنہ سے براز کی قے ہوتی ہے۔ جسم خوب گرم، لیکن پسینہ ندارد۔ بالکل بے ہوش۔ لیکن ناک سے تیز آواز آتی ہے۔ اور چہرہ سرخ، بستر بالکل گرم معلوم ہوتا۔ قبضی خوف، یا فرقت سے پیدا ہوئی بیماریاں، سرسامی بخار، دماغ سُست، تنفس میں

گلا گھر گھراتا ہو، غافل آنکھوں کی پتلی سکڑی ہوئی؛ پیٹ میں زیادہ اجتماع ریا، گہری تیند، ساتھ ہی نصف کھلی آنکھیں۔ سردی، گرمی، غفلت، اوپیم کے مخصوص علامات ہیں۔

(۹) سیلا ڈونا۔ دماغ (CEREBRUM) اور پورے نظام عصبی پر اس کا خاص فعل ہے چہرہ تلتایا؛ نبض سخت؛ پُر اور مطرقتی (ہوٹری)

خدیان، تشنج اور اکڑن، آنکھیں سُرخ۔ ٹنک کی لگا کر دیکھنا۔ منہ گلا، یازبان، خشک، سُرخ، تشنج، شکم، کھانے کے وقت گلا میں سڑی برہو کا ذائقہ معلوم ہونا؛ جسم کا کوئی مقام گرم اور سوخن، سُرخ ٹنک یا جلن کی طرح کسی جگہ پر اجتماع خون اور ورم، پانی سے خون، پیشبی، حقوڑا اور ار حیف، درد زہ، کھانسی، سُرخ بخار۔ سرُ خبادہ۔ سکتہ، زخم، کسی قسم کا درد۔ یکایک شروع ہونا۔ اور یکایک بند ہونا، سیلا ڈونا کی خاص علامت ہے۔

(۱۰) بر ایونسیا۔ پھیپھڑہ کی جھلی، دماغ اور جگر پر اس کا خاص فعل ہے، ہونٹھ، منہ اور معدہ خشک، جس کی وجہ سے مریض بہت دیر بعد زیادہ پانی پی کر اپنی پیاس روکتا ہے، براز، خشک، سخت اینٹ کی طرح، زیادہ گرمی یا برسات میں خشک، سرد ہوا لگ کر بیمار ہونا، حیف کے وقت حیف نہ ہو کر ناک سے خون گرنا۔ پتان سخت گرم، اور درد کرنا۔ قبض لیکن اجابت کی حاجت بالکل نہ ہو، ہو اک نالی کا ورم، پھیپھڑہ کا ورم (شروع حالت میں) سینہ میں سردی لگنے کی وجہ سے درد، سانس لینے اور کھانسنے میں تکلیف محسوس ہونا خشک کھانسی، جوڑ کا وجع مفاصل (خاص کر جب چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس ہو) درد کمر، وجع مفاصل کا بخار۔ صفر اوی بخار، اور درد صفرار کی تہ، سینہ میں جلن، کڑوی ڈکار، چڑچڑا حراج، زچہ خانہ کا بخار، کانٹا چھنے یا کٹ جانے کی طرح درد، چلنے پھرنے میں بیماری بڑھنا۔ بر ایونسیا کے استعمال کی خاص علامت ہے۔

۱۱۔ پلسا ٹیلا۔ جسم کی بلغمی جھلی، اعصابی جھلی، وریدیں، آئینے، کان اور آکے تناسل پر اس کا خاص فعل ہے؛ ثقیل چیز، جیسے گھی یا تیل سے بنی، کھانے پینے سے پیدا ہوئی بد ہضمی، زبان پر میل کی تہ یا زرد صفرا اور بلغم کی تہ، تیزابیت۔ سینہ میں جلن۔ سفید آنوؤں ملا پتلا دست، خسرو پانی بھرا، کان میں درد، کان سے مواد بہنا۔ وجع مفاصل، جوڑوں کا وجع مفاصل، تپ و لرزہ، تپ لازمی، سر میں سردی لگنا۔ اور آکے ساتھ ہی ناک سے گاڑھا بلغم نکلنا۔ پلکیں چمٹ جانا۔ خسرو کے بعد کا ہر سرد اپن بے قاعدہ حیض، سیلان الرحم۔ قوطر میں ورم، حیض لگنا، سوزاک، مرض کے علامات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہننا، کبھی رونا۔ ہر مرتبہ پاخانہ کا رنگ گاڑھا ملائم اخراج پانا۔ پیریم رہنے کی وجہ سے حیض میں گر کاوٹ کھلی سرد ہوا میں رہنے سے۔ بیماری میں کمی، درد زہ کے وقت استعمال کر کے سے آسانی کے ولادت کے امیدوار حین کا جسم گھوم کر سر آگے کی طرف آجاتا ہے۔ ذرا میں زور دینے والوں کے لئے (خاص کر عورتوں کے لئے) فائدہ مند (۱۲) کھوجا۔ آکے تناسل، مثانہ، مزہ اور جلد پر اس کا خاص فعل ہے۔ ہنی میں کی رائے کے مطابق کھوجا۔ سوزاک کی خرابی (ANJISYCHOTIC) کو دور کرنے والا ہے؛ گوشت کی بالیدگی (VEGETALION) کی طرح۔ ہم کی گٹی۔ ایک قسم کا نوکدار پھوڑا (جو رحم، ناک، گلا کے اندر۔ کان یا مقعد میں پیدا ہوتا ہے) مہ، سوزاک کی وجہ سے بد گوشت، دبا ہوا سوزاک ورم مجرئی بول، گاڑھا، اخراج، پیشاب ہو جانے کے بعد گترنے کی طرح درد۔ اور پیشاب کی کٹی دھار، کان یا ناک سے لگاتار سبز رنگ کا بلغم نکلنا؛ پیڑ و کا پھولنا، دانت نکلنے کے وقت اس کا مسوڑھا۔ ضائع ہونے لگنا۔ لیکن آگے کے حصہ میں زخم نہ ہونا۔ کپڑے جسم میں روئیں کھڑے ہونا۔ یا نہ ڈھکے حصہ میں پسینہ۔ ٹیکہ لگولنے کے بعد پیچک ہو جانے کے بعد جسم کا اچھی طرح نہ ٹھیک ہونا۔ سرد ہوا میں مرض کا بڑھنا۔ بواسیر، استسقا، ما آتشک، پیشاب کی نلی کے منحنی

کے پاس زرد یا سبز رنگ کا مواد جمع ہوتا۔ بار بار بوند پیشاب ہوتا۔ سوزاک کے بعد بہت پیشاب۔ آتشک کی بیماری کا دوسرا درجہ کسی کسی کی رائے سے تھو جا۔ مرض سوزاک کی اچھی دوا ہے اور حفظ ماتقدم بھی ہے۔

(۱۱۳) چائنا:- کلی کے نظام عصبی پر اس کا خاص اثر ہے۔ جسم سے بہت زیادہ خون یا مٹی کا نکل جانا۔ یا دودھ بننے کی وجہ سے کمزوری۔ ٹھیک وقت (جیسے ایک روز ناغہ دیکر) کسی بیماری کا حملہ۔ میاہ رنگ کا یا تھکے تھکے خون کا اخراج، اسکے بعد بے ہوشی اور قوت باصرہ کا کم ہونا۔ اور کان میں ہون کی آواز، خون کی کمی، خون میں پانی کا حصہ۔ زیادہ نفخ شکم۔ ایسا محسوس ہوگا یا سیٹ ریا ح سے بھرا ہوا ہے۔ دکار یا ریا ح نکلنے سے آرام محسوس ہوتا۔ بلا تکلیف کا اسپہال (پیلہ پانی کی طرح یا مٹی کے رنگ کا پاخانہ):- جاڑا بہت سردی، پیاس کے ساتھ پسینہ، نیند کے وقت یا کھڑے سے جسم کے ڈھکنے پر پسینہ، مزمن وجع مفاصل، پھل کھانے کے بعد اسپہال چار کی وجہ سے نفخ شکم، جسم کو چھونا (یہاں تک کہ ہوا کا چھو جانا) مریض برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اجتماع خون کی وجہ سے جگر اور طحال کا بڑھنا۔ بلیریا کی وجہ سے تپ و لرزہ (جس بخاریں جاڑا۔ گرمی اور پسینہ، تینوں درجے صاف نمایاں ہوں) سوچیں، بہت زیادہ بھوک۔ سر میں تنگ کی طرح درد (ایسا کہ شہرٹ جائیگا) کمزور کنوا لاغراب میں انزال:- زیادہ جماعت کر سکی وجہ سے نامردی،

(۱۱۴) رٹساکس:- آلات جسمانی، بلغمی جھلی، عضلہ جلدیہ، اور جوڑوں کے تشیخ پر اس کا خاص فعل ہے۔ زبان خشک یا میل کی تہ جی اور زبان کا اگلا حصہ سرخ، مثلث نما، بے چہی، ہر وقت کڑوا ہوا بدلتا۔ ٹائیفاؤد بخار کے علامات نمودار ہوتا۔ ہلکا ہڈیاں، غشی، عضلات میں درد۔ گرمی تو لہجی درد (بائی حصہ میں) بائیں بازو میں درد، اسکے ساتھ دل کی بیماری نکلنے کے وقت کندھے میں درد۔ بخار کے درمیان لرزہ میں تکلیف دہ، خشک کھانسی، اور درمیان حرارت میں تمام جسم میں پتی اچھلنا۔ وجع مفاصل خاص کر مزمن وجع مفاصل، جوڑوں میں درد۔ درد کو باختر وجع مفاصل کی وجہ سے

کالج، آبلہ کا درہر باد۔ جس میں پانی بھرا ہو، تمام جسم میں خسرہ کی طرح سرخ
 دلنے، سرسامی بخار میں اسہال، امراض جلدیہ (ناقابل برداشت)
 ملن اور کھجلا ہیٹ اور کانور) چلے پھرنے سے بیماری دینی محسوس ہونا۔
 رستاکس کی خاص علامت ہے۔

(۱۵) سائلشیا:۔ (ادویات تشنج کے باب میں) سلکا ملاحظہ ہو، مقوی
 غذا ملنے پر بچہ کا جسم نہ بڑھتا ہو، اور خشک ہوتا جاتا ہو، بچہ کے ہاتھ
 پیر پتلے، پیٹ بڑا۔ چہرہ بوڑھوں کی طرح سرخ۔ سر پر زیادہ پسینہ
 ٹپکنا (VACCINATION) کا بڑا نتیجہ۔ کانٹا مچھلی کا کانٹا
 وغیرہ جسم میں داخل ہونے پر سلکا کے استعمال سے آسانی سے اس کے
 نکلنے میں مدد ملتی ہے؛ انگلی پکنا؛ استسقاء۔ مختلف قسم کے پھوڑے
 کنٹھ مالا کی وجہ سے زخم، بے چینی، سر میں بدبودار مواد بھری پپٹری جمن۔
 چربی کی کمی کی وجہ سے ہاتھ پیر پتلا پڑ جانا۔ ہڈی اور ہڈی کو ڈھکنے والی
 جلد میں مواد پیدا ہونا۔ پورنما اور آناؤس کے دنت بیماری کی زیادتی۔

(۱۶) سائنٹا:۔ (CINA) آنتوں پر اس کا خاص اثر ہے
 ہمیشہ ناف کھجلا نا (کرم رہے یا نہ رہے) ناک میں انگلی ڈالنا۔ چرچڑا مزاج
 بچہ ہمیشہ تھوک نکلتا ہے۔ گویا نگلے میں کچھ اٹکا ہے۔ یکایک بار بار تیز بخار
 نیند نہ آنا۔ ککر کھانسی۔ تشنج یا اکڑن، دانت کڑکڑانا۔ خوفناک حالت
 (کرم کی وجہ سے) آنتوں میں کرم، غذا سے نفرت، یا تیز، بھوک رات میں
 بخبری سے پیشاب ہو جانا، دودھ کی طرح پیشاب ہو پنگ کھٹ یا گلاروندھنے
 والی کھانسی، کرم کی وجہ سے، بہت علامات، تپ بلغمی (کرم ہو یا نہ ہو)۔
 (۱۷) سیکیل کار:۔ دماغ اور پشت کے اعصاب پر اس
 کا خاص اثر ہوتا ہے۔ ہیضہ کی انٹین یا اکڑن۔ ہیضہ میں جسم کی حملن۔
 (ہمیشہ نیکھا جھلنے کو کہتا ہو)۔ ہاتھ پیر بے قابو، اور سانس رگڑنا۔

× نلف سائلشیا صفت ہے سکے عوض نلف، سلکا، استعمال کرنا چاہیے۔

درزہ، ولادت کے آخر کا درد۔ اخراج خون (خاصکر دہلی عورتوں کا) بے خبری میں بدبودار کمزور کر نیوالا سبز رنگ کا دست، معدہ سے اخراج خون، رحم سے عرصہ تک اور زیادہ مقدار میں صفی جاری رہنا اسقاط حمل کا اندیشہ، ولادت جلد ہونے کے لئے سیکل (خاصکر ۵ یا پچھلی طاقت) استعمال کرنا بہت خراب ہے۔

(۱۸) سلفر :- خاصکر کٹی کا نظام اعصابی کے درمیان سے تمام جسم پر اس کا فعل نمودار ہوتا ہے۔ ہر قسم کی جلدی بیماری، کھجی، کوئی فرس بیماری، قبض، بواسیر، کف، زخم، وجع مفاصل، پھوڑا، انگلی بگلتا۔ چھوٹے گرم۔ اسہال، سرکے (اند جلن) گویا گرم پانی سے جل رہا ہے) بار بار پیشاب ہونا۔ پیشاب ہوتے وقت جلن تمام جسم میں (خاصکر ٹوے میں) بہت جلن محسوس ہونا، ہونٹھ، ناک، کان کے سوراخ، آنکھوں کی پلک، پیشاب کی نلی، مقعد وغیرہ کا رنگ سرخ، گویا خون سے بھرا ہے۔ کوئی جلدی بیماری دیکر دوسری شدید بیماری ہونے پر کوئی بیماری جلد چھڑانہ چاہتی ہو منتخب دوا دینے پر بھی فائدہ نہ ہوتا ہو، آشوب چشم، وقت مقررہ کے بہت پہلے یا بعد عرصہ تک رہنے والا زیادہ مقدار میں ادرار حیف، سوزشی اور تکلیف دہ سیلان رحم، یا جی مرصیان کو مناسب دوا دینے پر بھی فائدہ نہ ہوتا۔ ان کو بیچ بیچ میں سلفر کھلا کر دوا دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

کبھی بیماری کے شروع میں اور آخر میں یہ دوا دیکر علاج کرنا چاہیے۔ نہانے یا جسم ڈھونے کے بعد بستر کی گرمی سے یا آدھی رات کے بعد مرض کا بڑھنا۔ اس دوا کے استعمال کرنے کے لئے مخصوص علامات ہیں۔

سلفر کے استعمال کے پہلے کبھی کلک کا رب نہ دینا چاہیے۔

(۱۹) فاسفورس :- خون اور پرورش کرنے والا نظام اعصابی پر اس دوا کا خاص فعل ہے۔ اخراج خون خلیق، تھوڑی سیوٹ سے بھی بہت زیادہ اخراج خون ہو، منہ، معدہ، مقعد وغیرہ حصوں میں

بہت جلن محسوس ہوتا۔ شام سے دوپہر تک کھانسی کا بڑھنا۔ دماغ کی بیماری، سر میں چکڑا درد، سر، بہرا پن، ناک سے خون کا اخراج، خون کی کمی، زیادہ اسہال، پانی کی طرح براز میں سا بودا نہ کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نکلنا اور مقعد کھلی رہنا۔ ٹھنڈے پانی پینے کے لئے تیز پیاس لیکن اسکو پینے کے بعد معدہ کا گرم ہو کرتے ہو جانا۔ نیند کے بعد بیماری کم ہو جانا۔ دماغی اور جسمانی اعصابی کی کمزوری۔ بھیسپٹے کا درم۔ کھانسی کے ساتھ بلغم اور خون نکلتا۔ آواز بیسی، جلدی جلدی مابہاری ہونا۔ ادار حیف، عورتوں سے صحبت کی بہت خواہش، پخلے جڑے کی ہڈی میں زخم، دانت کی جڑ علیحدہ رہنا اور آسانی سے اُس سے خون گرنا، دانت کی جڑ زائل ہونا۔ سینہ کا کوئی پھوڑا نثر لگوانے کے بعد اگر ناسور ہو جائے تو یہ دوا فائدہ کرتی ہے۔

(۲۰) فیبرم مسٹ:- خون پر اس کا خاص فعل ہے۔ کئی خون

جسمانی کمزوری کی وجہ سے سر بھاری، مشانہ اور مجری بول کا درم۔ کبھی خوب بھوک اور کبھی بھوک ندارد۔ کبھی جسمانی عضو سے خون نکل جانا، چہرہ سُرخ (خاص کر رزہ کی حالت میں) بغیر درد کے بدبھمی کے دست، میریا، دن کی غذا رات میں دُکار آنا۔ یا قے ہو جانا۔ چہرہ آترا ہوا، سینہ میں دھڑکن، خون کی قے، دمہ وغیرہ مرض آہستہ آہستہ ٹپنے پر مریض کو آرام محسوس ہونا، غرمن، اسہال۔ گلا کی خرابی، پیشاب میں بالو کے ذرات نکلنا۔ چائے یا کوئین کے غلط استعمال سے پیدا ہوئی بیماریاں، نازک عورتوں کے لئے اور اعصاب اور غلیہ خون کے مزاج والے آدمیوں کے لئے بہ دوا بہت مفید ہے۔

(۲۱) کاربو ویکسی ٹیلیس:- خون نظام اعصابی اور معدہ کی بلغمی جھلی کے اوپر اس کا خاص فعل ہوتا ہے۔ درجہ سردی میں جب قوت حیات یک دم ختم ہونا چاہتی ہے (جب جسم رن کی سطح ٹھنڈا اور ٹیلا ہو جاتا ہے، اور مریض ہمیشہ ہوا کرتے کے لئے کہتا ہے۔ کسی

بھی بیماری کی آخری حالت میں جب بہت ٹھنڈا پسینہ، زبان ٹھنڈی
 سانس ٹھنڈی، آواز بیٹھی وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں، کسی بیماری
 یا چوٹ سے اپنی صحت واپس نہ لاسکا۔ کونین وغیرہ دواؤں کے
 غلط استعمال سے پیدا ہوئی بیماری، جسم کے اندر گویا کوئی چیز جل جھن
 رہتی ہے۔ جسم کے کسی حصہ میں سیاہ خون کا اجتماع، خون، ڈکارا پسینہ
 کی جلن، پریٹ ایک ہو جانا۔ پیٹ پھولنے کے ساتھ اوپر کی طرف یا
 جانا، سرسامی بخار، بواسیر، اسہال، درد دانت، مسوڑھوں سے آسانی
 سے خون نکلنا۔ متعفن زخم، آواز بیٹھی، جانگنی کی حالت میں پیر کے تلوے
 سے کمر تک ٹھنڈک ہونے پر مریض بالکل ہوا کھانا چاہتا ہے۔ یہ
 کاربو کی خاص علامت ہے۔

(۲۲) کمیو ملا:- نظام اعصابی جگر، معدہ اور بلغمی جھلی کے اوپر اس
 کا خاص فعل ہے؛ چڑچڑا مزاج، ناقابل برداشت درد، بھالا
 مارنے کی طرح درد، درد زہ، دانت کا درد، وغیرہ علامات میں
 مریض سو نہیں سکتا۔ یا بے چینی سے رونے لگتا ہے۔ ناقابل برداشت
 درد، اور بیچ بیچ میں درد والی جگہ کابلے ص ہو جانا۔ ٹھن جھن کرنا۔
 (جیسے وجع مفاصل فالج) رات کے وقت تلوے میں زیادہ جلن، نیند
 کے وقت کی کھانسی، بچہ کے دانت نکلنے کے وقت کی بیماریاں۔ (جیسے
 زرد یا سبز رنگ کے دست، اکرن، پانی کی طرح دانہ دار دست۔
 سڑے انڈے کی طرح بدبو دار پانی کی طرح درد، دانت نکلنے کے وقت
 بچہ کا ایک گال سرخ اور گرم ہونا؛ تکلیف دہ بے چینی، گلے
 میں درم اور اس کے ساتھ ٹھوڑا بخار، گرم چیز پینے سے دانت
 کا درد بڑھنا، عصبی درد، حیفص کے وقت خون کالا۔ دھند دھند
 حالت حمل میں عورتوں کا شج، بچہ چڑچڑا اور تھوڑی ہی بات میں
 رنجیدہ ہو جائے؛ بچہ کی تکلیف گود میں گھومنے سے کم ہو جائے۔
 (۲۳) کلیر یا کارب:- پرورش کی خرابی سے پیدا ہوئے

(کنٹھ مالا، دق، ہڈیوں کی نراکت) امراض پر اس کا خاص فعل ہے۔

حسب ذیل علامات میں کلکیر یا کارب خوب فائدہ کرتا ہے۔

- (۱) گورے رنگ کا موٹا مادہ نرم ہڈی والا آدمی (۲) جس کو سردی لگ کر ذرا ہی میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ (۳) رات میں پسینہ (۴) جگہ پیر خوب ٹھنڈے اور ذرا ہی میں جاڑا معلوم ہوتا ہو (۵) نظام ہضمی میں تیزابیت (جیسے ذائقہ ترش، ڈکار ترش، تھ ترش، براز میں ترش بیلو (۶) خاص جگہ پسینہ (جیسے بچہ کے سر میں پسینہ (۷) ہڈیوں کی اچھی طرح پرورش نہ ہونا (جیسے چند یا اپنے وقت پر نہ بھر جائے، یا بچہ کا وقت پر نہ چل سکنا (۸) دھوبی وغیرہ جو بہت دیر تک پانی میں کام کرتے ہوں۔ بچہ کو دانت نکلنے میں دیر یا تکلیف، بچہ کا وقت پر نہ چل سکنا۔ آنکھوں کی سوزش، گلیٹیاں سوچی زیادہ حیض اور اس کے ساتھ گھٹنے سے لیکر تلوتک، دونوں پیر برف کی طرح ٹھنڈے، اور تر، مقررہ وقت کے بہت پہلے حیض ہونا۔ دودھ کی طرح سفید سیلان الرحم، جماع کے وقت بہت جلد انزال اور اس کے ساتھ ہی کمزوری۔ رات میں سر میں پسینہ، تیزابیت، قریب پور نما کے یا پور نما کے دن بیماری کی زیادتی، ٹھنڈی ہوا اور بیمار کے پاس سونے سے بیماری کا کم ہونا۔ سبز یا سیاہ رنگ کا جلن پیدا کرنے والا درست، بیچ بیچ میں تے۔ اسہال یا ہر قسم کی مزمین بیماری میں ایک روز کا وقفہ دیکر بیماری کا بڑھنا۔ اس دوا کے کھلانے کے بعد کبھی سلفر نہ دیا جائے۔

(۲۴) لائیکو لوڈیم :- آئہ تنفس، معدہ، مثانہ اور آئہ تناسل کی بلغمی جھلی، جلد اور جگر میں اس کا خاص فعل ہے، دل مست۔ قوت یادداشت کی کمزوری، آسانی سے غصہ آجانا، دائیں جسم کی بیماری نوینا۔ آنت بڑھنا، پھوڑا وغیرہ جو کوئی بیماری دائیں طرف ہو کر بائیں جانب پھیلے، نفخ شکم کے ساتھ بچے کی طرف ریا ح خارج ہونا۔ بیٹ میں گر گرٹا ہٹ، پیشاب میں سُرخ رنگ کی چیز، تہ نشیں ہوتی ہو،

سہ پہر کو چار بجے سے رات کے ۸ بجے تک کسی بیماری کی زیادتی، ایک پیر سرد
دوسرا گرم، بھوک کے وقت تھوڑا کھانے سے پیٹ بھر جانا یا پیٹ بھاری
محسوس ہونا۔ پسینہ کے بعد ہی پیاس، تپ و لرزہ میں ترش ذائقہ، ترش
پسینہ، ترش ڈکار، ترش تے، قبض، لیکن مقعد کے سکرے رہنے سے پاخانہ
نہ ہونا، مزمن بیماری، خون کی بیماری۔ صبح نیند کھلتے وقت اور بعد میں
سر گھومنا، جلن پیدا کرنے والی ڈکار، منہ میں پانی بھر آنا۔ اور سینہ میں
جلن، دماغی محنت سے پیدا ہوئی بد ہضمی، لتھک ایسٹ ملا مادہ۔

(۲۵) لیکے سس :- پیٹھ کے نظام اعصابی، پھیپھڑے اور معدہ
کے اعصاب کے اوپر اس کا خاص فعل ہے۔ سستی، نیند کے بعد ہی کسی
بیماری کا بڑھنا، بایں جانب کی بیماریاں، بایں جسم میں کوئی بیماری
پیدا ہو کر دائیں طرف پھیل جائے، جسم کو یا کس گیا۔ خون کی خرابی، کمزوری
کی وجہ سے زبان یا کسی دوسرے حصہ کا کاپٹنا، گلا میں درد، کان میں درد۔
نگال کی ٹہی سے کان کے نیچے پھیلنے کی طرح درد، پیاس نہ ہو، لیکن گلا۔ خشک
ہو جائے، شرا بدبودار دست، بے خبندی سے پاخانہ نکل جانا۔ موسم
گرم یا کاسہال، جلد پر سیاہی مائل نیلے رنگ کا زہر ملا زخم، رحم سے
ادار حیف (خون کا رنگ کالا) حیف کے وقت درد زہ کی طرح
درد۔ عورتوں کے ماہواری میں اور مرض پلگ میں۔

(۲۶) مرکوریس والی دس :- ہر عضو بڑا اور ہرنج پر اس کا
خاص فعل ہے۔ ڈاکٹر نیش کا ارشاد ہے کہ پھوڑا پکانے کے لئے مرکوریس
ادنی طاقت میں اور اسکو بٹھا دینے کے لئے اسکو اعلیٰ طاقت میں استعمال
کرنا چاہیے۔ مسوڑھا سو جا اور اس میں سور اخ ہو جائے۔ اس سے
خون گرتا ہو، زبان میں درم ہو۔ اور ٹنگ پڑے۔ اور زبان میں دانت
کا داغ دکھائی دے، زبان رس بھری منہ میں رال بھرا اور تیز پیاس
دن رات بہت پسینہ، ٹہیوں کی بیماریوں، گلا کے اندر زخم، رال بہنا۔ منہ
کے اندر زخم۔ دانت میں درد، کان سے مواد بہنا، ناک یا آنکھ سے بلغم

یا مواد نکلتا۔ آنکھیں، آنا۔ جگر میں دم (دائیں کروٹ سونے پر درد) جگر سخت اور متورم اور اس میں درد، ترش صفرا گرنا۔ یرقان، اسپہال میں، آتشک کے زخم صاف نمودار ہونا۔ معدہ کا دم، آتشک سے پیدا ہوا وجع مفاصل، آنوں کے ساتھ خون کا دست، کو تھنار حنا صکر یا حنا کے وقت (رات کے وقت بستر کی گرمی سے مرض کا بڑھنا۔ مرکبوریس کے استعمال کی خاص علامت ہے۔

(۲۷) نکس و امیکا:۔ پشت، چربی، قوت حرکت اور قوت ادراک پر اس کا خاص فعل ہے۔ جن لوگوں کو ریاچ کا قلبہ ہو، جن کو غصہ آسانی سے آ جاتا ہے۔ جو لوگ متفکر اور پریشان رہتے ہیں دماغی کام کرنے والوں (جیسے آفس کا حساب رکھنا)۔ کی بیماریاں ذکی الحس، آواز، روشنی، بو وغیرہ مرض بالکل برداشت نہ کر سکتا ہو، تشنج یا اکثرن، تیز بخار میں بھی جاڑا معلوم ہونا نیشلی، کڑوی یا گرم، ادویات محرکہ کے استعمال کے بذاتج، بار بار اجابت کی حاجت لیکن بہت تھوڑا پاخانہ ہونا۔ یا بالکل ہی نہ ہونا۔ نیند کے کھلنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونا۔ کھانے کے ایک دو گھنٹہ بعد پیڑو میں بوجھ معلوم ہونا۔ قے یا متلی، اجابت ہو جانے کے بعد کچھ دیر کے لئے تکلیف کم ہو جانا (خاص کر پچیس میں) بواسیر کے ساتھ کھلی، اندر سے، سردی کے دنوں میں پستلا اور وات میں خشک، صبح مرض کی زیادتی، گویا کچھ اڑا ہوا ہے قبض کے ساتھ براز نکلنے کی حاجت، خشک کھانسی زکام، رات میں جاگنا، زیادہ غذا یا نیشلی چیزوں کے استعمال سے پیدا ہوئی بیماریاں، کبھی تپے دست اور کبھی قبض، قولنجی درد، نفخ شکم، سینہ میں جلن، سر بھاری، اور اسکے ساتھ سر میں جکڑ، آنوں کا بڑھنا، زبان کا پچھلا حصہ میلا، بد خواب، گویا گولی سینہ پر چڑھا ہے۔ ناؤ یا جہاز پر چلنے سے متلی، تشنجی دم، نچلے حصہ میں انیمشن، جلدی جلدی اور زیادہ مقدار میں حیف ہونا۔ حیف کے وقت اور صبح اُبکائی

تے، پیشاب، قطرہ قطر ہو، مجری بول کا فالج اور جگر کی بیماری شراب وغیرہ پینے کی وجہ سے ہاتھ پیر کا کاٹنا۔

(۲۸) نیٹرم میوور یا ٹیکم :- خون عروق جاذبہ معدہ کی فعلی جھلی جگر اور نلی پر اس کا خاص فعل ہے؛ نہ تہی بخار، کمزوری، دہلان خون کی کمی، نقص، طحال اور جگر کا بڑھنا، سوزاک، سفید سیلان رحم، زکام، ناک سے خون گرنا، کرطوا یا ممکنہ ذائقہ یا ذائقہ ہائے معلوم ہونا۔ ہونٹ اور مقعد خشک اور پھٹا ہوا، پیر یا بخار رہنا گیارہ بجے خفیف ٹھنڈک سے بختار آنا، منہ پر مریض کو خشک محسوس ہونا، زبان، ہونٹ، ناک اور انگلی میں ترک اور چلک کی طرح درد، کھلی، دل دھڑکنے والی تشنج کے باب میں نیٹرم میوور ملاحظہ ہو۔

(۲۹) وراٹرم ایلمیم :- داغ اور پشت کے نظام اعصابی کے پیچ سے پرورش کرنے والے اعضاء پر اس کا مخصوص فعل ہے سفیدہ (بھات، کاماٹہ جاول پیچ کی طرح زیادہ مقدار میں دست و قے) تمام جسم ٹھنڈا، اکڑن، قوتنجی کمزوری کے ساتھ ٹھنڈا پسینہ، اعصاب میں حسستی، ہڈیاں اُبکائی یا قے کے ساتھ سر پر ٹھنڈا پسینہ، مرض دیرانی اور اس کے ساتھ چیزوں کو بھار ڈالنے یا کاٹ ڈالنے کی خواہش بے جس و حرکت، غصہ ہونے پر مریض کا پاگل ہو جانا۔ وجع مفاصل سرد ہوا میں بڑھنا، بہت درد، تکلیف سے مریض کا خرافات بکنا۔ زیادہ اخراج، پاخانہ، پیشاب، رال زیادہ مقدار میں نکلا۔

(۳۰) پیرسلفر :- جلد اور آرتھریٹس کی جھلی پر اس کا خاص فعل ہے مواد پیدا کرنا۔ اور بڑھانا اسکی خاص حقیقت ہے۔ ٹھنڈی ہوا یا معمولی درد بھی برداشت نہ کر سکتا۔ تھوڑی سی چوٹ یا چھل جانے سے ہی جن کو مواد پیدا ہو جاتا ہے؛ مواد پیدا کرنا یا نیکرنا (بورک وغیرہ) اکثر ان کا بیان ہے کہ پھوڑا پکانے کے لئے اور توڑنے کے لئے تھوڑے مواد پیدا کر لینے کے لئے، پیر کی پھلی طاقت (حبیبہ ۲۲ سفوف)

دینا چاہئے اور بٹھا دینے کے لئے یعنی مواد پیدا کرنا۔ اس کو روکنے کے لئے، سپر اوپنچ طاقت کی (جیسے ۳: ۲۰۰) دینا چاہیے۔ مواد اور خون بھری کھینسی، مواد بھرا زخم، سٹرا زخم، چاروں طرف سسرخ رنگ، خشک ہوا لگ کر گھڑ گھڑا ہٹ کی کھانسی، دمہ محسوس ہونا۔ کہ گویا گلا میں مچھلی کا کانٹا اٹکا ہوا ہے۔ پھوڑے میں مواد ہونا۔ اس کی علامت سابقہ ہے) ٹنک یا خراش کرنے والا درد۔ گھنٹا محسوس ہونا۔ دن رات پسینہ، عضلات کی کمزوری کی وجہ سے تکلیف سے پاخانہ ہونا اور آہستہ آہستہ پیشاب ہونا۔ پارہ کے غلط استعمال سے پیدا ہوئے علامات، سورا اور آتشک کا مادہ اور اینٹھن، سانس میں تکلیف (خاص کر دمہ پیدا کرنے والی کھانسی کے شروع) میں پھوڑا، انگلی کا پکنا، سر میں سخت پھنسیاں، کھانسی مزمن، مزمن بد ہضمی، بواسیر، قبض، کان سے مواد گرنا۔ آتشک کے زخم اور بدبودار مواد نکلنا۔ کتنھ مالا دلے آدمیوں کے لئے پارہ کے غلط استعمال سے پیدا ہوئی بیماری میں اور مغربی ہوا سے مرض کی ترقی کے علامات میں یہ دوا بہت فائدہ مند ہے۔

(۱۳) ہیمی میلس :- خون کو لے جانے والی وریڈوں پر اس کا خاص فعل ہے۔ جسم کے کسی وریڈ سے سیاہ رنگ (PASSIVE) کا اخراج خون، ہیمی میلس کے استعمال کی خاص علامت ہے، خون بہنے پر بواسیر جسم کے کسی مخرج سے (جیسے آنکھ، ناک، کان، پھیپھڑا، رحم اور مقعد وغیرہ) سے سیاہ رنگ کا تھک تھک اخراج خون، عورتوں کے آلات تناسل کی نسیں متورم، رحم سے زیادہ مقدار میں سیاہ ادراخنیں ہیں اس دوا کا داخلی اور خارجی استعمال ہوتا ہے۔

کھاروں علاج

ٹیشور میڈیز یا ادویات بائیو کیمک

بائیو کیمک طریقہ علاج کے مؤید ڈاکٹر شسلر صاحب کا ارشاد ہے کہ خون کا سفید حصہ یا زلال (ALBUMEN) چربی، شکر، پانی، تیزابیت اور غیرہ چیزیں (INOGRANIC SALTS (TISSUE) بے جان نمک اور خون کے مخصوص جز ہیں، کلکیر یا فلوریکا۔ کلکیر یا فاسفوریکا۔ کلکسیر یا سلفیوریکا؛ قیرم فاس فوریکم، کیلی میو ریا ٹکم۔ کیلی فاسفوریکم، کیلی سلفیوریکم اور سلکائیہ بارہ سالٹوں (یانمک) جاندار جسم (TISSUE) کے کل یا سیسین بنتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ ان سالٹ میں سے کسی ایک کی بھی جسم کی ہونے پر، تشنج کا زوال ہوتا ہے اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان کی رائے یہ بھی ہے کہ اس خاص سالٹ سے اس خاص تشنج کو پورا کر دینے سے بیماری اچھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے انہوں نے ان بارہ نمکوں کا نام ادویات تشنج (TISSUE REMEDIES) رکھا ہے ان کا ارشاد کتنا ثبوت سے پڑ ہے۔ اس بات پر یہاں غور کرنا بیکار ہے ہاں مندرجہ ذیل ادویات ہو میو پیٹھک کے طریقہ سے تندرست جسم پر آزمائی گئی ہیں۔ (PROVED) اور مریض کے بارے میں بار بار فائدہ کرنے سے ہم لوگوں نے اس بارہ دواؤں کے مخصوص علامات اس کتاب میں شامل کر دیئے ہیں

ڈاکٹر شسلر صاحب شروع میں ہو میو پیٹھک تھے اسکے بعد اپنے نام کو قائم رکھنے کے لئے ہی شاید انہوں نے اس طریقہ کو مشہور کیا ہے۔ ہو میو پیٹھک فارما کو پیاء کے طریقہ سے بھی بائیو کیمک دواؤں کا ثقیل ہوتا ہے۔ شسلر صاحب عموماً X۶ X۱۲۔ سفوف کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن ہو میو پیٹھک سب ہی ثقیل (X۱...X۱۰) حالت کے مطابق استعمال کیا کرتے تھے۔

(۱) لے تھے لین :- سال ۱۹۱۷ء میں کیلی فورنیا یونیورسٹی کے معلم ڈاکٹر
(T.E. ROBERTSON) لے تھے لین (LETHELIN) 'نای ایک'
شے انسان کے جسم میں (IN THE PITUITARY BODY AT THE BASE)
(OF THE BRAIN)

دریافت کیا ہے اور انسان کے جسم سے اس کو علیحدہ کرنے میں بھی
کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے استعمال سے انسان کے جسم تیزی سے بڑھتے
لگتے ہیں۔ اس لئے ادویات تشحیح کے طریقہ علاج سے لے تھے لین بھی جلد
ایک دوا بن جائے گی۔

(THE INDINE DAILY NEWS, MARCH 1-1-1917) ملاحظہ ہو۔

(۲) سلیکا کا ۱۲ X سفوف. ۳۰: پیٹھ کی چوٹ اُنکلی پکتا، زخم،
پھوڑا، گھاؤ، ٹیکا لگانے کی وجہ سے پیدا ہوا زخم، دانہ دار وغیرہ
جن تمام درموں سے پتلا مواد نکلتا ہے۔ موٹے تازے پتوں کے
سر پر پسینہ، پیٹ بڑا ہو۔ لیکن ہاتھ پیر چھوٹے، قبض، براز
کا کچھ حصہ پھر اندر چلا جاتا۔ جسم میں قوت حیات اور حرارت
کی کمی، تھوڑے ہی میں سردی لگتا۔ درد سر مزمن، پیریا بٹل میں
صحت کا خراب کرنے والا بدبو دار پسینہ، ہڈی کا زخم، ران کے جوڑ کا
درد، وغیرہ، ہڈی کی بیماری، رات میں پسینہ (خاص کر گردن کے پیچھے)
بہت عرصہ تک قیام کرنے والا بخار، مرضِ دق، مزمن و متبع مفاصل
جوڑوں کا درد۔ جسمانی طاقت کی نسبت دماغی طاقت کی زیادتی کی وجہ سے
جلد تھکاوٹ آجاتی ہے۔ قوتِ سامعہ کی زیادتی، بے چین رہنا۔
خاموش رہنے کی خواہش، بے چینی، مایوسی، اندر خوب سردی محسوس
ہونا۔ گوشت، گرم غذا سے نفرت، بال بڑھ جانا۔ پیر کا پسینہ بند
لے پسینہ بند کرنے کے لئے بہت لوگ فٹ پاؤڈر (FOOT POWDER) استعمال
کرتے ہیں۔ اس سے پسینہ تو فوراً بند ہو جاتا ہے۔ لیکن مندرجہ بالا سخت بیماریاں پیدا ہو
سکتی ہیں۔ سلیکا کے استعمال سے پسینہ اور مذکورہ بالا بیماریاں رفع ہوتی ہیں۔

ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں فالج، مرض سکتہ، بہراپن، ناک کا اگلا
جھٹہ سُرخ ہو جانا۔ یا پھوڑا ہونا، ناک ٹڈی میں دانہ یا زخم اور اس
مواد نکلنا، زبان یا ہونٹھ کے کنارے زخم، سیلان رحم، اعصابی درد۔
ناک کی بلغمی جھلی کے موٹے ہونے کی وجہ سے ناک کا بند ہو جانا،
سنگ تراش یا چکی والوں کا دم۔ سنگ گرہ، آنکھ میں مواد پڑنا۔
ران کے جوڑے میں سوجن (امادش یا پورن ماسی کو بڑھنا) درد والی
بواسیر، بدبو دار اسہال، بواسیر۔

بورک ایسڈ، پُرانا سوزاک، پستان یا گھنڈی میں زخم، مرض
بازو کے نلی کا دم، دق سے پیدا ہوا پھیپھڑے کا پھوڑا، تیز
تپاک قلب، امراض مزمنہ و خون کی تحریک کی وجہ سے نیند نہ آنا۔
(سائی کی شیا ملاحظہ ہو۔)

امادش اور پورن ماسی کی رات میں گھنڈی ہوا میں مرض میں
ترقی، فساد یا گرم کوٹھری میں سر میں گرم کپڑے باندھنے، یا گرم
پانی میں نہانے سے بیماری کی کمی، اس دوا کی خاص علامت ہے۔
فیرم فاسفوریکم ۲۰۰ X - آنکھ، کان، دانت، معدہ،
زخم وغیرہ، کسی مقام میں ورم کی شروع حالت میں خفیہ ریڑھ
کا ورم (براہنکائی ٹس) پھیپھڑا (نونیہ) پلیوریسی، کل البہتابی بخار،
درد سر، سر میں چکر، وجع مفاصل، درد کمر، زہر باد، گلے کا زخم، کھانسی
سردی، دماغ میں بلغم وغیرہ امراض کی شروع حالت میں چمکدار
سُرخ خون گرنا، آتشک، اسہال، ناک سے خون گرنا۔ پھوڑا۔
پیٹھ کا پھوڑا، جسم کہیں کہیں سے متورم اور آن جگہوں کا گرم رہنا۔
یشاب روکنے کی طاقت کا زائل ہو جانا۔ درد سر کی وجہ سے سر میں
سنگ، سردی لگنے کی وجہ سے درد اور اسہال، بد ہضمی، قے۔
فیرم فاس ۳ X - کی ترپٹی یا مرہم مرض آتشک میں لگانا چاہیے۔
حرکت کرنے سے یا سینکے سے مندرجہ بالا بیماریوں کا بڑھنا اور

سرد استعمال سے گھٹنا، قیرم فاس کی خاص علامت ہے۔

(۳) کلگیر یا سفیوریکا ۳-۲۰۰۔ پھوڑا، سردی، سفیدی مائل زرد اخراج، جسم کے کسی حصہ میں مواد پڑنے والا یا آنکھ کی تلی میں (CORNEA) زخم یا مزمن، اسہال یا مزمن، زخم سے پہلا مواد نکلتا یا اس کی وجہ سے کھوڑا کھوڑا بخار ہونا، یا مسوڑھوں میں چھالے یا جگر اور مثانہ کی بیماری، یا منونیا، یا برانکائیٹس کا تیسرا درجہ، یا درد سر یا مکی، یا اعصابی، درد، جسم میں موت ملس کی زیادتی یا پھسل، اور ٹھنڈی چیز کھانے کی رغبت، یا پھنسی پھوڑا (خاص کر منہ میں) مزمن وجع مفاصل، جلد کی بیماری، ایلو پیٹھک طریقہ سے کسی بیماری کا علاج ہونے کے بعد۔

کلگیر یا سفیوریکا ۲-۲۰۰۔ آب زلال (ALBUMEN) کا نکلتا۔ یا قحطی، غذا پوری ملنے پر بھی بچہ کا جسم مضبوط نہ ہونا۔ بد ہضمی، جسم خشک ہو جانا۔ جسم کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جوڑا اچھی طرح نہ بیٹھنا۔ بچہ کی چند یا نہ بھرنے۔ ہڈی کی بیماری، زیر سے دانت نکلتا، ران کے جوڑ کی جگہ سفید، سوجن یا اکڑن، یا تشنج، اور سستی، ہاتھ، پیر ٹھنڈے اجتماع خون، کی خرابی یا خاندانی سود المزاجی سے پیدا ہوا سبب کی خرابی (دق وغیرہ) مثانہ کی بیماری۔ سفید سیلان الرحم، درد یا رات میں پسینہ، یا زخم، یا دانتوں کا جلد جلد زائل ہونا، برسات میں وجع مفاصل ہونا، سر میں اجتماع آب، پیٹھ کی ریڑھ اور گردن کمزور یا درد سر، یا سر میں بہت پسینہ (موٹے تازے

۱۔ سابق کے عالم تشریح جسم کی رائے کو غلط ثابت کر کے جرمن کے عالم کہتے ہیں کہ کلگیر یا سفیوریکا جاندار جسم میں نہیں ہے اس لئے موت سے کچھ ہی روز پہلے ۲۵ برس تک علاج کرنے کے بعد ڈاکٹر شسلر نے اپنی سیریا میڈیکا سے نکال دیا۔ لیکن ہم لوگوں کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے بائیو کیمیک یا موبو پیٹھک طریقہ سے آزمائش کے بعد (PROVING) بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے

بچہ کو تبدیلی موسم یا مہنی یا حرکت سے مرض کا بڑھنا اور سونے سے گھٹنا اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۶) کلکیر یا فلوریکا ۱۲-X-۲۰۰۔ ہڈی میں اکھار، سخت دانہ، ہڈی کے جوڑنے والی جگہ کا بڑھنا۔ گلیٹیاں ورم کرنا۔ گلیٹوں کا سخت ہونا۔ آنکھوں میں جالا پڑنا۔ اعصاب میں ورم یا نواسیر یا آنتوں کا بڑھنا۔ بواسیر یا رحم سے اخراج، کان میں سخت میل، ہاتھ پھٹنا۔ دانت برابر نہ ہوں، دانت میں درد ہو، بچوں کے دانت دیر سے نکلنا۔ کھانسی اور اس کے ساتھ تھکے تھکے، زرد کف نکلنا۔ جسمانی اعضا کا۔

(خاص کر رحم کا) اپنی جگہ سے ہٹنا۔ دل، وریڈوں کا بڑھنا۔ زرخہ یا گلا نیلا۔ خشک محسوس ہونا۔ آرام کے وقت اور موسم برسات میں مرض کا بڑھنا اور گرمی سے کم ہونا۔ اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

کیلی سلفیوریکم :- ۶-X-۱۲۔ سفوف ۲۰۰۔ زرد بلغم تھکے تھکے اخراج اور ہر قسم کے ورم اور بلغم کے تیسرے درجہ کی یہ اچھی دوا ہے۔

بہت قسم کی جلدی بیماری میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے۔ گھڑ گھڑا بہت کے ساتھ اور بلغم، اور زرد کے ساتھ دمہ، گلا، کان، اور معدہ سے زرد رنگ کا بلغم نکلنا۔ سر بھاری۔ (سرد ہوا میں آرام) اوس یا آگ کی آتش سے گویا سر جھلسا جاتا ہو۔ سیلان رحم کا اخراج زرد۔

جسم کی تکلیف (گویا جکڑ آنا) جسم میں داد یا کھال اُدھنا۔ جسم میں آکسین کی کمی کی وجہ سے سرگھومنا۔ جھاڑا معلوم ہونا۔ دانت میں درد وغیرہ بخار، دمویہ، چمپک، زہر باد۔ خضیتہ الرحم کا ورم، کھانسی یا دفتیر یا، ہوپ کھانسی، پھیپھڑے کا ورم۔ (نمونیا) ہنیتہ سرسائی بخار وغیرہ کے تیسرے درجہ میں یا لیریا بخار، معدہ میں بلغم کی وجہ سے

برقان، قولنجی درد یا معدہ میں بوجھ محسوس ہونا۔ قبض۔ ہونٹ کی کھال نکلنا۔ چہرہ زبان، منہ یا کسی بھی جھلی پر جلی پیدا ہو جانا۔ نصف جسم کا فالج، ناک سے یا کان سے بدبو دار اخراج

ہوتا۔ کان میں یا اگزیم، کھجلی، پھوڑا، خسرہ کے دب جانے سے پیدا ہوئے علامات یا امراض ناخن وغیرہ کمرہ کے اندر (خاصکر کھڑکی بند رہنے پر) گرم جگہ میں، موسم گرما میں، اور غروب آفتاب کے بعد اس بیماری کا بڑھنا، ٹھنڈی ہوا کھلی جگہ میں، خشک مقل موسم میں آرام محسوس ہونا۔ اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۸) کیلی فاسفوریکم X۱۲ - سفوف - ۲۰۰ - یہ عضلات یا پٹہ دماغ اور خون کی دوا ہے۔ دماغ سست ہونا۔ بڑی عمر کے آدمیوں کا بھی بچوں کی طرح رونا۔ اعصابی بے ہوشی، امراض اعصاب خون خراب ہونا، سٹرن کی حالت، سرسامی بخار، خراب زخم، براز اور پسینہ وغیرہ میں بدبو، جسم کے کسی حصہ میں سڑنے کے شروع درجے میں یا تمام جسم میں ٹھنسیاں، زکام میں بدبو، ناک سے بہت بدبو دار، بلغم نکلتا، اسہال، درد کان، گردن اکڑنا، دم، زکامی کھانسی کی وجہ سے موسم گرما کا بخار، یا آنکھیں سرخ، فالج کی حالت یا مرگی، زیادہ شراب پینے کی وجہ سے نیند نہ آنا، پیٹ میں درد، بہت کمزوری (جسمانی یا دماغی) خون کا رنگ سیاہی مائل، پر نبض کمزور۔ شروع حالت میں تیز بعدہ سست، یادداشت کی کمزوری، بد ہضمی، زچہ خانہ کا بخار یا سیاہ رنگ کا چھچک، اخراج خون، تمام جسم میں روسی۔ رحم سے اخراج خون زلالی، بول، ہیٹیریا، پاگل پن، یا سونے میں سرگھو منا، یا کھلی جگہ میں جانے سے ڈر یا سرگھو منا، ورم معدہ یا زخم معدہ یا ہوپ کھانسی یا وجع مفاصل، تپ، نسوان کا کانپنا۔ محنت کی وجہ سے ہانپنا یا اکڑنا۔ آواز سرد، ہوا لگنا یا زیادہ محنت یا لکھنے سے بیماری کا بڑھنا۔ یا آہستہ آہستہ گھو منا یا اچھی باتیں کرنا۔ اور گرم حالت میں آرام محسوس کرنا۔ اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۹) کیلی میٹوریاٹیکم X۱۲ - سفوف - ۲۰۰ - سوزش کے دوسرے درجہ میں زیادہ فائدہ راتا ہے۔ یہ خاصکر بلغمی جھلی پر فائدہ کرتا ہے۔

سفید یا میلے رنگ کا داغ یا بیماری کی مزمن حالت میں تھکے تھکے زکام کھانسی، آواز بیٹھی، خشک، بلغم، گلا و کان کی گلی کا آئینہ، بیماری متعلق زخم، منہ میں رال کی کمی، یا ڈفقیہ یا (خصوصاً دوا) بد ہضمی مرگی و بچ مفاصل میں جوڑوں کا درم، سردی کا پھوڑا یا جسم بھر میں روسی یا سرطان، قبض، مرض یرقان، بوٹے سی دین میوٹ کے درم سے پیدا ہوا بہرا پن، کان میں مواد (مزمن بیماری) گلے کا زخم، موتیا سیلا، چیچک، بخار دموئے زہریا، اگزیم، پھیپھڑے کا درم (نمونیا) ذات الجنب، سفید سیلان الرحم، آتشک، سوزاک حیف کی تکلیف، سیلان الرحم، خون میں آئینہ، اسہال سرسائی بخار، پلنگ، دم، بوجہ بد ہضمی، سفید پتلی چیز کی غذا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد وغیرہ، ثقیل چینے میں کھانا اور حرکت سے مرض کا بڑھنا اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۱۰) میگنیشیا فاسفوریکا $12 \times 12 \times 12$ - سفوف ۳۰، ۳۰، ۳۰ - اینٹھن اکڑن، اعصابی درد میں یہ دوا بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ خوب گرم پانی کے ساتھ بخلی طاقت کا سفوف استعمال کرنا چاہیے اس سے درد گھٹ جاتا ہے۔ سر، منہ، ذات، معدہ وغیرہ میں درد، عصبی درد، قوت شامہ کی کمی، اکڑن، تشنج، ہوپ، کھانسی، عضلات میں اکڑن کزاز، تشنج کی وجہ سے پیشاب رگنا، تشنج کھانسی۔ جسم کانپنا میں بلا مرضی کے ہاتھ پیر کے عضلات کا کانپنا۔ بہت عرصہ تک شراب پینے کی وجہ سے بہت قسم کے علامات، کلارک۔ کا ہاتھ کانپنا ریاضی تو لیم، بہت کھجلی، دردوں، دم، خون، یواسیر، پانی کی طرح زکام جاری ہونا، سردی میں بڑھنا، گرمی سے گھٹنا، وجع مفاصل درد، جیڑا بیٹھ جانا۔ بچکی، فالنج کی وجہ سے جسم کا کانپنا۔ تمام جسم میں کھجلی، نالو کا درم۔ صفرا کی پتھری اور اس کے ساتھ تو لیم

درد، (۳x گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا) متلی یا تے، معدہ میں
ریاح جمع ہونا، مرض مرگی، جمائی آنا، بہت زیادہ پسینہ نکلنا، نیند نہ آنا
آہستہ آہستہ چھوٹے یا سردی لگنے سے درد بڑھتا (خاص کر دائیں
جانب سینے سے، زور سے دیائے رکھنے، بلنے یا جسم کو دھرا موڑنے
سے درد کم ہونا۔ اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۱۱) نیٹریم سلفیوریکم ۱۲x سفوف ۳۔ ۲۰۰۔ صفر اکیو جی۔
بیماروں میں اور جن کے جسم میں پانی کا حصہ زیادہ ہو ان کے واسطے
نہایت اچھی دوا ہے۔ صفر اوی بخار، صفر اوی کڑوی تے، ڈکار یا
اسہال، صفراء سے پیدا ہوا درد سر، کڑوا ذائقہ، میلی زبان، بایو کیمک
کے طریقہ سے پیدا ہوا درد سر، بخار اور انفلوینزا کا یہ یکتا دوا ہے
یرقان، سردی کا بخار، معدہ میں ریا ح کی وجہ سے درد، ملیس
بخار، جگر کی بیماریاں، نزلہ خیمہ الرحم میں بلغم کا جمع ہونا اور ساتھ ہی
درد یا سبز رنگ کا کف نکلنا۔ تھند کے وقت ہاتھ پیر میں مروڑ۔
یا تشخ، ہڈیاں، دماغ میں چوٹ کی وجہ سے دماغی درد، حیض،
ہیفہ اسہال، بچوں کا ہیفہ۔ (درد) (LEAD-COLIC OR PRINTER'S COLIC)
مرض میں ۱۲x استعمال کرنا چاہیے۔ خون میں سفید ذرات کی زیادتی
یا سرخ ذرات کی کمی، صفراء کی کھیلی میں درد، مزمن سوزاک، ورم
مفاصل یا جوڑوں کا درد (خاص کر بلغمی مزاج والوں کو) جگر میں بیماری
کی وجہ سے استسقاء، پیشاب روکنے کی طاقت نہ رہنا۔ اعصابی درد
(پیریا سے پیدا ہوا)۔ پستان میں دودھ کم کرنے کے لئے بیکوں کا چھٹ
جانا (مریض روشنی میں جانے سے ڈرتا ہے)۔ کان میں درد۔ ٹھن ٹھن
محسوس ہونا۔ ناک سے (آنکھ کی وجہ سے) بدبودار مواد بہنا۔ ناک
اور منہ میں سرخ مریح کی طرح) جلن، کبھی طرح کی غذا کا ذائقہ نہ
معلوم ہونا، دانتوں کا درد، اور اس کے ساتھ مسوڑھے میں جلن
(دھواں پینے سے آرام محسوس ہونا) مرض پتھری حالت حمل میں کھانے

کے وقت سینہ میں درد کی وجہ سے سینہ دبا رکھنا، پیر اور ایسٹریوں میں سوچنا، گہری نیند، دمہ کی وجہ سے رات میں نیند کھل جانا، پھوڑا، داد، ۲۰۰ نم زین، برساتی ہوا یا تری کے پاس رہنا، پانی سے پیدا ہوئے بلودے، گرم، کھلی جگہ میں سونے کی وجہ سے بیماری کا آرام محسوس ہونا۔ اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۱۲) نیٹریم فاسفوریکم ۳۰ x ۱۲ x سفوف ۳۰ - ۲۰۰۔

یہ مرض تیزابیت کی اچھی دوا ہے۔ کھٹی ڈکار، قے، وجع مفاصل یا جوڑوں کا درد۔ پسینہ میں کھٹی بو، جسم میں یورک ایسڈ رہنا۔ آنکھوں سے زرد رنگ کا اخراج، مثانہ سے زرد رنگ کا اخراج اور جلن تپ و لرزہ، طیریا اور اس کے ساتھ کھٹی قے، زیادہ مقدار میں کھٹا دودھ نکلنا، جریان مٹی، ریڑھ کے ستون کا مغز کمزور، جسم کمزور تیزابیت سے پیدا ہوا اسپہال، بچہ کے جسم سے کھٹی بو آنا، زیادہ شکر یا مٹھی ڈال کر دودھ پینے کی وجہ سے بچوں میں لیکٹک ایسڈ، بڑھ جانے سے پیدا ہوئی بیماریوں میں، اُلگلیٹوں کا درم، جن سے سیال اخراج ہوتا ہے۔ سوزاک کی بیماری بیماری، سینہ میں جلن، مٹہ میں پانی بھر آنا۔ معدہ میں تھوشتی، تیزابیت سے پیدا ہوئی بد ہضمی، مواد پیدا ہونا۔ رگی، زہر باد، سیکے کا بڑا نتیجہ، سر بھاری، سر میں چکر۔ سانس میں ترش بر بو۔ آنکھوں کا درم، ایک کان کا گرم اور سرخ ہونا اور اس کے ساتھ کھلی رہنا۔ ناک کھجلا نا، ناک میں ہمیشہ بڑبو محسوس ہونا۔ منہ سرخ ہو کر آئاس ہو جانا، ترش اور تلخ، ذائقہ، زبان کی جڑ میں زرد داغ، معدہ میں زخم، معدہ میں اجتماع ریا ح، گرم کی وجہ سے پیٹ میں درد

۱۰ ڈاکٹر ڈنڈا رگل پیج فرماتے ہیں کہ نیٹریم سلف ۲۰۰ داد کی تیز بہت دوا ہے۔ ہم لوگوں نے ۱۸۹۷ء میں موسم برسات میں اس دوا کی ۵۰۰ طاقت کھلا کر ایک لڑکے کو بالکل اچھا کر دیا ہے۔

ترچھی نگاہ، قبض، اجابت کے وقت کو نکتہ نما، براز سفید یا سبز، امراض بول، امراض تیزابیت کی وجہ سے پیشاب روکنے کی طاقت نہ رہنا سفید سیلان الرحم، تپ دق، دل کا پٹنا، کمزوری کی وجہ سے پیرا کھڑنا ران، ایڑی وغیرہ جوڑ کے مقام میں درد، کھجلی کی وجہ سے سینہ نہ آنا۔ اگر یا، شہد کے رنگ کا احسراج۔ بچہ ڈبلا ہوتا جانا۔ بجلی گر پڑنے کے وقت، چربی ملایا میٹھی غذا سے بیماری کا بڑھنا۔

نیٹرم میٹور یا کم ۱۲ X سفوف ۳۰ - ۲۰۰ - تا امید ی اپنے کو بالکل بے مددگار کے سمجھنا، متواتر پیاس، جسم بہت ڈبلا کمزور، منہ خشک ہونا۔ نمک کھانسنے کی بے حد خواہش، قبض اس دوا کے غصوں علامات ہیں۔ کئی خون، چہرہ اُترا ہوا۔ درد سر، کلیجہ کی دھڑکن دمانی پریشانی، ڈبلا اور کمزور ہونا۔ ہونٹ خشک، ہونٹھکے کنارے زخم کنارہ یا ہونٹھکے بیچ کی جگہ پھٹی، بلغم لیسار اور صاف، انگلی پکنا پیر کے انگلی میں گو کھرو (یا گھٹ) ناخن کی بہت قسم کی بیماریاں۔

تپ و لرزہ، لمیر یا (دن گیارہ بجے لرزہ ہوتا۔ درجہ سردی ہو، یا اس کے پہلے پیاس، درجہ گرمی میں پیاس نہ رہتا۔ سر میں تھیر درد، کوئین سے رکھا ہوا بخار وغیرہ علامت میں صاف پانی کی طرح بلغم نکلتا، اچھی غذا سنبھالنے پر بھی بچہ کا جسم نہ بڑھتا۔ نواہر مسوڑھے میں درد، پیٹھ میں درد، مریض کو ایسا محسوس ہو گویا پیٹھ پھٹی جاتی ہے۔ مریض کا جسم ہمیشہ تیل لگایا معلوم ہوتا ہو، سفید لیسار گندمی رال، یکا یک خون کا دوران رک جانا۔ کبھی بھی شدید بیماری کی وجہ سے دل کے عضلات کا فالج، پھیپھڑے معدہ وغیرہ سے اخراج خون زیادہ مقدار میں شراب پینے کی وجہ سے استسقاء، موسم گرما کے نزول کی کھانسی کا بخار، گہری نیند یا نیند بالکل ہی نہیں۔ مرگی اور اس کے ساتھ منہ سے کف نکلتا، سردی، گرمی کا احتمال اور چند یا پر سرد پانی دالنا، خیردار اس کے پیچھے یا گردن کے پیچھے پانی

نہ لگتے پو بھونرا اور ہر پلے جسانداروں کا ڈنک مارنا۔ کونین سے
اڑکا ہوا جنار، پتی یا جسم کی کھجلی، اچھی غذا ہونے سے بھی مریض کا
جسم خشک ہوتے جانا، جوڑوں میں درد۔

جاڑے کے دنوں میں سمندر کے کنارے رہنا۔ پیشاب کے بعد کونین
آرٹنک، مرکری، نائٹرک آف سلور، سلفر، وغیرہ کے غلط استعمال
سے مرض کا بڑھنا، کھلی جگہ میں رہنا۔ سرد پانی سے غسل کرنا۔
دائیں کروٹ سونے پر مریض کو آرام محسوس ہوتا۔ اس کی خاص علامت
ہے۔ نیٹرم میور، ملاحظہ ہو۔

مخصوص اعضاء کی ادویات

دایاں عضو ماؤف ہونے پر، آرم۔ ارجنٹم، نائی، اے پس،
کالو، سلفر، کینتھر، کلکریا کارب، چیلی ڈوٹیم، انکس و امیکا۔
پلس، بیلاڈونا، برائیونیا، بوریکس، بیٹیا، شکیل، لائیکوپوڈیم۔

بایاں عضو ماؤف ہونے پر، اسافوٹیلا۔ آرج نائی۔
فاسفورس، یوفوریا کروکس، کیپیکم، منزپریم، لیکس، اسٹائم سائنا بلف، سلکا۔
دایاں اور بایاں عضو کے بعد دیگرے۔
ماؤف ہونے پر، ایگارکس، انٹم کروڈ، ٹیکس۔

کسی عضو کے مخالف دونوں کونے
(DIAGONALLY) ماؤف ہونے پر، ایگا، فاسفورس۔

(۲) دو اکی طاقت اور دو اکی فعل اور زمانہ قیام

(د۔ دن۔ گ۔ گفٹہ۔ س۔ سقوت)

اس مقصد کے ہر ایک صفحہ میں چار خانے ہیں۔ پہلے میں حروف
تہجی کی ترتیب سے دونوں کے نام۔ دوسرے میں ان کے نام

تیسرے میں دوا کی طاقت (DRUG POTENCY) عموماً کام میں آنے والی ثقیل (DILUTIONS) یا طاقت (POTENCIES) اور پختے خانہ میں اس دوا کی طاقت کا زمانہ قیام، یعنی دواؤں کا اثر جسم

(DURATION OF ACTION OF THE POTENTISED DRUG)

میں کتنی دیر تک ٹھہر سکتا ہے۔ مندرج ہیں

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
اسٹیم	اسٹیم	۳۰ - ۳	-
آرم میوزیٹرو	آرم ملے	۲ - ۳ - ۳۰	-
اسٹے فائی سیکریا	اسٹے فائی	۳ - ۳۰	-
آرم میٹا لیکم	آرم	۳۰ - ۳	۵ - ۶ - ۷ - دن

(RELATIONSHIP OF REMEDIES (DR GIBSON MILLER'S)

سلاہ ہومیو پیتھک دوا کا زمانہ قیام، مرض کی حالت اور مرض پر منحصر ہے اسے چوتھے خانہ کا مطلب معمولی زمانہ قیام سمجھنا چاہیے۔ جیسے ٹکس و امیکا کی کوئی طاقت استوائ کرنے پر اس کا اثر ہمیشہ ایک روز سے سات روز تک رہتا ہے یا ایکونائٹ کے فعلی کا اثر نصف گھنٹہ سے دو دن تک مریض کے جسم میں موجود رہتا ہے۔

مشہور و معروف ڈاکٹر جابر نے فرمایا ہے کہ نئی (حالیہ) بیماری کے موافق کسی ہومیو پیتھک دوا کا زمانہ قیام کم سے کم ۱۵ منٹ سے ۸ گھنٹہ تک اور پُرانی (مزمن) بیماریوں میں اس دوا کا زمانہ قیام ۵ روز سے ۸ روز تک تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ضرورت پڑنے پر دوا بدل کر دوسری دوا دی جاسکتی ہے۔

(HULL'S JAHN 6TH AMERICAN EDITION)

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
اسٹریا وار جکا	اسٹری	۱ - ۳	-
اسٹکن	اسٹک	اسفوف ۳ - ۳۰	-
اسیم	اسم	۶	-
آئی ویرس	آئی وے	۵ - ۳	-
آئی ویرس و سکلر	آئی وے	۵ - ۳۰	-
آسٹرن سیا کرب	اسٹرن کرب	۶ - سفوف	-
آیوڈیم	آیوڈ	۵ - ۳ - ۳۰	۳۰ - ۳۰ دن
آر جٹیم نارٹیکیم	ارج نائی	۳ - ۳۰	۳۰ دن
آر جٹیم مٹالیکیم	ارج مٹ	۳ - ۶ - ۳۰	۳۰ - ۲۱ دن
آر کالیورنئس	آرٹی	۵ - ۶	-
اسٹرافین تھس	اسٹروفے	۵ -	-
آرنکامارنٹینا	آرنکا	۵ - ۳ - ۲۰۰	۶ - ۱۰ دن
اسٹرامونیم	اسٹرامو	۵ - ۳۰	-
آرسنکم آیوڈ	آرس آیوڈ	۳ - ۳۰ - ۳۰	-
آرسنکم ایٹیم	آرس	۳۰ - ۲۰۰	۳۴ - ۳۰ دن
آرسنکم بروم	آرس بروم	۵ (پانی کے ساتھ)	-
آرسنکم ہائیڈرو	آرس ہائیڈرو	۳ -	-
آرسنکم سلف فلو	آرس سلف	۳ - ۳۰	-
ایکاتھا انڈیکا	ایکامی	۳۰ - ۱۲	-
ایکونائٹ نپ	ایکون	۳۰ - ۳۰	نصف گھنٹہ سے ۴۸ گھنٹہ
ایٹیارسی موسا	ایکیرے	۵ - ۳ - ۳۰	۱۲ - ۰ دن
ایکیا - آئی گٹیا	ایکیا	۳	ایک گھنٹہ - ۲۱ دن
ایگارے اہرن گیکان	ایگاہ	۵	-
ایکر - یکم میکے	ایگار	۳ - ۲۰۰	۳۰ دن

سہ پانی کے ساتھ سفوف کھانا منع ہے۔

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
ایگنس کسٹس	ایگنس	۱-۶	۲۰-۲۱ دن
اینگلیسٹورا	اینگٹ	۳-۶	۲۰ دن
ایٹروپین	ایٹروپ	۲-سفوف	-
انیٹو نینیم کروٹم	انیٹم کروٹ	۳-۶	۲۰ دن
ایلیونیم مارٹریکیم	ایلیٹ مارٹ	۲-۳ سفوف ۴-۶	۲۰-۳۰ دن
ایڈری نیلین	ایڈ	۱-۳-X	-
ایکاکارڈیم اور	ایاکا	۳-۶	۳۰-۴۰ دن
انتھراسینم	انتھرا	۳-	-
ایپومارفیا	ایپومارف	۳-۶	-
ایپوسانٹم کنائیم	ایپوسانٹ	۵-	-
ایسپتیم	ایسپسٹھ	۱-۶	-
ایسروٹیم	ایسرو	۳-۲۰	-
ایوناسٹائی واد	ایونا	۵ (گرم پانی کے ساتھ)	-
ایملٹائٹروسم	ایملٹائی	۱-۳X	-
ایمونیم کارب	ایمون کارب	نیچے کی طاقت	۲۰ دن
ایمونیم کاسٹیکم	ایمون کاسٹ	۱-۳	-
ایمون پیکرک	ایمون پیک	۲-۳	-
ایمونیم فاسس	ایمون فاس	۲X س	-
ایمونیم بنزوئیک	ایمون وبنج	۲-س	-
ایمونیم بروم	ایمون بروم	۱-	-
ایمونیم میور	ایمون میور	۳-۶	۲۰-۳۰ دن
ایمیراگریشیا	ایمیرا	۲-۳	-
آرٹھی سٹاڈلگیرسن	آرٹھی	۱-۳	-
ایرانیا ڈاڈلے	ایرانیا	۴-۳۰	-

نام ادبیات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
ایلیٹونیا کنٹرکٹ	ایلیٹو	۵ - ۳۰ - ۳	-
ایلو مینا	ایلیوم	۶ - ۳۰	۲۰ - ۶۰ دن
ایلیومین	ایلیومے	۱ - ۳۰	بہت عرصہ تک
ایلو سکورٹنیا	ایلو	۱ - ۲۰۰	۳۰ - ۲۰ دن
ایلیٹرم فرموسا	ایلیٹری فر	۵ - ۳	-
اسکوٹے لیریا	اسکوٹے	۵ - ۳	-
ایلیم سیمپا	اپس	۱ - ۳	ایک دن
ایلیم سٹاوا	ایلیے	۲ - ۶	-
ایگلی پیس ٹیوب	ایگلی پی ٹیوب	۵ - ۱	۲۰ - ۶۰ دن
اسافٹیدا	ایسانی	۲ - ۳۰	۲۰ - ۲۰ دن
سپائی جلیا	سپائی	۲ - ۳۰	۲۰ - ۳۰ دن
ایسارام یورپ	ایسارام	۳ - ۶	۸ - ۱۲ - ۱۲ دن
ایڈ بک لک	ایسی ایکز	۳ - ۳۰	-
ایڈ ایسٹیکم	ایسی ایسی	۳ - ۳۰	۱۲ - ۲۰ دن
ایڈ کارپولیکم	ایسی کارپ	۱ - ۳۰۰	-
ایڈ نائٹیریکم	ایسی نائی	۲ - ۳۰	۲۰ - ۶۰ دن
ایڈ پیکر یکم	ایسی پیکرک	۱ - ۶	-
ایڈ فاسفوریکم	ایسی فاس	۲ - ۳۰	۲۰ دن
ایڈ فسلوریکم	ایسی فسلو	۶	۳۰ - ۳۰ دن
ایڈ میوریا یکم	ایسی میور	۱ - ۶	۳۵ - ۳۵ دن
ایڈ ٹیکٹک	ایسی ٹیک	۳ - ۳۰	-
ایڈ سلفیورک	ایسی سلف	۵ - ۳۰	۲۰ - ۶۰ دن
ایڈ ہائڈروسیانک	ایسی ہائڈرو	۱ - ۳	-
ایگنیشیا	ایگنے	۵ - ۳۰	۲ گھنٹہ ۹ دن

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام کا اثر
ایٹھوزا -	ایٹھو	۳ - ۳۰	۲۰ - ۲۰ دن
انفلوزینیم	انفلو	۳۰ - ۲۰۰	-
ایٹھہ دانتھہ کی کئی	اوٹھہ طاخط ہو	-	-
ایکا کوہنا	ایپ	۳۰ x ۳	۲ گھنٹہ ۲۰ دن
ایکیوس لفظ ایسیوس	ایکیوس طاخط ہو	-	-
ایکیشیا	ایکیشیا	-	-
ایس ملی فوکا	ای	۳۰ - ۵	-
ایم گرے وپوس	ایپ گرے	۳۰ - ۱	-
ای بی ایچ کناڈس	ای بی ایچ	۳۰ - ۵	-
ای بی ایچ نانگرا	ای بی، نانگرا	۳۰ - ۱	-
ایرم ڈاٹھلم	ایرم	۳۰ - ۳	۱ - ۲ - ۲ دن
ایلاٹیم	ایلاٹ	۲ - ۶	-
ایلیٹھس	ایلیٹھ	۱ - ۶	-
ایکیوس	ایکیو	۳ - ۵	۳۰ دن
اونٹھہ کروکٹیا	اونٹھہ	۳ - ۶	-
اسپرٹ کیفر	کیفر	۳	ایک گھنٹہ ایک دن
اوپیم	اوپ	۳ - ۲۰	۴ - ۲ دن
اور پگنیم	اورا	۳	-
اولینڈر	اولی	۳ - ۳۰	۳۰ - ۲۰ - ۲۰ دن
اسٹی لگیا سلونکا	اسٹی لنگ	۵ - ۲۰ x	-
اوپیم کیلنم	اوس	۲ - ۲۰	-
اسکنا پلتوریا	اسکنا	۵ - ۶	-
سینچیا	سینچ	۵ - ۳	ایک گھنٹہ ایک دن
بریرس و لیکرس	بریا	۵ - ۶	۲۰ - ۳۰ دن

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانه قیام اثر
بسته	بسته	۱-۶	۲۰-۵۰ دن
بیوفو	بیوفو	۶-	-
بیاس پیرنیس	بلیس	۵-۳	-
بیلا دونا	یل	۳۰×۳	۲-۴-۴ دن
یوتراپس	یوتراپس	۶-۳۰	-
یودسٹا	یودی	۲-۶	۴-۱۲-۱ دن
یوریس	یوریس	۱-۳	۲۰-۲ دن
بیڈیگا	بیڈ	۱-۶	-
بیٹشیا	بیٹ	۵-۳۰	-
براشا آیوڈ	برایوڈ	۲-۳-۳ سفوت	-
براشا کارونیکم	براشا کارب	۳-۳۰	۲۰ دن
براشا سیوریایکم	براسیو	۳-۳ سفوت	-
بسلینم	بسی	۲-۲۰۰	-
برایونیا	برایو	۱-۳۰	۴-۲۱-۵ دن
بلٹا اوزنیکس	بلکٹا	۵-۶-۲۰۰	۲۰ دن
پاؤڈر و سٹلم	پاؤڈر	۵-۶-۲۰۰	۳۰ دن
پاکروجن	پاکرو	۶-۳۰	-
پاکو کارپس	پاکو کارپ	۳	-
پلیاٹیلانیٹ	پلیس	۳۰×۳	۳۰-۳ دن
پیشیلا	پس	۳-۳۰	-
پیشرو لیم	پیشرو	۳-۶	۲۰-۵۰ دن
پیشرو سلینم	پیشرو	۱-۳	-
پیر برا بریوا	پیرس	۵-۳	-
پیرس	پیرس	۳-	-

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
پسی فلورائن کاربٹ	پسی فلو	۴ (خوراک سے قطرے)	
پلیسم	پلیسم	۳ - ۳۰	۲۰ - ۳۰ دن
پلیگنیم	پلیگی	۴ - ۳۰	-
پلینیم	پلینٹ	۳ - ۳۰	۲۰ - ۳۰ دن
پلین ٹیگو	پلینٹ	۴ - ۳	۰
مقریڈیم	مقری	۳۰ X ۳	-
کھیا	کھیا	۳۰ - ۳	-
کھوجا	کھوجا	۲۰۰ - ۴	۶۰ دن
کھلیب دارسا	کھلیب	۴ - ۴	-
ٹائیفائیڈ نیم	ٹائی فائی	۳۰ - ۲۰۰	-
ٹیو کریم	ٹیو کر	۱ - ۴	۱۲ - ۲۱ دن
ٹے بیکم	ٹے بے	۳ - ۲۰۰	-
ٹراکیسکم	ٹراکس	۴ - ۳۰	۱۲ - ۲۱ دن
ٹیور کیو لنیم	ٹیور	۳ - ۲۰۰	-
ٹری بنتھن	ٹری	۱ - ۴	-
ٹری ڈیم	ڈمب	۴ - ۳۰	-
ٹیکوریم	ٹیکور	۴ - ۳۰	۳۰ - ۴۰ دن
ٹرنیڈ یولا	ٹرنیڈ	۴ - ۳۰	-
جھیا	جھیا	۴ - ۳۰	-
جن سینگ	جن سینگ	۴ - ۳	-
جن سیانا لوٹیا	جن لوٹ	۴ - ۳	-
جلمسیم	جلس	۴ - ۳۰	۳۰ - ۴۰ دن
جیکر مسدا	جیک	۴ - ۲۰	-
حدٹ اروفا	جیٹ رور	۲ - ۲۰	-

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
جے بورینڈی	جے بو	۳ - س - ۲	-
چائنا	چائنا	۳۰ - ۰	۷ دن
چے فلا	چے	۳ - ۰	-
چیلی ڈونیم	چیلی	۳ - ۰ X	۴ - ۱۲ دن
ڈکس	ڈل	۶	-
ڈایکوریٹ	ڈایک	۳ - ۰	۱ - ۷ دن
ڈکسارا	ڈکے	۳۰ - ۲	۳۰ - دن
ڈیجیٹلس	ڈیجی	۳۰ - X ۲	۲۰ - ۵ دن
ڈیفنریم	ڈیفن	۳۰ - ۲۰۰	-
ڈیفنی انڈیکا	ڈیفن	۶ - ۱	-
ڈراپر	ڈراپس	۶ - ۱	۲۰ - ۳۰ دن
رٹاکس	رس	۲۰۰ - ۳	۱ - ۷ دن
رس وے نیٹا	رس وین	۲۰۰ - ۳	-
رس ریڈ	رس ریڈ	۲۰۰ - ۳ - ۳	۱ - ۷ دن
روٹا	روٹا	۳۰ - ۱	۳۰ - دن
ریوم	ریوم	۶ - ۳	۲ - ۳۰ دن
ریوکس کراچس	ریوکس	۶ - ۳	-
رس خج	رس	۶ - ۳	-
ریڈیم بروماٹ	ریڈی	۲۰۰ - ۳	-
روڈو ڈنڈرم	روڈو	۳ - ۰	-
روبینا	روبین	۳ - ۰	۲۵ - ۴۰ دن
رٹانا	رٹانا	۶ - ۳	-
رکنن کیوس بلب	رکن	۳۰ - ۳ - ۰	۳۰ - ۴۰ دن
رلفین	رلفین	۳۰ - ۳	-

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانه قیام اثر
زنکم مثاسیکم	زنک	۲ - ۳۰	۳۰ - ۴۰ - دن
زنجبار	زنج	۱ - ۶	-
زین تحوک سائکم	زینقو	۱ - ۶	-
سائی کوٹا و اژدسا	سائیگوتا	۳ - ۲۰۰	۳۵ - ۴۰ - دن
سائتا	سائتا	۱ - ۲۰۰	۱۲ - ۲۱ - دن
سائکس	سائے	۶ - ۲۰۰	-
سائکیشیا	سلکا - ملاحظه ہو	-	-
سار سا پرلا	سارسا	۱ - ۶	۳۵ - دن
سلفر	سلف	۶ - ۲۰۰	۴۰ - ۶ - دن
سیکیل	سکے	۵ - ۳۰	۲ - ۳ - دن
سلکامن	سلکا	۳ -	۱۲ - ۲ - دن
سر بجم جیمو	سج	۵ -	-
سفید شیو	سنس	۵ - ۳۰	-
سینا	سائتا - ملاحظه ہو	-	-
نریر یا اژدسا (سکس)	سینری	۳	-
سیپا	سپ	۶ - ۲۰۰	۴۰ - ۵۰ - دن
سفلینیم	سفل	۳۰ - ۲۰۰	-
سی سیفیوگا ایں موسا	راکیا ایں موسا (خط ہو)	-	-
سمفنا ٹم	سمفنا ٹم	۵ -	-
سیانو کتن مرکا	سیانو	۵ -	-
سلا میری ٹھا	سلا	۱ - ۶	۱۲ - ۲ - دن
سلکا	سلی	۳ - ۴۰ - ۲۰۰	۴۰ - ۶ - دن
سلینیم	سلون	۳ - ۲۰۰	۴۰ - دن
سنگونا	(چائتا ملاحظه ہو)	-	-

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
سی، نی، پریس	تنے	۱-۳-۳	-
سس ٹس	سس ٹس	۱-۳-۳	-
سڈرن	سفیکا	۹-۶	-
سیاں سرولیٹس	سیاں	۹ (دس بارہ قطر)	-
سرے نیم	سو	۳۰-۲۰۰	۳۰-۲۰ دن
سلوکم چاک	سلوکم	۳-۳	-
سکیولا	(سیلا ملاحظہ ہو)	-	-
سولینم نانگرا	سولینم	۲-۳	-
سنگو نیریا	سنگ	۹-۳-۶	-
سوی ٹو ناسن	سن ٹو	۱-۳-۳	-
سوائٹنا	سوائی	۱-۳-۳	۲۰-۳۰ دن
بیادلا	سواڈ	۹-۳	۲۰-۳۰ دن
سیمیوکس	سیمیو	۹-۶	۲-۲-گھنٹہ
سراسینا	سراس	۳-۶	-
فارمکا	ناری	۴-۳۰	-
فاسفورس	فاسفو	۳-۳۰	۲۰ دن
فائی زسٹک	فائی زس	۳	-
فائی ٹولکا	فائوٹ	۹-۳۰	-
فلکس میں	فلکس	۱-۳	-
فیرم آیوڈیم	فیرم آیوڈ	۳-۳	-
فیرم پیکرک	فیرم پیک	۳-۳۰	-
فیرم فاسفوریکم	فیرم فاس	۳-۶	-
فیرم میوڈ	فیرم میوڈ	۳-۴	-
فیرم مشالک	فیرم	۱-۶	۵۰-۵ دن

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
فلینڈ یکم	فلینڈ	۹ - ۶	
کاکیلوس انڈیکا	کاکیلو	۳ - ۳	۳۰ - ۳۰ دن -
گلشن لکٹائی	گلشن	۱۱ - ۲	-
کینڈ یورنکا	کینڈ یو	۱۱ - ۱	-
کافیا کروڈا	کاف	۳ - ۲۰۰	۱ - ۴ - ۱ دن
کوریلیم ریویرم	کوریل	۳ - ۳	-
کوپیکم	کون	۹ - ۳ - ۳۰	۱۲ - ۲۰ - ۱ دن
کالین سو نیم	کالین سو	۹ - ۳ - ۲۰۰	۳۰ - ۳۰ دن -
کلیسٹر نیم	کلیسٹر	۳ - ۳	-
کالو با لم	کالوسی	۹ - ۳ -	-
کالوسنہ	کالوس	۳ - ۳	۱ - ۴ - ۱ دن
کاسٹم	کاسٹک	۳ - ۳	۵ - ۵ دن -
کارڈواس میرٹس	کارڈ	۹ - ۳ - ۱۱	-
کاربوانی مل	کاربوائے	۳ - ۳ - ۳۰	۴۰ - ۴۰ دن
کاربوجی ٹلیس	کاربوائے	۱ - ۳ - ۳۰	۴۰ - ۴۰ دن
کارسنوسن	کاری	۳۰ - ۲۰۰	-
کیوپرم آرسنکم	کیوپر ارس	۲ - ۲ - ۳	-
کیوپرم بیلیکم	کیوپر ایسی	۲ - ۲ - ۳	-
کیوپرم ٹیکم	کیوپر	۴ - ۳۰	-
کیونبیا	کیوبی	۲ - ۳	-
کنتم آرس	کنی آرس	۲ - ۲ - ۳	-
کنتم سلفیو	کنی سلفا	۱۱ - ۳ - ۳۰	-
کیو غنص	کیو غنہ	۹ - ۱	-
کینولودیم	کنولوا	۳ -	-

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زیادہ قیام اثر
کیلی آیوڈیم	کیلی آیو	۱۲ - ۵	۲۰ - ۳۰ - دن
کیلی کاربونیکم	کیلی کارب	۳ - ۳۰ - ۲۰۰	۳۰ - ۵۰ - دن
کیلی آرسنم	کیلی آرس	۳۰ - ۳	
کیلی فوریکم	کیلی فور	۱ - ۶	
کیلی نائٹریکم	کیلی بائی	۳۰ - ۳	۳۰ - ۴۰ - دن
کیلی پارنگینٹم	کیلی پارمنگ	۳ x ۳ (پانی کے ساتھ)	-
کیلی فاسفوریکم	کیلی فاس	۳ - ۳۰ - ۲۰۰	-
کیلی بائی کرومیکم	کیلی بائی	۲ - ۳۰ - ۱۲	۳۰ - دن
کیلی برومیکم	کیلی برو	۵ - ۳ - ۳۰ -	-
کیلی میو ریسیکم	کیلی	۳ - ۶	-
کیلی سائٹس	کیلی سائی	۳ x ۳	-
کیلی سلفوریکم	کیلی سلف	۳ - ۲	-
کوناسٹم	کونائی	۳۰ - ۳۰	۳۰ - ۵۰ - دن
کوکا	کوکا	۵ - ۳	-
کوپپوا	کوپپوا	۱ - ۳	-
کوبرا (ناجا)	کوبرا (ناجا)	۴ - ۳۰	-
کیکٹس	ککٹ	۵ - ۴ - ۳۰	۶ - ۱۰ - دن
کیڈیم سلف	کیڈیم	۳ - ۳۰	-
کنائس انڈیکا	کنائی	۵ - ۳	-
کنائس شائی وا	کناسیٹ	۱ - ۱۲	۱ - ۱۰ - دن
کینٹھرس	کینٹھ	۳ x ۳	۳۰ - ۴۰ - دن
کیسیکم	کیس	۳ - ۴ (دودھ کے ساتھ)	۷ دن
کیوٹا	کیو	۱ - ۳۰	۲۰ - ۳۰ - دن
کیفر	کیف	۵ - ۳	۱ - ۱۰ - دن

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
کلکیر یا آیوڈ	کلک آیوڈ	۲-۳-۳	-
کلکیر یا آرسنک	کیلک آرس	۳۰-۳-۳	-
کلکیر یا کاربونیٹ	کیلک	۶-۳۰-۳	۶-۴۰ دن
کلکیر یا فاسفو	کیلک فاس	۱-۳-۲۰۰	۶-۴۰ دن
کلکیر یا فلوریدا	کیلک کے فلو	۳-۱۲-۳	-
کلکیر یا سلف	کیلک سلف	۲-۶-۳	-
کیلیمیا	کیلیم	۱-۶-۲	۲-۱۴-۴۰ دن
کلیمڈیم	کیل	۳-۶-۲	۳-۲۰-۴۰ دن
کلیمڈیولا	کلیمڈ	۹-۳-۳	-
کرپور وٹم	کرپو	۲-۲۰۰-۲	۱۵-۲۰-۴۰ دن
کرکس سٹائوا	کرکس	۹-۳۰-۳	۹-۴۰ دن
کرڈن میٹالک	کرڈن	۳-۶-۳	۳-۴۰ دن
کرڈیس پکرائڈس	کرڈ	۳-۶-۳	۳-۴۰ دن
کرٹیکس	کرٹ	۹-۳-۳	-
کلیمڈر آرکٹ	کلیم	۳-۳۰-۳	۱۴-۲۰-۴۰ دن
کلورم	کلورم	۲-۶-۲	-
کلورل یا ٹیڈرٹ	کلوریل	۱-۳-۶	-
گوائیکم	گوائے	۶-۳۰-۳	۴۰-۴۰ دن
گیموجینا	گیمو	۳-۳۰-۳	۱-۵-۴۰ دن
گرافائیٹس	گرافائیٹ	۶-۳۰-۳	۴۰-۵۰-۴۰ دن
گریسی اول	گریس	۹-۳-۳	-
گلوفائن	گلوف	۲-۳۰-۳	۱-۴۰ دن
لیک بنتھ	لیکن	۹-۳-۳	-
لے فقا سرس	لیتھا	۳-۳-۳	-

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
لاہوسی لے لے سس	ٹرو	۵ - ۳	۲ - ۸ - دن
لائیکوپس	لائیکوپس	۵ - ۳۰	-
لائیکوپوٹیم	لائیکو	۶ - ۲۰۰	۲۰ - ۵۰ - دن
لیڈم	لیڈم	۳ - ۳۰	۳۰ دن
لیتھوٹیم کارب	لیتھی کارب	۱ - ۳ - س	
لیٹم ٹائیگرم	لی	۳	۱۴ - ۲۰ - دن
لسن	لسی	۳۰	-
لیٹنڈرا	لیٹ	۵ - ۳۰	-
لوبلیا	لوبے	۵ - ۳	-
لیک کینم	لیکے کن	۳ - ۲۰۰	
لیکس	لیکے	۶ - ۲۰۰	۳۰ - ۲۰ - دن
مسکس	مس	۱ - ۳	ایک دن
مرکیورس کرڈالوس	مرک کار	۳ - ۶	-
مرکیورس ڈال سس	مرک ڈال	۳ - ۶ - س	-
مرکیورس بن آبود	مرک بن	س - س	
مرکیورس پردو	مرک پردو	۱ - ۲ - س	
مرکیورس ڈالوس	مرک دا	۲ - ۳ - س	۱ - ۳ - دن
مرکیورس سلوبلس	مرک سول	۲ - ۳۰	-
مرکیورس سالی نیٹس	مرک سالی	۶ - ۳۰	-
مار فینم	مارف	۳ - ۶ - س	-
مربی لنینم	مارب	۳۰ - ۲۰۰	-
مزیرم	مز	۶ - ۳۰	۲۰ - ۶ - دن
میڈورنیم	میڈور	۳۰ - ۲۰۰	-
من تھس	منی	۳ - ۳۰	۱۴ - ۲۰ - دن

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
مفاطر	مفاتی	۱ - ۳	ایک دن
ملی فویم	ملی	۱ - ۱	۱ - ۳ دن
میریکا	میریکا	۱ - ۳	-
ملی لوش	ملی لو	۱ - ۱	بچے کی طاقت
گنیشا کار پونکا	مگنی کاب	۳ - ۳۰	۲۰ - ۵۰ دن
گنیشا فاسفوریکا	مگنی فاس	۳۰ - ۳۰۰	-
گنیشا میور	گنیش میور	۳ - ۲۰۰	۲۰ - ۵۰ دن
گنیشا سلف	گنیش سلف	۱ - ۳	۳۰ - ۱ دن
گنیشا اسٹیکم	گنیش	۳	۲۰ - ۱ دن
طیرا آت سی نیس	طیرا آف	۳۰ - ۲۰۰	-
مینڈ نیم	مینڈ	۳۰ - ۲۰۰	-
نکس دامیکا	نکس دا	۱ - ۲۰۰	۱ - ۴ دن
نکس ماسٹیکا	نکس منیم	۱ - ۳	۸ - ۲۱ دن
نیوفروٹیم	نیوماس	۱ - ۶	-
نیکوٹینیم	نیکوٹ	۳ - ۶	-
نیٹرم آرسک	نیٹرم آرس	۳ - ۳۰	-
نیٹرم کاربوٹیکم	نیٹرم کارب	۳ - ۶	۳۰ - ۱ دن
نیٹرم نائٹریٹ	نیٹرم نائی	۲ - ۳	-
نیٹرم سلفیوریکم	نیٹرم فاس	۳ - ۱۲ x ۳	-
نفس لیم	نفسیل	۶ - ۲۰۰	۲۰ - ۵۰ دن
ناجا (کوبرا)	ناجا (یا کوپرا)	۶ - ۳۰	-
نف تحصیلینیم	نفتحہ	۱ - ۳ - ۳	-
ناٹری ایٹرس ڈاکس	ناٹری ایسی ڈا	۵	-
وائی برنم اوپوس	وائب	۵ - ۳ - ۳	-

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
وای یولا ڈوریا	وای یولا آد	۹ - ۶	۲۰۲ - دن
وای یولا ڈرائی کلر	وای یولا ڈرائی	نیچے کی طاقت ۳	۸ - ۱۲ - دن
ورسکیم	وربا	۹	۸ - ۱۰ - دن
وایٹریم الیم	ورسے	۳ - ۳۰	۲۰ - ۳۰ - دن
وسکم الیم	وسکم	۹ - نیچے کی طاقت	-
وراٹرم وراٹڈ	ورے وی	۹ - ۶	-
ولے ریولینٹ	وریا	۶ - ۳۰	-
ولے لیورینٹ	ولیز	۹	۸ - ۱۰ - دن
ویکس نیم	ویکس	۳ - ۳ - ۴	-
بائیڈروکوٹامیل	بائیڈروکو	۳ - ۶	-
بائیڈرو فونیم	بائیڈرو فو	۳۰ - ۲۰۰	-
بائی پیرکیم	بائی پی	۹ - ۶	۱ - ۴ - دن
بایوسیا مس	بائی نیس	۹ - ۲۰۰	۴ - ۱۲ - دن
بائیڈرائسٹس	بائیڈرائسٹ	۹ - ۱ - ۲۰۰	-
بیرسلفر	بیرسیر	۳ - ۳ - ۲۰۰	۸ - بیہوش
ہکلا لادا	ہکلا	۳ - ۳ - نیچے کی طاقت	-
ہلی نیٹھس	ہلی	۹ - ۳۰	-
ہوڈرماہورائٹس	ہوڈرما	۳۰ -	-
ہونیس	ہلی پی	۹ - ۶	-
ہلی یورس	ہلی	۹ - ۳۰	-
ہیسی میل	ہیسی	۹ - ۳ - X	-
یوکلپٹس	یوکل	۹ - ۳ - X	-
یو پے ٹوریم پارپ	یو پے پارپ	۱	-
یو پے ٹوریم پرف		۹ - ۳۰	۱ - ۶ - دن

نام ادویات	مختصر نام	طاقت	زمانہ قیام اثر
یوفوریم	یوفوری	۳ - ۶	۵۰ - ۵۰ دن
یوفریشیا	یوفر	۳ - ۵	۵۰ - ۵۰ دن
یورینیم نائٹ	یوری	۲ - ۳ - ۵	-

(۳) رشتہ ادویات

(DRUG-RELATION SHIP)

اطلاع

اس باب میں محلل قوی ہومیوپیتھک دواؤں کا آپس میں رشتہ بنایا گیا ہے۔
 (الف) کس دوا کے بعد کون دوا چل سکتی ہے۔
 (ب) کس دوا کے بعد کون دوا نہیں چلتی۔
 (ج) کس دوا کے زہر کا قفل کس کس دوا کو زائل کرتا ہے۔

یعنی

(الف) اس حصہ میں کس قدر قوی دوا کے بعد کون سی محلل قوی دوا اچھا کام کرتی ہے۔ درج ہے۔
 جیسے 'ایلو' دوا کے بعد 'کیلہ پائی کروم'، 'سیپیا'، 'سلفیورک ایسڈ' یا 'سز' خوب چلتا ہے۔ مریض کے جسم میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی سے 'کیلہ پائی کروم'، 'سیپیا'، 'سلفیورک ایسڈ' اور 'سکفر' ادویات کو ایلو کے بعد دلی موافق دوائیں کہتے ہیں۔

اس بعد والی موافق ادویات میں 'جوہلی قلم' سے لکھی گئی ہیں۔ اُن کو اُن دواؤں کا جہ پیلے دی گئی ہیں۔ تمامید کہتے ہیں۔ جیسے 'ایلو' کے بعد

سہ یعنی ادویات تمامید جیسے 'ایلو' کے استعمال سے بیماری کچھ دُوب جُٹنے پر بیماری کا باقی حصہ سکفر سے رفع ہو سکتا ہے (بقیہ پشت پر)

والی موافق دواؤں میں لفظ سلفر جلی قلم سے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سلفر دوا ایلو کی معاون ہے، یہ تو بتا دینا بے سود ہے کہ ایلو کے ساتھ سلفر کے بعد والی موافق اور معاون دونوں قسم کا رختہ سمجھ لینا چاہیے۔

(ب) اس حصہ میں کسی محلل مقوی دوا کے استعمال کے بعد کون سی محلل مقوی دوا نہیں چلتی یا نقصان پہونچاتی ہیں۔ لکھی گئی ہیں۔

جیسے، ایلو کے بعد 'ایلیم سیٹ' استعمال کرنے پر کوئی سخت بیماری پیدا ہو جاسکتی ہے۔ اسی لئے 'ایلیم سٹائیوا' ایلو کے بعد والی مخالف یا مہلک (INCOMPATIBLE) دوا کہی جاسکتی ہے۔

(ج) اس حصہ میں کسی محلل مقوی دوا کی زیادہ مقدار استعمال کرنے کے بعد کس کس محلل مقوی دوا کے استعمال کرنے پر اس کا زہر یا فعل زائل ہو جاتا ہے۔ لکھا گیا ہے۔ درج ذیل ہے۔

جیسے ایلو استعمال کرنے کے بعد 'کیمفر'، 'لائیکو'، 'نکس'، یا سلفر استعمال سے ایلو کا زہر یا فعل زائل ہو جاسکتا ہے۔ یعنی اگر ایلو کے استعمال کے بعد مریض کے جسم میں اس کا زہر یا فعل (POISONING) یا کوئی نئی علامت نمودار ہو تو اس زہر یا فعل کو زائل کرنے کے لئے 'کیمفر'، 'لائیکو'، 'نکس' یا سلفر استعمال کرنا چاہیئے۔ اسی سلفر، 'کیمفر'، 'لائیکو'، 'نکس' اور سلفر دواؤں میں ایلو کے زہر کو ہلاک کرنے والی یا ضد میں یا قاذر ہر کہتے ہیں۔ (ANTIDOTES)

(بقیہ پشت کا)

اس سے محسوس ہوتا ہے کہ تمام ادویات تمامیہ، بعد والی موافق ادویات کے طالع ہیں۔ اگر کل بعد والی موافق ادویات تمامیہ نہیں ہیں) ایک بات اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ 'ادویات تمامیہ ان ادویات کے پہلے جن کے اثر کو وہ نکیل کو پہونچاتی ہیں) ضرورت پڑنے پر (دوا سلفر، ایلو، کے پہلے بغیر کسی نقصان کے استعمال کی جاسکتی ہے۔)

بلا علم رشتہ ادویات دینے کا بوجھ کسی کو اپنے سر نہ لینا چاہیے۔
 موجودہ وقت کے ہومیو پیتھ کی نسبت سابق کے ہومیو پیتھوں کو
 اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ اس لئے علاج میں ان کو بہت زیادہ کامیابی
 ہوئی تھی اور ان کی وجہ سے مہذب دنیا میں آج ہومیو پیتھ کی اس قدر
 آؤ بھگت ہے، ادویات کے رشتہ کا علم ہوئے بغیر دوا دینا ایسا ہے
 جیسے روکنے والے پرزہ (BRAKE) کے بغیر موٹر گاڑی چلاتا
 قدم قدم پر خوفناک مصیبت آسکتی ہے۔ موجودہ کتاب کی مدد سے ہومیو پیتھیک
 دواؤں کا بے فائدہ استعمال بند ہوگا۔ ایسی امید کرنا بے جا نہ ہوگا۔
 انگلینڈ میں زمانہ حال کے انگلستانی ہومیو پیتھیک ڈاکٹر (دور) میں مقدم
 ڈاکٹر کلارک صاحب کا ارشاد ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک خرمین
 بیماری میں علاج کے لئے کلکیریا کارب کے استعمال سے کچھ کچھ فائدہ
 ہو رہا تھا۔ لیکن کلکیریا کارب کے بغیر ہی برائیوں کا استعمال کرنے
 پر بیماری ناقابل شفا ہو گئی۔

(THE CASE WAS IRRETRIEVABLY SPOILED) ایک دفعہ مجھے
 خود ہی کچھ تکلیف دہ علامات ہو گئے اس کا سبب تلاش کرنے میں کمی
 رفتہ بہر گئے؛ اس کے بعد سبب کچھ سمجھ میں آیا کہ کچھ روز پہلے ٹیمرم میوڈ
 ۲۔ ایک خوراک کھانے سے ہی نتیجہ ہے (اس وقت) (JAHR) کی
 کتاب کھول کر اس کا فائدہ نیٹری اسپیرٹس (NITRI SPIRITUS DULCIS)
 دیکھا۔ سوچنے ہی سے میں اُسی وقت بالکل اچھا ہو گیا۔ اُس وقت
 ان محلل قوی ہومیو پیتھیک دواؤں کی مضبوطی میری سمجھ میں آ گئی۔
 (DR. CLARKE'S DICTIONARY OF PRACTICAL MEDICINE)

(Vol. I. PAGE V. AND Vol II) (لاحظہ ہو۔)

صاحب خانہ اور نئے معالجوں کی دوا دینے کی آسا کے لئے مندرجہ
 بالا تینوں قسم کے رشتے ترتیب وار لکھے گئے ہیں۔
 لکھنا بیکار ہے کہ ادویات معاون ادویات و اق (یعنی سم) (بقیہ پشت پر)

کس دوا کے بعد کون دوا خوب بہترین کام کرتی ہے

(THE REMEDY IS FOLLOWED WELLBY)

نام دوا	ادویات معاون یعنی جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں
آرمٹ	ایکون، بل، کیلک، چائنا، لائیکو، مرک، ایڈنائی، پلس، رس، سپی، سلف، سلکا۔
ایوڈیم	بیڈی، لائیکو، پلس، ایکون، آرج نائی، کیلک، کیلک فاس، کیسیلی بانی، مرک سول، فاسفو۔
آرنکا	ایکون، اپیکا، راس، ورے، ہائیو، آری، بل، برائیو، بیراجی کیلک، کیلک، کیو، کیلینڈر، کو نیم، ہیر، آیوڈ، نکس، فاس، لیڈم، پلس، سورجی، ریٹنا، ایڈ سلف، سلف، باربار۔
آرنکیم الیم	نیٹرم سلف، اے ٹن سیٹ، کاربووج، نیٹرم سلف، فوسفو، پائرو، کھوجا، ایپی، بل، کیلک، کیو، چائنا، سائیکو، فیرم ایڈ، فلیو، آیوڈ، اپیکا، کیلی بانی، لائیکو، مرک، نکس، براٹش کارب، کیلک فاس، چلی، لیکے، سلف، ورے، رس۔
آرٹھیسیا	کسٹر (WINE) شراب کے ساتھ، آرٹھیسیا۔
آرنکیم ٹ	دوا استعمال کرنا چاہیے۔
آرنکیم نائی	کیلک، پلس، سپی، کیلک، کیلی کارب، لائیکو، مرک، پلس، سپی، سپائی، اینج، برائی، ورے، لم سیڈرو۔
ایکونائٹ	آرنکا، کافیا، سلف، امبرو، آرس، بل، برائیو، کیلک،

(دشت کاغذ) (الف) کس دوا کے بعد کون دوا چلتی ہے۔

اس لئے ان کو علیحدہ نہیں لکھا گیا ہے۔

نام دوا	نام ادویات معادلہ یعنی جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں
ایکونارٹ	کیلک، کلیو، کینتھ، سپر، اپیکا۔ کیلی برو، مرک، پلس، آرس؛ سپی، سیپائی، آپینج، سلکا،
ایگر بیکن	بل، کیلک، کیوپرم، مرک، ادپ، پلس، ورس، سلی، ٹرنٹ، یٹویا۔
اگنس کیلیٹس	آرس، براؤ، کلیڈیم، اگن، لائیکو، سلف، سلج۔
انڈسٹورا	بل، اگیشیا، لائیکو، سیپ،
انٹم کروڈ	کیلک، لیک، مرک، پلس، سپی، سلف، سلا۔
انٹم ٹارٹ	براٹا کارب، سائنا۔ کیف، پلس، سپی، سلف، ٹری، کاربووج، اپیکا۔
انا کارڈیم	لائیکو، پلس، پلاٹلی،
انا کھراسینم	ارم، یڈن، سلی،
ایمون کارب	بل، کیلک، لائیکو، فاس، پلس، رس، سپی، سلف، ورس، براؤ۔
ایمون میور	انٹم کروڈ، کافیاء، مرک، نکس، فاسفو، پلس، رس۔
امبر اگریشیا	لائیکو، سپی، پلس، سلف؛
ایلیو مینا	کیلی بائی، سپی، ایڈ سلف، سلف،
ایلیو	آرج، مٹ، فیہرم،
ایلم سیپا	کیلک، سلی، فاسفو، پلس، سارسا۔ تھوجا؛
ایلم شایوا	آرس،
ایسا فٹیا	چائنا، مرک، پلس،
ایسارم یو	پستھ، کاسٹیکم، پلس، سلی، ایڈ سلف،
ایڈ ایسٹ	چائنا۔
ایڈ ٹائٹرک	آرمکا، آرم، بل، کیلک، کاربووج، سٹے،
	کیلی کارب، کرویو، مرک، فاسفو، پلس، سپی، سلا۔
	سلف، تھوجا۔ آرس، کلیڈیم،
ایڈ فاس	آرس، بل، کیلک فاس، لائیکو، فیہرم فاس۔ نکس۔

نام دوا	ادویات معاون یعنی جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں۔
ایسڈ فلیو	سیپی، پیس، رس، سلی، سلف، ورے
ایسڈ میوور	گریفٹ، ایسڈ، نائی، سلی۔
ایسڈ سلف	کیلک، کارب، پیس، سیپا، سلف، سلی۔ نکس۔
	آرنیکا۔ ریوٹا، کیلک، کوٹیم، لائیو، پلیٹ، سیپی، سلف، پیس۔
اگنیشیا	آرس، بل، کیلک، چائٹا، لائیو، پیس، رس، نکس، سیپی، سلف، زنگ، سلی، نیٹرم میوور۔
اتھیورا	کیلک۔
	انٹم کروڈ، آرس، بل، بریو، کیلک، ایپی، کیلک، کیڈم،
	کیو، چائٹا، اگن، نکس، فاسفو، پیس، پوڈو، یوم، سیپی،
	سلف، ٹیلٹ، ورے، انٹم ٹارٹ، کیو پر، آرنیکا۔
ایس	آرس، گریفٹ، آیوڈ، کیلی، بائی، لائیو، فاسفو، رس،
	ایسڈ، ایڈ، سلف، آرنیکا۔ نیٹرم میوور۔
ایرام	یونڈر۔
اوپیم	ایکون، انٹم ٹارٹ، بل، ہائیو، نکس، نکس، و۔ سمیلیو۔
اونٹینٹ	کونائی، لائیو، نیٹرم میوور، پیس، رس، سیپی، سپائی۔
اوسیم	ڈرائیک،
اسٹینٹ	پیس، کیلک، کیلی، کارب، نکس، فاسفو، رس، سلف،
	بیلی، ہائیڈروٹ۔
	ایکون، بل، بریو، کیو پر، ہائیو، نکس،
	مسلا، ملاحہ ہو۔
سکیولا	کاسٹی، کوکوسی، کیلک، انس، فلیو، کیلی، کارب، اگن،
سٹے فانی یگرا	لائیو، نکس، پیس، رس، سلف، سلی،

نام ادویات	ادویات معارف جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں
اسٹرامونیم سپاکی جلیا	ایکون، بل، برالو، کیو، برم، ہالی، یوس، نکس۔ آرتیکا، ایکون، آرس، ٹیل، کیلک، سکی، سی۔ ڈیچی، آرس، کیلی کارب، کیلی، نکس، پلس، رس، سیپی، سلف، زمک، بروی، برالو، آرج، نالی، کاربو، وچ، ایسی، فلیو، پیر کیلی، برم، نکس، ونا، سفو، فلیس۔
سینجیا	کیمفر (ملاحظہ ہو)۔
اسیرت کیمفر بربریس پستق بیلادونا	لاسیکو، بل، کیلک، پلس، سیپی، کلک، ایکون، آرس، کیلک، کاوج، کیو، کو، نیم۔ ڈلک، پیر، بادس، لیک، مرک، بن، مک۔ ایسٹ میور، نکس، پلس، رس، سٹیکا، سیپی۔ سل، اسٹرامو، سلف، ورے، لی، ری، وے، چائنا، ایلیومی، کلک، رس، سیپی، ورے۔ نکس، آرس، برالو، لاسکو، ونا، سفو، سلی۔ آیوڈ، مرک، سلف، لیک، سیپی، ایسٹ نالی، سٹرس، کروٹے، پارو۔ ڈلک، انٹ، ٹارٹ، کو، نیم، (کیلک) چائنا، فاسفو، پلس۔ رس۔ سیپی، سلی، سلف، لاسکو، مرک۔ ایسی نالی، سو، ری، ٹو، بر کیلک، فاس، لیک، کیلی کارب، ہائیڈرو، (ٹو، بر، کو، نیم) (ملاحظہ ہو)۔
بوروسٹا بوریس بیڈیا گاکا بیٹیشیا برائٹ کارب	ایلیومی، رس، کیلی کارب، نیرم میور، آرس، ایسرو، انٹ، ٹارٹ، بل، بربریس، کیلک، کاربو، وچ، ڈلک، ہایوس، کیلی کارب، ایسی میور، نکس، ونا، سفو، فلیس۔
بیسلینم برایونیا	

نام دوا	ادویات معاون یعنی جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں
برایونیا	رس، سلی، سیاڈلا، سلا، سلف، ڈراس
برونیم	آرج نائی، کیلی کارب،
پیرس	کیلک، لیڈم، لائیگو، نکس، فاسفو، پلس، رس، ایسی، سلف،
پلیم	آرس، بل، لائیگو، مرک، فاسفو، پلس، سلی، سلف۔
پلاٹینم	اناکا، آرج مٹ، بل، لائیگو، پلس، رس، سپی، ورس، لگنے، پلاٹینم، سلف،
پوڈوفالک	کوریل، کاسٹی، پوڈو، ایپی،
پارٹوسن	ایٹل، اسپا، ایڈسلف، آرج نائی، لائیگو، سلی، اسٹین،
پلسٹلا	کیل میور، کیلی سلف (ٹیور) کیو۔ انٹم کرڈ، انٹم ٹارٹ، اناکا۔ ایسانی، آرس، بل، کیلک، پوفوای، گرافی، لگنے، کیلی بائی۔ ایڈنائی، نکس، رس، سپی، سلف، فاسفو،
پٹرولیم	برایو، کیلک، لائیگو، ایڈنائی، نکس، پلس، سلی، سلف۔ سپی
تھوجا	آرس، نیٹر، سلف، سائی، میڈوری، سلی، ایسانی، کیلک، لگنے، کیلک، اسپا، لائیگو، مرک، ایڈنائی، پلس، سلف، وٹکس۔
ٹیوبرکیولینم	سوری، ہائیڈرو، سلف، بل، کیلک، کیلک تاس، کیلک آئیڈ، سلی، براسٹا کارب، فاسفو، پلس، پٹی
	کتوجا، بیسلیم (ملاحظہ ہو۔)
	چائنا، پلس، سپی،
	پٹی، کیلکٹا۔ ایکٹا

لہ سپی کے پہلے پٹرولیم، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سپیا کے بعد
پٹرولیم استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

نام دوا	ادویات معاون یعنی جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں۔
چائنا	فیرم، ایڈا اے، آر، آرٹکا، ایسانی، بل، کیلک، کاربووج، کیلک فاس، ٹیکے، مرک، پلس، فاسفو، ایڈا فاس، سلف، ورے،
جیلی ڈونیم	ایکون، آر، براؤ، اپیکاک، لیڈم، لاسیکو، نکس، سپی، سپائی، سلف، کوریل،
ڈلکارا	بیراٹا، کارب، کیلک، کیلی سلف، سلف۔ بل۔ لاسیکو، رس، سپی،
ویجی ٹیبلٹس	براؤ، بل، کیمو، چائنا، لاسیکو، نکس، اوپی، فاسفو، پلس، سپی، سلف، ورے، ایڈا اے،
ڈرائیرا	نکس، کیلک، ساٹنا، پلس، سلف، ورے، کونائی، رسٹاکس،
رس وین	رسٹاکس کے بعد کی ادویات ملاحظہ ہوں
رس ریڈ	کلکیریا فاس، کیلک، کاسٹی، لاسیکو، ایسی، فاس، پلس، سپی، سلف، ایسی سلف،
روٹا	گنے کارب، بل، پلس، رس، سلف،
ریوم	براؤ کیلک، آر، آرٹکا، بل، بریرس، کیلکٹ، کیلک فاس،
رسٹاکس	کیمو، کونیم، گرافا، ہاپوس، ٹیکے، مرک، ایسی میو، نکس، پلس، فاسفو، ایڈا فاس، سپی، سلف، ڈرائی،
ریو میکس	کیلک،
رن کیولس لمبوسا	براؤ، اگنے، کیلی کارب، نکس، رس، سپی، سیاڈی،
روڈوڈنڈران	آرٹکا، آر، کیلک، کونائی، لاسیکو، مرک، نکس، پلس، سپی، رس، سلف،
روڈیم بروائٹ	رس وین، سپی، کیلک

نام دوا	ادویات معاون یعنی جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں۔
زرنخم امٹ	کیلک فاس، ہیپر، اگنے، پلس، سپی، سلف۔
سائٹا	کیلک، چائٹا، اگنے، نکس، پلٹی، پلس، سلی، اسپینی، (دسلکا ملاحظہ ہو۔)
سائیلیشیا	ایلی، سپیا، مرک، سپی، بل، ہیپر فاسفورس، سلف۔
سارسا پرٹلا	ایلو، نکس، سورجی، ایکون، پلس، آرس، بیڈی، ایکیو، ایلیو، ایس، بل، براؤ، براؤٹا کارب، بار بیرس، پوریکس، کلک، کاروچ، یوفوربی، گریفاء، گرے سارسا، کیلی کارب، مرک، ایسی نائی، فاسفو پوڈو، رس سپی، سمیو، ڈرا سی، (ایکون، آرس، بل، چائٹا، مرک، پلس۔ فاسفو، پلس، آرس، سپی، سلف؛ (چائٹا، ملاحظہ ہو۔)
سکیل	نیٹریم کارب، نیٹریم میو، نکس، سپاڈی، سلف، بل، پلس، کونائی، کاربووچ، ڈکمارا۔ یوفوربی، گریفاء، لائیکو، پیرو۔ پلس، سارسا پرٹلا، سلی، رس، نیٹرٹ، فاسفو۔ ایسی نائی۔ بر بیرس، کونائی۔ کے کارس، آرس، اگنے، نکس، سلی، براؤٹا کارب، کیلک، سلف، تھو، ایسی فلیو، آرس، ایسانی، بل۔ کلیم، گریفاء، ہیپر، لیک، لائیکو، نکس، فاسفو، رس۔ سپی، سلف، نیو، کیلک، نکس، مرک، سپی، بل، کاربووچ، لیک، کارب، فاسفو۔ کوپرم، کیلک، لائیکو، فاسفو، سلف
سلکامن	
سٹکونا	
سپا	
سینونو تھس ام پریٹا	
سلا میریٹا	
سلکا	
سلینیم	
سٹش	
سٹینگا	

نام دوا	ادویات معاین جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں۔
سورنیم	سلف، ٹیویر، ایلیمین، یوریکس، براسٹا کارب، کاربوووج، چائنہ، ہیسپر، لائیکو،
سالی کیوٹاوائی رو	بل، ہیسپر، ادپی، پکس، رس، سپی، اسٹیس،
سائنہ	تھوجا، آرس، بل، پکس، رس، اسپنج، سلف۔
سباڈا	سپی، آرس، بل، مرک، نکس، پکس۔
سمبوکس	آرس، بل، کونائی، ڈروسی، نکس، فاسفورس، سپی،
فاسفورس	آرس، ایل، سیپا، کاربوووج، ایل، برالیو، چائنہ،
فیسرم	کیل، کارب، کیلک، لائیکو، نکس، پکس، رس، سلی، سلف،
	ایلیوم، چائنہ، ہما۔ ایجون، آرنیکا، بل، کونیم، لائیکو، مرک،
	فاسفورس، سلف، ورے۔
کاکیولس	آرس، بل، ہیسپر، لائیکو، نکس، پکس، سلف، ادپی
کافیا	آرم، بل، ایسی، فلیو، لائیکو، نکس، ادپی، سلف، ایجون۔
کاسٹیکم	انٹیم ٹارٹ، آرم، گیو، کیلی، آیوڈ، کیلک، نکس، پکس، رس، روٹ،
	سپی، سلی، اسکیٹن، سلف، لائیکو، پٹروٹ، کورسٹ،
	کاربوووج۔
کاربووائیٹ	آرس، بل، برالیو، ایسٹنائی، فاسفورس، سپی، سلی۔
	ورے ورے (کاربوووج) کیلک فاس۔
کیفر	کینتھرپ، آرم، انٹیم ٹارٹ، بل، کاکیو، نکس، رس، ورے،
کلکیریا آزر	کونائی، گلووا، ادپی، پکس،
کلکیریا کارب	بل، رس، ٹیکار، یوریکس، لیمتھ، ڈراسی، ڈالک، اپیکاک
	کیل، یائی، لائیکو، ٹیٹرم کارب، گریفائٹس، نکس، ورے، فاسفورس،
	پکس، پوڈو، پلاٹ، سلی، اسپی، سارسا، ٹیویر، ہتھریڈیم۔
	کیلک کارب کے بعد سلف یا ایسٹنائی ہرگز نہیں دینا چاہیے۔
	اٹھلانے سے تیز بیماریاں پیدا ہوتی ہیں

نام دوا	ادویات معادن جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں۔
کاربووج	آرس، ایکون، چائنا، لائیکو، نکس، ایسڈ فاس، پلس، سیپی، سلف، ورے، ڈرائے، کیلی کارب، فاسفو، کیلی، جلس، سائیکو، زنک، رس، بل، کاسٹیکم، ہایوس، پلس، اسرار موئے، ورے، زنک، کیلک، سائیکو۔
کیو پرم ایسڈ کیو پرم مٹ	ایسڈ نائی۔
کیلی آیوڈ	کاربووج، نکس، ایسڈ نائی، فاسفو سیپی، آرس، ایسڈ، فلیو، لائیکو، پلس، سلف۔
کیلی ٹائٹرکیم کیلی بائی کیلی بروٹیم	بل، کیلک۔ پلس، رس، سیپی، سلف، انٹیم ٹارٹ، آرس، پلس، باربا، کیلک،
کیلی سلف	ایسڈ اسے، آرس، کیلک، ہیپر کیلی کارب، پلس، رس۔ سیپی، سلی، سلف،
کیکٹس کیسٹ میم کنائن ٹیوا کینتھر س	ڈیجی، یو پیٹ پرف، کیلک، نکس، سلف، بل، کاربووج، لویہ، ایسی ڈائی، بل، ہایوس، لائیکو اوپ، پلس، رس، ورے۔
کیف، بل، کیلی آیوڈ، کیلی بائی۔ مرک، فاسفورس۔ پلس، سیپی، سلف،	کیف، بل، کیلی آیوڈ، کیلی بائی۔ مرک، فاسفورس۔ پلس، سیپی، سلف،
کیموٹا	بل، گنے، کارب، پلس، ایکون، آرنیکا، برالو، کیلکٹ، کاکیلوس، فارم، رک، نکس، رس، سلی، سلف۔ سیپی،
کلیر یا فاس کلیر یا فلور میٹ کیڈیا کیسٹ میم	ہیپر۔ ریٹونا، سلف، زنک، رس، آیوڈ، سوڈی۔ کلیر یا فاس، ایسڈ فاس، ٹیٹریم میوور، سلی۔ کیلک، لائیکو، ٹیٹریم میوور، پلس، سیپی، ایسڈ نائی، ایکون، کاسٹی، پلس، سیپی،

نام دوا	ادویات معاون یعنی جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں۔
کلید ٹیم کونایم	ایسڈ نائی، ایکون، کاسی، پیس، سیپی، بیراجی، آرئی، آرس، بل، کیلک، کیلک آرس، سائیکو ڈراسی، لائیکو، نکس، سوری، فاسفو، پکس، رسر اسرامو، سلف۔
کوریلیم کوچیکم کالوستھ	سلف کاربووج، مرک، نکس، پکس، رس، سیپی، بل، برائیو، کاسی، کیمو، نکس، سلف، پیانی، اسٹرا، مرک
کلینڈیولا کرلوزوم	ہسیر، آرٹکا، آرس، برائیو، ایسڈ نائی، فاسفورس، آرس، بل، کیلک، کینی کارب، لائیکو، ایسڈ نائی، نکس، رسی، سیپی، سلف۔
کروکس کروٹنٹ کلی میٹر آرکٹ گوٹکم گریفائٹس	چائنا، نکس، پکس، سلف۔ رس، کیلک، رس، سیپی، سلی۔ سلف۔ کیلک۔ مرک آرس۔ کاسی، ہسیر، فرم۔
لاروسیرس لائیکو پوڈیم	آیوڈ، لیک، پکس، چیلی، اگنے، رسی، کیلی آیوڈ، اناکا، بل، برائیو، کاربووج، کوچی، ڈکے، گریفا، ہائیوسس، کیلی کارب، لیڈم، نکس، فاسفو، اسٹرامو، پیس، رس، ورے، ڈراسی، کیلک، پھر ٹیم۔
لیڈم لین لیکس	ایکون، بل، برائیو، چیلی، نکس، پکس، رس، سلف، (بائیڈرو فومین، ملاحظہ ہو) لائیکو، ایسڈ نائی، ہسیر، کیلی آیوڈ، آیوڈ، ایکون،

نام دوا	ادویات معاون یعنی جو بعد میں خوب کام کرتا ہے
یکے سس	آرس، الیسی، بن، بروم، کاربووج، کاسٹی، کونائی۔ کیلک، کیلک، چائنا، ہایوس، کیلی بائی، مرک، سائیکو، نکس، نیٹریم میور، اوہیم، فاسفو، سلی، سلف، ٹریٹ۔ یوفوربی، مرک، ریپروٹو، ایوٹ۔
مرکوریس	بڈی، آرس، اسانی، بل، وٹاس، کاربووج، چائنا۔ ڈیک، آلوڈ، ہیپر، لیک، لائیکو، ایڈ میور، ایڈ ٹائی۔ فاسفو، پلس، رس، سیپی، سلف، حقو جا۔ (مندرجہ بالا مرکوریس، ملاحظہ ہو۔)
میزریم	کیلک، کاسٹی، اگنے، لائیکو، مرک، نکس، فاسفو، پلس، سلف، حقو جا۔
میزریم	سیپی، لائیکو، رس، حقو جا۔
میزریم	کیلک، کاسٹی، فاسفو، پلس، سیپی، سلف، بن، لائیکو، نیٹریم میور، نکس، پلس، سیپی۔
میزریم	کیلک، سیپی، کارب، سیپی، سلف، آرس، اگنی، سپائی، بل، برالو، کیلک، کاربووج، کاکو، کوٹی، ہایوس، لائیکو، فاسفو، پلس، رس، سیپی، ایڈ ٹائی، لائیکو، سلف، آرس، ٹاٹ، لائیکو، پلس، رس، اسٹراپیو، نکس، کیلک، نکس، ایڈ ٹائی، پلس، سلف، سیپی، ایس، کیپی، اگنے، سیپی، برالو، کیلک، ہیپر، کیلک، کارب، پلس، رس، سلف، حقو جا۔

لہذا مزید اس کے سے مرکوریس، سالی یا مرکوریس، رانی رس سمجھنا چاہیئے۔

نام دوا -	ادویات معاون جو بعد میں خوب کام کرتی ہیں -
ناٹیرم سلفٹ	آرس، کھوجا، بل،
والولا اوڈو	بل، رس، سیبی، اسٹے فانی،
دریسکیم	بل، چائنا، لائیکو، اسٹرامو، سیبی، رس، سافٹ،
دراٹیرم	آرنیکا، ایکون، آرس، آرنج نائی، کارپووج، چائنا، کیو پریم،
ولیریا	ڈی اسی، لوبی، پکس، رس، سیبی، سلفٹ، سمبیر، ڈکے،
ہائیڈرو نوبیم	سٹاسفو، پکس،
ہائیوسیا	نیرم، کارب، نیرم، نیوز، چلس، ایکے، ناجا وغیرہ زہریلے
ہیپر سٹاز	کارپو وغیرہ،
	بل، فاسفو، پکس، اسٹرامو، ور،
	کلینڈ، ایبرو، ایکون، آرم، بل، برالو، آیوڈ، لیکے،
	مرک، ایسی نائی، پکس، نکس، رس، سیبی، اسپنج، سٹی، سافٹ،
	آرنیکا، زنک،
ہائی پورس	بل، برالو، چائنا، لائیکو، نکس، فاسفو، پکس، پکس -
ہی میلس	سلفٹ، زنک،
پریپریم پرن	فیرم، آرنیکا،
یوفوریم	نیرم، سیبی، ٹیوب،
یوفوریا	ایکون، ایلیو، ایکل، کونائی، مرک، نکس، فاسفو، پکس،
	رس، سلفٹ، لائیکو،

(ب) کس دوا کے بعد کون دوا نہیں چلتی یا نقصان کرتی ہے

(INIMIC OR INCOMPATIBLE REMEDIES)

نام دوا	دوا کے بعد والی صاف دوا ہیں -
آرم میوٹ	کافی، شراب
آرنجٹیم نائی	کافی

دوا کا نام	دوا کے بعد دوا کی مخالفت دوائیں۔
آرنیکا	شراب (پاگل کتا، سیار، بلی وغیرہ کے کاٹنے پر آرنیکا استعمال کرنا بہت زیادہ مُضر ہے)
اسٹروپن	جلس۔
ایمونیم کارب	لیکے۔
ایلو سوکروڈنا	ایلی، سینا، ایلی سا،
ایلیم سیپا	ایلو، ایلی، سینا، سلا،
ایلیم سائیوا	ایلو، ایلی، سینا، سلا،
ایسڈ اسے سے	آرنیکا۔ بوریکس، نین، سارسا، بل، لیکے، مرک،
ایسڈ نائی	لیکے (ہنسی میں نے فرمایا ہے کہ کیکل کارب کے بعد ایسڈ نائی نہیں چلتا)۔
ایسڈ لیک ٹنگ	کافب
اگزینا	کافی، نکس، بے،
اے پس	رس، واسقو،
ایرم ٹرائفیلیم	کلیدیم
اٹے فانی گیگرا	بے نن (اٹے فانی گیگرا کے لیے پہلے رے نن نہیں چلتا)
اسٹرا مونیم	کان
ایس کیولا	(سلا، ملاحظہ ہو)
بیلادونا	ڈکے، ایسڈ، اسے سے، دفی گر۔
بودسٹا	کافیا
بوریکس	ایسڈ اسے سے۔ دفی گر اور شراب۔
براٹا کارب	(کیکل کارب کے بعد براٹا ۵ رے نن نہیں چلتا)
براڈنیا	کیکل۔
پیرسر	فیرم فاس۔
نک	(نک پوڈوفائلم کے فعل کو بڑھاتا ہے)۔

دوا کے بعد دالی مخالف دوا بھی

نام دوا

بیرس	نیم فاس
کافی، کافی	کائیوس، ٹیکس
(کاربو و ج ؟)	کاربو این
(کاربو این ؟)	کاربو و ج
ایسے، کافی، فاسفو، کائیو، ہر قسم کے ایسڈ،	کاسٹیکم
کیتھ، کاسٹی، کائیو، آئن، سس، نس، جی، اسٹرامو،	کافیا کرڈ
آرت مائی کے بعد، کافیا نہیں چلتا	
کافیا	کالوناٹم
(کاربو و ج یا چائنا کے بعد، کریازو، نہیں چلتا)	کریازوٹم
سلف، برائش کارب، برائیو، کیس، بائی، ایسڈ مائی کے بعد	کلیر یا کارب
کلیر یا کارب نہیں چلتا۔	
کیفر	کنا بس ٹائو
(سوزیم کے بعد کبھی کبھی کو نیم نہیں چلتا۔)	کو نیم
آرم	کلید ٹیم
کیفر	کیلنڈیولا
(کلیر یا کے بعد، کیلی بائی۔ نہیں چلتا۔)	کیلی بائی
آرم	کائیو
کیفر	کیلنڈیولا
(کلیر کے بعد، کیلی بائی۔ نہیں چلتا)	کیلی بائی
(کیفر یا کافو کی بو سونگھنا۔)	سیلی بائی
زنک، نکس۔	کیوٹلا
کافی	کیتھر س
کلیڈی (کافیا کے بعد یا کیلی ناٹیم کے بعد، کیفر	کیفر

کس دوا کے بعد کون دوا نہیں

۹۶۹

یا نہ مان کرتی ہے

دوا کا نام	دوا کے بعد والی مخالف دوائیں -
لیکے سس	ایسی سی، اے، ایسی کارب، ایسی نائی، ایون کارب، ڈکے، سوری، (سپین) چائنا۔ وٹی۔
لیڈم مارفینم مرکوریس	ایسی، اے، سلی، (سلاک کے پہلے یا بعد محلل،) (تقتیل کیا دوا۔ (POTENTISD) (مرکوریس) نہیں چلتا)
ملی فلیم ٹائپریم ایڈرٹس ٹکس واما کا	کافی ٹیبی رین ایسی، اے، اگے، زنک، ہر قوم کا ایڈرٹ (ٹکس واما کا کے پہلے یا بعد نہیں چلتا۔) (زئیرمی، پوڈوفاٹلم کے فعل کو بڑھاتا ہے۔ اسپیج (DR. SMITH)

(ج) کس دوا کے زیر کا فعل کس کس دوا کو زائل کرتا ہے۔

THE REMEDY IS ANTIDOTED BY

دوا کا زیر مخالفت	ANTIDOTES)
آرم مٹ	بل، چائنا، کائیو، کافی، کیوپر، مرک، پکس، سسپائی کیف
اسٹریا	براو،
آئرس	ٹکس،
آیوڈم	انٹیم مارٹ (ایپس) آرس، ایکون، بل، کیف، چائنا، کافی، کئی، ساف، فرم، گریفا، گریشی، ادپی، ہیر، فاسفو

لہ مرکب اس بات طلب مرکوریس والی دس بھٹنا چاہیے۔

دوا کا نام	دوا کا زہر مخالفت	(ANTIDOTES)
آیوڈیم	اسپیج، سلف، حقو جا (پارا) میں ملا ہوا گیہوں کا میسدہ	
آر جینٹ نائی	آرس، کیلک، لائیک و نیٹرم میوڑ، مرک، سلی، فاسفو، لیس، آرس، ایپی، سلف، آیوڈ، دودھ،	
آر جینٹ مٹ	مرک، مپس،	
آرنیکا	شامک، کاس،	
اوسیم	بل، مرک، ہیپو، اسپج، ایسی، فاس، سلی،	
آرنیکا	ایکون، آرس، کیمفر، چائنا، ساکیو، اگے، ایپی، ایون، کارب، سینڈا، فیرم،	
آرنیکا آیوڈ	برایو۔	
آرنیکا ایپ	کچی، سلف، کاربووج، چائنا، یو فوربی۔ فیرم، آیوڈ، ہیپو، آیوڈ، ایپی، کیلی، بالی، مرک۔ نکس دا۔ نکس، اوپی، سمبو، سلف، بیٹے، ورے، ٹیکے۔	
آرنیکا ہائڈرو	ایون، ایسٹ، نکس۔	
ایکونائٹ نیپ	ایسی، اے۔ اے۔ بل، کاربو، کافی، نکس، سلف، کیو، ورے، ہیپی سی، ٹیرو، ماسپی، وینگر، شراب، (ایکون) پیٹ	
اکٹیا ریس	کیلک، مپس، زن، کیف، شراب، چربی یا تیل، کافی،	
اگریس	کیمفر، نکس، نیٹرم میوڑ، ٹک ملا پانی،	
اگنیس کیلکس	برایو، چیلی، کافی،	
انگس ٹورا	بل، اوپی، فانی جس،	
ایٹروپن	کیلک، ہیپو، مرک،	
ایونیم کروڈ	ایسانی، چائنا، کاکو، ایپی، لورو، اوپی، مپس،	
ایونیم ٹارٹ	رس، ہیپی، کونائی، مرک، کلے، کروڈن، کافی، این، رس۔	

(ANTIDOTES)	دوا کا ہر مخالف	دوا کا نام
	اے پس، آرس، کیمو، ایسی، کارب، کاربو ووج،	انتھراسیم
	کریو، لیکے، رس، فلیس، سلی، ایڈر، سلف، چائنا،	ایکل نائٹریٹ
	کیلکٹ۔	ایمون کاسٹ
	آرج نائی۔ کھٹائی سرکہ،	ایمون کارب
	آرنیکا، کیف، ہیر، لیکے، ترشی، روغن، اریٹڈی۔	
	روغن زیتون وغیرہ۔	ایمون میور
	کیف، ہیر، کافی، نکس،	امبرا گریٹا
	کیف، کافی، پلس، نکس، اسٹرافا۔	امانیا
	تعب کو کا دھواں پینا۔	ایلیو مینا
	برالو، کیف، کیمو، ایپی، فلیس،	ایلیو من
	ایلو۔ کیمو، نکس، ایپی، سلف۔	ایلو سو کوٹریٹا
	کیف، لاسکو، نکس، سلف، ایلیو، سرسوں،	ایلیم سیپا
	آرنیکا، کیمو، کافی، نکس، تھو جا، ورے،	ایلیم سٹ
	لاسکو۔	ایسا فنیڈا
	کیف، کاسٹ، چائنا، مرک، پلس، ولیری،	ایسارم
	ایڈ اے سے، کیف، پوروں کی کھٹائی، وسنگو،	ایڈ اے سے
	ایکون ٹیری، گنیشیا کارب، نکس، سپی، ٹیبا،	ایڈ کارب
	کھر یا مٹی، دودھ، شکر ملا پتے کا پانی۔	ایڈ ٹامٹ
	کلکیریا، ہیر، کونامی، دک، سرے، سلف، پیرو۔	ایڈ ٹامٹ
	اسٹریٹا۔ کافی، کیف	ایڈ ٹامٹ
	س۔	ایڈ ٹامٹ
	گنیشیا کارب، کلکیریا کارب	ایڈ ٹامٹ
(DR. TESTE)	برالو، کیف، ایپی	ایڈ ٹامٹ
	برالو	ایڈ ٹامٹ

(ANTIDOTES)	دوا کا زہر مخالف	دوا کا نام
	ایپی، پلس،	ایڈ سلف
	کیمرت، کافی، فرم، اوپی، ایپی، نکس، ورے، وی،	ایڈ ہائیڈرو
	پلس، آرنیکا، کیف، اے سی، اے سی، کاکیو، کیمو،	انگیشیا
	نکس،	
	تیزاب،	ایٹھوزا
	آرس، آرنیکا، چائنا، نکس، ٹے بی،	ایپکاک
	آرس، شراب، ناب،	ایلیس کوریلیم
	کیفٹھ، ایپی، لیکا، لیڈم، نیٹریم میور، پلیٹین، ایسی کارب،	ایلیس ملی فتکا
	آرنیکا، روضن زیتون، پیاز،	
	ایسی، اے سی، اے سی، بل، پلس، نکس، دوودھ یا سٹھا۔	آرم
	نکس، رس، شراب،	ایلیس نکس
	نکس،	ایکیولس میپ
	ایسی، اے سی، مل، کیمو، ساکیو، کافی، کیور، جلیس،	اوپیم
	ایپکاک، مرک، ایسی میور، نکس، پلس، ورے، زنگ،	
	کیف، سلف،	اولینڈر
	ایپی،	اسٹنگیا
	پلس،	اسیٹن
	ایمر، کیف،	اسٹافی سیگیرا
	ایکون، کیف، کلوروفارم، امیل، نالی، آرج، کافی،	
	ہایوس، ورے، ورے، سلفر، ۳۰ (ٹے بی)	
	ایسی، اے سی، بل، ہایوس، نکس، اوپی، پلس، ٹے بی،	اسٹرامونیم
	کیف، عرق لیمون،	
	سلکا کا زہر مخالف ملاحظہ ہو۔	اسکیولا سیریٹا
	ٹے بی،	

دوا کا نام	دوا کا زیر مخالف یا فاد (ANTIDOTES) زیر
سپائی جلیا	آرم کینتھ، کاکبو، پلس،
سینجیا	ایکون، کینتھ،
باریرس	کیف، بل،
ہستہ	کافی، کیلک، کیس، نکس،
نیونو	لیک، سنیکا۔
سیلا ڈونا	(ایکون، کافی، ہیر، ہاوس، مرک، ادپی، پلس،
براٹٹ کارب	سہاری، شراب،
بووسٹا	انٹم ٹارٹ، بل، کیف، ڈلکا، مرک، زنک،
بوریکس	کیف
برایونیا	کیمو، کافی،
برومیم	ایکون، ایلیومی، کیف، کیمو، چیلی، کلے، اگنے،
پوڈوناٹلم	نکس۔ ایسی، جی، پلس، رس، سنیکا، انٹم ٹارٹ،
پلسٹلا	ایمون کارب، کیف، گنے، کارب، ادپی، (کوچی ۹)
	کالوسنتھ، لپسٹا، نکس،
	ایسا، کافی، کیمو، اگنے، نکس۔ اسٹیا، انٹم ٹارٹ کیلک
	فاس (DR. TESTE) تیراب (AUGIES) مقدار
	ہے۔ کیمو لا اور پلسٹلا ایک دوسرے کے زیر مخالف ہیں
	یعنی آئس میں ایک دوسرے کی موافق ہے۔
	انٹم ٹارٹ
پلسٹاٹ	ایکون، کاکبو، فاسفیو، نکس،
پٹرولیم	کیف، کافی۔
پیرس	ایلیومی، ایلیومی، انٹم ٹارٹ، آرم، بل، کاکبو،
لم	کاسٹی، ہیر، ادپی، ہاوس، کیسلی بروم، کریو،
	نکس مار پٹرز۔ پکیٹ، ایسی سلف، ایسی۔ اسے سے۔

(ANTI-DOSES)

دوا کے زیر مخالف یا ناقض دوا

دوا کا نام

کیو، زک، ایتھوزا۔ (ڈاکٹر ٹسٹ)
بل، نائٹری، اسیرٹس، ڈول سس، پلس، کو لچی،

(DR. TESTE)

پے ٹینم

مرک۔

پلس ٹیکو

فیرم، حقوجا، شراب، بیر، شراب، چائے۔

کتھیا

کو لچی، کیف، کیو، مرک، نکس، کاکو، پلس، سلف۔

حقوجا

اسٹرافا۔

کیف۔

ٹیو کریم
رے بیکم

ایسی، اے سے آر، کلے، کاکو، اگنے، ای، لایکو،

وٹاسفو، نکس، پلس، سینی، ورے، اسٹرافا۔ کیف، کافی۔

پلس، کیلیم، پلٹن ٹیکو، سپائی، رے نیگ، شراب
کھائی کا استعمال،

وٹاسفو۔

ٹیری ہتھنا

نکس۔

ٹیلیوریم

کیف۔

ڈاکٹر کے کم

(بیروسٹا) کاربو ورج، چیلی، کیو پر، جلس، لگنے، کارب۔

ٹرن ٹولا

مکس (پلس)

مرکس کار، اسٹرافا۔

ٹیم بی ٹینم

اسٹرونی، چائے، کافی، ٹیجی، فیرم میو، نکس۔

جلسیم

(JEPHSON)

اسٹرونی کن

بن

جیورنڈی

آرٹھ، اے پلس، آرٹس، ایسانی، بل، براو، نا، کاربو ورج

چائے

کیلیس، کاشی، سڈرن، سائنا، یونٹ، فیرم، فیرم

کیلک کارب

ای، ٹیجی، فیرم، ایسکو، مہ، مرک، فیرم کاربو ورج

دوا کا نام	دوا کا اہر تحقیقات یا فارمز	(ANTIDOTES)
سائٹا	آرئی، کیف، چائٹا، کیس،	
ساز مارپلا	مل، مرک، سپی،	
سلفر	ایکون، کیف، آرس، کیمو، چائٹا، کونانی، کاسٹی، نکس،	
	مرک، پلس، رس، سپی، سلی، کھوجا۔	
سیکیل	کیف، ادپی،	
سلکے من	کیف، کافی، پلس	
سٹائیرس	ہیپر، لے، نالی، ادپی، سلف۔	
سیپا	ایکون، انٹرمارٹ، رس، سلف، انٹرم کروڈ، پودھوں کی	
	کھٹائی (ACIDS) نائٹریٹ، اسپرٹس، ڈل، رس۔	
	ڈنگھنا۔	
سفلیٹم	کس و	(ALLEN'S ANTIDOTES) ملاحظہ ہو۔
سیانو کس	میٹر م میٹور۔	
بلا میری ٹما	کیف	
میلکا	کیف، ایڈفلور، ہیپر	
سلیٹیم	اگن، پلس (ایم) لینڈ	
سینس اسٹ	سپی، رس، کینٹھ،	
مڈرن	کیف،	
سنگا	آرئی، مل، برار، کیف	
سیال مروڈا	سنگا، پلس۔	
سورنیم	کافی	
سیائٹا	کیف، پلس،	
باڈلا	کیف، کونانی، پلس۔	
سمبوس	آرس، کیف،	
سینا	پودر۔	

(ANTI-DOTES)

دوا کا نام	دوا کا زیر مخالفت یا قادر ہر
قاسفور	کافی، کیلک، مہتر، نکس، پیپی، ٹیری، آرس، کیف
قانی جٹنگ	کلور د فارم آرئی، کافی، ملی، فے کرتے مالی دیا میں۔
فرم آرس	آرئی، بل، چائنا۔ ہیپر ایپی، پلس، سلف، ورے، بیٹر شراب، رسبوم۔
فلینڈریم قانی ٹوٹکا	بل، کافی، اگنے، آرس، مرک، مہتری، ٹایٹرم، اسپرٹس، ڈلس، اویپ، سلف، دودھ، نک،
کاکیلوس انڈیکا	کف، کیو، کیو، اگنے، اسٹرافا
کافیا	ایکون، نکس، ایسی، اسے، کیو، چائنا، گریٹی، مرک، پلس، اگنے، سلف، ٹیویر،
کاسیم	انٹیم نارٹ، کافی، کولوسی، ڈالکے، گودے، نائی ٹری، اسپرٹس، ڈالکے، نکس، ایسی،
کاربواہن	آرس، کیف، نکس، کیا، کافی، دے نیگرا، شہ، اب
کاربوج	آرس، کیف، کافی، کیا، نائی ٹری، اسپرٹس، ڈالکے، نکس۔
کیوپرم آرس	(آرسک کا زیر مخالفت ملاحظہ ہو)
کیوپرم لے سے	بل، چائنا، ساٹکو، ڈالکے، ہیپر ایپی، مرک، نکس،
کیوپرم مرٹ	بل، کیف، ساٹکو، چائنا، کاکیلوس، ڈالکے، ہیپر ایپی، مرک، نکس، پلس، ورے، آرس، کیو، شر، انڈے کی سفید (دھ۔)
کیئم سلف	ارنیکا، آرس، کیلک، کار، ج، فیئر، ہیپر، کیا، فیئر ٹری، پلس،
کیلی آلوڈ	ایون میو، آرس، چائنا، مارن، آرس، سلف، دیری۔

(ج) کس دوا کے زہر کا فغا کس کس ۹۷۸ داکوڑاں کرتا ہے

دوا کا نام	دوا کا زہر مخفی یا فغا دزہر	(ANTIDOTES)
کیلی آیوڈ	آرج نائی، آرم، ہیر، ایسی نائی، ۳۰	
کیلی کارب	کیمف، کافی، نائی، ٹری، اسپرٹس، ڈال سس، ڈرکھ،	
کیلی کلور	ہائیڈرو۔	
کیلی نائی	ای، نائی، ٹری، اسپرٹس، ڈال سس، سونگھنا۔	
کیلی بائی	آرس، ایکے، ٹیس، کھائی، کھریا دودھ،	
کیلی بروم	کیمف، ایکون، نکس، رنگ، پردھن کی کھٹائی۔	
کیلی میور	بل، کیلک، سلت، ہائیڈرو، پلس،	
کیلی ٹیس	ایکون، کیمف، چائنا، یو پی ٹوریم پرنٹ۔	
کیلی سیٹ	کیمف، مرکب،	
کیلی سس	ایکون، کیمف، ایسی، ایرو، پلس، ریون،	
کیلی سکم	کلینڈیم، کیمف، چائنا، ایسی، سلف، گدھک،	
	کاڈھواں۔	
کیلی مولا	ایکون، ایلیو، یوریکس، کیمف، چائنا، کاکو، کافیا	
	روئی، کو، ای، اگنے، ٹیس، وے وی،	
کیمفر	کینٹھرس، نائی، ٹری، اسپرٹس، ڈال سس، اپنی، سفو	
کلیر یا آکس	گلوٹو، پلس، کاربوووج،	
کایہ یا کارب	برالو، کیمف، چائنا، نائی، ٹری، اسپرٹس، ڈال سس، ٹیکس،	
	سیپا، سلف، ہیر، آیوڈ، ایسی نائی۔	
کلیا	ایرو، ہائیڈرو، سیپا،	
کلینڈیم	کیمپس، کاربوووج، ہائیڈرو، اگنے، مرکب، رنگ۔	
کلینڈیولا	آرنیکا۔	
کوما	جائین۔	
کونیم	کافی، ڈرکھ، نائی، ٹری، اسپرٹس، ڈال سس۔	
	شیرا۔	

گوجیوا بل، شراب، مرگ کار۔ مردوں کے لئے۔ اور مرگ سول،
عورتوں کے لئے مفید ہے۔ (۱) لطف

کومبرا (ناجا) لی بی،

کوریلم کیلک، مرگ،
کولچیسیم بل، نیف، کاکیو، میڈم نکس، سپائی، شکو، شہید،
نکس۔

کالین سونیا

کالو سنتھ کیف، کاسٹی، کیمو، کافی، ادپی، اسٹراٹا
کریازوٹم ایکن، نکس، فرم،
کروکس سیٹ ایکن، بل، ادپی۔

کروٹن ملک لے ناکا، انٹم ٹمارٹ، کیلے، آرس، رنہ،
کروٹیلین ہائیڈریٹ لیک (کیف، کافی، ادپی، شراب اور لکازہر مخالف ہے)
کلیبی میٹس براہو، کیف، کیمو، اناکا، کروٹن، رس، رنہ۔

کلودم براہو، لائیگو، پلیسیم ایسٹ،
کلورین ہائیڈریٹ ڈیجی، مسکس، ٹمارٹ۔
نکس۔

گوجیا کیف۔ کافی، ٹولوسی، کیلی بارب، ادپی،
گریفائٹس ایکن، آرس، نکس، چائنا، شراب۔
گرے ٹولا کاسٹی، بل، یو فوربی، نکس،

لاروسپرس کیف، کافی، ایسی، ادپی، نکس۔
لائیکو لودیم اڑکام، کیف، کاسٹی، کافی، نیمو، گریفائٹس، نکس،
میڈم کیف، آرس۔

ویب لیا

ای،
ہولی، نکس، پلس، پٹائی۔

ایلیوئی، آرس، بل، کیم، کیو، کاکو، کارلو، کافی،

دوا کا نام	دوا کا زیر مخالف یا فادزہر	(ANTI-DOTES)
گلیسر	ہیپریٹرم، مرک، ایسی نالی، ایسی فاس، نکس، اوپی، سیپی، ٹرانٹ - سیڈون؛	
مرکوریس پروڈیوڈ	ہیپریٹرم، لائیگو،	
مرکوریس آیوڈ	ہیپریٹرم	
مرکوریس واپوس		
مرکوریس سول	منہجہ بالا مرکب ہیں۔ کہ کل زیر مخالف ملاحظہ ہوں،	
مزیرم	ایکون، براؤ، کیلک، کیلی آیوڈ، نکس، کیف، کھٹائی۔	
سیدوہ نیم	ایپی، نکس و۔	
سنی نیٹفکس	کیف۔	
مفاسٹر	کیف، کوڈے۔	
مرکیا	ڈیجی۔	
گنیٹیا کارب	آرس، کیو، مرک سول، نکس، پلس۔ ریزم، کوکوسنٹ،	
گنیٹیا فاس	جلس، بل، بیکے۔	
گنیٹیا میور	آرس، کیلک، کیو، نکس،	
گنیٹیم ایشیکم	کافی، کیف، مرک سول۔	
لیریا ان	براؤ، نکس، آرس، رس۔	
مارفینم	ایکون، اپی، اٹروبی، ادنیاسیڈ، بل، کافی،	
مکس	کیف، کافی،	
مرکوریس	آرم، آرس، ارسائی، بل، براؤ، کلڈیم کاربووج، کیلک۔	
	چائنا، کرلو، کونائی، کلورل، کلیمے۔ ڈاکے، قیصرم	
	کلور۔، ہیپریٹرم، کیلی آیوڈ، کیلی کلورل، لیلیائی۔	
	لیکے، مسنری، ایسی ہائی، نکس، اوپی، پروڈو، فاسٹلو۔	

✽ مرکوریس کا مطلب مرکوریس سول یا مرکوریس واپوس سمجھنا چاہیے۔

دوا کا نام	دوا کا زیر مخالف یا فاذر ہر	(ANTIDOTES)
مرکیوریس کار	روٹا، سارسا، اسٹے نا، سپی، اسٹی لنگ، سپائی، سلف؛ اسٹیمو، ویرمی کیس، کاسٹی، سائنا، ہائیڈرے، ہاپوس۔ آرس، لیکے می، لائیکو، ایسی می، نکس وا، پگس، ٹری، حقو جا یو بی، مرک سول، سپی اور مندرجہ بالا مرکبوریس کے قریب قریب کل زیر مخالف؛	
مرکیوریس لیس	ہیپر	
نائیٹری ہپریٹس لیس	کیلک، کاربووج، کاسٹی، کونائی، کیلک کارب، نیٹرم میوٹ اوپی، سپی،	
نکس وا	ایکون، آرس، بل، کیف، کیمو، کایکو، کافی، یو فور بی، اوپی، پگس، حقو جا، امینٹر، گنے، آئرس، پلیٹی، اسٹرامو۔ سٹرابا۔	
نکس میکٹا	کیف، بھلس، لورو، نکس وا، اوپی، دے ری، زنک۔	
نکوٹینم	ٹے بیکم، کازہر مخالف ملاحظہ ہو؛	
نیٹرم کارب	کیف، نائیٹری، اسپرٹس، ڈاللس۔	
نیٹرم فاس	اے پس، سپی۔	
نیٹرم میوٹ	آرس، فاسفو، سپی، نکس، کیف، نائی ٹری، اسپرٹس۔ ڈال سس، سونگھتا۔	
ناجا	کویرا کازہر مخالف ملاحظہ ہو۔	
وارے برنم	ایکون، ورے۔	
والولا اوڈورٹیا	کیف۔	
والولا ٹرکلر	کیف، مرک، پگس، رس،	
وربسیکم	کیف	
ورے گرم المیب	ایکون، آرس، کیف، چائنا، کافی (سٹانا)	
ورے گرم ورید	بہت گرم کافی،	

دوا کا نام	دوا کا زہریں الف یا فا زہر	(ANTIDOTES)
وسکم البہم	کیمف، چائنا	
ویرو لونیٹم	انٹم ٹارٹ، سلینڈر، سیرسی، تھو جا، ویکس،	
دے سیرنبا	بل، کیمف، پلس، مرک، سائنا، کافی،	
ویکسینٹم	اے پلس، انٹم ٹارٹ، میلنڈری، سلی، تھو جا۔	
ہائڈرو فورینٹم	اگنس، بل، سڈن، ہلوس، لیکے، اسٹرامو،	
بانی پیریکم	آرس، کیمو سلف،	
ہلوسیا مس	ایسی، اے سے، بل، چائنا، اسٹرامو، وے نیگر،	
ہائڈراکسٹس	سلف	
ہیپر سلف	ایسی، اے سے، بل، کیمو، سلی، آرس	
ہلی پورس	کیمف، چائنا	
ہیمی نیلس	آرنی، کیمف، چائنا، پلس۔	
یونورہ بیسم	ایسی، اے سے، کیمف، اوپی (لیمون کا عرق زیادہ مقدار میں)۔	
یونفریشیا	کیمف، کاسٹی، پلس،	

مقصد (الف)

ایک قطرہ دوا سے فائدہ کیوں ہوتا ہے؟

ذرہ ہی کل کا سب سے خورد ترین علت مادی ہے۔ بیان دنیا کی علت مادی ذرات نہ منقسم ہو سکتے ہیں، اور نہ فنا ہو سکتے ہیں (یا ازلی) ہیں، اتنے پر بھی تمام قدرتی افعال کی (جیسے بادل، بجلی، طوفان، زلزلہ وغیرہ) یہی علت ہے، پرانے مہرشی گزروں سے لیکر قابل تعظیم مغربی مہاتما ڈلٹن تک، سبھی زیادہ اسی اصول کو مانتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بے جان ذرات کی عظمت اب قائم نہیں رہ سکتی۔

(۱) کپڑا، پانی، بخارات، درخت، جاندار وغیرہ تمام اشیاء سو راج دار سکرٹنے والے اور منقسم ہونے والے ہیں اسی سے علماء کا خیال ہے کہ تمام اشیاء لطیف

ذرات سے بنے ہیں۔ ہن لطیف ذرہ کا نام اجزائے صغیر (MOLECULES) ذرات ہے جیسے ایک قطرہ پانی کو تقسیم کرتے کرتے جب ایسی لطیف حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ ضرورہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو اسی خوردبین سخت حصہ کا نام پانی کا ذرہ ہے (یعنی ایسے کروڑوں ذرات سے ایک قطرہ پانی تیار ہوتا ہے)۔ اس کے بعد کیمیاوی فعل کے ذریعہ پانی کے اجزاء تقسیم کرنے پر جب ہائیڈروجن (HYDROGEN) اور ہوائے لطیف یا نسیم یا آکسیجن (OXYGEN) نام کے دو بھاپ پائے جاتے ہیں تو یہ بھی فرض کرنا محلات معمول نہ ہو گا کہ پانی کے ہر ایک ذرہ میں ہائیڈروجن اور ہوائے لطیف یعنی آکسیجن ضرور ہی موجود ہے۔ ۱۔ ذرہ کے ذرہ کو علت مادی یا جو ہر فرد (ATOMS) ذرہ ناقابل تقسیم کہتے ہیں اور تمام ذرات کی علت مادی جو ہر فرد (یا ذرات ناقابل تقسیم ہیں) جیسے پانی کے ہر ایک ذرہ میں دو کے حساب سے، ذرات ہائیڈروجن اور ایک کے حساب سے ذرات نسیم یا ہوائے لطیف یا آکسیجن موجود رہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں میں سوراخ، ناقابل منقسم صنعت ہی وغیرہ باتیں دیکھ کر علم الکیما میں ذرات کی ایجاد کی گئی ہے اور اکثر علت مادی سے آپس میں ملنے سے مرکب چیزیں پیدا ہوتی ہیں انکو سمجھانے کے لئے مغربی علم الکیما میں، علت مادی مانی گئی ہے۔ حقیقت میں ذرہ اور ذرات لطیف یعنی علت مادی کی موجودگی ہمارا خیال ہی ہے۔

بلکہ جو چیزیں ایک قسم کے مادہ سے بنی ہیں، جیسے توڑنے پر ایک یا اس سے زیادہ چیزیں نہیں پائی جاتیں۔ ان کو عناصر (ELEMENTS) کہتے ہیں۔ جیسے سونا، پانی، ہائیڈروجن وغیرہ شتر عناصر ہیں۔

اور جن اشیاء کو تقسیم کرنے پر توڑا یا اس سے زیادہ عناصر پائے جاتے ہیں ان کو مرکب اشیاء (COMPOUNDS) کہتے ہیں۔ جیسے پانی ایک مرکب چیز ہے۔ کیونکہ پانی کو تقسیم کرنے پر وہ بھسپ موسور ہائیڈروجن اور آکسیجن (جو ہوائے لطیف یا نسیم میں پائے جاتے ہیں) یہ کہنا بیکار ہے کہ یہ دونوں چیزیں پانی سے بالکل علیحدہ ہیں۔

(۲) مشہور عالم واسکو دوج، فیزکس وغیرہ علم ریاضی کے ماہر علم مادہ کے عالم اور علم کیمیا کے فاضل نے مختلف قسم کی آزمائش اور تلاشوں کے بعد ایک آواز سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے جان چیزیں ٹھوس (بلا سوراخ کے) ذرات کسی طرح بھی، بے جان، کی علت نہیں ہو سکتے۔ صرف مرکزی طاقت ہوا سے ہے۔

(What is constitutive of matter is not indivisible

Partieles, but more centres of force)

اس کے علاوہ برٹش ایسوسی ایشن کے سابق صدر تام علم کے ماہر سر ولیم کروکس نے نئے طے کیا ہے کہ ٹھوس (SOLID) سیال (LIQUID) اور گیس (GASEOUS) ان تین قسم کی حالتوں کے علاوہ چیزوں کی اور بھی ایک حالت ہے چیزوں کی یہ چوتھی یا نورانی حالت (RADIANT) بخونی غور کرنے پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ بے جان (بلا حرکت والا مادہ) کبھی بھی اس دنیا کا علت مادہ نہیں ہو سکتا۔

لیکن ناظرین تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اٹھاڑھوں یا انیسویں صدی کی بات ہے اب اس پر بھی کچھ روشنی پڑنی چاہئے کہ اس بارہ میں بیسویں صدی کا علم کیا کہتا ہے (۳) آج کل کے عالموں میں یہ بات قائم رہتے معلوم نہیں ہوتی کہ ذرات ہی مادی چیزوں کے ناقابل تقسیم حصہ ہیں، مشہور پروفیسرے بون کا بیان ہے کہ حکومت کو گنبد بے جان کہتے ہیں، اس کے نزدیک نہایت ہی لطیف ذرے کے اندر بھی ایک طاقت (ENERGY) پوشیدہ ہے (انہیں اگر باہر سے طاقت بھی ملے تو بھی وہ آپ ہی آپ بڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی بڑی بے جان چیز کسی مہم سے منتشر ہو جاتی ہے۔ اس وقت اسکے پوشیدہ ذرات میں اس پوشیدہ طاقت کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ سورج کا جلال اور بجلی بھی اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہے۔ بے جان چیز مادہ (MATTER) اور طاقت (FORCE) ایک ہی چیز کی دو مختلف شکلیں ہیں جب ذرات کی (INTRAATOMIC ENERGY) طاقت غیر محرک حالت سے سرحد درہنہ ہے اس وقت وہ بے جان چیز

(مادہ) رہتی ہے۔ جب وہ متحرک حالت میں موجود رہتی ہیں تب وہ مطلق روشنی
بکلی وغیرہ کی شکل میں رہتی ہے (نویں مادہ جنتی پیر کا بیان کہ ۸۱۹ اشک کے لحاظ سے)
(۴) عالموں کی باتوں سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جسے ہم بے جان کہتے ہیں
وہ درحقیقت بے جان نہیں ہے۔ ہمیشہ متحرک بقعر (AETHER)
مرکزی طاقت کا انبار ہے۔ ایک عالم تو یہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں۔
کہ ان کی رائے سے بے جان طاقت کا انبار ذرات کے تجربہ بکذریہ طاقت
کی پیدائش ہو سکتی ہے نوایجاد ریڈیم (RADIUM) کانفل مری کا کام
ہے، بے جان چیز (مادہ) کے منتشر ہونے پر دو طاقت اُس میں پوشیدہ طریقے سے
رہتی ہے۔ اس کی جھلک صرف خاص حالت میں ہوتی ہے۔ گلکے یونیورسٹی
(دارالعلوم گلکے) کے سابق دانش چانسلر ہر دلفریز بنگال کے نہایت مشہور
و معروف سرگورداس بندا اویا دیھا مرحوم (Kt. M.A. B.I. PH. D) کی
تصنیف و گیان و کرم، ملاحظہ ہو

(۵) بیسویں صدی کے شروع میں (۱۹۰۳ء) میں مسٹر اور مسز کیری
(MADAME PIERRE CURRIE) نے ریڈیم کو ظاہر کر کے علمی دنیا کو حیرت
میں ڈال دیا ہے۔ یہ ریڈیم ایک مرکب کرن ہے یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کا بوجھ
ذره بھر بھی گھٹتا ہے یا نہیں، نیات یا جاندار جسم میں کچھ دیر تک ریڈیم کی
دور نگار کھنے پر اسکی عجیب طاقت نمودار ہوتی ہے۔ چھوٹے درخت، میل،
وغیرہ تو غلات ہی ہو جاتے ہیں، انسان کی کھال جل جاتی ہے اور پتھر میں
بند چڑیاں اور چوہے وغیرہ جاندار مفلوج ہو کر آخر میں مر جاتے ہیں۔

The Path-Mall Magazine oct 1903 Rayes Experiments

1904 British Medical Journal Sept. 21. 1907)

Karl Pearson "Grammar of Science" ۱۱

2nd ed. Ch. VII.

Gustave le Bons "Evolution of matter" ۱۲

(دراپہ) اور ریڈیم سے تڑپوا استعمال کرنے پر جڑوں کا دھج مفاصل آرام ہوتا ہے۔

(THE BERLIN RADIUM EMANATORIA REPORTS AND THE

INDIAN DAILY NEWS FOR NOV-6-1911) اس جگہ پر ایسا کہنا شاید

نامناسب نہ ہو گا کہ پیری کر دی صیاحب کے والد اور بابا مشہور ہوسو پتھی کے معالج تھے۔ ایک گرین ریڈیم کی قیمت چھ ہزار سے کم نہیں ہے اور تمام دنیا میں کل م آؤنس ریڈیم موجود ہے۔

(DR. R. N. MOOR OF UNITED STATES BUREAU OF MINES

۱۹۱۸ء میں امریکہ کے مور صاحب نے مسو تھیورم (MESOTHORIUM)

نام کی ایک دھات دریافت کی ہے۔ یہ چیز رنگ برازیل (MONAZTE)

میں ٹی ملی دھات کی شکل میں ملی ہے۔ اس میں بھی ریڈیم کے کڑوں کی طرح دیر تک نہیں ٹھہر سکتیں، ریڈیم کی کرنیں دو ہزار برس تک قائم رہ سکتی ہیں۔ لیکن مسو تھیوریم کی کڑوں کی عمر زیادہ سے زیادہ ایک یا دو برس تک کی ہے۔ جو ہو، اس کی کڑوں کے استعمال سے بھی بہت مرض آرام ہو رہے۔ اس کی قیمت تھوڑی ہے۔ اسی لئے معالجوں کو آمید ہوتی ہے کہ وقت پا کر اسکی مدد سے غریب انسان کو بھی آرام ہو سکے گا۔

(۶) کچھ روز پہلے کیا وی علم میں بھی سبق دیا جاتا تھا کہ کم و بیش شتر خاص چیزوں سے اس دنیا کی پیدائش ہوتی ہے؛ لیکن بیسویں صدی کے روشن ہونے پر علماؤں نے بہت آزمائش کے بعد مجبور ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ ستر یا اس سے بھی زیادہ اصلی چیز نہیں، بلکہ ایک ہی اصلی چیز سے اس دنیا کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا نام برقی ذرات، یا برقی نقطہ (ELECTRONS) ہے۔ کسی کسی کی رائے یہ الیکٹرون جو بجلی سے ہیں۔ ذرات ماہ

لہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ مادہ کو تقسیم کرتے کرتے آخر میں ایک حالت ایسی آجاتی ہے کہ پھر اس کو تقسیم نہیں کر سکتے اسی کا نام (HYDROGENATUM) ذرات رکھا گیا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ کی نسبت چھوٹا اور کوئی قطرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ابھی تک مانا جاتا تھا۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آپہنچا (بقیہ پشت پر)

ذرات اسی فرض کے برابر ہی میں بسندوق کی گولی کی طرح ہوں گے۔
 اس کے علاوہ اس ذرہ کو ۹ فٹ لمبا، ۸۰ فٹ چوڑا اور ۴۰ فٹ اونچا
 ایک مکان تصور کیا جائے تو اس کے برقی ذرات ایک ایک غلٹاپ
 (۱۰) کی طرح ہوں گے۔ اس بارہ میں گلکسٹہ یونیورسٹی (دارالعلوم گلکسٹہ)
 کے سابق ممتحن پروفیسر الینڈر تر ویدی (M.A. P.H.S) مرحوم نے
 فرمایا ہے۔۔۔۔۔ ذرات کی نسبت لطیف تر مادہ اس دنیا میں
 گویا اور کوئی نہیں ہے۔ اب پتہ لگتا ہے۔۔۔۔۔ ذرہ کو توڑنے سے
 ٹکڑے مل سکتے ہیں، ایک ٹکڑا کتنا لطیف ہوتا ہے ان ذرات کی
 چال ڈھال بڑی عجیب و غریب ہے ان کے لئے ایک سکند میں ایک
 لاکھ میل چلنا بھی غیر ممکن نہیں ہے؛ کبھی کبھی تو یہ اپنی رفتار میں بڑی
 تیزی سے چلتے ہیں۔ نواکجا در پیم کے ذرات تریچھ چورے ہیں؛ اس کے
 ذرات برابر باہر نکلا کرتے ہیں، اس کی بھی رفتار کتنی مضبوط رہتی ہے۔
 ذرات میں یہ سب ذرات لطیف سیکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں موجود
 ہیں۔ لیکن وہ رہنا نہیں چاہتے، وہ اند کی طرف پوشیدہ رہنے پر
 بھی تیزی سے گھومتے ہیں اور بحجز خلا میں چوٹ دے کر روشنی کی لہر
 پھیر دیتے ہیں۔ موقع ملے ہی وہ روکاٹ سے چھٹکا پا کر باہر نکل آتے ہیں
 جس بجلی یا الیکٹرون کے ذریعہ انسان ان سو برسوں سے اتنے
 ٹکڑے کر رہا ہے۔ اس کی شکل وہ بالکل نہیں جانتا۔ اب
 معلوم ہوتا ہے مادہ کہ یہ لطیف ذرات اس بجلی کے علاوہ اور
 کچھ نہیں ہیں۔ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ لطیف ذرات بے جان شے
 (مادہ) ہے یا نہیں، بجلی مادہ ہوا نہ ہو، برقی ذرات سے ضرور ہی
 بنا ہے۔ دنیا میں صرف بجلی ہی بجلی ہے۔ یہ علت مادی ہے۔ لیکن ہماری
 زبان سلسلہ وار مشکل ہوتی جاتی ہے۔ علم اگر عقل میں نہ آوے تو وہ
 جہل ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ختم کر دینا چاہیے
 (پرکرت، مطبوعہ ۱۹۰۹ء صفحات ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-

حقیقت میں، سب طرح کی الکٹرن (یا برقی نقطہ) کا دار و مدار (ENERGY) طاقت پر ہے۔ یہ قدیم کراوشی اور حال کے ڈیٹن صاحب کا ذرات (ATOMS) اس برقی ذرات سے بنتا ہے۔ بجلی خود ہی طاقت سے پر چیز ہے۔ بجلی کے فعل ہی ذریعہ ذرات کا وصل اور جسدائی ہو کر نذرانہ دنیائنتی ہے اور کل طبعی فعل ہوا کرتے ہیں؛ ایک ایکٹہ میں کروڑوں الکٹرن گردا گرد رہتے ہیں، آپس میں منتشر الکٹرن کا ہجوم قائم بھر حصار (AELHER) میں برابر ادھر سے ادھر دوڑا کرتے ہیں دو الکٹرن کبھی بالکل نہیں ملتے یا ایک دوسرے کا وصل نہیں ہوتا اور ہر ایک الکٹرن کے درمیان کچھ نہ کچھ خلا رہتا ہے۔ اُس جگہ کوئی دوسرا الکٹرن داخل نہیں ہو پاتا۔

(۷) متواتر بہت قسم کی آزمائش کرنے پر، کیمرج ٹرنیٹی، کالج سے پروفیسر اسٹریٹ (STRUT.) صاحب نے کہا ہے کہ تھوڑا ریڈیم برومائیڈ ایک شیشہ کی ٹی میں رکھ کر دھیمی دھیمی آہنی آہنی دینے سے اُس سے بہت تھوڑی بھاپ نکلا کرتی ہے؛ اس بھاپ کے مجموعہ کی ناپ الیمین کے سر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس نکلی ہوئی بھاپ میں اُس کے کئی لاکھ اوصاف ہوا کے ساتھ مل جاتے پر بھی، صاف ریڈیم کے تمام اوصاف اس ملی ہوئی چیز میں موجود رہتے ہیں۔ اس کی عجیب و غریب طاقت اور بہت زیادہ کام کرنا دیکھ کر تعجب ہونا پڑتا ہے، اس کے استعمال سے جسم کے ایسے خراب زخم کی بمبیا ریاں جو انسج کو برباد کر دیتی ہیں، آرام ہو جاتی ہیں۔ مختلف عاملوں نے مختلف قسم کی آزمائش کے بعد بلا شک و شبہہ کے طے کیا ہے کہ اس میں ناقابل تردید

۱۔ لیکن صاحب موجودہ زمانہ کے ایک مشہور راۓ کے مروجہ گروہ میں انھوں نے بھی اس رائے کی تائید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ذرہ تیار بلکہ کہ وہ برقی ذرات کا ایک مجموعہ ہے اور ہر ایک برقی نقطہ (RESERVOIR OF ENERGY) الکٹرن) براعظم ہے، کتاب موسومہ بلا حفظ ہو۔

(N.C. CARBS EVOLUTION OF MIN.D)

ایک قسم کا جوھر کنٹھا ہوتا ہے، اُستاد ڈرسٹ کہتے ہیں کہ جوہر کی پوشیدہ طاقت کے بارے میں خود کرنے پر تعجب ہوتا ہے۔

(THE BECQUEREL RAYS)

(۸) جس خونیٹک لطیف زہر سے امراض خسرو، چیچک، طبریا، ہسٹیریا، انفلوئنزا، یا پلگ پیدا ہوتے ہیں اسکو کیا کبھی کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یا ناپ سے اُس کا وزن وغیرہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کی ناقابل دید پسیدہ کرنے والی طاقت پر فتح پانے کے لئے آج تمام مہذب دنیا کی شاہی طاقت لگی ہوئی ہے۔

(۹) ماہرین علم الحیات نے (BIOLOGIST) ثابت کیا ہے کہ قوت

حیات (PROTOPLASM) ہی زندگی کے جسم کی عقلت مادی ہے۔ یہ ہی ذرات زندگی کے خسرانہ کا سبب اولین ہے یعنی نباتات اور جسم زندگی کا اصلی سبب ہی (MALARIAL BASIS OF LIFE) ہے۔ ذرات زندگی

کے خسرانہ قوت حیات، کا سلسلہ جب اچھی حالت میں رہتا ہے۔ تو اسکو ہم لوگ صحت کہتے ہیں اور جب یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تب اس کو مرض کہتے ہیں۔ اشیاء محرکہ سے زندگی کا فعل تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

اس لئے قوت حیات کا سلسلہ ٹوٹ جانے پر اشیاء محرکہ سے قوت حیات کا فعل بڑھا جاسکتا ہے۔ اس لئے ادویات کو قوت کا کیمیاوی

محرک (CHEMICAL STIMULI) یا قوت حیات بڑھانے والا خیال تو مناسب نہیں ہے۔ قوی محرک (A. LARG STIMULAS)

کے ذریعہ زندگی کا فعل رکتا ہے اور نسبتاً نئی طاقت کی تحریک کے ذریعہ قوت حیات کا فعل بڑھ جاتا ہے۔

اب اگر مرض ہونے پر بالمثل طریقہ والے یہ خیال کریں کہ زیادہ تعداد یا کم تعداد ذرات کی زندگی کے خزانہ کی قوت حیات کا سلسلہ ٹوٹ جائے کی حالت میں پہنچ گیا ہے تو اُن کا گمان مناسب نہیں کہا جاسکتا۔ ہم لوگوں نے کتاب کے شروع میں کہا ہے کہ متعدد جسم میں کسی دوا کے

کھانے سے جسم میں جو تمام علامات ظاہر ہوتے ہیں، وہی علامات اگر بیماری کی حالت میں نمودار ہوں تو اسی دوا کو نہایت قلیل مقدار میں استعمال کر کے اس مرض کو رفع کرنے کا نام ہو میو پیٹھک ہے۔ یعنی ذرات زندگی کے خزانہ کی قوت حیات کا سلسلہ شکست ہو جانے پر نہایت قلیل مقدار میں منقسم ہو میو پیٹھک دوا استعمال کرنے پر قوت حیات کا فعل بڑھ جاتا ہے۔ یا جسم کو آرام ہو جاتا ہے۔ اگر ہو میو پیٹھک دوا استعمال کرنے پر قوت حیات کا فعل بڑھ جاتا ہے۔ یا جسم کو آرام ہو جاتا ہے اگر ہو میو پیٹھک دوائے ایسی آمیدیں کریں تو عقیدہ کے خلاف نہ ہوگا۔ اسلئے تندرست جسم میں ہو میو پیٹھک آزمودہ دوا زیادہ تعداد میں دینے پر مرض کیوں ترقی کرتا ہے۔ اور کم مقدار میں استعمال کرنے سے کیوں آرام ہوتا ہے۔ اس بڑی سچائی کے دریافت کرنے کی وجہ سے خلقی ہو میو پیٹھک ذرا بھی بغیر لغزش کے خاموشی کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہتا ہے اور ہو میو پیٹھک میں بلا شوق والے اور فیصدی ستائوے علاج بغیر مشقت کے امتحان کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو میو پیٹھک دوا زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پر مرض ترقی پکڑتا ہے۔ یا نہیں؟ دوا مقدار میں استعمال کرنے پر آرام ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ عرصہ تک صبر سے اسی طرح امتحان کرنے کے بعد اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ مذکورہ بالا اصول سچائی پر قائم ہے تو ہم لوگ ان سے انکساری سے درخواست کرتے ہیں کہ علاج ہو میو پیٹھک کے طریقہ کو تسلیم کر کے نہایت ہی قلیل دوا کی طاقت کے بارے میں شہادت دیکر دنیا کی بھلائی کریں۔

(۱۰) سب ہی جانتے ہیں کہ (RASTEUR KOUCE BENRING)

آجکل کے عالم قدیم طریقہ کے معالجوں کی ٹی ٹاکسن (ANTI-TOXIN) کے طریقہ میں لطیف ذرات حصوں میں منقسم دوا استعمال ہوا کرتی ہے۔ اور اسی کے ذریعہ پاگل کتے وغیرہ کے کاٹنے، زخم، دق، ڈنقہریا، کزاز وغیرہ خراب امراض آرام ہونے کی وجہ سے دنیا کو بے حد فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن خیال ہے بہت آدمی یہ نہیں جانتے کہ سیڈے بڑے تحقیق صاحبان

(خاص کر پیرنگ) نے ہم آواز ہو کر سب کے رو برو اس کا فائدہ صاف الفاظ میں ہو سوتا چیک
ڈیویشن کی تعریف اور اس کا فائدہ تسلیم کیا ہے (ملاحظہ ہو۔)

(Beltrage Zdr Experimenteller Thera)

Heft II. by prof. E. von Behring Berlin 1906

(II) کے گویو نیورسٹی (ردار العلوم) کے پروفیسر (معلم المعرفہ) تل کین اور گیل
ان دونوں صاحبان کی رائے میں ہر قسم کے نقذات میں ہے بہت بڑی مقدار پر پیشیدہ

(Vide their first course in physics page 482)

Here is a Free English translation of interest
ing p ssages:-

Thirteen years ago (von Behring) demonstrated before the Berlin Physiological Society the immunising action of my tetanus-antitoxin. In infinitesimal dilution and spoke of the production of the serum by treating animals with a poison which acted the better - the more it was diluted. Gentleman..... if I had set myself the task of rendering an incurable disease curable by artificial means and should find that only the road of Homoeopathy led to my goal I assume your dogmatic considerations would never deter me from taking that road.

یہ پہلے کلکتہ یونیورسٹی کے ماتحت کالجوں میں درس کی کتاب تھی جو نہایت
 قلیل مقدار میں ہومیو پیتھک محل (منقسمہ) دواؤں کے ذرات میں بھی یہی
 اگر پوشیدہ رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

یہ کہنا بیکار ہے کہ متقدمین علماء میں کوئی بھی طریقہ کا حامی نہیں ہے۔ یا
 ہومیو پیتھک طاقت کی سچائی کی ترقی کے لئے انھوں نے قلم نہیں اٹھایا تھا۔

(۱۲) لورپول کے ڈاکٹر ہے ورڈ (HAYWARD) صاحب کا بیان ہے
 کہ ذرات ہی مادہ کا لطیف ترین حصہ ہے کچھ عرصہ پہلے تعلیم دی جاتی
 تھی لیکن برقی ذرات کے ساتھ مقابلہ کرنے پر ایک ایک ذرہ بہت بڑا ہے۔
 ہر ایک ذرہ میں موجودہ ذرات برقی میں آپس میں اتنا فرق یا غلا یعنی
 خالی جگہ (SPACE) پڑی ہے کہ سورج کی دنیا کے بڑے خلا میں اپنے اپنے
 حلقوں میں بہت تیزی سے گھومنے والے سیاروں کی طرح وہ برقی ذرات
 بغیر کسی شخص کے بڑی تیزی سے اُس ذرہ کے اندر ہی متواتر چلنے لگنا کرتی ہیں۔

Dr. C.W. Hayward's paper on "Loss" in the
 British Hom. Journal for Feb. 1911 F.B Grosvenor
 M.A.M.D. Article "Matter and "Medicine" in
 the Homeopathic Recorder for August 1916)

Vide also Mysteries of the atom by E.

Hendrick - Sc.D. Homeoworld (Jan. 12.P.57)

Besides the valuable articles on electrons

recent ly contributed by prof Niels Bohr (Noble

Prize holder 1922) J.J. Thompson Rutherford

Curie, Seddy Eintsin, Planck, Aston, Michel

Millikan Gilbert Lewis and Langmeir.)

(۱۳) اس موقع پر تازہ زندگی علم سائنس کے محب اور خواہد و فکر کرنے والے

مراجہ کیفیت والے کتاب پر دیکھیں مگر وہی صاحب جو کہ چند سال پہلے تازہ

نہیں رہ سکتے، ہو میو پیٹھک طریقہ علاج کو بہت لوگ آسان کام سمجھتے ہیں۔
 غیر مالک کا حال تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہمارے اس ملک میں ہو میو پیٹھی
 کے ساتھ علم کے تذکرہ کا ایک گہرا تعلق سلسلہ وار آ رہا ہے۔ بنگال کے فخر علاؤ الدین
 مہندر لال سرکار جس طرح ایک طرف ہو میو پیٹھک علاج کی بنیاد مضبوط
 کر گئے ہیں۔ اُسی طرح اُنھوں نے علم سائنس کی عظمت کے لئے اپنی زندگی
 کو وقف کیا ہے۔ جنھوں نے اس ملک میں ہو میو پیٹھک کی شہرت کے لئے
 زندگی کو وقف کیا ہے اُن میں سے بہتوں کو پایہ تکمیل دینے والا کہا جاسکتا
 ہے۔ ڈاکٹر مہندر لال سرکار بھی ایک تکمیل دینے والے تھے۔ اس تکمیل میں
 ایک بہادری ہے، چاروں طرف کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ دل لگی
 کرتے ہیں۔ لیکن اس یہودہ مذاق کو صحیح سمجھ کر اکیسوں اور یقین کے
 ساتھ ہو میو پیٹھی کی تکمیل کرنی پڑتی ہے۔ سچا عقیدہ ہوئے بغیر یہ تکمیل
 بار آور نہیں ہوتی، یہ عقیدہ ڈاکٹر کو عقیدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
 اس میں بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کیونکہ اس غلط عقیدہ کی اصلیت
 میں سچا عقیدہ موجود رہتا ہے۔ ہو میو پیٹھک ڈاکٹر دل کی اس کور
 عقیدہ کی مثال آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور دل ہی دل
 میں ہنستے بھی ہوں گے آپ اس کو کور عقیدہ کہنا چاہیں تو کہیں۔ لیکن مجھے اس میں
 تکمیل کرنے والے کی بالکل سچائی کا پتہ لگتا ہے۔ اس اکیسویں اور اس
 عقیدہ کے بغیر کام پورا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اس ملک کے دیوتاؤں کے
 کور عقیدہ کا مذاق اڑا کر رہے ہیں۔ کور عقیدہ والا دشتو دوسرے دیوتا
 کی بات بھی نہیں کرتا۔ وہاں بھی اصلیت میں وہی سچا عقیدہ روشن ہے۔
 علمی چرچے میں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اُن میں ایسے کور عقیدہ والے بہت
 ملتے ہیں، وہ اگر علم ہی کو خوشی اور علم ہی کو برہم سروپ مان لیں تو آپ کو
 تعجب نہ ہونا چاہیے۔ ایسی مشق ہوئے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی۔
 میں یہ نہیں جانتا کہ ہو میو پیٹھک سائنس ہے یا نہیں۔ لیکن میری عادت
 کچھ علم چرچے کی ہے۔ لیکن میں طالب علم ہوں، صرف علم کا بھکاری ہوں۔

بھیک کی جھولی کندھے پر رکھ کر عالموں کے دروازہ دروازہ پر گھومتا رہا ہوں۔ کیا علم ہے اور کیا علم نہیں ہے۔ اس بارہ میں مختلف بحث و مباحثہ عالموں کے منہ سے میں نے سنا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ آج جس عالم علم کا جھنڈا انجمن علماء میں لہرا رہا ہے۔ دو ہی روز بعد وہی علم اور اصول کا جھنڈا پامال ہو رہا ہے۔ کتنے ہی جھنڈے زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن تمام عالموں کے دیوار کی شکل میں بڑی سچائی ہے اس دیوار کو چھوڑ دینے پر کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ دیوار ہی ثبوت بدہی کی دیوار۔ علم کے لئے ثبوت بدہی کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نقوش کو حسب مناسب تیز کر کے اس پر سان چڑھا کر ان نفاس کے میل سے ثبوت اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ حاصل کیا ہوا ثبوت بدہی بہت لوگوں کے ذریعہ ثبوت بدہی جو سچ پایا گیا ہے۔ علم اسی کو سچ مانتا ہے ہو میو پیٹی کے علم کے بارہ میں میں نے بہت بحث سنی ہے۔ بہت بحث و مباحثہ بہت سے اُطول، بہت سے علمی بیانات میں نے سنے ہیں۔ لیکن ان کا اثر میرے دل پر نہیں ہو سکا۔ رہا نہ گنگا میں ایک جمج بیلادونا ڈال کر دریائے گنگا سے ایک جمج پانی لے کر پینے سے اگر اُس کا نتیجہ دکھائی دے، اگر لفظ سچا علم علماء کے طریقہ کے ذریعہ ثبوت بدہی میں اس کا نتیجہ دیکھ سکوں اور یہ معلوم ہو کہ اور بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ معلوم ہو رہا ہے تو میں اس کو بغیر کسی قوت کے سچ مان لیتے کو تیار ہوں۔ نتیجہ کس طرح دستیاب ہوا اُسے لیکر اُسے لیکر مقنن، سر صیٹول کیا کریں۔ علم سائنس کے نزدیک ثبوت بدہی ہی بالکل ثبوت ہیں۔

۲۲ مارچ ۱۹۱۸ء کو شوپور میں سائنس کی عمارت کھولنے کے وقت جناب صدر رالیندر سندھر تر ویدی سورگباشی کا ارشاد ملاحظہ ہو:

(۱۴) اور حال میں ۱۹۱۳ء میں خالص ریڈیم x۶ - قوت کا سفوف کمرنوں کی مدد سے امریکہ کے مشہور معالج، اے۔ پی۔ ایٹول صاحب ایم، ڈی، فوٹو گراف لیکر کامیاب ہو گئے۔

ہمارے چہرہ کی آنکھیں یا خوردبین سے نہ دکھائی دینے والی $x \cdot y$ کی طاقت میں بھی جو ریڈیم موجود ہے۔ اُس کو اُنکھوں نے ظاہر کر کے عالموں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔

(۱۵) اب متذکرہ بالا لطیف ذرات کا ملاپ یعنی مادہ کے حامیوں کا نہایت عزیز مجسمہ ذرہ بیسیویں صدی کے ریڈیم کی کرن کے سامنے چور چور ہو کر اور ناقابل دید لطیف طاقت کی شکل (یا بجلی کے ذرہ یا بجلی میں) تبدیل ہو کر سچائی مادہ کی ہستی کی شہرت دیتے ہوئے زمانہ قوت کی نیک جبر کی اطلاع کیا۔ دنیا کے سامنے گہری آوازیں نہیں دے رہا ہے۔

علم سائنس کے اچھے طریقہ کی تربیتی کے پاک پانی میں نہا کر مستقل دور اندیش بنی مین نے سیکڑوں برس پیشتر گہرے غور و خوض سے آدمی اشیاء کے اندر بعید الفہم قوت دیکھی تھی اور جن کی (DYNAMISATION) قوت بڑھانے پر مفاہین لکھنے سے عالموں اور جاہلوں کے طبقہ نے اتنے دنوں تک مذاق اُٹایا۔ آج اُسی سائنس کے مختلف آزمائش اور تجربہ کے بعد مادہ پرستوں نے بڑی عظمت کی ضروری چیز مادہ (MATTER) کو رد کر کے ہمارے اعضاء میں اُلٹی ناقابل دید قوت کی سچائی تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اُس کی عظمت کی تعریف کرتے ہوئے بنی مین صاحب کی غیر معمولی عقل کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور انگلستان کے محافظ سابق ولیم جیڈ اور ہندوستان کے شہنشاہ نے تاریخ ۱۹۲۱ء کو برٹش ہومیو پیتھک ہسپتال کی بنیاد

۱۸ (PLATES) میں کوئی مادہ اور پلیٹیں $x \cdot y$ نصف ڈرام کرن گھنٹہ بل کر اکسپوز (EXPOSED) دینے کے بعد صاف فوٹو گراف اُٹھا تھا۔ مفصل حالات کے لئے:-

(THE HDM RECORDER APRIL 15, 1913 (R 145-146)

۷ (THEORY OF DYNAMISATION) کی مقدار میں ملاحظہ ہو

اپنے ہاتھوں سے رکھنے کے بیشتر یہ فرمایا تھا کہ میں بھی ایک مریض زیر علاج ہو میو پیٹھک ہوں۔ اس طرح انھوں نے بڑی خوشی سے سب کے رو برو تعریف کی تھی اسکے بعد ۱۹۲۶ء میں لندن ہسپتال کے ہو میو پیٹھک ڈاکٹر کو اپنا معالج مقرر کیا۔

(WEIR BURNETT. PROFESSOR OF HOM. MATERIA MEDICA

A PHYSICIAN IN ORDINARY TO H.R.H. عظمیٰ شاہی عملہ

THE PRINCE OF WALES) کے مرتبہ پر (مقرر کیا تھا۔ اس طرح مستقل

جوئی پر علاء مہرینی میں کا ہی طریقہ مثل بالمثل کی زیادہ تعریف ہوتی تھی اس میں تو کوئی شہرہ نہیں کہ مہاتما ہی میں! آپ کے پاک جلوہ سے پرنورانی پیشانی پر فرح کے خوبصورت تاج کا نتیجہ ہمیشہ شگفتہ رہے گا۔ وہ کبھی بھی پرمردہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا مادہ کی کیمیاوی برقی علم کی دیوار کی بنیاد ڈالنے والے آپ کے مقلد ڈاکٹر گلوآئی کو بھی ایک روز طعنہ سے کہنا پڑا کہ سائنس دان اور جاہل، ان دونوں طریقوں کے لوگ ہی مجھ پر حملہ کیا کرتے ہیں، ان دونوں طرف کے حامیان مجھے نینڈک کے خاندان کا جاندار عالم کہہ کر مذاق اڑا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بلاشبک و شبہ معلوم ہے۔ کہ مادہ کے اندر ایک عظیم طاقت میں نے دریافت کی ہے۔

مقدمہ (ب)

سورالمزاجی اور آس کا دقعیہ

(شدید امراض یعنی مسادر اور مزمن ملاحظہ ہو)

(ہومیو پیٹھک علاج میں تھوڑی بہت معلومات ہوئے بغیر طالب علم

(H.R.H. The Prince of Wales stated in joyous tone "I am a Homeopathic patient too" The Homeopathic world February July 1921)

(صفحہ ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۱۱ فروری ۲۳ء صفحہ ۲۵۰ - ۲۵۱ - ملاحظہ ہو)

اس مقصد (رب) کا مطلب سمجھ نہیں سکتا۔

یاد رکھنے کے قابل :- تمہید کے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ ۱۸۹۰ء میں بڑی شخصیت والے ہنری میں صاحب نے ہومیو پتھی دریافت کی تھی۔ لیکن بہت عرصہ تک ہومیو پتھی طریقہ سے علاج معالجہ کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک دوا کے استعمال سے کسی کسی مریض کی بیماری بالکل آرام آرام نہیں ہوتی کچھ دب کر رہ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ۱۸۱۶ء میں انہوں نے اس اصلیت کی تلاش شروع کی۔ بارہ برس تک تلاش کرنے کے بعد انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ سوزا کا آتشک یا زہر سورا مریض کے جسم میں موجود رہنے پر ایسا ہوتا ہے اس باب میں پہلی تین قسم کے سوزا لڑا جی کا حال بیان کیا جائیگا۔ ہنری میں صاحب کے بتائے ہوئے امراض حاد اور مزمن کے علامات اور ہومیو پتھک طریقہ سے علامات مرض لکھنے کا طریقہ کے ساتھ اس مقصد کو ملا بڑھنے سے بالمش طریقہ کے استاد کے اصول سے تمام قسم کے مزمن مرض کے علاج کرنے کی اور ہومیو پتھی کے اصل اصول (FIRST PRINCIPLES) سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔

ہومیو پتھی یا طریقہ بالمش کے اصل اصول کو اچھی طرح درک کرنے کے ہومیو پتھک علاج کرنیکی کوشش کرنا مذاق ہی۔ موجودہ ہومیو پتھک علاج دنیا کے شہنشاہ علامہ کنیٹ صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ہومیو پتھی تمام دنیا میں رائج ہو گئی ہے۔ لیکن بڑے ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو موجودہ پتھی کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انھیں کے ذریعہ ہومیو پتھی کا اصلی اصول زیادہ تر بگڑ جاتا ہے۔

لہٰذا تذکرہ بالا باب کے ساتھ یاد رکھنے کے قابل مقصد پڑھیے

HOMEOPATH IS KNOWN EXTENSIVELY DISSEMINATED OVER THE WORLD, BUT STRANGE TO SAY BY NONE ARE ITS DOCTRINES SO DISTORTED AS BY MANY OF ITS PRETENDED DEVOTEES KENT LECTURES ON HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY PAGE 3, MEMORIAL EDITION.

معالج اور گھر گریہست صاحبان کو یہ ارشاد خصوصیت سے یاد رکھنا چاہیے لیکن
بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تک اردو کی کسی ہومیو پیتھک کتاب میں ہومیو پیتھی
کے اصل اصول پر غور نہ کرنے کیوجہ سے امراض حادہ و مزمن کے علاج کا طریقہ
نہیں پایا جاتا۔ اس لئے اُمید ہے کہ متذکرہ بالا چاروں باب کے غور
سے پڑھنے پر یہ کمی کچھ پوری ہو جائے گی۔

ہر سہر سورا المزاجی :- امراض حادہ کا علاج کرتے وقت ٹھیک
منتخب دوا بھی کبھی کبھی حسب خواہش فائدہ نہیں کرتی۔ ایسی حالت میں سمجھنا
چاہیے کہ مریض کا خون خراب ہو گیا ہے اور وہ بگاڑا خون (مناسب ہومیو پیتھک دوا
استعمال کرنے پر بھی شفا میں غلٹ ڈالتا ہے۔ یہی من صاحب فرماتے ہیں کہ مین
وجوہات سے (جیسے زہر سورا، زہر آشک، اور زہر سوزاک خون میں داخل
ہونے پر) یہ خرابی خون یا سود المزاجی (DYSCRASIA) پیدا ہو جاتی
ہے۔ یعنی (CONSTITUTION) مزاج میں سورا سفلیں سائیکوسس
پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں زہر علیحدہ علیحدہ خود مختاری کی صورت میں یا
سب مخلوط، مریض کے جسم میں رہتے ہیں تو ہم لوگ اس کو مرض مزمن کہتے
ہیں (شدید اور مرض مزمن کا مقصد ملاحظہ ہو)۔

تمام سود المزاجی یا مرض مزمن چھوت دار امراض متعدی (CONTAGIOUS)
خاندانی اور باہر کی (HEREDITARY) سے طرف سے اندر (FROM)
(OUT WARD IN WARD) کی طرف ہوتے ہیں اور وہی درجے آغاز، اور
تمو ہوتے ہیں (درجہ زوال نہیں ہوتا) یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ طبعی قوت
واقع مرض سود المزاجی کو دور نہیں کر سکتی۔

جن کو کوئی سود المزاجی ہوتی ہے ان کو کوئی حاد بیماری ہونے پر بھی وہ مجربہ
ہو جاتی ہے۔ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سود المزاجی ہی مریض کی گذشتہ
تاریخ (PAST HISTORY) وغیرہ اچھی طرح معلوم کر کے یہ طے
کرنا چاہیے کہ اس کو کون سود المزاجی ہے اور اس کے بعد اس
سود المزاجی کو دفع کرنے کے لئے پہلے دوا دینا چاہیے اس کے بعد (یعنی

سور المزاجی کچھ دب جملے پر) حسب ضرورت حاد بیماری کی دوا دینا چاہیے
اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا دفع سور المزاجی کے استعمال کرتے ہی سور المزاجی
حاد بیماری کا سبب بنتا ہے۔ سور المزاجی اگر نہ رہے تو حاد مرض
کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔

(Dr. Kidpath's Law of cure Page 6) ملاحظہ ہو۔

ہنی میں صاحب کے تینوں سور المزاجی کی علامات اور ادویات وغیرہ
مختصراً بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) سور (PSORA) کئی ہزار پیشہ جدام (یا اکوتہ کی طرح
کے ایک قسم کا جلدی مرض اتنا پھیلا کہ لوگ بکھرا گئے۔ مختلف قسم کی ادویات
اندرونی استعمال اور بیرونی استعمال کی وجہ سے وہ مرض زائل نہ
ہو کر جسم کے اندر (SUPPRESSED) دب گیا اور اس
نے جسم کو خراب کر دیا۔ اسی دبی ہوئی کھجلی یا جلدی امراض کا نام سور یا
اندرونی زہر کھجلی ہے۔ لہذا بعد لہذا یہ سوراء مختلف کی شکل میں
(جیسے بوڑھی، بد صورتی، سردی، دق زیادہ پیشاب) بیکن قلب یا
مرض دماغی وغیرہ میں ظاہر ہوا کرتا ہے صاحب الزائے کینٹ کا ارشاد
ہے کہ سوراء، انسان کی طبعی حسرابی یا استوائی ہے۔ اور مرض

لہ اگر ایک برس کے بچہ کو سوکھا (MARASMUS) ہو جائے اور
دو برس کی عمر والوں کو اگر اس میں مرض دق کے علامات اور بوڑھوں کی طرح چہرہ
دکھائی دے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کوئی مرض مزمن ترکہ میں
پایا ہے یعنی بچہ کا سوکھنا اور مرض دق کی کمزوری یہ دونوں ہی بچہ میں
تینوں مزمن امراض کے علامات ہیں۔ ان کی طبعی حالت بالخصوص علامات
متذکرہ بالا ہر ایک سور المزاجی بیان کرتے وقت علیحدہ علیحدہ لکھا جائے گا۔
لہ شروع میں طبعی قوت دفع مرض ملاحظہ ہو۔

سوزاک (یعنی حادثہ تمام بیماریاں) سوزاک کے اوپر ہے۔ منقسم ہو رہا ہے۔
 سوزا، اگر نہ رہتا تو جسم انسانی پر کوئی بیماری حملہ نہ کر سکتی، امراض
 زہریہ (VENERAL DISEASES) کے علاوہ کل مزاجی کیفیت والے
 (CONSTITUTIONAL) اور عضوی (ORGANIC) مریض

اندر دینی سوزاک کے مشابہ ہیں۔ جیسے مزمن جگر کی بیماری ایک علیحدہ خود بخود آتا
 نہیں ہے، یہ جگر میں سوزاک کا رہتا۔ مقامی (LOCALISATION) ہے۔
 اسی طرح دل پھیپھڑا، دماغ، مثانہ وغیرہ کی مزمن بیماریاں علیحدہ
 علیحدہ نہیں ہیں۔ اُن اُن آلات میں سمجھنا چاہیے کہ سوزاک موجود ہے
 دیا ہوا سوزاک، سرطان (CANCER) امراض، دل، پھیپھڑے کی
 بیماریاں، دق وغیرہ جسم کو زائل کرنے والی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

زہر سوزا عموماً نچری دم (BLOOD VESSEL) اور جگر (LIVER) کو
 خراب کر دیتا ہے اور جلد پر پیسید اور پھوڑا (BOILS) پیدا کر دیتا ہے

۱۔ ہنی من لئے مندرجہ ذیل امراض کا بیان کیا ہے عصبی کمزوری۔ اعتناق الرحم
 (HYSTERIA) وہم عراقی (HYPOCHONDRIASIS) وحشت (جنون سخی)
 بدوقوفی (IDIOCY) جنون (MADNESS) مرگی اور جملہ قسم کے تشنج
 (EPILEPSY AND CONVULSIONS) ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا یا لکڑن (RACHITIS)
 سرطان (CANCER) ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا (CARIES) قطرہ مودی یا سہ
 ایک قسم کا ملائم سرطان یا مسہ (FUNGUS HAEMATIDES) نئی ساخت

(NEO PLASMS) نفیس (GOUT) میڑ برقان (ICTERUS) مرض
 ارزق یا نیلی بیماری (CYANOSIS) استسقا (DROPSY) امراض عین معدہ
 ناک، پھیپھڑے یا مثانہ یا رحم سے اخراج اور پھیپھڑے پر مواد نامردی یا بچھ پن،
 آدھا سیسی دردمز بہر این، موتیا بند، سبز موتیا (GLAUCOMA)
 سنگ مثانہ (RENAL CALCULUS) فلج، نفس لے نہ سہ یا کام کرنے
 کی نا طاقتی، ہر قسم کا جسمانی درد وغیرہ اس، سوزاک کے تحت ہیں۔

(THE ORGANON SECTION) ملاحظہ ہو

چھو جانے (جیسے ہاتھ ملانے، پہنے ہوئے کپڑے استعمال کرنا) کے ذریعہ سے یہاں تک کہ سوراخ میں مبتلا ہوئے اشخاص کی سانس یا پھیپھڑوں کے ساتھ سوراخ بہر تندرست جسم میں پہنچ جاتا ہے یونودسٹی کے ہم معتبہ دل کے سانس کے ساتھ وہ تندرست طلباء میں سرایت کر جاتا ہے۔

اگر دیکھو کہ ہومیوپیتھک مناسب دوا کے استعمال سے بھی کوئی حاد بیماری اچھی نہیں ہو رہی ہے یا بیماری بے حد بے کار بڑھتی جا رہی ہے۔ یا اگر یہ معلوم ہو کہ کسی کی جلد کھٹکتی ہے۔ یا کوئی کھجلی، زخم، یا آگزیما، برار، لگا رہتا ہے یا کبھی کبھی جسم پر پانی بھری پھنسیاں نکلا کرتی ہیں۔ یا ہاتھ کی کلائی کے پاس وقتاً فوقتاً جاری بیماری ہو جا یا کرتی ہے اور سینے برس پہلے ہاتھ کے جوڑوں میں اندھوری کی طرح دالنے نکلنے تھے اور اس کے بعد ناخنوں میں نقص پیدا ہو گیا ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ جستہ (zinc) اور گنسدھک وغیرہ کا مرہم کوئی دوسری نقصان دہات وغیرہ سے تیار کی ہوئی دوا کے خارجی استعمال سے کوئی بیماری دب گئی ہے اور اس کے بعد ہی سے کوئی تیز بیماری پیدا ہو گئی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض کے جسم میں سوراخ پوشیدہ طور سے سکونت پذیر ہے۔ سوراخ خرابی دور کرنے کے لئے سلفر ۳۰-۲۰۰ مخصوص دوا ہے۔

سورنیم، کیلک کارب، لائیکو، سیپا، سلیکا، ہیپر فیرم میور، گریفائٹس، آرسنک، ایلیمین، کاسٹیک، مرزیم، ٹروکیم، کاربو ایسڈ، ٹیوہ کیو لیم، آرم سٹ، نائٹرک ایسڈ، گوکیم، بوریکس، زینک آکسائیڈ، براسٹا کارب، لیکس، فاسفورس، وغیرہ دواؤں کا ادنیٰ طاقت کی خرابی کو رفع کرنے والی ہیں۔۔۔ (ANTIPSORICS)

سلفر وغیرہ ادویات قابل سوراخ استعمال کرنے پر کبھی کبھی دبا ہوا اندرونی سوراخ کسی جلدی بیماری کی شکل میں جسم کے بیرونی حصہ میں نمودار ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں سمجھنا چاہیے کہ مریض شفا کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ اور دوا کچھ عرصہ تک روک دینا چاہیے۔

ادویات قاتل سورا کے استعمال کرنے کا خاص وقت :-
صبح حالت حمل میں حیض کے پانچویں روز حیض کے وقت، اور حیض ہونے
کے کچھ ہی پہلے یا بعد روا استعمال کرنا منع ہے۔

(ب) آتشک (SYPHILIS) سفلس

آتشک کے ماؤت انسان کے ساتھ صحبت کرنے پر چلر کے کسی باریک
(یا کٹی ہوئی) حصّہ میں اس کا زہر لگا دیا جائے پر تندرست جسم میں بھی
آتشک کا زہر پھیل جاتا ہے۔ اس زہر کے سرایت کرنے کے بعد متواتر تین
درجے کے بعد دیگرے ظاہر ہوتے ہیں۔ زہر سرایت کرنے کے ایک یا دو ہفتہ
بعد اس مقام پر جہاں زہر لگا تھا۔ ایک پانی بھری پھنسی (VESICLE)

نمودار ہوتی ہے۔ اسکے بعد یہ پانی بھری پھنسی سخت زخم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
ٹپھے کی گانٹھ کو یا کھی کہتے ہیں (۲) سخت زخم ہونے سے کم سے کم دو ماہ
کے اندر گلے میں زخم ہو کر ہڈیوں میں درد، مختلف اقسام کے آتشکی زخم،
(SYPHILIDES) بال گرنا، ناخن میں نقص ہونا، آنکھ کے انگری پر دے۔

کی سوجن (IRTIS) رطوبتی گلیٹوں کا بڑھنا وغیرہ علامات پیدا ہوتے
ہیں اور آخر میں (۳) عنقریب ڈیرھ برس بعد ہڈیوں کا ابھار یا کھسکا
(GUNMATA) یعنی ہڈی، چلہ داغ، جگر، ہیفہ، رحم وغیرہ جسم کے

تمام اعضا میں اور حصّوں میں ٹیو بر یا توڑی کی نمود یا مواد پیدا ہو جاتا
ہے۔ ناک، مری (غذا کی نالی، تالو، مجری، براز وغیرہ مقام کی ہڈیوں
میں زخم ہونا۔ یا سٹر جانا وغیرہ علامات نمودار ہوتے ہیں۔ مگر وہ جسم میں بہت
تیزی سے یہ تینوں درجے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہو مویو پیٹھک طریقہ سے
کھینک علاج ہونے پر وہ مناسب وقت پر بلا کسی نقص کے آرام ہو سکتا
ہے (مرض آتشک کا حائل ہو، لیکن خراب علاج یا مختلف قسم کی نقصان
دہ ادویات وغیرہ کے استعمال سے آتشکی زہر جسم کے اندر سرایت کرنے
پر مرض خونزاک ہو جاتا ہے۔ اس وقت بہت ہوشیاری سے مناسب
سلا سلا ہونے لگی کی طرح دانت اور چچی ناک ان باتوں کو آتشک کے مطلق یاد کرنا چاہیے۔

ہو میوٹھک دوا کے استعمال سے اسکو ماؤف جسم کے اندر سے باہر لانا پڑتا ہے۔
کسی نرسن بیماری میں اگر سر کے دونوں طرف کی ہڈی بے حد درد و سخت
بالکل خراب، دماغی کمزوری، ہڈی کا ابھار (GUMMATA) اور گہرا

زخم (DEE-SEATED ULCERATION) رات کے وقت (یعنی غروب
آفتاب سے طلوع آفتاب تک) تکلیف کا بڑھنا وغیرہ علامات
معلوم ہوتے ہیں۔ ان سب علامات کو دیکھتے ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ مرض کے جسم
میں آتش کی خرابی پوشیدہ ہے۔ اسکے علاوہ اگر کسی بچے کا سر اونچا آگے
کے بالائی حصہ میں چاروں طرف دانت کنگھی کی طرح کٹے ہوئے اور ناک
کی جڑ بیٹھی ہوئی یعنی چیلٹی دکھائی دے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسکے خون
میں زہر آتش موجود ہے یعنی اس کے باپ یا ماں کے تین چار پشت
میں کسی نہ کسی کو بلا شک و شبہ آتش ہوئی ہے

مرض آتش میں ہڈی اور سر کی ہڈی کی چیلٹی (PERIOSTEUM)
اور سر خصوصیت بتلا ہوا کرتے ہیں مرض آتش برقی (TUBERCULAR)
در حقیقت پھوڑا (Boils) نہیں ہے۔ اس لئے سوراخ والے چیلڈی
پھوڑے کے ساتھ اس کے دھوکا ہونے کا امکان نہیں ہے۔

مرض آتش کے دفعہ کے لئے مرکب سول ۶۔۔۔ ۲۰۔۔ اچھی دوا ہے۔
سفلیئم، ہیمہ، نائٹریک ایسڈ، آرم مرٹ، نیٹریم میور، سلیکا، نیٹریم سلف
لیکس، آرس، گوئیکم، گریفائٹس، لائیکو، کیلی بائی وغیرہ ادویات
قابل آتش ہیں (ادنی طاقت میں) اگر منتخب دوا استعمال کرنے
پر اندرونی آتش ماؤف جسم کے باہری حصہ میں حناق مطلق آنکھ
کے انگری پودہ کی سوچن (IRITIS) وغیرہ کی شکل میں نمودار
ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مرض شفا کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔

ماں باپ میں کسی کو بھی آتش رہے تو اس خیال سے کہ ان کی
اولاد میں نہ پھیلے۔ حسب ذیل طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حالت
عمل میں اور جتنے عرصہ تک بچہ ماں باپ کا دودھ پیتا رہے ماں پر

دو ہفتہ پر ایک، خوراک سفلیئم ۳۰۔ اور روزانہ مرک سول ۶۔ (صبح)
استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال کرنے سے اگر بخہ میں کمزوری وغیرہ
کے علامات پائے جائیں تو بخہ کو ہر روز صبح و شام ایک خوراک مرک سول دینا
چاہیے (امراض طفلان کے بیان میں سور المزاجی یا خاندانی مرض ملاحظہ ہو)۔

(ج) طبی زہر (dyco sis) سوزاک سائیکو سیس: کینٹ اور
ہنی مین کا بیان ہے کہ زہر سوزاک دو قسم کا ہوتا ہے حاد اور مزمن حاد زہر

پھیلتے پر مقامی (LOCAL) سوزاک پیدا ہوتا ہے اسوجہ سے اس کی
شروع، نمود، اور زوال، یہ تینوں درجے یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔

اور مرض مزمن میں ماؤف ہونے پر (CONSTITUTIONAL) حلقی

سوزاک پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی شروع، اور نمود دہی درجے

ہوتے ہیں۔ حلقی زہر سوزاک، یا سائی کیو سیس، خرابی مہاسہ ہے دونوں قسم

کے زہر حملہ کرنے والے ہیں اور ہر سرایت کرنے کے آٹھ دنوں میں روز بعد سوزش

مجری بول (URETHRITIS) کی طرح ان دونوں ہی مرض سوزاک

میں مجری بول (MUCO PURULENT DISCHARGES) ہوا کرتا ہے

پیکاری کے ذریعے سے نائٹریٹ آف سلور وغیرہ مقامی دوائیں استعمال کرنے

پر بہت مریضوں کا یہ اخراج بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سب طریقوں سے

اخراج بند کرنا نہایت مضر ہے۔ سوزش مجری بول اور امراض حیض والے

باب میں مرض سوزاک ملاحظہ ہو)۔

مقامی (یا معمولی مرض سوزاک میں صرف آلہ بول پر حملہ ہوا کرتا ہے تمام

جسم ماؤف نہیں ہوتا۔ پٹرو سلینم اس کی بہترین دوا ہے کنائس سیٹ، کینٹھرس،

یا کو پیوا کی کبھی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اس ملک میں دونوں قسم کے سوزاک

میں سے مقامی سوزاک کی تعداد زیادہ ہے۔ سوراہ میں مبتلا مریضوں کو

مقامی سوزاک ہونے پر پہلے ادویات قابل سوراہ استعمال کرنا چاہیے۔

ہنی مین صاحب فرماتے ہیں کہ سائیکو ٹنگ یا (طبعی) سوزاک، ایک سخت

بیماری ہے یہ کل جسم کو خراب کر دیتی ہے۔ ہمیشہ بیماری کے شروع

ہوتے ہی، اس کا اخراج مواد کی طرح گھاڑھا۔ پیشاب میں تکلیف کم۔
تصیب میں سوجن اور سختی اور کسی کسی کو تصیب کے اوپر گانٹھ دار ابھار۔
(GLANDULAR TUBERCLES) ہوتا ہے۔ اور درد۔

(ملاحظہ ہو۔) ہنی میں صاحب کی تصنیف شدہ کتاب کے انک ڈسٹریکٹ
تصیب کے چاروں طرف گولریا گو بھی کے پھول کی طرح مسے یا گانٹھ
(EXCREBESCES) یہ سائی کیوسس کی مخصوص علامت

ہے، گولریا کی طرح ہونے والے مسے بہت ہی خشک رہتے ہیں اور گو بھی
کے پھول (یا مرغ کی چوٹی) کی شکل والے لمبے دلتے عموماً اسپینج کی طرح ملائم
رہتے ہیں اور ان سے آسانی سے اخراج خون ہوتا ہے۔ کاسک سے جٹانا چھری
وغیرہ آلات سے کانٹا یا کس کر باندھنا وغیرہ کسی بھی ترکیب سے اگر یہ بڑھا
ہو گوشت جسم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یا پچکاری کا (INJECTION)

استعمال کر کے اخراج بند کر دیا جاتا ہے۔ یا زیادہ مقدار میں پارہ وغیرہ
(MERCURY ETC.) استعمال کیا جاتا ہے تو اخراج رفتہ رفتہ بند ہو

جاتا ہے اور ہمیشہ مندرجہ ذیل علامات پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہت زیادہ
(MUSCULAR) عضلاتی کمزوری اور سوزش کے (IRRITABILITY)

ساتھ فکر، سخت درد یا بہت خف عصی کمزوری (NEURASTHENIA)

دمہ یا ہوا کی نالی کے امراض (BRONCHIAL AFFECTIONS) ہاتھ کی

انگلی کے ناخن کی خرابی اور پتھیلی میں (PALMS) مسے، پیشاب کے راستے

سے اخراج بند کرنے کے بعد سے زائد گوشت کو کٹانے کے بعد سے

وجع مفاصل کا (خاص کر گھٹنے اور اٹری) حملہ ہوتا ہے۔ بال خشک

گویا جھکے ہوئے مریض کو جس طٹ کا ناقابل برداشت درد ہوتا ہے یا خفیہ الزم

کی سوجن یا جس طٹ پیدا ہوتا ہے۔ آندھی پانی کے دنوں میں

(یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک) جس زیادہ ہو جاتا ہے

(BOERICKE'S COMPEND PAGE 83 UNDER "SYMPTOMS OF

SUPPRESSED GDNORRHAEA") (ملاحظہ ہو)

اور عرصہ تک (یعنی دس پندرہ سال تک) مرض میں مبتلا رہنے پر
 عموماً مندرجہ ذیل علامات نمودار ہوتے ہیں، کئی خون، موم کی طرح چہرہ
 سفید ہونٹھ، کان صاف، جسم میں اکثر جگہ متے، آنکھ اور ناک سے
 گاڑھی زردی مائل سبز طوبت (YELLOWISH GREEN) نکلتا

آلات بول و نفس یا جگر کے سخت، امراض بہت تیز و جمع مفاسل
 (پیشاب کے راستہ سے خون بند ہونے کی وجہ سے۔ خصیہ میں ورم
 ہو کر مریض کو تکلیف سے بے چین کر دیتا ہے، ران، پیر، اور ٹلوے میں انجین،
 یا اگر ٹن کی وجہ سے مریض کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یا بڑی تکلیف سے لنگڑا کر
 چلتا ہے..... اگر کسی بچہ کے چہرہ پر خون نہ ہو مثل موم کے ہو
 یا بد ہضمی کی وجہ سے پانچانہ کے ساتھ غذا بلا ہضم کے نکلے یا ہر موسم
 گرما میں ہیضہ کی طرح دست ہوا کرے تو سمجھنا چاہیے کہ بچہ کے جسم
 میں سائیکوسس، اس کے والدین سے آیا ہے اور پوشیدہ بیٹھا ہے۔

کتھوجا۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ سائیکوسس، مزاج دالے مریض کی خاص دوا
 ہے۔ میڈورا، ٹم، کیلک کارب، حنا صکرناک سے گاڑھا زردی
 مائل سبز رنگ کا بلغم نکلنے پر (ناٹریک ایسڈ، کیلک فاس (خاص کر کئی
 خون کے ساتھ قوت رہنے پر) کیلی آلوڈ ۳۰۔ ۵۔ ہیپر سلفر، پلس، لی فولیم
 ایسڈ فاس، سلیکا۔ نیٹرم میو، کیلی سلف، نیٹرم فاس، ساٹنا، آڈ
 ناٹریک، آرس، بوریکس، کاسٹیکم، کلیمٹس، گریٹاٹس، ہائیڈراٹ
 نکس و میکا، کیلی بائی۔ سیپیا، وغیرہ ادویات (۲۔ ۲۰۰
 طاقت کی) مٹے کی خرابی دور کرتی ہیں، منتخب دوا استعمال کرنے
 اگر رکا ہوا اخراج پیشاب کے مقام سے نکلنے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ مرض
 شفا کی طرح رجوع ہوا ہے۔ اور دوا نافذ نہ ہو رہی ہے۔

مرکب سودا المراجی۔ کبھی دوا اور کبھی تینوں سودا المراجی، ایک
 ہی وقت اور ایک ہی بیمار جسم میں موجود ہوتی ہے۔ اس پر بھی تیز تیز
 ایلوپتھک دوائیں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے

جلدی امراض وغیرہ جسم کے اندر داخل ہونے پر مرض اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہنسی میں صاحب کا بھی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے ادویات و تاتل سو را استعمال کرنا چاہیے۔ اسکے بعد دافع آتشک یا سوزاک کی ادویات ان دونوں میں جن کے علامات زیادہ نمودار ہوں، اس کا علاج پہلے کرنا چاہیے اور اس کے بعد ادویات دافع سو را المزاجی جو باقی رہ گئی ہے۔ استعمال کرنا چاہئے۔

تینوں سو را المزاجی کے بارہ میں چند مزید باتیں

(۱) کبھی سو را المزاجی کی ابتداء اور نمویہ دو درجے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمود کا درجہ ابتدائی (PRIMARY) اور ثانوی (SECONDARY) درجہ عروج (ADVANCED) وغیرہ حقیقت درجے (SUB-STAGES) ہوتے ہیں جس حقیقت درجہ میں کوئی سو را المزاجی تندرست شخص میں سرایت کرتی ہے اُسی حقیقت درجہ کی ہی علامت اُسی وقت سے اُس شخص میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جس میں مرض سرایت کرتا ہے اور مناسب وقت پر اسکے ذریعہ تبدیلی کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا درجہ حقیقت کے پیشتر کوئی بھی علامات مادی شخص میں موجود نہیں ہوتی۔ جیسے اگر میاں اور بیوی دونوں میں فرد کو آتشک ہو، اور اگر درجہ ثانوی میں صحبت کے ذریعہ وہ بیوی میں سرایت کر جائے تو درجہ ابتدائی کے زخم وغیرہ کوئی علامات اس عورت کے جسم میں ظاہر نہیں ہوتے، لیکن درجہ ثانوی کے جلدی امراض وغیرہ (SYPHILODERMA) اور بعد کے علامات اُس میں اُس وقت مناسب طور پر ظاہر ہوتے ہیں جس سے خرابی یعنی سائیکوسس

سے ایک ایک اہل قابل تعلیم فن جراحی کے ماہر ڈاکٹر کا تخی لال مرحوم نے ممتاز درجہ بالا بیان پر رائے رائی کی تھی، درست نہیں ہے ابتداء الی اور ثانوی علامات ہمیشہ نمودار نہیں ہوتے۔ آتشک کا زہر (بقیہ پشت پر)

کے متعلق کبھی بالکل یہ ہی اصول ہے۔ درجہ شدت میں سوراخ میں مبتلا ہوئی عورتوں سے صحبت کرنے سے اسی درجہ شدت میں سوراخ مرد کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور بڑھا کرتا ہے۔ درجہ شدت میں سوراخ میں مبتلا ہونے والوں کے ساتھ کھیل کود سے خراب ہوا لگ کر بھی تندرست لڑکوں میں سوراخ داخل ہو جاتا ہے اور بڑھا کرتا ہے۔

(۲) نسلاً بعد نسل کا طریقہ مندرجہ بالا اصول کے تحت ہے اور سوزاک وغیرہ میں مبتلا ہونے والے یا پ کے اولاد پیدا ہونے کے وقت کی سوزا المراجی کی طاقت کے علامات اس پچھ میں پہونچتے ہیں اور ایسے بچوں میں جو سوزا المراجی (پشت کا آئینہ) جو کسی درجہ میں آتا ہے، وہی زہر ہے اور وہی علامات درجہ اول پیدا ہوں گے اور یہی حال سوزاک کے زہر کا ہے۔

اسکے متعلق ہمارے بیان کی تائید نہیں صاحب کے آرگن (DR. GANON) پر تفسیر کرتے وقت (POST GRADUATE SCHOOL OF HOMOEOPATHIES) ڈاکٹر ٹینٹ صاحب نامی اسکول میں عیش بہا سبق دیا تھا۔ (HOM PHILOSOPHY) اور اُس کے آگے نام سے جو تصنیف شائع ہوئی تھی اُس سے ناظرین کی واقفیت کے لیے چند سطور مندرجہ ذیل ہیں۔

آتشک یہاں سے بیوی میں سرایت کرتا ہے اور جن درجہ میں ہوتا ہے اُسی درجہ میں سرایت کرتا ہے اور اُس وقت سے بتدریج بڑھتا ہے۔ عورت یہ بیماری مرد سے اُسی درجہ میں پاتی ہے جس درجہ میں وہ شادی کے وقت مرد میں تھی۔ وہ (عورت) وہی پاتی ہے جو مرد میں ہوتا ہے۔ اگر مرد میں یہ بیماری ترقی پر ہوتی ہے تو نورت کو اُسی درجہ میں ملتی ہے (وہ عورت) اُسے (مرد اُسی درجہ میں پاتی ہے) جو اُس کے (مرد کے) پاس اُس کو (عورت کو) دینے کے لئے ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی بات سوراخ اور سائیکوسس کے لئے ہے، حاد میازم میں یہ بات کبھی واقع نہیں ہوتی، لیکن تینوں مزمن میازم میں چھوت ہوتی ہے اُسی شکل میں جس میں وہ اُس وقت ہوتا ہے۔ (لکچر ۳) یہ کہنا بیکار ہے کہ کچھ دنوں تک استقلال کے ساتھ آزمائش کرنے کے بعد علم ہونے پر نئے معالجوں کو جو رائے اُن کو ٹھیک معلوم ہو وہی اختیار کرنا چاہیے۔

داخل ہوتی ہے وہی سور المزاجی کے اثرات (یعنی سوزاک وغیرہ امراض کے قبولیت کا اثر بعدہ اُس کے مزاج میں ظاہر ہوتے ہیں۔

(۳) سفلس، سورار، یا سائیکوسس صرف ایک مرتبہ انسانی جسم پر چکر کرتا ہے زندگی میں کبھی بھی دو یا اس سے زیادہ مرتبہ کسی کو بھی آتشک یا سورار (نالی مرض) سوزاک ملے ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ اس کو چھ مرتبہ (سوزاک) ہوا ہے

تو سوزاک ایک مرتبہ آرام ہو جانے کے بعد دوبارہ یا زہر لگنے سے شروع سے نیا گنور یا (سوزاک) ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک مشہور بنگلہ کی ہومیو پیتھک کی کتاب میں پڑھ کر بہت تعجب ہوا۔ اس کتاب کے طبع بہت ہو گئے ہیں اسلئے اُس کے متعلق نہ کہنا ہی اچھا ہے لیکن خالص ہومیو پیتھک کی اشاعت کے لئے جنھوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اُن ہی صادق دور اندیش معالج ڈاکٹر کینٹ کی تصانیف تمام طلباء کو نہایت غور و خوض سے پڑھنا چاہیے۔

ایکے علاوہ پروارک پکستان بنگلہ زبان کا طبع نہم کے شائع ہونے پر کلکتہ کے ایک مشہور ڈاکٹر نے ہم لوگوں کی باتوں کی تردید کی تھی اس کے جواب میں انکساری کو ہمارا کہنا ہے کہ

(AS REGARDS THE NOTE WITH REFERENCE TO A FRESH

ATTACK OF SYCOSIS OR SYPHILIS WE WOULD OBSERVE THAT WE

ARE BELIEVERS IN DR. KENT'S VIEW WHICH HAS BEN FRE

QUENTLY CONFIRMED DURING OUR LIMITED EXPERIENCE"

جو ہو، ظہار اور عالم ناظرین کی واقعیت کے لئے شکا کوئی میں ہومیو پیتھک

(MD. PH. D. LL. D.)

مڈیکل کالج کے میسر یا میڈیکا کے عالم مشہور

(SAINT JACQUES HOSPITAL) ڈاکٹر کا دہر تھایت پیرس کے مشہور معالج

اور ہومیو پیتھک بٹا ہی مجلس (HELD AT THE PARIS) کے صدر فرانسیسی

OUSSET PIERRE M. D.) ڈاکٹر (WORLD'S FAIR IN JULY 1900)

نیویارک ہومیو پیتھک مڈیکل کالج کے علم العلاج کے معلم اور فلورا ہسپتال کے دور اندیش معالج ڈاکٹر سینڈٹ مرس (A. B. M. D.) ہومیو پیتھک (بقیہ پشت پر)

(بقیہ نشیت کا) کا قابل عزت ماہواری رسالہ (THE HOMOEOPATH RECORDER) موسومہ کے سابق اڈیٹر ڈاکٹر ایس. سٹرج (M.D.) اور خالص ہومیو پیتھک فلسفہ کے دلدادہ ڈینم ڈیکل کالج کے معلم نرس میں مرض کے علاج کے ماہر ڈاکٹر وغیرہ (A.M.M.D.) صاحبان کے کتب وغیرہ سے کچھ اقتباس درج ہے۔ جو شخص مرض آتشک میں ایک مرتبہ مبتلا ہو چکا ہو اسکو دوبارہ نہیں لگایا جاسکتا اور آتشک ثلاثی کا نتیجہ اکثر مستقل ہو کر رہتا ہے۔ کاپر ویٹ کی پریکٹس ص ۶۹ اور ۷۵۵۔ ملاحظہ ہو۔)

جب طبیب آتشکی شخص کو شادی کرنے کی اجازت دے تو طبیب کو چاہیے کہ اس آتشکی شخص کو پیشتر ہی مطلع کر دے کہ اس کی ذمہ داری صرف اس پر نہیں ہے۔ کیونکہ ثلاثی درجہ آتشک ظاہر الشفاء ہونے کے دن ہی نہیں تیس اور ستادین برس کے بعد بھی نمودار ہوتا ہے، میری جاسٹ پریکٹس آف ایڈیشن مترجمہ جے، آر، کیسیگونی ایم، ڈی ص ۶۷ ملاحظہ ہو۔

(۷) ثلاثی علامات (آتشک) کے ظاہر الشفاء ہو جانے کے ۵۰ برس بعد بھی نمودار ہو سکتا ہے اور علاوہ سوزاک شفا ہو سکتا ہے گو کہ بالکل شفا یا با نہایت مشتبہ ہے۔ اکثر مریضوں پر دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ جو غالباً صرف اعادہ مرض ہے۔ ڈاکٹر سینڈس بسن پریکٹس ص ۱۷۵، ۱۶۳، ملاحظہ ہو، ہم لوگوں کے لئے یہ کہنا فضول ہے کہ کل کی تازہ تعریف موسومہ ہومیو پیتھک پریکٹس بہترین تعریف ہے۔

(۸) اکثر تجربہ کار طبیب دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان سوزاک کے شدید ذہر سے کبھی بھی نجات نہیں پاتا۔ جن لوگوں کو بیماری چھوٹ سے ہوئی ہے۔ وہ اخراج مواد کی تکلیفات سے چھٹکارا پائے اور سمجھنے لگے کہ شفا ہو گئی۔ لیکن بعد کو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ براہ راست چھوٹ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ای، پی، این، شوٹنز کی کتاب موسومہ سکشول ص ۷۵ ملاحظہ ہو۔

(۹) تین نرس بیماریوں (MISERIES) میں سے صرف ایک بیماری انسان کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حملہ کرتی ہے۔ انسان دو مرتبہ سیش میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ دو مرتبہ ساکو بسن میں اور نہ دو مرتبہ مورایا (بقیہ نشیت)

تو سمجھنا چاہیے کہ اصل سوزاک اسکو صرف ایک مرتبہ ہوا تھا۔ زہریہ سوزاک یا سائیکوسس سے ماؤف شخص بھی دوسری مرتبہ طبعی زہر سوزاک قبول نہیں کر سکتا۔ (۴) امراض مزمن میں دوا استعمال کرنے کے بعد (۱) اگر پہلے بالائی جسم کے (جیسے سر کے) اور اس کے بعد نیچے کے (جیسے ہاتھ پیر وغیرہ) نیچے کے

(SYMPTOMS DISAPPEARING FROM ABOVE DOWNWARDS)

علامات غائب ہوں (ب) اگر اپنے جسم کے اندرونی علامات اور اس کے بعد بیرونی (جیسے جلد وغیرہ) علامات آرام ہوں یا (ج) کسی مرض کے موجودہ علامات میں اگر سب کے آخر کی علامات سب سے پہلے آرام ہو، اور اُس کے بعد پہلے کی علامات ترتیب وار کم ہوں تو سمجھنا چاہیے۔

(DISAPPEARING IN THE REVERSE ORDER OF THEIR COMING)

کہ طبعی ہومیوپیتھک دوا منتخب ہوئی ہے۔ جیسے ورم غشاریطین میں دوا استعمال (ENDOCARDITIS) کرنے کے بعد اگر کوئی چلدی بیماری نمودار ہو تو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک دوا منتخب ہوئی ہے۔

(۵) مرض کے مجموعی علامات کو دیکھ کر مرض مزمن کی دوا منتخب کرنی پڑتی ہے۔ اور منتخب دوا کی ادنیٰ طاقت (جیسے ۳۰-۲۰۰۔ صرف ایک خوراک ہفتہ وار) یا اُس سے زیادہ ادنیٰ طاقت ۱-۱۰۰۰۰۰۔ ایم۔ ایم۔ ۵۴ دنوں میں ایک ماہ کا وقفہ دے کر یا تین چار ماہ کے وقفہ سے ایک ایک خوراک کی دینی پڑتی ہے۔ دوا استعمال کرنے کے بعد

(بیشک کا بقیہ) یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر کسی سے دریافت کیا جائے کہ تم کو کتنے مرتبہ سوزاک ہوا ہے تو جواب دیگا کہ قریب قریب نصف درجن کے لیکن اس میں سو صرف ایک ہی سائیکوٹمک ہے۔ سائیکوٹمک خلقت پر دوبارہ سائیکوسس کا حملہ نہیں ہوتا۔ ایک حملہ کے بعد انسان کو ہمیشہ کے لئے امانت مل جاتی ہے۔

کینٹ صاحب کے لکچر متعلق ہومیوپیتھک فلاسفی پہلا ایڈیشن ص ۱۴۲ ملاحظہ ہوں

کچھ فائدہ ظاہر ہونے پر دوا کچھ عرصہ تک بند رکھنی پڑتی ہے اس کے بعد ضرورت ہونے پر وہ دوا یا کوئی دوا مرئیض کی حالت کے مطابق دینا چاہیے۔
مفصل تشریح کے لئے اس کتاب کا باب امراض ماد اور مزمن مطابق

رائے مہی من صاحب (HANNERI ANN'S CHRONIC DISEASES)

KENT'S LECTURES ON HOM PHYLOSOPHY ALLEN'S CHRONIC
MIASM'S اور BIDWELLS HOW TO USE THE REPERTORY)

مقصد (ج) علم الجبرائیم

(قرار حمل ملاحظہ ہو)

پانچویں یا چھٹی بار کی اشاعت کے کسی کسی بزرگ قابل تعظیم مفسر نے یہ کہا ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو بات پائی جاتی ہے زمانہ مستقبل میں اسی بات کے سیج ہونے میں نقص کیوں پڑے گا؟ تعجب خیز فعل نیا علم جبرائیم کے شاعروں کے سخت فرضی باتوں کو بھی کام میں تبدیل کر کے سیج ثابت کر رہا ہے تو جان کی پیدائش کے مضمون کو وہ کیوں نہ ثابت کر سکے گا؟ اس کے علاوہ کسی کسی عالم کے مٹھ سے یہ بات بھی گھسنے میں آئی ہے کہ جب کپڑے، محقر، جوں، کھٹل، وغیرہ پسینہ سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا کیا وی ترکیب کے زور سے مادہ میں جان موجود ہونے کا ثبوت کبھی بار آور نہ ہوگا۔ ان دونوں طریقوں کے سوال کرنے

۱۸۲۱ء میں آخر میں ہمیں کا آرگن جو پہلی بار طبع ہوا ہے اس میں مندرجہ ذیل اصول کے موافق معلوم ہوتا ہے امراض مزمن کے علاج کے شروع میں تعجب ہو مودا کچھ روز زیادہ مقدار میں روز تین چار مرتبہ استعمال کرانے کے بعد (آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد) وہ دوا زیادہ ادنیٰ طاقت میں استعمال کرانا چاہیے، سوا، سفلس، سانگیو سس امراض کی دوا کے مقدار کے بارہ میں دورانہش قاعدہ بنانے والے۔
۲۔ آخری رائے دیتے ہیں (ORGANON) مطبوعہ بارششم
۲۔۳ مقصد کا فٹ نوٹ ملاحظہ ہو۔

والوں کی خدمت میں حسب ذیل چار باتیں خوب استقلال سے سمجھنے کی درخواست کرتا ہوں۔

(۱) شروع ہی زمانہ سے تمام ممالک میں انسانوں کے مختلف طرح کی چیزوں کو مرکب کرنے یا علیحدہ کرنے وغیرہ ترکیب کے ذریعہ جان پیدا کرنے کی بار بار کوشش کی ہے اور بار بار ناکامیاب ہوئے ہیں۔ مغربی علم کیا بھی یہ فعل ناممکن سمجھ کر ہاتھ لگانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ۱۸۴۲ء میں ویسٹمن نے جب پیدائش اختیار کرنے کے طریقہ سے اس کے موافق رائے ظاہر کرنا چاہی تو علمی دنیا میں ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان کی تصنیف موسومہ دونوں کتابیں زمانہ

کے (BEGINNING OF LIFE (1872) & EVOLUTION OF LIFE (1907) نشان سمندر میں ڈوب گئیں۔ اس دن کیموج کے عالم بارک صاحب کے کیونڈس کے علمی کیمیا گاہ (LABORATORY) میں کیمیا کی ترکیب کی طاقت (REDIUM) ریڈیم۔ بارول (BOVRIL) وغیرہ کے مرکب سے جان پیدا ہوا کرتی ہے اس ڈھنگ کی ایک شہرت ہوئی ہے۔ (VIDE BURKE'S ORIGIN OF LIFE & MC. CABE'S FROM NEBULA TO MAN.) لیکن ناظرین

شاید بھولے نہ ہوں گے کہ اس زبردست غرور کا کیا حشر ہوا تھا اور حیوانی دنیا نہ ہو کر بیکار جھوٹ اور ڈھونگ کی دنیا ہوتی تھی۔

(۲) اندھے میں کچھ آکسیجن (OXYGEN) کچھ ہائیڈروجن (HYDROGEN) اور کسی غذا میں نائٹروجن رہتا ہے، سائنس نے خوب تلاش اور تحقیقات کر کے یہ پتہ تو لگایا ہے۔ لیکن کوئی بھی کیمیا کا عالم ان ایجاد کے ہواجرار کو مناسب مقدار میں ملا کر آج تک ایسا اندا تیار نہ کر سکا۔ جس کے ٹوٹنے

لے اب انجمن موسومہ (DUNDEE BRITISH ASSOCIATION) ڈانڈی

شیر نے (DR SCHAFER) کہا ہے کہ تھوڑے ہی زمانہ کے بعد علم کیمیا کے ماہران اپنے اپنے کیمیا گاہ میں مادہ کے مرکب سے جان پیدا کر سکیں گے۔

اچھی بات ہے۔ بحث کے لئے مان بھی لیا جائے کہ کیمیا دی ترکیب جان کے اجزاء پیدا ہونا ممکن ہے لیکن ان اجزاء میں روح کی تقدیس بازیتا کس طرح پیدا ہوئی۔

پھر چڑیوں کے بچے یہاں تک کہ بیگمچی کی طرح ادنیٰ جان بھی پیدا ہو سکے۔ یعنی کیمیا کے عالم جن اجزاء کے بارہ میں کہا کرتے ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسی چیز اور بھی چڑیوں وغیرہ کے اندر سے ضرور ہی ہوتی ہیں۔ جس کا پتہ موجودہ زمانہ کے کیمیا دانوں تک نہیں لگا۔ اور جس چڑی کی دیو سے کیمیا دی ترکیب سے تیار کئے ہوئے اندر سے میں جان کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔

(۳) زمانہ موجودہ کے کیمیا دانوں نے اکثر قسم کی آزمائش کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہنس اور مرغی کے اندر سے ایک ہی قسم کے ہیں۔ ان میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ اور وہ نہایت باریک ترین کانٹے کے وزن کے مطابق ایک ہی وزن کے ہیں اور دونوں ہی غیر متحرک اندر سے کاغذ (چھلکا) ٹوڑ کر تعجب خیز ساز و سامان سے آراستہ دو لاثانی جان نکلا کرتی ہیں۔ لیکن ایک کا اندر اکیوں ہنس کے بچہ کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ اور تیر سکتا ہے۔ اور دوسرے اندر سے نکلی ہوئی جسان کیوں چوٹی کی سجاوٹ سے پیدا ہوتی ہے اور پانی میں تیر نہیں سکتی؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف جنس کے اندر سے میں مختلف طبائع اور بھی اعلیٰ خاص اجزاء ضروری موجود ہیں جن کا پتہ لگالینا حلیم کیمیا کے دائرہ قدرت سے باہر ہے۔ اور جسم ناقابل محسوس اجزاء کی وجہ سے ہنس کا اندر اٹوٹ کر ہنس ہی کا بچہ نکلتا ہے۔ اور مرغی کا اندر اٹوٹ کر مرغی ہی کا بچہ اصلی شکل سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا یہ بھی ایک راز کی بات نہیں ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر کا جنین اول (۱) ذرہ کیسہ (CALL) رہتا ہے۔ اسکے بعد وہ علی الترتیب (۲) خاکی کیسہ حمل (۳) دھڑکتی بھیر لوتھڑا (۴) مچھلی (۵) مختلف قسم کی ضعیف جان پڑتا۔ اور دودھ پینے والی جان اور (۶) بندر کی شکل ہو کر آخر میں (۷) انسان کا جسم رکھ کر اس زمین پر آ پہنچتا ہے۔

(HAECKEL'S EVOLUTION OF MAN)

(ملاحظہ ہو)

جس طرح چند قطرے جامن بہت دودھ کو دہی میں تبدیل کر سکتا ہے اور ایسڈ کا ایک ذرہ جس طرح چار پانچ من شکر کو دوسری چیز کی شکل میں بدل سکتا ہے۔ علمِ مینا کے استاد فیثرا پیچھے عالم و فاضل کہتے ہیں کہ جاندار اور نباتات کے جسم سے نکلا ہوا بہت قسم کا سیال جو جسم میں موجود رہتا ہے بہت چیزوں کی شکل بدل کر قوت حیات کو ظاہر کرتا ہے (یعنی زندگی کچھ کیمیاوی تبدیلیوں کے نتیجے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔)

اسی اصول سے یکجا کرنے کے قاعدے کے بھر دسہر کیمیا گاہ میں نقلی جان تیار کرنے کی وہ اُمید کر رہے ہیں؛ اسلئے کیا ہم اُن سے دریافت کر سکتے ہیں کہ آب و دانہ وغیرہ جو چیزیں جسم کی ساخت میں فائدہ پہنچاتی ہیں اُن میں جولا انتہا طاقت چھپی ہوئی ہے اور جس چھپی ہوئی طاقت کو تحرک کر کے قدرتِ جاندار سے زندگی کے فعل کرا لیتی ہے جو عجیب طاقت نباتات اور جاندار جسم میں زندگی بھر موجود رہ کر جسم میں تسام کیمیاوی فعل جاری کرتی ہے، کیا اس طاقت کا کسی نے اب تک پتہ پایا ہے یا اس ناقابلِ معلوم بڑی قدرت کا پیر نہ بخیر میں جکڑ کر کیا کوئی کیمیا گر اس کو کسی روز جانچ کرنے کی نالی میں داخل کر سکا۔ ہے جو کیمیا کے سایہ میں آکر بڑی خوشی کے ساتھ اس لامحدود راز کو افشا کرنا چاہتے ہیں اُن کو مذکورہ بالاسر بیان دیسٹن اور برگ صاحب کی اچھل کود کے ضروری ہونے والے نتیجہ کو دوبارہ یاد کر لینا چاہیے۔

(۴) پکایا ہوا غلہ یا دودھ دہی وغیرہ کھانے کی چیزیں چند روز تک رکھ کر چھوڑنے پر اُس میں چھٹا لگ جاتا ہے اور کچھ روز بعد یہ چیزیں سُرنی شروع ہو جاتی ہیں اور اُس میں چھوٹے چھوٹے کپڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کہاں سے آئے؟ پرانے زمانے کے علماء کی رائے تھی کہ یہ کپڑے اُن کھانے کی چیزوں سے نمودار ہو جاتے ہیں، کچوا، کپڑے وغیرہ نالی، یا کھانا وغیرہ میں دکھائی دیتے ہیں، اسلئے ان کی پیدائش تری سے ہونے لگی دھت

(۱۰۱۶ بھارت ورثہ حیرت ملاحظہ ہو)

ایک اصول کے تحت ہو کر ان کا نام تری سے پیدا ہوئے رکھ دیا گیا ہے اور یقین کر لئے گئے

(ABIOTHESES OR SPONTANEOUS GENERATION)

کہ ان کی پیدائش خود بخود ہے، لیکن ریڈی لین، دل، ہویک، حلیم، ہولنج، پیس ٹیڈر، ٹنڈال، الیٹر وغیرہ، معظم سائنس دانوں نے دو سو سال تک (۱۸۶۹ء - ۱۹۶۰ء) بڑی سے بڑی حکمتوں اور چھوٹے سے چھوٹے آلات وغیرہ کی مدد سے بہت ہی سخت آزمائش کے بعد پرا شک شبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذکورہ بالا کیڑے خود بخود پیدا ہونے والے نہیں ہیں، ان پیدائش ہوا میں اڑتی ہوئی دھول کے ذرات خدا جانا سے ہوئی ہے۔ زمین کی ہر جگہ ہم لوگوں کے ذرات دکھائی دیتے ہیں، معزز ٹنڈال بڑی کوشش سے ہر طرح کی آزمائش کے بعد نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی دھول کے کل اجزاء درحقیقت دھول ہی نہیں ہیں۔ اس کا زیادہ حصہ دھول کے ذرات اور بہت کم حصہ چھوٹے چھوٹے ادنیٰ طبقہ کے جاندار ہیں) یہ دھول کے ذرات کثیر تعداد میں جو خوردبین سے معلوم ہوتے ہیں۔ جراثیم (GERMS) (OR BACILLI) کی شکل میں پانی، زمین، ہوا، خلا میں ہر جگہ موجود ہیں ہلوگ سائنس یا

اس موجود زمانہ کے علم الجراثیم کے حاملوں کا فرمانا ہے کہ ایک جسم کے جراثیم سے ایک مختار قسم کے مرض پیدا ہوا کرتے ہیں، جیسے کمایسیس نام کے جراثیم مرض ہنسیہ پیدا کرنے والا ہے۔ بیسیس سیس، پلگ کا سبب محرکہ وغیرہ ملاحظہ ہو) پلگ وغیرہ امراض سے ماؤں شخصوں کے دست، تے، وغیرہ میں مذکورہ بالا جراثیم دکھائی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے علم الجراثیم کے علماء مذکورہ بالا جراثیم کو اس مرض کے حملہ کا مقدم سبب سمجھتے ہیں یعنی ان جراثیم کے تندرست جسم پر حملہ کرنے ہی سے مرض وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی سبب سے بیماری تندرستی خراب ہونے سے ہی مذکورہ بالا جراثیم ہمارے جسم کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ (یعنی ہم لوگ اپنے فعل سے اُنہیں اپنے جسم میں دعوت دیتے ہیں۔)

نگی ہوئی چیزوں یا سڑے زخم میں جو کیڑے دکھائی دیتے ہیں وہ ان ہی لطیف جسم والے جانداروں کے خاندانی ہیں ان ہوا میں رہنے والے قابل دید جراثیم کے اثر سے ہی دودھ ترش ہو جاتا ہے، شراب کھجور کا عرق وغیرہ سیال ٹھیک چیزوں میں پھین یا خمیر (FERMENTATION) یا تاڑی پیدا ہو جاتی ہے، انسانی جسم کی کوئی جگہ کٹ جلنے پر یہ جراثیم اُس جگہ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور مرض کی جگہ پر مودا پیدا ہو جاتا ہے۔ درحقیقت آجکل کی کیمیاوی دنیا نے خود بخود پیدا ہونے کا خیال ترک کر دیا ہے، جاندار کے پیدا ہونے کے بارہ میں موجودہ زمانہ کے سائنس دانوں نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ صرف جاندار ہی سے جاندار کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تحقیق کی ہوئی صاف گو سائنس نے ۲۰۰ سو برس کی متواتر تلاش اور سخت تحقیقات کے نتیجے کے طور پر یہ برار اذو نیاز کے روبرو بلا شک و شبہ قائم کیا ہے۔

Vide Spencer's Biology. Huxley's Presidential address of 1870 to the British Association.

Tyndalls Article in the Nineteenth century for January 1878, Haeckels Natural History of Creation, Tyndalls Floating Matter in the air and chambers Encyclo-poedia article

"Spontaneous Generation"

لیکن اس جگہ پر یہ کہنا نامناسب نہ ہو گا کہ مذکورہ بالا جراثیم کے پیدا کرنے والے (یعنی سابق جراثیم کے بیج) کس طرح اس زمین پر آئے ہونچے اس بارہ میں زمانہ کے موجودہ کے سائنس دانوں میں سخت اختلاف رائے دکھائی دیتا ہے۔

گزشتہ زمانہ کے کسی نیک ساحت میں تعجب خیز کیمیاوی طاقت کے اثر سے یکایک مادہ میں جان پیوست ہو کر اصول علی الترتیب کے

مطابق بہت دنوں سے اور بہت اوقات اختلافات ہونے پر بھی گروہ زمین سلسلہ وار مختلف قسم کے جانوں سے بھر گئی ہے۔ سو اتنی نچتر پورے طریقہ کامیابی کا وہ بڑا وقت اب گزر گیا ہے اسلئے دنیا کے موجودہ حالت میں کیمیاوی ترکیب سے جان پیدا ہونے نہیں دکھائی دیتی ہے کہہ کر جو سب کیمیا کے متعلق مضامین لکھنے والے ماہوار رسالہ میں لمبی چوڑی باتیں بنا کر یا بھان متی کا پیارہ بجا کر اپنے اپنے ایجاد کی طاقت و عظمت دکھاتے ہوئے جان کی پیدائش کا سوال حل کر ڈالتے ہیں۔ ان کی تو بات ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ مذکورہ بالا اچھے مشکل خیالات کا مطلب یہ ہی ہے کہ خود بخود پیدا ہونے کی رائے اصول علی الترتیب کی مدد سے ثابت ہوتا ہے اور اصول علی الترتیب خود بخود پیدائش کے ذریعہ آسانی سے ہی قائم کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ یہ تو ایجادِ جال ان کے آسان عقیدہ کا علم ظاہر کرتا ہے لیکن نامعلوم جراثیم کی طرح یا دھوکے کے مثل بھی لطیف ہو سکتا ہے لیکن بد قسمتی سے آزمائش کا مشاہدہ موجودہ نئی سائنس یا قدیم خیالات کے ایجاد کرنے والا فلسفہ اس کی بالکل تائید نہیں کرتا۔ علم کیمیا کے سر تاج قابلِ تعظیم عالم و فاضل لارڈ کیلون صاحب فرماتے ہیں کہ شروع میں جراثیم ٹوٹے ہوئے تارہ میں موجود تھا۔ اس کے بعد ٹوٹے ہوئے تارہ کے ساتھ وہ زمین پر گر کر زمانہ ابتدا پر اپنا خاندان پھیلاتا ہوا اصول علی الترتیب کے قاعدہ کی مطابق بہت جسم کی جانوں میں تبدیل ہوتا ہے۔

۱۔ مشاہدہ (OBSERVATION) اور تجربہ (EXPERIMENT) کے ذریعہ ہم لوگ موجودہ زمانہ میں بیگزول کی سچائی اور حقیقت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور زمانہ حال کی سچائی کی تفسیر کر کے زمانہ گذشتہ کی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں، سائنس کی یہ ہی رائے ہے۔ اسکے علاوہ جو ہمارے علم میں آتا نہیں وہ سائنس (علم کیمیا) نہیں ہے۔ فرض یا حکمت سے خالی صرف اندازہ یعنی زمانہ حال کی کیمیا سے زمانہ گذشتہ کی کیمیا طفلانِ علم کیمیا کا شغل ہی اب مشاہدہ اور تجربہ کے ذریعہ زمانہ حال میں خود بخود پیدائش ثابت نہیں ہوتی۔ اسلئے اس زمانہ حال کی تفسیر کر کے گذشتہ زمانہ کی خود بخود پیدائش کیمیا دان کی حکمت کے بھروسہ پر اس قسم کے اصول تک اس طرح پہنچانا ناممکن ہے۔ اسلئے خود بخود پیدائش کو علم کیمیا کے مطابق کہنے سے کیا بچھیا یا نہیں جاتا (بقیہ پشت پر)

تمام قسم کے ماہر ان علم کیسے جرمین علماء رحیم ہونچ اور یورپ کے اکثر مشہور عالم اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن علامہ زولٹر (ZOLLNER) نے اسکی تردید کی ہے۔ فاضل ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کی کل جگہ نہایت لطیف جراثیم سے پُر ہے، خلا میں موجودہ جسم مناسب غذا، ہوا، حرارت پانے پر بڑھتے ہیں اور رفتہ رفتہ دنیا میں مختلف قسم کے جان کی شکل میں پیدا کرتے ہیں۔ صفحہ میں کہا گیا ہے کہ مادہ میں طاقت (ENERGY) پوشیدہ رہتی ہے خاص خاص حالتوں میں وہ ظاہر ہوتی ہے۔ صوبہ بنگال کے قابل فخر علامہ کیمیا داں سر عکیش چندر لیسو (K.T.M.A.D.S.C.C.I.E.C.B.I) کے تحریر کتاب (RESPONSE IN THE LIVING AND THE NON-LIVING)

موسومہ پڑھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عقل (یعنی) (SENSIBILITY) قوت احساس اسی طرح پوشیدہ طریقہ سے موجود ہے اور خاص حالتوں میں نمودار ہوا کرتی ہے اپنے بنائے ہوئے آلات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نباتات کے اعصاب متحرک ہونے پر آواز نکلتی ہے؛ یعنی راحت اور تکلیف (پشت کا بقیہ) اور خود بخود پیدائش کے طریقہ ثبوت میں انصاف کے قاعدہ کے (SYLLOGISM) دلیل کرنے کی جگہ (PREMISES) ٹھیک ٹھیک متقا پر نہیں معلوم ہوتی ہے اس لئے وہ نتیجہ (INFERENCE) ٹھیک (یا منطق کے مطابق بھی) نہیں ہے یعنی غلط ہے۔

اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ داخل کیا ہوا علم کیسے سچا یا حکمت یا پیدا ہوا نتیجہ (INFERENCE) خود بخود پیدائش کی دیوار نہیں ہے کہ وہ عقیدہ یا حکمت سے خالی تدبیر کے منصوبہ (SPECULATION) کے اوپر ہی اس کا انحصار ہے؛ یعنی علم کیسے اور اچھی حکمت کے نام پر اپنے فیصلہ کو بلا قیل و قال اور خوف و خطرہ کے تسلیم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

۴۔ (BARCIAY LEWIS DAY) صاحب کی تصنیف کتاب موسومہ سے (OUR HERITAGE OF THOUGHT) چند سطور مندرجہ ذیل ہیں (بقیہ پشت پر)

یا اپنے جاندار ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہیکٹس وغیرہ دو قسم کے راز مانتے والے لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ (VIDE HAECKELS) خلا کے ہر ایک ذرہ میں (REDLE OF THE UNIVERSE P. 57-868-WONDER OF LIFE) تین اوصاف موجود ہیں۔

دیشٹ کا بقیہ (دیدانت دلیری کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ جان ان چیزوں میں بھی یہاں تک کہ جن کو مادہ کہتے ہیں۔ پوشیدہ ہے۔ دیدانت کی رو سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ مادہ بے جان، تمام کائنات ایک جاتا ہے، ایک خیال ڈاکٹر یوس صاحب ان ذرات جو انہوں نے زندگی کے دوران انسانیت کا اظہار کرتے نئی سائنس کی ہے۔ نہایت عزت کے مستحق ہیں ہم لوگوں میں ایک گہری حس تعظیم کی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک ہندوستانی کا جسد تھا کہ وہ ہمارے زمانہ قدیم کے قابل تعظیم بزرگوں کے اس دلیرانہ قول کو کہ جان تمام چیزوں میں پوشیدہ ہے از مودہ طریقوں سے ثابت کرے۔ سابق گورنر (لارڈ رنڈلڈ شے) کے الفاظ میں۔ سر جیکبش کا جنم زمانہ کے ریشوں میں سے کسی کا اسلئے ہوا ہے کہ موجودہ زمانہ میں سخت سائنٹفک مظاہرات سے ثابت کریں کہ ایک دنیا کا وجود ہے۔ جس میں جان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔

انے تیسھی ایم ڈی اپنے خیالات کا اظہار جو انہوں نے ہیگ میں مختلف اقوام کے ہومیو پتھیک کاؤنسل منعقدہ ۲۶ اگست ۱۹۱۸ء کے روبرو پیش کیا تھا اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں اصول کی قبولیت (ادویات کا دوا فعل ہستی میں علاج) (بالش) لندن کے ایک اخبار مارننگ پوسٹ، مطبوعہ ۸ جولائی میں دیکھا گیا تھا۔ اس اخبار نے ایک ہندوستانی سائنٹسٹ سر جیکبش یوس کے تصانیف پر رائے زنی کی تھی، یہ بیان کرنے کے بعد کہ یوس کا عقیدہ ہے کہ بودھوں میں بالفعل کا اثر ہے۔ مثلاً بے تار برقی کی تحریک جو نہایت نازک احساس والے انسان اور دوسرے بھی نہیں محسوس کرتے وہی اخبار پھر کہتا ہے کہ انھیں (یوس) نے ثابت کیا ہے کہ ہر قلیل مقدار میں دھات میں بھی تحریک پیدا کر دیتا ہے اور زیادہ مقدار میں ختم کر دیتا ہے، ہمارا اصل اصول مادی دنیا تک (بقیہ پت پر)

(۱) پھیلاؤ (EXTENSION) (۲) طاقت (FORCE) اور
 (۳) احساس (SENSATION) لیکن مادہ کے ماننے والوں کا خیال زندہ
 اپنے جسم کو تقسیم ہونے کی بجائے طاقت کے غرور میں ہمیشہ کے لئے ڈوب جانے کا اجزا
 (مقصد ملاحظہ ہو) کیا اس مادہ کے ماننے والوں کی تائید کو تا ہے؟ زنا
 حال کے علم کیمیا کے ایک خاص سردار ایرے لیس (ARRHENIUS) صاحب
 کی رائے کے مطابق کسی دور کے زندہ تارے — سے پہلا نہایت ہی لطیف تخم
 جان تمام دنیا میں حاضر و ناظر کے دباؤ کی وجہ سے چاروں طرف سے متحرک ہو کر زمین
 پر آ گیا ہے۔ لیکن بڑے بڑے علماء کے دوسرے قائم مقام — بلکہ، رن، صاحب
 (BECQUEREL) اس رائے کے خلاف فرماتے ہیں کہ غور کی امر میں ایسی
 جراثیم کی قابل ترین موجود ہے کہ اس سے نوزادہ جراثیم ہرگز زندہ حالت میں
 زمین تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور ٹوٹے ہوئے جسم تارہ یا تصور کے
 فریب سے کسی دوسرے تارہ سے تخم جراثیم کا زمین پر گرنا یا بڑے خلا میں
 جراثیم کا اترتے رہنا، یہ رائے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ آسانی سے پیدا
 ہو جاتا ہے کہ مذکورہ ٹوٹے ہوئے تارے یا گھڑ میں، یا خلا میں پہلا تخم جو سومر
 کس طرح پیدا ہو گیا (یعنی جان) روح کا مضمون ہم لوگوں کے دائرہ علم سے باہر ہی
 علم مادہ آج تک اسکو حل نہ کر سکا اور معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی حل نہ کر سکے گا۔
 بلکہ جان کی پیدائش کے بارے میں علم کیمیا کی طرف سے عالم سر نہری، اسکو
 علم روح کے نام سے مشہور و معروف علامہ ڈارون اور عالم دالین صاحب
 اور سائنس کے ماہر ہیکلے صاحب جو خدا سے منکر اور صرف مادہ کے قائل ہوں
 (دہشت کا بقیہ) پھیل گیا ہے، ہنیک و کین تقرابی میں ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے
 ہنیک مطبوعہ گذشتہ فروری میں درج ہے کہ واقعہ کے گرد کی راز کی اشاعت
 کی اشد ضرورت ہے کہ وہی چیز شخصیں مرض کا بڑا عمل قائم کر سکتی ہے۔
 مطلب بالمثل نہ کہ عمل مخالفت، بسنت کے کبھی نہیں سنا۔
 ہنیک کاتون ہونیو پیتھک، ورلڈ۔ مطبوعہ فروری ۱۹۲۱ء
 (۵۷ - ۵۸ - ملاحظہ فرمائیے۔)

میں پہلے شخص تھے علم مادہ کی طرف سے ہمیشہ عاقل شاعر ٹنڈل صاحب اور فلسفہ انقلاب کی طرف سے نہایت قابل ہربرٹ اسپنر صاحب اور بیسویں صدی کے بتدیج انقلاب کے حامیوں کے مادی فریج فلسفہ میں یکتا قابل تعظیم و رگسو صاحب انکساری کے ساتھ یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا اپنا اپنا علم اس دقیق مسئلہ کے حل کرنے میں بالکل ناقابل ہے بہت مدت تک غور و خوض کے بعد فلسفہ زندگی کے حامیوں کی جماعت نے ایک آواز سے تسلیم کر لیا ہے کہ حافرو ناظر ہستی دھوکے کے پردہ میں پوشیدہ ناقابل دید کوئی ایک ایسی ابدی اور قادر (ONE INFINITE & ETERNAL ENERGY) مطلق ہے جس کے اثر سے یہ حیرت انگیز کام ہوا کرتا ہے۔

اب سوال یہ ہو کہ تمام متفقہ منطق ہر جگہ حافرو ناظر قابل بیان بعید الفہم قدرت عظیم جو جان کی زندگی اور جاندار کی جان ہے اور جو حیوانات اور نباتات کیلئے بڑی طاقتور کو متواتر بھلائی کے راستہ پر چلاتی ہے وہ ادنیٰ طاقت تارکک ہے یا روشن وہ قدرت کاملہ عقل سے بے بہرہ ہے یا اس کی تہہ میں کوئی نیک اصول پوشیدہ ہے یعنی نئی سائنس میں بھی ناقابل دید ہستی کا مضمون کیا درست ہو گیا ایسی جھٹک پائی جاتی ہے؟ اس کے جواب کا بعض غور و فکر کر نیوالے ناظرین پر چھوڑ کر ہم مختلف محققین کی رائے درج کرتے ہیں۔

(SIR ARTHUR KEITH) نے اپنی تقریر میں بلا مبالغہ فرمایا ہے کہ جس ابتدائی جماعت کو ہمارے اومین ہزرگوار کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس میں خدائے برتر نے انسان کی پوشیدہ تقدیر ہمیشہ کے لئے لکھ دی ہے اس نیک ساعت میں مخلوق کو جو کچھ آج تک ملایا آئندہ ملے گا اسکا اظہار عجیب طور پر آغاز زمانہ میں ہوا ہے یعنی انسان کی طاقت اس کے اوصاف اور راز و نیاز کی تسکین انہی عجیب لطیف نظروں وغیرہ جملہ باتیں حالت روئیدگی میں اس میں موجود تھیں کینچھ وغیرہ عالموں کا بتلایا ہوا نئے زمانہ کا یہ علم ناقابل دید ہونے پر بھی سائنس کے ناقابل ترک ہے۔

لنارک صاحب جو جان کی بتدیج ترقی کے اصول باقی تھے اپنے سسٹم انیٹاٹک (۱۸۲۰) میں فرماتے ہیں کہ "نچر" (قدرت) چیزوں کا صرف قاعدہ ترتیب ہے جو ان قوانین کے تحت ہر جو قات برتری مرضی سے نکلے ہیں (۱۸۳۰) اس ذات برتری کی ہستی اور لائیوڈ وٹا کر انسان (بقیہ پشت پر)

مشاہدہ سے معلوم کیا ہے (صفحہ ۸) گو کہ یہ بات بے وسیلہ ہے لیکن خیال معقول ہے
 دارون صاحب بھی جن کو لوگ منکر کہتے ہیں اس مشہور کتاب کو سہ ماہی اور جن آف ایس
 سیر (صفحہ ۹۳) جیپ انڈیشن میں اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں میں اخذ کرتا ہوں کہ تمام جاندار جیسا
 ایک اصل شکل سے جس میں حاتی نے شروع میں زندگی پھونکی پیدا ہوئی تھیں پھر اپنے خطوط و صورت
 ۲۹ مارچ ۱۸۶۳ء کو بنام سر جے ڈی ہوکر ۲۹ نومبر ۱۸۶۶ء بنام وی کیس اور ۸ مئی ۱۸۶۸ء
 (یعنی دو ماہ قبل اپنی موت) بنام میکنتوش میں دارون علی الترتیب لکھتے ہیں (۱) بالکل زندگی کی صلیت
 پر ابھی خیال کرنا بیوقوفی ہے کوئی متا مادہ کے صلیت پر بھی غور کرئیے (۲) مجھے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی
 کا اصلی سبب اٹھ ساٹھ سے باہر۔ (۳) میری رائے میں کوئی قابل وثوق شہادہ ایسی نہیں ہے
 کی گئی جس سے معلوم ہو کہ جاندار سہی بلا جان کے مادہ سے پیدا ہوئی ہے۔

جاندار دنیا کی ترقی کے کم سے کم تین درجے ہیں جہاں کوئی تیسرا سبب یا طاقت ضروری عمل
 میں آتی ہے۔ غیر جاندار سے جان دار ہونا پہلا درجہ ہے جبکہ بالکل ابتدائی نباتاتی ذرہ (یا زندہ
 جزو پلازم جسم) سے پیدا ہوا ہے) شروع میں ظاہر ہوا۔۔۔۔۔ اس میں کوئی ایسی چیز ہے
 جو کیمیاوی تبدیلیوں سے بالکل ممتاز ہے گویا یہ بظاہر سیدہ ہے اور یہ بہت لوگوں کی رائے ہے
 کہ ابتدائی نباتاتی ذرہ دنیا میں ایک نئی چیز تھی جس میں طاققت تھی (دوسرا درجہ جس میں یہ
 ہی شکلات ہیں جو اس اور ضمیر کی پیدائش (اور ذی عقل کا خیال اور گویائی ہیں) والیں
 صاحب کا ڈراما تین سو صفحات ۴۷۴-۴۷۵ء ملاحظہ ہو۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ زندہ مادہ کی پیدائش کے ابتدائی بابت ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔
 ساٹھ کی رو سے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ زندگی کی ابتدا پر رائے قائم کی جائے۔
 ہم لوگ صرف قیاس دوتا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی سائنٹیفک خوبی نہیں ہے
 کہلے (آرنک بیا لو جی دی انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا)

ایسے بھی لوگ ہیں جو پیش گوئی کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئیگا جبکہ کیمیا ساز (کمپٹ) نگار
 تعمیری کوششوں کے مطابق (الیومین) سے تجاذر کر جائیں گے اور حیوان مادہ کی صلیت
 کو جاندار جسم میں مجتمع کر دیئے کسی سر نقطہ نظر سے جو کچھ اسکی بابت کہا جائے لیکن کیمیا
 ساز (کمپٹ) صرف استقدر کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال انکے حیطہ اختیار میں کوئی ایسا
 ممکنہ نہیں ہے سر جی ڈی ہوکر کو صاحب کی تقریر بحیثیت صدر برائٹن الیوی ایشن ۱۸۸۷ء

انتیاری پیدائش کیو اتق کی شہادت لائق محقق کے سامنے رد ہو جاتی ہے۔
 سڈس فرگٹنٹ آف سائنس (آرٹیکل اسپین ٹیلیس خیرش)
 موجودہ دنیا میں ایسی چیز کا وجود نہیں ہے جیسا کہ غیر جانبدار مادہ سے
 جاندار مخلوق کا پیدا ہونا، ہر رٹ اسپنسر (ظاسفر آف ایلووٹین) مئی ۱۸۶۶ء ص ۶۹
 سر اسٹون نے اعلان کیا کہ آسمانی علم جو سقیل کے مطالعہ سے ایک فہم اور عقل کی
 خوبی سے پروہود کی ہستی کا نتیجہ نکلا ضروری ہے (پرنسپیا اسکول جن ملاحظہ ہو)۔
 جان کی پیدائش عملی کیمیا کے موجودہ دائرہ سے باہر ہے۔ پروفیسر مینگن کا کہنا ہے۔
 سر اولیور لاج صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ زندگی کی اصلیت زندہ
 پروٹوپلازم کے ایک جگہ مصنوعی طور سے طبع کر دینے سے بھی لاپتہ سمجھ میں آتی ہے وہ
 چیز جو کہ مادہ سے باہمی کام کرتے سے اسکو ایسی شے بخشی ہے جس کو ہم قوت حیات
 کہتے ہیں گمان غالب ہے کہ وہ ہم کو دھوکہ دیگی۔ یہ طاقت کی صورت نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن
 بلاشبہ شہید رہنمائی کا قاعدہ ہے جو طاقت کو کام میں لاتی ہے۔ یہ بات علم طبیعیات اور
 علم کیمیا کو خوب معلوم ہے اور تمام معمولی قانون قدرتی طور پر قائم نہیں ہوتے جو مادی دنیا کے
 قانون معلوم یا ہر معلوم ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں اپنی جدید تصنیف موسومہ ڈی میکنگ آف
 میں سر اولیور صاحب یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ چیز جسکو ہم انقلاب (EVOLUTION)
 کا راستہ سمجھتے ہیں۔ خدائی اور مقصد کا اظہار کرتے ہیں۔
 لارڈ کلورن صاحب اپنی تصنیف کی رپورٹ میں قوی تر میم کرتے ہوئے فرماتے
 ہیں (نائنٹی نینچی انڈیا فیٹر سلسلہ ۱۹ء) کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جان کی پیدائش کے بارے
 میں سائنس خالق کی طاقت کو نہ تسلیم کرتی ہے اور نہ انکار کرتی ہے، سائنس پیدا کرنے اور ہستی
 کرانکی طاقت کو تسلیم کرتی ہے اور بطور عقیدت کے تسلیم کرنے کے لئے ہم کو بھی مجبور کرتی ہے۔
 اور آخر میں پیدائش کیو اتق خراب اور سیکسی کی حالت میں بحفاظت میں پھینک دیا گیا
 تھا اسوقت بیرونی طاقت اندر داخل ہو کر ہمارے جسم کی بیرونی و ترقی کے باعث ہوتی
 ہے اعدیاں کے دودھ کے ساتھ محبت کا حال شدید اقل ہو کر اور اعز کے محبت کے ذریعہ
 زندگی خوشگوار ہو گئی ہے، بڑے ایام میں اور بیرونی ضرورت کے نتیجہ کی شکل میں طاقت جمع ہوتی
 ہے اور اسی کے بعد وہ بیرونی جنگ و جدال میں قادر ہو سکا ہوں (بقیہ پشت پر)

تشریح الالفاظ

(GLOSSARY)

اجزاء صغیرہ :- مرکب اشیاء کا خورد ترین حصہ جس میں مرکب اشیاء کے تمام صفات موجود رہتے ہیں (MOLECULE)

اجزاء صغیرہ کا انتشار :- کسی مرکب کے بالکل ٹکڑے جانے پر اس کے ذرات کا برقی نقطہ میں تبدیل ہونا۔ (DISSOCIATION OF MOLECULES) ملاحظہ ہو۔

ادویات تھامیہ - یا (COMPLEMENTARY REMEDIES)

(COMPLEMENTS)

ادویات محرکہ :- جو دوا کسی حیوانی عضو میں تحریک پیدا کرتی ہے (STIMULANT)

اسباب محرکہ :- کسی مرض کا سبب تحریک اسباب (EXCITING CAUSE) سابقہ ملاحظہ ہو۔

استسقا - مرض شکم - پیٹ میں پانی بھر جانا (ASCITES)

اُبھار خون کی وجہ سے کسی حصہ جسم کا سخت ہو جانا یا پھول جانا (ERUPTION)

اسباب ثانوی :- اسباب سابقہ ملاحظہ ہو۔

ادویات مادی (MATERIALISM IN MEDICINE)

(MATERIALISTIC MEDICINE)

آزمائش ادویات :- تندرست جسم میں دوا کے اثرات کی (PROVING-S)

آزمائش یعنی حالت صحت میں دوا کے کھانے سے جسم اور دماغ کے عمل و علامات اور حالات جو ظاہر ہوتے ہیں ان تمام علامات اور حالات کا لکھنا۔

(بقیہ پشت کا) اس میں میرا اپنا ہیں کہاں ہی اس سبب کی اصلیت میں ہوں کہ تم! اندر اور باہر کے اس طاقت کے ہی جنگل جہاں میں مختلف طریقوں سے زندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ دونوں کی اصلیت میں ایک ہی طاقت عظیم ہے۔ جس کے ذریعہ سے ذی روح اور غیر ذی روح ذہہ اور مجسمہ کائنات ذی روح ہو رہی ہیں۔ اس قدرت عظیم کی ہمت میں ہی زندگی کی شکل ہے، مقدس پروفیسر جگدیش چندر بسو صاحب کی تعریف نہیں مگر نختہ اوکیت (مطبوعہ کولار ۱۹۲۸ء) ملاحظہ ہو۔ ۲۲۸ ملاحظہ ہو۔

امراض ادویات :- ایون پارہ، کوئین، وغیرہ دواؤں کے غلط استعمال کیونکہ مریض نے سیم
میں مزمن بیماری کی طرح کے علامات ظاہر ہوتے ہیں اسی کا نام

امراض ادویات (DRUG-DISEASES) ہے۔

ادویات نسج :- (TISSU REMEDIES) ملاحظہ ہو۔

امراض خلقی :- (CONSTITUTIONAL DISEASES) امراض عام ملاحظہ

آزمودہ (PROVED)

الم الحنجہ (دائیں بائیں پہلو کا) پسیوں کا درمیانی عضلہ کا درد (PLEURODYNIA)

الم عصص (COCCYGO DYNIA)

اسباب سابقہ : کسی مرض کے پہلے کا سبب (PREDISPOSING CAUSE)

اجتماع الدم : جسم کی کسی جگہ یا کسی عضو میں زیادہ خون اکٹھا یا متجمد ہونا۔ (CONGESTION)

انصباب :- کسی عضو میں زیادہ مقدار میں اور تیزی سے خون کا فوڑنا۔

(DETERMINATION OF BLOOD)

انقلاب - تبدیلی (EVOLUTION) (لفظ نیست ملاحظہ ہو۔)

اصول انقلاب - (THEORY OF EVOLUTION) (لفظ نیست ملاحظہ ہو۔)

ادویات مصلح (ANTIDOTAL REMEDIES)

ادویات مخالف (IN-COMPATIBLE OR INIMICAL REMEDIES)

ادویات ایک اثر والی (ALLIED OR KINDRED REMEDIES)

اعصاب (NERVES)

بدرقہ (INGREDIENTS)

برقی ذرات یا برقی نقطہ (ELECTRONS) (مقررہ ملاحظہ ہو)

بانی انقلاب (THE ORIGINATOR OF EVOLUTIONISM)

بخار بے قاعدہ :- جس بخار کا زمانہ راحت کم یا زیادہ ہوتا ہے (ملاحظہ ہو)

(ANTIPATHY) بے رغبتی، کراہت :-

(ERUPTIONS) پھنسیاں یا پھوڑا

(EXTENSION) پھیلاؤ۔

تر یا قزیر (ISOPATHY) اس کو فادزیر جراثیم بھی کہتے ہیں۔
 تشنج :- بلا ارادہ اعصاب میں کھینچاؤ۔ انجھن یا الکرن (SPASM)
 تقلیل :- دوا کا مقہر لطیف حصہ۔ (ATTENUATION)
 تقلیل کا اظہار - (EVOLUTION) نیست ملاحظہ ہو۔

تجربہ یہ (EXPERIMENTS)

تجزیہ تقسیم کرنا جدا جدا کرنا (ANALYSIS)

تیزی :- رفتار کی حالت یعنی فی سکند دوری جتنا بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ اسی
 حالت کو تیزی (VELOCITY) کہتے ہیں۔ جیسے گھوڑا اور گھنٹہ میں،
 (۲۲-۲۶-۲۸ سکند) پندرہ میل (یعنی ۱۵-۱۶-۱۷ فٹ) جانے پر
 اس کی تیزی $\frac{۱۵-۱۶-۱۷}{۲۲-۲۶-۲۸}$ = ۱ فٹ فی سکند۔
 جراثیم مرض - مقصد (ب) (MIASMA) سود المزاجی اور اس کا
 دفعیہ ملاحظہ ہو۔ (DISEASE GERMS)

جراثیم :- آنکھوں سے نہ دکھائی دینے والا بہت چھوٹا جاندار۔

(TERMS OF BACILLI) خوردبین کی مدد سے ملیسریا، پلیگ،
 ہیضہ وغیرہ بیماریوں میں یہ جاندار کثرتِ اخون میں دکھائی دیتا ہے۔ اسلئے اسکو
 پیدا کرنے والے کہتے ہیں۔ (ز امراض جراثیم اور مقصد)
 (ج) جراثیم پیرا (۲) ملاحظہ ہو۔

چھوت دار امراض (DIRECT) چھونے کے ذریعہ یا چیزوں کے ذریعہ
 دودھ، پانی، غذا، کپڑا، برتن، کھٹی وغیرہ) کسی انسان سے دوسرے انسان
 میں جراثیم مرض داخل ہوتے ہیں، اس مرض کو چھوت دار مرض
 (INFECTION) کہتے ہیں۔

حرکت :- کسی چیز کے قیام کی تبدیلی کو حرکت (MOTION) کہتے ہیں۔
 (شرح میں الفاظ زور اور طاقت ملاحظہ ہو)

حفظ یا قدامت :- کسی مرض کے حملہ کرنے کے پہلے ہی اسکو روکنے کی کوشش۔
 (PREVENTIVE OR PROPHYLACTIC TREATMENT)

- AGNOSTICISM) خدا سے منکر۔ صرف دو مادہ مانتے والے
- MATERIA MEDICA) خواص الادویہ :-
- (DOSE) خوراک۔ دوا کی مقدار
- (ABIOTGENESIS OF SPONTA NEOUS GENRATION) خود بخود پیدائش
- LUMBAG-) درد کمر
- (DYNAMIC) دوا کے اُبھارنے کی طاقت
- (COCCYX) دُبجی کی ہڈی۔
- دوا کی طاقت کا اُصول :- رگڑنے یا حل کرنے وغیرہ سے ہو۔ مسوتھیک
- طریقہ سے کسی دوا کا کیفِ حصّہ، یعنی مادی حصّہ یا غیر متحرک حالت کو چھوڑ
- کر وہ اپنی شکل یا لطیف حصّہ (یا متحرک حالت)
- یعنی پوشیدہ طاقت کا اظہار کیا جاسکتا ہے، اسی طریقہ کا نام، دوا کی طاقت
- (THEORY OF POTENTIALISATION OR DYNAMISATION) ہے۔
- ذرات بہت چھوٹا حصّہ (PARTICLES) یا عنصر کا لطیف ترین حصّہ
- (ATOMS) (مقصد (م) ملاحظہ ہو)
- (DRUG RELATIONSHIP OR RELATIONSHIP OF REMEDIES) رشتہ ادویات
- (THE AGE OF MATERIA LISTIC MEDICINE) زمانہ ادویات مادی
- (THE MATERIA LISTIC) زمانہ مادہ
- (PRESSURE) (WEIGHT) (ATTRACTION) زور کشش
- (FORCE) وغیرہ جس سے حرکت پیدا ہوتی ہے اُسی کا نام زور
- ہے۔ نیوٹن کہتے ہیں کہ حرکت پیدا کرنا، زور کا کام ہے، حرکت کی پیداوار
- استعمال زور، لیکن حرکت کی پیدائش کا سبب زور نہیں، حرکت کی پیدائش
- کا سبب کوئی نہیں جانتا۔ اسلئے کوئی چیز، موسومہ زور نہیں ہے۔ یا اگر
- کوئی چیز ہو بھی تو وہ طاقت، یا قوت ہے۔
- اسی شرح میں نقل، حرکت، قوت، ملاحظہ ہو)
- (DURATION OF DRUG ACTION) زمانہ قیام ادویات

زہر مرض :- مرض پیدا کرنے والے جراثیم یا زہر و بائیہ (VIRUS) سدیم :- (خلا) نہایت لطیف گئیں جو مقام فضا میں پھیلا ہے۔ جو کائنات

کے ہر ذرہ میں موجود ہے (ETHER) سوزش :- جسم میں سخت تحریک کی وجہ سے اعصاب اور عضلات کے فعل میں زیادتی ہونا۔ (IRRITATION)

سیال - گیلی چیز (SOLUTION)

سیال بنانا - گھلانا (PROCESS OF SOLUTION)

سور المزاجی (DYSORASIA) (مقصد ب) (ملاحظہ ہو)

سوزش :- جسم کے کسی حصہ میں درد، گرمی، سرخی، (INFLAMMATION) آگاس ہونا، جسے پیرکٹ جانے پر اگر دن میں پھوڑا ہونے پر ہاتھ ٹوٹ جائے پر۔ انگلی میں کانٹا چبھ جانے پر سوزش ہوتی ہے۔

ساخت :- جسم کے آلات کی بناوٹ (STRUCTURE)

سائیکوسس :- زہر سوزاک (SYCOSIS) (مقصد ب) (ملاحظہ ہو)

صریح :- دو معنی نہ ہو۔ جسکے دو معنی نہ ہوں ایک ہی معنی ہوں (UNEQUIVOCALY)

طبعی سوزاک - سائیکوسس (SYCOSIS)

طفیلی :- ایسا حیوان یا نبات جو دوسرے جنوں یا نبات کے جسم کے بغیر اپنی

غذا نہیں پاتے۔ (PARASITES)

طاقت دوا (DRUG POTENCY)

طاقت :- کام کرنے کی طاقت (یعنی مخالفت زور رہنے پر بھی کوئی چیز نہ

چلانے کے لئے قابلیت کو) طاقت (ENERGY) کہتے ہیں، جیسے

پھینکے ہوئے اینٹ کے ٹکڑا میں طاقت ہے وجہ یہ ہے کہ مرکزی کشش

کے خلاف بہت چڑھ سکتا ہے، طاقت کی ابت اور انتہا نہیں ہے

طاقت ہی ایک مادی شے، علت ہے (مقصد ا) (ملاحظہ ہو)۔

اور طاقت ہی ایک شے سے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے۔ کسی

بیرونی چیز سے، طاقت، ہمارے حواس کے ذریعہ داخل ہونے پر ہم لوگ

اس چیز کی موجودگی، شکل، ذائقہ، بو، وغیرہ سے معلوم کرتے ہیں۔ اس شرح میں الفاظ، فعل، حرکت، اور زور، ملاحظہ ہو، جناب لاج صاحب (SIR OLIVER LODGE LL.D. D. SC.)

فرماتے ہیں کہ طاقت ہی زور (FORCE) ہے، یا پیدا کرنے والا (FORCE GENERATOR LODGE'S ELEMENTARY MECHANICS.) صفحہ ایک ملاحظہ ہو۔

علم میں مذکورہ طاقت اس کی علامت کو مد نظر رکھ کر ہو میو پیتی میں ثقیل اور طاقت (POTENCY OR POWER) ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتا آرہا ہے۔ (صفحہ ۱۱۳۔ ملاحظہ ہو۔)

طب تشاہی (IDIOPATHIC)
عرق النساء (SCIATICA)
علم الحیات (BIOLOGY)

علم متعلق مقدار دردا۔ (POSOLOGY)

عتاصر۔ جو چیزیں اپنے جنس کے علاوہ کسی دوسرے جنس کی چیزوں کے مرکب سے پیدا نہیں ہوئیں (ELEMENTS) مقصد (۱) (۲) ملاحظہ ہو۔

علاج آب خون۔ (AERUM THERAPY) ملاحظہ ہو۔

علم کیمیا۔ اصلی چیزوں کی صفت، اور ان کے آپس کے ملنے اور جسد ہونے وغیرہ سے کیسا فعل ہوتا ہے یا کیسے مرکب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق علم (CHEMISTRY) ملاحظہ ہو۔

علم تجسیر۔ (SCIENCE)

علم سفوف۔ سفوف کرنا چکر کرنا۔ (PROCESS OF TRITURATION)
عقوتی (SCEPTICISM)

علاج بالمثل (HOMOEOPATHY THE LAW OF SIMILARSTHO)

(METHOD OF CURE) صفحہ ۱۰۱۔ ملاحظہ ہو

غیر متحرک۔ حرکت کا طاقت نہ ہوتا۔ (PASSIVE)

فعل غشاء :- نرم، لطیف، جال کی طرح صاف غلاف (MEMBRANE)
 کسی چیز کو اگر 'زور' (FORCE) کے خلاصہ چلا یا جائے تو فعل کرتا
 ہوا فعل تمام طاقت کے اتفاق (COHESION) کے خلاصہ ہوتا ہے۔
 تمام فعل میں طاقت ایک جگہ ہے دوسری جگہ جاتی ہے (اس شرح میں
 الفاظ کو، حرکت، زور، اور طاقت، ملاحظہ ہو۔)

فعل ادویات (DRUG ACTION OR ACTION OF REMEDIES)

فلسفہ انقلاب (PHILOSOPHY OF EVOLUTION)

قوت دافع مرض (VISMEDICATRIX NATURAL THE HEALING)

(POWER OF NATURE)

قوت حیاتیات :- (VITAL ENERGY)

قوت محرکہ ذرات :- (INTRA-ATOMIC ENERGY)

قواعد صحت (HYGIENIC RULES)

لطیف ترین (INFINITESIMAL)

مقامی مرض :- جس مرض کا حملہ صرف ایک حصہ پر ہوتا ہے تمام جسم مائل نہیں
 ہوتا۔ (یعنی خون کی خرابی نہیں پیدا ہوتی، اس کا نام مقامی (LOCAL)
 مرض ہے، آتشکی، زخم، مقامی مرض ہے۔ کیونکہ اس مرض کا زہر
 کسی تشدد سے شخص کے جسم میں داخل کرنے پر اس کے طرف آلات
 تناسل میں زخم پیدا ہو جاتا ہے (کل جسم پر مرض کا حملہ نہیں ہوتا)
 مرض خلقی ملاحظہ ہو۔

مالینولیا (HYPOCHONDRIA)

موروثی؛ خاندانی (HEREDITARY)

مادہ :- کسی چیز کے ذرات لطیف میں طاقت جب بلا حرکت موجود رہتی ہے۔

تب اس چیز کو مادہ (MATTER) کہتے ہیں۔ مقصد (۲)

ملاحظہ ہو۔

منکر، صرف مادہ ماننے والے (AGNOSTICISM)

(ST VITUS DANCE)

مرض رقص

(OBSERVATION)

مشاہدہ

(ANTIDOTES)

مصلح دوا

(COMPOUNDS) اعلیٰ چیزوں کے ملنے سے بنی چیزیں

مرکب اشیاء

مقصد (۱) (۲) ملاحظہ ہو

(NOSODES) مرض کے زہر سے تیار کی ہوئی دوا

مرض کے زہر سے دوا تیار کرنے کا علم، ہیمنہ، پلگ، وغیرہ متعدی
امراض کا زہر (VIRUS) یا جرم (BACILLI) جیسے اس کاپانی، مواد، خون وغیرہ جسم میں داخل کر کے اُن امراض کو دفع کرنے
یا علامات کو دُور کرنے کا علم (ISOPATHY)

(POTENTISED)

مخلط :-

(SYNTHESIS)

مرکب کرنا

پینے کی طاقت والا۔

متحرک :-

مرض خلقی: جس مرض سے کل جسم ماؤں ہو جاتا ہے (یعنی خون میں خرابی

ہو جاتی ہے) اس کا نام (CONSTITUTIONAL DISEASE) مرض

خلق ہے جیسے سخت زخم والا، آتشک، ایک مرض تمام جسم میں پھیلنے والا

ہے۔ کیونکہ یہ مرض خونِ ناک زہر مرض (VIRUS) کسی تندرست

شخص کے جسم میں داخل ہونے پر، اس کے خون میں خرابی ہو

جاتی ہے (جیسے مباحثہ کے بعد زہر پہلے قزیب پر زخم کی صورت

میں نکلتا ہے۔ اس کے بعد وہ قزیب سے ہو ٹھنڈا، انگلی،

پستان، مقعد وغیرہ کے دوسرے حصے میں پھیل جاتا ہے۔

مقامی مرض ملاحظہ ہو۔

مقامی مرض: کسی خاص عضو میں مرض ہونا۔

مرض متعدی: - براہ راست (DIRECT) چھوٹے سے جو براہِ غیر

کسی بیمار شخص سے کسی دوسرے تندرست شخص میں داخل ہوتا

ہے۔ اُس کو مرض متعدی (CONTAGIOUS) کہتے ہیں۔ جیسے سوزشِ کرن مول (MUNNPS) ہونیکا کھانسی۔ (WHOOPING COUGH) ہیضہ، انفلوئنزا، جذام، دق، ڈفٹیریا۔ چیچک، پچیش، مونیا، ٹائیفائیڈ بخار وغیرہ امراض چھوت دہر اور متعدی (دلوں سے لگے) ہیں۔ چھوت دار مرض ملاحظہ ہو۔

نمیت سے ہست ہونا۔ باطن سے ظاہر ہونا۔ متقدمین آریہ نیدتوں کی رائے سے خلا وغیرہ نہایت چھوٹے عنصر سے یہ کثیف دینا بنی۔ (زمانہ موجودہ دور کے سائنس دانوں کی رائے کے موافق کسی ایک ہی چیز کی تبدیلی سے تمام مادہ اور روح کا پیدا ہونا۔ اُسی کو نیست سے ہست ہوتا کہتے ہیں (EVOLUTION)

نیت سے ہست ہونے کا اصول (THEORY OF EVOLUTION)

(NERVOUS SYSTEM)

نظامِ عصبی

نسج کا بیان :- یافت و ساخت جسم یعنی مختلف سوت کی طرح ریشے وغیرہ جو باہم مل کر مختلف اعضاء جسم کی یافت و ساخت بناتے ہیں۔ و بار۔ جن بیماری کا حملہ ایک ہی وقت بہت اشخاص پر ہوتا ہے۔ اسکو و بار (EPIDEMIC) کہتے ہیں۔

Compiled & Edited
& All Rights Reserved
By
M. Bhattacharyya & Co (P) Ltd.

Published by:
Anupam Bhattacharyya
on behalf of
M. Bhattacharyya & Co. (P) Ltd.
73, Netaji Subhas Rd.
Calcutta-700 001

Price Rs: 75

6th Edition : February 1986

Printed By: Granthalaya Pvt Ltd.
(Printing Division)
P 518 Raja Basanta Roy Road
Calcutta-29

